




3 2044 106 312 119

Bot Diet

H 51





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLIŃK



**Nomenclator botanicus
hortensis**

oder

alphabetische und synonymische Aufzählung

der

**in den Gärten Europa's cultivir-
ten Gewächse,**

nebst Angabe

ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer
Dauer und Cultur.

Bearbeitet

von

Gustav Heynhold.

Zweiter Band.

Dresden und Leipzig,

in der Arnoldischen Buchhandlung.

1846.

Alphabetische
und
synonymische Aufzählung

der
in den Jahren 1840 bis 1846

in
den europäischen Gärten
eingeführten Gewächse,

nebst Angabe
ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer
Dauer und Cultur.

Ein Hilf- und Ergänzungsbuch zu den Werken von
Dietrich, Dumont-Courset, Loudon, Sweet,
Steudel u. s. w.,

nach den
neuesten Quellen bearbeitet
von
Gustav Heynhold.

Dresden und Leipzig,
in der Arnoldischen Buchhandlung.
1846.

Bot. P. A.

H 51

1846

V o r w o r t.

Seit der Herausgabe meines *Nomenclator botanicus hortensis*, also seit 5 Jahren bin ich unausgesetzt bemüht gewesen Nachträge dazu zu sammeln.

Die Anzahl der seit dieser Zeit in den Gärten eingeführten Gewächse, sowohl an Gattungen als Arten und Abarten, (der vielen künstlich gezogenen Hybriden oder Bastarde noch gar nicht zu gedenken), ist sehr ansehnlich, und so wird denn gegenwärtiges Supplement einen neuen Beleg von dem Aufschwung den die Blumistik in der neuern und neuesten Zeit immer mehr und mehr gewonnen hat, liefern.

Ebenso haben die wissenschaftlichen Untersuchungen manche andere Resultate und daraus hervorgegangene Namenveränderungen (die freilich leider die Synonymie — ein unvermeidbares Uebel — vervielfältigen), hervorgerufen.

Es schien sonach Bedürfnis mit dem Erscheinen des längst versprochenen Nachtrags nicht länger anzustehen und den Besitzern des größern Werkes dadurch eine Beihilfe und Ergänzung zu geben.

Die Masse des herangewachsenen Stoffes möge daher die Bogenzahl des gegenwärtigen Werkes, über dessen innere Einrichtung ich hier noch Einiges zu erwähnen habe, entschuldigen.

Bei Gattungen nämlich, die im Hauptwerke nicht vorkommen, ist wie früher die Linneische Klasse, sowie die natürliche Familie, zu der sie gehören, angegeben, bei solchen aber, die schon früher aufgeführt worden, um Raum zu ersparen, nur der deutsche Name so gut er sich allenfalls geben liefs, beigelegt. Wenn Arten, die in der neueren Zeit zu einer andern Gattung gestellt worden, schon früher aufgenommen sind, aber denselben Bei- oder Trivialnamen behalten haben, so ist nur die Seite im Hauptwerke citirt und deutscher Name, Vaterland etc. zu nehmen und giltig, wie es daselbst gegeben ist; dasselbe gilt auch bei beigelegten neueren Varietäten zu den älteren Arten. Ist der Paginazahl eine II beigelegt, so bezieht sich das auf gegenwärtigen Band.

Obgleich sonach beide Werke, das gegenwärtige wie das frühere, gegenseitig verglichen werden müssen und Hand in Hand gehen, so kann doch auch dieser Nachtrag den Besitzern anderer ähnlicher Werke und selbst des trefflichen Steudel'schen Nomenclator von Nutzen sein, da im letztgenannten Buche, z. B. die herrlichen Farn-

kräuter, die jetzt mit vieler Vorliebe kultivirt werden, nicht enthalten sind, auch so Manches Neue hier vorkommt, was dort nicht zu finden ist; — wobei jedoch der Unterzeichnete das offene Bekenntniß ausspricht, daß er das vorzügliche Werk des verdienstvollen Herrn Dr. Steudel auch zur Vervollständigung gegenwärtiger Arbeit mit vielem Danke benutzt hat.

Es ist wohl möglich, daß mir bei der Menge der Gegenstände auch noch hier und da Einiges entgangen ist, aber auf einen vollständigen Abschluß läßt sich, wie der hochgeehrte Herr Verfasser in der Vorrede zum Hauptwerke, die sich auch über die eigentliche Tendenz der Herausgabe dieses Buches weiter verbreitet, schon angedeutet hat, nicht rechnen. Dasselbe ist auch auf die benutzten literarischen Hilfsmittel zu beziehen, die in diesem Fache zumal so kostbar als zahlreich sind; wird also hier und da etwas vermißt, so bitte ich um gütige Nachsicht und Berichtigung.

Indem ich sonach hiermit ein Versprechen (laut Vorrede und Nachschrift des Hauptwerkes) durch Herausgabe des gegenwärtigen Buches erfülle, so wie mehreren An- und Nachfragen wegen Erscheinen desselben entgegenkomme, übergebe ich es einem hochgeehrten Publikum in der Erwartung und Hoffnung, daß es mit eben so viel Beifall und Nachsicht als sein älterer Stammgenosse aufgenommen werden möge.

Denjenigen hochgeehrten und hochgesinnten Männern aber, die mich bei dieser Ar-

beit in literarischer wie in anderer Hinsicht so vielfach unterstützt haben, meinen innigsten herzlichsten Dank hier darzubringen, halte ich für heiliges Pflichtgefühl; Ihnen möge, wenn auch ungenannt, das Buch, was unter so manchen hemmenden Verhältnissen bearbeitet wurde, gewidmet sein.

Dresden, im Monat Mai 1846.

Gustav Heynhold.

Ergänzendes Verzeichniss der Autoren und jetzt lebenden oder kürzlich verstorbenen Botaniker.

Nach der *Linnaea* Band XIX. Heft II, u. IV.

- Ackermann*, Nicol. Med., Dr., Prof. in Stockholm.
- Adler*, W., Pastor in Wohlsdorf bei Zügenrück, im Herzogthum Sachsen.
- Ahlquist*, Abr., Probst u. Pastor zu Runsten in Oeland.
- Ahnfelt*, N. G., Privatdocent zu Lund, † 1837.
- Ainley*, W., engl. Botaniker.
- Amici*, Ritter v., Prof. d. Naturwissenschaften in Florenz.
- Amoreux*, P. J., † zu Montpellier 1824.
- Angelis* zu Admont in Steyermark.
- Arduino*, Luigi, Prof. zu Padua, ein Sohn von Pietro Arduino, † 1834.
- Arendt*, J. J. F., Osnabrück.
- Areschong*, J. E., Dr. zu Lund.
- Armano*, Mailand.
- Arrhenius*, Dr. u. Prof. zu Upsala.
- Aucher*, Eloy, Naturforscher u. Reisender in Aegypten u. dem Orient, † 1838 in Ispahan.
- Ayres*, Dr., England.
- Bacle*, ein Genfer, reiste am Senegal u. in Südamerika, † 1838 in Buenos Ayres an den Folgen seiner Gefangenschaft.
- Backhouse*, James, engl. Botaniker u. Reisender.
- Badaro*, ital. Botaniker, Schüler von Moretti, reiste in Brasilien, † daselbst 1831.
- Bailey*, J. W., Prof. zu West Point in Nordamerika.
- Bainbridge*, Fr., England.
- Baldwin* (*Baldwyn*), W., nordam. Botaniker, † zu Franklin am Missouri 1839 auf einer botanischen Reise.
- Balfour*, J. H., Prof. d. Botanik in Glasgow.
- Balsamo-Crivelli*, J., Dr. u. Prof. in Mailand.
- Banbury*, Esq., engl. Naturforscher u. Reisend. in Südafrika.
- Banks* u. *Wallis*, Sammler des Herzogs von Devonshire, ertranken im Oregon 1838.
- Barbouné*, Prof. zu ? in Frankr.
- Barnéoud*, Marins, franz. Botan.
- Battersby*, R., Dr., England.
- Baudo*, Firmin, Frankreich.
- Baudot*, de, K. franz. Procurator.
- Bauer*, G. H., Apothek. in Berlin.
- Baumann*, J. et Napol., Gärtner zu Bolwiller im Elsaß.
- Baumgarten*, Dr., Arzt zu Schäßburg in Siebenbürgen, † 1843.
- Bautier*, Alex., zu Paris.
- Barter*, W., Curator des botan. Garten zu Oxford.
- Becquerel*, ?
- Beek*, A. van, Mitglied d. Instituts d. Niederlande.
- Beever*, Miss, England.
- Behlen*, Steph., K. baier. Forstmeister zu Aschaffenburg.
- Beilschmid*, Apoth. zu Ohlau in Schlesien.
- Bell*, John, engl. Botaniker.
- Bellani*, Angelo.
- Beneken*, Fr., Apoth. in Naumburg a. d. Saale.
- Bennet*, J. J. Esq., London.
- Bennett*, William, England.
- Bentall*, Thomas, England.
- Berard*, Paris.
- Berg*, Ernst v., Gntsbesitzer zu Nenenkirchen.
- Berger*, F. X., Caplan, † 1834 auf d. Reise nach Griechenland.
- Bergfeld*, A., † 1830 zu Regensburg.
- Bergsma*, Dr. u. Prof. am botan. Garten in Utrecht.
- Berlèse*, L., Abbé, Secretair d. Gartenbaugesellschaft in Paris, Verfasser eines schätzbaren Werkes über Camellien.
- Bernhardi* J. J., Dr., Prof. der Botanik zu Erfurt*).
- Besser*, W. F. J. G. v., K. russ. Staatsrath, Prof. u. Director d. bot. Gartens in Kiew, † 1842.
- Betke*, F. F., Med., Dr. zu Malchin in Mecklenburg.
- Beynon*, W. L. ?
- Bieberstein*, Fr., Freih. Marschall v., siehe M. B. p. XII. im ersten Band.
- Biener*, Dr. F. A., K. preuss. geheimer Justiz-Rath, lebt in Dresden, Besitzer eines reichen Herbars.

*) Ich bitte hiermit den p. VI. im I. Bd. begangenen Irrthum, wegen der angeblichen Todesanzeige dieses ausgezeichneten Botanikers, zu berichtigen, wobei ich wünsche und hoffe, daß derselbe noch lange für die Wissenschaft wirken möge.

- Biatzoosky*, östr. Botaniker.
Billberg, J. G., Kammerrath zu Stockholm.
Billot, Profess. zu Hagenau im Elsass.
Billotti, Tecofila (Tochter von Al. Colla).
Birkell, ?
Bischoff, Dr. L. W. T., Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens zu Heidelberg.
Bischoff, T. G., Dr., Bonn.
Bladon, James, England.
Blanc, franz. Escadronchef b. d. Artillerie.
Blanchet, hereiste als Botaniker Brasilien.
Blanco, Don Emanuel, bearbeitete die Flora der Philippinen, † 1845 in Manila.
Bloxum, A., Geistlicher, Engl.
Blytt, Prof. d. Botanik zu Christiania in Norwegen.
Bock, ein fleißiger u. kenntnisreicher Botaniker (zumal tüchtiger Cryptogamolog), lebte in Bockau im sächs. Erzgebirge u. † daselbst 1820 in armen Umständen.
Bockeler, Botaniker in Varel an der Jahde.
Boissier, Edmund, zu Genf, einer der kenntnisreichsten u. thätigsten Botan. unserer Zeit, bereiste Spanien u. d. Orient.
Bojer, Wencesl., Prof. u. Direct. d. botan. Gartens zu Port Louis (Isle de France).
Bonafous, Matthieu, Dr., Direct. d. Landbaugartens in Turin.
Bonato, G. B., ehemal. Prof. d. Botanik zu Padua, † 1837.
Bongard, H. G., Dr., K. russ. Staatsrath, (Petersbg.), † 1839.
Boot, Francis, M. Dr., England.
Boreau, A., Prof. zu Angers.
Bosch, van der, ?
Botta, aus Paris, reist in Arabien.
Botteri, Math., Lesina in Dalmat.
Bouché, Peter Carl, Institutsgärtner an der Gärtnerlehranstalt, Nenschöneberg bei Berlin.
Bouché, Carl Dav., Inspector d. botan. Gartens in Schöneberg bei Berlin.
Boucher de Crevecoeur, J. A. G., † zu Abbeville 1844.
Bouquet, Dominique, † zu Montpellier 1845.
Bourdon, J., Paris.
Boussingault, Paris.
Bové, Nicolas, aus Luxemburg, Reisender in Syrien, Arabien, d. Berberei, † zu Algier 1841.
Bowman, John Eddowes, Esq., lebte in Manchester † 1841.
Boykin, Dr. zu Milledgeville in Georgia (Nordamerika).
Bracht, Albert, k. k. östreich. Hauptmann.
Brandt, J. F., Dr., k. russ. Staatsrath, (Petersburg).
Brassai, Samuel, Prof. in Klausenburg.
Braun, Alex., Dr., Prof. d. Botanik etc. in Freiburg, Breisg.
Braun, Fr., Apoth. in Baireuth.
Braun, G. H., Apoth. in Berlin.
Bravais, A. et L., franz. Botan.
Bredemeyer, k. k. Hofgarten-Direct. zu Schönbrunn b. Wien, †.
Brewer, W. T., Geistlicher, ?
Brichan, James B., ?
Brignoli v. Brunhof, Dr., Prof., Director d. botan. Gartens zu Modena.
Brinsley, Rich. Esq., England.
Brocchi, J., † 1826.
Brotero, Fel Avellar, † den 5. Aug. 1828.
Broomfield, W. Arnold, Med. Dr.
Brown, Georg, Kew.
Bruce, J. hereiste Abyssin. †.
Bruch, Philipp, Bryolog, † zu Zweibrücken, 11. Febr. 1847.
Brückner, G. A., Dr., Medicinalrath in Mecklenburg.
Brunner, Dr. u. Prof. in Bern.
Buch, Leop. v., k. preuss. Kammerherr, berühmter Geolog, bereiste d. canar. Inseln.
Buchinger, Dr., Ober-Schulinspector u. Prof. in Strafsburg.
Buckley, engl. Botaniker.
Buek, Medicinal-Assessor, zu Frankfurt a. d. Oder.
Buek, H. W., Dr. med., Physikus in Hamburg.
Buekman, James, ?
Bull, Henry, ?
Bürger, Dr. in Leyden.
Burkhardt, Fr., Apoth. zu Niesky in der Lausitz, †.
Buquoy, Georg, Graf v. (Prag).
Cagniard-Latour, Frankreich.
Calvert, F. C., Frankreich.
Canal, Graf Malabaila v., Präsident d. k. k. ökonom. Gesellschaft zu Prag.
Candolle, A. P. et A. de Candolle, s. DC.
Carey, Mathew, Philadelphia, † 1838.
Carlisle, Anthony, geb. zu Stillington (Durham), † 1840 zu London.
Carmigniani, Vinc. ?
Carreno, Schüler v. Lagasca, † zu Paris 1841, 23 Jahr alt.
Cassebeer, Dr., Senator u. Apotheker zu Gelnhausen.
Cassel, F. P., Dr., Prof. u. Director d. bot. Gartens zu Gent, †. 1821.
Cattaneo, Antonio, † zu Mailand 1845.
Caulini, (Cavolini), P.
Chaillet, J. F., aus Neuschatel, † daselbst 1839.
Champagneux, zu Lion.
Chantrans, Girod. ?
Chauvin, Professor in Caen.
Chav., Ed. Chavannes, in Lausanne.
Comolli, Antonio, Dr. u. Prof., Italien.

- Chev.*, Dr. Chevallier, früher in Paris, † 1840 in Freiburg.
- Chiaje* s. Delle Chiaje.
- Chisholm.* ?
- Choris*, Maler a. d. Expedition des Rurik, † zu Veracruz 1828.
- Christoforis*, G., † zu Mailand.
- Clementi*, Dr., Assistent d. bot. Lehrkanzel zu Padua.
- Colmeiro*, spanisch. Botaniker.
- Comolli*, J., Prof. u. Director d. Provin. Medic. Lyceums zu Como.
- Comte*, J. A., Prof. zu Paris.
- Cooley*, nordam. Botaniker.
- Corda*, J. A., Custos am naturh. Museum in Prag
- Corson*, E., Dr. med. zu Paris
- Corson*, Sohn eines schottischen Gärtners, † 1841 zu Timor, 27 Jahre alt
- Cotta*, Heur., Dir. d. k. sächs. Forstacademie zu Tharandt, † 20. Octbr. 1844.
- Coquebert de Montbret*, s. Montbret, p. XII. 1r Bd.
- Coult*, Thomas Coulter, Dr., ein Irländer, lebte in Genf, reiste in Mexico, † 1843
- Courverchel*, zu Paris.
- Couteau*, Gartenbesitzer, Frankr.
- Cristy*, Will., Esq., † 1839.
- Crivelli*, s. Balsamo.
- Croom*, H. B. Esq., geb. in Lenoir County, Nordkarolina, 1799, ertrauk mit seiner Familie a. d. Küste v. Nordkarolina 1837
- Crouan*, Gebrüder, Apotheker, Frankreich.
- Crozier*, Georges, England.
- Cruckshanks*, A. Esq., Edinburg
- Cruickshank*, J., England
- Cruse*, W., Dr. u. Prof. zu Königsberg in Pr.
- Cunn.*, Allan Cummingham, nach seines Bruders Richard Tode Dir. d. bot. Gartens in Sydney, † daselbst 1839, 48 Jahre alt, vergl. p. VII. 1r Bd.
- Curie*, P. F., Lausitz.
- Curnow*, William, England.
- Daresté*, C., Frankreich.
- Darlingt*, W., Dr., New-Chester (Pensylvanien).
- Davids.*, R. Davidson, Anfscher d. Gouvernem. Gartens in Hobarttown (Van Diemens Land).
- Dawnay*, W. H., England
- Daws.*, W. Dawson, England.
- Deakin*, England.
- DC.*, A. Pyr. DeCandolle, geb. 4 Febr. 1778, † 9. Sept. 1841, vergl. p. VIII. 1r Bd.
- Decker*, starb auf der Reise in Palermo
- Deisch*, J. G., Augsburg.
- De la Haye*, Felix, Kunstgärtner, Versailles.
- De la Rive*, s. Rive
- De la Vigne*, G. F., Uebersetzer d. Schkuhrschen Rietgräser, † als Prof. d. Botan. in Charkow.
- Delastre*, Frankreich.
- Delessert*, Benj., Baron, Banquier in Paris, Besitzer eines der reichsten Herbarien, † 1847.
- Delessert*, Henri, Verwandt. des vorigen, † in der Havanna 1843, 28 Jahre alt
- Delise*, T., Bataillonchef, Vire in Frankreich, † 1843.
- Delise*, D. F., † zu Vire (Calvados) 1841.
- Delle Chiaje*, Stephan., Med. Dr., Neapel.
- Dennes*, G. E., Secretair d. bot. Gesellschaft in London.
- Dennstädt*, A. W., Dr. u. Prof. zu Belvedere bei Weimar †.
- De-berger*, ?
- Desjardins*, Julien, Stifter der Societé d'histoire naturelle auf Mauritius, † 1839 od. 1840.
- Desmazières*, zu Vire. Herausgeb. schätzbare getrockn. Pflanzen.
- Desmarest*, A., Prof. d. Naturgesch. a. d. Veterinärsechule zu Alfort, † daselbst 1838.
- Desmoulins*, C., Prof. in Perigux.
- Despréaux*, Reisender in Newfoundland, den Canarien und Antillen, † in Mexico.
- Dierbach*, J. H., † zu Heidelberg 1845.
- Diesing*, Dr., Assistent am k. k. Naturalienkabinet zu Wien.
- Dietr.*, A. Albert Dietrich, Dr. u. Lehrer a. d. Gärtnerlehranstalt zu Berlin.
- Dietr.*, D. Frdr. David Dietrich, Jena.
- Dillon*, Martin, Reisender mit Petit in Abyssinien, † 1841 daselbst.
- Ditmar*, Dr. jur. und Syndicus in Rostock.
- Doellinger*, Ignaz, Dr. u. Hofrath in München, †. 1841.
- Döll*, J. C., Prof. u. Bibliothekar in Carlsruhe
- Dölliner*, George, ?
- Don*, David, Secret. der Linnéischen Gesellschaft in London, † 8 Decbr. 1841.
- Don*, George, † ebendas. 1841.
- Donné*, A., Frankreich.
- Doubleday*, Eduard et Henry, England.
- Drejer*, S. T. N., Docent a. d. Veterinärsechule zu Kopenhagen, † 1842.
- Düben*, Baron, geb. auf Schonen, † im Aug. 1845 zu Lund.
- Düb*, Dr. J. E. Düby, Pastor in Genf.
- Duchartre*, P., Dr., Frankreich.
- Ducke*, Dr. u. Prof. in Prag.
- Duisburg*, v., Prediger zu Rudau bei Königsberg in Pr.
- Dumont de Courset*, †. 1824.
- Dunans*, Phil., Genf.
- Duncan*, Robert, Dick.
- Dunker*, J. A. H., Prediger zu Rathenow, † 1843
- Dupont*, franz. Botaniker.
- Durando*, Cajetan, Lieutenant, Caraglio.

- Durieu de Maisonneuve*, Capit. d. Infanterie, Perigneux.
Dutrochet, Academiker zu Paris.
Duvernoy, G., Stuttgart.
Dwigoubssky, J. A., Prof. in Moskau, † 1839.
- Ebel*, W., Dr., Privatdocent zu Königsberg.
Echeverria, Maler, Mexico.
Edmonstone, Thomas, Verf. der Flor. d. Shettlandsinseln, † 1846.
Eichwald, Ed. M., Dr., Prof., Etatsrath, St. Petersburg.
Einsele, A., Dr. Med. ?
Eisengrein, G. A., Dr. u. Prof. zu Freiburg.
Ekart, T. P. Phil., Dr., Coburg.
Elkan, L., Dr. zu Königsberg.
Ellis, Daniel, Pflanzen-Physiolog zu London, †.
Elsmann, F., Provisor in Regensburg.
Emmerich, W. J., Canonicus u. Vorsteher d. bot. Gartens in Regensburg, † 1839.
Endress, bereiste als Botaniker die Pyrenäen etc.
Engelmann, G. W., K. r. Collegien-Assessor u. Gymnasial-Dir., Mitau.
Engelmann, G. M., Dr., St. Louis (Nordamerika).
Erdelyi, Mich. v., Prof. zu Wien.
Esenbeck s. Nees.
Evans, John, England.
Eversmann, Eduard, Dr. u. Prof. zu Kasan.
Eysenhardt, G. W., Dr. u. Prof. d. Botanik zu Königsberg, †.
- Fabre*, Esprit, Gärtner zu Agde (Frankreich).
Fabriani, Giovanni, Prof. d. praktischen Botanik an d. Universität zu Modena, † 1843.
Facchini, Franz, Dr. zu Vigo in Südtirol.
Fauché, Mitglied des Conseil de santé zu Paris.
Fée, A. L. A., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Straßburg.
Felix, Legationsrath, Regensburg, † 1846.
Fellenberg, Emanuel.
Ferrand, E., Frankreich.
Férussac, de, Baron, zu Paris.
Fieber, F. X., zu Prag.
Fielding, H. B., England.
Fingerhuth, C. A. M., Dr. zu Esch bei Enskirchen.
Finlays, Finlayson, engl. Botaniker.
Fintelmann, C., Hofgärtner zu Charlottenburg bei Berlin.
Fischer, der II. Sohn, Garteninspector am botan. Garten zu Göttingen, † 1836.
Fitt, George, ?
Fleischer, Franz, Dr. zu Hofwyl (Schweiz).
Fleischmann, botan. Gärtner in Laibach.
Fleming, John, engl. Botaniker.
- Flotow*, J. v., Major a. D. zu Hirschberg (in Schlesien).
Flower, Thom. Bruges, England.
Focke, G. Woldemar, Med. Dr. zu Bremen.
Forb., Edward Forbes, Prof. am Kings-College in London.
Forb, J. Forbes, Reisender der Londoner Gartenbaugesellsch. in Afrika, † im Aug. 1823.
Forsander, J. P. Mag. Weslöe.
Forselles, Jacq. Heintz v., Bergwerksbeamter, Stockholm.
Forster, Edward, England.
Fortune, ein engl. Botaniker, bereiste in neuester Zeit China.
Fraes, Dr., früher Prof. d. Botan. u. Garteninspector, Athen.
Fradley, Nordamerika.
Frank, Jos. C. Dr. zu Heidelberg, reiste in Georgien u. Florida, † in Neuorleans 1835.
Fras., Charles Fraser, Colonie-Botanikus, Neusüdwallis.
Freemann, Samuel, England.
Fremery, Lüttich.
Freyer, Heintz., Custos am naturhistorisch. Museum z. Laibach.
Frisch, J., ?
Fritzsche, Jul. Ph., Dr. zu Casan, früher in Berlin.
Fröl., J. A. Frölich, v., Dr. u. Medicinalrath zu Ellwangen, † 11. März 1841.
Frost, John, Prof., geb. 1803 in London, † 17. März 1840 in Berlin.
Funck, H. C., Apoth. zu Gefrees in Franken, † 1839.
Fürnr., A. E. Phil. Fürnröhr, Dr. u. Prof. am Lyceum zu Regensburg.
- Gachet*, Dr. u. Prof. d. Botanik zu Bordeaux, † 1842.
Gaillon, Benj., zu Brest.
Gal, H. Galeotti (Galiotti), bereiste Mexico v. 1835—1840.
Gand, Gustav, Straßburg.
Gardiner, W., Dundee in Schottl.
Gard., G. Gardner, Direct. d. k. bot. Gartens in Paradenia auf Ceylon.
Garovaglio, Santo, M. Dr. in Pavia.
Gaspar., Guglielmo Gasparini, Dir. d. botan. Garten zu Bocca-difalco bei Palermo.
Gay, Claude, Reisender in Chili u. Peru, v. 1828—31 und v. 1834—42.
Gay, Jacques, Secret. d. Pairs-kammer zu Paris.
Geiseler, Ed. Ferd., M. Dr. u. Medicinalrath, †. 1827.
Gellerstedt, Joh. Dan. Phil., Mag. zu Oerebroë.
Gellibrand, botanisch. Reisender, wurde 1837 mit seinem Begleiter Hesse in Neuholland von den Wilden erschlagen.
Gerhard, Legationsrath, Leipzig.
Germain, E., M. Dr. zu Paris.
Gever-Deynoot, P. M. E. Utrecht.

- Gibson*, George Stacey et Sam. Esq., England.
- Gilbert*, David, † 1839.
- Gilbert*, ein Naturforscher, wurde 1846 in Südastralien von den Wilden erschlagen.
- Gilpin*, William Sawrey, berühmt. Gründer von Parks u. Gärten in England, † 1843.
- Giobert*, Giovanni Antonio, † zu Turin 1834.
- Girard*, Frédéric de, ?
- Girou*, de, Buzareingues.
- G. M. S. s.* Flor. Wetter.
- Godin*, Lille.
- Godron*, Dr., Prof. med., Nancy.
- Goldfuss*, G. A., M. Dr., Prof. u. Geheimerath in Bonn.
- Göppert*, H. R., M. Dr. u. Prof. in Breslan.
- Gorski*, M. Dr. zu Wilna?
- Gosse*, L. André, M. Dr. in Genf.
- Gottsche*, C. M., Med. Dr. in Hamburg.
- Goudot*, Justin, (reiste in Südamerika?)
- Graf*, Siegm., Dr. in Laibach, † 30. Aug. 1838.
- Graham*, John, beim Gouvernement in Bombay angestellt, † 1839.
- Graham*, Robert, M. Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Edinburg, † 7. Aug. 1845.
- Gray*, Asa, Dr., Prof. u. Dir. des botanischen Gartens an der Harvard-Universität im Cambridge im Staate Massachusetts in Nordamerika.
- Gray*, Peter, Esq., England.
- Grenier* Ch., Dr. u. Prof. der Medicin in Besançon.
- Griesselich*, L., M. Dr. in Carlsruhe.
- Griff*, Dr. Will. Griffith, Hilfs- wundarzt im Dienste d. engl. ostind. Compagnie u. Conservator d. botan. Gartens in Singapore, war bei d. Expedition nach Cabul, † 1845 zu Malacca oder nach Anderen zu Penang.
- Grindon*, Leo H., Esq. Bristol, England.
- Grieseb*, Dr. A. Grisebach, Prof. extraord. d. Bot. in Göttingen.
- Guépin*, J. P., Dr. Med. u. Prof. zu Angers.
- Guill.*, J. P. A., Guillemin, Aide-Naturaliste zu Paris u. Custos d. Delessertschen Sammlungen, † 1842 zu Montpellier.
- Guimpel*, Fr., Prof. u. Maler zu Berlin.
- Gümbel* (d. ältere), Landau.
- Gümbel* (d. jüngere), München.
- Gulch*, J. W. G. Esq., England.
- Gutheil*, Herrm., Kreuznach.
- Guthnik*, Apoth., Thnn b. Bern, (war auf den Azoren).
- Hackl*, Prof. d. Landwirthschaft zu Leitmeritz, †.
- Haenseler*, Felix, Apothek. etc., geb. zu Durrach b. Kempten in Baiern 1767, † zu Malaga d. 12. Aug. 1841.
- Hagenb.*, Hagenbach, Prof. der Botanik zu Basel, † 1844.
- Hall*, H. C. v., Dr. u. Prof. in Gröningen.
- Hampe*, E., Apoth. in Blankenburg.
- Hamstroem*, Nerike (Schweden).
- Hanson*, William, (England).
- Harpe*, J. J. C. de la, Dr. med. (Frankreich).
- Hartig*, Theod., Forstrath und Professor. (Braunschweig).
- Hartinger*, Anton, Wien.
- Hartmann*, Emanuel, Apoth. in Kork, † 1837 bei Nenorleans.
- Hartweg*, aus Carlsruhe, bereiste mehrere Provinzen Südamer. in bot. Hinsicht, sehr fleissiger u. kenntnißreicher Sammler.
- Harzer*, C. A. F., Kupferstecher u. Naturaliensammler in Dresden, † 18. März 1846.
- Harv.*, W. H. Harvey, Esq., M. Dr., Sommerville b. Limerick.
- Hasselt*, van, reiste 1820 mit Kuhl nach Java, wo er von den Hufen eines Rhinoceros zu Tode getreten wurde.
- Hassk.*, Justns Carl, Hasskarl, Assistent-Gärtner des Gartens zu Buitenzorg auf Java.
- Haw.*, Adrian Hardy Haworth, Esq. zu Little Chelsea, † 1833.
- Heer*, Oswald, Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Zürich.
- Hegewisch*, aus Hannover, † daselbst 1840, botan. in Mexico.
- Heldr.*, Theod. v. Heldreich, Conservator von DC. Herbar., bereiste Sicilien etc.
- Heim*, Dr., k. preuss. Geh. Rath, † zu Berlin 1834.
- Helper*, Dr. aus Prag, wurde von den Eingebornen d. Audaman- u. Nicobar-Inseln 1. Jan. 1841 ermordet.
- Henfrey*, Arthur, Esq., Curator der botanischen Gesellschaft zu London.
- Henry*, A., Dr. Besitz. d. akadem. lithogr. Instituts zu Bonn.
- Henschel*, A. W. E. Th., Med. Dr. u. Prof. zu Breslan.
- Henze*, Hofgarten-Director in Cassel.
- Heppenstall*, John, (England).
- Hergt*, J. L., Apoth., Hadamar.
- Hering*, Carl, Apoth. zu Stuttgart, † 1843.
- Hess*, J., Oberbaurath, Vorsteher d. botan. Gartens zu Darmstadt, † 1837.
- Hesse* s. Gellibrand.
- Heudelot*, Dir. d. k. Cultren am Senegal, reiste daselbst 1835 bis 37, † 1837.
- Heufeler*, Ludw., Ritter v., Dir. am Tyroler National-Museum.
- Heyer*, Dr., Forstmeister in Giesen.

- Hibbert**, George, Esq., Besitzer eines botan. Gartens zu Clapham, † 1838.
- Hildenbrand**, Edler v., Polizeicommissar in Pavia, vorher in Triest.
- Hinds**, Fsq. (England).
- Hinterhuber**, Vater u. Sohn, Apotheker u. Botan. in Salzburg.
- Hirschfeld**, W., Groß Nordsee in Holstein.
- Hlad.**, Franz Hladnik, geb. 1773 zu Idria, † als Prof. zu Laibach 1844.
- Hoare**, Sir Rich. Colt, † 1838.
- Hoest**, F. M. S. V., Dr. med., (? Archangel).
- Hoffmann**, J. F., Dr., Gouda, (Holland).
- Hoffmann**, Dr. u. Privatdocent in Gießen.
- Hofmann**, J. V., Weltpriester u. Prof. in Brixen.
- Holandre**, J., Prof. in Metz.
- Holl**, Fr., Dr. u. Mitvorstand d. pharmac. Instituts zu Dresden, bereiste als Naturf. Madeira.
- Hollengreen**, zu Motala in Ostgothland.
- Hollsey**, Reisender in Nordam.
- Homann**, G. G. J., Prediger zu Budow bei Stolpe in Pommern.
- Hoocker**, Jos. Dalton, Dr. med., war bei der Südpolexpedition.
- Hoppe**, D. H., Dr. zu Regensburg, † 1. Aug. 1846.
- Horkel**, Joh., Dr. med. u. Prof. zu Berlin.
- Hornemann**, Prof. u. Dir. des botan. Gartens zu Kopenhagen, † 1841.
- Hornung**, Apoth. in Aschersleben.
- Horsfield**, Thom., Med. Dr. zu London.
- Hosak**, Dav., Elzin b. New-York.
- Houlton**, Prof. in London.
- Houtte**, Louis van, Besitzer eines reichen Pflanz.-Etablissements zu Gent, thätiger u. kenntnißreicher Handelsgärtner etc.
- Huber**, François, zu Genf, † 1831.
- Hübener**, J. W. P., Dr. zu Mannheim.
- Hübner**, Wilh., Apoth. in Braunschweig (Ostpreußen).
- Hünefeld**, F. R., Dr. n. Prof. d. Chemie in Greifswalde.
- Hüguenin**, A., zu Chambéry, (Savoyen).
- Hull**, John, Arzt zu Manchester, † 1839.
- Humble**, A. Heinr., Med. Dr., (Schweden).
- Hume**, Sir Abraham, † 1837 od. Anfang 1838 im 89. Lebensjahr. Nach seiner Gemahlin ist die Gattung *Humea* benannt.
- Hundeshagen**, J. Ch., Prof. in Gießen.
- Hunnemann**, J., † im April 1839.
- Huss**, Magnus, Philos. Mag., (Schweden).
- Hussenot**, Dr. med. zu Nancy.
- Hutton**, W., London?
- Jablonsky**, Paul Ernst, Med. Dr. in Berlin.
- Jack**, Will., Chirurg, im Dienste d. ostind. Compagnie, bereiste Ostindien, † 27 Jahre alt, nahe beim Vorgebirge d. g. Hoffn.
- Jäger**, Georg Frdr., Med. Dr. in Stuttgart.
- Jäger**, Dr., pract. Arzt in Annweiler.
- James.**, W. Jameson, Prof. der Chemie u. Naturgeschichte in Quito.
- Jaub.**, Janbert, M. le Comte.
- Ibbotson**, H., Esq., England.
- Jenner**, Henry, Lasceller, Engl.
- Jepp**, G. F. W., Hamburg?
- Jlott**, William, England.
- John**, J. F., Dr. u. Prof. in Berlin.
- Johnsohn**, Heinr. ?
- Jordan**, Robert, C. R., England.
- Irmisch**, Thilo, Lehrer in Sondershausen.
- Isabelle**, Montevideo.
- Jürgens**, G. H. B., Jever (Ostfriesland).
- Jundzill**, Prof., † (?) Wilna.
- Jung**, W., Apoth. in Hochheim.
- Junghuhn**, F., Dr., Gesundheits-Officier auf Java.
- Jussieu**, Adrian de, Prof. d. Botanik zu Paris.
- Kachler**, Joh., Wien.
- Kämel**, Pfarrer in Mintraching, † im Januar 1837.
- Kastalsky**, russ. Algolog, † vor 1840, wahrscheinlich bei der Lütkeschen Expedition.
- Karel. et Kiril**, Gr. Karelin, bereiste mit Kirilow Soongarien.
- Keith**, Patrik, † 1839.
- Kennedy**, Handelsgärtner in Hammersmith bei London.
- Kerber**, Dr. in Breslau.
- Kickx**, Joh., Prof. zu Gent.
- Kiene**, Jac., Dr. med. in Gastein.
- Kielmeyer**, G. F. v., Dr. med. u. Staatsrath in Stuttgart, (früher Tübingen), † 24. Oct. 1844.
- Kieser**, G. D., Dr., Prof. u. Geh. Hofrath in Jena.
- King**, Samuel, (England).
- Kingston**, J. F., (England).
- Kirilow**, (Karel. et Kiril.), Joh., geb. zu Irkutsk, bereiste die Ufer d. Baical-See's, dann mit Karelin Soongarien, † d. 11. Septbr. 1842 zu Arsanas.
- Kirschl**, Kirschberger, Med. Dr. u. Prof. zu Straßburg.
- Kittel**, Martin Balduin, Dr. u. Prof. am Lycenm u. Dir. d. Gewerbsch. etc. zu Achaffenburg.
- Knapp**, J. L., † 1842 zu Alveston in Gloucestershire.
- Knight**, Sir Th. Andr (vergl. Kn. et Salish), Präsident der Lond. Gartenbau-Gesellschaft, † zu London 11. Mai 1838, 79 Jahre alt.
- Koch**, C., Prof. in Jena, bereiste den Caucasus.
- Koch**, H., Dr. zu Jever.

- Köberlin*, Dirkenreishausen bei Memmingen.
- Kölbing*, F. W., Bischoff der mährischen Brüdergemeinde zu Herrnhut, † 1840.
- König*, G., Prof. in Mannheim.
- Korthals*, P. W., Dr. Philos.
- Kostel.*, V. F. Kosteletzky, Dr. med., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Prag.
- Kratzmann*, Dr., Prag.
- Krause*, Joh. W., Prediger zu Taupadel im Großh. S. Weimar, † 1842.
- Kraufs*, Ferdin., Dr. in Stuttgart, reiste am Cap d. g. Hoffn.
- Krebs*, L., Apoth. in Grahams-town (Cap-Colonie).
- Kreutzer*, G. Jos., Wien.
- Kreysig*, F. L., Dr., k. s. Medicinalrath etc., geb. 1770 zu Eilenburg, † 3. Juni 1839 in Dresd.
- Krüber*, Dr. med., Kaiserslautern.
- Kromholz*, J. V. v., Med. Dr. u. Prof. in Prag, † 2. Nov. 1843.
- Krüger*, J. F., Berlin.
- Kuhl*, reiste mit van Hasselt 1820 nach Java, starb dort in Buitenzorg.
- Kurr*, H., Med. Dr., Stuttgart.
- Kützing*, F. T., Dr. u. Prof. an d. Realschule in Nordhausen.
- Lachmann*, H. W. L. jun., Med. Dr. in Braunschweig.
- Lafont*, de Baron de Melicocq, (Frankreich).
- Lagasca*, † 26. Juni 1839 in Barcelona.
- Lagger*, Dr., Freiburg i. d. Schw.
- Lamb.*, Lambert, Esq., † 1842 zu Kew, 81 Jahre alt.
- Lambertye*, Graf L. de, (Frankr.).
- Lang*, C. H., Stadtpfarrer zu Mühlheim in Baden, †.
- Langthorn*, R., (England).
- Lankester*, Edwing, Med. Dr., (England).
- Lapylaie* (Bachelot de), (Normandie), bereiste Newfoundland.
- Lasch*, Fr., Apoth. in Driesen.
- Lasègue*, A., Conservator am bot. Museum d. Bar. Delessert.
- Laterrade*, J. F., (Bordeaux).
- Laurent*, Apotheker, (Frankr.).
- Laurer*, Fr., Dr. und Prof. in Greifswalde.
- Lazies*, George, Prof., Carlowitz in Syrmien.
- Leach*, William Elford, † 1836 an der Cholera.
- Leavenworth*, Melines Conklin, Dr. med. in Augusta (Nordam.).
- Lechler*, Willibald, (Württemberg).
- Lees*, Edwin, (London).
- Lefebure*, L. F. H., Sous-Prefect zu Verdun bis 1814, † 1839.
- Lehmann*, Alex., geb. zu Dorpat 1814, reiste im nördl. Asien, † in Simbirsk 12 Sept. 1842.
- Leiblein*, Med. Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Würzburg.
- Leibold*, Naturalienhändler in Dresden, bereiste Cuba etc.
- Le Lièvre de la Morinière*, Dir. d. Posten zu Vannes, † 1845.
- Levormand*, René, Adv. zu Vire im Departement Calvados.
- Lenz*, Harald Othm. (Schneepenthal bei Gotha).
- Leo*, ehem. Pharmacien-Major, (Frankreich).
- Leprieur*, Pharmaceut d. Marine, (Frankreich). Reiste am Senegal. Vergl. Perrottet.
- Leras*, Prof. (Frankreich).
- Lereboullet*, Prof., (Frankreich).
- Leresche*, Geistlicher in St. Cierge sur Moudon (südl. Schweiz).
- L'Herminier*, Felix Louis, † zu Paris 1833.
- Lesplaut*, Maurice (Frankreich).
- Letellier*, Dr. med. in Paris.
- Léveillé*, Dr. med. in Paris.
- Lhotzky*, J., Dr. zu Wien, (erst in Brasilien, dann in Neuhol-land), jetzt in England.
- Liebich*, Christoph, Forstinspect. zu Prag.
- Liebig*, Prof. d. Chemie in Gießen.
- Liebmann*, F., Dr., Prof. u. Ass. am bot. Garten in Kopenhagen, reiste in Mexico.
- Lièvre*, Le, de la Morinière.
- Lindemann*, Emanuel, k. russ. Hofrath u. Lehrer am Gymnasium zu Mitau, † 1845.
- Lindea*, J. J., aus Brüssel, be-reise d. Aequinoctialgegenden.
- Lindenberg*, J. B. Gr., Dr. jur. in Bergedorf.
- Linderholm*, Magnus Gust, Med. Dr. u. Prof. (Schweden).
- Lindgren*, Lehrer d. Naturgeschichte zu Degeberg in Westgothland.
- Lincke*, J. R., Dr. (? Leipzig).
- Linné*, Louise, d. Tochter Lin-né's des Vaters, † zu Upsala d. 31. März 1839 im Alter v. 90 Jahren.
- Ljungberg*, Nicol Joh. Med. Dr. (Schweden).
- Ljungstedt*, G. C., Phil. mag. (Schweden).
- Lloyd*, G., † 19. Oct 1843 auf der Reise in Theben.
- Loehr*, Apotheker, ?
- Lomler*, G., Saalfeld.
- Lorck*, C. G., Dr. u. Lehrer zu Königsberg in Preußen.
- Lortet*, Clémence, née Richard, † zu Lyon 1838.
- Loudon*, Joh., Claudius, Esq., Bayswater in England, † 14. Decbr 1843.
- Lowe*, (William T.), Richard Thomas, Cambridge.
- Lucas*, Aug., Dr. u. Apotheker in Berlin.
- Lüders*, F. G. J., zu Hamburg, bereist Amerika.
- Lundquist*, Nicol. Wilh. Phil. Mag., Buchhändl. in Stockholm.
- Luschnath*, Bernh., Kunstgärtner in Langfuhr b. Danzig reiste früher in Brasilien für d. botan. Garten in St. Petersburg.

Luxford, George, (England).
Lynghby, Hans Christ, Prediger,
 †? (Dänemark).

Macaire-Prinsep, Isaac, (Genf).
Macf., James Macfadyen, Med.
 Dr., (Jamaica).

Macklot, wurde auf Java erschlagen.

Maclure, Will., † in Mexico 1840.

Maerker, Apothecker, ?

Mahieu, J. N. ?

Malabaila v. Canal, Graf, Prä-
 sident d. k. k. ökonom. Ge-
 sellschaft in Prag.

Maly, Dr. u. Prof. in Grätz.

Mann, Wencesl., Prag?

Marcet, François, in Genf.

Marcet, Jeanne, Wittve v. Alex.

Marcet, Prof d. Chemie in Genf.

Marchand, Ludw., Luxemburg.

Margot, ? Genf.

Martens, G. v., Legationsrath
 in Stuttgart.

Martens, Prof. der Botanik in
 Lüttich.

Martin, bereiste Spitzbergen.

Martinati, Dr. in Padua.

Martins, Ch. F., Dr. in Paris.

Masi, Ludw., Dr. in Perugia.

Massara, Giuseppe Filippo, Dr.
 u. Arzt zu Soudrio, geb. zu
 Pavia, † 1839.

Massas, de, Artillerie-Capitain,
 (Dauphiné).

Matthews, P., Reisender in Peru,
 † 1841.

Mauke, J. G., Pastor in Brock-
 witz b. Meissen, † 1840.

Mauksch, Thomas, Kaisermark
 in Ungarn, † 1831.

Mauri, E., Prof. d. Botanik zu
 Rom, † 1836.

Meigen, J. W., Dr. u. Secretair
 d. Handelskammer, † zu Stoll-
 berg b. Aachen 11. Jul. 1845.

Mercier, Philippe, (aus Martini-
 que gebürtig). Genf. † 1831.

Meyen, F. J. E., Med. Dr. u. Prof.
 in Berlin, früher in Bonn, †
 2. Sept. 1840.

Meyer, Bernh., Dr. u. Medicinal-
 rath zu Offenbach, † 1836,
 Mitverf. d. Flora d. Wetterau.

Michahallis, aus Nürnberg, † im
 Aug. 1834 auf der Reise in
 Nauplia.

Mickl, Pfarrer in Salzburg, † 1843.

Middendorf, v., Prof. in Kiew.
 Reiste in Sibirien.

Mikan, J. C., Prof. d. Naturg.
 zu Prag, † 1844. Sein Vater
 J. Mikan ebef. Prof. d. Botan.
 † daselbst 1814.

Milbert, J. G., Maler d. Bandin-
 schen Expedition, † 1840.

Minciotti, L. P., Prof. in Padua.

Miq., F. A. W. Miquel, Dr. u. Prof.
 d. Botanik in Rotterdam.

Mitten, William, (England).

Mohl, Hngo v., Med. Dr., Prof.
 u. Dir. d. bot. Gartens in Tü-
 bingen.

Moldenhawer, J. J. P., Dr. u.
 Prof. zu Kiel, † 1827.

Moll, C. E. Frhr. v., (ehemal.
 Kammerdirector in Salzburg),
 † 31. Jan. 1838, 78 J. alt.

Mondelli, F. u. P., Gebrüder.

Mons, J. B. van, † zu Löwen 1842.

Montagne, Camille, Med. Dr.,
 ehemalig. Chirurgien-Major,
 (Frankreich).

Moritzi, Alex., Prof. d. Botan.
 in Chur.

Moser, Dr. H., geb. zu Wien,
 † zu Paris 1826.

Mougeot, J. B., Med. Dr., Bruyè-
 res (Lorraine Dép. des Vosges).

Mückusch, F. v., † zu Trop-
 pau 1847.

Mühlenbeck, H. G., Dr. med. zu
 Mühlhausen, † 1845.

Müller, Dr. phil., Apoth. u. Me-
 dicinalrath in Emmerich a. Rh.

— — Decan in Odenbach (baier-
 sche Pfalz).

— — Karl, Pharmaceut in Jever,
 (Oldenburg).

— — Apoth. in Urach, (Wür-
 temberg).

Münter, Jul., Dr. med., Assistent
 bei d. k. Bibliothek in Berlin.

Mulder, Claas, Prof., Franeker.

Munby, G., (England).

Murray, Alex., Dr., † 1838.

Murray, John, Hall.

Myrin, Claës Gust., Magister u.
 Doцент der Botanik, † 1835
 zu Upsala.

Naccari, Fort. Luigi, Prof. und
 Vice-Consul zu Chioggia.

Nägeli, Carl, Dr. u. Privatdoc.
 in Zürich.

Nardo, Dr. med., pract. Arzt
 in Venedig.

Nathusius, Herrm., Gutsbesitzer
 in Handisburg b. Magdeburg,
 † 1835.

Naudin, Ch, Frankreich.

Naumann, J. G., Gartendirector
 zu Schlkenau in Böhmen.

Neves-Mello, Don Antonio Jose
 das, † 1835 nachdem er im
 J. 1834 von seiner Stelle als
 Prof. d. Botanik zu Coimbra
 entsetzt worden war.

Neumann, Ferd., k. preufs. Ba-
 taillons-Arzt in Erfurt.

Neumann, Obergärtner am jardin
 des plantes zu Paris.

Neumayer, Franz, Ragusa, † im
 Sept. 1840 im Dorfe Cunna auf
 der Insel Sabioncello.

Neuschild, Pastor in Grofsmellen
 (Pommern).

Newman, Christopher A. (Engl.)

Nicklès, Napol., Apoth. zu Benn-
 feld im Elsaß.

Nisson, Sveno, Ph. Mag. und
 Prof. in Lund.

Noé, Wilh., Dr. u. Pharmaceut,
 ehem. in Fiume jetzt in Con-
 stantinopel.

Nordstedt, C. P. U., Med. Dr.
 (Schweden).

- Normansell*, Harsy Thomas, Dir. d. botan. Gartens in Paradenia auf Ceylon, † 1843.
- Notaris*, Giuseppe de, Dr., Prof. u. Dir. d. bot. Gard. in Genua
- Nouttett*, W. L., (England).
- Oakes*, (Nordamerika).
- Oersted*, A. S., Dr. in Kopenhagen.
- Oesterreicher*, Med. Dr., chem. Prof. d. Botan. in Krakau, †
- Oken*, L., Med. Dr. u. Prof. in Zürich.
- Orbigny*, A. d', Reisender in Südamerika.
- Orsini*, A., (Neapel?)
- Ortmann*, Anton, Apotheker in Carlsbad.
- Oth*, A., Dr. med., geb. zu Bern, † zu Jerusalem im Juli 1839 an der Pest (n. a. Angaben am Sonnenstich).
- Palm*, Med. Dr., (Württemberg).
- Pamplin*, William, Buchhändler in London.
- Parlat*, Philipp Parlatore, Dr. u. Prof. d. Botan. in Florenz.
- Pappafava*, Dominico, Dr., Wien, (früh. in Cattaro in Dalmatien).
- Paquy*, ?
- Payen*, Mitglied des Iustituts ?
- Payer*, ?
- Peck*, Prof. d. Cambridge-College zu Boston.
- Pencati*, Graf Gius. Mazari, ein Venezianer, † 1836.
- Pépin*, ?
- Perleb*, K. J., Dr. med. u. Prof. zu Freiburg im Breisg., † 1845.
- Peschier*, Jacques, Genf, †.
- Petermann*, W. L., Dr. Leipzig.
- Petif*, Dr. med. in Zweibrücken.
- Petit*, Felix, Botaniker in Paris.
- Petit*, Antoine, Reisender mit Dillon in Abyssinien, wurde 3. Juni 1843 von einem Crocodil beim Uebergang über den Nil gefressen.
- Philippar*, Aug., Chef am Jardin des plantes in Paris, † 1839.
- Phoebus*, P., Dr. med. u. Prof. zu Giefsen.
- Piddington*, ? (England).
- Pittoni*, J. C. Ritter v., Grätz.
- Platt*, Thomas, Adv. zu London, Mitherausgeber d. Fl. graeca, † 1842 in hohem Alter.
- Pleete*, William, (England).
- Poech*, J., Dr. med. u. Assistent d. botan. Lehrkanzel zu Prag, † 1846.
- Pouchet*, ?
- Preifs*, Med. Dr. u. Prof., Regimentsarzt (in Böhmen).
- Preifs*, J. A. L., Phil. Dr. in Hamburg, bereiste Australien.
- Preisler*, Fiscal-Adjunct in Prag.
- Prescott*, J., Dr. zu St. Petersburg, †.
- Pritzel*, G., Dr. in Leipzig, Verfasser einer Monographie der Anemonen.
- Prolongo*, Don Pablo, Apotheker zu Malaga.
- Puccinelli*, B. A., Lehrer der Botanik zu Lucca.
- Puerari*, M. N., in Genf.
- Purdie*, Sammler für d. k. botan. Garten zu Kew.
- Purkinjie*, J. E., Med. Dr. u. Prof. zu Breslau.
- Putterl.*, A. Putterlick, Dr. med. u. Custos-Adjunct am k. k. bot. Museum zu Wien, † 1845.
- Quartin-Dillon*, Rich., Dr., Reisender in Abyssinien, † daselbst 1841.
- Quekett*, Edwin E., Esq., (England).
- Quekett*, John, (England).
- Quistorp*, J., Prof. in Greifswalde, † 1834.
- Raab*, Apotheker in Beyreuth, † im Decbr. 1835.
- Rabenhorst*, Dr. u. Apoth. in Dresden, früh. Luckau, bereist jetzt Italien u. Dalmatien.
- Racchetti*, Alex., Prof. in Padna.
- Radius*, J., Dr. med. u. Prof. in Leipzig.
- Raffles*, Sir Stamford, Gouvern. v. Java, verlor seine Sammlungen durch den Brand seines Schiffes b. Bencoulen u. † bald darauf selbst in Engl. 1826.
- Rafinesque*, G. S. (Schmaltz), † im Sept. 1840.
- Rainer*, M. v., in Mailand.
- Ralfs*, John, (England).
- Rameaux*, ?
- Ramon de la Sagra*, Don, Dir. d. botan. Gartens in Havanna.
- Rapin*, Daniel, Apoth. zu Rolle in der Schweiz.
- Ratzeburg*, J. Th. Ch., Dr. med. u. Prof. in Neustadt-Eberswalde.
- Ré*, Giov. Franc., Dr. u. Prof. zu Turin.
- Redouté*, † 19. Juni 1840.
- Regel*, Obergärtner am botan. Garten in Zürich.
- Reichenbach*, G. fil., (Dresden).
- Rengger*, J. R., Dr., ein Deutscher, reiste in Paraguay, † 1832.
- Resmann*, Klagenfurth.
- Rcum*, J. A., Prof. a. d. Forst-academie zu Tharandt, † 1839.
- Reufs*, F. A., Dr. u. Privatdocent zu Würzburg.
- Reuter*, F. G., Conservator d. Boissierschen Herb. in Genf.
- Riché*, F. J., Oberaufseher am Jardin des plantes zu Paris, † 1838.
- Richter*, H. F. E., Dr. med. u. Prof. an der medic. chirurg. Academie in Dresden.
- Ringier*, ?
- Ringius*, H. H. Candid., Schweden. Herausgeber des Herbar. normale.
- Ritgen*, F. A., Med. Dr. u. Prof. in Giefsen.

- Rive*, Auguste-Arthur de la, Prof. d. Physik in Genf.
- Roberge*, (Frankreich).
- Robert*, Prof. u. Dir. d. botan. Gartens zu Toulon.
- Robert*, bereist Spitzbergen mit Bravais u. Martin.
- Roches*, J. J. de, Med. Dr. in Genf.
- Rodig*, k. sächs. pens. Justizamtmann, † 1844 in Dresden.
- Römer*, M., Landrichter zu Aub in Baiern.
- Rollinson* (Rollison), engl. Handeldsgärtner.
- Roques*, J., Dr. med. zu Paris.
- Rosmäfslar*, E. A., Prof. a. d. Forstacad. in Tharandt.
- Roth*, A. W., † zu Bremen d. 16. Octbr. 1834.
- Rouçel*, F. (nach Quérard E), Verfasser d. Flora du Nord de la France, lebte zu Alost, † im Jahre 1831, nach Morren.
- Roussel*, Henri François Anne de, zu Anfang dieses Jahrh. Prof. in Caën, später b. d. Armee in Italien. Todesjahr unbekannt.
- Roux*, Polidore, Conservator d. naturhist. Sammlung zu Marseille, ging 1831 nach Ostindien, um mit Boron v. Hügel zu reisen, † in Bombay 1832.
- Rowland*, John, (England).
- Royer*, Augustin le, in Genf.
- Rudolphi*, F. C. L., Dr. in Greifswalde.
- Ruff*, J. H., in Guben.
- Rugel*, F., Apoth. aus Würtemberg, bereist als Botan. Nordamerika.
- Rumy*, G. K., Dr. zu Garn in Ungarn.
- Runge*, F., Dr. u. Prof. in Oranienburg, früher in Breslau.
- Russegger*, Bergrath, bereiste Griechenland u. Aegypten.
- Russel*, Duke of Bedford, John, † 1839.
- [*Russel*, Dr. Patrik, war der Vorgänger Roxburgh's b. d. Expedition in Coromandel u. Bruder des Alex. Russel, ist längst gestorben].
- Rutherford*, Edinburg.
- Rylands*, Thos. G., England.
- Sadler*, Michael, Prof. d. Chemie in Pesth.
- Säve*, D., (Schweden), Verf. d. Synopsis Flor. Gothlandicæ.
- Saladin*, Jean Louis, Genf.
- Salis-Marschlins*, Ulysses von, Graubündten.
- Sartwell*, (Nordamerika).
- Saufure*, N. Th. de, Prof. in Genf, † 1845.
- Sauter*, v., in Wien.
- — A. E., Dr. in Mittersyl, (früher Kitzbühl).
- — Andr., Förster in Ziel bei Inspruck.
- Savi*, Gaetano, Dr. u. Prof. in Pisa, † 1844.
- Savi*, Pietro, Prof. der Botanik in Pisa.
- Schäfer*, Lehrer am Gymnas. in Laupersyl, Canton Bern.
- Schäfer*, M., Lehrer in Trier.
- Schäffer*, Superintend. zu Regensburg, berühmt durch sein Werk über d. Schwämme etc. †.
- Schäffer*, J. C. H. v., Dr. med., Geh. Rath u. Leibarzt in Regensburg, †.
- Schaffner*, Dr., Heerstein bei Oberstein.
- Schagerström* J. A. (Schweden).
- Schärer*, L. E., Pastor, (Schweiz), † 1844.
- Schauer*, J. G., Dr. u. Prof. in Greifswald, früh in Breslau.
- Schauer*, Sebast., Breslau.
- Scheele*, A., Pastor zu Heersum bei Hildesheim.
- Scheidweiler*, J., Dr. u. Prof. in Brüssel.
- Schenk*, E., Dr. u. Professor in Würzburg.
- Schinz*, Med. Dr. in Zürich.
- Schlttl.*, D. F. L. v. Schlechtendal, Oberlandesger.-Präsident zu Paderborn, † 1842, Vater d. Dr. u. Prof. d. Botanik v. Schlechtendal in Halle a. d. S., s. p. XVI.
- Schleiden*, Dr. u. Prof. in Jena.
- Schmid*, Bernhard, Missionär in Ostindien (Utacamund).
- Schmidlin*, Eduard, in Stuttgart.
- Schmidt*, E. L. W., Med. Dr. in Stettin, † 1843.
- — H. R., Philos. Dr. u. Oberlehrer in Danzig.
- — J. A. F., Diaconus in Ilmenau.
- — J. G., Dr. u. Lehrer zu Lenzburg in der Schweiz.
- Schnitspahn*, G. F., bot. Gärtner in Darmstadt.
- Schmitz*, Dr. u. Lehrer an der Ritter-Acad. zu Bedburg am Rhein, † 1845.
- Schnitzlein*, A., Dr. u. Apoth. in Windsheim, jetzt Privatdocent in Erlangen.
- Schönheit*, Pfarrer zu Singen, (Schwarzburg Rudolstadt).
- Scholtz*, H., Dr. med. in Breslau.
- Schomburgk*, Richard, Bruder d. Sir Robert Schomb., reist auf Kosten d. k. preufs. Regierung in Guiana etc.
- Shouw*, J. F., Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Kopenhagen.
- Schrader*, Dr. in Bonn.
- Schram*, Oeconom.-Commissionsrath zu Stargard in Pommern.
- Schrenk*, Al., (beschrieb d. Pflanzen d. Soongarey).
- Schweinitz*, L. D. v., † 1843.
- Schubert*, Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Warschau.
- Schultz*, C. H., Med. Dr. u. Prof. in Berlin.
- Schultz*, C. H., gen. Bipontinus, Dr. med. u. Hospitalarzt zu Deidesheim (Rheinpfalz).

- Schwabe*, S. H., Hofrath u. Apotheker in Dessau.
- Schykowsky*, med. u. phil. Dr. in Petersburg, reist in Auslande
- Scott*, R. D., Dr. u. Prof. der Botanik zu Dublin.
- Séchier*, ?
- Schlmeyer*, J. F., Apoth. in Cöln.
- Seitz*, C. S., Hofgärtner am bot. Garten zu München.
- Sembritzki*, St. Petersburg.
- Sesi*, Dr. u. Prof. in Genna.
- Scubert*, Med. Dr. u. Prof. in Carlsruhe.
- Shepherd*, John, Curator d. botan. Gartens zu Liverpool, † 1836.
- Short*, Dr., Prof. d. Medic. und Bot. zu Lexington in Nordam.
- Shuttleworth*, ein reicher Engländer, lebt in Bern, thätiger Förderer d. Wissenschaft und Besitzer eines der reichsten Herbar.
- Sickler*, F. W., Dr. u. Dir. des Gymnasiums zu Hildburghausen, † 1836.
- Sidebotham*, Joseph, Manchester.
- Sieber*, F. W., d. berühmte Reisende, † 1844 zu Prag im Irrenhause.
- Siemssen*, Dr. in Rostock.
- Sieurin*, J., ein junger schwed. Botan., erkrank in der Nähe der Havanna 1846.
- Silvin*, M., Prof. in Lyon.
- Simpton*, Sam. (Lancaster).
- Sinclair*, Georg, Gärtner d. Herzogs von Bedford zu Woburn Abbey, † 1834.
- Skalnik*, fürstl. Lobkowitzscher Hofgärtner in Prag.
- Smith*, Colin, Geistlicher, (Inverary).
- — J., (England).
- — W., † 1839.
- Söderberg*, C., Dr. u. Provinzialarzt, (Upland).
- Sommerauer*, Ignaz, Admont in Steyermark.
- Sommerfelt*, S. C., Pfarrer zu Ringeboe b. Christiania, † 1838.
- Sonder*, W., Dr. u. Apotheker in Hamburg.
- Sontheimer*, J. v., Dr. u. königl. württemberg. Generalstabsarzt, † 1846.
- Soriano*, Vinc., Dr., (Madrid).
- Spanoghe*, J. B., † auf Timor.
- Sparkes*, G., England.
- Spekmoser*, A., Gymnasialpräfect zu Marburg in Steyermark, † 1845.
- Spenner*, Dr. u. Prof. zu Freiburg im Breisgau, † 1841.
- Spicker*, Prof. in Frankf. a. d. O.
- Splitgerber*, F. L., geb. zu Amsterdam, reiste in Guiana, † 1845.
- Spring*, A. F., Dr. u. Prof. d. Botanik in Lüttich.
- Spruce*, Richard, (York).
- Sprunner*, W. v., in Ingolstadt, bereiste Griechenland.
- Stein*, J. C., Apoth. zu Frankfurt am M., † 1834.
- Steinheil*, A., Pharmaceut, sammelte früher in Algier, † 26. Mai 1839 auf der Ueberfahrt nach Caracas.
- Stenhammar*, G., Probst zu Stockholm.
- Stephens*, H. O., Bristol.
- Stewart*, (Edinburg).
- Stockaar*, v., Apoth. (Regensbg.).
- Streeten*, Robert J. N., D. med. (Worcester).
- Stempel*, C. T., Med. Dr. und Prof. in Rostock.
- Stromeyer*, F., Hofr. u. Prof. d. Chemie zu Göttingen, † 1835.
- — J. F., Hofr. u. Prof. der Medicin in Göttingen, † 1830.
- Suard*, V., Apoth. in Nancy.
- Suffrian*, Dr. u. Lehrer am Gymnasium in Dortmund.
- Suhr*, J. N. v., Lieutenant, (Schleswig).
- Sullivant*, Wm. S., Nordamer.
- Taylor*, Thos., Dr. med. (Engl.).
- Telfair*, Charles, Esq., geb. zu Belfast in Ireland um 1778, † zu Port Louis auf Mauritius im Jul. 1833 (Telfairia Hook.).
- Terscheck*, k. sächs. Hofgärtner am Palaisgarten zu Dresden.
- Thedenius*, K. Fr., (Stockholm).
- Théis*, A. E., Präfect d. Departem. Haute Vienne, † 1842.
- Thomä*, C., Dr. u. Prof. ?
- Thomas*, Emanucl, Pflanzenhändler zu Bex.
- — Ludw. aus Bex, † im Jan. 1824 in Neapel.
- — Philipp, aus Bex, † zu Cagliari im Sept. 1831.
- Thompson*, Sylvanus, (York).
- Thornton*, Dr., (London), † 1837.
- Thuret*, Gustave, ?
- Timanski*, (Kasan).
- Tittmann*, Joh. Aug., Med. Dr. u. k. sächs. Bergrath, Dresden, † 1840.
- Tommassini*, Jos., Präsident des Magistrats zu Triest.
- Towers*, J. G. ?
- Traunfellner*, Apoth. in Klagenfurth, † 13. Oct. 1840.
- Traunsteiner*, Jos., Apoth. zu Kitzbühl in Tyrol.
- Trautvetter*, E. R. v., Prof. d. Botanik in Kiew, früher in Petersburg u. Dorpat.
- Trécul*, Auguste. ?
- Trevisan*, Eugen, Custos des Landwirthschaftsg. in Padua.
- Trevisan*, Victor v., Gutsbesitzer zu Padua.
- Trinius*, C. B. v., k. rufs. Staatsrath, † 1844 in Petersburg.
- Tristan*, Graf de, ?
- Trog*, (Thun).
- Tscherniaicw*, Prof. d. Botanik in Charkow.
- Tulasne*, L. R. u. C., ?
- Tully*, Will., Med. Dr. u. Prof. d. Botanik, (Nordamerika).
- Turner*, Hy. John, (London).
- Turpin*, P. J. F., † 1840.

- Uechtritz*, Maxim. Freih. v., in Breslau.
Unger, F., Med. Dr., Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Grätz.
Vahl, d. Sohn, Dr. (Kopenhagen).
Valentine, Will., Esq. (England).
Valsecchi, A., Prof. in Padua
Vaucher, Jean Pierre-Etienne, Prof. d. Kirchengeschichte in Genf, † 1841.
Venturi, A., Gutsbesitzer zu Brescia.
Vidovich, in Melada bei Zara.
Vigne, G. F. de la, s. de la Vigne.
Vincent, John, Advocat, (Insel Mauritius).
Virlet, (reiste in Morea und Kleinasien).
Visiani, Rob. v., Med. Dr., Prof. u. Dir. d. botan. Gartens in Padua.
Vittadini, C., Med. Dr. Mailand (?).
Viviani, Domin., Prof. d. Botan. in Genua, † 1840.
Vogel, Eduard, (Dresden).
Vogel, Theod., Dr. u. Privatdocent, † 17. Decbr. 1841 auf d. Insel Fernando-Pob. Guinea.
Voigt, F. S., Dr. med. u. Prof., Geh. Hofrath, Dir. d. botan. Gartens in Jena.
Voigt, J. O., in Serampore, Verf. des Hortus suburbanus Calcuttensis, Calcutta 1845, 8. †.
Voith, v., Oberbergwerksdirector. (Regensburg).
Volz, Fr., Pharmazeut, (Stuttgart, sammelt in Nordamer.).
Vriese, U. H. van, Dr. u. Prof. d. Botanik in Amsterdam.
Vrolik, W., Prof. u. Dir. d. bot. Gartens in Gröningen.


Wächter, J. K., Forstrath zu Hannover, †. 1846.
Wagner, Dan, Apoth. in Wien.
Waitz, Landkammerrath in Altenburg.
Walker, Richard, (Oxford).
Wallmann, J. H., Phil. Mag. u. Lector am Gymnasium zu Linköping.
Walpers, G. W., Dr. med. in Berlin.
Walser, E., Med. Dr. in Ulm.
Weniger, H. L., Sprachlehrer in Mülheim am Rhein.

Westring, J. P., Med. Dr. in Linköping.
Wessen, J. G. (Schweden).
Wheeler, Daniel, (England).
Wied Neuwied s. Neuwied.
Wiegmann, A. F., Dr. u. Apoth. in Braunschweig.
Wiener, Dr. med., † zu Regensburg 1840.
Wierzb., P. Wierzbicki, Dr. in Orawicza im Banat, † 1847.
Wiest, † im Mai 1835 an der Pest in Kairo.
Wilbrand, J. B., großherz. hess. Geh. Medic.-Rath, Dr., Prof. u. Dir. des botan. Gartens in Gießen, † 1846.
Wild, Medic. Assessor u. Apotheker in Cassel.
Willkomm, H. M., Med. Bacc. in Leipzig, bereiste Spanien auf Kosten des H. v. Römer auf Löthain und Neumark in botan. Hinsicht.
Wilson, Will., Esq. zu Warrington, (England).
Winch, Nathanael John, † zu Newcastle im Mai 1838.
Winckler, E., Philos. Dr. in Leipzig.
Wirtgen, Phil., Oberlehrer in Coblenz.
Wirzén, J. E. A., (Helsingfors).
Wolfgang, Prof. in Wilna.
Wollaston, T. V., (Cambridge).
Wood, J. B., Med. Dr. in Broughton bei Manchester.
Worsley, Anna, (Brislington).
Würschmidt, Canonic. in Speyer.

Zahlbruckner, J., Secretair Sr. kaiserl. Hoheit d. Erzherzogs Johann, (Wien).
Zanardini, Joh., Dr. und Prof. in Venedig.
Zani, ?
Zenker, J. C., Dr. u. Prof. in Jena, † 1837.
Zetterstedt, J. W., Professor in Lund.
Zeyher, J. M., Geh. Hofrath u. Garten-Dir. in Schwetzingen bei Mannheim, † 1843.
Zeyher, C. s. Ecklon.
Ziccardi, M. A., Dr. med., † 1845.
Zimmermann, F. J. v., Med. Dr. in Wien.
Zollinger, reiste in Java.

Da viele Botaniker und Beförderer dieser Wissenschaft hier noch aufgeführt worden, die bei den in diesem Werke verzeichneten Pflanzengattungen, Arten etc. hinsichtlich der Bestimmungen nicht theilhaftig, daher nicht citirt sind, so blieben die gebräuchlichen Abkürzungen bei selbigen weg — Uebrigens bitte ich die hier noch nachträglich gegebenen Berichtigungen und Ergänzungen mit p. V — XIX. Band I. zu vergleichen und die Buchstaben der Vornamen zu beachten.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

 Bei dem fortwährend sich mehrenden Stoff, der mit der alphabetischen Reihenfolge fortwuchs, und die früher berechnete Bogenzahl schon weit überschritten hat, war es leider nicht möglich, die versprochene Nachlese schon jetzt beizufügen, um die Herausgabe des Buches nicht länger zu verzögern. Der Unterzeichnete hat das während des Druckes ihm bekannt Gewordene und gütigst Mitgetheilte sorgfältig gesammelt, so dafs dieser Nachtrag, auf welchen mehrfach hingewiesen worden, in möglichst kurzer Zeit erscheinen wird.

Der Verfasser.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Erklärung der gebräuchlichen Zeichen und Abkürzungen.

- h. Bäume und Sträucher.
 - h̄. Kleine Sträucher.
 - 24. Ausdauernde (Stauden-) Gewächse.
 - 3. Zweijährige Gewächse.
 - ⊙. Jährige Gewächse.
 - Kn. Knollengewächse.
 - Sch. Schlingende, windende oder kletternde Gewächse.
 - Wa. Wassergewächse.
 - Zw. Zwiebelgewächse.
 - f. Gewächse, die im freien Lande ausdauern.
 - f. b. Dergl., die aber im Winter bedeckt werden müssen.
 - m. Dergl., die im Mistbeete gezogen werden.
 - m. f. Dergl., die anfänglich im Mistbeete gezogen, dann aber in's Freie gepflanzt werden.
 - k. Dergl., die im kalten oder Orangerhause überwintert werden.
 - t. Dergl. des temperirten oder Caphauses.
 - w. Dergl. des warmen Hauses.
-

Abelia floribunda Hort. belg. v. *Vesalia floribunda*.
Abelmoschus Medik., Moschuseibisch, XVI. VIII.,
Malvaceae.

divaricatus Grah., ausgespreitzter, f. w. t. Neuholland.

maculatus Bartl., gefleckter, f. w. Ostindien.

splendens (Fras. mss.) schimmernder, f. f. w. t. Neu-
holland.

esculentus Wight et Arn., (= *Hibiscus esculentus* L.,
= *Hib. Bamnia* Targion.), *ficulneus* Wight et Arn.,
ficulnoides Walp., *longifolius* Endl., *Manihot* Endl.,
officinalis Endl. (= *moschatus* Mch., *Hibiscus Abel-*
moschus L.) = *Hibiscus ficulneus* etc. etc. p. 395.

Abroma Jacq., Cacaomalve, Mariae Mart. Maria's, f. w.
Brasilien.

Abrus minor Desv. et *pauciflorus* Desv. = *Abrus*
preparatorius p. I.

Abutilon Dill. G., Sammtmalve (pappel), XVI. VIII.,
Malvaceae.

atropurpureum G. Don (= *Sida atropurpurea* Blume),
dunkelpurpurfarbige, ♂. f. w. Java.

Bedfordianum Hort., angl. et belg. Bedfords, f. t. ?

esculentum Juss. (= *Sida esculenta* Steud.), geniess-
bare, f. f. w. Brasilien.

muticum Sweet (= *Sida mutica* Delil.), unbewehrte,
⊙. f. Oberaegypten.

paeoniflorum (*Sida paeonifl.* Hook.), pfingstrosenblumige,
f. f. w. Brasilien.

striatum Dicks. Lindl., gestreifte, f. w. t. Brasilien.

venosum Hort., belg. aderige, f. w. ? Brasilien.

acerifolium Schldl., *albidum* B. Webb, Schldl.,

americanum G. Don, *arborescens* G. Don, *asiaticum*

G. Don (= *hirsutissimum* Mch.), *aureum* G. Don,

auritum G. Don, *contractum* Sweet, *cornutum* G.

Don. *crispum* Medic., *ferrugineum* H. B., *giganteum*

Sweet, *glaucum* G. Don, *graveolens* Wight Arn.,

hernandioides G. Don, *hirtum* G. Don, *incanum*

Sweet, *indicum* G. Don (= *elongatum* Mch., *fru-*

tescens Medic.), *Leschenaultianum* Sweet, *Lucianum*

Sweet, *mauritanium* G. Don, *molle* Sweet, G. Don,

(*grandifolium* Bot. reg.), *mollicomum* G. Don,

mollissimum G. Don, *nudiflorum* G. Don, *occiden-*

tale Medic., *permolle* G. Don, *periplocifolium* G.

Don, *polyanthum* Sweet, *populifolium* G. Don,

pulchellum G. Don, Sweet, *pulchrum* G. Don, Sweet,

reflexum Presl, *Sonneratianum* G. Don, *speciosum*

Sweet, *tiliaefolium* G. Don, *triquetrum* Presl., un-

Abutilon

bellatum G. Don, virgatum Sweet, vitifolium Presl,
 = *Sida ucerifolia* p. 751, seq. A. Avicennae G.,
 (= *pubescens* Mch., *Theophrasti* Medic., *vesicarium*
 Schltl. = *Sida Abutilon*) p. 751.

Acacia T., Acacie.

- acinacea Lindl., nadelähnliche, h. h. k. t. Neuholland.
 acuminata Benth., zugespitzte, h. h. k. t. Neuholland.
 β) ciliata Meisn. (= *A. Lehmanni* Preiss.).
 alata R. Br., (p. 867), α) genuina Meisn., β) platyptera
 Meisn. (= platyptera Lindl.).
 albicans van Houtte (= *superba* Hort.), weissliche, h. h. t. ? Neuholland.
 armata R. Br., (p. 1.), (= *furcifera* Lindl.).
 armatoides Hortul., wenig bewaffnete, h. h. k. t. ?
 Neuholland.
 aureonitens Benth., goldschimmernde, h. h. k. t. Neu-
 holland.
 Baueri Benth., Bauer's, h. h. k. t. Neuholland.
 Benthami* (= *diptera* Benth. non Humb.), Bentham's,
 h. h. k. t. Schwanenfluss.
 α) latior Meisn. (*diptera* β) *eriptera* Benth., *erip-
 tera* Grah., β) angustior Meisn. (= *diptera* Hook.).
 Bonplandii Tenore. (nec Gill. et Hook.), Bonpland's. h. h. t.
 Bonaria.
 bruniades A. Cunningh., bruniaähnliche, h. h. k. t.
 Neuholland.
 callosa Spgl., schwielige, h. h. w. Brasilien.
 capensis Colla, capische. h. h. k. t. Cap. d. g. Hoffn.
 cardiophylla Cunn., herzblättrige, h. h. k. t. N.-S.-Wales.
 celastrifolia Benth., celasterblättrige, h. h. k. t. Schwa-
 nenfluss.
 chlorantha Zuccar., grünblumige, h. h. t. w. Mexico.
 chrysobotrya Meisn., goldtraubige, h. h. k. t. ?
 complanata A. Cunningh. (= *anceps* A. Cunningh. =
visneoides Colla ? = *compressa* Auct.), verflachte,
 h. h. k. t. Neuholland.
 Cunninghamii Hook, β) glabra v. p. 2.
 cuspidata Cunningh., feinspitzige, h. h. k. t. N.-S.-Wales.
 cyanophylla Lindl., Benth., blaublättrige h. h. k. t.
 Schwanenfluss.
 Cyclopis A. Cunningh., v. p. 2. ? varietas A. Melanoxyl.
 Cygnorum Benth., Schwanenfluss. A. h. h. k. t. Schwa-
 nenfluss. β) sedifolia Meisn. (= *sedifolia* Lehm.).
 decipiens β) incrassata Hook., γ) elongata Benth., ?
 δ) trapezoidea DC. (= var. *praemorsa* Bot. mag.).
 Vergl. p. 2. et p. 867.
 deltoidea A. Cunningh., deltaförmige, h. h. k. t.
 Schwanenfluss.
 β) pungens Benth.
 densifolia Benth., (= *strigosa* Lindl. nec Lk., = ?
densa van Houtte), dichtblättrige, h. h. k. t. Neu-
 süd-wales.
 dentifera Benth., gezahnte, h. h. k. t. Schwanenfluss.
 denudata Lehm., nackte, h. h. k. t. Neuholland.
 β) gracilis Meisn., γ) spinosissima Meisn.
 distachya DC., zweiährige, h. h. w. Neuspanien.
 dolabriformis Wendl., hobelblättrige, h. h. k. t. Neu-
 holland. Vergl. ? A. Dolabella Rehb. Nachtrag p. 807.
 Drummondii Benth., Drummond's, h. h. k. t. Schwanenfluss.

Acacia

- dysophylla* Benth., weichzottige, f. f. k. t. Neusüd-wales.
elata Cunningh., erhabene, f. f. k. t. Neusüd-wales.
Erythropus Tenore, rothstielige, f. f. k. t. ?
exsudans Lindl., ausschwitzende, f. f. k. t. N.-S.-Wales.
extensa Lindl., ausgedehnte, f. f. k. t. Schwanenfluss.
fagonioides Benth., fagoniaähnliche, f. f. k. t. Schwanenfluss.
farinosa Lindl., mehliges f. f. k. t. Neusüd-wales.
filicina Mart., fadenschopfige, f. f. w. Brasilien.
filifolia Benth., fadenblättrige, f. f. k. t. Schwanenfluss.
glaucescens W., var. *cuneata*, Hügelli et *ovalifolia* van Houtte.
graminea Lehm., grasblättrige, f. f. k. t. Neuholland.
hakeoides A. Cunningh., hakeaähnliche, f. f. k. t. Neusüd-wales.
holosericea Cunningh., (= *neurocarpa* Cunn.), sammthaarige, f. f. k. t. Neuholland.
Hookeri Benth., Hooker's, f. f. k. t. Neuholland.
hybrida Lodd., p. 3. (= *micracantha* A. Dietr.).
implexa Benth., verflochtene, f. f. k. t. Neuholland.
incurva Benth., einwärtsgekrümmte, f. f. k. t. Neuholland.
intertexta Sbr. p. 3 (= *theconocarpa* Cunn.).
Kunthii Dehnh., Kunth's, f. f. w. Neugranada.
latifolia Benth., breitblättrige, f. f. k. t. Neuholland.
linarioides Benth., leinkrautähnliche, f. f. k. t. Neuholland.
micracantha Desv., kleinstachlige, f. f. w. Cayenne.
Mirbelii Dehnh., Mirbel's, f. f. k. t. Neuholland.
nerüfolia Cunningh., oleanderblättrige, f. f. k. t. Neusüd-wales.
obscura DC. jun., dunkle, f. f. k. t. Neuholland.
officinalis Dehnh., gebräuchliche, f. f. k. t. Neuholland.
oleaefolia A. Cunningh. p. 4. (= *dealbata* Cunn. nec Lk., *furfuracea* G. Don), β) *elegans*, γ) *glauca* van Houtte.
oncinophylla Benth., widerhackenblättrige, f. f. k. t. Schwanenfluss.
piligera Cunn., haartragende, f. f. k. t. Neusüd-wales.
platyptera Lindl., breitflügelige, f. f. k. t. Schwanenfluss. (Vergl. *alata*.)
podaliriaefolia A. Cunn., podalirienblättrige, f. f. k. t. Neuholland.
polybotrya Benth., vieltraubige, f. f. k. t. Neuholland.
Preissiana Lehm. (= ? *obscura* var. Meisn.), Preiss's, f. f. k. t. Neuholland.
pruinosa Cunn., bereifte, f. f. k. t. Neusüd-wales.
pulchella RBr., α) *glaberrima* Meisn., β) *hispidula* Meisn., γ) *hispidissima* Meisn.
pulverulenta A. Cunn., bestäubte, f. f. k. t. Schwanenfluss.
Raddiana Savi, Raddi's, f. f. w. Brasilien.
Riceana Henslow (= *setigera* Hook.), Riceane's, f. f. k. t. Van-Diemens-Land.
rotundifolia Hook., rundblättrige, f. f. k. t. Neuholland.
rutaefolia Hort. non Lk., (*spectabilis* var. ?), rautenblättrige, f. f. k. t. ?
salicina Lindl. (? = *salicifolia* Hort.), weidenähnliche, f. f. k. t. Neuholland.
scapuliformis A. Cunningh., plattförmige, f. f. k. t. Neuholland.
sclerophylla Lindl., knorpelblättrige, f. f. k. t. Neuholland.

Acacia

- semiverticillata Knowl. et Westk. (= ? *subverticillata* Hort.), halbwirtelförmige, f. f. k. t. Neuholland.
 setosa Dehnh., borstige, f. f. k. t. ?
 spathulata Tausch, spatelförmige, f. f. k. t. Neuholland.
 spectabilis Cunningh. v. p. 5.
 sphacelata Benth., brandfleckige, f. f. k. t. Schwanenfluss.
 squamata Lindl. (= *deflorata* Herb. Preiss.), schuppige f. f. k. t. Schwanenfluss.
 stenoptera Benth., schmallflügelige, f. f. k. t. Neuholland.
 subcoerulea Lindl., v. p. 5.
 sublanata Benth., wenigwollige, f. f. k. t. Neuholland.
 tortuosa W. (= *albida* Lindl.), v. p. 6.
 translucens A. Cunningh., durchschimmernde, f. f. k. t. Neuholland.
 triangularis A. Cunningh., dreikantige, f. f. k. t. Neuholland.
 trichandra Zuccar., haarfädige, f. f. t. Mexico.
 trigona A. DC., dreiseitige, f. f. k. t. ?
 undulata W., v. p. 6., γ) microphylla, δ) orithophora Swt.
 urophylla Benth., schweifblättrige, f. f. k. t. Schwanenfluss.
 velutina Bertol., DC., feinsamthaarige, f. f. w. Antillen. Brasilien.
 verniciflua Cunningh., v. p. 6. (= *graveolens* Lodd., = *virgata* Lodd.).
 verticillata W., v. p. 6., β) latifolia DC. (= *ruscifolia* A. Cunningh.).
 xylocarpa A. Cunningh. nec W., holzfrüchtige, f. f. k. t. Neuholland.

Noch werden nachstehende in den Pflanzenverzeichnissen aufgeführt:

asparagoides van Houtte, Bartheriana van Houtte, biloba Hort., bispinosa van Houtte, Brunonii van Houtte, candicans Hort., depressa Hort., lineata minor Hort., Mühlbeckii Hort. Vindob., ovata Hort., pinnata van Houtte (? *tamarindifolia* W.), polymorpha van Houtte, praemorsa van Houtte, respectabilis Hort., rigida van Houtte, rubicunda van Houtte, scabra van Houtte, Schottiana Hort., scolopendrioides Hort., tamariscifolia Hort. angl. tardiva elegans van Houtte etc.

A. alba Colla, *asplenioides* N. E. *caracasana* W. etc. v. *Calliandra alba* Benth. etc. *chrysostachys* Swt. v. *Adenantha chrysost.*

A. amara W., *Lebeck* W., *Nemu* W., *Neumanniana* H. Berol., *speciosa* W. etc. v. *Albizia amara* Benth. etc.

A. Farnesiana W. (= *Mimosa Farnesiana* L.) v. *Vachelia Farnesiana*.

A. glauca W. (= *biceps* W. = *frondosa* W. = *leucocephala* Lk.), *trichodes* W. v. *Leucaena glauca* Benth. etc.

A. xylocarpa W. nec A. Cunningh., v. *Xylia dolabriformis* Benth.

Acaena L., Stachelnüsschen.

Berteriana Bernh. (= *argentea* Berter. = *pinnatifida* Hort. = *trifida* Steud. Hochst.), *Bertero's*, 4. f. k. Chili.

pinnatifida R. et P., β) *incisa* Lindl.

trifida R. et P. (= *pinnatifida* Lindl.), dreispaltiges, 4. k. Chili.

Acalypha L., Brennkrout, morifolia Brotero, maulbeerbaumblättriges, ☉. f. w. ? Südamerica.

Acanthophippium Bl., p. 867., Stachelorche, javanicum Blume, javanische, 4. w. Java.

Acanthospermum Schrk., DC., Stachelsaame, XIX. IV., Compositae Corymbiferae.

hirsutum DC. (= *brasilum* Schrk.), rauhhaariger, ☉. m. f. Brasilien.

hispidum DC., steifhaariger, ☉. m. f. Brasilien.

humile DC. (= *Centrospermum humile* Less. = *Melampodium humile* Sw., v. p. 505).

xanthioides DC. (= *Centrospermum xanthioides* H. B. K. = *Melampodium australe* L.), spitzklettenähnlicher, ☉. m. f. Südamerika.

Acanthostachys Lk., Kl., Otto, Stachelähre, VI. I., Bromeliaceae.

strobilacea Kl., zapfenähnliche, 4. w. Südbrasilien.

Acanthotheca DC., Stachelbüchsen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

dentata DC., gezahntes, ☉. f. Südafrika.

integrifolia DC. ganzblättriges, ☉. f. Südafrika.

pinnatisecta DC., fiedertheiliges, ☉. f. Südafrika.

Acanthus lusitanicus Hort. (? = *hispanicus* Hort.), v. A. niger. p. 7.

Acarna caespitosa W., *cancellata* W., p. 8. v. *Atractylis caespitosa*, *cancellata*.

Acer T. Ahorn.

Boscii Spach (= *lobatum* Bosc. Hortul.), Bosc's ♀ f.?

coriaceum Bosc, Tausch, lederartiger, ♀ f.?

glabrum Torrey, kahler, ♀. f. Nordamerika.

grandidentatum Nutt. (= *barbatum* Hook. nec Mchx.), grosszahniger, ♀. f. Nordamerika.

heterophyllum W. (= *creticum* Hort, *sempervirens* L.), γ) *obtusifolium*, δ) *nanum*.

hybridum Bosc. (= *pensylvanicum* L. var.), Bastard, ♀. f. Nordamerika.

laetum C. A. Mey., freudiggrüner, ♀. f. Caucasus.

laurifolium D. Don (= *oblongum* Wall. p. 8).

marucum Guss., ♀. f. Unteritalien.

monspeulanum L. (= *trilobum* Mch. = *trilobatum* Lam.), β) *commutatum* Presl., γ) *illyricum* Jacq. fil.

obtusatum W. K. (= *opulifolium* β) Tausch.), β) *neapolitanum* Tenore.

opalifolium Tenor. Lk., ♀. f. Neapel.

Opalus Ait. (= *italum* Lauth = *rotundifolium* Lam. = *villosum* Presl.), rundblättriger, ♀. f. Südeuropa.

opulifolium Vill. (= *hispanicum* Pourr., *vernum* Reynier).

parvifolium Tausch. (= *creticum* Schmidt), kleinblättriger, ♀. f. Südeuropa.

platanoides E, ζ) *palmatifidum* Tausch.

polymorphum Spach (= *coriaceum* Lodd., *creticum* Tratt. non L.), vielgestaltiger, ♀. f. b. Orient.

sanguineum Spach (*coccineum* Hort., *glaucum* Hort., *rubrum* Wats.), blutrother, ♀. f. Nordamerika.

suberosum Dumort, korkiger, ♀. f. Belgien.

tripartitum Nutt., dreitheiliger, ♀. f. Nordamerika.

Noch kommen in den Pflanzenverzeichnissen folgende (ohne Angabe des Vaterlandes) vor:

affine Hffg., *colchicum fol. rubris* Mackoy. *neglectum* Hffg., *recurvatum* Hort., *sylvestre* Wender.

Aceranthus Morr. et Decaisn., Ohnhornblümchen, IV. I., Berberideae.

Aceranthus

diphyllus Morr. et Decaisn. (= *Epimedium diphyllum* Lodd. v. p. 290), zweiblättriges, 4. k. f. b. Japan.
Aceras hircina Lindl., v. *Himantoglossum hircinum* Sogl. p. 879.

Aceratium DC., Ohnhörnchen. Tiliaceae-Elaeocarpeae.

Ginitri Hask., Ginitri-O., ♂. ♀. w. Java,
 glaucum Hort. belg., blaugrünes, ♂. ♀. w. ? Java.

Achillea T., Garbe.

bicolor Wender, zweifarbig, 4. f. ?
 sylvatica Tenore, Wald, 4. f. Calabrien.
 teretifolia W. (= *A. santolina* C. A. Mey. non L.),
 stielrundblättrige, 4. f. Caucasus, Persien.
 vermiculata Trin. (= *amoena* C. A. Mey.), wurmförmige,
 4. f., Caucasus, Persien.

A. alpina L. etc. v. *Ptarmica alpina* etc.

Achimenes P. Brown, XIV. II., Personatae-Gesnerieae.

Argyrostigma Hook. (= *Tetranema hirsutum* Hort.),
 silberpunktige, 4. w. Südamerika.
 coccinea P. (= *ternifolia* Fisch. = *Trevirania coccinea* W. p. 816), scharlachfarbig, 4. w. Jamaica.
 grandiflora DC. (= *Giesebrechtiana* Hort. Belg.), grossblumige, 4. w, Mexico.
 hirsuta Lindl., rauhaarige, 4. w. Guatemala.
 longiflora DC. (= *grandiflora* Auct.), langblumige, 4. w. Mexico.
 multiflora Gardn., vielblumige, ♂. 4. w. Brasilien.
 pedunculata Benth. Lindl., gestielte, 4. w. Guatemala.
 picta Benth. (= *zebrina* Hort.), bunte, 4. w. Mexico.
 rosea Lindl., rosafarbig, 4. w. Brasilien.
 rupestris Gardn., felsliebende, 4. ♂. Brasilien.

? Hybriden: *Achimenes ignea* van Houtte, *ilicifolia* van Houtte et Liebmanni Hort.

Ob nachverzeichnete kultivirt werden, ist mir unbekannt,
 als: *A. comifera* DC. (= *Trevirania discolor* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika. *divaricata* Walp. (= *Trevir. divaricata* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika.
erinoides DC. 4. Südamerika., *heterophylla* DC. (= *Trevirania heterophylla* Mart.), 4. Brasil., *maculata* Walp. (*Trevir. maculata* Poepp. et Endl.), 4. Peru, *Martensiana* Walp. (= *Trevir. maculata* Mart.), 4. Mexico, *mollis* Walp. (= *Trevir. mollis* Poepp. et Endl. = *Episcia hispida* DC.), 4. Südamerika, *scabra* Walp. (= *Trevirania scabra* Poepp. et Endl.), 4. Südamerika, *tenella* DC. (= *Gesneria acaulis* Moc. Sess.), 4. Mexico, *tenerrima* Walp. (= *Trevir. tenerrima* Poepp. et Endl.) 4. Peru, *urticaefolia* Walp. (*Trevir. urticaefolia* Poepp. et Endl.), 4. Peru.

alba Hort. = *Niphaea alba*.

Achyranthes L., Spreublume.

sanguinolenta Crantz, Lam. (= *Aerva sanguinolenta* Blume = *Illecebrum sanguinolentum* L.), blutfarbig, 4. w. Ostindien.

Achyranthes atropurpurea Lam. v. *Desmochaeta atropurpurea* p. 257, *Monsoniae* P. v. *Aerva Monsoniae*, *polygonoides* Retz v. *Digera arvensis*, *uncinata* W. (= *Desmochaeta uncinata* R. et S.), v. *Pupalia densiflora*.

Achyrocline Less. DC., Spreuhüllchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

celosioides DC. (= *Gnaphalium celosioides* H. B.), hahnenkammähnliche, ⚭. k. t. Peru.

flaccida DC. (= *Gnaphalium flaccidum* Weinm., *Helichrysum flaccidum* Don, v. p. 385).

satureioides DC. (= *Gnaphal. saturej.* Lam.), satureyähnliche, ⚭. k. t. Brasilien, Peru.

Achyrocome ambigua Schrank v. *Elytropappus ambiguus*.

Achyropappus Kunth, Spreukelch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae, schkukhrioides L. et Otto (= *Schkukhria senecioides* N. E.), schkukhriaähnlicher, ☉. f. Mexico.

Achyrophorus Scop. DC., Spreuträger, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

ambiguus DC. (= *Crepis pinnatifida* Hort. p. 230 zu berichtigen), zweifelhafter, 4. fr. ?

apargioides DC. (= *Hypochaeris apargioides* Hook. Arn. = *Hypoch. Berterii* Colla. = *rupestris* Poepp. = *Oreophila apargioides* Don, = *Seriola apargioides* Hook. Arn.), apargiaähnlicher, 4. k. f. b. Chili.

aurantiacus DC. (= *Amblachaeonium aurantiacum* Turcz. = *Hypochaeris aurant.* Turcz. = *Hypochaeris grandiflora* Ledeb.), orangefarbiger, 4. f. Dahurien, Sibirien.

helveticus Scop. (= *Hypochaeris helvetica* L. = *H. uniflora* Vill. v. p. 411).

hispida DC. (= *Hypochaeris hispida* W. v. p. 411).

maculatus Scop. (= *Hypochaeris maculata* L. v. p. 411).

oxydontus DC. (= *Porcellites cretensis* Cass. = *Seriola cretensis* Dsf. Poir. non L.), schmalzahniger, 4. f. ?

pinnatifidus DC. (= ? *Hypochaeris corsica* Tausch. = ? *H. macrorrhiza* Sogl. = *H. pinnatifida* Cyrill. = *Robertia pinnatifida* Sogl. v. p. 689).

Aciotis aquatica D. Don v. *Spennera aquatica*.

Acmella Rich. p. 12, *biflora* Sogl. v. *Wollastonia*

biflora p. 858, *brasiliensis* Sogl. v. *Wedelia paludosa* p. 856, *globosa* Sogl. v. *Chiliophyllum globosum* p. 190, *mauritiana* P. Rich. v. *Spilanthes mauritiana*, *repens* Rich. P. v. *Spilanthes repens*.

Acnida L., Virginischer Hanf, rhyssocarpa Mchx. (= *rusocarpa* Auct., *ruscocarpa* W.), runzelfrüchtiger, ☉. f. Virginien.

Acnistus Schott, *Acnistus*, V. I., Solanaceae.

arborescens Schltdl. (= *cauliflorus* Schott = *Agnistus arborescens* G. Don, = *Atropa arborescens* L. (p. 106) = *Cestrum campanulatum* Lam. = *Cest. cauliflorum* Jacq. = *Lycium aggregatum* R. et P. = *Lycium arborescens* Sogl.), baumartiger, ⚭. w. Jamaica.

Acocanthera lycivides Don, v. *Lycium cinereum* p. 483.

Acocanth. venenata Don, v. *Cestrum venenatum* p. 185.

Acoidium fuscum Lindl., v. *Trichocentrum fuscum*.

Aconitum T., Sturmhut.

elatum Wender, hoher, 4. f. ?

leucanthum Wender. (= *album* Mch.), weißblumiger, 4. fr. ?

ovatum Lindl., eiförmiger, 4. k. f. b. Cashmere.

pallidum β) *brachybotryum* Fisch., v. p. 14.

tenuifolium Turcz (non Host.) feinblättriger, 4. f. Dahurien.

Acontias Schott, Endl., XXI. IX., Aroideae.

hastifolius Schott (= *Arum sagittifolium* Hort. Angl. = *Caladium hastifolium* Steud.), spontonblättrige,

4. w. ? Südamerika.

Acontias

- helleborifolius* Schott (= *Arum helleborifolium* Jacq.
= *Calladium helleborifolium* Vent. v. p. 143).
variegatus Kunth (= *Caladium variegatum* Desf.), bun-
te, 4, w. ?

Acorus *gramineus* Ait. fol. luteo-marginatis van Houtte.
Acratherum miliaceum Lk. v. *Arundinella Acratherum*.

Acriopsis Reinw., Spitzorche, XX. I., Orchideae.

javanica Reinw., javanische, 4. w. Java.

picta Hort. belg., bunte, 4. w. ? Java.

Acronychia Forst, Spitznägelein, VIII. I., Tricoccae
Rutaceae.

Baueri Schott, Bauer's, f. k. t. ? Neuholland.

Cunninghamii Hook, Cunningham's, f. k. t. Neuholland.

oblongifolia Endl. (= *Cyminosma oblongifolia* A. Cun-
ningham Hook. v. p. 243).

ovata Endl. (= *Cyminosma ovata* Hort.), eiförmige, f.
f. k. t. Neuholland.

Acropera Lindl., Spitzstendel.

fuscata Hort. belg. (= *luteola* Hort. = ? *sulphurea*
Hort.), bräunlicher, 4. w. ? Mexico.

Loddigesii Lindl. p. 866. β) *pallida* Hort. et *purpurea*
Hort. (= *atropurpurea* Hort.).

Acrophyllum verticillatum Hook. = *venosum* Benth.
= *Calycomis verticillata* D. Don, v. *Weinmannia*
venosa p. 856.

Acropteris Lk., Spitzfarn, XXIV. I., Pterioideae (Po-
lypodiaceae) septentrionalis Lk., (= *Asplenium sep-
tentrionale* Sw., v. p. 93.).

Acroptilon Cass., DC., Spitzfederchen, XIX. III.,
Compositae-Cynarocephalae.

Picris DC. (= *Centaurea Picris* Pall. = *Serratula*
amara Pall. = *Serratula Picris* M. B. p. 747) β)
obtusifolium Cass., γ) *angustifolium* Cass., δ) *subden-
tatum* Cass., ε) *serratatum* Cass.

repens DC. (? = *angustifolium* Cass. = *Centaurea re-
pens* L.), kriechendes, 4. f. Orient.

Acrostichum L., Vollfarn.

brevipes Kunze (= *callaefolium* Lk. non Blum.), kurz-
stieliger, 4. w. Java.

callaefolium Blume, schlangenkrautblättriger, 4. w. Java.

crassinerve Kunze (= *conforme* Lk. non Sw.), dickner-
viger, 4. w. Cap, Java.

flabellatum Humb., fächerförmiger, 4. w. Neugranada.

flabellifolium Lk., fächerblättriger, 4. w. ?

flagelliferum Wall. Bl., peitschenförmiger, 4. w. Ostind.

repandum Blume, ausgeschweiffter, 4. w. Java.

scandens L. (= *Lomaria scandens* W.), klimmender, 4.
Sch. w. Ostindien, (Java).

scolopendrifolium Raddi (= *fimbriatum* Hort. Angl. p.
16), hirschezungenblättriger, 4. w. Brasilien.

acuminatum Endl., *incisum* Endl., v. *Polybotrya*
acuminata et *incisa*, *alcicorne* Sw. et *grande* All.,
Cunn. v. *Platyterium alcicorne* et *grande*, *conforme*
Sw., *Olfersia* Endl., v. *Olfersia conformis* et *cor-
covadensis*.

Actaea dahurica Turcz. (*pterosperma* Turcz.), v.
Actinospora dahurica p. 868, *palmata* DC. (= *Hy-
drastis carolinensis* Walt.), v. *Trautvetteria palma-
ta* p. 816, *gyrostachya* Wender. et *orthostachya* Wen-
der., v. *Cimicifuga* II. *Botrophis* Rafin.

Actinomeris Nutt.

alternifolia DC. (*squarrosa* Nutt. p. 17), wechselblättriges, 4. f. Nordamerika.

tetraptera DC. (= *Coreopsis alata* Cav. non Pursh = *Helianthus tetrapterus* Ortega = *Pterophyton alatum* Cass.), vierflügeliges, 4. k. Mexico.

Actinostrobos Miquel, Strahlenzapfen, XXI. x., Coniferae.

pyramidalis Miq. (= ? *Callitris pyramidalis* Sweet), pyramidenförmiger, ⚥. k. t. Neuholland.

Actinotus leucocephala Benth. v. *Eriocalia leucocephala*. A. *minor* DC. v. *Eriocalia minor* Sm. p. 308.

Actisia florida Hort. Erford. ? ?

Acynta guineensis Medic. = *Sansevieria guineensis*.

Adamsia anemonoides Fisch., *glacialis* Fisch. etc. v. *Sieversia anemonoides* etc. p. 755.

Adeptum pilosiusculum Lk., v. *Dicksonia pilosiuscula* p. 262.

Adenandra Ventenatiana Hort. v. *Agathosma Ventenatiana* p. 23.

Adenantha L., Drüsenstaubbeutel, *chrysostachys* Benth. goldähriger ⚥. ⚥. w. t. Mauritius, Madagascar.**Adenanthos** LaBill., Drüsenblume p. 18.

Meisneri Lehm., *Meisner's*, ⚥. t. Neuholland.

Adenesma hyssopifolium G. Don, v. *Hippion hyssopifolium* p. 401.

Adenocarpus DC., Drüsenhülse (frucht).

Boissieri B. Webb. (= *decorticans* Boiss.), Boissier's, ⚥. ⚥. k. Spanien.

graecus Griseb. (= *Cylisus divaricatus* Sm. = *Ononis ramosissima* Friwaldsky), griechische, ⚥. ⚥. k. f. b. Rumelien.

telonensis DC., p. 18. (= *grandiflorus* Boiss.).

Adenogramma Rchb., Drüsenfruchtknoten.

galioides Fenzl (= *Pharnaceum Mollugo* L. spec. = *Molluga glomerata* Sering. = *Stuedelia galioides* Presl = *Pharnaceum glomeratum* Thbg., p. 713), labkrautähnlicher, ☉. f. Cap. d. g. H.

Adenophora Fisch., Drüsenträger.

cordata Tausch., herzblättriger, 4. f. ?

verbenaefolia Bunge (= *Campanula verbenaefolia* Sieb.), eisenkrautblättriger, 4. f. Japan.

Adenorhopium Forskohlii Pohl, *gossypifolium* Pohl, *integerrimum* Pohl, *multifidum* Pohl, *panduraefolium* Pohl, *pellatum* Pohl, v. *Jatropha glandulosa*, *gossypifolia* etc., p. 430.

Adenostyles Cass., Drüsengriffel, XIX. r., Compositae-Corymbiferae, (vergl. p. 141 et p. 871).

glabra DC. (= *alpina* Bluff et Fingerh. = *viridis* Cass. = *Cacalia alliariaeefolia* Lam. = *C. alpina* Jacq. L. = *C. glabra* Vill.), kahler, 4. f. Mitteleuropäische Alpen

hybrida DC. (= *Cacalia tomentosa*, β) *hybrida* Vill.) Bastard-D., 4. f. Schweiz, Frankreich, Italien.

leucophylla Rchb. (= *candidissima* Cass. = *Cacalia alpina* var. *tomentosa* All. = *C. leucophylla* W. = *C. tomentosa* Vill.), weissblättriger, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

Petasites Bluff et Fingerh. (= *albida* Cass. = *albifrons* Rchb. = *Cacalia hirsuta* Vill. = *C. alpina* Mill. =

Adenostyles

C. albifrons L. fil. = *C. Petasites* Lam. = *C. tomentosa* Jacq.), pestilenzwurzblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Adesmia DC., Freifaden, angustifolia Hook. et Arn., schmalblättriger, ☉. w. m. f. Chili.

Loudonia Hook. et Arn. (= *Loudonia anthylloides* Bertero), Loudon's, †. k. t. Chili.

Adhadota Vasica NE. (= *pubescens* Mch. = *Gendarussa Adhadota* Steud. = *Justicia Adhadota* L. p. 433).

Adiantum L., Frauenhaar.

aethiopicum L. (= *trigonum* LaBill. = *tenerum* Lk., Enum.), aethiopisches, 4. w. Cap. g. H. Brasilien.

assimile Sw. (= *tenerum* Lk.).

brasiliense Lk., brasilianisches, 4. w. Brasilien.

cardiochlaena Kunze (= *polyphyllum* Kunth ? non W.), 4. w. Südamerika.

chilense Kaulf., chilesisches, 4. w. Chili.

β) glanduliferum Kunze.

concinnum Humb., Kunth, nettes, 4. w. Südamerika.

curvatum Kaulf., gekrümmtes, 4. w. Brasilien.

intermedium Sw. (= *fovearum* Raddi, *triangulum* Kaulf.), mittleres, 4. w. Südamerika.

macrodon Kaulf., Kunze (= *lucidum* Anglor.), 4. w. ? Moritzianum Lk., Moritz's, 4. w. Caracas (zu berichtigen p. 868).

pubescens Schk. (= *plicatum* Kaulf.).

rigidum Presl (= *fructuosum* Presl, = *pulverulentum* Raddi excl. Synon.), starres, 4. w. Chili.

sulfureum Kaulf., schwefelgelbes, 4. w. Chili.

tenerum Sw. (= *assimile* Lk., Hort., Berol.).

trapeziforme L. (= *rhomboideum* Schk.).

Adolphia Meissn., Adolphië, V. 1., Rhanneae.

infesta Meisn. (= *Ceanothus infestus* H. B. K. p. 173).

Adonis Rupp., Dill., Adoniströschen.

distorta Tenore, gedrehtes, 4. f. Neapel.

intermedia Webb, mittleres, ☉. f. Spanien, Canar. Inseln. *ircutiana* Fisch. v. *sibirica*, *chaerophylla* Fisch. (= *Marschalliana* Andr.) v. *volgensis* p. 20.

Adorium crassifolium Rafin. v. *Seseli divaricatum*.

Adysetum alpestre Sweet, *altaicum* Sweet, *argenteum* Sweet etc., v. *Alyssum alpestre* etc., p. 41. *Fischerianum* Sweet (= *Alyssum sibiricum* Fisch. nec W.

p. 42), v. *Koniga sibirica*.

Aechmea R. et P., Lanzenblatt, VI. 1., Bromeliaceae.

discolor Hort. Belg., verschiedenfarbiges, 4. w. Südamerika.

fulgens Brogn., funkelndes, 4. w. Südamerika (Cayenne, Pernambuco).

Mertensii Schult. (= *Bromelia Mertensii* Meyer), Mertens's, 4. †. w. Südamerika (Cayenne).

paniculata R. et P., rispiges, 4. w. Peru.

Aechmophora arduennensis Spgl. v. *Bromus arduennensis*.

Aegialitis tenuis Trin. v. *Koeleria villosa*.

Aegilops L., Hartgras, triticoides Req. Lk., queckenähnliches, ☉. f. Südeuropa.

triuncialis L. (= *echinata* Presl), langähriges, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

β) *glabriuscula* Fisch. et. Mey.

ventricosa Tausch (= *squarrosa* W. non L.), bauchiges, ☉. f. Kleinasien.

- Aegiphila** Jacq., L., Geißstrauch, glabrata Schott., glatter, ⚔. w. Brasilien.
Aegochloa eryngioides Benth. etc., v. *Navarretia eryngioides* (= *pusilla* H. Par.) etc.
- Aegopodium** L., Giersch, alpestre Ledeb. Voralpen, 4. f. Altai.
- Aeluropus** Trin., Katzenfüschen. III. II., Gramineae.
arabicus Steud. (= *Calotheca arabica* Sgl. = *Festuca mucronata* Forsk. = *F. pungens* Vahl = *Triodia pungens* R. et S. = *Uralepis pungens* R. et S.), arabisches, 4. k. Arabien.
laevis Trin. (= *Agrostis pungens* Pall. = *Calotheca littoralis* Sgl. = *Dactylis distichophylla* Brign. = *D. littoralis* W. p. 249. = *D. maritima* Schrad. = *Poa pungens* MB. = *P. littoralis* Gouan. = *Festuca procumbens* Gmel. = *Triticum supinum* Schrank.), glattes, 4. f. Süd- und Osteuropa, Nordafrika.
niliacus Steud. (= *Calotheca niliaca* Sgl., *Dactylis repens* Sieb. non Dsf.), Nilbewohnendes, 4. k. Aegypten.
Smithii Steud. (= *Dactylis canariensis* N.E. = *D. fasciculata* C. Sm. = *D. Smithii* Lk. = *Poa Smithii* Kunth), Smith's, 4. k. Canarische Inseln.
villosus Trin. (= *Calotheca repens* Sgl. = *Dactylis repens* Dsf., p. 249. = *Festuca littoralis* Sibth., Lam. = *Poa repens* MB. = *Poa tunetana* Sgl.), zottiges, 4. k. f. b. Nordafrika, Griechenland.
- Aeonia** Lindl., Aeonie, XX. I., Orchideae.
volucris Lindl., (*Epidendrum volucre* Pet. Thouars), flüggelförmige, 4. w. Madagascar, Mascarenas.
- Aeonium** B. Webb et Berthelot, Ewiggrün, XI. VII., Corniculatae - Crassulaceae.
cruentum B. Webb, blutrothes, 4. ⚔. k. Canarische Inseln.
Youngianum B. Webb, Young's, 4. ⚔. k. Canarische Inseln.
- Aerides**, Sw. Luftstendel.
Brockesii Lindl., Brockes's, 4. w. Ostindien.
crispum Wall. (*Brookeii* Hort.), krauser, 4. w. Ostindien.
maculosum Lindl., gefleckter, 4. w. Ostindien.
obtusum Lindl., stumpfer, 4. w. Java.
quinquevulnerum Hort., Belg. fünffleckiger, 4. w. Ostindien.
violaceum Hort., Belg. violetter, 4. w. Ostindien.
virens Lindl., grüner, 4. w. Ostindien (Java).
odoratum Lindl., ? = *cornutum* Roxb. p. 21, *tesseletatum* Wight = *Vanda Roxburghii* p. 736.
- Aërva** Forsk., (arabischer Name), Monsonia Mart. (= *Achyranthes Monsonia* P. = *Achyr. pungens* Lam. = *Celosia Monsoniae* Retz. = *Illecebrum Monsoniae* L. fil.), Monson's, ☉. m. w. Ostindien.
- Aeschynanthus** Jack., Schammaske, XIV. II., Personatae - Cyrtandreae.
acuminatus Wall., zugespitzte, ⚔. w. Ostindien.
Boschianus Hort., Belg. Boschian's, ⚔. w. Ostindien.
grandiflorus Sgl., (= *parasiticus* Wall., *Incarvillea grandiflora* Hort. = *Incarvillea parasitica* Roxb. = *Trichosporum grandiflorum* Don), v. p. 868,
Horsfieldii RBr., Horsfield's, ⚔. w. Java.
longicaulis Wall., langstengliche, ⚔. w. Ostindien.
longiflorus Wall., langblumige, ⚔. w. Ostindien.
maculatus Lindl., gefleckte, ⚔. w. ? Ostindien.
radicans Jack., wurzelnde, ⚔. w. Ostindien.

Aeschynanthus

ramosissimus Wall. (*parasiticus* Hort.), ästige, ♀. w Ostindien.

Roxburghii Wall. (*grandifolius* et *macrophyllus* Hort.), Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

volubilis Jack., windende, ♀. Sch. w. Sumatra.

oblongifolius G. Don, v. *Babactes oblongifolia*.

Aeschynomene L., Schampflanze.

rosea Brotero, rosafarbige, ☉. ♀. w. Brasilien.

versicolor Wender, buntfarbige, ☉. w. ? Mexico.

sericea Hort. = ? *Sesbania sericea* p. 749.

Aesculus L., Fohrkastanie.

chinensis Bunge, chinesische, ♀. f. Nordchina.

carnea W. (= *rubicunda* Loisel. (= *Pavia carnea* Spach), p. 22).

Watsoniana Spach (= *carnea* Wats. = *rubicunda* Lindl., Lodd.), Watson's, ♀. f. Nordamerika.

humilis Lindl., v. *Pavia humilis*.

Aetheilema RBr., Aetheileme XIV. II., Acanthaceae.

imbricatum RBr. (= *Phaylopsis imbricata* Swt. p. 614, = *Blechnum anisophyllum* Juss. = *Ruellia dorsiflora* Retz. = *Ruellia imbricata* Forsk.).

rigidum Bartl., starre, ♀. w. Westindien.

Aetheorrhiza bulbosa Cass (= *Hieracium bulbosum* W. = *Leontodon bulbosus* L. = *Prenanthes bulbosa* DC. = *Taraxacum bulbosum* Rchb.), v. *Crepis bulbosa*, p. 230.

Aetheria occulta Lindl., v. *Goodyera occulta* (= *Platylophus goodyeroides*).

Aethionema RBr., Steintäschel, heterocarpum Gay, verschiedenfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.

leptocarpum DC., schlankfrüchtiges, ☉. f. ?

persicum Hort., persisches, ♂. f. Persien.

A. Diastrophis Bunge, v. *Diastrophis cristata*, p. 261.

Aethusa Anmi Spgl., v. *Helosciadium leptophyllum*.

Aganippea Moç., Sess., Aganippea, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

dentata DC., gezahnte, ☉. f. Mexico.

Aganisia Lindl., Aganisie. XX. I., Orchideae.

pulchella Lindl., schöne, 4. ♀. w. Demerara.

gladiifolia Hort., v. *Angraecum gladiifolium*.

Aganosma caryophyllata G. Don, v. *Echites caryophyllata*.

Agapanthus *umbellatus* L'Her., p. 22, var. *maximus* Hort. = *umbellatus* β) *multiflorus*.**Agapetes** G. Don, Agapete X. I., Vaccinieae.

arborea DC. (= *Vaccinium arboreum* Leschen.), baumartige, ♀. t. Ostindien.

coriacea Don (= *Arbutus coriaceus* Blume, *Thibaudia coriacea* Blume), lederartige, ♀. ♀. t. Java.

lucida Don (*Thibaudia lucida* Blume), glänzende, ♀. ♀. t. Java.

setigera Don (= *Thibaudia setigera* Wall.), borstentragende, ♀. ♀. t. Ostindien.

Agarista DC., Agariste, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

calliopsidea DC., calliopsisähnliche, ☉. f. Californien.

Agarista buxifolia G. Don etc., v. *Leucothoe buxifolia* etc., p. 460 etc.

Agassizia cheiranthifolia Spach., v. ? *Sphaerostigma cheiranthifolium* p. 777.

Agathaea Cass., Bläuling.

Bergiana DC. (= *Cineraria Bergiana* Spgl., *Detridium Bergianum* N. E., *Elphegea Bergiana* Less., *Kaulfussia amelloides* Eckl.), Bergin's, ☉. f. Cap. der gut. Hoffn. spathulata Kunze, spatelblättriger, ☿. k. Cap der guten Hoffnung.

strigosa N. E. (= *Aster Charicis* Less., *Aster strigosus* Lichtenst. non Thbg.), *Kaulfussia strigosa* Spgl. fil. = *Leyssera ovata* Thbg.), striegeliger, k. k. Cap der guten Hoffnung.

tenera DC., zarter, ☉. f. Cap der gut. Hoffn.

*tenella** v. *Felicia tenella*.

Agathelepis Choisy, Agathelepe II. 1., Globulariaceae - Selagineae.

angustifolia Choisy (= *Selago angustifolia* Thbg. p. 740, = *Eranthemum angustifolium* L.)

parvifolia Choisy (= *Eranthemum parvifolium* L. = *E. parviflorum* Berg.), kleinblättrige, ☿. k. Cap der guten Hoffnung.

Agathophytum bonus Henricus Moq. Tand., v. *Chenopodium bonus Henricus*.

Agathosma W., Wohlgeruch.

Bartlingiana Eckl. Zeyh. (*Thunbergiana* Bartl. et Wendl.), Bartlings, ☿. k. t. Cap der gut. Hoffn.

teretifolia G. Don (= ? *Diosma teretifolia* Lk. p. 267), stielrundblättriger, ☿. k. t. Cap der g. Hoffn.

thyoides Eckl. Zeyh., G. Don, (*A. erecta*, *δ. glaberrima* Schldl.), lebensbaumähnlicher, ☿. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Thunbergiana Schldl. (nec Bartl. et Wendl.), (= *Diosma ciliata* Thbg. = *Diosma Thunbergiana* Spgl.), Thunberg's, ☿. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lasiophylla G. Don, v. *A. villosa* p. 23.

Agave L., Amerikanische Aloe.I. **Agave.**

americana L., γ) foliis striatis.

atrovirens Karwinsky.

attenuata H. Berol., Salm Dyck, verschälerte, 4. t. k. Mexico.

bromeliaefolia Salm Dyck, bromeliablättrige, 4. t. k. Mexico.

bulbifera Salm Dyck, zwiebeltragende, 4. t. k. Mexico.

chloracantha Hort., grünstachelige, 4. t. Südamerika.

Commelini Salm. Dyck, (*Aloe americana tuberosa minor* Commel.), Commelin's, 4. t. k. Mexico.

filifera Salm Dyck, fadentragende, 4. t. k. Mexico.

glabra Karwinsky, kahle, 4. t. k. Mexico.

heteracantha Zuccar., verschiedenstachelige, 4. t. k. Mexico.

hexapetala Jacq., sechskronenblättrige, 4. t. Südamerika.

Karwinskyi, Zuccar., Karwinsky's, 4. t. k. Mexico.

latifolia Karwinsky.

longifolia Hort., langblättrige, 4. t. Südamerika.

lophantha Schiede.

lurida Jacq., Ait. (= *mexicana major* H. Par. = *A. vera crux* Mill.).

macroacantha Zuccar.

Martiana Zuccar., Martius's, 4. t. Südamerika.

mexicana Lam. (= ? *bulbifera* Bonpl. = ? *Manguai* Dsf.).

micracantha Hort., kleinstachelige, 4. t. Südamerika.

Milleri Haw. (= *virginica* Mill.).

polyanthoides Schiede, vielblumige, 4. t. k. Mexico.

Agave

potatorum Zuccar.

pugioniformis Zuccar. (= ? *Karwinskyi* Zuccar.), dolchförmige, 4. t. k. Mexico.

pulcherrima Otto, schönste, 4. t. k. Mexico.

pulchra Hort. Monac., schöne, 4. t. k. Südamerika.

punctata Hort. Berol., punktirte, 4. t. k. Mexico.

rubescens Salm Dyck (= *flaccida* Hort. Monac. = ? *bromeliaefolia* Salm), röthliche, 4. t. k. Mexico.

Scolymus Karwinsky, distelförmige, 4. t. k. Mexico.

serrulata Karwinsky, sägezahnige, 4. t. k. Mexico.

sobolifera Salm Dyck, sprossende, 4. t. Westindien, ? Mexico.

spicata Cavan., ährenförmige, 4. t. Havanna.

striata Zuccar. (= *Bonapartea juncea* Hort. non W.), gestreifte, 4. t. Mexico.

teoxomuliana Karwinsky, teoxomulianische, 4. t. k. Mexico.

vivipara L. (= *A. Theometel* Zuccar.).

xylinacantha Salm, 4. t. k. Mexico.

yuccaefolia Redout., W. (= *spicata* Guss.).

Yxtli Karwinsky, Yxtli-A, 4. t. k. Mexico.

II. *Littaea* Brignol. (Tagliab.).

brachystachys Cavan. (= *spicata* DC.), kurzährige, 4. t. k. Mexico.

geminiflora Brandes, Ker, (= *Bonapartea juncea* W. E., *B. flagelliformis* Henkel, *Dracaena Boscii* Hort. Cels., *Dracaena filamentosa* Scanagata, *Littaea geminiflora* Brign, *Yucca Boscii* Dsf.).

Agenora laevigata Don, v. *Seriola laevigata*.

Aglanema Schott, Blume, Endl., Glanzfaden, XXI. ix., Aroideae.

princeps Kunth. (= *Caladium princeps* H. Berol.), fürstliche, 4. f. w. ?

simplex Blume (= *integrifolium* Schott. = ? *oblongifolium* Schott. = *Caladium simplex* Blume = *Arum integrifolium* Hort., Anglor., Hort., Berol., p. 85), einfacher, 4. f. w. Java.

marantaefolium Blume, oblongifolium Blume et pictum Blume et pygmaeum Hasskarl, in Ostindien heimisch, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Agnistus Auctor., v. *Aenistus*.

Agnostus Cunningh., p. 24.

heterophylla Hort., Belg., verschiedenblättrige, f. t. Neuholland.

Agonis flexuosa DC., *hypericifolia* Schauer, *lineari-folia* DC., *marginata* DC., v. *Billotia flexuosa* etc.

Agoseris cuspidata Rafin. et *glauca* Rafin., v. *Troximon glaucus* et *cuspidatus*.

Agraphis Lk. (*Limonanthe* Lk.), Sternhyacinthe, VI. i. Coronariae-Asphodeleae.

azurea (Goldb.), brevifolia (Ker.), campanulata Lk. (= *Scilla Jacquini* Gmel. = *S. hispanica* Mill.), cernua Rchb. (= *Scilla nutans* var. Sm., *S. non scripta*, β . *flore incarnato* Bot. Mag. = *Hyacinthus belgicus* Hort. = *cernuus* L. spec.), a) praecox, b) serotina F. et Mey., nutans Lk. (= *Scilla festalis* Salisb. = *Hyacinthus non scriptus* L. = *H. nutans* Hort. = *H. pratensis* Lam. = *Usteria hyacinthiflora* Medic. = *Endymion nutans* Dumort. = ? *Hyacinthus spicatus* Mch.), patula Rchb. (= *Hyacinthus patulus* Dsf. = *H. amethystinus* Lam. = *H. cernuus* var. *carneus*

Agraphis

Ait. = ? *H. spicatus* Mch. = *Endymion patulus* Dumort.) = *Scilla azurea* etc., p. 732 et p. 885.

Agretta crispa Eckl., v. *Ixia crispa*, *pentandra* Eckl. et *retusa* Steud., v. *Ixia scillaris*, *retusa*.

Agricolaea fragrans Schrk., v. *Clerodendron fragrans*.

Agriophyllum L., Odermennig.

acutifolia Dumort., spitzblättriger, 4. f. Belgien.

a) *discolor*, β) *laevigata*, γ) *pallida*.

canescens Dumort., grauer, 4. f. Belgien.

Eupatoria L. (= *grandis* Andrzy, *officinalis* Lam.), α) *rotundifolia*, β) *longifolia* (= *minor* Mill.).

gryposepala Wallr. (= *parviflora* Auct. nec Ait.), klein-
kelchiger, 4. f. Pennsylvanien.

humilis Wallr., niedriger, 4. f. Dalmatien.

incisa Torr. et Gr., schlitzblättriger, 4. f. Carolina,
Georgia, Florida.

leucantha Kunze (= *striata* Hort. Angl. non Mchx.),
weißblumiger, 4. f. ?

microcarpa Wallr. (= *parviflora* Auct.), kleinfrüchtiger,
4. f. Pennsylvanien, Georgien.

nepalensis D. Don (= *lanata* Wall. = *Eupatoria* Thbg.).

odorata Camer., Mill. (= *suaveolens* Auct. nec Pursh
? = *elata* Mch.).

pilosa Ledeb. (= *dahurica* W. = *glabrata* Speg. =
A. Goctetiana Andrzy. = *conopsea* Tschernaj = *A.*
Eupatoria var. *dahurica* Fisch.). „A Livonia usque
ad Dahuriam“ C. A. Mey.

platycarpa Wallr., breitfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.

procera Wallr. (= *repens* Mutel, = *odorata* Lej.), hoher,
4. f. Deutschland.

pubescens Wallr., feinhaariger, 4. f. Nordamerika.

rostellata Wallr., geschnäbelter, 4. f. Pennsylvanien.

sessiliflora Dumort., stiellosblumiger, 4. f. Belgien.

sororia Fisch. et Mey., verschwisterter, 4. f. Iberien.

stipularis Dumort., zwischenblättriger, 4. f. Belgien.

viscidula Bunge, schmieriger, 4. f. Nordchina, Nepal.

Nachverzeichnete werden wahrscheinlich nicht kultivirt,
als: *Blumei* G. Don, *Java* Japan, *bracteata* E. Mey. (= ?
repens Eckl. et Zeyh.), *Cap der gut. Hoffn.*, *caffra* E.
Mey., *Cap. d. g. Hoffn.*, *hirsuta* Bongard, Brasilien.

serrifolia Wallr. = *parviflora* Ait., *striata* Mchx.
= ? *parviflora* Ait.

Agriophyllum M. B., Wildblatt, I. II., Aizoideae-
Amaranthaceae.

pungens Lk. (= *arenarium* M. B. = *Corispermum pun-*
gens Vahl, p. 219 = *squarrosus* Stev.).

Agrostemma apetala G. Don, *brachypetala* G. Don,
corsica G. Don, *flos cuculi* G. Don, etc., v. *Lychnis*
apetala etc., *A. Banksia* Meerb., v. *Lychnis gran-*
diflora, *parviflora* Hort. (*laeta* G. Don), v. *Lychnis*
laeta, *perrennans* Dens., v. *Lychnis Densoni*, p. 883.

Agrostis L., Straußgras.

alpina Scop., β) *flavescens* Host (= *versicolor* Hoppe
non Stev.).

Cornucopiae Fras. (= *anomala* W., p. 25 = *A. Mi-*
chauxii a Trin., *Trichodium decumbens* Mchx. =
Alopecurus carolinianus Speg.).

effusa Speg. (= *alopecuroides* Lk. = *anemagrostoides*
Trin. = *pallida* DC. = *Pourretii* W. = *Agraulus*

Agrostis

- anemagrostoides* Trin. = *Alopecurus effusus* Lk. = *Trichodium effusum* Lk.), weitschweifiges, ☉. f. Italien, Frankreich, Portugal.
- glauca* Bast. (= *Trichodium glaucinum* R. et S.), blaugrünes, 4. f. Frankreich.
- lachnantha* Nees. (= *Podosaemum lachnanthum* Nees.), Cap der guten Hoffnung, p. 25.
- laxiflora* Richards. (= *A. Cornucopiae* Lam., *laxa* Schrb. p. 25, *Michauxii*, β) Trin. = *scabra* W. = *Trichodium laxum* Schult., *T. laxiflorum* Mchx., *T. Mühlenbergianum* Schult., *T. scabrum* Mühlbg.).
- maritima* Lam. (= *alba* L., var. Trin., *arenaria* Gouan = *Milium maritimum* Clement. = *Vilfa maritima* P. B.), Meerstrand's, 4. f. Südfrankreich.
- mucronata* Presl, stachelspitziges, ☉. f. ? Sicilien.
- nitens* Guss. (= *Lachnagrostis nitens* Trin. = *Triplachne nitens* Nees.).
- salmantica* Kunth. (*Trichodium salmanticum* Lagasc.), spanisches, ☉. f. Spanien.
- Schultesii* Kunth. (= *canina* var. Trin. = *pannonica* Hort. = *Trich. neglectum* Schult.), Schultes's 4. f. Ungarn.
- Tenorii* Otto, Tenore's, 4. f. Italien.
- verticillata* Vill. p. 25, (*condensata* W. = ? *decumbens* Gaud. = *densa* M. B. = *refracta* Mch. = *Vilfa densa* P. B. = *V. stolonifera* et *verticillata* et *Vilfarsii* P. B.).
- vulgaris* Wither. (= *capillaris* Schkr., *tenella* Hoffm., *intermedia* Balb. = *pumila* L. = *versicolor* Hort.).
- Cinna* Lam., v. *Cinna arundinacea*, *Cinna* Retz (= *mexicana* L.), v. *Cinna mexicana*, *dispar* Mchx., v. *Sporobolus dispar*, *dispar* Hort., Par., v. *Piptatherum multiflorum*, *gallica* Hort. (*gallecica* Hort.), v. *Airopsis agrostidea*, *glutinosa* Fisch., v. *Melinis minutiflora* p. 883, *latifolia* Otto = ? *Agrostis alba*, β) *Michauxii* Hort., (= *dubia* Hort., *longiseta* Hort. = *triflora* Hort., Hafn.), v. *Chaeturus fasciculatus*, *minima* L., v. *Mibora verna*, *monspeliensis* Auct., v. *Polypogon monspeliensis*, *pallida* Hoffm., Schkr. = *canina*, *pallida* Wither. = *alba*, *paniculata* Hort. Madr. = *Mühlenbergiae* species, *pauciflora* Pursh (= *oligantha* R. et S.) = *Mühlenbergia Willdenowii* var., *retrofracta* W., v. *Calamagrostis retrofracta*, *suaveolens* Blytt, v. *Blyttia* s., *trichodes* R. et S., v. *Sporobolus trichodes*, *vernalis* Hort. Dorpat. = *alba*, *versicolor* Stev. = *Colpodium Steveni*, *vinealis* Schlehr. = *canina*, *vinealis* Schreb. = *alba*.
- Aichrysum** Webb et Berthel., Immergold, XI. VII., Corniculatae - Crassulaceae.
- pulchellum* C. A. Meyer, schönes, †. k. t. Canar. Inseln.
- Aira atropurpurea* Wahlbg. (= *A. Pinkeneyi* Bigelow. = *Avena atropurpurea* Lk., p. 107), v. *Vahlodea atropurpurea* Fr.
- Airopsis** Desv., agrostidea DC. (= *A. Candollei* Desv., p. 26, = *Aira elegans* Vill. = *minuta* Loisel. = *Catabrosa agrostidea* Presl = *Milium galecicum* R. et S. = *Poa agrostidea* DC.), *globosa* Desv. (= *Agrostis tenella* Poir. = *Paspalum globosum* Rasp.).
- Aizoon** L., Zaserling.
- secundum* L., fil. einseitiger, 4. k. Cap der g. Hoffn.

Aizoon

stellatum Lam., sternförmiger, ♀. k. Cap der g. Hoffn.
tomentosum Lam. (= ? *rigidum* L. fil.), filziger, ♀. k.
Cap der guten Hoffnung.

canariense Andr. non L., v. *Sesuvium Portulacastrum*, p. 750.

Ajax Salisb., Haw., v. *Narcissus* I. p. 539.

Ajuga L., Günsel.

acaulis Brocchi, (= *decumbens* Tenor., *Tenorii* Presl),
stengelloser, 4. f. Südtalien.

alpina L., (*genevensis* var. Auct.), Alpen-G., 4. f. Nord-
europäische Alpen¹).

bracteosa Wall. (*hyoscyami* Wall. = *integrifolia* Don, p. 27).

glabra Presl, kahler, ♂. f. Sicilien, Syrien.

Laxmanni Benth. (= *Teucrium Laxmanni* Murr. p. 803,
= *Phleobanthe Laxmanni* Tausch.).

oblongata M. B. (*salicifolia* Stev. non Schreb.).

Alaternus angustifolia Mill. (= *hispanica* et *rotundi-
folia* Hort.) = *Rhamnus Clusii*, *balearica* Duham.
(= *latifolia* Mill. = *Phylica* Mill.) = *Rhamnus*
Alaternus, p. 681.

Albersia Blitum Kunth, *oleracea* Endl., *polygonoi-
des* Endl. (= *Roemeria polygonoides* Mch.), v.
Amaranthus Blitum etc.

Albertinia Spgl. (v. Albertini, Mykolog.), XIX. 1.,
Compositae-Eupatorineae (Vernoniaceae).

brasiliensis Spgl., brasilianische, ♀. t. w. Brasilien.

capitata DC. (= *Conyza capitata* Spgl. = *Vernonia*
incanescens Mart.), kopfförmige, ♀. t. w. Brasilien.

polycephala DC. (= *multiflora* Mart.), vielköpfige, ♀.
t. w. Brasilien.

Albizzia Durazzini, Benth., (Albizzi italienischer Natur-
forscher), XVI. VII. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimos.
lebeckioides Benth. (= *Acacia lebeckioides* DC.), lebeckia-
ähnliche, ♀. w. Ins. Timor.

Neumanniana* (= *Acacia Neumanniana* H. Berol.),
Neumann's, ♀. t. ?²) Neuholland.

amara Benth., fulgens Benth., granulosa Benth. (= *Acacia muricata* W. A., *granulosa* LaBill.), Julibrissin
Durazzini, Benth., Lebeck Benth., lophantha Benth.,
Nemu Benth., procera Benth., speciosa Benth., stipu-
lata Benth. = *Acacia amara*, *fulgens*, *Julibrissin* etc.
p. 1. seq.

Folgende neue Arten werden noch nicht kultivirt, als:

A. elata Benth. (= *Acacia elata* Grah.), Isember-
giana Benth., marginata Benth. (= *Acacia marg.*
Hamilt.), mollis Benth. ♀. Ostind., myriophylla Benth.
(= *Acacia myriph.* Grah.), Smithiana Benth. (Wall.),
Wightii Benth. (= *Acacia Wightiana* Grah. = *A.*
amara Wight. = *A. Wightii* Wight, Arn. = *Mi-*
mosa pulchella Roxb.), ♀. Ostindien.

Albucca L., Weissblume (Stiftblume).

cornuta Dsf., Redout. (= ? *alba* Lam.), gehörnte, 4.
Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

longifolia Fisch., langblättrige, 4. Zw. t. Cap der
guten Hoffnung.

1) Nach Fries v. *A. genevensis* L. verschieden.

2) Wahrscheinlich Varietät oder Hybride von *Albizzia*
(*Acacia*) *lophantha*.

Albuca

- maxima Don, größte, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.
 parviflora Don, kleinblumige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.
exuviata Ker (= *Anthericum exuviatum* Jacq.),
filifolia Ker (= *Anthericum filifolium* Jacq.), *fugax*
 Ker (= *Anthericum fragrans* Jacq.), v. *Ornithogalum*
exuviatum, *filifolium* et *fragrans*, *nematodes*
 Sweet (= *Anthericum filifolium* Thbg.), v. *Ornithogalum*
Thunbergii, *vittata* Ker, v. *Ornithogalum vittatum*.
Albuca nutans Rehb. = *Ornithogalum H. nutans*,
 p. 569.

Alcanna spinosa G. = *Lawsonia spinosa*, p. 450.

Alchemilla Löwenfuß, Frauenmantel.

- fissa* Schum., Günth. (= *hybrida* Schleich. = *minor* Host.,
palmatifida Tausch, *pyrenaica* Duf., *vulgaris glabra*
 DC. = *conjuncta* Babingt.).
vulgaris L. (= *glaberrima* Schmidt = *glabrata* Tausch
 = *multicaulis* Tausch = *palmata* Gilib. = *pratensis*
 Schmidt = *sylvestris* Schmidt = *truncata* Tausch.),
 δ) *iberica* Fisch. et Mey. Vergl. p. 28.

Alectorolophus Hall., Klaffer.

- buccalis** (= ? *Reichenbachii* Drejer = *Rhinanthus buc-*
calis Wallr.), aufgeblähter, ☉. f. Deutschland.
hirsutus All. (= *Rhinanthus Alectorolophus* Poll. =
hirsutus Lam. = *villosus* P. = *grandiflorus*, β) *pu-*
bens Wallr. = *Crista galli*, γ) L. spec.).
major Rehb. (= *glaber* All. = *Rhinanthus glaber* Lam.,
R. Crista galli L. var.), β) *alpestris* Wahlbg. (= *pulcher*
 Schummel).

Alettris L., Hyacinthalöe.

- farinosa* L. (= *alba* Mchx. = ? *Wurmbea bullata* W.),
 mehlig, 4. k. f. b. Nordamerika.
japonica Lamb. (= *farinosa* Thbg. = *Hypoxis spicata*
 Thbg.), japanische, 4. k. Japan.
pumila Ait., *sarmentosa* Andr., *Uvaria* L. v. *Knip-*
hafia pumila, *sarmentosa* et *aloides*.

Aleurites Forst., Mehlbaum.

- laccifera* W. (= *Croton lacciferum* L. = ? *Croton aro-*
maticum var. L.), milchender, ♀. w. Ostindien.
moluccana W. (= *Jatropha moluccana* L.) = *tri-*
loba p. 28¹).

Alfredia cernua Cass. = *Silybum cernuum* G., p. 760.

Algarobia Benth., Algarobie X. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

- juliflora* Benth. (= *Prosopis juliflora* DC., p. 658. =
Acacia juliflora W. = *Mimosa piliflora* Sw.).

Alhagi T., Mannapflanze.

- kirgisorum* Schrenk, C. A. Mey., Kirgisen-M., 4. ♀. k.
 Asiat. Rußland.
camelorum Fisch. et Mey. (= *A. Pseudalhagi* Desv. =
Hedysarum Pseudalhagi MB. = *Manna caspica* Don).
A. maurorum T. DC. (= *mannifera* Desv. = *Hedy-*
sarum Alhagi L. = *Manna hebraica* Don), v. p. 29.
Alicteres carthagenensis Schott., v. *Helicteris car-*
thagenensis.

1) Alexandra Imperatricis Schomburgk (zu Ehren Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland benannt), Papilionaceae. Grosser schöner Baum aus Guiana, wird noch nicht kultivirt.

Alipsa foliosa Hoffinsg., v. *Sturmia foliosa*.
Alkanna tinctoria Tausch, v. *Anchusa tinctoria* p. 53.
Alkekengi fissum Mch. = *Physalis viscosa*, *A. officinarum* Mch. = *Phys. Alkekengi*, *A. procumbens* Mch. = *villosa* Mch. = *Physalis pubescens* p. 621.
Allagathera Forskohlei Mart. = *Alternanthera sessilis*.
Allagopappus dichotomus Cass., v. *Jasonia dichotoma*, p. 880.

Allamanda L., Aubletii Pohl (= *cathartica* plur. Auctor. = *grandiflora* Lam. = *Echites salicifolia* R. et S. = *Orelia grandiflora* Aubl.), Aublet's, ♀. w. Guiana.
 Linnaei Pohl, (= *cathartica* L. non Auct.), Linné's, ♀. w. Brasilien.

Schottii Pohl (= *brasiliensis* Schott = *cathartica* Schrad.), Schott's, ♀. w. Brasilien.

Allionia L.

albida Walt. (= *aggregata* Speg. = *Calymenia aggregata* P. = *C. albida* Nutt. = *Calyxhymenia aggregata* Orteg.), weifslische, ☉. f. Carolina, Neuspanien. Vergl. p. 28.

Cervantesii Steud. (= *Calyxhymenia Cervantesii* Dsf.), Cervante's, 4. ♀. k. ?

cucullata C. A. Mey., kappenförmige, 4. f. k. ?

Allium T. L. Lauch.

acre Presl, scharfer, 4. Zw. Sicilien.

acuminatum Hort., zugespitzter, 4. Zw. f. ?

acutangulum Schrad. (= *angulosum* plur. auct. = *triquetrum* Hort.) b. flore albo.

adscendens Tenore, aufsteigender, 4. Zw. f. Neapel.

amethystinum Tausch, amethystfarbiger, 4. Zw. f. Dalmatien.

Ampeloprasum L., β) *margaritaceum* Mch. ? (= *neglectum* Wender.), p. 29.

arvense Guss. (= *candidum* Presl), Acker, 4. Zw. f. Sicilien.

atrosanguineum Karelin et Kirilow, blutrother, 4. Zw. f. Asiat. Rufslund.

azureum Ledeb. (= *coeruleum* Auct.), azurblauer, 4. Zw. f. Altai.

caespitosum Sievers, rasenartiger, 4. Zw. f. Sibirien.

cardiostemon Fisch. et Mey., herzfädiger, 4. Zw. f. Armenien.

caricifolium Karelin et Kirilow, seggenblättriger, 4. Zw. f. Asiat. Rufslund.

caucasicum M. B. (= *globosum* Redout. = *savranicum* Bess.), caucasischer, 4. Zw. f. Caucasus.

coeruleum Pall.¹⁾, (*coerulescens* Don), blauer, 4. Zw. f. Sibirien.

collinum Guss., Hügel-L., 4. Zw. f. Calabrien.

Coppolerii Tineo (= *parviflorum* Guss. nec L. = *australe* Guss.), Coppoleri's, 4. Zw. f. Calabrien, Sicilien.

cornutum Clementi, gehörnter, 4. Zw. f. Dalmatien.

crinitum Tausch, bemähnter, 4. Zw. f. Oesterreich.

Cupani Rafin. (= *moschatum* L. var. Jan. ? = *tenuiflorum* Tenor.), Cupani's, 4. Zw. f. Sicilien.

1) Vergl. Endlicher Catalogus horti acamedici Vindobonensis. Vol. I. p. 137. Nach andern Schriftstellern wird *A. coeruleum* Pall., zu *A. azureum* Ledeb., citirt.

Allium

- Cyrilli Tenore (= *fragrans* Cyrill.), Cyrillo's, 4. Zw. f. Neapel.
- declinatum Rchb., niedergebogener, 4. Zw. f. ?
- denudatum Redout., nackter, 4. Zw. f. ?
- Erdelii Zuccar., Erdel's, 4. Zw. k. Palästina.
- fallax Don, Schult. (= *angulosum* All. et *senescens* auct. non L. = *narcissifolium* Vill. = *montanum* Schm. = *serotinum* Schleich. = *acutangulum*, β) *montanum* M. et K. et γ) *calcareum* M. et K.), trügerischer, 4. Zw. f. Mitteleuropa.
- Fischerii Sweet (non Bess.), Fischer's, 4. Zw. f. Sibirien.
- fissile G. Don, Sweet, gespaltener, 4. Zw. f. Kleinasien.
- fistulosum L., β) *ceratophyllum* Ledeb., Fisch. et Mey., Bess. (p. 30), γ) *altaicum* Pall., Fisch. et Mey.
- flavescens Bess. (= *albidum* MB. non Fisch. = *amophilum* Heuff.), gelblicher, 4. Zw. f. Taurien, Volhyn.
- flavum L., β) *ruthenicum* Lang (= var. *tauricum* Rchb.), (p. 30).
- Frivaldszkyanum Kunze (= *margaritaceum* Frivalds. nec Sm.), Frivaldsky's, 4. Zw. f. Macedonien.
- galanthum Karel. et Kiril., milchweißblumiger, 4. Zw. f. Asiat. Rußland.
- glandulosum Lk. et Otto (= *longifolium* Lindl. non Humb. Boupl.), drüsiger, 4. Zw. k. Mexico.
- globosum MB. (= *tauricum* Pall.).
- graminifolium Loisel., grasblättriger, 4. Zw. f. Corsica.
- hirsutum Zuccar. (non Lam.), rauhhaariger, 4. Zw. k. f. b. Palästina.
- indoriense Fisch., uralischer, 4. Zw. f. Ural.
- infestum Brotero, unangenehmer, 4. Zw. f. ?
- kermesinum Rchb., kermesinfarbiger, 4. Zw. f. Oberkrain.
- laxiflorum Tausch, lockerblumiger, 4. Zw. f. Böhmen.
- Ledebourianum R. et S. (= *uliginosum* Ledeb., p. 32, non Don), Ledebour's, 4. Zw. f. Rußland.
- lepidum Hort., Berol., (= *saxatile* Hohenack. non MB.), schilferiger, 4. Zw. f. Altai.
- longicaule Hornem., langstenglicher, 4. Zw. f. Nordamerika.
- longispathum Redout. (= *pallens* Ker, = *fuscum* et *paniculatum* Auct.), langscheidiger, 4. Zw. f. Frankreich, Ungarn, Podolien.
- macrostemon Bunge, grobsfadiger, 4. Zw. f. b. Nordchina.
- margaritaceum Sibth., Sm. (= *stenopetalum* Guss.), perlfarbiger, 4. Zw. f. Griechenland, Süditalien, Dalmatien.
- monadelphum Turcz., einbrüderiger, 4. Zw. f. Sibirien.
- moschatum L., β) *majus* (= *setaceum* W. K.).
- neapolitanum Cyrill. (= *album* Savi = *candidissimum* Cav., *lacteum* Sib. Sm., *liliifolium* Zeyh. = *amblyopetalum* Lk.), p. 30.
- nebrodense Guss., nebrodischer, 4. Zw. f. Sicilien.
- oreophilum C. A. Mey., steinliebender, 4. Zw. f. Caucasus.
- permixtum Guss., gemischter, 4. Zw. f. Sicilien.
- persicum Fischer, persischer, 4. Zw. f. Persien.
- petraeum Karelin et Kirilow, felsliebender, 4. Zw. f. Asiat. Rußland.
- polyanthum Schult. (= *multiflorum* Lam.), reichlichblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich.
- polyphyllum Karel. et Kiril., vielblättriger, 4. Zw. f. Asiat. Rußland.
- polyrrhizon Turcz., vielwurzeliger, 4. Zw. f. Sibirien.

Allium

- praescissum Rchb., abgestutzter, 4. Zw. f. Sibirien.
 prostratum Trevir. (= *cernuum* Hort. = *Fischeri* Bess. = *deflexum* Fisch.), p. 31.
 pulchellum G. Don (= *carinatum capsuliferum* Jan. = *coloratum* Spr. = *paniculatum* Redout.), p. 31.
 Purshii G. Don (= *vineale* Pursh = *canadense* Hortul.), p. 31.
 pusillum Cyrill. (= *capillare* Dsf. = *maritimum* Rafin.).
 pylium H., Genuens. Pforten-L., 4. Zw. f. ?
 robustum Karel. et Kiril., kräftiger, 4. Zw. f. Songaria.
 Rothii Zuccar., Roths, 4. Zw. k. f. b. Palästina.
 rotundum L., β) Waldsteinianum G. Don, R. et S., p. 32, (= *Ampeloprasum* W. K. = *A. Ampeloprasum*, β) *latifolium* Bess.), γ) tauricum, δ) scariosum, Jan.
 rubens Schrad. (= *bisulcum* Redout., p. 29, = *Stellerianum* Ledeb. = *Fischeri* H. Berol.), röthlicher, 4. Zw. f. Altai.
 sativum L., p. 31, β) kirghisorum Hort. Dorpat.
 Schmidtianum Tausch, Schmidt's, 4. Zw. f. ? Böhmen.
 Schoenoprasum L., p. 31, (= *riparium* Opitz = ? *tenuifolium* Salisb.), γ) reflexum Dietr.
 segetum Jan., Saat-L., 4. Zw. f. Sicilien.
 serescens L. p. 31, (= *glaucum* Schrad., *canescens* Hort., *baicalense* W. E. = *illyricum* Lk. et Otto = *purpureum* Salisb. = *spurium* Hort. = *narcissifolium* Scopol. = *longicaule* et *trisculcum* Hort.).
 sphaerocephalum L., p. 31, (= *descendens* Bot. Mag. = *atroviolaceum* Hornem. = *lineare* Tenor. = *veronense* Poll.).
 Stellerianum W., Steller's, 4. Zw. f. Sibirien.
 sulcatum DC., gefurchter, 4. Zw. f. ?
 tenuiflorum Tenore, dünnblumiger, 4. Zw. f. Neapel.
 β) major Kunth (= *paniculatum* Tenore).
 tenuissimum W., dünnster, 4. Zw. f. Sibirien.
 Tinei Presl, Tineo's 4. Zw. f. Sicilien.
 triste Kunth et Bouché, trauernder, 4. Zw. f. ? Orient.
 tulipaefolium Ledeb. (= *decipiens* Fisch. = *nigrum* MB.), tulpenblättriger, 4. Zw. f. Altai.
 uliginosum G. Don (= *angulosum* Lour. = *senescens* Thbg.), Sumpfl.-L., 4. Zw. k. Japan, China.
 vernale Tineo, Frühling's, 4. Zw. f. Sicilien.
 violaceum Willd. suppl. (= *flexum* Rchb.), violetter, 4. Zw. f. Croatien.
 viridulum Ledeb., grünlicher, 4. Zw. f. Sibirien.
 Wierzbickii Heuffel (= *hirsutum banaticum* Wierzb.), Wierzbickis, 4. Zw. f. Banat.
 Willdenowii Lk. (= *pusillum* W. E. suppl. ?), Willdenow's. 4. Zw. f. ? Sibirien.
brachystemon Redout., v. *roseum*, *bracteatum* Hort. (= ?), *consentinum* Hort. Belv. (= ?), *incarnatum* Hornem. = *intermedium*, *luteum* Hort. Angl., v. *obliquum*, *nemorale*, Salisb., v. *ursinum*, *nitidulum* Hornem. (= ?), *ochraceum* Hort. (= ?), *Oroprasum* Hort. Gorenk. (= ?), *pratense* Schleich., v. *vineale*, *punctatum* Hort. (= ?), *siculum* Ucria (= *Dioscoridis* Sibth.), v. *Nectaroscordum siculum*, *tataricum* Hort. (= *undulatum* Auct.), v. *nutans*, *virescens* DC., v. *oleraceum*.
A. evosmum Lk. et Otto (= *nudicaule* Lehmann, p. 30),

Allium

flavescens Poepp., *fragrans* Vent. et β) *gracile* Dryand., Ait., γ) *nepalense* Bot. reg., *ornithogaloides* Bosc., *striatellum* Lindl., p. 31, *striatum* Jacq. (= *canadense* Mchx.), v. *Nothoscordum evosmum*, *fragrans* etc.

Allobrogia Tratt., v. *Czackia Liliastrum*.

Allojozonium Kunze, *Verschiedengürtel*, XIX. III., *Compositae-Corymbiferae*.

arctotideum Kunze, bärenohrähnlicher, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Allophyllus Cominia Sw., *racemosus* Sw., v. *Schmidelia Cominia*, *occidentalis*, p. 730.

Alloplectus Mart. (*Besleria* Auct. p. 119), XIV. II., *Personatae Gesnerieae*.

bicolor Mart. (= *dichrous* DC. = *Schottii* G. Don = *Besleria bicolor* Schott. = *dichrus* Spgl.).

circinnatus Mart. (= *Besleria hirtella* Schott).

coccineus Mart., G. Don (= *Besleria coccinea* Aubl.).

cristatus Mart. (= *Besleria cristata* L., *Lophia phoenicea* Desv.).

sparsiflorus Mart., zerstreutblumiger, \S . w. Brasilien.

Ob nachstehende kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: *angustifolius* DC., \S . Brasil., *glaber* DC. (= *Besleria cristata* Moç. Sess.), *hispidus* Mart. (= *Besleria hispida* H. B. K.), \S . Südamerika, *Patrisii* DC., \S . Guiana.

sanguineus Mart. (= *Besleria sanguinea* P. = *Dalbergaria sanguinea* Tuss., Juss. = *Vireya sanguinolenta* Rafin.), v. *Tussacia sanguinea*.

Allosorus Bernh., *Krausfarnn*.

a) *Cryptogramme* RBr.

angustifolius Kunze (*Cheilanthes angust.* H. B. K. p. 187, = *Cheil. marginata* Lk. excl. Syn.).

auratus Presl (= *Pteris chrysocarpa* Hook. et Grevill.), goldfarbiger, 4. t. w. Nepal.

auriculatus Presl (= *Cheilanthes auriculata* Lk. = *Pteris auriculata* Sw. = *Adiantum auriculatum* Thbg.), geöhrt, 4. t. w. Cap der guten Hoffnung.

caespitosus Presl (= *Cheilanthes crenulata* Lk.), rasenartiger, 4. w. Südamerika.

ciliatus Presl (= *Cheilanthes rufescens* Lk.), p. 188, gewimperter, 4. w. ? Mexico.

crispus Bernh. (= *Phorobolus crispus* Desv.), p. 32.

*hirsutus** (= *Cheilanthes hirsuta* Lk., p. 188, var. von *A. caespitosus*?).

b) *Platyloma* Kunze.

atropurpureus Kunze, Presl, (= *Pteris atropurpurea* L. p. 663, *Pellaea atrop.* Lk.).

Calomelanos Presl (= *Pteris Calomelanos* Sw., p. 663, *Pt. hastata* Thbg. = *Pellaea Calom.* Lk.).

flexuosus Kaulf., Kunze (= *Pteris flexuosa* Hook., Lk., p. 664, = *Pt. cordata* Cav., Lk. = *Pellaea flexuosa* Lk.).

intramarginalis Presl (= *Pteris intr.* Kaulf.), p. 664.

hastatus Presl (= *Adiantum hastatum* L. suppl. = *Pteris hastata* Sw., p. 664, = *Pellaea hastata* Lk.).

sagittatus Presl, Kunze (= *Pteris sagittata* Cav. p. 664, = *Pellaea sagittata* Lk.).

Allosorus

ternifolius Kunze (= *subverticillatus* Presl = *Pteris peruviana* Poir., p. 664, = *subverticillata* Sw. = *P. ternifolia* Cav.).

Almyra stellaris Salisb., v. *Pancratium illyricum*.

Alnus T., Erle.

autumnalis Loddig., Herbst, h. f. ?

denticulata C. A. Mey., gezähnelte, h. f. Caucasus.

latifolia Dsf., breitblättrige, h. f. ?

obcordata C. A. Mey., verkehrtherzblättrige, h. f. Caucasus.

orientalis Decaisn., (= *longifolia* Bové), morgenländische, h. f. Syrien.

pubescens Tausch (*A. glutinosa* et *incana* var. *hybrida*), weichhaarige, h. f. ?

sibirica Fisch., sibirische, h. f. Sibirien.

alpina Borckh. = *incana*, *cordata* Dsf. = *cordifolia*, *ovata* Hort. = *viridis*, *rubra* Hort. (= ?)

Alocasia cucullata Sweet, *macrorrhiza* Sweet, v. *Colocasia cucullata*, *macrorrhiza*.

Aloe T. L., p. 33. seq.

I. *Haworthia* Duv. Haw. (= *Apicra* W.).

altilinea Haw., R. et S., β) *denticulata* Haw., R. et S.

aristata Haw., R. et S. (= *arachnoides* var. auct.), begrante, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

brevis Haw. (*margaritifera*, γ) *minima* Bot. Mag., *margarit. brevis* Haw.), kurze, 4. k. t. Cap d. g. H.

cuspidata Haw., R. et S. (= *translucens* Haw. var. Spgl.), langspitzige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

cymbifolia Schrad. (= *cymbaeformis* Curt. = *cymbiformis* Haw. = *Haworthia concava* Haw.).

erecta R. et S., Haw. (= *margaritifera* DC., *margaritifera* β) Willd. Enum.), aufrechte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

glabrata Salm Dyck, glatte, 4. k. t. Cap. d. g. Hoffn.

granata Haw., R. et S. (*Apicra granata* W., *Aloe margaritifera* var. *mimima* DC., Salm Dyck, *margaritifera minor* Ait.), geperlte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *laetevirens* Salm Dyck nec Haw., Link, γ) *minor* (H. *granata*, β) *polyphylla* Haw.)

parva Haw., R. et S., kleine, 4. k. t. Cap d. g. H.

retusa L. (= *Catevala retusa* Medik.), β) *mutica* R. et S., Haw.

rugosa Salm Dyck (= *Radula*, γ) *minor* Salm Dyck, Haw., *Radula asperior* Haw.), runzelige, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

β) *perviridis* Salm Dyck.

semimargaritifera Salm Dyck, Haw.

α) *maxima* Salm Dyck, R. et S., (*A. margaritifera maxima* Haw., *Haworthia maxima* Haw., *A. africana* Commel.), β) *major* Salm Dyck, γ) *minor*

Salm Dyck (= *A. glabrata* Hortul.), δ) *multiperlata* Haw., Salm Dyck (= *A. media* Hortul.).

setosa Haw., R. et S. (= *arachnoides minor* Haw.), borstige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

α) *setis niveis tenuissimis numerosis*, β) *nigricans* Haw, γ) *media* Haw., δ) *major* Haw.

subattenuata Salm Dyck (= Haw. *Radula*, δ) *magniperlata* Haw. = *A. Radula*, δ) *margaritacea* Salm Dyck), wenigverdünnte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

subfasciata Salm Dyck (= *fasciata*, β) *major* Salm Dyck,

Aloe

- = *subulata* Salm Dyck, observ. 1822), wenigquerbänderige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
subrigida R. et S. (= *pseudorigida* Haw., Salm Dyck = *Apicra rigida* W.), wenigstarre, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
subtortuosa R. et S. (= *Apicra tortuosa* W., Aloe *pseudo tortuosa* Salm Dyck, H. *pseudo tortuosa* Haw.).
subulata Salm Dyck (*A. Radula*, α) *major* Salm Dyck, H. *Radula laevior* Haw.), pfriemenförmige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
tortuosa Haw. (*tortella* Haw.), β) *major* Salm Dyck.
translucens Ait. (= *pellucens* Haw., *A. arachnoides*, δ) *translucens* Bot. mag.).
turgida Haw., R. et S., aufgeschwollene, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
venosa Lam. (= *tricolor* Haw., *Apicra tricolor* W.).
viscosa L. (= *triangularis* Lam.), β) *indurata* Haw.
Bradleyana Jacq. = *atrovirens*, *clariperla* Haw. = *attenuata* β) *concinna* Haw. = *viscosa*, *fasciata* Haw. non Salm = Reinwardti, *Hebes* R. et S. = *obtusa*, *herbacea* DC. = *reticulata*, *herbacea* Mill. = *atrovirens*, *Radula* Ker = *attenuata*, *stenophylla* R. et S. = *angustifolia*.

II. *Apicra* Haw. (*Haworthia* Salm Dyck).

- pentagona* Haw., Jacq. (*A. spiralis*, β) *pentagona* Ait., W.), fünfkantige, 4. $\frac{1}{2}$. k. t. Cap d. g. Hoffn.
quinquangularis R. et S. (= *pentagona* Salm Dyck, *pentagona*, β) *torulosa* Haw.), fünfeckige, 4. $\frac{1}{2}$. k. t. Cap der guten Hoffnung.
spiralis Haw., R. et S. (*A. pentagona*, β) *spiralis* Salm Dyck).
spirella Haw., R. et S.

III. *Gasteria* Haw. (*Curviflorae* Salm Dyck).

- angulata* W. (= *Lingua*, β) *latifolia* Willd. Enum. = *Lingua longifolia* Haw. = *linguaeformis* Mill. = *Gasteria longifolia* Haw.), α) *vulgaris* W., β) *unilateralis* W., γ) *truncata* W.
angustifolia Haw., Salm Dyck, (= *conspurcata*, α) *unilateralis* S. Dyck = *Lingua angustifolia* Haw. = *linguaeformis*, β) Lam. = *linguaeformis verrucosa* DC.), schmalblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Bayfieldii Salm Dyck, Bayfield's, 4. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.
brachyphylla Salm Dyck (= *brevifolia* Haw., R. et S. *nigricans*, γ) *denticulata* Salm Dyck), kurzblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
carinata Mill (= *disticha*, β) L. = *disticha triangularis* H. Par.).
conspurcata Haw. Salm Dyck (= *conspurcata*, β) *truncata* Salm Dyck).
decipiens Haw., R. et S. (= *Haworthia nigricans* Haw.), täuschende, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
disticha Haw., R. et S. (= *Lingua* Salm Dyck, α) *angustifolia* S. Dyck = *Gasteria denticulata* Haw.).
elongata Salm Dyck (= *G. trigona* Haw. = *A. acinacifolia*, γ) *angustifolia* S. Dyck = *acinacifolia*, δ) *laevivirens* Salm Dyck), verlängerte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Aloe

excavata W. (= *obscura* W., *obscura* α) et β) Salm Dyck, *Lingua* α) *angustifolia* W., *Gasteria latifolia* Haw., *A. disticha* δ) L. spec. = *A. Lingua* Bot. mag. = *A. Lingua multifaria* Haw.).

glabra Haw., Salm Dyck, α) major, β) minor Haw. (glabra β) *brevifolia* Salm Dyck).

guttata Salm Dyck, getüpfelte, 4. k. t. Cap d. g. H. α) *angustifolia* (= *G. subnigricans*, β) *glabrior* Haw. = *nigricans*, γ) *denticulata* Hort.), β) *latifolia* Salm Dyck.

laevis Haw., Salm Dyck, (= *angustifolia*, β) *laevis* Salm Dyck).

nigricans Haw., α) *latifolia* (= *Lingua*, β) *crassifolia* Ait. = *obliqua* Jacq.), β) *crassifolia* Haw., γ) *marmorata* Haw., Salm Dyck.

picta Haw. (= *Bowieana* R. et S), bemahlte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pusilla R. et S. (= *Gasteria parva* Haw.), niedrige, 4. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.

scaberrima Salm Dyck (= *intermedia*, β) *asperrima* Haw.), schärfste, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subcarinata Haw., Salm Dyck (= *pseudo-angulata* Salm Dyck), β) *striata* Salm Dyck (= *pseudoangulata* Salm Dyck) = *angulata striata* W.).

subnigricans Haw., Spgl., α) *planifolia* (= *speudonigricans* Salm Dyck), β) *canaliculata*.

sulcata Haw., Salm Dyck (= *obscura*, γ) *truncata* Salm Dyck = *linguaeformis* Lam., DC. = *Lingua*, β) *angulata* Haw. = *Gasteria angulata* Haw.).

trigona Haw., Salm Dyck (= *Gasteria obtusa* Haw. = *nitida*, γ) *obtusa* Salm Dyck).

verrucosa Ait. (= *carinata*, β) *ensiformis* DC. = *A. Serra* β) *verrucosa* P.).

vittata R. et S. (= *fasciata* Haw. = *nigricans*, γ) *fasciata* Salm, Haw.), bandstreifige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *laxa* Haw.

dictyodes R. et S. = *retata*, *Lingua*, γ) *brevifolia* = *obtusifolia*, *maculata* Curt. (= *maculata*, α) *pulchra* Ait. = *obliqua* DC. non Haw. Salm) = *pulchra*, *marmorata* Hort. = *formosa*.

IV. *Bowiea* Haw.

africana Haw. (= Aloe *Bowiea* R. et S.).

V. *Grandiflorae* Salm Dyck.

a) Aloe Haw.

barbadensis Mill. (= *perfoliata barbadensis* Ait. = *vulgaris barbadensis* DC. = *vulgaris* Lam.).

β) *elongata* Murr., R. et S. (*vulgaris* W. Enum.),

γ) *chinensis* Salm Dyck, R. et S.

caesia Salm Dyck, α) *patula* S. Dyck, β) *elatiior* S. Dyck, γ) *disticha* van Marum.

echinata W., β) *minor* S. Dyck = *tuberculata* Haw.

glauca Mill., α) *elatiior* S. Dyck (= *major*), β) *minor* (= *rhodacantha* Bot. mag), γ) *humilior* Salm Dyck (= *rhodacantha* DC.), δ) *spinosior* Haw., R. et S. (= *muricata* Schult.).

grandidentata S. Dyck, grofszahnige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

latifolia Haw., S. Dyck (*A. Saponaria latifolia* Haw.

Aloe

= *A. Saponaria major* Bot. mag. = *umbellata*, *a*) *major* DC.).

longiaristata R. et S. (= *aristata* Haw. non *Haworthia aristata* Haw.), langgrannige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

obscura Mill. (= *maculata* Dsf. = *maculosa* Lam. = *perfoliata obscura* Ait. = *picta* Thbg., *A. Saponaria obscura* Thbg.), dunkelfarbige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

purpurascens Haw. (= *perfoliata*, *ε*) *purpurascens* Ait.

= *barbadensis* Ait = *ramosa* Haw.), purpurfarbige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung ¹⁾.

Saponaria Haw. (= *maculata* Lam.), Seifen-A., ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

a) *minor* Haw. (= *umbellata* DC. = *picta* *β*) Ait.),

β) *picta* Salm Dyck (= *A. S. luteostriata* Haw. = *umbellata striata* Hort. = *africana* Hort. Lombard.).

socotrina Lam. (= *sinuata* Thbg. = *vera* Mill.).

spinulosa S. Dyck, stachlige, ♀. k. t. Cap d. g. H.

tenuifolia Lam.

postgenita R. et S. = *prolifera* Haw. = *prolifera major* S. Dyck.

b) *Pachydendron* Haw. (= *Agriodendron* Haw.).

africana Mill., *a*) *latifolia*, *β*) *angustior* Haw. (= *pseudoafricana* S. Dyck).

angusta R. et S. (= *P. angustifolium* Haw.), schmale, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

distans Haw., *a*) *brevifolia* S. Dyck (= *mitraeformis humilior* W. = *mitraeformis brevifolia* Bot. mag. = *mitraeformis*, *β*) *angustior* Lam.), *β*) *reflexa* S. Dyck,

γ) *depressa* Haw.

ferox Mill., Lam. (= *P. ferox* Haw. = *A. horrida et muricata* Haw. in Linn. Trans., *A. perfoliata*, *θ*) *ferox* Ait.).

mitraeformis W., S. Dyck, Haw, R. et S.

Principis Endl. (*A. Salm Dyckiana* R. et S., *A. africana* S. Dyck = *P. Principis* Haw.).

subferox Speg. (= *pseudoferox* S. Dyck = *ferox* *β*) Haw. = *P. pseudoferox* Haw.).

supralaevis Haw. (= *P. supralaeve* Haw.).

xanthacantha W. (= *A. mitraeformis patula* Hort.).

c) *Rhipidodendron* W.

dichotoma L., suppl.

plicatilis Mill., Ait. (= *A. disticha*, *ε*) *plicatilis* L. spec.

= *Kumara disticha* Medik = *Rhipidodendron distichum* W. = *R. plicatile* Haw.), *β*) *major* S. Dyck (*A. plicatilis* Jacq.).

A. pertusa Haw. = *Pyrgosea corymbosula*.

Alona Lindl. (Anagramm v. *Nolana*), V. 1., Solanaceae. *coelestis* Lindl., himmelblaue, ♀. k. t. Coquimbo ²⁾.

Alonsoa R. et P.

parviflora Steud. (= *Hemimeris parviflora* H. B.), kleinblumige, 4. ♀. k. t. Caracas.

urticaefolia Steud. (= *Celsia urticaefolia* Curt. = *Hemimeris urticaefolia* W.), nesselblättrige, ♂. ♀. k. t. Südamerika.

1) „Ab *A. rubescente* DC. toto caelo recedit S. Dyck.“

2) Herr Professor Lindley stellt zu dieser Gattung noch folgende Arten: *rostrata* Lindl., *obtusata* Lindl., *glandulosa* Lindl., *carnosa* Lindl., sämtlich von Coquimbo; *tomentosa* Lindl. (= *crassiuscula* Poepp.), von Valparaiso, dann noch: *revoluta* Lindl., *baccata* Lindl., *longifolia* Lindl.

Aloysia Ortega.

chamaedryfolia Chamiss. (= *Lippia chamaedryfolia* Steud. = ? *Verbena dentata* Visiani), gamanderblättrige, \S . t. Brasilien.

citriodora Ortega (= *Lippia citriodora* Kunth = *Verbena triphylla* L'Her.).

Alsevosmia Cunningh., Alsevosmie V. r., Caprifoliaceae.

Banksii Cunningh., Banks's, \S . k. t. Neuholland.

bupleurifolia Cunningh., hasenohrblättrige, \S . k. t. Neuholland.

Alsianthe biflora Fenzl, *stricta* Fenzl = *Alsine biflora et stricta* p. 38 et 39.

Alsine L., Wahlenb., Miere.

filiformis Fenzl (= *Spergula* Hochst. et Steud.), fadenförmige, \odot . f. Mittelasien.

formosa Fenzl, schöne, \odot . f. Kurdistan.

globulosa C. A. Mey. (= *Arenaria globulosa* LaBill. = *globosa* Spgl.), kugelige, \odot . f. Syrien, Caucasus.

juniperina Fenzl (= *Arenaria juniperina* L. p. 75).

pharnaceoides Fenzl (= *Arenaria pharnaceoides* Sering.), pharnaceumähnliche, \odot . f. Orient.

procumbens Fenzl (= *Arenaria procumbens* Vahl, p. 75, = *geniculata* Poir.).

campestris Fenzl, *dichotoma* Fenzl, *montana* Fenzl, v. *Minuartia campestris* etc., p. 527.

Alsinnella erecta Mch., v. *Moenchia erecta*, p. 527.

Alsophila R. B. Hainfarn.

elegans Mart., zierlicher, 4. w. Brasilien.

paleolata Mart. (= *Polypodium alsophilum* H. Berol.), spelzentragender, 4. w. Brasilien.

Astroemeria L.

aurea Grah. (*aurantiaca* D. Don, p. 39, *flava* Hort.).

brasiliensis Sellow, Spgl., brasilianische, 4. Kn. k. t. Brasilien.

Bredemeyeriana W., Bredemeyer's, 4. Kn. k. t. Südamerika.

caryophyllea Jacq., nelkenähnliche, 4. Kn. k. t. ?

Cummingiana Herbich, Cumming's, 4. Kn. k. t. Chili.

Curtisiana Meyer (= *A. Ligtu* L. fil. Curt.), Curtis's, 4. Kn. k. t. Brasilien.

formosissima R. et P. (= *formosa* P.), schönste, 4. Kn. k. t. Peru.

gloriosa Chamiss., Schltld., prächtige, 4. Kn. k. t. Chili.

Hookeriana Schult. (= *rosea* Hook. non R. et Pav. = *Simsii* Sweet non Spgl.), Hooker's, 4. Kn. k. t. Chili.

Jacquesii Hort., Jaques's, 4. Kn. k. t. Südamerika.

nemorosa Hort. belg. Hain-A., 4. Kn. k. t. Südamerika.

oculata Lodd. (= *Salsilla* Hort. Anglor. non L.), geäugelte, 4. Kn. k. t. Chili.

pulchra Sims (= *A. flos Martini* Ker = *tricolor* Hook.), schöne, 4. Kn. k. t. Chili.

Riedeliana Hort. belg. Riedel's, 4. Kn. k. t. Südamerika.

Simsii Spgl. (= ? *Hookeri* Lodd., Sweet non Schult. = *A. Ligtu* var. β) Spgl. = *pulchella* Sims), Sims's, 4. Kn. t. Chili.

Feuilleana Meyer. = *Ligtu montana* Ker, v. *Ixiolirion montanum*.

Alternanthera Forsk., RBr., Wechselstaubbeutel.

diffusa Hort. Berol., weitschweifiger, \odot . f. m. w. Brasilien.

echinata Hort. Bonn., Fisch. et Mey., igelstacheliger, \odot . f. m. w. ?

Alternanthera

sessilis R. Br. var. *caspica* Fisch. et Mey.

strigosa Hassk., striegelicher, ☉. f. m. w. Java.

tenella Colla (= *Illecebrum tenellum* Hort. = *Paronychia tenella* Dsf.), zarter, ♂. 4. w. ?

Althaea L. Eibisch, Wintermalve.I. *Althaeastrum*.

cretica Weinm., cretische, ♂. f. k. Creta.

kurdica Schldl., kurdische, 4. f. Kurdistan.

macrantha Hort. (= ? *taurinensis* H. Erlang.), großblumige, 4. f. ?

meonantha Link, schmalblumige, ♂. f. Griechenland.

multiflora Rehb., vielblumige, 4. f. Südeuropa.

II. *Alcea*.

leucantha Fisch. (= *nudiflora* Lindl.).

III. *Sectio dubia*.

armeniaca Tenore, armenische, ♂. f. Armenien.

speciosa Visiani, prächtige, ♂. f. ?

sylvestris Briganti, wilde, ♂. 4. f. Neapel.

Alyssum T. L., Steinkraut, p. 41.I. *Alyssum* C. A. Mey.

altaicum C. A. Mey. (= *Adysetum altaicum* Sweet.), altaisches, 4. ♀. Altai.

confertum Hort., gedrängtes, ☉. f. ?

filifolium Wahlbg., fadenblättriges, ☉. f. Kleinasien.

gemonense Wulff. (= *medium* Host = *petraeum* Arduin.).

minutum Schldl., niedriges, ☉. f. Sibirien.

parvulum Schrad., kleines, ☉. f. ?

Scovitzianum Fisch. et Mey. (*strictum* C. A. Mey.), Scovitz's, ☉. f. Ararat, Caucasus.

II. *Aurinia*.

obcordatum DC., verkehrtherzförmiges, 4. ♀. f. ?

saxatile L.

III. *Odontarrhena* C. A. Mey.

alpestre L., ♂) *savranicum* Andrzy.

argenteum Vitm.

Marschallianum Andrzy.

microphyllum (C. A. Mey.), (= *alpestre* var. Spach), kleinblättriges, 4. ♀. f. Altai.

murale W. Kit., Mauer-St., 4. ♀. f. Banat, Siebenbürgen.

obovatum Turcsch. (C. A. Mey.), (= ? *sibiricum* W.), verkehrteiförmiges, 4. f. Altai.

obtusifolium Stev. (= *murale* MB., *spathulatum* Adam), stumpfblättriges, 4. ♀. f. Taurien, Sibirien.

tortuosum W. K. (= *alpestre* β) *majus* K. = *serpyllifolium* M. B. = *subalpinum* Pall.), gedrehtes, 4. ♀. f. Ungarn, Taurien.

Wierzbickii Heuff, Roch.

IV. *Psilonema* C. A. Mey.

calycinum L.

dasy carpum Stephan. (= *sibiricum* Trevir.), wollfrüchtiges, ☉. f. Sibirien.

homalocarpum (Fisch. et Mey.), flachfrüchtiges, ☉. ♂. f. k. Steiniges Arabien.

A. canescens DC., v. *Ptilotrichum canescens*.

Hiernach zu berichtigen, p. 41 seq., wo die übrigen verzeichnet sind.

Alyxia Banks, p. 42.

actinophylla Cunningh., strahlenblättrige, ♀. t. Neuholland.

Alyxia

scandens R. et S. (= *Gynopogon scandens* Forst.), klimmende, ♀. Sch. t. Societätsinseln.

A. *Gynopogon* R. Br. = A. Forsteri.

Amalia Rchb. (= *Amalias* Hoffmsg. = *Laelia* Lindl. nec Adans.), (Prinzessin Amalie, Herzogin zu Sachsen, kgl. Hoheit), XX. 1, Orchideae.

acuminata* (= *Laelia acuminata* Hort. belg.), zugespitzte, ♀. w. Mexico.

aurantiaca* (= *Laelia aurantiaca* Lindl.), orangefarbige, ♀. w. Mexico.

flava* (= *Laelia flava* Lindl.), hellgelbe, ♀. w. Brasilien.

fulva* (= *Laelia fulva* Lindl.), rothbraune, ♀. w. Mexico.

furfuracea* (= *Laelia furfuracea* Lindl., Karwinsky), kleiige, ♀. w. Mexico.

Galeottiana* (= *Laelia Galeottiana* ? Lindl.), Galeotti's, ♀. w. Mexico.

gigantea* (= *Laelia gigantea* Hort. Booths.), riesige, ♀. w. Mexico.

majalis* (*Laelia majalis* Lindl. = *Cattleya Grahamei* Lindl.), Maiblühende, ♀. w. Oaxaca.

peduncularis* (= *Laelia peduncularis* Lindl.), gestielte, ♀. w. Guatemala.

purpurea* (= *Laelia purpurea* Hort.), purpurfarbige, ♀. w. Mexico.

rubescens* (Lindl.), röthliche, ♀. w. Mexico.

superbiens* (= *Laelia superbiens* Lindl.), stolze, ♀. w. Guatemala.

albida*, anceps Hoffmsg., autumnalis*, cinnabarina*, grandiflora*, Perrinii* = *Laelia albida*, *anceps*, *autumnalis*, *cinnabarina*, *grandiflora* et *Perrinii* p. 442.

Amalia aeris incola Hort. hisp. = *Tillandsia dianthoides*.

Amaracus Mch., Sträucheldosten, XIV. 1, Labiatae.

Dictamnus Benth. (= *tomentosus* Mch. = *Origanum Dictamnus* L. p. 567).

Tournefortii Benth. (= *Origanum Tournefortii* Ait. p. 567, = *calcaratatum* Juss.).

Amaranthus T., Amaranth (Fuchsschwanz),

altissimus Ridell, höchster, ☉. f. Nordamerika.

Arardhanus Sweet, Arardhan's, ☉. f. Ostindien.

aureus Dietr., goldfarbiger, ☉. f. Nepal.

bahiensis Schrad., Ledeb., Bahia-F., ☉. f. m. Bahia.

miamensis Riddell, miamischer, ☉. f. Nordamerika.

pallidus M. B., bleicher, ☉. f. Taurien.

parisiensis Schkr. (= ? *pachystachys* Rchb.), parisischer, ☉. f. ?

patulus Bertol., absteher, ☉. f. Neapel.

quitensis H. B., Quito-A., ☉. f. Peru.

recurvatus Dsf. (= ? *hybridus* L. var.), zurückgekrümmter, ☉. f. ?

rhombeus R. Br., rautenförmiger, ☉. f. Neuholland.

rigidus Schult., starrer, ☉. f. ?

rubricaulis Page, Hort. anglor., rothstengeliger, ☉. f. m. Ostindien.

spicatus Lam. (= *viridis* All.), ähriger, ☉. f. Südeuropa.

undulatus R. Br., wellenblättriger, ☉. f. Neuholland.

Zweifelhaftere Arten: caesius Dietr., circinnatus Dsf., coracanus Mart., Cururu Tenor., dubius Mart., esculentus H. Patav., Fatine Mart., glomeratus Otto,

Amaranthus

laxifolius Otto, *littoralis* Otto, *luteus* Mart., *macrocaulos* Poir., *monstrosus* Hort., *pendulus* Hort., *purpurascens* Schrad., Otto, *sanguinolentus* Schrad., *tenuiflorus* Fisch., *tortuosus* Hornem., *zanensis* Hornem.

nepalensis Hornem. = ? *Acroglochin chenopodioides*, p. 16.

Amareus agrarius Presl, *badius* Presl, *filiformis* Presl, *patens* Presl, *procumbens* Presl, *Sebastiani* Presl, *spadiceus* Presl, *speciosus* Presl, v. *Trifolium agrarium* etc., p. 818 seq.

Amaryllis L., Amaryllenschwertel.

bahiensis DC., Bahia-A., 4. Zw. w. Bahia.

chilensis L'Her. (= *coccinea* Molina = *linearifolia* Molina), chilesischer, 4. Zw. w. Chili.

fulvovirens Schott (= *calyptrata* Ker var.?), rothbraungrüner, 4. Zw. w. Brasilien.

glaucescens Mart., blaugrünlicher, 4. Zw. w. Brasilien.
hemerocallidiflora Hort. (= ? *hemerocalloides* Broter.), taglilienblumiger, 4. Zw. w. ? Südamerika.

Karwinskyi Zuccar., Karwinsky's, 4. Zw. w. Brasilien.

leonensis van Houtte, Löwen-A., 4. Zw. w. Sierra Leone.

maculata L'Her., gefleckte, 4. Zw. w. Chili.

nivea Schult., schneeweisse, 4. Zw. w. Peru.

Principis Salm Dyck (= *Carolinae* Hort., Monac. et

Nymph. = *striatifolia* Sweet).

pulverulenta Herbert (non Lodd.), bestäubte, 4. Zw. w. Brasilien.

retinervia Sweet, netznervige, 4. Zw. w. Westindien.

vittata Ait., β) *Gravinae* Melazzo, γ) *superba* Hort.

Hybriden:

affinis Sweet (= *canaliculata* Sweet), β) *membranacea* Sweet, γ) *latifida* Sweet, δ) *purpureo-striata* Sweet, *aloides* Hort., *altissima* Hort., *Amaliae* Sterler, *amplexicaulis* Lodd., *anceps* Herb., *angustifolia* Hort., *angusta* Sweet

(= *Johnsoniana-rutila*), *ardens* Herb. (= *crocato-reginae*), *attenuata* Sweet, *angusta* Sweet, *aurantiaca* Herb. (= *Reginae-acuminata*), β) *amabilis* Sweet, γ) *Camillus* Herb.,

δ) *fulva* Sweet, ϵ) *Gustavus* Herb., *Beatum* Herb. (= *Johnsoni-acuminata*), β) *Beatrice* Herb., γ) *crispata* Sweet, δ) *macrantha* Sweet, ϵ) *tricolor* Sweet, ζ) *tricuspis* Sweet, *bella* Herb. (= *Swetii-Carnarvoni*), *Brokesii* Herb. (= *crocato-Johnsonii*), β) *Creusa* Herb., *crocea* Hort. angl., *cruciata* Hort. angl., *discolor* Herb. (= *Johnsonii-tristis*), *Drapiezii* Hort., *elegans* Herb. (= *formosovittata*), *exaltata* Hort., *eximia* Herb. (= *Goweni-Higheleriana*), *expansa* Herb. (= *equestri-florida*), *florida* Herb. (= *fulgido-rutila*), *formosa* Herb. (= *Principis*

s. *striatifolia-reginae*), *Gowenii* Herb. (= *Principis* s. *striatifolia-acuminata*), *Griffini* Herb. (= *psittacino-Johnsonii*), α) *Napoleoniana* Herb., β) *albicincta* Herb., γ) *Alompsa* Herb., δ) *campanulata* Sweet, ϵ) *quadricolor* Sweet, ζ) *quadrilineata* Sweet, η) *retinervia* Sweet, θ) *recurviflora* Sweet, ι) *Victor* Sweet, *Harrisonii* Herb.

(= *Principis* s. *striatifolia-stylosa*), *Haylockii* Herb. (= *solandriflora-acuminata*), *Herberti* Sweet (= *solandriflora-stylosa*), α) *carnella* Sweet, β) *longa* Sweet, δ) *magnifica* Sweet, *Higheleriana* Herb. (= *stylosa-solandriflora*), β) *Domine* Sweet, γ) *picta* Sweet, *Hoodii* Sweet (= *Reginae fulgida*), *Jacobaea* Hort., *inclinata*

Amaryllis

Herb. (= *fulgida-vittata*), *inconstans* Sweet (= *acuminata Johnsonii*), *α*) *basiflora* Sweet, *β*) *breviflora* Sweet, *γ*) *concolor* Sweet, *δ*) *crispiflora* Sweet, *ε*) *delicata* Sweet, *ζ*) *dilecta* Sweet, *η*) *flexuosa* Sweet, *θ*) *fulvocincta* Sweet, *ι*) *glaucescens* Sweet, *κ*) *imperialis* Sweet, *λ*) *lateritia* Sweet, *μ*) *lineolata* Sweet, *ν*) *punctulosa* Sweet, *ξ*) *purpureo-rubens* Sweet, *ο*) *postulosa* Sweet, *π*) *tortuliflora* Sweet, *ρ*) *uniparvula* Sweet, *σ*) *varia* Sweet, *τ*) *venosa* Sweet, *υ*) *veniflora* Sweet, *intermedia* Sweet (= *Reginae-equestris*), *intertexta* Colvill. (= *equestri-reginae*), *inversa* Herb. (= *Johnsoni-vittata*), *β*) *Andromache* Herb., *γ*) *Pluto* Herb., *δ*) *Saturn* Herb., *Johnsonii* Sweet (= *Reginae-vittata*, *brasiliensis* Redout. = *spectabilis* Lodd.), *β*) *barbe blanche* Herb., *γ*) *mater* Herb., *δ*) *pendula* Herb., *ε*) *Ponceaunelta* Herb., *ζ*) *quarta* Herb., *η*) *Scaramouch* Herb., *θ*) *Sorella* Herb., *liturata* Rchb., *lugubris* Herb. (= *stylosa Johnsonii*), *β*) *griselina* Herb., *γ*) *porporina* Herb., *δ*) *sumbrella* Herb., *magnifica* Sweet (= *striatifolia-vittata*), *major* Herb. (= *acuminata-rutila*) *micans* Herb. (= *rutila-crocata*), *minor* Hort. Nymphenb., *multistriata* Sweet (= *psittacino-Valleti*), *mutabilis* Sweet, *nobilis* Herb. (= *acuminata-striatifolia*), *praeclara* Herb. (= *Johnsoni-striatifolia*), *β*) *Colvilliana* Sweet, *γ*) *decora* Sweet, *δ*) *patens* Sweet, *pretiosa* Herb. (= *psittacina-Griffini*), *princeps* Sweet, *pulcherrima* Herb. (= *Sweetii-pulverulenta*), *β*) *Amorosetta* Sweet, *γ*) *Calisto* Sweet, *δ*) *Gratian* Sweet, *ε*) *Salamander* Sweet, *ζ*) *Vezzosa* Sweet, *pumila* Spin., *punctata* Sweet, *quintuplex* Herb. (= *Harrisoni-tristis*), *rigida* Sweet (= *crocato-rutila*), *sanguinea* Herb. (= *rutila-vittata*), *Sideriea* Herb. (= *sanguinea-subbarbata*), *sinistra* Herb. (= *Griffini-vittata*), *sororia* Hort., *speciosa* Hort., *splendens* Herb. (= *rutilo-equestri-vittata*), *β*) *alta* Herb., *γ*) *Bellona* Herb., *δ*) *ignescens* Sweet, *ε*) *Mars*, *ζ*) *Vesta*, *spuria* Sweet (= *acuminata-reginae*), *β*) *carinata* Sweet, *γ*) *sordida* Sweet, *stellata* Herb. (= *subbarbata-sanguinea*), *striatiflora* Sweet (= *acuminata-Sweetii*), *β*) *comobrina* Sweet, *γ*) *diversicolor* Sweet, *sulphurea* Hort., *Sweetii* Herb. (= *striata Johnsonii*), *α*) *affinis* Sweet, *β*) *Annesleyana* Sweet, *γ*) *amoena* Sweet, *δ*) *histriata* Sweet, *ε*) *brevifolia* Colvill., *ζ*) *discolor* Sweet, *η*) *expansa* Sweet, *θ*) *ligulaeflora* Sweet, *ι*) *lineata* Sweet, *κ*) *modesta* Sweet, *λ*) *notha* Sweet, *μ*) *obscura* Colvill., *ν*) *palliiflora* Sweet, *ξ*) *patentissima* Sweet, *ο*) *recurvata* Colvil., *π*) *rugosa* Colvil., *ρ*) *salmonea* Sweet, *σ*) *superba* Sweet, *τ*) *undulaeflora* Sweet, *υ*) *Valleti* Sweet, *φ*) *variegata* Colvil., *ψ*) *versicolor* Sweet, *χ*) *Wellsiana* Colvil., *tabulata* Hort., *tortuosa* Sweet (= *psittacina-equestris*), *triplex* Herb. (= *Goweni-vittata*), *tristis* Herb. (= *Johnsoni stylosa*), *variabilis* Sweet, *variata* Herb. (= *formosa-inversa*), *venosa* Herb. (= *vittata Johnsonii*), *venusta* Herb. (= *fulgida-striatifolia*), *Weldenii* Hort. etc. Darnach zu ergänzen p. 44 seq.

Amberboa Vaill., DC. (*Amberboi* Adans), *Ambraslockenblume*, XIX. III., *Compositae Cynarocephalae*, vergl. p. 175 *Centaurea*.

carthamoides DC. (= *Psephellus carthamoides* Fisch. et Mey.), *safforähnliche*, 4. fr. *Persien*.

crupinoides DC. (= *Centaurea crupinoides* Dsf.).

Amberboa

erucaefolia DC. (= *sinaica* DC. ? = *Volutarella erucaefolia* Cass. = *Centaurea erucaefolia* L.).

Lippii DC. (= *Centaurea Lippii* L., *Volutarella Lippii* Cass.)

moschata DC. (= *Centaurea moschata* L. = *Chryseis moschata* Cass.).

muricata DC. (*Centaurea muricata* L. = *C. pubigera* DC. = *Cyanopsis radiatissima* Cass.).

odorata DC. (= *Centaurea ambracea* Schkr. = *glauca* W. = *C. moschata* β) L. = *suaveolens* W. = *Chryseis odorata* Cass. = *C. glauca* Cass.).

phaeopappa DC. (= *Psephellus phaeopappus* Fisch. et Mey.), braunfederige, 4. fr. Persien.

spectabilis DC. (= *Centaurea Balsamita* Don = *Psephellus spectabilis* Fisch. et Mey.).

suaveolens W. = *odorata*.

Amblachaeium aurantiacum Turcz., v. *Achyrophorus aurantiacus*.

Amblirium album Sweet, *camtschatcense* Sweet, *lanceolatum* Sweet, *pubicum* Sweet = *Fritillaria alba*, *camtschatcensis*, *lanceolata* et *pubica* p. 338 seq.

Ambyglottis flava Blume = *Calanthe bicolor* p. 145.

Ambrina ambrosioides Spach, *anthelmintica* Spach, *chilensis* Spach, *pinnatisecta* Spach = *Chenopodium ambrosioides*, *anthelminticum*, *chilense* et *multifidum*, p. 189.

Ambrosia T., Götterspeise (Traubenkraut).

bipinnata Cervant., Tenor., doppeltgefiederte, \odot . f. ? Mexico.

Ambrosinia Bass. L., Ambrosinie, XXI. ix., Aroideae.

Bassii L. (= *nervosa* Lam.), Bassi's, 4. k. Sardinien, Sicilien, Nordafrika.

velutina Blume (= *maculata* Tenor.), sammthaarige, 4. k. Sardinien, Neapel.

Amelanchier Med., Beermispel.

cretica Lindl. (= *orbicularis* Borkhaus. = *Aronia cretica* P. = *Crataegus cretica* Dsf. = *Pyrus cretica* W.), cretische, \dagger . f. Creta.

intermedia Spach, mittlere, \dagger . f. Nordamerika.

alnifolia Nutt. = *florida*.

canadensis Med. = *Botryapium*, p. 46.

Amellus L., Sternbläuling.

strigosus Less. (= *Aster strigosus* Thbg.), striegeliger, \odot . f. Cap der guten Hoffnung.

Amicia H. B. K.

affinis Hort., ähnelnde, \dagger . Sch. w. t. ? Mexico.

Amirola glandulosa Hook., v. *Llaguoa glandulosa*.

Ammannia Houst., p. 47.

auriculata W., β) *hyrcanica* Fisch. et Mey.

humilis Mchx. (= *catholica* Cham. et Schlttdt. = *occidentalis* DC. = *Peplis occidentalis* Spgl.), β) *ramosior* Mchx. non L.

purpurea Lam. (= *ramosior* Auct. non L. = *latifolia* Hort.), purpurfarbige, \odot . f. Nordamerika.

robusta Heer, starke, \odot . f. Brasilien.

senegalensis Lam., α) *brasiliensis* S'Hil., β) *auriculata* H. Berol., γ) *racemosa* Poir., δ) *auriculata* DC.

stylosa Fisch. et Mey., langgriffelige, \odot . f. Neu-Orleans.

undulata C. A. Mey., wellenförmige, \odot . f. Nubien.

Wormskioldii Fisch. et Mey. (Hort. Berol.), *Wormskiold's*, \odot . f. Brasilien.

Ammi L., Sanddolde.

anethifolium Lam. (= *meoides* P. = *Daucus meoides* Dsf. ? *Daucus crinitus* Dsf.), dillblättrige, 4. f. Orient, Sibirien.†

Broussonetii DC., Broussonet's, ☉. f. ?

crinitum Guss., bemähnte, ♂. f. Calabrien, Sicilien.

glaucifolium L. (= *majus* L. var. ? Sm.), blaugrünblättrige, ♂. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland.

intermedium DC. (= *glaucifolium* Lapeyr.), mittlere, ♂. f. Pyrenäen, Neapel.

rubricaula Hornem., rothstengelige, ☉. f. Nordamerika.

acaule Speg. = *Bunium acaule*, *capillaceum* Mchx.

costatum Ell. = *Discopleura capillacea* et *costata*.

Hiernach zu berichtigen p. 49.

Ammodendron Fisch., Sandstrauch, p. 868.

Eichwaldii Ledeb., Eichwald's, †. f. b. k. Caucasus.

Amomum compactum R. et S. (= *racemosum* Lam. non R. et P.) = *A. Cardamomum*.

Amoria angulata Presl, *caespitosa* Presl, *elegans* Presl, *hybrida* Presl, *Micheliana* Presl, *pallescens* Presl, *repens* Presl, *reflexa* Presl = *Trifolium angulatum* etc., p. 818.

Amorpha L., Uniform.

humilis Tausch, niedrige, †. †. fr. ?

nana Nutt. = *fragrans* Swt.

Amorphophallus Blume, Decaisne, Endl. (= *Candarium* Rehb. = *Pythion* Mart.), Schlangenkraut, XXI. ix., Aroideae.

bulbifer Blume (= *Pythonium bulbiferum* Schott. = *Arum bulbiferum* Roxb., p. 85).

campanulatus Blume (= *Candarium Roxburghii* et *Hookeri* Schott. = *Arum campanulatum* Roxb., p. 85).

dubius Blume (= *Dracontium polyphyllum* Dennst. non L. = ? *Arum polyphyllum* Hort. anglor. Lk. Enum.), zweifelhaftes, 4. w. Ostindien.

giganteus Blume (= *Dracontium paeonifolium* Dennst. = *D. polyphyllum* Houtt.), riesenhaftes, 4. w. Ostindien.

leonensis van Houtte, Löwen-S., 4 w. Sierra Leone.

Ampelopsis Mchx., wilder Wein.

latifolia Tausch, breitblättriger, † Sch. f. ?

Ampelosycios scandens Pet. Thouars = *Joliffia africana*, p. 430.

Ampelogygonum chinense Lindl. et *tinctorium* Lindl. = *Polygonum chinense* et *tinctorium*, p. 643 et 644.

Amphibecis violacea Schrank = *Ampherephis intermedia*, p. 49.

Amphicome Royle, Rundschof, *arguta* Royle, Lindl. (= *Incarvillea arguta* Royle), p. 49.

Emodii Royle et Lindl. (*Incarvillea Emodii* Wall.), Himalaja-R., 4. Sch. f. b. Himalaja.

Amphirapis DC., Amphirapis, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

pubescens DC. (= *Solidago pubescens* Wall. = *Solidago nepalensis* D. Don, p. 770), weichhaarigé. 4. f. Nepal.

Amphithalea Eckl., Zeyh., Amphithalea, XVII. iv. (vi), Leguminosae - Papilionaceae.

ericaefolia Eckl., Zeyh. (= *Priestleya ericaefolia* DC., p. 655).

Amphymenium Rohrii H. B. = *Pterocarpus Rohrii*, p. 664.

Amygdalus T. L., Mandel.frutescens Wender., strauchige, β . fr. ?georgica Dsf. (= *nana* β) *georgica* Sering), georgische, β . f. Georgien.glandulosa Siebold, Pierrot, drüsige, β . f. Japan.*nana* L., β) *biserrata*, γ) *angustifolia*, δ) *latifolia* (= *sibirica* Tausch, Lodd.).*pedunculata* Pall. (= *Pallasii* Turcz.), gestielte, β . f. Sibirien.*pilosa* Turcz., behaarte, β . f. Mongolei.*tomentosula* Hort., wenigfilzige, β . f. ?**Amymis** L., Balsammyrte.*decandra* Brotero, zehnmännige, β . w. Brasilien.*heptaphylla* Roxb. et *punctata* Roxb., v. Clausena*heptaphylla* et *punctata*.**Anacampteros** Sims, Fettblatt.*trigona* DC., dreiseitiges, β . t. Cap der gut. Hoffn.*rotundifolia* Sweet = *telephiastrum* DC.*Anacamptis quadripunctata* Sweet = *Orchis quadripunctata* (= *O. Brancifortii* Biv.), p. 566.**Anacyclus** L., Ringblume.*inflatus* Lehm., aufgeblasene, \odot . f. Sibirien.*radiatus* Loisel., γ) *sulfureus*.*valentinus* L., β) *purpurascens* P.*divaricatus* Cav., Balb. = *clavatus*, *hirsutus* Lam.= *valentinus*, *mucronulatus* Hort. = *tomentosus*.*Anadenia ilicifolia* RBr. et *triternata* Cunningh.,v. *Grevillea ilicifolia* et *triternata*, *Manglesii* Grah.(= *Grevillea Manglessii* Hort., p. 368), v. *Manglesia cuneata*.**Anagallis** T., Gauchheil.*coerulea* Schreb. var. *corolla glanduloso-crenulata* H. Heidelb.Hybriden: *Breweri*, *coccinea*, *coerulea grandiflora*, *elegans*, *grandiflora*, *maxima*, *Parksii*, *Philippsii*, *Rosaliae*.*Anagyris neapolitana* Tenore = ? *A. foetida*, β) *glauca*, p. 52.**Ananassa** sativa Lindl. var. *polystrobila* Hasskarl.*Anandria radiata* Less. = *A. Bellidiastrum*, p. 84.**Anarrhinum** Dsf., Lochschlund.*pubescens* Fresen. (= *Cardiotheca pubescens* Ehb.), weichhaariger, \odot . f. Arabien.*Anaxetum crassifolium* Schott = *Polypodium crassifolium*, p. 645.**Ancathia** DC., Feuerdistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.*igniaria* DC. (= *Onopyxus igniarius* Hort. = *Carthamus igniarius* Pall. = *Cirsium elegans* W. = *igniarium* Spgl.), altaische, 4. f. Altai.**Anchusa** L., Ochsenzunge.*bifida* Hort, zweispaltige, 4. f. ?*officinalis* L., δ) *micrantha* Fisch. et Mey.*zeylanica* Jacq. (= *tenella* Auct. non Hornem. = *Myosotis zeylanica* Jacq.), zeylonische, \odot . f. m. Ceylon.Ungewifs: *dentata* Hort.*saxatilis* Pall., v. *Stenosolenium saxatile*.*sempervirens* L. (= *Omphalodes sempervirens* D. Don, p. 557), v. *Caryolopha sempervirens*.*Ancistrocarpus Schrankii* Ledeb. = *Microtea debilis* *Anda brasiliensis* Radd. (= *Pisonis* Mart.) = *Gomesii* Juss., p. 869.

Andersonia R. B.

aristata Lindl., begrannete, ⚔. t. Neuholland (Schwanenfl.).

gracilis DC., schlanke, ⚔. t. Neuholland.

lanuginosa Cunningh., wollige, ⚔. t. Neuholland.

Andrachne L., Andrachne.

aspera Spgl., rauhe, 4. k. Aegypten.

Andrographis echioides N. E., *paniculata* Wall., v.

Justicia Sect. II. p. 434.

Andromeda L., Andromede.

Drummondii Hort. belg., Drummond's, ⚔. ⚔. k. f. b. Nordamerika.

phillyreaefolia Hook. = *Pieridia*, v. *Pieris phillyreaefolia*.

Watsoniana Steud. (= *salicifolia* Wats.), v. *Lyonia salicifolia*.

Andropogon L., Bartgras.

abyssinicus R. Br., Fres., abyssinisches, 4 k. Abyssinien.

altissimus Hochst., höchstes, 4. k. Abyssinien.

avenaceus Mchx. (= *ciliatus* Ell. = *nutans* Mühlbg.

= *stipoides* H. B. = *Trachypogon stipoides* N. E.),

haferähnliches, 4. f. b. k. Nord- u. Südamerika.

lanceolatus Roxb. (= *Batratherum lanceolatum* N. E.),

lanzettliches, 4. w. Ostindien.

Nardus L. (= ? *citriodorus* Desf.), Narden-B., 4. w. Ostindien.

nutans L., nickendes, 4. f. b. k. Nordamerika, Jamaica.

pertusus W. (= *Holcus pertusus* L.), durchbohrtes, 4. w. Ostindien, Neuholland.

caffrorum Kunth, *cernuus* Roxb., *elongatus* Spgl.,

rubens Kunth, *saccharatus* Roxb., *Sorghum* Brot.,

v. *Sorghum caffrorum*, *cernuum*, *elongatum*, *rubens*,

saccharatum et *vulgare*, p. 883. = *hispidus* W.

(= *virens* Spgl.) = *Arundinella* Mikani.

Androsace T., Mannschild, sect. II.

lanuginosa Wall., Hook., wolliges, 4. k. f. b. Nepal.

β) *glabrior* Wall.

Androsaeum hircinum Spach, *pyramidale* Spach,

Webbianum Spach = *Hypericum hircinum*, *elatum* et *grandifolium*, p. 409 seq.

Androtichum Brogn., Mannhaar, III. r., Cyperaceae.

polycephalum Brogn. (= *Abildgardia polycephala* Brogn.

= *Cyperus prolifer* N. E. = *C. trigynus* Spgl. =

Eriophorum montevidense Lk. p. 309), vielköpfiges,

4. w. Montevideo.

Aneilema RBr., Aneilema.

spirata RBr. (= *Commelyna spirata* L. mant.), wellenblättrige, ☉. f. m. w. Ostindien.

Aneimia Sw., Nacktähe.

cheilanthoides Kaulf., schuppenfarnähnliche, 4 w. Brasilien.

cordifolia Presl, herzblättrige, 4. w. Brasilien, Westindien.

densa Lk. (= *A. Phyllitidis* Sw. var. = *fraxinifolia* Raddi), dichte, 4. w. Brasilien.

Dregeana Kunze, Dregé's, 4. w. ? Südafrika.

hirta Sw., rauhe, 4. w. Westindien.

laciniata Lk., schlitzzwedelige, 4. w. ? Brasilien.

longifolia Raddi var. *undulata* Kunze (= *oblongifolia* Hort. Angl.).

mandiocana Raddi, mandiocaische, 4. w. Brasilien.

media Lk., mittlere, 4. w. ?

Aneimia

Phyllitidis Sw. (= *longifolia laevis* Raddi = *Anemidictyon*).

Raddiana Lk. = *flexuosa* Sw., Zweifelhaf: *coccinea* Hort.

Anemagrostis interrupta Trin., *spica venti* Trin. = *Apera interrupta et spica venti*, p. 68.

Anemarrhena Bunge, Windlilie, VI. 1., Liliaceae-Asphodeleae.

asphodeloides Bunge, affodilähnliche, 4. k. f. b. Nord-China.

Anemone T., Windblume.

multifida Poir. (= *Hudsoniana* Richards.), β) *sanguinea* Pursh.

nemorosa L., a) *alba*, b) *flore pleno*, β) *rubra* (*rosea*), b) *flore pleno*, γ) *coerulea*, δ) *sulphurea* Kunze, Pritzel, ϵ) *biflora* Hoppe, ζ) *parviflora* Schldtl., η) *hirsuta* Wierzb., θ) *semitplena*.

obtusiloba D. Don (= *Govaniana* Wall.).

parviflora Mchx. (= *cuneifolia* Juss. = *cuneata* Schldtl. = *tenella* Banks, Herb. nec Pursh. = *borealis* Richards. = *sylvestris* β) *alba minor* Schrank).

Richardsonii Hook. (= *arctica* Fisch. = *Vahlia* Hornem.). Zweifelhaf: *acanthifolia* Rich.

semperflorens Hort. (= *chinensis et sempervirens* Hort.) = *coronaria*, *uniflora* Pursh = *Thalictrum anemonoides* p. 805, *uralensis* Fisch. = *coerulea*, *versicolor* Salisb. = *hortensis*.

Anethum T. Dill.

cymbocarpum DC., cymbelfrüchtige, \odot . f. Caucasus, Persien.

— *segetum* d'Urville, v. *Ridolfia segetum*.

Angelica L., Angelica.

anomala Lalleu. (= *Peucedanum angelicaefolium* Hort.), abweichende, σ , f. Sibirien.

dura C. Koch, harte, σ . f. Nordarmenien.

laevis Gay., glatte, 4. f. Spanien.

lucida L. (? = *lobata* Walt. = *Imperatoria lucida* Szgl. = *I. verticillaris* Hort.), glänzende, 4. f. Nordamerikā.

atropurpurea L., *sativa* Mill. (= *officinalis* Mch. = *Archangelica* L.) = *Archangelica atropurpurea* et *officinalis*, p. 72.

Angelonia H. B. K., Angelonie, p. 869.

cornigera Hook. (= *ciliata* Gardn.), hörnertragende, \odot . σ . w. Brasilien.

Gardneri Hook. (*Gardneriana*, *grandiflora* Hortul.), Gardner's, 4. h . w. Brasilien.

procumbens Nees, Mart. (= *Physidium procumbens* Schrad. = *Schelveria arguta* Nees), niederliegende, 4. w. Brasilien.

pubescens van Houtte, weichhaarige, 4. h . w. Brasilien.

Angostura Cupare R. et S. = *Galipea trifoliata*, p. 343.

Angraecum A. P. Th. (= *Aërobion* Szgl.), p. 869.

apiculatum Hook., kurzspitziges, 4. w. Sierra Leone.

armeniaceum Lindl., armenisches, 4. w. Sierra Leone.

ashantense Lindl., ashantisches, 4. w. Sierra Leone.

bilobum Lindl., zweilappiges, 4. w. Sierra Leone.

clandestinum Lodd., heimlichblühendes, 4. w. Sierra L.

Angraecum

gladiifolium Pet. Thouars., degenblättriges, 4 w. Mascarenas, Madagascar.

pellucidum Lindl., durchschimmerndes, 4. w. Sierra Leone.

teretifolium Lindl., stielrundblättriges, 4. w. Sierra Leone.

Anguloa R. et P., p. 60.

Clowesii Lindl., Clowes's. 4. w. Columbia.

superba H. B., stolze, 4. w. Peru.

uniflora R. et P., einblumige, 4. w. Columbia.

Anguria L., Birnengurke.

pedatisecta N. E. Mart. (= *Momordica pedata* L.), fußförmiggespaltene, ☉. m. f. w. Peru.

Anhalonium Lem. (= *Ariocarpus* Scheidw.), v. Cacteeae.**Ania** Lindl., Anie, XX. 1., Orchideae.

angustifolia Lindl., schmalblättrige, 4. w. Ostindien.

bicornis Lindl., zweihörnige, 4. w. Ceylon.

latifolia Lindl., breitblättrige, 4. w. Ostindien.

Anigozanthos LaBill., Röhrenschwertel.

glauca Hort. belg., blaugrüner, 4. t. k. Neuholland.

humilis Hort. belg., niedriger, 4. t. k. Neuholland.

pulcherrima Hook., schönster, 4. t. k. Neuholland (Schwanenfluss).

viridis Hort. belg., grüner, 4. t. k. Neuholland.

Anisacanthus quadrifidus N. E. = *Justicia quadrifida*, p. 435.

Aniseja Choisy, Aniseja, V. 1., Convolvulaceae.

biflora Choisy (= *Convolvulus biflorus* L. = *Ipomoea biflora* P.), zweiblumige, ☉. Sch. f. China.

calystegioides Choisy (= *Ipomoea crassipes* Hook.), dickstielige, 4. ♀, Sch. w. Südafrika.

uniflora Choisy (= *Convolvulus Bentira* Hamit. = *C. emarginatus* Vahl, = *C. Rheedii* Wall. = *C. uniflorus* Burm. = *Ipomoea uniflora* R. et S.), einblumige, 4. Sch. w. Ostindien, Java.

Anisochilus carnosus Wall., Benth. (= *Plectranthus carnosus* Sm. = *P. strobiliferus* Roxb. = *crassifolius* Hortul.), β) purpurascens, γ) glaber Schrad.

Anisoderis foetida Cass., *rhoeudifolia* Fisch. et Mey. = *Barkhausia foetida* et *rhoeudifolia*, p. 113.

Anisum officinale Mch. (= *vulgare* G.) = *Tragium Anisum*, p. 814.

Annesorrhiza Chamiss., Schlttdt., Zahlwurz, V. 1., Umbelliferae.

capensis Schlttdl. (= ? *Oenothera interrupta* Thbg., p. 554), capische, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

montana Eckl., Zeyh. (= ? *Oenothera interrupta* Thbg. l. c.), Berg, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

Annesleia falcifolia Salisb. (= *Houstoni* Sweet) et *grandiflora* Sweet = *Inga anomala* et *Houstoni*, p. 416 et 417.

Anoda Cav., Sommermalve.

amplissima Hort. Amstelodam. (var. acerifol. ?), weitästige, ☉. f. ?

cristata Schlttdl. (= *Dilleniana* Cav. = *lavateroides* Medic. = *triloba* Cav. = *Sida cristata* α) L. = *S. Dilleniana* W.), kammförmige, ☉. f. Mexico.

hastata Cav. (= *Dilleniana* Schlttdl. = *Sida cristata* β) L. = *S. hastata* W. = *S. centrata* Spgl. = *acerifolia* Zucc. et *Zuccagnii* Spgl.).

Anoda

pubescens Schtdl., weichhaarige, ☉. f. Mexico.

triangularis DC. (= *Sida deltoidea* Hornem. = *S. suberosa* Hortul. = *S. incarnata* Spgl. = *S. triangularis* W.).

β) *brachyantha* Rchb.

Anoetochilus argenteus Hort. belg., v. *Spiranthes argentea*.

Anogra Douglassiana Spach, *Nuttalliana* Spach = *Oenothera pallida* et *albicaulis*.

Anogramma chaerophylla Lk. et *leptophylla* Lk. = *Gymnogramma chaerophylla* et *leptophylla*, p. 371.

Anomatheca xanthospila Ker = *Waitzia xanthospila* Rchb., p. 855.

Anona L., Flaschenbaum.

squamosa L., schuppiger, ♀. w. Ostindien.

Antelaea G. ? ?

canescens Cels., graugrüne, ♀. k. t. ? ?

Antennaria Leontopodium G. = *Leontopodium alpinum*, p. 453.

Anthemis L., Chamille.

arvensis L., γ) *incrassata* Loisel., δ) *granatensis* Boissi. *chrysoleuca* Gay, goldfarbigweiß, ☉. f. Oran.

suaveolens Schwägr., gutriechende, 4. f. ?

suffruticosa Lehm., halbstrauchige, ♀. f. ?

Ungewifs: *senecioides* Hortul.

Anthericum L. (*Phalangium* Lam.), Zaunlilie.

albucoides Ait. (= *Albuca anthericoides* Sweet = *Ornithogalum albucoides* Thbg. = *Phalangium albucoides* Poir.), weißblumenähnliche, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

scilloides Schult., meerzwiebelähnliche, 4. k. t. Buenos Ayres.

Unbestimmtere: *cernuum* Hornem. 4., *Renarii* Hort., *sibiricum* Hortor. 4.

comosum Stbg. (= *Sternbergianum* Schult. fil.), v. *Chlorophytum Sternbergianum*, *Jacquinianum* Schult. (= *flexifolium* Jacq. non L.), *muricatum* L. suppl. Thbg., v. *Trachyandra Jacquini* etc. *A. blepharophorum* R. et S. (= *ciliatum* Jacq.), *divaricatum* Jacq., *elongatum* W., *falcatum* Thbg., *filiforme* Ait., *flexifolium* L., *floribundum* Ait., *hirsutum* Thbg., *longifolium* Jacq., gehören ebenfalls zur Gattung *Trachyandra*.

Anthocercis LaBill., Strahlenblume, floribunda Hort. belg., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

Anthochlamys Fenzl., Blütenhüllchen, I. II., Aizoideae-Chenopodeae (Oleraceae).

polygaloides Fenzl (= *Corispermum polygaloides* Fisch. et Mey.).

Anthoxanthum L., Ruchgras.

angustifolium Hort., schmalblättriges, 4. f. ?

Carrenianum Parlatore, Careno's, 4. f. Spanien.

Anthriscus P., Klettenkörbel.

Cicutaria Duby (= *humilis* Bess., *sylvestris* Hoffm. var. K. = *Chaerophyllum Cicutaria* Vill.), Wasserschieblingähnlicher, 4. f. Mitteleuropa.

nitens Bernh. (= *Chaerophyllum nitens* Turcz.), schimmernder, 4. f. Rußland.

sylvestris Hoffm, β) *daucifolium* Dsf.

- Anthurium** Schott, Endl. (*Pothos* Auct., p. 653),
Blüthenschwanz.
- acaule Schott (*Pothos acaulis* Jacq. = *P. Scolopendrium* Spgl. = *P. longifolius* H. Berol.).
- amplum Kunth (*Pothos macrophylla* Hort. Berol.), umfangsender, 4. w. ?
- Beyrichianum Kunth, Beyrich's, 4. f. w. Brasilien.
- cartilagineum Kunth (= *P. cartilaginea* Dsf.), knorpelblättriger, 4. w. ?
- caudatum Kunth (= *P. caudata* Hort.), schweifiger, f. Sch. w. ?
- cordifolium Kunth (= *Pothos cordata* W. E. = *macrophylla* Hook. excl. Synon.).
- coriaceum Endl. (= *Pothos coriacea* Grah.), lederartiger, 4. w. Brasilien.
- crassinervium Schott (= *Pothos crassinervia* Jacq.).
β) maximum (= *Pothos maxima* Dsf.).
- digitatum Schott (= *Pothos digitata* Jacq.).
- glaucescens Kunth (= *Pothos glauca* Schott = *reflexa* Hffg.).
- gracile Lindl. (= *Pothos gracilis* Rudge).
- grandifolium Kunth (= *P. grandifolia* Jacq.), großblättriger, 4. w. Caracas.
- Harrisii Endl. (= *P. Harrisii* Grah.).
- Hookeri Kunth (= *P. acaulis* H. Berol. = *P. crassinervia* Hook. = ? *P. acaulis* Lodd.), Hooker's, 4. w. Demerara.
- indecorum Schott (= *P. indecora* Hort.), unzierlicher, 4. w. Brasilien.
- intermedium Kunth, mittlerer, 4. f. w. ?
- lanceolatum Kunth (= *P. lanceolata*).
- leptostachyum Schott (*P. leptostachya* Hort.), schlankähriger, 4. w. Brasilien.
- longifolium Kunth (= *P. longifolia* Hffg. = *P. elongata* H. Berol.).
- lucidum Kunth (*P. lucida* Hort. Berol.), glänzender, 4. f. Brasilien.
- macrophyllum Kunth (= *P. macrophylla* Sw. excl. Synon. Jacq. = *Dracontium cordatum* Aubl.).
- microphyllum Endl. (= *P. microphylla* Hook.).
- obtusifolium Kunth (= *P. obtusifolia* Ait.).
- Olfersianum Kunth (= *P. lucida* H. Berol.), Olfers's, 4. f. w. Brasilien.
- Ottonianum Kunth, Otto's, 4. f. Sch. w. Brasilien.
- palmatum Kunth (= *P. palmata* L.).
- pedatum Endl. (= *P. pedata* H. B. K.).
- pentaphyllum Endl. (= *P. pentaphylla* Curt.).
- rubricaulum Kunth (*P. rubricaulis* H. Berol. = *P. rubescens* Hort.), rothstengeliger, 4. f. w. Brasilien.
- rubrinervium Kunth (= *P. rubrinervia* Lk. = *P. suaveolens* Dsf.), rothnerviger, 4. f. w. Guiana.
- sagittatum Kunth (= *P. sagittata* Sims.).
- Sellowianum Kunth, Sellow's, 4. w. Brasilien.
- subsagittatum Kunth (= *P. subsagittata* H. B. K.), wenigpfeilblättriger, 4. w. Neu-Andalusien.
- trinervium Kunth, dreinerviger, 4. w. Brasilien.
- undulatum Schott (= *P. undatus* H. Berol.), wellenblättriger, 4. w. Brasilien.
- variabile Kunth (= *P. enneaphylla* et *heptaphylla* Flor. Flumin. ?) veränderlicher, 4. f. Sch. w. Brasilien.

Anthurium

- violaceum Schott, *a*) latifolium (= *P. violacea* Sw.),
β) angustifolium (= *P. leucocarpa* H. Berol.).
 Willdenowii Kunth (= *P. lanceolata* W.), Willdenow's,
 4. w. ?

Anthyllis L., Wollblume.

- macrocarpa Wender. (? var. *A. Vulnerar.*), großfrüchtige,
 4. f. ?
 quadricolor Hort. belg., vierfarbige, 4. f. ?
 Weldeniana Rehb., Welden's, ♂. f. Dalmatien.
rustica Mill. = *Vulneraria*.

Anticlea Kunth (*Anticlea*, Mutter des Ulysses), VI. III.,
Colchicaceae (*Melanthaceae*), (*Juncaceae*, *b*) *Veratreae* Rehb.).

- glauca Kunth (= *Zygadenus glaucus* Nutt. = *glaberrimus* H. Berol. = *commutatus* R. et S. = *Helonias glaberrima* Sims excl. Synon.), blaugrüne, 4. f. b. k. Nordamerika.
 sibirica Kunth (= *Melanthium sibiricum* L. p. 506 = *Leimanthium sibiricum* R. et S. = *Zygadenus sibiricus* Endl.).

Antidesma L.

- Bunius Spgl. (*A. alexiteria* var. Auct. = *A. Stilago* Poir. = *Stilago Bunius* L.), dreimännige, 5. w. Amboina.

Antirrhinum T., Löwenmaul.

- angustifolium Poir. (= *jamaicense* Fisch.), schmalblättriges, ☉. 5. m. f. k. Jamaica.
 majus L., var. quadricolor Paxton, var. ? eximium Hort. ryditospermum Fisch. et Mey. (= *ryditocarpum* G. Don), grubigsamiges, ☉. f. Sibirien. (Zu berichtigen p. 869).
Anurus Nissolia E. Mey. (*linifolius* Presl.) = *Lathyrus Nissolia*, p. 448.

Aotus Sm., Haarkelch.

- cordifolia Benth., herzblättriger, 5. t. Neuholland.
 ferruginea LaBill. (*villosa β* DC.), rostfarbiger, 5. t. Neuholland.
 gracillima Meisn., schlankster, 5. t. Schwanenfluss.
 lanigera Cunningh., wolliger, 5. t. Neuholland.
 villosa Sm. (= *Pultenaea ericoides* Vent. = *rosmarinifolia* Sieb.), zottiger, 5. Neuholland.

Aphelandra RBr., Aphelandra.

- aurantiaca Lindl. (= *ignea* N. E. = *Hemisandra aurantiaca* Hort.), orangefarbige, 5. w. Mexico.
Apium chilense Hort. Par. v. *Wydleria chilensis*.
Aplectrum hyemale Sweet = *Corallorrhiza hyemalis*.
Apollonias canariensis N. E. = *Laurus canariensis*, p. 449.

Apteranthes Mik., Flügellosblümchen, V. II., *Asclepiadeae*.

- Gussoneana Mik. (= *Stapelia Gussoneana* Jacq. fil. p. 782 = *europaea* Guss. = *Piarranthus Gussoneanus* G. Don).

Aptosimum Burchel, Aptosimie, XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

- depressum Burch., niedergedrückte, 5. k. t. Südafrika.
 procumbens Burch. (= *Oklendorfia procumbens* Lehm.), niederliegende, 5. k. t. Südafrika.

Aquilegia T., Akelei.

- glandulosa Fisch., var. major, gigantea, rubra Hort.

Aquilegia

- glauca* Lindl., blaugrüne, 4. k. f. b. Himalaya.
sinensis van Houtte, chinesische, 4. k. f. b. China.
Skinneri Hook., Skinner's, 4. f. Nordamerika.
 Gartenvarietäten: *non plus ultra*, *pulcherrima*.
hybrida Sims = *bicolor* Ehrh.

Arabis L., Gänsekraut.

- colorata* Tausch, farbiges, ? 4. f. ?
declinata Schrd. (? *Turritis* *Grahami* Lehm.), niedergebogenes, ♂. 4. f. Nordamerika.
fruticulosa C. A. Mey, strauchiges, 4. ♀. f. Altai.
heteromalla Schrad., verschiedenwendiges, ♂. f. Nördlichstes Amerika.
incana Roth non W. (= *minor* H. Berol.), weißgraues, ♂. f. Schweiz, Frankreich.
Ludoviciana Fisch. et Mey. (= *Cardamine* *Ludoviciana* Hook. = *Cardamine* *Engelmanniana* H. Berol. = *Sisymbrium* *Ludovicianum* Nutt.), Ludovicisches, ♂. f. Neu-Orleans.
sibirica Hort. angl., sibirisches, 4. f. Sibirien.
Sieberi Tausch (= *stricta* Sieb.), Sieber's, ♂. 4. f. Oesterreichische Alpen.
sudetica Tausch (= *ciliata* Tausch), Riesengebirgs-G., 4. f. Sudeten.

Marshalliana Hort. = *hirsuta*, *Thaliana* L. = *Sisymbrium* *Thalianum*, p. 762.

- Arachnites alpina* Schun. = *Chamaerepes* (*Chamaeris*) *alpina*, p. 187, *antropophora* Schm. = *Aceras anthorpophora*, p. 9, *fuciflora* et *musciflora* Schmidt = *Ophrys arachnites* et *myodes*, p. 562, *Monorchis* Hoffm. = *Herminium* *Monorchis*, p. 392.
Arachnopogon heterospermum Hort. = *Hypochaeris* *Salzmanniana*, p. 880.

Aralia L., Aralie, Bergangelika.

- ciliata* van Houtte, gewimperte, ♀. w. ? Ostindien.
crassifolia Soland., Hook. (= *heterophylla* Soland.), dickblättrige, ♀. t. k. Neuzeeland.
Hügelii Hort., Hügel's, ♀. t. k. Neuholland.
insignis Hort., ausgezeichnete, ♀. t. k. ?
longifolia Reinwardt (= *Paratropia longifolia* DC. = *Sciadophyllum longifolium* Blume), langblättrige, ♀. w. Java.
pinnata Hort. belg., gefiederte, ♀. w. ? Ostindien.
Schefflera Sogl. (= *Schefflera digitata* Forst.), Scheffler's ♀. t. k. Neuzeeland.
trifoliata Meyen, dreiblättrige, ♀. k. t. China.
 ? *chinensis* L., *cordata* Thbg., *japonica* Thbg., v. *Dimorphanthus elatus*, *edulis* et *japonicus*.

Araucaria Juss., Schmucktanne.

- Bidwilli* Hook.¹⁾, Bidwill's, ♀. t. k. Moreton Bai in Australien.
gracilis Mack. Catal., schlanke, ♀. t. k. ?

Dombeyi Rich. = *imbricata*.

- glauca* Mack. Catal. = ? *Cunnighamia lanceolata* *glauca*.

Arauja Broter., Arauja, V. II., Asclepiadeae.

- albens* G. Don (= *Physianthus albens* Mart., p. 621).
sericifera, Seidetragende. ♀. w. Peru.

1) Banza-tanza oder Banyatunya der Eingebornen, 1843 von Bidwill in England eingeführt.

Arbutus T., Erdbeerbaum.

Andrachne L., β) lucida Hort., γ) serratifolia Hort., δ) with large oblong fruit Hort. angl., ϵ) with large compressed fruit Hort. angl.

cassinifolia Hort. angl., Cassineblättriger, f. k. t. Madeira.
chinensis Hort. belg., chinesischer, f. k. t. China.

farinosa van Houtte, mehlig, f. k. t. ?

procera Dougl. (non Soland.), hoher, f. k. Nordamerika.

punctata Hook., Arn., punktirter, f. k. Californien.

turbinata P. (= *andrachnoides* Lk. = *hybrida* Ker = *serratifolia* Lodd.), aufgetriebener, f. k. Südeuropa.

β) *Milleri* Sweet.

arguta Zucc. = *Arctostaphylos arguta*, *Cunningii* Hort. = *Pernettya Cumingii*, *discolor* Hook. (= *nitida* Hort.) = *Arctostaphylos discolor*.

Arceuthobium Oxycedri MB. = *Viscum Oxycedri*, p. 852.

Archangelica officinalis Hoffm., α) sativa, β) discocarpa γ) decurrens Lalle. (Ledeb.).

Die letztere von Ledebour als eigne Art aufgenommen, ist im altaischen Sibirien heimisch. Vergl. p. 72.

Archemora DC., Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

rigida DC. (= *Oenanthe rigida* Nutt. = *Oxypolis rigida* Rafin. = *Pastinaca rigida* Spgl. p. 591 = *Sison marginatum* Mehx. = *Sium rigidius* L.), starre, 4. Wa. f. Nordamerika.

tricuspidata DC. (= *Oxypolis tricuspidata* Rafin. = *Sium rigidius* Walt. non L. = *Sium tricuspidatum* Ell.), dreispitzige, 4. Wa. f. Carolina.

Arctogeron DC., Bärling, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

gramineum DC. (= *Erigeron gramineus* L., p. 308).

Arctostaphylos Adans., Bärentraube.

arguta Zuccar. (= *Comarostaphylis arguta* Zuccar.), spitzzähne, f. k. t. Mexico.

discolor DC., verschiedenfarbige, f. k. t. Mexico.

nitida Benth., glänzende, f. k. t. Mexico.

pungens H. B. K. (tomentosa β Lindl.), stechende, f. k. t. Mexico.

*pilosa** p. 73 = *Pernettya pilosa*, p. 608.

Arctotheca Wendl., Bärenbüchse.

hirta Schrad, kurzhaarige, 4. k. Cap der g. Hoffn.

Arctotis L., Bärenohr.

flammea Jacq. fil., feuerfarbiges, f. k. t. Cap d. g. H.

grandiflora Jacq. (= *laevis* Thbg. var.), großblumiges, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

maculata Jacq. (= *arborescens* W. = *aspera* DC. ϵ = *scabra* Berg.), geflecktes, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Massoniana Spr. (= *grandiflora* Spgl.), Masson's, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pusilla DC., niedrigstes, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

speciosa Jacq. (*acaulis* L. δ DC. = *breviscapa* Thbg. = ? *grandiflora* Ait. non Jacq.), prächtiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Jacq. (= *laevis* Thbg. var. Less. DC.), sparriges, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

tricolor Jacq. (= *acaulis* β DC.), dreifarbiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

undulata Jacq. (= *acaulis* γ DC. = *lanata* Thbg.), wellenblättriges, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

nodosa Thbg. = *Chrysanthemum nodosum*.

Arcyphyllum erectum Nutt. et *simplicifolium* Ell.)

= *Rhynchosia erecta* et *reniformis*, p. 688.

Ardisia Sw., Spitzblume.

anceps Wall., zweischneidige, ⚭. w. Silhet.

attenuata Wall. (= *alternata* DC.), verdünnte, ⚭. w. Ostindien.

crispa A. DC. (= *Bladhia crispa* Thbg. = *Ard. crenulata* Lodd. non Vent. = *crenata* Bot. mag. = *lentiginosa* Ker = *glandulosa* Blume), krause, ⚭. w. Japan, China, Ostindien.

β) *elegans* Andr. (= *A. crenata* Roxb. Wall.).

glabra A. DC. (= *Bladhia glabra* Thbg.), kahle, ⚭. t. Japan.

humilis Vahl (= *solanacea* Roxb. = *littoralis* Andr. = *A. Doma* Wall. = *oleracea* Wall. = *umbellata* Roxb. Lodd. = *Anguillaria solanacea* Poir. = *zeylanica* G.), β) *solanacea* Wall., γ) *grandiflora* Wall., δ) *Wightiana* Wall.

japonica Hornst. (= *Bladhia japonica* Thbg.), japanische, ⚭. t. Japan.

β) *Belgorum* A. DC. (*japonica* Morr., et *Decaisne, odontophylla* Lindl. non Wall.).

mexicana van Houtte, mexicanische, ⚭. t. Mexico.

pentagona DC. (= *quinqueгона* Blume), fünfkantige, ⚭. w. Java, China.

racemosa Spgl., traubige, ⚭. w. Brasilien.

speciosa Blume, prächtige, ⚭. ⚭. w. Java.

latifolia R. et S. v. *Badula Lamarckiana* = *Lindleyana* Dietr. = *punctata*.

Arduina bispinosa L. mant. = *Carissa Arduina, bispinosa* Lodd., Hortul. = *Carissa ferox*.

Areca L., Arecapalme.

alba Bory, weiße, ⚭. w. Mascarenas.

aurea Makoy Catal., goldfarbige, ⚭. w. ?

Dicksonii Makoy Catal., Dickson's, ⚭. w. ?

madagascariensis Mart., madagascarische, ⚭. w. Madagascar.

Nenga Blume, Nenga-A., ⚭. w. Java.

pumila Blume, kleine, ⚭. w. Java.

sapida Forst., Soland., wohlschmeckende, ⚭. w. Neuzeeland.

lutescens Bory = *Hyophorbe indica*.

Arenaria L., Sandmiere.

gothica Fr. (= *ciliata* β *Wahlbg.*), gothische 4. f. Schweden.

tenuiflora Schrad., dünnblumige, ☉. f. ?

cephalotes MB., *procera* Spgl. = *Eremogone cephalotes* et *E. procera, muralis* Sieber = *Stellaria muralis*, p. 786.

Arenga saccharifera LaBill. (= *Gomutus saccharifer* Spgl. p. 364 = *G. Rumphii* Correa = *Borrassus Gomutus* Lour. = *Saguerus Rumphii* Roxb. = *Saguerus Gomuto* Houtt.).

Argemone T., Stachelmohn.

mexicana L., β) *floribus ochroleucis* (= ? *ochroleuca* Sweet), γ) *flor. albis* (= *alba* Rafin = ? *albiflora* Hornem.).

rosea Hook., rosafarbiger, ☉. f. Chili.

Argyrea Lour., Silberwinde.

argentea Arn. Choisy (= *Convolvulus argenteus* Wall.

Argyreia

- = *Lettsomia argentea* Roxb.), wahre, f. Sch. w. Ostindien.
- capitata Arn. Chois. (= *Convolvulus capitatus* Vahl = *Convolvulus strigosus* Roxb. = *Ipomoea capitata* R. et S. p. 410 = *Lettsomia strigosa* Roxb.).
- cuneata Ker (= *Convolvulus cuneatus* W. = *Lettsomia cuneata* Roxb. = *Ipomoea atrosanguinea* Sims).
- elliptica Arn. Chois. (= *Convolvulus ellipticus* Heyne, Roth = *C. laurifolius* Roxb. = *C. peduncularis* Wall. = *Ipomoea elliptica* Roth = *I. laurifolia* Sweet, p. 419), elliptische, f. Sch. w. Ostindien.
- Guichenotii Chois. (= *Convolvulus Reinwardtianus* Dietr. = *Ipomoea asclepiadea* Chois. = *I. pulchra* et *Reinwardtiana* Blum.), Guichenot's, f. Sch. w. Java, Timor.
- malabarica Arn. Chois. (= *Convolvulus malabaricus* L. = *Ipomoea malabarica* R. et S., p. 420).
- mollis Chois. (= ? *Convolvulus gracilis* Salisb. = *C. mollis* Burm. = *C. sericeus* L. mant. = *Ipomoea sericea* Blume = *Lettsomia hispida* Hook.), weiche f. Sch. w. Ostindien.
- pomacea Chois. (= *Convolvulus Choisyanus* Wall. = *C. Rottleri* Speg. = *Ipomoea zeylanica* G. = *Lettsomia pomacea* et *strigosa* Roxb.).
- Roxburghii Arn. Chois. (= *Convolvulus Roxburghii* Wall. = *Ipomoea amoena* Blume = *multiflora* Roxb. = *Roxburghii* Sweet, p. 420).
- setosa Arn. Chois. (= *Convolvulus confertus* H. Hamb. = *C. setosus* Roxb. = *C. strigosus* Speg. = *Ipomoea strigosa* Roth, p. 421 = *Lettsomia setosa* Roxb.), borstige, f. Sch. w. Ostindien.
- speciosa Sweet (= *Convolvulus nervosus* Burm. = *C. speciosus* L. fil. = *Ipomoea speciosa* P. = *Lettsomia nervosa* Roxb.).
- splendens Sweet (= *Convolvulus splendens* Hornem. = *Lettsomia splendens* Roxb. = *Ipomoea splendens* Bot. mag.).
- bona nox* Sweet, *ornata* Sweet, *uniflora* Sweet, v. Rivea bona nox, R. ornata et R. hypocrateriformis. *Argyrocome ferruginea* Schrk. et *Stachelina* Schrk. = *Helipterum speciosissimum* et *ferrugineum*.
- Argyrolobium** Eckl. Zeyh., Silberblatt, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Papilionaceae.
- argenteum Eckl. et Zeyh. (= *Crotalaria argentea* Jacq. p. 234).
- gracile Fenzl, schlankes, f. k. Aleppo.
- Linnaeanum Walp. (= *Cajanus argenteus* Speg. = *Genista argentea* Noulet = *Chasmone argentea* E. Mey. = *Cytisus argenteus*, L. p. 248).
- Andrewsianum* Steud., *calycinum* Jaub. et Spach, v. *Trichasma ciliatum* et *calycinum*.
- Aria Hostii* Jacq. fil. et *A. nivea* Hort. = *Sorbus scandiaca* Fr. var. et *Sorbus Aria*, p. 773.
- Ariocarpus* Scheidw., v. Cacteeae, p. 872.
- Arisaema** Mart., Schott, Arisaema, XXI. IX., Aroideae.
- atrorubens Blume (= *Arum atrorubens* Ait., p. 85 = *Arum triphyllum* L. = *A. triphyllum* var. *Zebrianum* Bot. mag., p. 86).
- Boscii Blume (= *Arum Dracontium* Bosc non L.), Bosc's, 4. f. Nordamerika.

Arisaema

- brasilianum Blume (= *Arum triphyllum* L. spec.), brasilianisches, 4. w. Brasilien.
 costatum Mart. (= *Arum costatum* Wall., p. 87).
 Dracontium Schott (= *Arum Dracontium* L., p. 85).
 filiforme Blume, (= *Arum filiforme* Reinwardt, p. 85), 4. w. Java.
 nepenthoides Mart. (= *Arum nepenthoides* Wall. p. 85).
 pentaphyllum Schott (= *Arum pentaphyllum* L., p. 86).
 ringens Schott (= *Arum ringens* Thbg., p. 86).
 speciosum Mart. (= *Arum speciosum* Wall., p. 86).

Arisarum T., Kugelwurz.

- proboscideum Schott (= *Arum proboscideum* L., p. 86).
 vulgare Targion., Tozzetti (= *australe* Rich.).

Aristea Soland., Borstenlilie.

- dichotoma A. Dietr. (= *Moraea dichotoma* Thbg.), zweizinkige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 melaleuca Ker (= *lugens* Hort. = *Moraea lugens* L., *M. melaleuca* Thbg.).

- repens A. Dietr. (= *Moraea repens* Schrk.), kriechende 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

- spathacea Spgl. (= *Bobartia juncea* Salisb. = *Moraea spathacea* Thbg.), scheidige, 4. k. t. Cap d. g. H.

- umbellata Spgl. (= *Moraea umbellata* Thbg. = *M. corniculata* Lam.), doldige, 4. k. t. Cap d. g. H.

Aristida coerulescens Dsf. (= *canariensis* W. = *gigantea* Hort. = *nutans* Hort. Berol. = *setacea* Hort.).**Aristolochia** T., Osterluzei.

- arkansana Lodd. (= *Arkansa*, p. 78).

- Bonplandii Tenore, Bonpland's, 4. Sch. w. Buenos Ayres.

- Gigas Hartw. et Skinner, riesenblumige, 5. Sch. w. Guatemala.

- hyperborea Paxt., Sweet, nördliche, 5. Sch. w. t. Ostindien.

- Kämpferi W., Kämpfer's, 5. Sch. k. t. Japan.

- ornithocephala Hook. (= ? *brasiliensis* Mart. = *ringens* Lk. et Otto), vogelköpfige, 5. Sch. w. Brasilien.

- Ottonis Hort., Otto's, 5. Sch. w. ? Südamerika.

- pedatinervia Brotero, fußförmignervige, 5. Sch. w. ? Südamerika.

Armeria W., Grasnelke.

- alpina W., b) alba.

- Oran H. Hafn. (= *Statice Oran* H. Par.), afrikanische, 4. f. b. k. Nordafrika.

- splendens Webb (= *Statice splendens* Lagasc.), schimmernde, 4. f. b. k. Spanien.

- ? Gartenhybriden: *formosa*, *intermedia*, *superba*, ? = *arborescens* Hort. = *fasciculata*.

Arnebia Forsk., Arnebie, V. r., Asperifoliaceae.

- cornuta Fisch. et Mey., gehörnte, ☉. f. Sibirien.

- guttata Bunge, betropfte, ☉. f. Sibirien.

Aronicum Doronicum Rehb. (= *Clusii* K.), β) longi-

- folium Rehb., γ) Bauhini Rehb. (= *scorpioides* δ DC.),

- δ) glaciale Rehb. (*scorpioides* γ DC.), vergl. p. 80.

- Arpitium simplex* G. Don = *Gaya simplex*.

Arpophyllum La Llave, Sichelblatt.

- coccineum Hort. belg., scharlachfarbiges, 4. w. ? Mexico

Arracacha Bancroft.

- moschata DC. (= *Conium moschatum* H. B. K., p. 214).

- xanthorrhiza* Bancroft (= *esculenta*, p. 80).

- Arrudea** Cambess., St. Hil., Arrudea, ? XIII. I., Gut-tiferae.
clusioides St. Hil., Clusiaähnliche, f. w. Brasilien.
- Arthrolobium** Desv. (= *Astrolobium* Auct. = *Ornithopus* II. p. 570), Gelenkhülschen XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
durum DC. (= *Ornithopus durus* Cav.).
ebracteatum DC. (= *Ornithopus ebracteatus* Brot.).
repandum DC. (= *Ornithopus repandus* Poir.).
scorpioides DC. (= *Ornithopus scorpioides* L.).
- Arthropodium** RBr., Gliederlilie.
Lindleyi Kunth (= *minus* Lindl. excl. syn.), Lindley's, 4. t. k. Neuholland.
fimbriatum RBr., v. *Dichopogon setosus*.
- Arthrostemma** Pav., Gliederfaden.
Humboldtianum Kunth et Bouché, Humboldt's, f. w. Caracas.
paniculatum D. Don, v. *Oxyspora paniculata*.
- Artocarpus** Forst., Brodfruchtbaum.
longifolia Hort., Cels., langblättriger, f. w. ? Ostindien.
Locucha Roxb., Locucha-B., f. w. Ostindien.
parvifolia Voigt, kleinblättriger, f. w. ? ?
pubescens W. (= *hirsuta* Lam.), weichhaariger, f. w. Ostindien.
rigida Blume, Sieboldt, starrer, w. Java.
- Arum** T. L., Schott, Kunth, Endl., Zehrwurz.
Dioscoridis Sibth., Sm., Dioscorides-Z., 4. f. b. k. Kleinasien.
italicum Mill., L., β) *immaculatum*.
orientale M. B.
pictum L. suppl. (= *corsicum* Loisel. = *balearicum* Buchoz.).
Rauwolfii Blume, (= *intortum* Russel), Rauwolf's, 4. k. Aleppo.
syriacum Blume non Spgl.
vulgare Lam. (= *maculatum* L. = *pyrenaeum* Lapeyr.), β) *maculatum*, γ) *albo-venosum*.
A. Arisarum L. et *proboscideum* L. = *Arisarum vulgare* et *proboscideum*, *A. atrorubens* Ait. (= *triphylum* L.), *costatum* Mart., *Dracontium* L. etc. = *Arisaema atrorubens costatum* *Dracontium* etc., *arborescens* L., *grandifolium* Jacq., *hederaceum* L., *lacerum* Jacq., *pinnatifidum* Jacq., *punctatum* Dsf., *tripartitum* Jacq. = *Philodendron arborescens*, *grandifolium* etc., *A. auritum* L. (= *Caladium auritum* Vent.), = *Syngonium auritum*, *A. bicolor* Ait. et *pellucidum* Fulchir. et *pictum* Fulchir. = *Caladium bicolor* cum var., *A. colocasioides* Dsf. = *Caladium colocasioides*, *A. bulbiferum* Roxb. (= *spectabile* Zippl.), *campanulatum* Roxb. = *Amorphophallus bulbifer* et *campanulatus*, *A. clavatum* Dsf. (= *pedatum* W. E.), *guttatum* Wall. *sessiliflorum* Roxb., *venosum* Ait. = *Sauromatum pedatum*, *guttatum*, etc., *A. Colocasia* L., *cordifolium* Bory, Dsf., *cucullatum* Lour., *esculentum* L. (= *Caladium esculentum* Vent.), *indicum* Lour., *macrorrhizum* L., *nymphaefolium* Roxb. (= *Caladium nymph.* Vent., p. 143), *odoratum* Roxb. (= *Caladium odor.* Bot. reg.) = *Colocasia antiquorum*, C. Boryi, *cucullata* etc., *A. crinitum* Ait. (= mus-

Arum

civorum L. suppl.) et *Dracunculus* L. = *Dracunculus crinitus* et *vulgaris*, *A. cuspidatum* Blume, *divaricatum* L. (= *orixense* RBr.), *flagelliforme* Lodd., *minutum* W. (= *mucronatum* Spgl.), *orixense* Roxb. (= *trilobatum* L. spec.) = *Typhonium cuspidatum*, *divaricatum*, *flagelliforme*, *minutum* et *trilobatum*, *A. gramineum* Lam. et *tenuifolium* L. = *Biarum gramineum* et *tenuifolium*, *integrifolium* Hort. anglor. Lk. = *Aglaonema simplex*, *lingulatum* L. et ? *cannaefolium* L. suppl. = *Monstera linguata* et *cannaefolia*, *ovatum* L. (= *Caladium ovatum* Vent.) et *spirale* Retz = *Cryptocoryne ovata* et *spiralis*, *A. sagittifolium* Hort. angl., Lk. = *Aconitias hastifolius*, *A. sagittifolium* L. (= *Caladium sagittif.* Vent.) et *xanthorrhizon* Jacq. (= *Caladium xanthorrh.* W.) = *Xanthosoma sagittifolium* et *Jacquini*, *A. sequinum* L. (= *Caladium seg.* Vent.) = *Dieffenbachia Seguine*, *A. ternatum* Thbg. (= *atrorubens* Spgl. = *fornicatum* Roth = *subulatum* Dsf. = *triphyllum* Houtt.) = *Atherurus ternatus*, *virginicum* L. (= *Caladium virginicum* Hook.) = *Peltandra virginica*, *A. viviparum* Roxb. (= *Caladium viviparum* N. E.) = *Remusatia vivipara*.

Zu welchen Gattungen nachstehende gehören, ist ungewiss, als: *betaefolium* Mill., Nordamerika, *discolor* Voigt, *haematophyllum*, *marginatum*, *palmatum* Lodd., *polyphyllum* Hort. anglor. Lk., *ramosum* Lk., *ventricosum* Hffg.

Arundina Lindl., Blume, Rohrstendel.

chinensis Blume, chinesischer, 4. w. China.

densa Hort. belg., dichter, 4. w. ? Java

Arundinaria glaucescens P. Beauv. et *macrosperma* Mcbx. = *Ludolfia glaucescens* et *macrosperma*, p. 479.

Arundinella Raddi, Rohrmiligras, III. II., Gramineae.

Acratherum N. E. (= ? *Acratherum miliaceum* Lk., p. 16), ostindisches, 4. w. Ostindien.

Mikani N. E. (= *brasiliensis* Raddi = *Aira brasiliensis* Spgl. = *Ischaemum hispidum* H. B. K.), Mikani's (brasilianisches), 4. w. Brasilien, Neuandalusien.

nepalensis Trin. (= *Acratherum miliaceum* Lk., p. 16, = *Orthopogon agrostoides* Trevir. hort. Wratisl.), nepalsches, 4. w. Nepal.

Arundo altissima Benth. = *Phragmites communis*, var. p. 618.

Asagraea caricifolia Kunth et *officinalis* Lindl. = *Schoenocaulon caricifolium* et *officinale*.

Asarca Lindl., Magerstendel, XX. I., Orchideae.

aurantiaca Lindl., orangenfarbiger, 4. w. Chili.

speciosa Lindl. (= *Serapias Gavila* Pav.), prächtiger, 4. w. Chili.

Asarum T., Haselwurz.

virginicum L. (non Thbg.), virginische, 4. f. Nordamerika.

virginicum Thbg. (= *japonicum* Hort.) = *Heterotropa asaroides*, p. 394.

Ascaridia triplinervia G. Don = *Polypappus triplinervis*.

Ascium anomalum Spgl. et *Aubletii* Spgl. (= *violaceum*) Vahl = *Norantea brasiliensis* et *guianensis*, p. 550.

Asclepias T. L., Schwalbenwurz.

acuminata Pursh (= *cordata* Walt. = *laurifolia* Auct. non Mchx. = *periplocaefolia* Nutt.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

consanguinea Kunze (= *obtusifolia* H. Prag. non Mchx.), verwandte, 4. f. Nordamerika.

Cornuti Decaisne (= *syriaca* L.), Cornut's, 4. f. Nordamerika.

cubensis Wender., cubaische, 5. w. Cuba.

Greeniana Nutt., Green's, 4. f. Nordamerika.

Michauxii Decaisne (= *angustifolia* Ell.), Michaux's, 4. f. Nordamerika.

princeps Bartl., fürstliche, 4. f. Nordamerika.

verticillata L., α) *galioides* H. B. K., β) *linifolia* Kunth (= *virgata* Lagasc., Sweet = *mexicana* Cav. = *parviflora* Lecont. = *angustifolia* H. Berol.).

americana Hort. = *variegata*.

Aspalathus L. Witschen.

pineus Thbg. (= ? *uniflorus* Thbg.), kiefernähnlicher, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

laricifolius Berg. = *laricinus*.

Asparagus T., Spargel.

caspius Hort, Vindob., caspischer, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

officinalis L., β) *maritimus* Sm.

trichophyllus Bong. et C. A. Mey. (= *A. neglectus* Kar. et Kir.), haarblättriger, 4. f. Asiatisches Rußland.

Asperula L., Waldmeister.

canescens Visian., graulicher, 4. f. Dalmatien.

ciliata Rochel, gewimperter, 4. f. Banat.

littoralis Sibth., Sm., Strand-W., 4. f. Türkei.

suavis Fisch., Mey. et Lallemand., feinrichender, 4. f. Natolien.

trichodes Gay, haarähnlicher, 6. f. Persien.

tyraica Bess. (= *galioides* MB. var. Lang), tyraischer, 4. f. Volhynien.

glauca Bess. = *galioides*.

Asphodeline Rchb., Asphodeline, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

capillaris Endl., Kunth (= *Asphodelus capillaris* Redout. = *Asphodelus luteus* var. *angustifolia* Ker), haarförmige, 4. f. ?

cretica Visiani Endl. (= *Asphodelus creticus* Lam.).

β) *liburnica* Rchb. (= *Asphod. liburnicus* Scop.).

lutea Rchb. (= *Asphodelus luteus* L.).

prolifera Kunth (= *Asphodelus prolifer* M. B. = *Anthericum dendroides*, Stev., Fisch.), sprossende, 6. f. Iberien, Armenien.

taurica Endl., Kunth (= *Asphod. tauricus* MB.).

Asphodelus T., Affodillie.

asiaticus Haw., asiatische, 4. k. f. b. ? Asien.

intermedius Hornem. (= ? *aestivus* Auct. ? *canariensis* Smith), 4. k. Canarische Inseln.

ramosus L., b) *flore pleno*.

regius Hort. = ? *Eremurus spectabilis*.

Aspidistra elatior Morren et Decaisne., p. 91.

Aspidium Sw., Schildfarn ¹⁾.**I. Bathmium Lk. (= *Aspidium* Endl.).**

fraxinifolium Schrd. (= *macrophyllum* Hort.), eschenblättriger, 4. w. Brasilien, Westindien.

cicutarium Sw., *longifolium* Desv., *macrophyllum* Sw. (= *fraxinifolium* Hort.), *trifoliatum* Sw.

II. Cyclosorus Lk.

gongyloides Schk. (= *contiguum* Kaulf.), kreissaamiger, 4. w. Surinam.

propinquum RBr., Kaulf., *unitum* Sw.

III. *Aspidium* Lk. (= *Nephrodium* L. C. Rich., Endl.).

affine Fisch. et Mey., ähnelnder, 4. k. f. b. Südöstl. Asien, Süddalmatien.

augescens Lk. (= *Ottonianum* Hort.), wuchernder, 4. w. Caracas.

chrysolobum Kaulf., Lk. (= *Lastraea chrysoloba* Presl), goldlappiger, 4. w. Brasilien.

concinnum Lk. (= *conterminum* W.), netter, 4. w. Brasilien, Martinique.

contractum Lk., zusammengezogener, 4. w. ?

Ctenitis Lk., kammähnlicher, 4. w. Brasilien.

Foeniseeii Lowe, Heu-S., 4. t. Madeira.

Kaulfussii Lk. (= *Nephrodium Kaulfussii* Endl. = *Lastraea Kaulfussii* Presl), Kaulfufs's, 4. w. Brasilien.

pallidum Lk. (= *Nephrodium pallidum* Bory), bleicher, 4. k. f. b. Morea, Calabrien, Sicilien.

rivulorum Lk. (*Polypodium rivulorum* Raddi), Bach-S., 4. w. Brasilien.

Sprengelii Kaulf. (= *Polypodium Balbisii* Spgl.), Sprengel's, 4. w. Westindien, Brasilien.

violascens Lk. (= *Nephrodium violascens* Schott = *Polypodium molle* Jacq.), violetter, 4. w. Brasilien.

cordifolium Sw., *crinitum* Boj., *cristatum* Sw., *Cunninghamii* J. Sm., *decompositum* Spgl., *dilatatum* Sw.

(= *Polypodium aristatum* Vill.), ? *dumetorum* Sm., *elongatum* Sw., *Filix mas* Sw., *Goldianum* Hook., *Hippocrepis* Sw., *intermedium* Mühlbg.,

invisum Sw., ? *irriguum* Sm., *laetevirens* Bevis, *lucens* Bojer, *marginale* Sw., *molle* Sw., *marginatum* Sw., *noveboracense* Sw., *Oreopteris* Sw.,

parasiticum Sw., *patens* Sw., *pennigerum* Sw., *pubescens* Sw., *Serra* Sw. (= *Nephrodium Serra* Endl. = *Lastraea Serra* Presl), *spinulosum* Sw., *Thelypteris* Sw., *villosum* Sw.

IV. *Nephrodium* Lk.

Schkuhrii Lk. (= *pectinatum* H. Berol. = *pectinatum* W. = *trapezoides* Schkh.), Schkuhr's, 4. w. ? Brasilien.

tuberosum Bory W., knolliges, 4. w. Mascarenas.

exaltatum Sw., *trapezoides* Sw.

V. *Polystichum* Lk., Schott.

acrostichoides Sw., *aculeatum* Sw., *angulare* Kit., *auriculatum* Sw., *drepanum* Sw., *fragrans* Sw., *lobatum* Sw., *Lonchitis* Sw., *proliferum* RBr., *pungens* Kaulf.,

rhizophyllum Sw., *rigidum* Sw.

1) Die unter die Untergattungen (zum Theil muthmaßlich) gehörigen, schon p. 91 und 92 verzeichneten Arten, werden hier der Uebersicht wegen noch einmal aufgeführt.

Aspidium

VI. Cyrtomium Presl.

falcatum Sw. (= *Polypodium falcatum* Thbg. = *Polypodium japonicum* Houtt.), sichelförmiger, 4. k. Japan.

VII. Tectaria Cav.

coriaceum Sw. (= *T. coriacea* Lk. = *T. Colahuala* Cav. = *Rumohrea aspidioides* Raddi = *Polystichum coriaceum* Schott., = *A. capense* Sw. = *A. discolor* Langsd. et Fisch. = *Polypodium coriaceum* Sw. = *P. adiantiforme* Forst. = *P. argentatum* Jacq.).

Unter welche Gattungen oder Untergattungen nachstehende gehören, ist mir eben so wie ihr Vaterland unbekannt, als: ephebum van Houtte, 4. w., ocellatum van Houtte, 4. k. t., uliginosum van Houtte, 4. w. t. Java.

Barometz W., v. *Cibotium glaucescens*, *crenatum* Sommerf., v. *Cystopteris crenata*.

Asplenium L., Strichfarn.

I. Acropteris Lk., p. 8 II.

II. Asplenium Lk.

affine Lk., ähnlicher, 4. w. ?

auricularium Desv. (= *brasiliense* Lk.), öhriger, 4. w. Brasilien.

crenulatum Presl (= *Nidus* Raddi non L. = *serratum* Lk. = *crassifolium* Hoffmsg.), gekerbter, 4. w. Brasilien.

decurtatum Lk., abgekürzter, 4. w. ? Brasilien.

elatus Lk., hoher, 4. f. Nordamerika.

foecundum Kunze (= *viviparum* Hort. anglor. non Presl), fruchtbarer, 4. w. Mauritiusinsel.

japonicum Kunze (= *Caenopteris japonica* Thbg.), japanischer, 4. t. w. Japan.

marinum Huds., α) major, β) minor.

obovatum Vivian., (*Forsteri* Sadler), verkehrteiförmiger, 4. f. b. k. Ungern, Corsica, Sardinien, Calabrien.

obtusifolium L., stumpfblättriger, 4. w. Westindien.

oligophyllum Kaulf., wenigblättriger, 4. w. Brasilien.

Otites Lk., Ohr-St., 4. w. Brasilien.

repandum Kunze, ausgeschweifter, 4. w. ?

Serra Langsd. et Fisch., sägezahniger, 4. w. Brasilien.

triste Kaulf., trauriger, 4. w. Brasilien.

III. Camptosorus Lk.

rhizophyllum L., p. 93.

rumicifolium (*Camptosorus rumicifolius* Lk.), ampferblättriger, 4. f. b. k. ?

assimile Endl. = *Allantodia australis*, p. 29.

dissectum H. Berol = *cicutarium*, *Hemionitis* Brotero = *palmatum*, *pulchellum* Hort. = *Otites*, *praemorsum* Hort. = *furcatum*, *striatum* Hortul (= *ambiguum* Raddi) = *Diplazium* Shepherdii, *trichomanoides* Mchx. (= *polypodioides* Sw.) = *ebenum*, *Virgilii* Bory = *acutum*.

Asprella major Fresen. = *Gymnostichum majus*, p. 371.

Astartea DC., Astartea VII. 1., Myrtaceae.

Endlicheriana Schauer (= *Leptospermum dubium* Sngl. = *Baeckea affinis* Endl. = *frutescens* Otto et Dietr., Hort. non L.), Endlicher's, 5. k. t. Neuholland.

laricifolia (= *Leptospermum laricifolium* A. Cunningh.), lerchenblättrige, 5. k. t. Neuholland.

Astelia Banks, Soland., *Astelia*, VI. 1., Juncaceae.

Banksii RBr. (= *Richardi* Endl. = *Hamelinia vera-troides* A. Rich.), p. 94.

Aster T., Sternblume.

I. *Aster* N. E., DC.

deflexus Tausch. (= ? *concinus* Colla non W. = *Tradescanti* Hort.), herabgebogene, 4. f. ?

Richardsonii Sgl. (= *giganteus* Hook.), Richardson's, 4. f. Nordamerika.

III. *Calimeris* N. E.

altaica N. E., α) *subincana* Fisch., Mey. et Lalle. (= *canescens* N. E. = *Aster pumilus* Fisch. = *altaicus* W. E.), β) *subviridis* Fisch., Mey. et Lalle. (= *Cal. altaica* N. E. = *Aster distortus* Turcz.), γ) *scabra* Fisch., Mey. et Lalle., δ) *viridis* Fisch., Mey. et Lalle., ϵ) *arbusculiformis* Fisch. Mey. et Lalle., Dahurien, Nordchina, Altai, vergl. p. 97.

VIII. *Felicia* Cass.

tenellus Thbg. L. fil. (= *Felicia tenella* N. E. = *F. fragilis* Cass. = *Agathaea tenella** p. 22 = *Cinera-ria tenella* Lk. = *Kaulfussia ciliata* Sgl. fil.).

IX. *Galatella* Cass.

Hauptii Lindl., α) *grandiflora* Fisch., Mey. et Lalle. (= *G. fastigiata* N. E. = *A. fastigiatus* Ledeb. = *A. Hauptii* Fisch.), β) *squamosa* DC. (= ? *leptophylla* N. E. = ? *nudiflora* Lindl.), γ) *tenuifolia* Lindl. (= *A. leptophyllus* Fisch.).

punctata Lindl. (= *Aster acris* L. = *Chrysocoma biflora* L.), α) *Neesiana* Fisch., Mey., Lalle. (= *G. punctata* N. E. = *Aster punctatus* W. K.), β) *grandiflora* Fisch., Mey., Lalle. (= *G. insculpta* N. E. = *A. hyssopifolius* Cav. non L., *A. punctatus*, β) *latifolius* Roch.), γ) *squamosa* Fisch., Mey., Lalle., (= *A. acris* MB.), δ) *densiflora* Fisch., Mey., Lalle. (= *A. trinervifolius* Lessing), ϵ) *hyssopifolia* Fisch., Mey., Lalle. (= *G. hyssopifolia* N. E. = *A. hyssopifolius* L. mant.), ζ) *dracunculoides* Fisch., Mey. et Lalle. (= *G. dracunculoides* N. E., α) *radiata* DC. = *G. pauciflora* Cass. = *A. dracunculoides* Lam., α) *radiatus* Ledeb.), η) *discoidea* Fisch., Mey. et Lalle. (= *G. biflora* N. E., *G. dracunculoides*, β) *discoidea* DC. = *Chrysocoma dracunculoides* Lam. = *Crinitaria biflora* Less. Cass. = *Linosyris punctata* DC. = *Aster dracunculoides*, β) *discoidens*, α) *major* Ledeb.), vergl. p. 99.

Xb. *Homostylium* N. E.

cabulicus Lindl., cabulische, \S . k. t. Kabul.

Unbestimmtere: *A. formosissimus* Hort., *inuloides* Brotero, *lusitanicus* Brotero.

Asteriscium Chamiss. et Schldl., Doldensternchen, V. II. Umbelliferae.

chilense Cham. et Schldl. (= *A. Poeppigii* DC. = *Cassidocarpus chilensis* Presl), chilesisches, \odot . 4. k. f. Chili.

Asteriscus T. Mönch, *A. aquaticus* DC. (= *sessilis* Mch. etc.), v. *Buphthalmum* I. p. 138.

? *Asteridia pulverulenta* Lindl. = *Athrixia australis*.

Asterocarpus tricuspidatus Eckl., Zeyh, (= *Celastrus tricuspidatus* Lam. p. 174), v. *Pterocelastrus tricuspidatus*.

Asterolinon Lk., Sternlein.

adoënsis Kunze (= *Lysimachia adoënsis* Hochst. et Steud.),
abyssinisches, ☉. f. Abyssinien.

Asteromyrtus Schauer, Sternmyrte, XVIII. I. Myrtaceae.

Gärtneri Schauer (= *Melaleuca angustifolia* G.), Gärt-
ner's, ♀. t. Neuholland.

Asterotrichion Lk., Kl., Sternmalve, ? XVI. VII.,
Malvaceae-Sterculiaceae.

sidoides Lk., Kl., Otto, sammetpappelähnliche, ♀. t. Neuholl.
Astilbe decandra D. Don = *Hoteja biternata*.

Astiria Lindl., Astirie, XVI. VIII., Malvaceae-Dombeyaceae.
rosea Lindl., rosafarbige, ♀. w. Bourbon.

Astorganthus Hügelii Endl. = *Melicope simplex*.

Astraea Kl., *Astraea*, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

lobata Kl. (= *Croton lobatum* L., p. 235), gelappte,
☉. w. Südamerika.

Astraea saxicola Schauer (= *Baeckea saxicola*
Cunn., p. 110), v. *Bucheria saxicola*.

Astragalus T., Tragant.

agrestis Dougl., Acker, 4. f. Nordamerika.

albicans Bong. et C. A. Mey., weifslicher, 4. f. Asia-
tisches Rußland.

Arbuscula Pall., baumähnlicher, ♀. f. b. Sibirien.

Arnacantha MB. (= *compactus* γ Lam. = *Poterium*
Pall.), dorniger, ♀. k, f. b. Taurien, Caucasus.

Asterias Steven, sternfrüchtiger, ☉. f. ? Caucasus.

aureus W., goldfarbiger, ♀. k. f. b. Armenien.

brachybotrys Bunge, kurztraubiger, 4. f. Altai.

Cicer L. (= *A. Pattersonii* H. Tübing. = *A. Pseudo-*
cicer Opitz).

γ) ciceriformis Bernh., Armenien.

collinus Dougl., Hügel, 4. f. Nordamerika.

cruciatus Lk. (= *Stella* MB.), kreuzförmiger, ☉. f.
Aegypten, Iberien.

cylindraceus DC. (= *cylindricus* Speg.), cylinderförmiger,
4. f. b. Armenien.

dilutus Bunge, hellfarbiger, 4. f. Asiat. Rußland.

diphtherites Fenzl, häutiger, ♀. k. Am Tigris.

dorycnioides Dougl., *Dorycnium*ähnlicher, 4. f. Nord-
amerika.

flexuosus Dougl., gebogener, 4. f. Nordamerika.

Gebleri Bong. et C. A. Mey., Gebler's, 4. f. Sibirien.

Grahami Steud. (= *vicioides* Grah. non Ledeb. = *hi-*
malayensis Hort.), Graham's, 4. k. f. b. Himalaya.

hamosus L. var. δ) minor Hort. Petropolit., ☉. f. Arabien.

himalayensis Jacquemont, Himalaya-T., 4. k. f. b. Himalaya.

hyrcanus Pall., hyrcanischer, 4. ♀. k. f. b. Gegend des
kaspischen Meeres.

illyricus Bernh. (= *monspessulanus* Auct.), illyrischer,
4. f. Illyrien, Dalmatien.

inflexus Dougl., eingebogener, 4. f. Nordamerika.

lasiopetalus Bunge, wollkroniger, 4. f. Asiat. Rußland.

lentiginosus Dougl., 4. f. Nordamerika.

olopterus DC. (= *austriacus altaicus* Fisch.), ganz-
flügeliger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Onobrychis L., β) latifolius, γ) major, δ) microphyllus,
 ϵ) sibiricus.

pectinatus Dougl. (= *Phaca pectinata* Hook.), kamm-
förmiger, 4. f. Nordamerika.

pictus Steud. (= *bicolor* Dsf.), bemahlter, 4. k. Chili.

Astragalus

podocarpus C. A. Mey. (non Grah.), fufsfrüchtiger, 4. f. Caucasus.

refractus C. A. Mey., zurückgebogener, 4. f. Caucasus.

strobiliferus Lindl., zapfenähnlicher, 5. k. f. b. Erzerum.

vicioides Ledeb. (non Grah.), wickenähnlicher, 4. f. Altaisch. Sibirien.

aegyptiacus Mill. (= *biflorus* Vivian., *maculatus* Lam.

= *subulatus* Dsf.) = *annularis*, *eriocephalus* W.

= *breviflorus*, p. 101, *odessanus* Bess. (= *cornutus* Pall.) = *vinineus*, p. 103.

Astrantia T., Sterndolde.

elatior Frivald., hohe, 4. f. Rumelien.

gracilis Bartl., schlanke, 4. f. Krain.

major L., γ) *involucrata*, δ) *fol. variegatis*.

pauciflora Bertol. = *minor*, = *speciosa* Hort. =

heterophylla W. (= *helleborifolia* Salisb.), *trifida*

Hoffm. = *caucasica*, p. 104.

Astrapaea Lindl., Prachtmalve.

penduliflora DC. (= *Wallichii* Ker. non Lindl.), hängendblunige, 5. w. Madagascar.

viscosa Sweet, v. Dombeya Amelia.

mollis Hort. (= *tomentosa* Hort.) = ?

Astrocarpus Neck., Sternkapsel, XI. III., Resedaceae.

purpurascens DC. (= *Reseda sesamoides* β DC. fl. fr.

= *Sesamella spathulata* Rehb.), purpurfarbige, ☉. f.

Süd- und Westeuropa.

sesamoides DC. (= *Reseda Clusii* Spgl. = *R. stellata*

Lam. = *Sesamella Tournefortii* Rehb.), Sesamähnliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

Astrocaryum W. Mey., Sternnufs.

Ayri Mart., *Ayri-S.*, 5. w. Brasilien.

Murumuru Mart., p. 104.

Astronium Jacq., Astronium, V. (XXII.) III., Terebinthaceae.

graveolens Jacq., starkriechendes, 5. w. Neugranada.

Ob *A. concinnum* Schott und *fraxinifolium* Schott, beide in Brasilien heimisch, und 5. kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Astrophytum Lemaire, v. Cacteae, p. 873.

Ataccia J. S. Presl., Ataccie, VI. I., Aroideae-Taccaceae.

integrifolia Presl (= *Tacca integrifolia* Ker, p. 794).

Atalantia Correa, Atalantie.

capitellata Lindl., kopfförmige, 5. w. Ostindien.

Athamanta L., Hirschwurz.

cervariaefolia DC. (= *Seseli cervariaefolium* DC. p. 749).

crinita Ledeb. (= *Sison crinitum* Pall. = *Schultzia*

crinita Spgl., p. 731).

macedonica Spgl. (= *Seseli macedonic.** = *Bubon macedonicum* L., p. 749).

ramosissima Portenschl. (= *verticillata* Unio-itin.), ästige, 4. f. Dalmatien.

stricta Ledeb., steife, 4. f. Sibirien.

Cervaria L., *Oreoselinum* L. = *Peucedanum Cervaria*

et P. *Oreoselinum*, p. 610, *cervariaefolia* Schrad.

(= *rigida* Hornem.), *condensata* L., *Libanotis* L. =

Libanotis buchtormensis (= *Seseli buchtorm.* p. 749),

condensata et montana, p. 461, *Golaka* Hacq., v. Ma-

labaila Hacquetii Tausch (= *Hladnikia golacensis* K,

p. 880), *Matthioli* Wulf., v. Turbith Matthioli, *Meum*

Athamanta

L. = *Meum athamanticum*, p. 522, *panacifolia* Spgl., v. *Magydaris panacina*, *tortuosa* Spgl., v. *Deverra tortuosa*.

Atherurus Blume, Schweifarum (= *Pinellia* Tenore, *Hemicarpurus* N. E.), XXI. ix. Aroideae.

ternatus Blume (= *Arum bulbosum* P. = *atrorubens* Spgl. etc., = *Pinellia tuberifera* Denhardt. = *Hemicarpurus fornicatus* N. E.), dreiblättriger, 4. Kn. w. Japan, Ostindien.

Athlianthus Endl., *Athlianthus*, ? II. i., Acanthaceae-Russeggereae.

spiciflorus Endl., ährenblüthiger, ☉. w. f. m. Tropisches Afrika.

Athrixia Ker, *Athrixia*.

australis Seetz, neuholländische, ♣. t. Neuholland.

Atractylis L., Spindelkraut.

caespitosa Dsf. (= *Acarna caespitosa* W., p. 8).

cancellata L. (= *Acarna cancellata* All. W., p. 8).

Atraphaxis L., Strauchmelde.

canescens Bunge, grauliche, ♣. k. Asiat. Rufsland.

Atriplex T., Melde.

crassifolia C. A. Mey., Altaisches Sibirien, p. 105.

Gmelini C. A. Mey., Gmelin's, ☉. f. Cantschatka, Insel Sitcha.

graeca W., griechische, ♣. k. f. b. Archipelagus.

hastata L., β) *calotheca* Rafn, Hornem. (= *macrotheca* Hort.).

Hermanni Willem. (*nitens* Schk. = *lucida* Dsf. = *viridis* Ehrh. = *acuminata* W. K. = *sagittata* Borkh.).

laciniata L. (= *albicans* Bess. = *astracanica* Balb. = *diffusa* Tenore = *sinuata* Hoffm.), β) *abbreviata* Opitz.

latifolia Whlbg. (= *hastata* Auct. = *patula* Sm.), β) *microsperma* W. K. (= *ruderalis* Wallr.), γ) *salina* Wallr., K.

littoralis L., β) *marina* L. (*serrata* Huds.), γ) *sulcata* Hort., Goett. ¹).

multifida Dsf. (= *lacera* Dsf.), vierspaltige, ☉. f. ?

parviflora H. B. K. (= *parvifolia* Auct. non Lowe).

procumbens Less., niederliegende, ☉. f. Altaisch. Sibirien.

? *sinensis* Juss., Hort., chinesische, ? ☉. f. China.

tatarica L. (? = *diffusa* Tenore), β) *oblongifolia* W. K.

benghalensis Hort. (= ? *acuminata* M. B.) = *hortensis*, *lucida* Mch. (non Dsf.) = *sibirica*, *campetris* K. = *tatarica* β) *oblongifolia*, *polysperma* Tenore = *rosea*.

Atropa L., Tollkirsche.

pubescens Brotero, weichhaarige, ? ? ?

Aubletia trifoliata = *Monniera trifolia*, p. 529.

Aubletia aspera Willd., *laevis* Willd. etc. = *Apeiba aspera*, *laevis* etc., p. 68.

Aubrietia Adans., *Columnae* Gusson., *Columna's*, 4. f. b. k. Unteritalien.

lepidioides Spgl. = *Heliophila lepidioides*, p. 386.

Audibertia Benth., p. 106.

polystachya Benth., vielährige, 4. k. Nördl. Californien.

pusilla Benth. = *Mentha Requieni*, p. 511.

1) Die unter *A. littoralis* L. p. 105 aufgeführten Abarten, gehören zu *A. latifolia* Whlbg.

Aulacospermum Ledeb., Furchensaame, V. II., Umbelliferae.

anomalum Ledeb., abweichender, 4. f. Altai.

cuneatum Ledeb., keilförmiger, 4. f. Altai.

Aurinia saxatilis Desv. = *Alyssum saxatile*, p. 42.

Avellinia Parlatores, Avellinie, III. II., Gramineae.

Michelii Parlatores (= *Bromus Michelii* Savi = *Festuca Michelii* Kunth = *Koeleria macilenta* DC. = *Vulpia Michelii* Rchb. etc.), Micheli's, ☉. f. Frankreich, Spanien, Italien.

Avena T., Hafer.

I. *Avena genuina*.

orientalis Schreb., var. albida aristata, albida mutica, fuscescens submutica Hort. Petropolit.

sativa L., var. albida acuta, albida anglica, brachystachya, Dun-Oats, Hopetown-Oats, Kartoffelhafer, Macbiehill-Oats, norwegica, philadelphica, polonica, Potato-Oats, praecox, praegrans, praegrans, pyramidalis, Reykliffe, sibirica, Sovereign-Oats, subaristata, tatarica, flavescens praecox, fusca mutica, fusca praecox, fusca subaristata etc. Vergl. Index septimus seminum horti botan. imper. Petropolit., benghalensis Hort., peruviana Hort.

II. *Avenaira* Rchb.

pulchella Lk. (= *Aira Tenorei* Guss.).

atropurpurea Lk., v. *Vahlodea atropurpurea*.

III. *Avenastrum* Koch.

amethystina Clarion, DC. (? = *bromoides* L.), amethystfarbiger, 4. f. Frankreich, südl. Tyrol.

Thorei DC. (= *longifolia* Thore = *sempervirens* L., var. Trin.), Thores, 4. f. Frankreich.

IV. *Trisetum* P., R. et S.

carpathica Host (= *fusca* Schult. = *flavescens* var. Spgl.).

micrantha R. et S. (= *Avena parviflora* W. non Dsf.), kleinspelziger, ☉. f. Südeuropa.

myriantha Bertol., vielblumiger, ☉. f. Italien.

palustris Mchx. (= *caroliniana* Walt.), Sumpfliegender-H., 4. f. Nordamerika.

pumila Dsf. (= *Trisetum aureum* Tenor.), niedriger, ☉. f. Nordafrika.

uniflora Parlatores (non *Trisetum uniflorum* Meyer), einblumiger, ☉. f. Teneriffa.

cristata Auct. (= *panicea* Lam. = *pauciflora* Auct.)

= *neglecta*, *Wilhelmsii* (Ledeb.), Spgl. = *rigida*.

muricata Spgl., v. *Pentameris papillosa*.

Axyris L., Amaranthmelde.

sphaerosperma Fisch. et Mey., kugelsamige, ☉. f.

a) humilis, β) elatior. Altai.

Aydendron N. E. et Mart. Aybaum, IX. I., Laurineae.

salicifolium N. E. (= *Laurus salicifolia* Sw., p. 449, = *L. hexandra* Rich. non Sw.).

Azadirachta L., A. Juss., Azadirachta, XVI. VI. (XI.), Hesperideae Meliaceae.

indica A. Juss. (= *Melia Azadirachta* L., p. 506), ostindische, ♂. w. Ostindien.

Azalea L., Felsenstrauch.

bicolor Pursh (= *nudiflora bicolor* Ait.).

glauca Lam. (= *scabra* Hort. = *viscosa glauca* Mchx.).

nudiflora L., Variet. und Hybrid. aurantia, caroliniana, Cartoni, Coburghii, corymbosa, crispa, cumulata, cuprea, discolor, fastigiata, flammaea, flava, florida, glo-

Azalea

bosa, glomerata, incana, incarnata, lutea, magnifica, mirabilis, montana, paludosa, prolifera, pumila, purpurascens, purpurea, Rawsonii, rosea, ruberrima, rubescens, rubicunda, rubra, ruffa, semiduplex, staminea, stellata, thyrsoflora Lindl., tricolor, variabilis, variegata, versicolor, villosa, violacea etc.

Ausserdem kommen noch zahlreiche Varietäten und Hybriden (von *Azalea calendulacea*, *glauca*, *nudiflora*, *pontica*, *speciosa* etc.), in den Gärten vor, als: *Ade-laïde*, *acretincta*, *albo-flavescens rosacea*, *amoenissima*, *aurotincta*, *Aurora*, *atrorubens*, *basilissa*, *Buckinghamii*, *calantha*, *calacoryphe*, *calodendron*, *calostephane*, *carnea partita et plena*, *chariessa*, *corusca*, *cramoisi flamboyant*, *cruenta*, *cuprea splendens*, *decus hortorum*, *delicata*, *dictatryx*, *electa*, *elegans Mortieri et tardiva*, *elegantissima*, *erythraea*, *eudaemon*, *eugenes*, *euprepes*, *gloria mundi*, *habrantha*, *habropis*, *helvola*, *Herbertiana*, *hilaris*, *hilarissima*, *honesta*, *hybrida decorata et punicea*, *imperatrix*, *inclita*, *jasminiflora*, *jucundissima*, *Laetitia Hort. angl.*¹⁾, *lepida*, *mirabilis*, *mixta triumphans*, *notabilis*, *ochroleuca*, *optima*, *ornata*, *perfecta*, *phoenicea*, *pictura subtilissima*, *placida*, *pockila*, *polyantha*, *praestantissima*, *pretiosa*, *regia*, *reginae belgica*, *rigida incarnata*, *robusta*, *roseo-flava*, *rubra fulgens*, *rubro-fusco-flavescens*, *sanguinea*, *sulphurea*, *superbissima*, *triumphalis serotina*, *triumphans gandavensis*, *variegata*, *venustissima*, *viola odorata* u. s. w. u. s. w.

A. citrina Hassk., v. *Rhododendron citrinum*.

Babactes DC., XIV. II., Personatae-Cyrtandreae.

oblongifolia DC. länglichblättrige, ⚥. w. Ostindien.

Babiana Ker, Babiane.

atrocyanea Eckl., schwarzblaue, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

coerulescens Eckl., bläuliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

fragrans Ker, wohlriechende, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

ochroleuca Sweet, weifsgelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

stellata Eckl., sternförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

villosula Ker (= *Gladiolus villosulus* Jacq. = *Ixia villosa* Jacq. = *Ixia villosula* Gmel.), wenigzottige, 4.

Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

longiflora Hort. (= *Gladiolus longiflorus* Andr. =

G. polystachyus Redout. = *G. tubatus* Jacq.) =

B. tubata.

Bei den übrigen p. 109 verzeichneten, ist noch das Culturzeichen k. beizufügen.

Babingtonia Lindl. (C. C. Babington, engl. Botaniker), X. I., Myrtaceae.

Camforosma Lindl. (= *Baeckea Camforosma* Endl.), Kampfer-B., ⚥. k. t. Südwestneuholland.

Baccharis L., Baccharis.

Chilquilla DC. (= *confertifolia* Colla), dichtblättrige, ⚥. t. Chili.

denticulata Don, gezähnelte, ⚥. k. Patagonien.

Feuillei DC. (= *ivaefolia* = *peruviana* Auct. = *striata* R. et P.), Feuille's, ⚥. k. t. Peru.

1) Hybride von *Rhododendron ponticum* und einer *Azalea*.

Baccharis

- genistelloides* P. (= *alata* Hort. = *Conyza genistelloides* Lam. = *Molina reticulata* Less. = *Pterocladis genistelloides* Lamb.), ginsterähnliche, ♀. k. t. Peru.
- juncea* Dsf. (= *Arrhenachne juncea* Cass. = *Stephananthus junceus* Lehm.), simsähnliche, 4. w. Brasilien.
- marginalis* DC. (= *parviflora* P. non Poir., = *Molina parviflora* R. et P.), berandete, 4. ♀. t. k. Peru, Chili.
- Pingraea* DC. (= *angustifolia* Dsf. non Mchx. = *linearis* Poepp. = *Pingraea angustifolia* Cass. = *Molina linearis* Less.), *Pingraea*-B., ♀. t. k. Chili, Brasilien, Californien.
- sagittalis* DC. (= *genistelloides* Poepp. = *reticulata* P. = *Molina reticulata* R. et P. = *M. sagittalis* Less.), pfeilförmige, ♀. t. k. Chili.
- trinervis* P. (= *Conyza trinervis*, Lam.), dreinervige, ♀. w. Brasilien.
- Wendlandii* Steud. (= *cuneifolia* Wendl. non DC.), Wendland's, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- adnata* H. B. K., *Dioscoridis* L., *indica* L., v. *Pluchea subdecurrens*, *Dioscoridis et indica*, *Dioscoridis* Bové, *ivaefolia* L. = *Conyza aegyptiaca et ivaefolia*, p. 216.

Backhousia Hook. et Harvey (James Backhouse, Entdecker dieser Gattung), XII. 1., Myrtaceae.

- myrtifolia* Hook. et Harvey, myrtenblättrige, ♀. ♀ t. k. Neusüdwaales.
- riparia* Hook. et Harvey, Ufer-B., ♀. ♀. t. k. Neuholland.

Bactris Jacq., *Bactris*.

- flavispina* Hort. belg., hellgelbdornige, ♀. w. Südamerika.
- latispina* Hort. belg., breiddornige, ♀. w. Südamerika.
- minor* Jacq. (= *minima* G. = *Cocos guineensis* L. = *Palma gracilis* Mill. = *spinosa* Mill.).
- setosa* Mart., borstige, ♀. w. Brasilien.
- Ob von nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: *acanthocarpa* Mart. Bahia, *aristata* Mart. (= ? *major* Jacq.), Brasil., *bifida* Mart. Brasil., *campestris* Mart. Brasilien, *chaetospatha* Mart. Brasil., *ciliata* Mart. (= *Martinezia ciliata* R. et P.), Peru, *chloracantha* Poeppig, Peru, *concinna* Mart., Brasil., *fissifrons* Mart., Brasil., *hirta* Mart., Brasil., *longifrons* Mart., Brasil., *longipes* Poeppig, Südamerika, *Maraja* Mart., Bahia, *mitis* Mart., Brasil., *riparia* Mart., Brasilien, *simplicifrons* Mart., Brasilien.

Ungewifs: *B. Neromanni* Voigt.

Bactrylobium Fistula W. etc. = *Cathartocarpus Fistula* etc., p. 172, *latifolium* W. = *Anagyris latifolia*, p. 52.

Badaroa bryoniaefolia Bertero, v. *Sycios bryoniaefolius*.

Badula Juss., *Badula*, V. 1., Myrsineae.

- insularis* A. DC. (= *Myrsine insularis* Dietr. = *B. Barthesia* Boj. non A. DC.), Insel-B., ♀. w. Mauritius.
- Lamarckiana* A. DC. (= *Anguillaria laurifolia* Lam. = *Ardisia latifolia* R. et S., p. 74), Lamarck's, ♀. w. Antillen.

Baeckea L., *Baeckie*.

- brevifolia* DC. (= *carnosula* Sbr. = *Leptospermum brevifolium* Rudge), kurzblättrige, ♀. k. t. Neuholland.
- crassifolia* Lindl., dickblättrige, ♀. t. k. Neuholland.

Baekea

frutescens L. non Hort. (= *chinensis* G.).

leptocaulis Hook., schlankstengelige, ♀. t. k. Neuholland.

pendula Hort., hängende, ♀. t. k. Neuholland.

phylicoides A. Cunn., phylicaähnliche, ♀. ♀. k. Neuholl.
= *affinis* Endl. (= *frutescens* Otto, Dietr., Hortul. non L.) = *Astartea* Endlicheriana, *affinis* Hook. (= *prostrata* Hook. = *diffusa* Sbr.), *thymifolia* Hook., v. *Euryomyrtus* *diffusa* et *thymifolia*, *Camforosma* Endl., v. *Babingtonia* *Camforosma*, *camphorata* RBr. v. *Camphoromyrtus* *Brownii*, *crenulata* DC., *diosmaefolia* Rudge, *gracilis* Cunn. (= *microphylla* Sbr.), v. *Schidiomyrtus* *crenulata*, *diosmaefolia* et *tenella*, *obovata* DC. (= *involucrata* Endl.), v. *Scholtzia* *obovata*, *saxicola* A. Cunning., v. *Bucheria* *saxicola*, *speciosa* A. Cunningh., v. *Hypocalymma* *Cunninghami*, *virgata* Andr. etc., v. *Harmogia* *virgata*.

Baeobotrys Forst., Traubenmyrte.

angustifolia Hort., schmalblättrige, ♀. w. ? ?

Baeometra columellaris Salisb., v. *Kolbea* *Breyniana* Schldl., p. 439.

Bahia Lag., Bahia (Wollblatt), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

arachnoidea Fisch., Lalle., spinnengewebige, 4. ♀. k. Neucalifornien.

lanata DC. (= *Actinella lanata* Pursh = *Eriophyllum caespitosum* Dougl., p. 310).

leucophylla DC., weißblättrige, ☉. f. Nootkasund.

oppositifolia DC. (*Eriophyllum oppositifolium* Nutt., p. 310).

Balantium Kaulf., Beutelfarn.

antarcticum Presl (= *Cibotium Billardieri* Kaulf. = *Dicksonia antarctica* LaBill.), südlicher, 4. w. Neuholland.

arborescens Lk. (= *auricomum* Kaulf. = *Dicksonia arborescens* L'Her., p. 262 = *D. integra* Sw.).

glaucescens Lk. (= *glaucophyllum* Presl), v. *Cibotium* *glaucescens*.

Ballota acetabulosa Benth., *africana* Benth. etc., v. *Beringeria acetabulosa*, *africana* etc., p. 119.

disticha L., v. *Anisomeles ovata*, p. 61, *suaveolens* L., Jacq., v. *Hyptis suaveolens*.

Balsamina Riv., Balsamine.

fasciculata Lam., DC. (= *B. heterophylla* G. Don = *Impatiens heterophylla* W. = *oppositifolia* Rottl.), büschelförmige, ☉. f. m. Ostindien.

labiata Lk., Kl., Otto, lippenförmige, ☉. f. m. Ostindien.

Mastersiana Paxt., Masters's, ☉. f. m. Ostindien.

oppositifolia DC., gegenblättrige, ☉. f. m. Ostindien.

scabriuscula G. Don, schärfliche, ☉. f. m. Ostindien.

Balsamita ageratifolia Dsf. (= *corymbosa* Salzm. = *flosculosa* Hort.) et *virgata* Dsf., v. *Plagiis ageratifolius* et *virgatus*, *annua* DC., v. *Tanacetum annuum*, *flabelliformis* P., v. *Pentzia flabelliformis*, p. 606, *vulgaris* W., v. *Pyrethrum Tanacetum*.

Balsamodendron Kunth, Balsambaum.

acuminatum Hort. belg., zugespitzter, ♀. w. Ostindien.

Camphora Hort. belg., Kampfer-B., ♀. w. Ostindien.

zeylanicum Kunth, v. *Canarium commune*.

Banisteria L., Banisterie.

- argyrophylla Hort., silberblättrige, f. w. ?
 bonariensis Hook., Arn., bonarische, f. w. Bonaria.
 splendens DC. (= *fulgens* Cav. non L. = *heterophylla* W.).
 tiliaefolia Vent., lindenblättrige, f. w. Java
 tomentosa Dsf. (= *emarginata* Cav.).
 volubilis Endl. (= *Malpighia volubilis* Sims = *Byrsonima volubilis* DC., p. 141).

angulosa L., *auriculata* L., v. *Stigmaphyllum angulosum*, *auriculatum*, p. 789, *appendiculata* Lam., *argentea* Speg., *brachiata* L., *chrysophylla* Lam., *coerulea* Lam., *nitida* Lam., *parvifolia* Lam., *purpurea* L., v. *Heteropteris appendiculata* etc., p. 394.

Banksia L. fil. Drathblume (Banksie).

- augusta Hort., herrliche, f. t. k. Neuholland.
 bruniades Hort., bruniaähnliche, f. t. k. Neuholland.
 calophylla H. Hügel, schönblättrige, f. t. k. Neuholland.
 cuneifolia Wendl. fil., keilblättrige, f. t. k. Neuholland.
 cylindrostachya Lindl., walzenährige, f. t. k. Neuholland.
 denticulata Dum. Cours., weniggezähnelte, f. t. k. Neuholland.
 Drummondii Hort., Drummond's, f. t. k. Neuholland.
 foliosa Hort., blattreiche, f. t. k. Neuholland.
 formosa Hort., liebliche, f. t. k. Neuholland.
 Meisneri Lehm., Meisner's, f. t. k. Neuholland.
 microstachya Cav., Lk. (= *marginata* β RBr.), = *praemorsa* Hort.), kleinährige, f. t. k. Neuholland.
 mimosoides Hort., Sinnpflanzenähnliche, f. t. k. Neuholland.
 patula RBr., ausgebreitete, f. t. k. Neuholland.
 phylicaeifolia H. Hügel, phylicablättrige, f. t. k. Neuholland.
 plumosa Hort., federförmige, f. t. k. Neuholland.
 prionotes Lindl., sägeblätter., f. t. k. Neuholland.
 pubescens Don, feinhaarige, f. t. k. Neuholland.
 reticulata Wendl. fil., netzblättrige, f. t. k. Neuholland.
 rubra Don, rothe, f. t. k. Neuholland.
 villosa Hort., zottige, f. t. k. Neuholland.
 virens Don, grünliche, f. t. k. Neuholland.

Aquisolium Lindl. = *ilicifolia*, *asplenifolia* Kngt. et Salisb. = *marcescens*, *conchifera* G. (= *mitis* Kngt. et Salisb. = *undulata* Lindl.), = *serrata*, *dilleniaefolia* Kngt. et Salisb. (= *longifolia* Cav. = *uncigera* Kngt. et Salisb.) = *latifolia*, *glauca* Cav. (? = *macrophylla* Lk.) = *integrifolia*, *grandidentata* Dum. Cours. = *speciosa*, *littoralis* Grah. = *Cunninghamii*, *longifolia* Hort. (= ? *salicifolia* Cav.) = *oblongifolia*, *marcescens* Hook. = *australis*, *nivea* LaBill., v. *Dryandra nivea*, p. 276, *polypodifolia* Kngt. et Salisb. = *repens*, *pyrifomis* G. v. *Xylomelum pyriforme*, p. 861, *serraeifolia* (= *serratifolia*) Kngt. et Salisb. = *aemula*, *tenuifolia* Salisb., v. *Hakea acicularis*, p. 374, *tomentosa* Hort. = *littoralis*.

Baphorrhiza tinctoria Lk., v. *Anchusa tinctoria*, p. 53.

Baptisia Vent., Baptisie.

- confusa Sweet, verwechselte, 4. f. Nordamerika.
 bracteata Ell., 4. Nordamerika, *leucophaea* Nutt., 4. Nordamerika, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Barbacenia Vand., Barbacenie.

squamata Paxt., Hook., schuppige, 4. w. Brasilien.
 Außerdem kommen noch folgende in Brasilien vor, die bis jetzt soviel mir bekannt ist, noch nicht kultivirt werden, als: bicolor Mart., coccinea Mart., ensifolia Mart., excapa Mart., flava Mart., glauca Mart., ignea Mart., longiflora Mart., luzulaefolia Mart., rubro-virens Mart., tomentosa Mart., tricolor Mart., Vandelli Roem. (= *brasiliensis* W.), Alexandrina Schomb. Guiana. Sämmtlich 4.

Barbarea RBr., Barbernkraut.

angustana Boiss., piemontesisches, 4. f. Piemont.
 orthoceras Ledeb. (= ? *stricta* Andrzy.), geradschotiges, 4. f. Gegend des Baicalseees.
 prostrata Gay, gestrecktes, 4. f. Frankreich.
 vulgaris RBr., γ) fol. variegat.
altaica Andrzy (= ? *hirsuta* Weihe) = *arcuata* Rchb.
Barbellina sericea Cass., v. *Staelhelina arborescens*, p. 781.

Barkeria Knowl. et Westc., Barkeria.

spectabilis Bateman, ansehnliche, 4. w. Guatimala.

Barkhausia Mch., Barkhausie.

Balbisiana DC., Balbis's, ♂. f. Sicilien.
 foetida DC., ♂) prostrata Dumort.
 juvenalis Delil., jugendliche, ⊙. f. Südfrankreich.
 nana DC. (= *Crepis nana* Richards. = *racemosa* Tausch), zwergige, ⊙. f. Sibirien, nördliches Amerika.
 porrifolia DC., porreeblättrige, ⊙. f. Neapel.
 recognita DC. (= *praecox* Balb.), wiedererkannte, ⊙. f. Schweiz.
 rhoeadifolia MB., mohnblättrige, ⊙. f. Iberien, Caucasus, Oestreich etc.

tenuifolia DC. (= *Crepis tenuifolia*, p. 230).

amygdalina Lag. = foetida, *canescens* Spgl. = bur-sifolia, *caroliniana* Nutt. = *Pyrrhopappus carolinianus*, *Leontodon* DC. (= *tenerima* Tenor.), = leontodontoides, *raphanifolia* Chev. non Spgl. = *taraxacifolia*, *versicolor* Spgl. = *Ixeris versicolor*, p. 426.

Barleria L., Barlerie.

obovata Hamilt. (= *buxifolia* Roxb. non L. = *crinata* β Lam.), verkehrteiförmige, ♂. w. Ostindien.
 tomentosa Heyne (= *acuminata* Wight), filzige, ♂. w. Ostindien.

gentianoides Dsf. (= *oenotheroides* Dum. Cours.) = flava, *lactea* Dsf. = alba, *pyramidalis* Lam., v. *Blechum Brownei*, p. 125.

Barnadesia Mutis, L. fil. Barnadesie, XIX. II., Compositae-Eupatorineae (Perdicieae).

rosea Lindl., rosafarbige, 4. ♂. t. Südamerika.

Barnardia Lindl., Barnardie.

japonica Schult. (= *Ornithogalum japonicum* Thbg.), japanische, 4. Zw. k. t. Japan.

Barosma apiculata Eckl., Zeyh. (= *Agathosma apiculata*, p. 23).**Barringtonia** Forst., Barringtonie.

acutangula G. (= *Eugenia acutangula* L. = *racemosa* Roxb. = *Stravadium rubrum* P. = *coccineum* DC. = *acutangulum* Juss., Loud., p. 790), spitzkantige, ♂. w. Ostindien.

Barringtonia

racemosa Blume (= *Eugenia racemosa* L. = *Stravadium racemosum* Sweet, p. 790 = *Stravad. alb.* P. = *Butonica sylvestris* Rumpf.).

Bartholina pectinata RBr., p. 114 (*B. Burmanniana* Ker).**Bartlingia** Brogn. (F. G. Bartling, Prof. der Botanik zu Göttingen), ? V. I., Myrtaceae-Chamaelaucieae.

obovata Brogn. (= *Cryptandra obovata* Sbr., p. 237).

Barysoma Bunge, *Barysoma*, V. II., Umbelliferae.

villosum Bunge (= ? *Heracleum villosum* Hoffm. Fisch.), zottige, ♂. 4. f. Caucasus.

Basella L., Baselle.

japonica Burm., japanische, ☉. ♂. Sch. w. t. Japan.

obovata H. B. K., verkehrteiförmige, ♂. 4. w. Neugranada.

Bastardia H. B. K. (Bastard oder Batard, französischer Botaniker).

foetida Sweet (= *Sida foetida* Cav., p. 752).

Batatas Rumph, Choisy, *Batate*, V. I., Convolvulaceae.

acetosaefolia Choisy. (= *Convolvulus acetosaefolius* Vahl = *C. repens* Sw. = *Ipomoea acetosaefolia* Vahl), ampferblättrige, 4. w. Südamerika.

betacea Lindl. (= *Ipomoea Humboldtii* Hort.), mangoldartige, 4. w. Demerara (engl. Guiana).

bonariensis Lindl., bonarische, 4. Sch. w. Buenos Ayres.

cissoides Choisy (= *Convolvulus calycinus* H. B. K. = *C. cissoides* Vahl), Klimmenähnliche, ☉. Sch. w. f. m. Südamerika.

edulis Choisy. (= *Convolv. edulis* Thbg. = *C. Batatas* L. = *C. esculentus* Sogl. = *Ipomoea Batatas* Poir., p. 418), genießbare (ächte), 4. Kn. w. t. Ostindien, Japan, Südamerika etc.

β *xanthorrhiza* (Patate jaune) Mauritius, γ) *platanifolia*, Guiana.

glaucofolia G. Don (= *Convolvulus glaucifolius* Sogl. = *Ipomoea glaucofolia* L., p. 419).

Jalapa Choisy. (= *Convolv. Jalapa* L. = *Ipomoea Jalapa* Bot. mag., p. 419.

β) *Purshii* G. Don (= *Ipomoea Michauxii* Sweet, p. 420, = *I. Jalapa* Pursh).

insignis G. Don (= *paniculata* Choisy. = *Ipomoea gossypifolia* W., p. 419 = *I. insignis* Ait, Ker).

littoralis Choisy (= *Convolvulus littoralis* L. = *C. arenarius* Vahl = *C. dianthus* Gmel. = *C. biflorus* Forsk. = *C. Imperati* Vahl, p. 215 = *C. obtusilobus* Mchx. = *C. sinuatus* Petagna = *C. stoloniferus* Cyrill. = *Ipomoea arenaria* R. et S. = *I. stolonifera* Poir.), Ufer-B., 4. f. Südeuropa, Nordafrika etc.

paniculata Choisy. (= *Convolv. paniculatus* L. = *C. roseus* H. B. K. = *Ipomoea eriosperma* P. B. = *I. mauritiana* Jacq. = *I. pentaloba* R. et S. = *I. paniculata* RBr., p. 420).

pentaphylla Choisy (= *Convolvulus hirsutus* Roxb. = *pentaphyllus* L. = *Ipomoea pentaphylla* Jacq., p. 420, *I. polytricha* G. Don).

quinquefolia Choisy. (= *Convolv. palmatus* Mill. = *C. pentaphyllus* β L. = *C. quinquefolius* L., p. 216).

ternata G. Don (= *Ipomoea ternata* Jacq., p. 421).

triloba Choisy, dreilappige, ☉. f. m. w. Brasilien.

heterophylla G. Don (et = *Willdenowii* G. Don = *Ipomoea heterophylla* Ortega Jacq. non RBr., p. 419),

Batatas

v. *Pharbitis heterophylla*, *ternata* G. Don = *Ipomoea ternata*, *venosa* Boj., G. Don = *Ipomoea venosa*, q. 421.

Bathmium fraxinifolium Lk., *macrophyllum* Lk., *trifoliatum* Lk., v. *Aspidium* I.

Batodendron arboreum Nutt., v. *Vaccinium arboreum*, p. 833.

Batis L., *Batis*, XXII. iv., *Urticaceae*-*Batideae* (? *Corniferae*).

aurantiaca, Mackoy, orangenfarbige, f. w. ?

Batschia Gmel., Mchx. (*Batsch*, Professor der Naturgeschichte zu Jena, † 1802), V. i., *Asperifoliaceae*.
canescens Mchx. (= *Lithospermum canescens* Lehm., p. 468).

caroliniana Gmel. (*Gmelini* Mchx. = *Lithospermum hirtum*, p. 469), *longiflora* Pursh (= *Lithospermum longiflorum*, p. 469), *Batschia nivea* Mch. = *Eupatorium ageratoides*, p. 319.

Bauera Kennedy Andr., *Bauera*.

juncea Sm., simsenförmige, f. t. k. Neuholland.

Bauhinia Plum., *Bauhinie*.

aculeata L. (= *fragrans* Hort.).

americana DC.

bahiensis Bong., Bahia-B., f. Sch. w. Brasilien.

corymbosa Roxb. (= *scandens* Burm. non L.), traubendoldige, f. Sch. w. Ostindien.

erriophora Tenore (? *Caulotretus*), wolltragende, f. Sch. w. ?

Finlaysoniana Grah., *Finlayson's*, f. Sch. w. Ostindien.

reticulata DC. (= *inermis* Forsk. = *platysiliqua* Perrot. = *tamarindacea* Delil. = *Thonningii* Schum.), netzförmige, f. w. Aegypten, Senegal.

rotundata Mill. (= *aculeata* L. var. ? DC.), rundliche, f. w. Carthagera.

divaricata Hort. = *Inga forficata*, *speciosa* Hort. = *tomentosa*.

Baumannia DC. (Gebrüder Baumann, Gartenbesitzer zu Bollwyller), V. i., *Rubiaceae*-*Guettardaceae*.

geminiflora DC. (= *Bridelia spinosa* Baum, H. Bollw.), doppeltblüthige, f. f. t. ?

Baumannia Douglassiana Spach, *Nuttalliana* Spach, *pinnatifida* Spach, v. *Oenothera pallida*, *albicaulis* p. 554 et *Purshiana*.

Baumgartia scandens Mch., v. *Cocculus carolinus*, p. 209.

Baxtera Rehb. (W. Baxter, engl. Botaniker), V. ii., *Asclepiadeae*.

loniceroides Steud. (= *Harrisonia loniceroides*, p. 377).

Beatsonia Herb., *Beatsonie* ? III. i. (XVI. i.), *Irideae*.
atrata Herb., schwärzliche, 4. Zw. t. Mexico.**Beaufortia** RBr., *Beaufortie*.

empetrifolia Schauer (= *Melaleuca empetrifolia* Rehb.), rauschbeerenblättrige, f. f. t. Südwestl. Neuholland.

rotundifolia Hort., rundblättrige, f. f. t. Neuholland.

Dampieri A. Cunningh., *macrostemma* Lindl., v. *Schizopleura Dampieri* et *macrostemma*, *glauca* Hort. anglor. (= ?), *pinifolia* Cels. = *Calothamnus quadrifida*, p. 149, *splendens* Baxter = *sparsa*.

Beckea africana Burm., *cordata* Burm. (= *racemosa* Eckl. et Zeyh.) = *Phylica pinifolia* et *racemosa*, p. 619.

Beckeria Fresen. (O. Becker, Botaniker in Frankfurt a. m. †), III. II., Gramineae.

dioica N. E. (= *Gymnothrix uniseta* N. E. = *Setaria dioica* et *macrochaeta* Hochst. = *Panicum adoense* Steud.), zweihäusige, ☉. ♂. f. w. Abyssinien.

polystachya Fresen., vielährige, ☉. ♂. f. w. Abyssinien.

Beckeria Bernh. = *Melica ciliata*, p. 507.

Becium Lindl., XIV. I., Labiatae.

bicolor Lindl. (= *Ocymum grandiflorum* L'Her. p. 552 = *O. abyssinicum* Hort. Par.), zweifarbiges, ☿. w. t. Abyssinien, Arabien.

Refaria L., v. Bejaria.

Begonia L., Begonie, Schiefblatt.

albo-coccinea Hook., weifs- und scharlachfarbiges, 4. w. Ostindien.

Barkeri Knowl. et Westc., Barker's, 4. ☿. w. Mexico.

besleriaefolia Schott, besleriablätteriges, ☿. w. Brasilien.

bulbillifera Lk. et Otto, zwiebeltragendes, 4. Kn. w. Mexico.

caffra Meisn. (= *sinuata* E. Mey., Otto et Dietr.), kaffersches, ☿. w. t. Cap der guten Hoffnung.

coccinea Hook., scharlachfarbiges, ☿. w. Brasilien.

crassicaulis Lindl., dickstengliches, ☿. w. Guatimala.

cucullata W., kappenförmiges, ☿. w. Brasilien.

fagifolia Fisch., Brasilien.

gracilis H. B., schlankes, ☉. ☿. w. Mexico.

heracleifolia Cham. et Schltdl., β) *radiata* Grah. (= *tanacetifolia* Hort.).

hirtella Lk., Antillen.

homonyma Steud. (= *sinuata* Bot. mag. Grah. non Wall.), gleichnamiges, ☿. w. Brasilien.

Hookeri Sweet (= *semperflorens* Hook.), Hooker's, ☿. w. ?

hydrocotylefolia Hook. (= ? *manicata* Hort.), wasser-nabelblätteriges, ☿. w. ?

incana Lindl., weifsgraues, ☿. ☿. w. Mexico.

incarnata Lk. et Otto (= *insignis* Grah. = *ciliata* Hort.).

Lindleyana Walpers (= *vitifolia* Lindl. non Schott.), Lindley's, ☿. ☿. w. Guatimala.

manicata Visiani, ärmelartiges, ☿. w. Südamerika.

β) *hybrida*.

parviflora E. Mey., kleinblumiges, ☉. ☿. w. t. Cap der guten Hoffnung.

peltata Otto et Dietr., schildförmiges, ☿. ☿. w. Mexico.

pentaphylla Walpers (= *muricata* Scheidw.), fünfblät-teriges, ☿. ☿. w. Brasilien.

Porteriana Fisch., Mey. et Lallemand, Porter's, ☉. w. Brasilien.

punctata Klotzsch non Hort., punktirtes, 4. w. Mexico.

rhizocarpa Fisch., wurzelfrüchtiges, ☉. 4. w. Südamerika.

suffruticosa Meisn., halbstrauchiges, ☿. w. t. Cap der guten Hoffnung.

suaveolens Haw. (= *odorata* W. E. = *humilis* Lindl.).

vitifolia Schott (= *grandis* Otto = *reniformis* Hook. = *truncata* Vellozo).

*Walpersii** (= *Ottonis* Walpers), Walpers's, ☿. ☿. w. Caracas.

Von nachstehenden ist mir Autor und Vaterland unbekannt, als: *hernandiaefolia*, *jatrophaefolia*, *rubricaulis*, *rupestris*, *zebrina*, *zebrina purpurea*.

Hybriden: *caulostigma purpurea et viridis*, *laetevirens*, *acuminata*, *argyrocelis* van Houtte, *erythrophylla* van Houtte.

elatior Hort., v. *reniformis et vitifolia*, *eriocaulis* Visian. = *Meyeri*, *nervosa* Hort. (= ?), *parvifolia* Hort. = *Dregei*, *peponifolia* Hort. = *macrophylla*, *populifolia* Schott. = *scandens*, *suaveolens* Hort. = *diptera*.

Beilia spicata Eckl., v. *Watsonia spicata*, p. 856.

Bejaria Mutis, Bejarie (= *Befaria* Auct. p. 116).

glauca Humb. B. et var. *Makoyi*.

ledifolia Humb. B., porstblätterige, ♀. t. Neugranada.

mexicana Benth., mexicanische, ♀. t. Mexico.

racemosa Vent. (= *paniculata* Mchx.).

Belladonna blanda Sweet, *pudica* Sweet, *purpurascens* Sweet, v. *Amaryllis blanda*, *pudica et Belladonna*, p. 44 et 45.

Bellevalia Lapeyr., Bellevalie.

ciliata N. E. (= *Hyacinthus ciliatus* Cyrill. = *sarmaticus* Pall. = *Muscari ciliatum* Ker, p. 534).

comosa Kunth (= *Hyacinthus comosus* L. = *Muscari comosum* Mill., p. 534, β) *monstrosa* Kunth (= *Hyac. monstrosus* L. = *Muscari paniculatum* Medic.), γ)

fuliginosa Kunth (= *Hyac. fuliginosus* Pall.), δ) *flore albo*, ε) *flore carneo*.

dubia Rehb. (= *Hyacinthus dubius* Guss.).

glauca Kunth (= *Muscari glaucum* Lindl., p. 534).

lineata Kunth (= *Hyacinthus ciliatus* Fleisch. = *H. lineatus* Steud.), *linirte*, 4. Zw. f. b. Smyrna.

maritima Kunth (= *Hyacinthus maritimus* L. = *Muscari maritimum* Dsf., p. 535).

romana Rehb. (= *appendiculata et operculata* Lapeyr.), = *Hyacinthus romanus* L. = *Scilla romana* Ker).

sessiliflora Kunth (= *Hyac. sessilifl.* Vivian. = *Muscari sessiliflorum* Spgl.), *stiellösblumige*, 4. Zw. f. b. Aegypten, Syrien.

trifoliata Kunth (= *Hyacinthus trifolius* Tenore), *dreiblättrige*, 4. Zw. f. b. Apulien, Persien, Cypern.

Bellis T., Gänseblümchen.

dentata DC. (= *annua* L. var. Spgl. = *Bellium bellidioides* Dsf. non L. = *Bellium dentatum* Vivian.), *gezahntes*, ☉. f. Südeuropa.

Bellium L., Massliebe.

rotundifolium DC. (= *giganteum* Cass. = *Doronicum rotundifolium* Dsf.), *rundblättrige*, 4. k. Atlas.

annuum Less = *Bellis annua*.

Belmontia E. Mey., Belmontie, IV. 1., Contortae-Genetianeae.

cordata E. Mey. (= *Sebaea cordata* RBr., p. 737 = *Exacum cordatum* L. suppl.).

Ohlendorffii Griseb. (= *Sebaea Ohlendorffiana* Eckl.), *Ohlendorff's*, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

Beloperone N. E., v. *Justicia* II. p. 434.

Belvisia coerulea Desv., v. *Napoleona imperialis*.

Bembycodium Kunze, Bembycodie, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae).

Athanasiae Kunze, Athanasiaähnliche, ♀. k. Cap d. g. H.

Benthamia Lindl., Benthamie.

japonica Sieb. et Zuccar., japanische, ♀. k. Japan.

Benzoin N. E., Benzoinlorbeer, XI. 1., Laurineae.

aestivale N. E. (= *Laurus aestivalis* Wangenh., p. 448 = *Evosmus aestivalis* Nutt. = *Laurus Benzoin* W. et Hort. non L.), Sommer-B., ♀. f. Carolina, Virginien.

melissaefolium N. E. (= *B. Diospyros* Sw. = *Evosmus Diospyros* Nutt. = *Laurus Diospyros* Pursh, p. 449 = *Tetranthera Diospyros* Spgl.), melissenblättrige, ♀. f. b. Carolina, Virginien.

odoriferum N. E. (= *Evosmus Benzoin* Nutt. = *Laurus Benzoin* L., p. 448 = *L. Pseudo-Benzoin* Mchx.), ächter, ♀. f. Nordamerika.

Benzoin officinale Heyne, v. *Styrax Benzoin*.

Berardia Brogn. (= *Nebelia* Sweet), Berardie, V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.

affinis Brogn., ähnelnde, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

fragarioides Schldtl. (= *Brunia fragarioides* W., p. 134 = *Heterodon fragarioides* Meisn.).

paleacea Brogn. (= *Brunia paleacea* Thbg.), spreuige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

phylicoides Brogn. (= *Brunia phylicoides* Thbg.), phyllicähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Berberis T., Sauerdorn.

actinacantha Mart., strahlendorniger, ♀. k. f. b. Chili.

aristata DC. (= *Chitria* Hamilt., p. 118 = *angustifolia* Roxb. = *floribunda* Wall. = *petiolaris* Wall.).

articulata Loisel. (= *provincialis* Audib.?) gegliederter, ♀. f. Südfrankreich.

asiatica Roxb. (= *ilicifolia* Roxb. non Forst.).

chilensis Gill., chilesischer, ♀. f. b. k. Chili.

dentata Tausch, gezahnter, ♀. f. ?

β) *latifolia*, γ) *capitata*.

integerrima Bunge, ganzblättriger, ♀. f. Samarkand.

nitens Schrad. (= β *cretica* Sieb.), Griechenland.

Nummularia Bunge, rundblättriger, ♀. f. Samarkand.

spathulata Schrad. (= *canadensis* Lk. Hayne), spatelblättriger, ♀. f. Nordamerika.

umbellata Wall. (= *angulosa* Wall. = *Wallichiana* et *floribunda* Auct. et Hort.), doldiger, ♀. k. f. b. Nepal.

vulgaris L., η) *alba* Mill., θ) *dulcis* Hort., ι) *macroacantha* Schrad. (= *sicula* Jan. = *aetnensis* Presl), x)

innominata Fisch. (= *aurea* Tausch = *sibirica* Hort.), *asperma* Clus. = *apyrena*, *lutea* L'Her. = *flava*.

altaica Pall., *sibirica*, *amricana* Lodd. (= ?), *atroviridis* Wall. = *Wallichiana* DC., *Bigelowii* Schrad. = *crenulata*, *ilicifolia* Booth = *crataegina*, *ilicifolia* Hort. = *heterophylla*, *pauciflora* Salisb. = *cretica*. Die übrigen s. Mahonia.

Berckheya cernua RBr., v. *Didelta cernuum*, p. 262.

B. fruticosa Ehrh. = *incana*.

Bergia L., Bergie.

aminannioides Roth (= *pentandra* Guillem.), Ammannia-ähnliche, ☉. f. m. Senegambien, Ostindien.

aquatica Roxb. (= *verticillata* W. non Lam. = *capensis* L. mant. = *Elatine luxurians* Delil. = *E. verticillata* Wight, Arn.), Wasserliebende, ☉. Wa. f. Aegypten, ? Cap, Ostindien.

trimera Fisch. et Mey. (= *Lechea verticillata* W. =

Bergia

B. ammannioides Wight non Roth.), dreizählige, ☉. f. Ostindien.

Beringeria Neck., Beringerie.

frutescens Rchb. (= *Ballota spinosa* Lk. = *Molucella frutescens* L.), strauchige, ♀. f. b. Frankreich.

mollissima Benth., (= *Ballota mollissima* Benth.) = *Marrubium cinereum* et *scrophulariaefolium* Hortul.), weichblättrige, 4. f. Spanien.

rugosa Benth. (= *Ballota rugosa* Benth. = *Marrubium rugosum* Dsf.), runzelige, 4. f. Orient.

Bernhardia W., Bernhardie.

complanata W. (= *Psilotum complanatum* Sw. = *P. dichotomum* Hort.), verflachte, 4. w. Westindien.

Berteroa DC., Berteroa.

adscendens C. Koch, aufsteigende, ♂. f. Iberien, Mingrelien.

orbiculata DC., kreisförmige, ♂. ♀. f. b. k. Griechenland.

procumbens Portenschlag, niederliegende, ♂. f. Dalmatien.

Bertiera Aubl., Bertiera, V. 1., Rubiaceae.

coccinea G. Don, scharlachfarbige, ♀. w. Sierra-Leone.

Bertolonia glandulosa Spin., v. *Myoporum viscosum*, p. 536.

Berula angustifolia K. et *lancifolia* Bess., v. *Sium angustifolium* et *lancifolium*, p. 763.

Berzelia Brogn., Berzelie.

arachnoidea Eckl. et Zeyh. (= *Brunia arachnoidea* Wendl.), spinnengewebige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

comosa Eckl., Zeyh. (= *Brunia comosa* Thbg., p. 134).

ericoides Eckl., Zeyh. (= *Brunia ericoides* Wendl., p. 134).

formosa Eckl., Zeyh. (= *Brunia formosa* D. Dietr. non Dum. Cours.), schöne, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

rubra Schldl. (= *Brunia rubra* W. = ? *Brunia squarrosa* Thbg.), rothe, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

superba Eckl., Zeyh. (= *Brunia speciosa* Hort. = *Brunia superba* Don, p. 134 = *Heterodon superbus* Meisn.).

Wendlandiana Eckl., Zeyh. (= *Brunia paleacea* Wendl., non Thbg.), Wendland's, ♀. t. Cap d. g. H.

Besleria Plum, L., Beslerie.

flavo-virens Mart. (= *luteo-virens* N. E.), gelbgrüne, ♀. w. Brasilien.

Noch kommen in den Gärten, ohne nähere Angabe des Autors und Vaterlandes, folgende vor: *B. pubescens*, *purpurea* et *semialata*.

B. bicolor Schott (= *dichrus* Spgl.), *coccinea* Aubl., *cristata* L., v. *Alloplectus bicolor* etc., *Drymonia* Steud., *grandiflora* H. B., *serrulata* Jacq., v. *Drymonia calcarata* etc., p. 277, *melittifolia* L., v. *Episcia melittifolia*, *sanguinea* P., v. *Tussacia sanguinea*, *scandens* Moç., Sess., v. *Lophospermum scandens*, *splendens* Hort., v. *Drymonia spectabilis*.

Bessera Schult. fil. (S. J. G. v. Besser, kaiserl. russ. Staatsrath und Prof. d. Botanik zu Kiew, †), VI. 1., Coronariae- (Liliaceae) Asphodeleae.

elegans Schult, fil. (= *Herberti* G. Don = *Pharium fistulosum* Herb., p. 612), zierliche, 4. Zw. k. t. Mexico.

Betonica L., Zehrkrout.

hirsuta L., b) flore albo.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *alba pura* Hort., *macrostachys* Wender., *rosea* Hort., *rubicunda* Wender., *superba* Hort., *affinis* Wender. = *officinalis* γ *stricta*, *lutea* Mill. = *Alopecuros*.

Ungewifs: *Morisonii* et *tenuifolia* Hort.

Betula T., Birke.

humilis Schrank. (= *fruticosa* Auct. non Pall.), niedrige, f. f. Mittel- und Norddeutschland, Ukraine.

β) *oycoviensis* Bess. (= *Sokolowii* Jacq.), p. 870¹).

microphylla Bunge, kleinblättrige, f. f. Altai.

nana L., β) *major* Hort., Vindob., γ) *stricta* Lodd.

papyracea Ait., var. *undulata* Hort., Vindob.

Varietäten und Hybriden (?): *glauca* Wender., *intermedia* Thom., *juncea* Hort., *myrsinoides* Tausch, *rhombifolia* Tausch, *urticaefolia* Court.

Beureria Jacq., Beurerie.

aspera G. Don (= *Ehretia aspera* Roxb., p. 283 = *E. tomentosa* Heyne).

cestroides Speg. (= *Freylinia cestroides* Colla non Benth.), Hammerstrauchähnliche, f. w. Südamerika.

divaricata G. Don (= *Ehretia divaricata* DC., p. 283).

laevis G. Don (= *Ehretia laevis* Roxb., p. 283).

laxa G. Don (= *Ehretia laxa* Jacq., p. 283).

Biarum Schott, Endl., Doppelzehrwurz, XXI. ix., Aroideae.

Bowei Decaisne (= *Caladium Bowei* Steud., *Bowei's*, f. b, k. Syrien.

gramineum Schott (= *Arum gramineum* Lam., p. 85), Südeuropa.

tenuifolium Schott (= *Arum tenuifolium*, p. 87).

Biasolettia nodosa Bertol., v. *Chaerophyllum nodosum*, p. 186.

B. tuberosa K., v. *Freyera Biasolettiana*.

Bidens T., Zweizahn.

affinis Kl. et Otto, ähnlicher, \odot f. Cuba.

anthriscoides DC., klettenkörbelähnlicher, \odot f. Mexico.

californica DC., californischer, \odot f. Californien.

carnea Heer, fleischfarbiger, f. w. Guiana.

caucalidea DC., Haftdoldenähnlicher, \odot f. Mexico.

chilensis DC. (= *bipinnata* Hook. non L. = *vulparadiasiaca* Colla), chilesischer, \odot f. Chili.

ciliata Hoffmeg., gefranzter, \odot f. Brasilien.

Coreopsis DC. (= *Coreopsis chrysantha* Speg. non L.), wanzenblumenähnlicher, f. w. Jamaika.

β) *Coreopsis reptans* L., γ) *incisa* Ker. Vergl. p. 218 et 219.

dichotoma Dsf., P. (= ? *reflexa* Lk.), gabelästiger, \odot f. w. Brasilien.

ferulaefolia DC. (= *Coreopsis ferulaefolia* Jacq., p. 218 = ? *Coreopsis incurva* Mch. = *Kerneria ferulaefolia* Cassin.).

fruticosa DC. (= *Coreopsis fruticosa* Vest.), strauchiger, f. k. ?

grandiflora (= *diversifolia* W. et Hort. = *odorata* Hort. = *quinqueradiata* Zea, *serrulata* Dsf. = *Coreopsis diversifolia* Jacq. et *serrulata* Poir., *Cosmea lutea* Sims, *Kerneria serrulata* Cassin).

1) Ist p. 121 als Synonym zu streichen.

Bidens

- hispidula* H. B. K. (= *decussata* Pavon. et Hort. = *leucantha* Auct.), steifhaariger, ☉. f. Venezuela.
paleacea Visian., spreuiger, ☉. f. Nubien.
parviflora W. (= *macrosperma* Fisch. = *multifida* Dsf. = *pauciflora* Poir.).
quadrangularis DC., vierkantiger, ☉. f. Brasilien.
quadriaristata DC. (= *chrysanthemoides* Pursh, Bigel. non Mchx.), viergranniger, ☉. f. Nordamerika.
striata Sweet, gestreifter, ☉. f. Mexico.
tenella L., zarter, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.
 Gartenerzeugnisse: *cicutaeifolia* Tausch (= *bipinnata* Hort.), ☉., *elongata* Tausch, ☉., *myrrhidifolia* Tausch, ☉., *tenuifolia* Tausch (= *bipinnata* var. Hort.), ☉.
apiifolia L., v. *Chrysanthellum procumbens*, p. 192,
fusca Lam., *oleracea* Cav., v. *Spilanthes oleracea* et var. *fusca*.

Bifrenaria Lindl., Doppelstendel.

atropurpurea Lindl. (= *Maxillaria atropurpurea* Lodd., p. 500).

longicornis Lindl., Demerara p. 121.

vitellina Lindl., dottergelbe, 4. w. Südamerika.

Bigelovia DC. (Bigelow, Prof. d. Botanik in Boston), XIX. I. (II.), Compositae-Corymbiferae.

dracunculoides DC. (= *Chrysocoma dracunculoides* Pursh.).

missouriensis DC. (= *Chrysocoma nauseosa* Pursh.).

nudata DC. (= *Chrysocoma nudata* Mchx.).

uniligulata DC. (= *Solidago pauciflosculosa* Mchx., p. 771).

virgata DC. (= *Chrysocoma virgata* Nutt.)

viscidiflora DC. (= *Crinitaria viscidiflora* Hook.), schmiegrigblumige, 4. 5. f. k. Nordwestl. Amerika.

Vergl. p. 194 und daselbst zu berichtigen.

Bigelovia porulosa Sm., v. *Borya porulosa*, p. 128.

Bigelovia commutata Speg. etc., p. 121, v. *Borreria verticillata* etc.

Bignonia T., Juss., Bignonie.

aequinoctialis L., β) *spectabilis* Vahl, Speg.

Carolinae Lindl., Carolina's, 5. t. w. ? Buenos Ayres.

fallax Cham. (= *Amphilophium pubescens* Speg., p. 49), trügerische, 5. Sch. w. Brasilien.

Lindleyi DC. (= *picta* Lindl. non Humb. Bonpl.), Lindley's, 5. Sch. w. Bonaria.

speciosa Hook., prächtige, 5. Sch. w. Bonaria.

Tweediana Lindl., Tweedie's, 5. Sch. w. Bonaria.

Unbestimmtere:

fraxinea Dsf., eschenähnliche, 5. ? w. ?

hirtella Brotero (? = *hirta* Velloz.), kurzhaarige, 5. w. Brasilien.

lucida Lodd., glänzende, 5. w. Südamerika.

(Dahin gehören auch: *crenata* Lodd., *multifida* Lodd, *purpurea* Lodd., *quadrangularis* Lockhart, vgl. p. 122).

adenophylla Wall. = *Spathodea stipulata*, *aesculifolia*

H. B. = *Tecoma aesculifolia*, *Aesculus* Dsf. = *Tecoma Aesculus*,

alba Aubl. = *Spathodea bracteosa*,

amoena Wall. = *Spathodea* ? *amoena*, *articulata* Dsf.

= *Phyllarthron Noronhianum*, *australis* Ait. (= *Pandorana* Andr.),

chinensis Lam. (= *glauca* Decaisn.

= *grandiflora* Thbg.), *chrysantha* Jacq., *incisa* Lodd.

Bignonia

etc., v. *Tecoma australis*, *grandiflora*, *chrysantha*, *incisa* etc., *Catalpa* L. = *Catalpa bignonioides* Walt. (= *cordifolia* Mch., *syringaeifolia* Sims, p. 172), *chelonioides* L. fil. = *Stereospermum chelonioides*, *Colei* Boj. (= *mauritiana* Hort.) et *Telfairiae* Boj., v. *Colea mauritiana* et *Telfairiae*, *cordata* Velloz., v. *Lundia cordata*, *filiifolia* Anders., v. *Jacaranda filicifolia* p. 428, *fluviatilis* Aubl. = *Tabebuia fluviatilis*, *frutescens* Mill. (= *stans* L.) = *Tecoma stans* p. 800, *jasminoides* Cunn. et *floribunda* Hort. = *Tecoma jasminoides* et *floribunda*, *lactiflora* Vahl = *Distictis lactiflora*, *latifolia* Rich. = *Tabebuia latifolia*, *Leucoxydon* L., v. *Tecoma Leucoxydon*, *Manglesii* Hort. = ? *Tecoma*, *meonantha* Lk. = *Tecoma australis* β s. *meonantha* p. 799, *Pareira* Hort. (?), *rigescens* Jacq. = *Distictis rigescens*, *rivularis* Hort. Kew. (= *viridiflora* Lodd. = *antisiphilitica* Mart.) = *Cystibax antisiphilitica*, *serratifolia* Vahl = *Tecoma serratifolia*, *serrulata* Wall. = *Spathodea serrulata*, *suberosa* Roxb. = *Millingtonia hortensis*, *triphylla* L. = *Tabebuia triphylla*, *tuberculata* Roxb. (= *pentandra* Lour. = *indica* var. α Blume), v. *Calosantes indica*, *uncinata* G. F. W., Mey., v. *Macfadyena uncinata*.

Billardiera Sm., Billardiere.

scandens Sm. (= *canariensis* Hort.), klimmende, \S . Sch. t. Neuholland.

Unbestimmtere:

melocarpa Hort., melonenfrüchtige, \S . Sch. t. Neuholland.
purpurea Hort., purpurfarbige, \S . Sch. t. Neuholland.
grandiflora Putterl. und *latifolia* Putterl., beide \S . und in Neuholland heimisch, werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt; *angustifolia* DC. (*salicifolia* Hort.) et *fusiformis* Labillard, v. *Sollya angustifolia* et *heterophylla*, p. 771, *rosmarinifolia* DC. = ? *Pronaya speciosa*, *variifolia* DC. = *Marianthus coelestis*.

Billbergia Holm et Thbg., Billbergie.

acaulis Hort. belg., stengellose, 4. w. Brasilien.

α) *foliis fusco-variegatis* (= *zebrina* Lindl.), β) *foliis luteo variegat.* Hort. belg.

bicolor Schult. fil. (= *Bromelia bicolor* Molin.), zweifarbige, 4. w. t. Chili.

Loddigesii Steud. (= *bicolor* Lodd. non Schult.), Loddige's, 4. w. Brasilien.

Quesneliana Hort. belg., Quesnel's, 4. w. Südamerika.

speciosa Holm et Thbg., prächtige, 4. w. Brasilien.

Unbestimmtere: *farinosa* Hort., *pulverulenta* Hort.

discolor Hort. belg. = *Bromelia discolor*, p. 132,

fasciata Lindl., v. *Hohenbergia fasciata*, *latifolia*

Hort. belg., v. *Bromelia latifolia*.

Billiotia RBr., G. Don (= *Agonis* DC.), Billiotie, XII. 1., Myrtaceae.

elliptica Sweet (= *Leptospermum ellipticum* ? Endl.), elliptische, \S . t. k. Neuholland.

flexuosa RBr., G. Don, Endl. (= *Leptospermum flexuosum*, p. 456 = *L. resiniferum* Bertol. = *glomeratum* Wendl. = *Metrosideros flexuosa* W.).

*hypericifolia** (= *thaeiformis* C. Schauer = *Leptospermum hypericifolium* Otto et Dietr. = *L. thae-*

Billiotia

- forme, A. Cunningh. *Agonis hypericifolia* Schauer),
johanniskrautblättrige, ꝑ. t. k. Neuholland.
linearifolia G. Don, C. Schauer (= *Leptospermum li-*
nearifolium DC.), gleichbreitblättrige, ꝑ. t. k. Neu-
holland.
marginata RBr., G. Don (= *ovatifolia* Sweet = *Lep-*
tospermum marginatum LaBill., p. 455 = *L. ovati-*
folium Sweet = *Fabricia myrtifolia* Hort. non G.).
β) *angustifolia* (= *Fabricia angustifolia* Otto).
saligna Sweet (= *Leptospermum salignum* Steud.),
weidenähnliche, ꝑ. t. k. Neuholland.
Billotia acerosa Colla, p. 123 = *Calothamnus*
quadrifida, p. 149.
Birnbaumia quadrifida Kosteletzky, v. *Justicia qua-*
drifida, p. 435.

Biscutella L., Brillenschote (Doppelschild).

- dilatata* Visian. (= *hispida* var.), verbreiterte, ☉. f.
Dalmatien.
erucifolia Rchb., rankenblättrige, ☉. f. ?
incana Tenore, weißgraue, 4. ꝑ. f. Neapel.
leiocarpa DC. (= *apula* G. *orientalis* Dsf.), glattfrüch-
tige, ☉. f. Orient.
obovata DC., verkehrteiförmige, ☉. f. ?
ambigua Wallr. non DC. (= *varia* Dumort. α *foliosa*
et β *scaposa*) = *laevigata*, *intermedia* Gouan (= *vari-*
abilis Loisel.) = *saxatilis*, *laciniata* W. (= *maxima*
Pall. = *megalocarpa* Fisch.) = *Megacarpaea laciniata*,
macrocarpa Hort. = *hispida*, *major* Sckk. = *auri-*
culata β, *marginata* Tenor. = *lyrata*, *pumila* Balb.
= *maritima*, *stenophylla* Dufour = *coronopifolia*,
tumidula Lagasca = *Columnae* β.

Bismalva Alcea Medic. et *moschata* Medic., v. *Malva*
Alcea et *moschata*, p. 490 et 491.

Bistella geminiflora Caill. et Delil., v. *Vahlia*
Weldenii.

Blaberopus A., DC., Giftsäftler, V. 1., Contortae-
Apocynae.

- neriifolius* A. DC. (= *Alstonia neriifolia* Wall., Don,
p. 39).
venenatus A. DC. (= *Echites venenata* Roxb. = *Al-*
stonia venenata RBr.), ächter, ꝑ. w. Ostindien.
Bladhia crispera Thbg., *glabra* Thbg., *japonica*
Hornst., *villosa* Thbg., v. *Ardisia crispera*, *glabra*,
japonica et *pusilla*.

Blackwellia Commers., Blackwellie.

- pubiflora* Lindl., behaartblumige, ꝑ. t. China.
tomentosa Vent., filzige, ꝑ. w. Java.
fugifolia Lindl. = *padifolia*.

Blaeria L., Blaerie.

- barbigera* D. Don (= *revoluta* Bartl. = *Erica barbi-*
gera Salisb.), bärtige, ꝑ. t. Cap der gut. Hoffn.
ericoides L. (= *rubra* Hort.).
purpurea L. (= *dumosa* Wendl., Don = *equisetifolia*
Don = *jucunda* Rchb. = *Erica dumosa* Salisb. =
E. equisetifolia Salisb. = *E. purpurea* Thbg.
articulata L. (= *eriantha* W.), *fasciculata* W.
et *scabra* W. = *Syndesmanthus articulatus* etc.,
p. 795, *bracteata* Wendl. (= *articulata* W.) =
Sympieza capitellata, p. 795, *bicolor* Kl. = *de-*

Blaeria

pressa Lichtenst. et *glabella* W. = *Simocheilus* bicolor etc., p. 885, *ciliaris* L. fil. = Griesbach. *ciliaris*, p. 307, *muscosa* Ait., v. *Scyphogyne* inconspicua, *nodiflora* Don = *Grisebachia plumosa*, p. 307, *ptilota* Drege = *Grisebachia hispida*, p. 307, *paucifolia* Wendl., v. *Syndesmanthus paucifolius*.

Blainvillea Cass., DC., (Blainville, franz. Naturforscher).
biaristata DC., zweigrannige, ☉. f. Rio grande.

latifolia DC. (= *Eclipta latifolia* L. suppl., p. 283 = *Verbesina Lavenia* Roxb. non L.).

rhomboidea Cass. (= *Verbesina dichotoma* Murray, p. 840 = *Verbes. lanceolata* Poir.), rautenförmige, ☉. f. m. Brasilien.

Blakea triplinervia L. fil. = *B. quinquenervia*, p. 124.

Blandfordia Sm., Blandfordie.

punicea G. Don, Sweet (= *marginata* Herb. = *Aletris punicea* LaBill.), dunkelrothe, 4. t. Neuholland.

speciosa H. Anglor., prächtige, 4. t. ?

Blaxium decumbens Cass., v. *Dimorphotheca fruticosa*, p. 265.

Blechnum L., Rippenfarn.

brasiliense Desv. (= *nitidum* Presl = *corcovadense* Raddi = *campestre* Hort.).

glandulosum Kaulf. non Lk.

intermedium Lk. (excl. synonym. Kaulf.), mittlerer, 4. w. Brasilien.

serrulatum Mchx., β) *angustifolium* W., γ) *calophyllum* Langsd. et Fisch. (= *stagninum* Raddi).

triangulare Lk., dreiwinkliger, 4. w. Mexico.

auriculatum Endl. (= *punctulatum* Sw.) = *Lomaria punctulata*, *australe* L. mant. (= *rigidum* W. = *auriculatum* L. spec.) = *Lomaria australis*, *glandulosum* Lk. = *polypodioides* Raddi.

Blepharacanthus N. E. Kelchklau, XIV. II., Acanthaceae.

capensis N. E. (= *Blepharis capensis* P., p. 125).

carduifolius N. E. (= *Acanthus carduifolius* Thbg., p. 7).

furcatus N. E. (= *Blepharis furcata* P., p. 125).

integrifolius N. E. (= *Blepharis saturejaefolia* Juss., p. 125).

procumbens N. E. (= *Blepharis procumbens* P., p. 125).

Blepharipappus Hook., DC. (= *Eriopappus* Arn. non Dumort.), Kelchfederchen (Wollfederchen), XIX. II., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae).

glandulosus Hook., drüsiges, ☉. f. Columbia.

scaber Hook., scharfes, ☉. f. Columbia.

Blepharis capensis P. etc., p. 125, v. *Blepharacanthus capensis* etc.

Blephilia Rafin., Blephilie, II. I., Labiatae.

ciliata Rafin. (= *Monarda ciliata*, p. 528).

hirsuta Benth. (= *nepetoides* Rafin. = *Monarda hirsuta*, p. 529).

Bletia R. et P., Bletie.

atropurpurea H. Berol., schwarzpurpurrothe, 4. Kn. w. ? Südamerika.

campanulata Llave, glockige, 4. Kn. w. Mexico.

coccinea Llave, scharlachfarbige, 4. Kn. w. Mexico.

humilis Lk. et Otto, niedrige, 4. Kn. w. Mexico.

Bletia

- obcordata Lindl., verkehrtherzförmige, 4. Kn.w. Ostindien.
 Parkinsonii Bot. mag., Parkinson's, 4. Kn. w. Mexico.
 punctata Llave, punktirte, 4. Kn. w. Mexico.
 purpurea DC. hort. Genev., pupurfarbige, 4. Kn. w.
 ? Südamerika.

alta Hort. = *verecunda*, *autumnalis* Llave = *Amalia*
 (= *Laelia*) *autumnalis*, *flava* Wall. (= *Woodfordii*
 Hook.) = *Phajus maculatus*, *grandiflora* Llave =
Amalia (= *Laelia*) *grandiflora*, *Tankervilleae* RBr.,
 v. *Phajus grandifolius*.

Blighia sapida Koen, v. *Cupania Akeesia*.

Blitanthus nepalensis Rehb. = *Acroglochin chenopodioides*, p. 16.

Blitum L., Erdbeerspinat.

- chenopodioides* Lam. (= *tataricum* Mill.).
Nuttallianum Nutt. (= *chenopodioides* Nutt. non Lam.),
 Nuttall's, ☉. f. Missouri.
petiolare Lk. (= *chenopodioides* Bernh. non Lam.), ge-
 stielter, ☉. f. ?
crassifolium Rehb. et *polymorphum* C. A. Mey., v.
Chenopodium crassifolium et *astracanicum*, minus
 Hort (? =).

Blumea DC., Blumea.

- Dregeana* DC. (= *Conyza amoena* Lk., p. 216), Dre-
 ges, 4. w. Südl. Afrika, Congo.

Blumia Candollei N. E. = *Talauma Candollei*, p. 797.

Blyttia Fr. (Blytt, Prof. der Botanik in Christiania), III. II., Gramineae.

- suaveolens* Fr. (= *Agrostis suaveolens* Blytt), gutrie-
 chende, 4. f. Norwegen.

Boisduvalia Spach, Boisduvalie, VIII. I., Onagrariae.

- concinna* Spach (= *Oenothera concinna* D Don = *O.*
humifusa Lindl., p. 555 = *subulata* Hook.).

Douglasii Spach (= *Oenothera densiflora* Lindl., p. 554).

Boissiera Hochst., (E. Boissier, franz. Botaniker und Reisender), III. II., Gramineae.

- bromoides* Hochst. (= *Pappophorum sinaicum* Trin.),
 trespenähnliche, ☉. f. Sinai.

Bolbophyllum v. *Bulbophyllum*.

Boldoa Juss. (D. Boldo, span. Botaniker), XXII. XI., Monimieae.

- fragrans* Endl. (= *Peumus fragrans* P., p. 611 = *Bol-*
du chilanum N. E. = *P. Boldus* Molina = *Ruizia*
fragrans Pavon).

Boldoa lanceolata Lagasc. et *purpurascens* Cav.,
 v. *Salpianthus arenarius* et *purpurascens*.

Boltonia L'Her., Boltonie.

- diffusa* Ell. (= *asteroides* Bot. mag. non L'Her.) =
Anonymus asteroides Mchx.), weitschweifige, 4. f.
 Nordamerika.

Bomarea Mirb.

acutifolia Hook., *edulis* Hook., *hirtella* Hook., *ovata*
 Mirb., *Salsilla* Mirb. = *Alstroemeria acutifolia* etc.,
 p. 39 et 40.

Bombax L., Wollblume.

- microphyllum* H. belg., kleinblättrige, 5. w. ? Ostindien.
insigne Wall. et *malabaricum* DC. (= *heptaphyllum*
 Cav. = *Ceiba* Burm. = *Gossampinus rubra* Hamilt.),
 v. *Salmalia insignis* et *malabarica*, *parviflorum*

Bombax

Mart. et pubescens Mart., v. *Eriotheca parviflora* et pubescens.

Bombyx phoenicea Mch., v. *Hibiscus phoeniceus*, p. 396.

Bonannia dissecta Presl et *officinalis* Presl, v. *Sinapis dissecta* et *alba*, p. 760.

Bonannia nitida Rafin., v. *Cupania Akeesia*.

Bonapartia v. *Buonapartea*, p. 138.

Bonatea W., *Bonatea*.

Bilabrella (= *Bilabrella falcicornis* Lindl.), zweilippige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

foliosa Lindl. (= *Orchis foliosa* Sw.), blattreiche, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

Bonaveria Scop., *securigera* Endl. (= *Securigera Coronilla* DC., p. 738).

Bonelia Cavanillesii Bertero, v. *Jacquinia macrocarpa*, p. 428.

Bongardia Bongardie.

Olivieri C. A. Mey. (= *Leontice Olivieri* Steud. = *L. altaica* Pall.), Olivier's, 4. Kn. f. b. Sibirien, Bessarabien, Insel Chio.

Rauwolfii C. A. Mey. (= *Leontice Chrysogonum* L., p. 452).

Bonjeanea Rchb., *Bonjeanea*, p. 871.

microphylla Rchb. (= *Lotus microphyllus* Hook., p. 478).

recta Rchb. (= *Lotus rectus* L. = *Dorycnium rectum* Sering., p. 272).

Booram G. Don, v. *Rhododendron* I. p. 684.

Borago L., v. *Borrago*.

Borbonia L., *Bourbonie*.

Candolleana Eckl., Zeyh. (= *ciliata* DC. non W.), Candolle's, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

villosa Thbg., zottige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

capitata Poir., *laevigata* Poir., *myrtifolia* Poir. etc., v. *Priestleya capitata* etc., p. 655, *cordata* Andr.

non L., v. *Rafnia triflora*, p. 675, *ericaefolia*, v. *Amphithalea ericaefolia*.

Borckhausenia lucida Roth, v. *Teedia lucida*, p. 800.

Borkhausia Lk., Spgl. v. *Barkhausia*.

Boronia Sm., *Boronie*.

anethifolia A. Cunningh., dillblättrige, 5. t. Neuholland.

cynosa Endl., afterdoldige, 5. t. Neuholland.

dichotoma Lindl., zweizinkige, 5. t. Neuholland.

Fraseri Hook. (= *anemonifolia* Paxton, nec All. Cunn.),

Fraser's, 5. t. Neuholland.

lanuginosa Endl., wollige, 5. t. Neuholland.

mollis A. Cunningh., weiche, 5. t. Neuholland.

nana Hook., zwergige, 5. t. Neuholland.

ovata Lindl., eiförmige, 5. t. Neuholland.

paleifolia A. Cunningh., spreublättrige, 5. t. Neuholland.

Rinzii Hügel, Rinz's, 5. t. Neuholland.

rosmarinifolia A. Cunningh., rosmarinblättrige, 5. t.

Neuholland.

rubiginosa All. Cunningh., rostfarbige, 5. t. Neuholland.

salicifolia A. Cunningh., weidenblättrige, 5. t. Neuholl.

scabra Lindl., scharfe, 5. t. Neuholland.

spatulata Lindl., spatelblättrige, 5. t. Neuholland.

teretifolia Lindl., stielrundblättrige, 5. t. Neuholland.

ternata Endl., dreizählige, 5. t. Neuholland.

Boronia

- triphylla Sieber, dreiblättrige, f. t. Neuholland.
 a) foliolis linearibus, β) foliolis ovalibus, s. latifolia Lindl.
 variabilis Hook., veränderliche, f. t. Van Diemens Land.
 viminea Lindl., ruthenartige, f. t. Neuholland.
Borrigo orientalis L., v. *Trachystemon orientales*.
- Borreria** G. F. W. Meyer, DC. (*Bigelovia* Sngl., p. 121).
 advena Fisch. (= *verticillata*, *spinosa*, *capitata*, *capitellata* Autor), \odot . f. w.
 affinis DC. (= *Spermacoce affinis* Pohl), ähnelnde, \odot .
 f. f. w. Brasilien.
 asperula DC., rauhe, \odot . f. Bahia.
 cornifolia DC. (= *Bigelovia cornifol.* p. 121 = *Spermacoce cornifolia* Fisch.).
 crassifolia C. A. Mey., dickblättrige, \odot . f. ? Südamerika.
 gracillima DC. (= *Spermacoce gracillima* Pohl), schlanke,
 \odot . f. Südamerika.
 Kohautiana Cham. et Schltl., Kohaut's, \odot . f. f. m. w.
 Südamerika.
 parviflora Meyer (= *Bigelovia parviflora* Sngl., p. 122).
 pumila DC. (= *Spermacoce pumila* Pohl), kleine, \odot . f.
 Brasilien.
 stricta Meyer (= *Bigelovia stricta* Sngl., p. 122).
 tenera DC. (= *Bigelovia tenera*, p. 122).
 tenuis DC. (= *Bigelovia tenuis*, p. 122 = *Spermacoce tenuis* Pohl).
 vaginata Chamiss., Schltl. (= *Bigelovia vaginata* Sngl.,
 p. 122).
 verticillata Meyer (= *Bigelovia commutata et verticillata*
 Sngl., p. 121 et 122 = *Spermacoce verticillata*
 Sw. = *S. hyssopifolia* P. = *S. mucronata* N. E. =
S. stellata W.).
- Borrichia** Adans., DC., Borrichie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 arborescens DC. (= *Bupthalmum aborescens* L. =
Diomedea glabrata H. B. K. = *D. unidentata* Cass.),
 baumartige, f. w. Westindien.
 argentea DC. (= *Bupthalmum canum* L'Her. = *Diomedea argentea*
 H. B. K., p. 265).
 frutescens DC. (= *Bupthalmum frutescens* L. = *incanum*
 Mill. = *Diomedea bidentata* Cass., p. 265),
 strauchige, f. k. Nordamerika, Westindien.
- Borya** LaBill. non W. (= *Baumgartenia* Sngl.), (Bory de St. Vincent,
 berühmter franz. Naturforscher), VI. I.,
 Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae. (Juncaceae, Comelinaceae Rehb.).
 scirpoides Lindl., binsenähnliche, 4. k. t. Schwanenflufs,
 (Ob kultivirt?)
B. acuminata W. (= *nitida* W.), *porulosa* W. etc.,
 v. *Forestiera acuminata* etc., *prinoides* W. = ?
Adelia ovata, p. 17.
- Bossiaea** Vent., Bossiaea.
 biloba Benth., zweifläppige, f. t. Südwestl. Neuholland.
 Colvillii Hort., Anglor., Colvill's, f. t. Neuholland.
 disticha Lindl., zweizeilige, f. t. Neuholland.
 Endlicheri Meisn., Endlicher's, f. t. Neuholland.
 a) ovalifolia (Endl.), β) angustifolia Meisn., γ)
 minor Meisn.
 linnaeoides G. Don, Linnaeaähnliche, f. t. Neuholland.

Bossiaea

microphylla Sm. (= *obcordata* Hort. = *Platylobium microphyllum* Sims = *Platylobium obcordatum* Vent.).
Nummularia Endl., pfennigkrautblättrige, ♀. t. Ostl. Neuholland.

ovata Sm., G. Don (= *Platylobium ovatum* Andr.), eiförmige, ♀. t. Neuholland.

paucifolia Benth. (= *virgata* Hook.), wenigblättrige, Schwanenfluss.

rosmarinifolia Lindl., rosmarinblättrige, ♀. t. Schwanenfl.
spinescens Meisn. (= *paucifolia* Lindl. non Benth.), stachelige, ♀. t. Neuholland.

tenuicaulis Grah., dünnstengelige, ♀. t. Neuholland.

thymifolia Hort., thymianblättrige, ♀. t. Neuholland.

diversifolia Hort. = *heterophylla*, *lenticularis* Lodd. non Sbr. = *rhombifolia*, *rufa* Lodd. non RBr. = *ensata*.

Bothriospermum Bunge, Traubensaame, p. 129.

bicarunculatum Fisch. et Mey. (= *chinense* Bunge).

chinense Fisch. et Mey. non Bunge (= *Kusnetzowii* Bunge), chinesischer, ☉. f. Südl. Mongolei.

tenellum Fisch. et Mey. (= *Anchusa tenella* Hornem. = *A. zeylanica* Jacq. fl. ¹).

Botryanthus Kunth, Traubenhyacinthe, VI. 1., Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae.

autumnalis (= *Muscari autumnale* Guss.), Herbst-T., 4. Zw. f. Sicilien.

commutatus Kunth (= *Muscari commutatum* Gussone = *Hyacinthus commutatus* Tenore), verwechselte, 4. Zw. f. Sicilien, Apulien.

odorus Kunth (= *Muscari racemosum* W., p. 535 = *Hyacinthus racemosus* L.).

pallens Kunth (= *Muscari pallens* Fisch., p. 535 = *Hyacinthus pallens* MB.).

? *paradoxus* Kunth (= *Hyacinthus paradoxus* Hort., Petropol.), wunderbare, 4. Zw. f. Kleinasien (Guriel).

parviflorus Kunth (= *Muscari parviflorum* Dsf., p. 535).

Strangwaysii Kunth (= *Muscari Strangwaysii* Tenore), Strangways's, 4. Zw. f. Byzanz.

vulgaris Kunth (= *Hyacinthus botryoides* L. = *Muscari botryoides* W., p. 534).

Botrychium Sw., Traubenfarn.

obliquum Mühlbg. (var. *B. fumarioid.*?), schiefer, 4. k. t. Carolina.

Botrydium aromaticum Spach et *Schraderianum* Spach, v. *Chenopodium Botrys* et *foetidum*, p. 189.

Botryocarpum nigrum Rich. = *Ribes nigrum*, p. 689.

Botryodendron Endl., Traubenbaum, V. 1., Araliaceae.

capitatum Endl. (= *Aralia capitata* Jacq., p. 71 = *Hedera capitata* Sm.).

angustifolium Endl. et *latifolium* Endl., beide ♀. und auf der Norfolk-Insel heimisch, werden wohl nicht kultivirt.

Bottianaea Colla = *Trichopetalum gracile*, p. 817.

Bouteloua gracilis Lagasc. etc., v. *Chondrosium gracile* etc.

Boutonia pomifera Hort. v. *Goodenia paniculata* p. 365.

1) p. 34 dieses Nachtrags. Gehört aber nach Endlicher zu *Bothriospermum tenellum*.

- Bouvardia** Salisb., Sogl., Bouvardie.
 crocata Hort, safranfarbige, ⚥. k. t. ? Mexico.
 flava van Houtte, hellgelbe, ⚥. k. t. Mexico.
 linearis H. B. K., gleichbreite, ⚥. k. t. Mexico.
 mexicana Hort., mexicanische, ⚥. k. t. Mexico.
 quinqueflora Dehnh., fünfblumige, ⚥. k. t. Mexico.
 splendens Hook., schimmernde, ⚥. k. t. ? Mexico.
 strigosa van Houtte, striegeliche, ⚥. k. t. Mexico.
- Bowlesia** R. et P., Bowlesie.
 incana R. et P., weifsgraue, ☉. f. Peru.
 tenera Sogl. (= *nodiflora* Presl. = *incana* H. Par. = *geraniifolia* Chamiss. et Schldt.).
- Brachycome** DC., Kurzschof.
 diversifolia Fisch. et Mey., ☉. f. p. 129.
 iberidifolia Benth. (= *capillacea* Walp.), schleifenblumenblättrige, ☉. f. Neuholland.
Brachycoris parviflora Schrad., v. *Lindenbergia urticaefolia*, p. 882.
Brachyderea rigida Cass., v. *Crepis rigida*, p. 229.
Brachyelytrum aristatum R. et S. (= *erectum* P. Beauv.), v. *Muhlenbergia aristata*, p. 533.
Brachyolobus amphibius All. etc., v. *Nasturtium amphibium* RBr. etc., p. 543.
- Brachypterum** Benth., Kurzflügler, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.
 scandens Benth. (= *Dalbergia scandens* Roxb., p. 250).
- Brachyramphus** DC., Kurzschnäbelchen, XIX. I., Compositae Cichoriaceae.
 caribaeus DC. (= *Sonchus taraxacifolius* Sogl. p. 772), caribäisches, ☉. f. m. Westindien.
 goraeensis DC. (= *Sonchus ciliatus* Perrot. = *S. goraeensis* Lam.), goraeisches, ☉. f. m. Guinea.
 intybaceus DC. (= *Cicerbita intybacea* Wallr. = *Lactuca intybacea* Jacq., p. 492 = *Phoenixopus intybaceus* Less.), cichorienblättriges, ☉. f. m. Insel St. Thomas.
- Brachysema** RBr., Kurzfahne.
 hybridum Hort, Bastard-K., ⚥. Sch. t. Neuholland.
 platypterum Hort. (= *Pontania Celsiana* Hort.), breitflügelige, ⚥. Schl. t. Neuholland.
 praemorsum Meisn., abgebissene, ⚥. Sch. t. Neuholland.
 villosum Hort., zottige, ⚥. Sch. t. Neuholland.
Brachystemum lanceolatum W., *linifolium* W., *verticillatum* W., v. *Pycnanthemum lanceolatum* etc., p. 668.
Brachystephium leucanthemoides Less., v. *Brachycome diversifolia*, p. 129.
Bradleja laurifolia H. Cels = ? *Glochidion* spec.
- Brahea** Mart. (Brahe, berühmter Astronom), VI. III., Palmae.
 dulcis Mart (= *Corypha dulcis* H. B. K.), süsse, ⚥. w. Peru.
Brandesia porrigens Mart. (= *Achyranthes porrigens* Jacq., p. 11), v. *Teleianthera porrigens*.
Brasenia peltata Pursh (= *Schreberi* Gmel.), v. *Hydropeltis purpurea*, p. 407.
- Brassavolea** RBr., Lindl.
 cuspidata Lindl., feinspitziqe, 4. w. Trinidad.
 elegans Lindl., zierliche, 4. w. Antigua.
 glauca Lindl., blaugrüne, 4. w. Mexico.
 Sloanei Lindl., Sloane's, 4. w. Jamaica.

Brassavolea

- subulifolia Lindl., pfriemenblättrige, 4. w. Ins. Nevis.
 tuberculata Hook., höckerige, 4. w. Brasilien.
 venosa Lindl., aderige, 4. w. Honduras.

Brassia RBr., Brassie.

- guttata Lindl. (= *Corvani* Hort.), getüpfelte, 4. w. ?
 Henchmanni Hort., Hechmann's, 4. w. ? Südamerika.
 Lanceana Lindl., var. purpurea et var. viridiflora Hook.
 maculata RBr., var. major.
 odorata Hort., wohlriechende, 4. w. ? Südamerika.
 verrucosa Hort. belg., warzige, 4. w. ? Südamerika.
 Wrayae Hook., Wraya's 4. w. Guatimala.

Auch eine *B. cuspidata* kommt in den Pflanzencatalogen vor.

Brassica T., Kohl.

- carinata Alex. Braun (= *Melanosinapis abyssinica* Hort. Carlsruh.), kielförmiger, ☉. f. Abyssinien.
 mesopotamica Bernh. (= *Sinapis mesopotamica* Spgl.), mesopotamischer, ☉. f. Mesopotamien.
 nigra K. (= *B. Melanosinapis* Endl. = *Sinapis nigra* L. = *Melanosinapis communis* Spenn. et Schimp.), var. abyssinica Alex. Braun.
 sempervirens Schrk., Tenor., immergrüner, ♂. f. k. Südeuropa.

Tournefortii Gouan, β) *sisymbrioides* Fisch.

- Unbestimmtere: *hirta* Mch., *odorata* Schrk., — *elongata* Ehrh. (= *nova* Winterl), *Erucastrum* L., *obtusangula* Schuttl., *ochroleuca* Soyer Willem. (= *Pollichii* Schuttl.) *Schimperi* Boiss., v. *Erucastrum elongatum*, Lamarckii, *obtusangulum*, *inodorum* et *arabicum*, p. 312, *erucoides* Hornem., v. *Eruca sativa*, p. 312, *fimbriata* Hort. = *oleracea* var., *lucida* Hort. = ? *muscovita* Mill. = *oleracea* var., *peregrina* Mill. = *oleracea* var., *pyramidalis* Hort. = *oleracea* var., *suffruticosa* Dsf. = ?
Moricandia arvensis, p. 531, *villosa* Bivon. = *incana*.

Brathydium grandiflorum Spach, v. *Hypericum procumbens*.

Bravaisia DC. (Gebrüder Ch. et F. Bravae's, franz. Botaniker), XIV. II., Bignoniaceae.

- floribunda DC. (= *Bignonia bibracteata* Bertero = *Amazonia integerrime* Spgl.), blüthenreiche, ♂. w. t. Caracas, Mexico.

Bravoia Llav. et Lexar. VI. I., Narsisseae Amaryllideae

- Endl., (Liliaceae s. Coronariae Alstroemerieae Rchb.).
 geminiflora Llav. et Lexar. (= *Coetocapnia geminiflora*, s. *Zetocapnia geminiflora* Lk. et Otto). Zu ergänzen p. 131.

Braya Stbg. et Hoppe, Braya.

- aenea Bunge, kupferfarbige, ♂. f. Altai.
 glabella Richards., Bunge, glatte, ♂. f. Melville, Nowaja Semlia.
 Limosella Bunge (= *limoselloides* Bunge), Limosella-blättrige, ♂. 4. f. Altai.
 rosea Bunge (= *pilosa* Hook. = *Platypetalum capitatum* Turcz. = *dubium* RBr. = *Draba rosea* Turcz.), rosafarbige, ♂. 4. f. Insel Melville.
 siliquosa Bunge, langschotige, ♂. 4. f. Altai.

Meyeri Bunge, v. *Pachyneurum grandiflorum*, *pinnafida* K. et *supina* K., v. *Sisymbrium pinna-tifidum* et *supinum*, p. 762.

Brebissonia microphylla Spach, et *thymifolia* Spach,
v. *Fuchsia microphylla* et *thymifolia*, p. 340.

Breweria RBr., *Breweria*, V. 1., Convolvulaceae.

Roxburghii Arn., Choisy (= *Convolvulus semidigynus*
Roxb. = *Ipomoea semidigyna* Sweet), Roxburgh's,
f. Sch. w. Ostindien.

spectabilis Choisy (= *Ipomoea spectabilis* Bojer), an-
sehnliche, f. Sch. w. Madagascar.

Bridelia spinosa Hort., v. *Baumannia geminiflora*.

Bridgesia spicata Hook., Arn., v. *Ericilla volubilis*.

Brignolia pastinacifolia Bertol., v. *Kundmannia*
sicula.

Brindonia indica Pet. Thouars, v. *Garcinia Cowa*,
p. 345.

Briza auriculata Trevir., v. *Chascolytrum trilobum*
β N. E., *barbata* Trin. (= *Calotheca barbata* N.

E.), v. *Chascolytrum barbatum*, *erecta* Lam. (=

montevidensis Speg.), v. *Calotheca brizoidea*, p. 150,
Lamarckiana N. E., v. *Calotheca dilatata*, p. 150,
triloba N. E. (= *Calotheca triloba* Kunth), v.

Chascolytrum trilobum.

Bromelia L., Bromelie.

antiacantha Bertol., Colla., 4. w. Brasilien.

Commeliniana de Vriese, Commelin's, 4. w. ?

latifolia W., breitblättrige, 4. f. w. Antigua.

mexicana Noisett., mexicanische, 4. w. Mexico.

Unbestimmtere: *elegans* Hort., *gigantea* Hort., *laevis*
Hort., *pumila* Hort., *sepiaria* Hort.

= *Aquilega* Salisb. = *bracteata*, *cruenta* Grah.,
farinosa Hort. (= *Billbergia spec.?*) *iridifolia* N. E.

Mart., *melanantha* Ker, *nudicaulis* L., *pallida* Ker,
pyramidalis Sims (= *nudicaulis* Ker), *zebrina*

Herbert., v. *Billbergia cruenta*, *iridifolia*, *clavata*,
nudicaulis, *amoena*, *pyramidalis* et *zebrina*, p. 123,

glabra Mill. (= *inermis* P. = *semiserrata* W.), v.

Ananassa semiserrata, *lucida* Mill., v. *Ananassa lu-*
cida, *rubra* Hort., *violacea* Hort. et *viridis* Hort.,

v. *Ananassa sativa* var., ? *sylvestris* Arrabida, v.

Ananassa bracteata, p. 52, *Mertensii* Meyer, v.

Aechmea Mertensii, p. 10, II.

Bromheadia Lindl., Hook. (Sir Edward French Brom-
head engl. Naturforscher), XX. 1., Orchideae.

palustris Lindl., Hook. (= *Grammaphyllum Finlay-*
sonianum Lindl., Hort.), Sumpf-B., 4. w. Malay-

ischer Archipel.

Bromus L., Trespe.

A. Genuini (Annu).
adoënsis Hochst., adoaische, ☉. f. Abyssinien.

asperrimus Tenor., schärfste, ☉. f. Neapel.

fasciculatus Presl (= ? *rubens* L.), büschelförmige, ☉.
f. Sicilien.

Gussoni Parlatore (= *maximus* Gussone), Gussone's,
☉. f. Sicilien.

intermedius Gussone (= *alopecuroides* Moris, *commutatus*
β *nanus* Tenor.), mittlere, ☉. f. Sardinien, Neapel.

madritensis L. (= *diandrus* Curt., Sm. = *scaberrimus*
Tenore).

maximus Dsf. (= *madritensis* Gussone).

scoparius L. (= *contortus* Dsf.),

sterilis L. (= *jubatus* Tenore).

Bromus

B. Ceratochloa P. B.

arduennensis Kunth (= *auriculatus* Lej. = *platystachys* Dsf. = *Calotheca bromoidea* Dsf. = *Libertia arduennensis* Lej. = *Michelaria bromoidea* Dumort.).

C. Festuceaei.

exaltatus Bunge, höchste, 4. f. k. Mexico.

Michelii Savi, v. *Avellinia Michelii*, *pauciflorus* Dsf. var. patul.¹⁾, *tenuis* Tineo (= *sabulosus* Gusson. = *Sardous* Spgl. = *Brachypod tenue* Tineo = *Festuca incrassata* Bertol. non Salzm.), v. *Vulpia tenuis*, *wolgensis* Spgl. var. squarros.

Broteroa Cav. (*Brotera* Auct.), (P. A. Brotero, portugiesischer Botaniker), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae (Geraniaceae Sterculiariae Rchb.).

ovata Cav. (= *Pentapetes ovata* DC., p. 605).

B. *Contrayerba* Spgl. (= *Sprengelli* Cass. = *trinervata* P., v. *Flaveria repanda*, p. 335, B. *corymbosa* W., v. *Cardopodium corymbosum*).

Broussonetia papyrifera Vent., δ) macrophylla Hort.

Browallia L. Browallie.

cordata G. Don (= *grandiflora* Lindl. nec Grah.), herzblättrige, ☉. f. Peru.

Linnaeana Spgl. = demissa et elata.

Brownea Jacq., Brownea.

grandiceps Jacq., großköpfige, ♀. w. Caracas, Cumana.
erecta Hort. = ? *Theophrasta pinnata* Jacq.

Brucea Mill., L'Her., Brucea.

antidysenterica Mill. (= *ferruginea* L'Her.), ruhrstillende, ♀. w. Abyssinien.

guineensis G. Don, guineaische, ♀. w. Sierra Leone.

Bruchmannia erucaeformis Nutt., v. *Beckmannia erucaeformis*, p. 116.

Brugmansia P. ist nur als Section von *Datura* anzusehen, vergl. diese.

Brunfelsia Plum., L. Brunfelsie.

gracilis Hort. belg., schlanke, ♀. w. Südamerika.

Lockharti Hort. belg., Lockhart's, ♀. w. Südamerika.

Brunia L., Brunie.

candicans Hort. anglor., weißliche, ♀. t. Cap d. g. H.

formosa D. Dietr., v. *Berzelia formosa* etc., *Levisanus* L., v. *Leucadendron Levisanus*, p. 458, *superba* Don (= *speciosa* Hort.), v. *Berzelia superba*, *tenuifolia* W. = *alopecuroides*.

Bryocles ventricosa Salisb., v. *Funkia ovata*, p. 340.

Bryonia T., Zaurrübe.

hederaefolia Jacq., epheublättrige, 4. Sch. k. Teneriffa.

? *vitifolia* Hort. belg., weinblättrige, 4. Sch. w. ?

grandis L. mant., v. *Coscinia indica*, *maderaspatana* Berg. = *scabrella quinqueloba* Thbg., v. *Cephalandra quinqueloba*, *triloba* Thbg., v. *Cyrtoneura triloba*.

Bubon buchtormensis Fisch., v. *Libanotis buchtormensis*, *cuneifolius* Spgl., *dichotomus* Spgl. etc., v. *Seseli cuneifolium*, *dichotomum* etc., p. 749, *roseum* Hort. = ? *tortuosum* Dsf., v. *Deverra tortuosa*.

1) hordeaceus L., pratensis Ehrh. et racemosus L., werden neuerlich von Fries als verschiedene Arten angesehen.

- Bucerosia** Wight, Arn. (*Boucerosia* Auct.), *Bucerosia*, V. II., Asclepiadeae.
Decaisniana Lemaire, Decaisne's, f. w. Senegal.
umbellata Wight, Arn. (= *Caralluma umbellata* Haw., p. 159).
Buchanania oppositifolia Sm., v. *Colebrockea oppositifolia*, p. 211.
- Bucheria*** (Bucher, Verfasser eines Nomenclator botanicus florae Dresdensis), VIII. I., Myrtaceae.
*saxicola** (= *Astraea saxicola* Schauer = *Baeckea saxicola* A. Cunningh., p. 110).
Buchholzia axillaris Mart., v. *Alternanthera spinosa*, s. *axillaris*, p. 40, *brachiata* Schrad. et *frutescens* Mart., v. *Teleianthera brachiata et frutescens*.
- Buddlea** (= *Buddleja* Auct.), *Buddlea*.
Lindleyana Hort., Angl., Lindl., f. k. f. b. ? Mittägl. Amerika.
salicifolia Jacq. (= *saligna* W.), v. *Nuxia saligna*.
Buechnera aethiopica L. et *foetida* Andr., v. *Chaenostoma aethiopicum et foetidum*.
- Buettneria** Loeffl., L., *Buettneria*.
corylifolia W., H. B. K., haselnufsblätterige, f. w. Südamerika.
heterophylla Hook. (= *Heterophyllum ramosum* Bojer, = *Telfairia volubilis* Neum.), verschiedenblätterige, f. Sch. w. Madagascar.
ovata Lam. (= *Ayenia spinosa* H. Par.), eiförmige, f. w. Peru.
*corylifolia**, *hermanniaefolia* Gay et *pannosa* DC., v. *Rulingia corylifolia*, *hermanniaefol.* et *pannosa*.
- Buginvillea** Commers. (= *Bougainvillea* G. Don), *Bougainvillea*.
peruviana H. B. K. (= *brasiliensis* Neuwied = *spectabilis* W.), peruvianische, f. Sch. w. Peru.
rubicunda Schott, röthliche, f. Sch. w. Brasilien.
spectabilis Juss. (= *bracteata* P. = *brasiliensis* Räusch. = *Josepha augusta* Arrabida).
Buglossum Adans. B., *coeruleum* Presl (*amoenum* G.) etc., v. *Anchusa paniculata* etc., p. 53.
- Bulbine** W., *Bulbine*.
Fraseri Kunth (= *Anthericum bulbosum* Hook. excl. synonym.), Fraser's, 4. Zw. t. k. Neuholland.
Hookeri Kunth (= *barbata* Hort. = *semibarbata* Schult. fil. = *Anthericum semibarbatum* Loddig), Hooker's, 4. t. k. Van Diemens Land.
macrophylla Salm Dyck, großblätterige, 4. t. k. ?
narcissifolia Salm Dyck, narcissenblätterige, 4. k. t. ?
semibarbata Haw. (= *floribunda* Schrad.).
brevifolia R. et S. et *triquetra* Speg., R. et S., v. *Bulbinella brevifolia et triquetra*, *planifolia* R. et S., v. *Simethis bicolor*.
- Bulbinella** Kunth, *Bulbinella*, VI. I., Coronariae (Liliaceae) Asphodeleae.
? *brevifolia* Kunth (= *Anthericum brevifolium* Thbg), kurzblätterige, 4. t. k. Cap der gut. Hoffn.
? *filiformis* Kunth (= *Anthericum filiforme* Ait. non Thbg., p. 63).
? *squamea* Kunth (= *Anthericum squameum* L., Suppl. p. 64).

Bulbinella

? *triquetra* Kunth (= *Anthericum triquetrum* L. suppl., p. 137), ¹⁾.

Bulbocodium L., Lichtblume.

I. *Merendera* Ram., DC., p. 512.

caucasicum Endl. (= *trigynum* Adam = *Merend. caucasicum* MB. = *Colchicum caucasicum* Spgl.).

*Fontanesii** (= *vernun* Dsf. excl. Synon. = *Merend. filifolia* Cambessed.), Desfontaine's, 4. Zw. f. b. k. Majorka, Algier.

*lusitanicum** (= *Merendera bulbocodioides* Steud. = *Colchicum bulbocodioides* Brotero), portugiesische, 4. Zw. f. b. k. Portugal.

*montanum** (= *autumnale* Lapey. = *Merend. Bulbocodium* Ramond = *Colchicum montanum* L. spec., p. 210 excl. Synon.).

soboliferum (Fisch. et Mey.).

II. *Eubulbocodium* Endl.

ruthenicum Bunge, Fisch. et Mey., Ukraine, Caucasus.
vernun L.

versicolor Spgl. (= *Colchicum versicolor* Ker = *Amaryllis colchicifolia* H. Monspel).

alpinum Mill., v. *Lloydia serotina*, p. 470.

Bulbophyllum A. P. Th., (Bolbophyllum), Zwiebelblatt, affine Lindl., ähnelndes, 4. w. Nepal.

angustifolium Lindl. (= *Diphyes angustifolia* Blume), schmalblättriges, 4. w. Java.

Calamaria Lindl., rohrähnliches, 4. w. Sierra Leone.

fuscum Lindl., braunes, 4. w. Sierra Leone.

galeatum Lindl. (= *Dendrobium galeatum* Sw.), helmartiges, 4. w. Sierra Leone.

macranthum Lindl., großblumiges, 4. w. Sincapore.

odoratum Lindl. (= *Diphyes odorata* Blume), wohlriechendes, 4. w. Java.

pendulum A. P. Thouars (= *recurvum* Lk., Otto ? Lindl.), überhängendes, 4. w. Mascarenas, ? Senegambien.

pileatum Lindl., pilzhutähnliches, 4. w. Sincapore.

pumilum Lindl. (= *Dendrobium pumilum* Sw.), kleines, 4. w. Sierra Leone.

variegatum Pet. Thouars (= *nutans* Rich.), buntes, 4. w. Bourbon.

violaceum Lindl. (= *Diphyes violacea* Blume), violette, 4. w. Nepal.

Carreyanum Spgl., v. *Tibrachia purpurea*, *longiflorum* Pet. Thouars., v. *Cirrhopetalum* Thouarsii.

Bulbostylis DC., v. *Eupatorium* H. p. 320.

Bulbostylis palustris Stev., v. *Heleocharis palustris*, p. 380.

Bumalda trifolia Thbg., v. *Staphylea Bumalda*.

Bumelia argentea R. et S., v. *Heeria argentea*, *nervosa* Vahl, v. *Lucuma Rivicoa*, *salicifolia* Sw., v. *Dipholis salicifolia*, *serrata* Pursh, v. *Prunus caroliniana*.

Bungea C. A. Mey., (Alex. v. Bunge, k. russ. Staatsrath, Prof. u. Director d. botan. Gartens zu Dorpat), XIV. II., Personatae Rhinanthaeae.

trifida C. A. Mey. (= *Rhinanthus trifidus* Vahl = *Bartisia trifida* Spgl.). dreitheilige, ☉. f. Caucasus.

1) Die hier verzeichneten Arten sind vom H Prof. etc. Kunth nur fraglich zu dieser Gattung gestellt worden.

Bunias L., Zackenschote.

cochlearioides Murray ¹⁾), löffelkrautähnliche, ♂. f. Altaiisch. Sibirien.

cristata Desv. = *B. Erucago* β *aspera*, *Cakile* L., v. *Cakile maritima*, p. 143, *orientalis* L. (= *perennis* Mch.), v. *Laelia orientalis*, *paniculata* L'Her., v. *Neslia paniculata*, *verrucosa* Mch. (= *raphanifolia* Sm.), v. *Rapistrum orientale*, p. 679, *vulgaris* Andrz. = *Erucago*.

Bunium L., Erdknoten.

alpinum W. K. (= *Ligusticum alpinum* Spgl., p. 462 = *Wallrothia tuberosa* Spgl.).

β) *petraeum* Tenore (= ? *saxatile* Mill. = *Wallrothia divaricata* Presl).

carvifolium DC. (= *Sison carvifolium* Bertol. = *flexuosum* Tenor. 761 = *Sison proliifer* Brochi), karbenblättriger, ♂. 4. f. Italien.

ferulaefolium Dsf. (= *Sison ferulaefolium* Spgl., p. 763). *flexuosum* Witherr., Sm. (= *Bulbocastanum* Huds. = *majus* Gouan = *denudatum* DC. = *Conopodium denudatum* K., p. 240).

β) *pyrenaicum* Lois. (= *pilosum* W.), γ) *ammoides* Lk.

peucedanoides MB. (= *Sium peucedanoides* Spgl., p. 763 = *Peucedanum carvifolia* MB. = *Silaus carvifolius* C. A. Mey.).

virescens DC. (= *Sium virescens* Spgl. = *S. Cordienii* Loisel. = *Gasparrinia virescens* Bertol. = *Peucedanum alpestre* Stev. = *Peucedanum tauricum* H. Par.), grünlicher, 4. f. Burgund, ? Caucasus.

acaule MB., v. *Chamaescidium acaule*, *ammoides* Cesati non Lk. = ? *Carvi* MB. et *divaricatum* Cesati = *Carum Carvi* et *divaricatum*, p. 167, *Falcaria* MB. = *Falcaria Rivini*, p. 329, *rigens* Spgl., v. *Trachyspermum rigens*, p. 814.

Buphane Herb. (*Boophane*) *ciliaris* Herb. etc., v. *Brunsvigia ciliaris* etc., p. 135.

Bupthalmum L., Rindsauge.

I. *Asteriscus* Mch., DC.

imbricatum Cav. (*A. imbricatus* DC.), (= *B. elegans* Brouss. (= *chrysanthemoides* Poir.).

maritimum L. (*A. maritimum* DC.), (= *Nauplius maritimum* Cass.), β) *sessile* Mill.

II. *Bupthalm.* genuin.

sagittatum Pursh, pfeilförmiges, 4. f. Nordamerika.

lanceolatum Hort. = ?

III. *Pallenis* Cass.

spinosum L. (*Pallenis spinosa* Cass.), (= *B. aureum* Salzm. = *asteroideum* Vivian.).

arborescens L., *frutescens* L. (= *incanum* Mill.) etc., v. *Borrichia arborescens* etc., *asperum* Hornem., v. *Wedelia hispida*, p. 856, *heterophyllum* W., v. *Acmella brasiliensis*, p. 12, *laevigatum* Brouss. (= *coriaceum* Hort.), v. *Jasonia laevigata*, *silphioides* Hornem., v. *Heliopsis scabra*, p. 387.

Bupleurum T., Hasenöhrrchen.

affine Rehb., ähnelndes, ☉. f. Ungarn.

1) *Calepina Corvini* Desv., p. 147, ist nach C. A. Meyer davon verschieden.

Bupleurum

chinense DC., chinesisches, ☉. f. China.

gracile MB. (= *Marschallianum* C. A. Mey. (= *Odontites gracilis* M. B.), schlankes, ☉. f. Taurien.

junceum L. (= *badium* Rochel = *baldense* W. K. = *Gerardi* Sibth., Sm.), ☉. ♂. Süd- und Osteuropa.

trifidum Tenor., dreispaltiges, 4. f. Calabrien.

amplexicaule Clairv. = *pyrenaicum*, *apiculatum* Friwalds. (= *cuspidatum* Rehb.) = *aristatum*, *arborescens* Jacq. (= *gibraltarium* Lam. = *obliquum* Vahl = *verticale* Ortega) = *coriaceum*, *diversifolium* Rochel (= *heterophyllum* Roch.) = *ranunculoides* β *caricifolium*, *denticulatum* Bellard. = *graminifolium*, *Fontanesii* Guss. = *Odontites*, *fruticans* Thbg. = *difforme*, *Gerardi* fl. Wett. (= *Pollichii* Gmel.) = *tenuissimum*, *lanceifolium* Hornem. (= *panacifolium* Hornem.) = ? *heterophyllum*, *mareoticum* Del. (= *minimum* Clarke) = *nodiflorum*, *mucronatum* W. = *frutescens*, *obtusifolium* Tenore = *cernuum*, *trifoliatum* Wendl. = *Heteromorpha trifoliata*.

Burchardia RBr., Burkhardie.

congesta Lindl., gedrängte, 4. t. Neuholland.

Burchellia RBr., Burchellie.

major Hort. (? = *speciosa* Hort.), große, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.

Burglaria lucida Wendl., v. *Ilex salicifolia*, p. 414.

Burgsdorfia romana Hffg. Lk. (= *rigida* Mch.), v. *Sideritis romana*, p. 754.

Burkea Hook., (Joseph Burke ward vom Grafen Derby in das Innere Südafrikas geschickt, um Thiere und Pflanzen zu sammeln), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae. *africana* Hook., afrikanische, ♀. w. Südafrika 1).

Burlingtonia Lindl., Burlingtonie.

maculata Lindl., gefleckte, 4. w. Brasilien.

rigida Lindl., starre, 4. w. Brasilien.

venusta Lindl., liebliche, 4. w. Brasilien.

Burmannia L., Burmannie.

alba Mart. (= *Triptarella alba* Schult.), weisse, 4. w. Brasilien.

bicolor Mart. (= *Triptarella bicolor* Schult.), zweifarbige, 4. w. Brasilien.

dasyantha Mart. (= *Triptarella dasyantha* Schult.), wollblumige, ☉. f. Brasilien.

(Ob kultivirt?)

Burrielia chrysostoma Torr. et Gr., v. *Baeria chrysostoma*, p. 109.

Bursaria Cav., Beutelblume.

procumbens Putterl. (= *Pittosporum procumbens* Hook.), niederliegende, ♀. k. t. Van Diemens Land.

Bursera paniculata Lam., v. *Canarium commune*.

Burtonia RBr., Burtonie.

bruniades Hort. angl., bruniaähnliche, ♀. t. Neuholland.

solanacea Hort. angl., Page, nachtschattenähnliche, ♀. t. Neuholland.

violacea Hort. = ? *conferta*.

Burtonia grossulariaefolia Salish., v. *Hibbertia grossulariaefolia*, p. 395.

1) Wird im Kew-Garten kultivirt.

Buxus sempervirens L., a) arborescens Mill., d) olivaeformis H. Vindob.

B. sempervirens gigantea Duham. = balearica.

Byrsonima Rich., Byrsonima.

Clausseniana Hort. belg., Claussen's, f. w. Südamerika.

Bystropogon coarctatus Schum. (= *pectinatus* L'Her.), *sidaefolius* L'Her., *suaveolens* L'Her. (= *graveolens* Blum.), v. *Hyptis pectinata*, polyanthos et *suaveolens*, p. 412, *marifolius* Juss, v. *Micromeria marifolia* (= *Calamintha fruticosa* P., *marifolia* P., p. 144).

Cacalia L., Cacalie (Pestwurz).

flexuosa Wall. (= *Eupatorium flexuosum* Lam. = *Senecio flexuosus* Less.), gebogene, 4. w. Mauritius.

gigantea Jacq. fil., riesenhafte, 4. f. Nordamerika, (Neu-Orleans).

suaveolens L. (= *Senecio suaveolens* Ell. = *Synosma suaveolens* Rafin.), b) foliis variegatis.

Die übrigen s. die Gattungen *Adenostylis*, *Emilia*, *Kleinia*, *Psacalium*, vergl. p. 871.

Cachrys T., Nufsdolde.

crispa P. (= *nudicaulis* Godet, = *longiloba* DC. = *Hippomarathrum crispum* K.), krause, 4. f. b. Palästina, Ost-Caucasus.

hirta Bertol., rauhhaarige, 4. f. ? Italien.

pungens Jan. (= *sicula* Guss., Tenore), stechende, 4. f. b. Calabrien, Sicilien.

sicula L. (= *pterochlaena* DC.), sicilianische, 4. f. b. Spanien, Sicilien, Griechenland.

alata MB., v. *Prangos foeniculacea*, *athamantoides* MB. etc., v. *Rumia athamantoides* etc., *callosperma* Pall. = *odontalgica*, *decursiva* Hornem. (= *latifolia* M. B.), v. *Agasyllis caucasica*, *dichotoma* Spgl. (= *peregrina* Spgl.), v. *Ulopermum dichotomum* Lk., p. 830, *hungarica* Mill., *tomentosa* Dsf. (= *panacifolia* Vahl), v. *Magydaris panacina* et *tomentosa*, *lanata* Hort., v. *Athamanta panacifolia*, p. 104, *triquetra* Spgl., v. *Colladonia triquetra*.

Cacteae ¹⁾.

§. 1. Cacteae tubulosae Miq., Endl.

I. Mammillaria Haw.

1. Homoeacanthae Pfeiff.

* *Tenues ramosae.*

echinata DC. (= *echinaria* DC.), β *densa* Lk. et Otto (= *caespitosa* Hort.). Mexico.

1) Bei den Cacteen hielt ich es für nothwendig von der alphabetischen Ordnung abzugehen, da selbige ohnedem in den meisten Pflanzen-Catalogen in wissenschaftlicher Reihe (wie ich schon p. 872 bemerkte), aufgeführt werden, eine alphabetische Einreihung und Nachweisung der fehlenden und neuen Arten zu p. 182, p. 278 etc., so wie p. 872 nicht gut möglich war, indem dadurch die wissenschaftliche Uebersicht der etwa bis jetzt bekannten Gattungen, Arten und Abarten dieser Familie, welche hier nach Walper's Repertorium botan. folgt, und mehrern Cactus-sammlern willkommen sein wird, nicht erreicht werden konnte.

Das Werk: *Cacteae in horto Dyckensi anno 1844 additis, tribuum, generumque charact. emendatis etc.*, a Principe Jos. de Salm Dyck, Paris 1845, habe ich dazu leider nicht benutzen können.

Cacteae

- elongata DC. Mexico.
 tenuis DC. Mexico.
 subcrocea DC. Mexico.
 intertexta DC. Mexico.
 sphacelata Mart. Mexico.

** Conothelae.

- polythele Mart. Mexico.
 quadrispina Mart. Mexico.
 columnaris Mart. Mexico.
 parvimamma Haw. (= *microthele* Spgl. = *Cactus prolifer* W. = *M. prolifera* Hort.). Westindien.
 simplex Haw. (= *C. mammillaris* L.). Westindien, Südamerika, Missouri.
 flavescens DC. (= *straminea* Haw.). Südamerika.
 prolifera Haw. (= *C. mammillaris prolifera* Ait. = *M. Parmentieri* H. Angl.). Südamerika.
 nivosa Lk. (= *tortolensis* H. Berol.). Insel Tortola.
 irregularis DC. Mexico.
 Wegenerii C. Ehrenb. Mexico.

*** Brachythelae.

- affinis DC. (= *cataphracta* Mart.). Mexico.
 angularis H. Berol. (= *compressa* DC.). Mexico.
 triacantha DC. Mexico.
 divergens DC. Mexico.
 cirrhifera Mart. Mexico.
 subangularis DC. (= *cirrhifera spinis fuscis* H. Monac.). Mexico.
 loricata Mart. (= *heteracantha* H. Berol.). Mexico.
 radians DC. (= *impexicoma* Lem.), β) globosa Scheidw. Mexico.
 gladiata Mart. Mexico.
 magnimamma Haw. (= *ceratophora* Lehm. = *Schiedeana* Hort.). Mexico.
 recurva Lehm. (= *Lehmanni* Hort.). Mexico.
 exsudans Zucc. (= *curvata* H. Berol.). Mexico.
 pycnanantha Mart. Mexico.
 latinamma DC. Mexico.
 acanthostephis Lehm. Mexico.

**** Polyedrae.

- polyedra Mart. Mexico.
 subpolyedra S. Dyck (= *polygona* Zucc. = *anisacantha*, = *xalapensis* Hort.). Mexico.
 Seitziana Mart. Mexico.
 tetracantha Salm Dyck. Mexico.
 villifera Otto (= *Mystax* Hort.), Mexico.
 carnea Zucc. Mexico.
 Karwinskiana Mart. Mexico.
 centrispina Pfeiff. Mexico.
 Zuccariniana Mart. (= *macracantha* DC.). Mexico.
 Fischeri Pfeiff. Mexico.
 Hystrix Mart. Mexico.
 Mystax Mart. Mexico.
 Caput medusae Otto (= *M. Sempervivi* DC.). Mexico.
 disciformis DC. Mexico.
 longinamma DC., β) hexacentra Berg in Otto et D. GZtg. Mexico.
 uberiformis Zucc. Mexico.

Cacteae

- Lehmanni H. Berol. (= *octacantha* et *leucacantha* DC.). Mexico.
 macrothela Mart. Mexico.
 Plaschnickii Otto. Mexico.

§. 2. Heteracanthae.

* Microthelae.

- crucigera Mart. Mexico.
 supertexta Mart. Mexico. β) mammillis longioribus Scheidw. Mexico.
 elegans DC. (= *intertexta* Hort.). Mexico. β) minor DC., γ) globosa Hort.
 Haageana Pfeiff. (= *diacantha nigra* Haage). Mexico.
 acanthophlegma Lehm. (= *geminispina* DC.). Mexico.
 Dyckiana Zucc. et Pfeiff. Mexico.
 bicolor Lehm. (= *geminispina* Haw.). Mexico.
 nivea Wendl. (= *Toaldoae* Lehm.). Mexico.

** Conothelae.

- discolor Haw. (= *depressa* DC. = *Cactus Spinii* Colla = *M. pulchella* H. Berol., = *M. canescens* Hort.). Mexico, Südamerika.
 β) prolifera (= *C. pseudomammillaris* S. Dyck).
 albida Haage (= *confinis* Haage). Mexico.
 chrysacantha Otto. Mexico.
 fuscata H. Berol. Mexico.
 rutila Zucc., β) octospina Scheidw. Mexico.
 aciculata Otto. Mexico.
 tentaculata Otto (= *pulchra* Haw.). Mexico.
 fulvispina Haw. Brasilia, Mexico.
 hexacantha S. Dyck. Mexico.
 setosa Pfeiff. Mexico.
 rhodantha Lk. et Otto (= *atrata* = *aurata* = *hybrida* Hort.). Mexico. β) prolifera, γ) Andreae Otto (= *inuncta* Hffg.), δ) Wendlanii (= *erinacea* Wendl.), ϵ) neglecta H. Berol., ζ) rubens (= *pyramidalis* H. Berol.).
 eriacantha Otto (= *cylindrica* = *eriantha* Hort.). Mexico.
 cylindracea DC. Mexico.
 vetula Mart. Mexico.
 vivipara Haw. (= *Cact. viviparus* Nutt.). Louisiana, Missouri.

*** Brachythelae.

- grandiflora Otto (= *canescens* H. Berol.). Mexico.
 coronaria Haw. (= *Cactus coronatus* W. E. Suppl. = *C. cylindricus* Otto). Mexico, Guatimala.
 hamata Lehm. Mexico.
 cornifera DC. (= *daimonoceras* Lem.). Mexico.
 uncinata Zucc. Mexico.
 brevimamma Zucc. Mexico.
 conoidea DC. Mexico.
 crebispina DC. Mexico.
 caespiticia DC. Mexico.

**** Stylothelae.

- pusilla DC. (= *Cact. pusillus* DC. Catal. = *stellatus* Lodd. = *C. stellaris* L. = *Mamm. stellaris* Hort.), β) major. Westindien.
 glochidiata Mart. (= *ancistroides* Lehm. = *crinifomis* DC.). Mexico. β) purpurea Scheidw., γ) sericata Lem.

Cacteae

Wildiana Otto (= *glochidiata* var. *aurea* Hort.). Mexico.
 crinita DC. Mexico.

***** Gibbosae ?

? gibbosa Salm Dyck. (= ? *Echinocatus exsculptus* Otto).

§. 3. Nicht hinlänglich bekannte Arten.

conica Haw. ?

lanifera Haw. (= *C. canescens* Flor. mex. ined.). Mexico.

Helicteris DC. (= *C. Helicteres* Moçino). Mexico.

glomerata DC. (= *C. glomeratus* Lam.). Domingo.

nuda DC. (= *C. nudus* Flor. mex. ined.). Mexico.

mitis Mill., species indescrupta.

Species addendae.

I. Aculeis centralibus nullis.

a) globosae.

subtetragona A. Dietr. Mexico.

Bergii Miq. (= *Seitziana* Miq. nec Mart.). Mexico.

sulco-lanata Lem. (= *retusa* Scheidw.). ?

microceras Lem. Mexico.

Webbiana Lem. Mexico.

retusa H. Belg. Mexico.

Ehrenbergii Pfeiff. Mexico.

stella aurata Mart. (= *tenuis* var. β Pfeiff.). Mexico.

elephantidens Lem. ?

 β) cylindraceae.

palescens Scheidw. Mexico.

stenocephala Scheidw. Mexico.

virens Scheidw. Mexico.

sericata Lem. Mexico.

Humboldtii Ehrbg. Mexico.

Schlechtendalii Ehrbg. Mexico.

micracantha Miq. ?

atrata H. Mack, ex Hook. Bot. mag. Chili.

floribunda Hook. Bot. mag. Chili.

thelocamptos Lehm. Mexico.

II. Aculeis centralibus heteromorphis.

§. 1. Mammillis sulcatis.

a) globosae.

Ottonis Pfeiff. Mexic.

scolymoides Scheidw. Mexico.

phymatothele Berg, in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.

 β) pyramidato-cylindraceae.

rhaphidacantha Lem. Cact. nov. gen. et spec. ?

ancistracantha Lem. ?

clava Pfeiff. Mexico.

§. 2. Mammillis ovatis v. cylindraceis.

a) globosae.

Fennelii Hopfer in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.

Schellhasii Pfeiff. Mexico.

sphaerotricha Lem. ?

ancistroides Lem. ?

ancistria Lem. ?

phaeacantha Lem. Mexico.

Oothele Lem. (= ? *echinops* ? *rosea*). ?

ovinamma Lem. ?

Cacteae

 β) pyramidatae v. cylindricae.

- clavata Scheidw. Mexico.
 decipiens Scheidw. Mexico.
 candida Scheidw. Mexico.
 zephyranthoides Scheidw. Mexico.
 nitida Scheidw. Mexico.
 leucocentra Berg, in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.
 polycentra Berg l. c. Mexico.
 crassispina Pfeiff. Mexico.

§. 3. Mammillis pyramidato-polyedris.

 α) globosae.

- centricirra Lem., β) macrothele ?
 Neumanniana Lem. ?
 deflexispina Lem. Mexico.
 crocidata Lem. Mexico.
 bihamata Pfeiff. Mexico.
 Funkii Scheidw. Mexico.
 mutabilis Scheidw. Mexico.
 pentacantha Pfeiff. Mexico.
 xanthotricha Scheidw. ? β) aculeis axillaribus robustioribus.
 aeruginosa Scheidw. ?
 Ludwigii Ehbg., β) clavata. Mexico.

 β) pyramidatae v. cylindraceae.

- versicolor Scheidw. Mexico.
 conopsea Scheidw. Mexico. β) longispina Scheidw.
 formosa Galeotti. Mexico.
 pyrrocephala Scheidw. Mexico.
 geminata Scheidw. Mexico.
 leucotricha Scheidw. ?
 echinocactoides Pfeiff. Mexico.
 Parkinsonii C. Ehbg. Mexico.

§. 4. Mammillis conicis.

 α) globosae.

- dolichocentra Lem. Mexico.
 aureiceps Lem. Mexico.
 pyrrochraantha Lem. ?
 rhodocentra Lem. ?
 scepontocentra Lem. (= *sulcolanata* var. ?) ?
 acicularis Lem. ?
 ruficeps Lem. ?
 Guilleminiana Lem. ?
 Odieriana Lem. Mexico.
 longispina Rehb. Suppl. zu Terschek's Cact. (= *Galeotti* Otto mss.). Mexico.
 minima Terschek Suppl. ? stellata var. Mexico.
 Seidelii Tersch. Mexico.
 recurvispina Vriese. Mexico.

 β) pyramidatae vel cylindraceae.

- Celsiana Lem. ?
 depressa Scheidw. Mexico.
 inconspicua Scheidw. (= *M. conoidea* DC. = *diaphanacantha* Lem.). Mexico.
 stipitata Scheidw. Mexico.
 ceratocentra Berg in Otto et Dtr. GZtg. Mexico.
 coronata Scheidw. ?
 erecta Lem. Mexico.

Cacteae

- spinosissima Lem. ?
 aulacothele Lem. Mexico. β) sulcimamma Pfeiff. (= *aulac.* var. *multispina* Scheidw.). Mexico.
 biglandulosa Pfeiff. Mexico.
 gracilis Pfeiff. Mexico.
 nobilis Pfeiff. Mexico.
 Pfeifferiana Vriese. Mexico. α) fulvispina Scheidw., β)
 dichotoma Scheidw., γ) altissima Scheidw., δ) flavi-
 ceps Scheidw., ϵ) variabilis Scheidw.
 speciosa Vriese. Mexico.
 tecta Miquel ?
 Martiana Pfeiff. ?
 turbinata Hook. Bot. mag. t. 3984.

Nicht hinlänglich bekannt:

[d. h. deren Stellung unter die Abtheilungen (Gruppen)
 noch nicht genau ermittelt worden.]

- imbricata Wegener. Mexico.
 Zeschwitzii Terscheck Suppl. (= *monoacantha* ?). ?
 obconella Scheidw. Bonaria.
 incurva Scheidw. Mexico.
 polytricha S. Dyck, α) hexacantha, β) tetracantha. ?
 Scheidweileriana Otto (= *glochidiata* var. *purpurea*
 Scheidw. = *gloch.* var. *sericata* Lem.)
 Hoffmannseggiana Hffmsg. Nachtrag zu d. Verz. VI.
 33—35 (= *inuncta* Hffmsg. ¹).

II. Melocactus DC.

- goniocanthus Lem. ?
 violaceus Pfeiff. (= *Parthoni* Hort.). Brasilia.
 depressus Hook. Bot. mag. Brasilia.
 Besleri Lk. et Otto excl. Syn. Lehm. Brasilia.
 Monvillianus Miquel. ?
 curvispinus Pfeiff. Mexico.
 obtusipetalus Lem., β) crassicostatus Lem. Santa Fe
 de Bogota.
 Hystrix Parment. ?
 communis DC. (= *Cact. Melocact. L.*), β) macrocephalus
 Lk. et Otto, St. Domingo, St. Thomas. γ) oblongus
 Pfeiff., St. Domingo. δ) laniferus Pfeiff. Westind.
 ϵ) Grengelii H., Dresd. ζ) conicus Pfeiff. ?
 havannensis Miquel (= *M. communis* var. *havannensis*
 Pfeiff.). Havanna.
 amoenus Hffmsg. (= *M. communis* var. *Jördensii* Otto
 = *rubens* Hort.). Columbia.
 rubens Pfeiff. Westindien.
 Wendlandii Miquel (= *Cact. Melocactus* Wendl. =
Meloc. communis var. *viridis* Otto).
 dichroacanthus Miquel. Insel St. Thomas.
 Brogniartii Lem. ?
 Miquelii Lehm. Insel St. Crucis.
 meonacanthus Lk. et Otto. Jamaica.
 spatangus Pfeiff. Curaçao.
 Lehmanni Miquel. Curaçao.

1) Es mögen allerdings, wie dies auch bei den folgenden Gattungen der Fall sein mag, manche Arten doppelt, d. h. unter verschiedenen Namen eine und dieselbe Art (vielleicht im jüngern Zustande beobachtet) vorkommen, was fernern Beobachtungen zur Berichtigung überlassen bleibt.

Cacteae

- microcephalus Miquel. Curaçao, Brasilien.
 Salmianus Otto mss. in Salm Dyck hort. (= *Echinocactus Salmianus* Lk. et Otto). Curaçao.
 atosanguineus Pfeiff., Insel St. Thomas.
 pyramidalis S. Dyck, β) carneus Miquel. ?
 Zuccarinii Miquel. Curaçao.
 xanthacanthus Miq. (= *Fchinoc. xanth.* Miq.). St. Thomas.
 macracanthus S. Dyck. St. Domingo, Curaçao.
 macracanthoides Miquel. St. Thomas.
 caesius H. L. Wendl. mss., apud Miquel, Columbia.
 griseus H. L. Wendl. l. c. Columbia.
 pentacentrus Lem. Brasilien.
 Lemairii Miquel. St. Domingo.
 Oreas Miquel. Bahia.
 crassispinus S. Dyck (= *Echinocact. Lemairii* Monv. ex Lem. Cact.). ?

Species vix-nota.

- Leucaster Hffinsg. (= *communis* var. *spinis breviorib. albis*). ?

III. *Anhalonium prismaticum* Lem. (= *Ariocarpus retusus* Scheidw.). St. Louis, Potosi.

IV. *Echinocactus* Lk. et Otto.

§. I. Costati.

* *costis rotundis.*

- Ottonis Lehm. (= *Cereus Otto.* Lehm.). Mexico. β)
 tenuispinus Lk. et Otto. Brasilien.
 Linkii Lehm. Mexico.
 tortuosus Lk. et Otto (= *muricatus* Hort.). Brasilien.
 muricatus Otto. Brasilien.
 formosus Pfeiff. (= *Meloc. Gilliesii* Hort.). Mendoza.
 rhodacanthus S. Dyck (= *coccineus* H. Berol.). Mendoza.
 Karwinskii Zucc. Mexico.
 Ceratistes Otto (an *Meloc spec.?*) Chili.
 acicularis Salm Dyck. Brasilien.
 gladius Lk. et Otto. Mexico.

** *costis obtuse angulatis.*

- Langsdorfii Lehm. (= *Meloc. Langsd.* DC.). Brasil.
 polyacanthus Lk. et Otto (= *Cact. erinaceus* Haw.).
 Brasilien.
 parvispinus (= *Cact. parvisp.* Haw.), DC. Südamerika,
 Westindien.
 tephrocanthus Lk. et Otto. Brasilien.
 intricatus Lk. et Otto. Montevideo.
 orthocanthus Lk et Otto. Montevideo.
 oligacanthus Mart. Mexico.
 ingens Zuccar. Mexico.
 pruinosis Otto (= *Cereus roridus* H. Berol.). Mexico.

*** *costis acuatis.*

- acuatus Lk. et Otto. Montevideo.
 corynodes Otto (= *acutangulus* Zucc. = *rosaceus* et
Sellowianus Hort.). Montevideo, Mexico.
 Sellowianus Lk et Otto. Montevideo.
 sessiliflorus Pfeiff. ?
 cornigerus DC. (= *Cact. latispinus* Haw. = *Melocact.*
latispin. Hort.). Mexico, Guatemala.
 recurvus Lk. et Otto (= *Cact. recurv.* Haw. = *C. no-*

Cacteae

- bilis* W. Ait. = *Cact. multangularis* Voigt = *Echinocactus glaucus* Karw.). Peru, Mexico.
Echidne DC. Mexico.
oxypterus Zucc. (= *Hystrix* DC.). Mexico.
glaucescens DC. Mexico.
Pfeifferi Zucc. Mexico.
platyacanthus Lk. et Otto. Mexico.
macrodiscus Mart. Mexico.
Spina christi Zucc. (= *Fischerii* H. Berol.). Mexico.
tuberculatus Lk. et Otto. Mexico.
spiralis Karw. (= *robustus* Karw. = *agglomeratus* Hort.). Mexico.
robustus Otto (= *spectabilis* = *subuliferus* Hort.), β) *prolifer* (= *agglomeratus* Karw.), γ) *monstrosus*. Mexico.
armatus Salm Dyck. ?
ornatus DC. Mexico.

**** *Costis compressissimis, crispatis.*

- crispatus* DC., β) *horridus* DC. Mexico, Guatemala.
dichroacanthus Mart. Mexico.
anfractuusus Mart. Mexico.
obvallatus DC. Mexico.
phyllacanthus Mart. Mexico. β) *spinis foliaceis tribus* Scheidw., γ) *spina foliacea unica* Scheidw. Mexico. (beide var.)

§. 2. Tuberculati.

- Scopa* Lk. et Otto (= *Cereus* S. DC.), β) *candidus*. Brasilien.
acutissimus Otto et Dietr. Chili.
exsculptus Otto (= *subgibbosus* Haw. = *Acanthion* et *interruptus* H. Berol. = *Cer. montevidensis* Hort.). Chili, Montevideo, Mexico.
hypocentrus Lehm. Brasilien.
centeterius Lehm., Hook. Bot. mag. t. 3972. Brasil.
pachycentrus Lehm. Brasilien.
leucacanthus Zuccar. Mexico.
subuliferus Lk. et Otto. Mexico.

Species parum notae.

- intortus* DC., (*Cactus* Mill. Dict.). Antigua. β) *purpureus* Plum. (= *Cactus nobilis* Lam.). St. Domingo.
depressus DC., (*Cact.* Haw.). Südamerika.
melocactiformis DC. Mexico.
 ? *aureus* Meyen (*Cact. aur.* Meyen). Peru.
 ? *cereiformis* DC. An *Cereus quidam junior*? Mexico.

Species addendae.

Sect. I. *Macrogoni* Lehm.

Angulis validis.

- melocactoides* Lem. ?
curvicornis Miquel. ?
Terscheckii Rchb. Montevideo.
Vanderaeyi Lem. Mexico.
electracanthus Lem. ?
dolichacanthus Lem. Mexico.
helophorus Lem. ?
aulacogonus Lem., β) *diacopaulax*. ?
pycnoxiphos Lem. ?

Cacteae

- hyttrichacanthus Lem. ?
 horizonthalonius Lem. ?
 Cumingii Hopffer, in Otto et Dtr. GZtg. Peru.

Sect. II. Crateranthi Lem.

Floribus in craterem explicatis.

- sessiliflorus H. Mack. et Hook. Bot. mag. t. 3569.
 mammillarioides Hook. Bot. mag. Chili.
 mammillifer Miquel. ?
 araneolarius Rehb., in Tersch. Suppl. Montevideo.
 Jenischianus Pfeiff. Südamerika.
 erinaceus Lem. Montevideo.
 Courantii Lem. ?
 submammulosus Lem. ?
 tetracanthus Lem. Montevideo.
 hypocratiferiformis Otto et Dietr. Montevideo.
 acanthoides Lem. ?

Sect. III. Stenogoni Lem.

Angulis compressis.

- arrigans Lk. mss. Mexico.
 campulacanthus Scheidw. ?
 stellatus Scheidw. ?
 debilispinus Berg, in Otto et Dietr. GZtg. Mexico.
 hyttrichocentrus Berg, l. c. Mexico.
 flavovirens Scheidw. Mexico.
 solenacanthus Scheidw. Mexico.
 corynacanthus Scheidw. Mexico.
 Galeottii Scheidw. Mexico.
 tortus Scheidw. (= *ornatus* DC. = *holopterus* Miq. =
Mirbelii Lem.). Mexico.
 Forbesii F. A. Lehm., in Tersch. Suppl. ?
 lancifer Rehb., in Tersch. Suppl. var. oxypteri? Mexico.
 Reichenbachii Terschek. Mexico.
 macracanthus Vriese. Mexico.
 phyllacanthoides Lem. ?
 grandicornis Lem. Mexico.
 tetracentrus Lem. Mexico.
 pentacanthus Lem. Mexico.
 ensiferus Lem. Mexico.
 xiphacanthus Miq. ?
 irroratus Scheidw. Mexico.
 Dietrichii* (*lancifer* A. Dtr. = *obvallatus* Pf.). Mexico.
 Melmsianas Wegener. Mexico.
 spinosus Wegener. Mexico.
 quadrinatus Wegener. Mexico.

Sect. IV. Phymatogoni Lem.

Costis tuberculatis.

- pectinatus Scheidw. (= *pectiniferus* Lem.). Mexico.
 Mackieanus Hook. Bot. mag. Chili.
 scelothrix Lehm. Mexico.
 fossulatus Scheidw. Mexico.
 Ehrenbergii Pfeiff. (= *porrectus* Lem. = *subporrectus*
 Lem.). Mexico.
 turbiniiformis Pfeiff. (= *Mammillaria turbinata* Hook.
 Bot. mag. t. 3984). Mexico.
 Monvilli Lem. Paraguai.
 pumilus Lem. ?
 ? hyptiacanthus Lem. ?

Cacteae

- thrinogonus Lem., β) elatior. ?
 gracillimus Lem. ?
 pectiniferus Lem., β) laevior. ?
 hexaedrophorus Lem., Iconogr. d. Cactées. Mexico.
 equitans Scheidw. Mexico.
 insculptus Scheidw. Mexico.
 hexaedrus Scheidw. Mexico.
 arachnoideus Scheidw. Mexico.

- gilvus Dietr. Mexico.
 macracanthus de Vriese. ?
 sulphureus Dietr. Mexico.
 concinnus Lem. ?

V. Discocactus Pfeiff.

- insignis Pfeiff. Westindien.
 Lehmanni Pfeiff. (= *Cact. placentiformis* Lehm.). ?
 Linkii Pfeiff. (= *Melocactus Besleri* Otto). ?

VI. Astrophytum Lem. nov. Cact. gen. et spec. 3 et 105.

- A. Myriostigma Lem. ?

VII. Echinopsis Zuccar.

I. Macracanthae.

- multiplex Pfeiff. et Otto (= *Cereus m.* Pfeiff. Enumer. = *Echinoc. multiplex* H. Berol. = *sulcatus* Hort. = *Echinonyctanthus multiplex* Lem.). Brasil.
 Zuccarinii Pfeiff. (= *Cereus tubiflorus* Pfeiff. = *Echinocactus tubiflorus* Hort. = *Echinonyct. tub.* Lem.).
 nigrispina Walp. (= *Echinonyct. nigrisp.* Lem.).
 leucantha Walp., Lindl. Bot. reg. XIII. t. 13 (= *Cereus leuc.* Pfeiff. = *Echinonyct. leuc.* Lem. = *Echinoc. leucanthus* Gill. = *Melocactus ambiguus, elegans* Hort. = *Cereus incurvispinus* H. Darmst.). Chili.

II. Micracanthae.

- Decaisniana Walp. (= *Echinonyct. D.* Lem.). ?
 turbinata Pfeiff. (= *Cereus t.* Pfeiff. = *Echinonyct. t.* Lem.). ?
 picta Walp. (= *Echinonyct. pictus* Lem.). ?
 Eyriesii Pfeiff. et Otto (= *Echinocactus Turp.* = *Cereus Eyriesii* Otto = *Echinonyctanthus* Lem.). Bonaria.
 Schelhasii Pfeiff. et Otto (= *Echinonyctanthus* S. Lem. = *Cereus* S. Pfeiff. = *Echinoc. Boutillieri* Parm.). ?
 oxygona Pfeiff. et Otto (= *Cereus* Lem. et Otto = *Echinocactus* Lk. = *Echinonyctanthus* Lem.). Brasil.
 campylacantha Pfeiff. et Otto (= *Cereus leucanthus* Pfeiff. = *Echinocat. leuc.* Gill. = *Melocact. ambiguus, elegans* Hort. ¹⁾). Chili.

VIII. Cereus Haw.

Sect. I. Cephalophorus Miq.

- senilis DC. (= *bradypus* Lehm. = *Pilocereus senilis* Lem.). Mexico, Guatemala, Brasilien.
 Columna Trajani Karw. (= *Pilocereus C. T.* Lem.). Mexico.

1) Schon bei *Echinopsis leucantha* citirt; auch ein *Cereus curvispinus* H Darmst. wird wiederum dazu citirt.

Cacteae

Sect. II. Eucereus Miq.

§. 1. Globosi.

- denudatus Otto (= *Echinocact. denud.* Lk. et Otto).
Brasilien.
pulchellus Pfeiff. (= *E. pulch.* Mart.). Mexico.
gibbosus Salm Dyck (= *Cactus* Haw. = *Echin. gibbosus* DC.). Jamaica.

§. 2. Cereastri.

a) robusti.

- reductus DC. (= *Cact. red.* Lk. = *nobilis* Haw.).
Mexico, Guatemala.
dichroacanthus Mart. Mexico.
polylophus DC. (= *Cer. Columna Trajani* Karw?). Mexico.
foveolatus Haage mss. ex Pfeiff. ?
multangularis Haw. suppl. (= *Kageneckii* Gmel. hort. Carls.), β pallidior (= *multangularis spinis albis* = *ochracanthus* Hort.). Südamerika.
strigosus Salm Dyck (? = *myriophyllus* Gill.?) Chili.
Lecchii Colla Hort. Ripul. (= *lanuginosus aureus* H. Medion.). ?
lanatus DC. Quito.
magnus Haw. (= *E. Eyriesii*?). St. Domingo.

b) tenues.

- parvisetus Otto. Brasilien.
flavescens Otto. ?
micracanthus DC. Mexico.
lanuginosus Haw. (L.) (= *repandus* Mill., β glaucescens (= *C. Royeni* H. Goetting.).
Royeni Haw. (L.) (= *lanuginosus* Mill. = *gloriosus* Hort.). Caribäen, Antillen.
floccosus Otto. St. Thomas.
armatus Otto. St. Thomas.
Curtisii Otto (= *Royeni* Bot. mag. = *Cer. octogonus* H. Anglor.). Granada.
fulvispinus Haw. (= *Royeni* Mill. Dict.).
flavispinus Salm Dyck. Südamerika.
Haworthii DC. (Spgl.) (= *nobilis* Haw.). Caribäen.
strictus DC. (W. E.) (= *Cereus mollis, nigricans, repandus spinis aureis* Hort.). Südamerika.
niger S. Dyck (Spgl.), β gracilior Salm Dyck. Südamerika.
aureus S. Dyck. ?
lutescens S. Dyck (= *aureus* β *pallidior* H. Dyck). ?
Moritzianus Otto. La Guayra.
crenulatus S. Dyck (= *Cact. Royeni* W. = *Cer. acromelas* H. Berol.), β griseus S. Dyck. Curaçao.
albispinus S. Dyck (= *elongatus, decagonus* Hort.). Mittägl. Amer.
coerulescens S. Dyck (= *Aethiops* Haw. = *Mendory* Hortul.). Brasilien.
azureus Parm. Brasilien.
spinibarbis Otto. Chili.

β) *glabri areolis-nudis tomentosis, lanugine nulla.*

a) robusti.

- chilensis Colla (= *Coquimbanus* Hort. non Molin = *Quintero* H. Goett. = *Echinoc. pyramidalis, elegans, subrepandus* Hort.). Chili.

Cacteae

- stellatus Pfeiff. Mexico.
 Dyckii Mart. Mexico.
 alacriportanus Mart. Brasilien.
 peruvianus Tabernaem. DC. (= ? *Cact. peruvianus*,
heptagonus, *hexagonus* et *pentagonus* L. = *Cereus*
heptagonus et *hexagonus* Hort.). Peru. β) monstrosus DC.
 (= *abnormis* W. E. = *Cereus monstrosus* Hort.). Peru.
 monoclonos DC. (= *Cact. hexagonus* Lam. = *Cereus*
surinamensis Auct.). Surinam, Caribaeen.
 calvescens DC. Mexico.
 candelaris Meyen. Peru.
 arequipensis Meyen. Arequipa.
 curvispinus Bertero mss. in Meyens Reise. Peru.
 caesius Salm Dyck (= *glaucus* Hort.). ?
 geometrizzans Mart. (= *Aquicaulensis* Hort.). Mexico.
 eburneus S. Dyck (= *Cactus eburn.* Lk. E. = *Coquim-*
banus Molin. = *C. peruvianus* W. E. suppl. nec L.,
 β) polygonus (= *griseus* Haw. = *polygonatus* Hort.),
 γ) monstrosus S. Dyck, δ) monstrosus ramosus. Chili.
 Hystrix S. Dyck. Antillen.
 candicans Gill. (= *Echinocact. candicans* Hort. = *C.*
gladius Lem.), β) tenuispinus (= *Montezumae*
 Hort.). Mendoza.
 regalis Haw. Südamerika.
 euphorbioides Haw. Südamerika.
 serruliflorus Haw. (= *fimbriatus* DC.). Westindien.
 grandispinus Haw. Westindien. (Hierzu citirt Walpers
 auch *C. fimbriatus* DC. (Lam.).
 β) Attenuati.
 repandus Haw. (= *Cactus* L. = *Cer. gracilis* Mill. =
Cactus Royeni DC. pl. gr.). Antillen, Caribäen.
 subrepandus Haw. (= *imbricatus* Hort.). Caribäen.
 eriophorus Otto (= *cubensis* Zucc. = *subrepandus* Hort.),
 β) laetevirens S. Dyck. Cuba.
 undatus Otto. ?
 divergens Otto. St. Domingo.
 divaricatus DC. (= *fimbriatus* Hort.). St. Domingo.
 erectus Karw. Mexico.
 chlorocarpus DC. (H. B. K.) Quito.
 γ) gemmati: areolis gemmaeformibus approxima-
 tis, interdum confluentibus.
 gemmatus Zucc. Mexico.
 anisacanthus DC., β) ortholophus (= ? *gemmatus* Zucc.),
 γ) subspiralis. Mexico.
 marginatus DC. (= *incrustedus* H. Berol. = *cupulatus*
 Hort. = *Mirbelii* H. Belg.). Mexico.
 Olfersii Otto. Brasilien.
 conicus Otto. Mexico.
 Jamacaru S. Dyck (= *glaucus* Hort.). Brasilien.
 glaucus Salm Dyck. ?
 lividus Pfeiff. (= *Perotettii* Hort.). Brasil., la Guayra.
 laetevirens Otto nec S. Dyck. ?
 grandis Haw. Brasilien.
 tetragonus Haw. (L.), β) minor Salm Dyck (= *penta-*
gonus W.). Südamerika.
 virens DC. (= *exserens* Lk. = *affinis* H. Berol.). Mexico.
 sublanatus S. Dyck. ?
 tilophorus Pfeiff. (= *retroflexus* Hort.). ?

Cacteae

§. 3. Polylophi caule humili carnoso etc. etc.

- cinerascens DC. (= *Deppei* H. Berol., H. Dyck = *Jamacaru* Piso.). Mexico. β) crassior DC. (= *acina-ciformis* H. Berol.), γ) tenuior DC.
 pentalophus DC., α) simplex (= *propinquus* DC.), β) subarticulatus (= *leptacanthus* DC.). Mexico.
 tuberosus Pfeiff. Mexico.

§. 4. Opuntiacei Pfeiff.

- moniliformis DC. (L.) St. Domingo.
 ovatus Pfeiff. (= *Opuntia Gilliesii* H. Berol. = *Op. ovata* H. Angl.). Mendoza.
 articulatus Otto et Dietr. (= *Opuntia articulata* Otto = *Op. polymorpha* H. Angl.). Mendoza.
 syringacanthus Pfeiff. (= *Opuntia platyacantha* H. Angl.). Mendoza.
 ? serpens DC. prdr. (H. B. K.). Quito.
 ? nanus DC. (H. B. K.). Quito.

§. 5. Protracti.

- serpentinus Lagasc., Lk. et Otto, Hook. Bot. mag. Mexico.
 ambiguus DC. (Bonpl.) ?
 polygonus DC. (Lam.). St. Domingo.
 obtusus Haw. Brasilien.
 variabilis Pfeiff. (= *Pitajaya* DC. (Jacq.) = *undulosus* DC. = *laetevirens* Salm Dyck = *quadrangularis*, *trigonus*, *prismatiformis*, *hexangularis*, *cognatus*, *affinis*, *glaucus*, *speciosus* Hort.). Mexico, Peru, Brasilien, Westindien.
 validus Haw. Südamerika.
 laetus Salm Dyck (= *formosus* Hort.). Montevideo.
 paniculatus DC. (Lam.) ?
 laetus DC. (H. B. K.). Quito.
 acutangulus Otto (= *undulatus* H. Dresd.). Mexico.
 pellucidus Otto. Cuba.
 princeps H. Würzb. ex Pfeiff. ?
 Bonplandii Parm. Brasilien.
 ramosus Karw. Mexico.
 baxaniensis Karw. Mexico.
 pentagonus Haw. (L.) (= *Cact. prismaticus* et *reptans* W. = *Cereus prism. et rept.* Haw.). Südamerika.
 tenellus S. Dyck. Brasilien.

§. 6. Repentes.

- Martianus Zucc. Mexico.
 flagelliformis Mill. (L.), β) minor S. Dyck. Südamerika.
 Smithii H. Angl. (= *Cer. crimson creeping* Bot. Reg. t. 1565 = *Cer. Mallisoni* Hort.). ?
 flagriformis Zucc. Mexico.
 leptophis DC. Mexico.
 Humboldtii DC. Quito.
 icosigonus DC. (H. B. K.). Quito.
 sepium DC. (H. B. K.). Quito.
 grandiflorus Mill., β) speciosissimus. Carib. Antill.
 nycticalus Lk. (= *pteranthus* Lk. = *brevispinulus* S. Dyck = *Antoini* H. Vindob. = *obtusus*, *rosaceus* Hort.). Mexico.
 garipensis DC. (H. B. K.) (= *quadrangularis* Haw.). Neuandalusien.

Cacteae

- radicans DC. (= *reptans* S. Dyck nec W. = *biformis* Hort.).
 spinulosus DC. Mexico.
 albisetosus Haw. St. Domingo.
 humilis DC. (= *gracilis* S. Dyck), β) minor (= *myriocaulon* Mart. = *Mariculi* Hort.). Südamerika.
 setiger Haw. Brasilien.
 inermis Otto. La Guayra.
 triangularis Haw. (L.) (= *compressus* Mill.), β) major (*undatus* Haw.), γ) pictus, s. variegatus. Mexico, Caribaeen.
 Napoleonis Grah., Bot mag. t. 3458 (= *triangularis major* S. Dyck). Westindien.
 triquetter Haw. (= *Cact. prismaticus* Dsf.). Südamerika.
 trigonus Haw. (= *Cact. triangularis foliosus* Jacq.), β)
 quadrangularis Haw. Carib.
 tripteris S. Dyck. ?
 prismaticus S. Dyck. Südamerika.
 extensus S. Dyck (= *subsquamatus* Pfeiff. = *horridus* Hort.?). ?
 setaceus S. Dyck, β) viridior S. Dyck (= *coccineus* DC.). Brasilien.

b) Speciosi.

- speciosissimus DC. (= *Cact. spec.* Dsf. = *speciosus* W.),
 β) lateritius Bot. reg. (= *hybridus* H. Berol. = *Epiphyll. hybrid.* Hort.), γ) Jenkinsonii H. Angl., δ)
 Vandesii H. Angl., ϵ) ignescens H. Dr., ζ) Guillardieri, η) Curtisii, θ) Roylii, ι) Devauxii, κ) Lothii,
 λ) Kiardi, μ) coccineus grandiflorus, ν) unduliflorus,
 ξ) Eugenia, \omicron) Mayfly, η) Makoyi, ρ) aurantiacus, σ)
 albiflorus ?, τ) grandiflorus etc. Andere Hybriden:
 Hansii Baumann, formosus Bosse, nothus Bosse,
 Selloi etc.
 Schrankii Zucc. (= *formosus* H. Monac.). Mexico.
 coccineus S. Dyck (? = *bifrons* Haw.). Mexico.

Species addendae.

- callicoché Scheidw. (= *inermis* Scheidw.). Mexico.
 Dumortieri Scheidw. Bonaria.
 polyptychus Lem. ?
 nigricans Lem. ?
 violaceus Lem. ?
 fernambucensis Lem. ?
 Terscheckii Parm. Buenos Ayres.
 Pfeifferi Parm. Buenos Ayres.
 horridus Otto. La Guyara.
 hamatus Scheidw. (= *rostratus* Lem.). Mexico.
 rostratus Lem. (= *hamatus* Scheidw.?). Mexico.
 Maelenii Pfeiff. Mexico.
 fulvibarbis Otto et Dietr. (= *chilensis* Hort.). Chili.
 deficiens Otto et Dietr. Caracas.
 resispinatus S. Dyck. ?
 ericomus Rchb., in Terscheck Suppl. Brasilia.
 geminisetus Rchb. ?
 xanthochaetus Rchb. ?
 polychaetus Rchb. l. c. (= *chalybaeus* Otto mss.) ?
 horridus Otto et Dietr. Curaçao.
 thalassinus Otto et Dietr. La Guayra.
 gladiator Otto et Dietr. (= *pugioniformis* Lem.). Mexico.

Cacteae

- tortuosus Forbes in Otto et Dietr. Gtzg. Buenos Ayres.
 lamprochlorus Lem. ?
 fluminensis Miquel. Brasilien.
 tenuis Pfeiff. ?
 Ehrenbergii Pfeiff. Mexico.
 cometes Scheidw. ?
 pterogonus Lem. Mexico.
 lumbricoides Lem. Montevideo.

IX. *Phyllocactus* Lk. (= *Phyllanthus* Miq. =
Cerei §. 7. *alati* Pfeiff., Enumer. Cactear.).

- Ackermanni Lk. (= *Cer. A.* Otto = *Epiphyll. A.*
 Haw.). Mexico.
 phyllanthoides Lk. (= *Cer. phyll.* DC. = *Cact. phyllan-*
thoides DC. = *C. speciosus* Bonpl. = *alatus* W.E.
 Suppl. = *Epiphyllum speciosum* Haw. = *Cact. ele-*
gans Lk. Enum. = *Epiphyll. phyllanthoides* Hort.),
 β) albiflorus. Mexico.
 oxypetalus Lk. (= *Cer. oxypetalus* DC. = *Epiphyll.*
oxypetalum Hort. = *Cact. oxypet.* Moc. et Sess.).
 Mexico et Guatimala.
 latifrons Lk. (= *Cer.* (= *Epiphyll. Zucc.*), *latifrons*
 Pfeiff.). Mexico.
 Hookeri Lk. mss. (= *Cereus Hookeri* Otto = *Epiphyll.*
Hookeri Haw. = *C. Phyllanthus* Hook. = *C. margi-*
natus S. Dyck). Brasil., Demerary.
 Phyllanthus Lk. (= *Cer. Phyllanthus* DC. = *Epip.*
Phyllanthus Haw. = *Cact. Phyllanthus* L. = *Opun-*
tia Phyllanthus Mill.). Brasil., Surinam, Guadeloupe.

X. *Epiphyllum* Pfeiff.

- truncatum Haw. (= *Cereus truncatus* DC. = *Cactus*
truncatus Lk. En.), β) coccineum, γ) aurantiacum
 Hort. Brasilien.
 Altensteinii Pfeiff. (= *Cereus truncatus Altensteinii*
 H. Berol. = *Epiphyll. truncatum multiflorum* Hort.).
 Brasilien.
 Russelianum Hook. Bot. mag. t. 3717 (= *Cereus Rus-*
selianus Gardn.). Brasilien.

§. 2. *Cacteae rotatae* Miq., Endl.XI. *Rhipsalis*.Subgenus I. *Rhipsalis* Pfeiff.1) *Alatae*.

- crispata Pfeiff. (= *Epiphyllum crispatum* Haw. = *Cer.*
crispatus H. Berol.). ?
 rhombea Pfeiff. (= *Cer. rbombeus* S. Dyck = *Cer. cri-*
spatus crenulatus H. Berol. = *Cactus torquatus* H.
 Lugdb. = *Epiphyll. crenulatum, rhombeum* Hort.). ?
 ramulosa Pfeiff. (= *Cer. ramulosus* S. Dyck = *Epiphyll.*
ramulosum, ciliare, ciliatum Hort.). ?
 platycarpa Pfeiff. (= *Epiphyll. platycarpum* Zucc.).
 Brasilien.
 Swartziana Pfeiff. (= *Cactus alatus* Sw. = *Cereus ala-*
tus DC. = *Epiphyll. alatum* Haw.). Jamaica.
 pachyptera Pfeiff. (= *Cereus alatus* Lk. et Otto = *Ep.*
alatum Haw. suppl. = *Cactus alatus* Bot. mag.),
 β) crassior S. Dyck Westindien.

Cacteae

2) Angulosae.

pentaptera Pfeiff. Brasilien.

trigona Pfeiff. Brasilien.

micrantha DC. Pfeiff. (= *Cact. micranthus* Kunth). Quito.

3) Teretes.

Cassytha G. (= *Cact. pendulus* Sw. = *Cassytha baccifera* Mill. = *Rhipsalis pendula* Hort.). Jamaica. Hispaniola α) Swartziana DC. Antill., β) Hookeriana DC. Mexico, γ) Mociniana DC. Mexico, δ) dichotoma DC. (= *Cact. pendulus* H. B. K.), Neu-Andalus. & Neu-Granada, ϵ) mauritiana DC. (= *Cact. pendulinus* Sbr.), Mascarenas, ζ) pendula S. Dyck). ?

floccosa S. Dyck (= *Rh. Cassytha* β major S. Dyck). ?

funalis S. Dyck (= *Cactus funalis* Spgl. = *Rh. grandiflorus* Haw., Lk. et Otto = *Rh. calamiformis* Hort. = *Cactus cylindricus* Velloz. Flor. Flumin.). Südamer. β) minor (= *Rh. Cassytha* δ pilosiuscula S. Dyck).

fasciculata Haw. (= *Cactus parasiticus* L. = *Cact. fasciculatus* W. E. Suppl. = *Rh. parasiticus* Haw. = *Cact. teres* Vellozo Flor. Flum.). Brasil., Carib.

undulata Pfeiff. (= *parasitica* DC. prodr.). Caribäen.

4) Articuliferae.

mesembrianthemoides Haw. (= *R. salicornioides* β Haw. = *R. echinata* Hort.). Südamerika.

cereuscula Haw. Brasilien.

Species addendae.

macrocarpa Miq. (= *Cactus phyllanthus* Vellozo Flor. Flum.). Brasilien.

sarmentacea Otto et Dietr. Bonaria.

Subgenus II. *Lepismium* Pfeiff.

commune Pfeiff. (= *Cer. squamulosus* S. Dyck = *Cer. elegans* Hort.). Brasilien.

Myosuros Pfeiff. (= *Cer. Myosurus* S. Dyck = *Cactus tenuis* Schott. = *Cer. tenuispinus* Haw.).

Knightii Pfeiff. (= *Cer. Knightii* Parment.). Brasilien.

paradoxum S. Dyck (= *Cer. pterocaulis* Hort.). Brasil.

Species addendae.

cruciforme Miq. (= *Cact. cruciformis* Vellozo Flor. Flum.). Brasilien.

fluminense Miq. (= *Cact. triqueter* Vellozo, l. c.). Brasil.

Subgenus III. *Hariota* DC. Mem. (nec. Adans.).

salicornioides DC. (= *Cactus lyratus* Vellozo = *Opuntia salicornioides* Spgl. = *Rhipsalis salicornioides* Haw., Lk. et Otto). Brasilien, β) ramosior S. Dyck, Brasilien.

Species addenda.

Saglioni Lem. (= *Rh. Saglioni* Otto = *Rh. brachiata* Hook. Bot. mag. t. 4039). Bonaria.

XII. *Opuntia* T.

1. Caule articulato.

a) Glomeratae.

sulphurea Gill. Chili.

ovata Pfeiff. Mendoza.

corrugata H. angl. Hort., Dyck. Pfeiff. ?

pusilla Salm Dyck. Südamerika.

Cacteae

longispina Haw. Chili (Mendoza).

glomerata Haw. Chili (Mendoza).

andicola H. Angl., Pfeiff. (= *horizontalis* Gill.). Chili (Mendoza).

tuberosa H. Angl., Pfeiff. (= *O. alpina* Gill.), β) spinosa (= *platyacantha* H. Angl.). Chili (Mendoza).

mesacantha Nutt., Pfeiff. Kentucky.

caespitosa Nutt. ex Sering. Bull. 1831. Pfeiff. Kentucky.

humifusa Nutt. Pfeiff. „Num uni praecedentium aequalis?“

b) Divaricatae.

fragilis Haw. (= *Cactus fragilis* Nutt. = *Op. Sabinii* Hort.). Nordamerika (in sterilibus Missouriensibus).

aurantiaca Gill. Bot. reg. t. 1606. Pfeiff. Chili.

extensa S. Dyck mss. ?

foliosa S. Dyck, DC. prodr. (= *Cact. foliosus* W. E. Suppl. = *Op. (Cact.) pusilla* Haw. nec S. Dyck = *Op. Hystrix* Hort.). Südamerika.

curassavica Mill. Dict. (*Cact. c. L.*). Curaçao, St. Thomas. β) media Haw., γ) minor Haw., δ) longa Haw., Brasilien.

pubescens Wendl., Cat. hort. Herrenh. Pfeiff. Mexico.

c) Compresso articulatae.

vulgaris Mill. (= *Cact. Opuntia* L. = *C. Opuntia vulgaris* et *nana* DC. pl. grass. = *Op. italica* Tenore?), β) media S. Dyck. Peru, Mexico.

intermedia S. Dyck (= *O. vulgaris* γ major S. Dyck). ? Südl. Europa, Dalmatien.

coccinellifera Mill. Dict. (= *Cact. coccinell.* L. = *O. mexicana* Hortor.). Südamerika.

tuberculata Haw. Suppl. (= *Cact. tuberculat.* W. E. Suppl.). Südamerika.

stricta Haw. (= *Cact. strictus* Haw. = *Opuntia inermis* DC.). Südamerika.

lanceolata Haw. (= *Cact. l.* Haw.). Mittelamerika.

decumana Haw. (= *Cact. decumanus* W. E. Suppl. et *C. elongatus* W. l. c. = *Op. maxima* Mill. Dict.).

elata Otto. Brasilien, Curaçao.

Ficus indica Mill. (= *Cact. F. i. L.* = *Op. vulgaris* Tenor. = *Cact. Opuntia* Gussone). Mittelamerika, Sicilien, Süditalien.

crassa Haw., β) major (= *glaberrima* H. Berol.). Mexico.

parvula S. Dyck (= *glauca* Hort.). Chili.

Hernandezii DC. (= *C. cochenillifer* Flor. mexic. ined.). Mexico.

microdasys Lehm., β) minor S. Dyck (= *pulvinata* DC.). Mexico.

decumbens S. Dyck (= *repens* Karw. = *irrorata* Mart.). Mexico.

glaucescens Otto. Mexico.

grandis H. Angl. Pfeiff. (= *glaucescens* Hort.). Mexico.

albicans S. Dyck (= *Prate* Sabin.). Mexico.

sericea Don mss., in Salm Dyck hort. (= *coerulea* Gill.). Chili.

orbiculata S. Dyck (= *sericea* β *longispina* Hort. Dyck. = *longispina* Hort.). ? Chili.

puberula Dieffenb. Mexico.

leucotricha DC. Mexico.

crinifera S. Dyck (= *senilis* Parm), β lanigera. Brasil.

Cacteae

- spinulifer S. Dyck (= *oligacantha* H. Vindob.). Mexico.
 missouriensis DC. (= *Cact. ferox* Nutt. = *Op. polyacantha* Haw.). Nordamerika.
 media Haw. Nordamerika (Missouri).
 splendens H. Angl. ?
 amyclaea Tenore (= *maxima* S. Dyck). „In rupibus calcareis prope Amyclas veterum“ (Monticelli).
 dejecta S. Dyck (= *diffusa* = *horizontalis* Hort.). Havanna.
 candelabrifformis Mart. Mexico.
 lasiacantha Dieffenb. (= *leucacantha* S. Dyck). ?
 megacantha S. Dyck (= *mexicana* Hort.). Mexico.
 tomentosa S. Dyck (= *Cact. tomentosus* Lk. E.). Südamerika.
 oblongata Wendl. Mexico.
 Tuna Mill. (= *O. coccinellifera* DC. pl. gr. = *Cact. Bonplandii* H. B. K. = *O. coccinea* Hort.). Quito, Mexico, β) laevior S. Dyck (= *flexibilis* = *Bonplandii* Hort.).
 pseudo-Tuna S. Dyck, β) spinosior S. Dyck, γ) elongata S. Dyck. Südamerika.
 glaucophylla Wendl. ?
 horrida S. Dyck (= *humilis* Haw.). Südamerika.
 Dillenii DC. (= *Cact. Dill.* Bot. reg. = *Op. Tuna* β Haw.). Südamerika.
 polyantha Haw. (= *Cact. polyantha* B. mag.). Südamer.
 triacantha DC. (= *Cact. triac.* W. E. Suppl. = *C. Urumbeba* Vell.). Südamerika.
 fulvispina S. Dyck (= *elongata* Haw. Suppl.), β) laevior S. Dyck. ?
 monacantha Haw. (W. E. Suppl.) (= *Cactus Opuntia Tuna* DC. pl. gr.). Brasilien.
 nigricans Haw. (= *Cact. Tuna* β *nigricans* Bot. mag. *Opunt. coccinellifera* DC. pl. gr. = *Cact. pseudo-coccinellifer* Bert.). Südamerika.
 elatior Mill. (= *Cact. Tuna* β W.). Südamerika.
 robusta Wendl. Mexico.

d) Cruciatæ.

- rubescens S. Dyck. Brasilien.
 catocantha Otto. St. Thomas.
 spinosissima Mill. (= *Cact. sp.* Lam.). Jamaica, Antillen.
 ferox Haw. (W. E. Suppl.) (= *cruciata*, *dolabrifformis* Hort.). Südamerika.
 leucacantha Otto, (non S. Dyck) (= *subferox* Schott.). Mexico.
 leucosticta Wendl. Mexico.

e) Paradoxæ.

- brasilienensis Haw. (W. E. Suppl.) (= *Cact. paradoxus* Hornem.), β) spinosior H. Berol., γ) minor S. Dyck (= *C. arboreus* Vellozo fl. Flum.). Brasilien.

f) Cylindraceæ.

- cylindrica DC. (Lam.) (= *Cereus cylind.* Haw.). Peru.
 imbricata DC. (= *Cereus imbric.* Haw.). Mexico.
 exuviata DC. (= *undulata* Hort. = *decipiens major* H. Vindob., β) angustior DC., γ) spinosior DC. Mexico.
 tunicata Otto (= *Cer. tunicatus* Lehm. = *O. furiosa* Wendl.). Mexico, Brasilien.

Cacteae

- rosea DC. (= *Cact. subquadriflorus* Flor. Mexic. ined.). Mexico.
 Stapelia DC. Mexico.
 Kleiniae DC. Mexico.
 decipiens DC., β) minor H. Dyck. Mexico.
 gracilis Mart. (Num fors. O. decipiens minor?). Mexico.
 Salmiana Parm. Brasilien.
 leptocaulis DC. (= *virgata* H. Berol.). Mexico.
 ramulifera S. Dyck. Mexico.
 clavarioides Otto (= *Cer. clavarioides* H. Berol. = *Cer. sericeus* = *Opuntia microthele* Hort.). Mexico.
 Poeppigii Otto. Chili.

Species addendae.

1. caule non articulato.

- platyacantha S. Dyck. Chili.
 pulverulenta Pfeiff. Südamerika.

2. articulis compressis.

- Galapageia Henslow. James's Island.
 Auberi Pfeiff. Cuba.
 flavicans Lem. ?
 streptacantha Lem. ?

3. articulis teretibus aut teretiusculis.

- Darwinii Henslow. Südamerika.
 fragilis Haw. ?
 Parmentieri Pfeiff. Paraguay.
 retrospinosa Lem. ?
 acracantha Lem. ?
 diademata Lem. ?
 Turpinii Lem. (= *Cereus articulatus* Pfeiff. = ? *O. polymorpha* H. Angl.). Chili.
 eburnea Lem. ?

XIII. Pereskia Plum.

- aculeata Plum. (= *Cactus Pereskia* L.). Westindien.
 β) rubescens, γ) rotundifolia H. Dyck. (= *acardia* Parm.), δ) lanceolata (= *P. brasiliensis* H. Hamb. = *P. longispina* Haw.).
 spathulata Otto (= *crassicaulis* Zucc.). Mexico.
 Pititache Karw. Mexico.
 Bleo DC. (H. B. K.) (= *cruenta* Hort.). Mexico, Neugranata.
 grandifolia Haw. (= *Cact. grandifol.* Lk. E. = *P. grandiflora* Hort.). Brasilien.
 zinniaeflora DC. (= *Cact. zinniaeflorus* Flor. Mex. ined.). Mexico.
 lychnidiflora DC. (= *Cact. fimbriatus* Flor. Mex. ined.). Mexico.
 opuntiaeflora DC. (= *Cact. opuntiaefl.* Flor. Mex. ined.). Mexico.
 rotundifolia DC. (= *Cact. frutescens* Flor. Mex.). Mexico.
 portulacaefolia DC. (L.). Caribaeen.
 horrida DC. (H. B. K.). Brasilien.
 glomerata Pfeiff. Peru.
 ? plantaginea H. Götting.

Species addendae.

- ochnacarpa Miquel (= *Cact. Rosa* Vellozo Flor. Flum.).

Cacteae

Neue Gattungen.

XIV. *Pelecyphora* C. Ehrenb. (Beilträger).

aselliformis C. Ehrbg., kellerwurmähnlicher, 4. w. Mexico.

XV. *Gymnocalycium* Pfeiffer.

denudatum Pfeiff. (= *Echinocactus denudatus* Lk. Otto).

gibbosum Pfeiff. (= *Cactus gibbosus* Haw.).

reductum Pfeiff. (= *Cactus* (= *Cereus*) *reductus* Lk.).

XVI. *Disisocactus* (*Distocactus*) Lindl. emend.

biformis Lindl. (= *Cereus biformis* Bot. reg.).

Sehr zweifelhafte:

Cactus neglectus Denh. ?

— *verticillatus* Brotero. ?

Caelia G. Don, v. *Coelia*.

Caelogyne Wall., v. *Coelogyne*, p. 210.

Caeloglossum Lindl., v. *Coeloglossum*.

Caenopteris Cicutaria Sw. (= *dissecta* H. Berol.),

japonica Thbg., *vivipara* Hort., v. *Asplenium cicutarium* p. 92, *japonicum et foecundum* p. 50 II.

Caesalpinia Plum., *Caesalpinie*.

ferox Hassk., starkbewehrte, 5. w. Java.

laxa Benth., lockere, 5. w. Mexico.

obcordata Van Houtte, verkehrtherzförmige, 5. w. ?

paigag Hort. Madrit., *paipag-C.*, 5. w. Südamerika.

digyna Rottl. = *oleosperma*, *enneaphylla* Roxb., v.

Mezoneuron enneaphyllum, *Gilliesii* Wall., v. *Poinciania Gilliesii*, p. 639.

Caesia R. Br., *Caesie*.

asparagoides Eckl., H. Dyck., spargelähnliche, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

Helleri Hügel msc., Endl., Heller's, 4. k. t. Neuholl.

Caesulia Roxb., DC., *Caesulie*.

lancifolia G. Don, lanzettblättrige, ♂. 4. w. Ostindien.

Cajanus indicus Speg. = *C. bicolor et flavus*, *sua-*

veolens Grah., v. *Rhynchosia suaveolens*, p. 688,

wolgaricus Speg., v. *Calophaca wolgarica*, p. 149.

Cajophora Presl, *Cajophora*, XVIII. II., *Loasaceae*.

lateritia Kl. (= *Lousa lateritia* Gill., in Hook. Bot.

mag., p. 470 = *L. aurantiaca* Hort. = *Raphisanthe lateritia* Lilja).

Caladium Vent., *Caladium*.

argyrostigma Schott, silberfleckiges, 4. w. ?

bicolor Vent., p. 143 (= *Arum bicolor* Ait.).

β) *pellucidum* DC. (= *Arum pellucidum* Fulchér.),

γ) *pictum* DC. (= *Arum pictum* Fulchér. nec Auct.),

δ) *haematostigma* H. Berol.

colocasioides Brogn. (= *Arum colocasioides* Dsf.), *Co-*

*locasia*ähnliches, 4. w. ?

poecile Schott, 4. w. ?

reticulatum Dsf., netzförmiges, 4. w. ?

violaceum Dsf., violettes, 4. w. Antillen.

zamiaefolium Lodd., keulpalmenähnliches, 4. w. Brasilien.

arborescens Vent., *Bauersia* Rchb., *brasiliense* Dsf.,

crassipes Hortul. (= *macropus* Hort. Petropol.), *fra-*

grantissimum Hook., *grandifolium* W., *grandifolium*

Sims (= *Simsii* Hook.), *Imbé* Hort. Berol., *lacerum*

W., *lacerum* Hort., *luridum* Lodd., *pedatum* Hook.,

Caladium

pinnatifidum W., *tripartitum* W., v. *Philodendron arborescens*, *crassinervium*, *Fontanesii*, *cannaefolium*, *fragrantissimum*, *grandifolium*, *Simsii*, *Imbé*, *lacerum*, *incisocrenatum*, *luridum*, *pedatum*, *pinnatifidum*, *tripartitum*, *auritum* Vent., v. *Syngonium auritum*, *belophyllum* W. (= *acuminatum* Dietr.), *edule* Meyer, *livide-vaginatatum* Hortor., *xanthorrhizon* W., v. *Xanthosoma belophyllum*, *edule*, *lividum* et *Jacquini*, *cucullatum* P., *esculentum* Vent., *nymphaeifolium* Vent., *odorum* Lodd., v. *Colocasia cucullata*, *esculenta*, *nymphaeifolia* et *odora*, *hastifolium* Steud., *helleborifolium* Vent., *variegatum* Dsf., v. *Acontias hastifolius*, *helleborifolius*, *variegatus* p. 7, 8, II., *petiolatum* Hook., v. *Pythonium Hookeri*, *sarmentosum* H. Berol., v. *Gonatanthus sarmentosus*, *scandens* W., v. *Culcasia scandens*, *seguinum* Vent. et *maculatum* Lodd., v. *Dieffenbachia Seguine* et var. β) *maculata*, *simplex* Blume, *princeps* H. Berol., v. *Aglaonema simplex* et *princeps* p. 14, II., *viviparum* N. E., v. *Remusatia vivipara*. — Noch kommen in den Verzeichnissen ein *C. macrophyllum*, *pedatifidum* (? *pinnatifidum*) *quercifolium* *versicolor* etc. vor, deren Autorität etc. mir unbekannt ist.

Calamagrostis Adans., Roth, (= *Arundo* plur. auct.), Schilfrohr.

glauca R. et S. (Hornem., non MB.), blaugrünes, 4. f. Nordamerika.

lanceolata Roth, β) ? *lithuanica* Bess. (= *vilnensis* Bess.). *aemula* Steud., *Billardieri* Steud., *Forsteri* Steud., *retrofracta* Lk. (= *Agrostis retrofracta* W.), v. *Lachnagrostis aemula*, *Billardieri*, *Forsteri* et *plebeja* s. *retrofracta*, p. 881.

Calamintha T., Bergmünze.

I. *Acynos* Mch., P.

annua Schrenk, jährige, \odot . f. Asiat. Rußland.

umbrosa Fisch. et Mey. (= *Melissa umbrosa* MB.), schattenliebende, 4. f. Mittelasien, Ostindien.

β) *nepalensis* Hort. Berol.

II. *Calamintha genuina*.

thymifolia Host. (non Rchb.), thymianblättrige, 4. f. Krain.

cana Auct. = *graveolens*, *cretica* Lam. (= *fruticosa* P. = *marifolia* P.), *croatica* Host, *subnuda*

Host (W. K.) (= *origanifolia* Host), *thymifolia* Rchb. et var. *alba* Lk. (W. K.), v. *Micromeria*

marifolia, *Piperella*, *Pulegium* et *Satureja rupestris*.

Calamus L., Rotang.

equestris W., Ritter-R., \mathfrak{h} . w. Moluccen.

Neumanni Hort. angl., Neumann's, \mathfrak{h} . w. Madagascar.

oblongus Reinw., länglicher, \mathfrak{h} . w. Java.

β) *latifolius* Rumpf.

rhomboideus Blume, rautenförmiger, \mathfrak{h} . w. Java.

viminalis W. (= *Reinwardtii* Mart.), ruthenartiger, \mathfrak{h} . w. Moluccen.

Calanchoe Adans., v. *Kalanchoe*.

Calandrinia H. B. K., Calandrinie.

amoena Visiani (= *caulescens* Hort.), liebliche, \odot . f. Südamerika.

Andrewsii G. Don (= *Talinum Andrewsii* Swt. = *pattens* Andr., p. 797).

Calandrinia

- arenaria Chamiss. (= *venulosa* Hook.), Sand-C., 4. w. Chili.
 capitata Hook., Arn., kopfförmige, ☉. f. Chili.
 Cumingii Hook., Arn., Cuming's, ☉. f. Chili.
 denticulata Gill., gezähnelte, 4. ♣. t. Chili.
 discolor Schrad. (= *speciosa* Lehm., non Lindl. = *Cistanthe discolor* Spach).
 elegans Hort. Lugd. Batav., zierliche, ☉. f. ? Südamerika.
 Gilliesii Hook., Arn., Gillie's, 4. t. Chili.
 glauca Schrad. (= ? *Cistanthe glauca* Spach), blaugrüne, 4. t. Chili.
 Lindleyana Walp. (= *discolor* Lindl., nec Schrad.), Lindley's, 4. t. Chili.
 lingulata DC. (non Hort.), zungenförmige, ☉. f. Peru.
 Lockharti G. Don (= *Talinum grandiflorum* Lk.), Lockhart's, 4. t. w. Trinidad.
 Phacosperma DC. (= *Phacosperma peruviana* Haw., p. 611 = *Tetragonia peruviana* Hort.).
 racemosa Bot. mag. (= *arenaria* Hook., Arn. = *picta* Gill.), traubige, ☉. f. Chili.
 speciosa Lindl. (= *spectabilis* Otto et Dietr. = *grandiflora* Hort. = *Cistanthe speciosa* Lilja).
 umbellata DC. (= *Portulaca prostrata* Dombey = *Talinum umbellatum* R. et P.), doldige, ☉. f. Chili.
curvifolia Hort. = procumbens.

Calanthe RBr., Schönstendel.

- Jebine Siebold, Jebine-S., 4. t. k. f. b. Japan.
 Masuca Lindl. (= *Bletia Masuca* Don fl. nepal. = ? *Amblyglottis veratrifolia* Blume = *Zeduba Masuca* Hamilt.), Masuca-S., 4. w. Ostindien.
 pulchra Lindl. (= *Amblyglottis pulchra* Blum.), schöne, 4. w. Java.
 purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Ostindien.
 Sieboldii H. Hügel., Siebold's, 4. w. China.
 speciosa Lindl. (= *Amblyglottis speciosa* Blume), prächtiges, 4. w. Java.
 striata RBr. (= *Limodorum* Sw. = *L.* ? *ungiculatum* LaBill.), gestreifter, 4. w. China. Japan.
 sulphurea H. Hügel. (= *Amblyglottis sulph.* Bl.), schwefelgelber, 4. w. Ostindien.
 sylvestris Lindl. (= *sylvatica* Lindl. = *Bletia sylvatica* Spgl. = *Alismorchis Centrosis* A. P. Th. = *Centrosia Aubertii* Rich.).
 tricarinata Lindl., dreikieliger, 4. w. Ostindien.
 tricolor H. Hügel., dreifarbiger, 4. w. China.
 versicolor Lindl., buntfarbiger, 4. w. Ostindien.
Calathiana nivalis Delarbr. = *Gentiana nivalis*, p. 351.

Calceolaria L., Pantoffelblume.

- alba R. et P., weißse, ♣. k. t. Chili.
 diffusa Lindl. (= *bicolor* Grah., non R. et P.), weit-schweifige, ♣. k. t. Chili.
 excelsa Grah., hohe, ♣. k. t. Chili.
 floribunda H. B. K. (= *paniculata* W.), blüthenreiche, ♣. k. t. Quito.
 hyssopifolia H. B. K. (= *linifolia* W.), ysopblättrige, ♣. k. t. Chimboraco.
 mollissima Walp., weichste, ♣. k. t. Chili.

Calceolaria

- Morisi Walp. (= *salicifolia* Moris), Moris's, ⚭. k. t. Chili.
 petiolaris Cavan. (= *connata* Hook. = *floribunda* Lindl.).
 Hybriden: *Atkinsoniana* D. Don, *exoniensis*, Jupiter Paxton, Pluto H. Anglor., *Talisman* Paxton etc.
biflora Lam. = *plantaginea*, *Cavanillesii* P. = *Neeana*, *pinnata* R. et P. (non L.) = *scabiosaefolia*, *tinctoria* Gill. = *arachnoidea*.
- Caldasia** Lagasc. (non Willd. nec Mutis), Caldasie, V. II., Umbelliferae.
 eriopoda DC. (= *Oreomyrrhis eriopoda* Endl.), wollstieliger, ♂. 4. k. Neuholland.
Calea urticaefolia Banks, v. *Caleacte urticaefolia*.
Caleana RBr., v. *Caleya*.
- Calectasia** R. B., Calectasie, VI. I., Juncaceae.
 cyanea R. B., himmelblaue, ⚭. k. t. Neuholland.
- Calendula** L., Neck., Ringelblume.
 americana Mill., amerikanische, ☉. f. Vera Crux.
 decumbens Mill., niederliegende, ☉. f. Vera Crux.
 echinata DC., igelstachelige, ☉. f. Mogador.
 maderensis DC. (= *maritima* Lowe, non Guss.), madeirische, ☉. f. Madeira.
 maritima Guss. (= *stellata* ?), Meerstrand's, ☉. f. Sicilien.
- Ungewissere oder Gartenvarietäten: *anemoneflora* Hort., *aurea* Hort., *grandiflora* Hort., *incanescens* Schrad., *linifolia* Wendl., *speciosa* Hort.
crista galli Vivian = ? *stellata*, *Dalgesirum* Hort. = *marginata*, *dentata* Hort. = *denticulata*, *hispanica* Tenore (non Hort.) = *incana*, *arborescens* Jacq. (= *rigida* Ait. = *muricata* Thbg.), v. *Tripteris arborescens*.
Calimeris Nutt., v. *Aster*, Sect. III., p. 97. C.
platycephala Nutt. = *incisa*, l. c.
Calla aromatica Roxb. (= *occulta* Lodd. vix Lourr.), v. *Homalonema aromaticum*, *Dracontium* Mey. (= *pertusa* Kunth), v. *Monstera Adansonii*.
- Calliandra** Benth., Schönfaden, XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimosaceae.
 alba Benth. (= *Acacia alba* Colla, non Willd. = *A. Collacana* Presl.), weißer, ⚭. w. ?
 asplenioides Benth. (= *Acacia asplenioides* N. E. = *Inga mertensioides* N. et Mart.), strichfarnblättriger, ⚭. w. Brasilien.
 caracasana Benth. (= *Acacia carac.* W., p. 2), *formosa* Benth. (= *Acacia formosa* Kunth., p. 3), *grandiflora* Benth. (= *Mimosa grandiflora* L'Her. = *Acacia grandiflora* W., p. 3), *Houstoni* Benth. (= *Inga Houstoni* DC., p. 417 = *Acacia Houstoni* W. = *Mimosa Houstoni* L'Her.), *Kunthii* Benth. (= *Inga anomala* H. B. K., p. 416), *laxa* Benth. (= *Acacia laxa* W., p. 3), *Lambertiana* Benth. (= *Acacia Lambertiana* Ker), *portoricensis* Benth. (= *Acacia portoricensis*), *quadrangularis* Benth. (= *Acacia quadrangularis* Lk., ? = *tetragona* W.)
- Callianthemum** C. A. Mey., Schönblümchen, XIII. VI. *anemonoides* Endl. (= *rutaefolium* Rchb. = *Ranunculus anemonoides* Zahlbr., p. 675).

Callianthemum

rutaefolium C. A. Mey. (= *coriandrifolium* Rchb. = *Ranunculus rutaefolius* L., p. 678).

Callicarpa discolor W., v. *Aegiphila arborescens*, p. 20, *sinensis* Hort. = *cana*.

Callichroa Douglasii Torr. et Grey., v. *Calliglossa Douglasii*, p. 875).

Calligonum L., Schönknöterig, (Flügelnuß).

crispum Bunge, krauser, ⚔. f. k. Asiat. Rußland.

flavidum Bunge, gelblicher, ⚔. f. k. Asiat. Rußland.

mongolicum Turcz., mongolischer, ⚔. f. k. Mongolei.

Panderi Fisch., Pander's, ⚔. f. k. Gegend des caspischen Meeres.

rubicundum Bunge, röthlicher, ⚔. f. k. Asiat. Rußland.

C. Calliphysa Steud., v. *Calliphysa juncea*, p. 148.

Calliopsis Rchb., Schöngesicht.

Atkinsoniana Hook. (= *Coreopsis Atkinsoniana* Dougl.).

basalis Otto et Dietr., ♂. f. Missouri.

cardaminefolia DC., schaumkrautblättriges, ⊙. f. Mexico.

Drummondii Don, v. *Coreopsis diversifolia*, p. 218, *tinctoria* DC. = *bicolor*.

Callipeltis Steven, Schönschildchen, VI. 1., Rubiaceae-Stellatae.

Cucullaria Stev. (= *Galium Cucullaria* R. et S., p. 344).

Calliprora Lindl., *flava* Hort. = *lutea*.

Callisace ruthenica Fisch. et *Schievreckii* Hoffm., v. *Peucedanum ruthenicum*, p. 610 et *Thysselinum palustre*, p. 810.

Callisia Loeffl., L., Callisie.

delicatula Kunth, zarte, 4. w. ?

Callistachya sibirica Rafin., *virginica* Rafin., v. *Veronica sibirica* et *virginica*, p. 844.

Callistachys Vent., Schönähre.

carinata Meisn., kielförmige, ⚔. t. k. Neuholl. ob kultiv.?

linearis Benth., gleichbreite, ⚔. t. k. Neuholland.

lineariaefolia Don (= *longifolia* Hort. = *lancifolia* Hort. = *angustifolia* Hort. = *Chorizema lancifolia* et *longifolia* Hort.).

oxylobioides Meisn., schmalblattähnliche, ⚔. t. k. Neuholland, ob kultivirt?

parviflora Benth., kleinblumige, ⚔. t. k. Neuholland.

purpurea van Houtte, purpurfarbige, ⚔. t. k. Neuholl.

elliptica Vent., *sparsa* Cunningh., v. *Oxylobium ellipticum* et *Pultenaea*, p. 578.

Callistemon RBr. (= *Metrosideros* Auct.), Schönfaden, (Bürstenblume).

acerosus Tausch, nadelholzblättriger, ⚔. t. k. Neuholl.

hybridus DC., Bastard-S., ⚔. t. k. Neuholland.

intermedius H. Berol., mittlerer, ⚔. t. k. Neuholland.

lanceolatus DC. (= *Metrosideros lanceolata* Sm. = *M. citrina* Curt.), β) *lophanthus* Sweet (= *Metrosideros decora* Salisb. = *M. lophantha* Vent.), γ) *latifolius* (Hffg.), δ) *semperflorens* Lodd., ϵ) *myrtifolius* (Hffg.).

lilacinus Makoy, lilafarbiger, ⚔. t. k. Neuholland.

linearifolius DC. (= *Metrosideros linearifolia* Sims = *rigidifolia* Hffg.).

linearis DC. (= *Melaleuca linearis* Schrad., Wendl. =

Metros. linearis Sm.), β) *brachyphyllus* H. Vratisl.

microstachyus Lindl. (= *Calothamnus Baxteri* H. Angl. = *Pentagonaster Baxteri* Klotzsch).

Callistemon

- pallidus* DC. (= *Metrosideros pallida* Bonpl. = *australis* RBr.), bleicher, ⚭. t. k. Neuholland.
phoeniceus Lindl., hochrother, ⚭. t. k. Neuholland (Schwanenflufs).
pinifolius DC. (= *Metr. pinifol.* Wendl. = *M. viridiflora* Cels Nois., non Spgl.).
rigidus RBr. (= *Metrosideros linearis* W. Enum. = *viminalis* Hort.).
rugulosus DC. (= *Metrosideros aspera* Hffg. = *M. glandulosa* Dsf. = *M. macropunctata* Dum. Cours., = *M. rigida* Hort. = *M. rugulosa* W. = *scabra* Colla).
Sieberi DC., Sieber's, ⚭. t. k. Neuholland.
viridiflorus DC. (= *C. ruscifolius* Colvill. = *Metrosid. viridiflora* Sm.), β) *purpureus* Hort. Vratislav.
Callistephus chinensis Nees (= *hortensis* Cass.), Heyneanus DC. (= *Aster indicus* Heyne). Vergl. *Aster* Sect. IV. p. 98.

Callisthene grandiflora Auct., v. ? *Qualea grandifl.*

Callithauma Herb., Schönschwertel, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

- angustifolium* Hort. belg., schmalblättriger, 4. Zw. t. w. Südamerika.
Hartwegianum van Houtte, Hartweg's, 4. Zw. t. w. Südamerika.
spathulatum Herb., spatelförmiger, 4. Zw. t. w. Truxillo.
viridiflorum van Houtte, grünblumiger, 4. Zw. t. w. Südamerika.

Callitris Vent., Schmuckcypresse.

- arenosa* Sweet, Sandliebende, ⚭. t. k. Neuholland.
australis Sweet (= *Cupressus australis* P.), neuholländische, ⚭. t. k. Neuholland.
cupressiformis Sweet (= ? *australis* Sbr.), cypressenförmige, ⚭. t. k. Neuholland.
Preissii Miquel, Preis's, ⚭. t. k. Neuholland.
pyramidalis Sweet, pyramidenförmige, ⚭. t. k. Neuholl.
quadrivalvis Vent. (= *Fothergilli* Hort. = *macrostachya* Hort. = *triquetra* Hort. = *Cupressus triquetra* Lodd. p. 240, = *Cupressus Fothergillii* Hort. = *Fresnelia Fontanesii* Mirb. = *Thuja articulata* Vahl, Dsf.),
Callotropis tricolor G. Don, v. *Galega tricolor*, p. 342.
Calobotra cytisoides Eckl., Zeyh., v. *Lebeckia cytisoides*, p. 450, *C. pulchella* Eckl., Zeyh., v. *Crotalaria purpurea*, p. 235.

Calochortus Pursh, Benth., Dougl., Graslinie.

- Barnardi* Dougl., Barnard's, 4. Zw. k. f. b. Californien.
vestitus Benth., bekleidete, 4. Zw. k. f. b. ? Californien.
Douglasianus Schult. fil. 4. Columbia, ist nach Kunth eine nicht hinlänglich bekannte Art.
Bonplandianus Schult. fil., *elegans* Pursh, *flavus* Schult. fil., *fuscus* Schult. fil., *pallidus* Schult. fil., v. *Cyclobothra purpurea*, *elegans* etc.

Calonyction Choisy, Nachtwinde, V. 1., Convolvulaceae.

- grandiflorum* Choisy (= *Jacquini* Don = *Convolvulus grandiflorus* Desr., Jacq., non L. = *C. Tuba* Schltdl. = *Ipomoea latiflora* R. et S.), großblumige, ♂. ⚭. Sch. w. Ost- und Westindien.

Calonyction

speciosum Choisy¹⁾, prächtige, ☉. Sch. w. m. Japan, Ostindien, Südamerika.

α) vulgare (= *Ipomoea bona nox* L., p. 418 = *I. longiflora* W. E. = *I. latiflora* Bot. reg. excl. Synon. = *I. Roxburghii* Steud. = *Quamoclit longiflora* Don = *Convolvulus macrosolen* Spgl.).

β) muricatum Choisy (= *Convolvulus muricatus* L. = *Ipomoea muricata* Jacq., p. 420 = *I. turbinata* Lagasca = *I. bona nox* β) bot. reg.

γ) pubescens Choisy (= *pseudomuricat.* Don = *Rheedii* Colla = *Convolvulus grandiflorus* L. Suppl., W., non Jacq. = *Ipomoea grandiflora* Lam. = *Ipomoea pseudomuricata* Lk.).

δ) laeve Choisy (= *Ipomoea longiflora* RBr. = *I. macrantha* R. et S. = *Convol. longiflorus* Spgl.).

ε) macrantholeucum Colla.

Calophaca Fisch., Schönlinse.

Hovenii Schrenk, C. A. Mey., Hoven's, 4. ⚭. f. Asiat. Rufsland.

juncea Fisch. et Mey., simsenförmige, 4. ⚭. f. Sibirien.

Calophyllum L., Schönblatt.

spurium Choisy, DC. (= *apetalum* W., *Calaba* L., non Jacq. = *calabioides* Don = *Inophyllum* var. Wall. = *Wightianum* Wall.).

Calosantes Blume, Prachtbignonie, XIV. II., Bignoniaceae.

indica Blume (= *Bignonia indica* L. var. α Blume = *B. pentandra* Lour. = *B. tuberculata* Roxb. = *Spathodea indica* P. = *S. pentandra* Hook., p. 775), indische, ⚭. w.

Calostemma aureum Lk. = luteum.**Calothamnus** LaBill., Schönstrauch.

eriocarpa Lindl., wollfrüchtiger, ⚭. t. k. Neuholland.

Hügelii Schauer (= *quadrifida* Endl., non RBr.), Hügel's, ⚭. t. k. Neuholland.

lateralis Lindley (= *longifolia* Lehm., *longissima* Hort.), seitenblumiger, ⚭. t. k. Neuholland.

planifolia Lehm., flachblättriger, ⚭. t. k. Südwestl. Neuholland.

α) angustifolia, β) latifolia.

quadrifida RBr. (= *purpurea* Endl. = *Billotia acerosa* Colla).

robusta Schauer (= *Knightii* Hort.), starker, ⚭. t. k. Neuholland.

Schaueri Lehm., Schauer's, ⚭. t. k. Mittägl.-westl. Neuh. *Calothea arabica* Spgl. etc., v. *Aeluropus arabicus* etc., p. 11. II.

Culburnia aurea Benth., *capensis* Benth., *intrusa* E. Mey., *robinoides* E. Mey., *sylvatica* E. Mey., v. *Virgilia aurea*, *capensis* etc., p. 852.

Caltha L., Dotterblume, XIII. VI., Ranunculaceae.

sagittata Cav. (= *multicapsularis* Soland.), pfeilblättrige, 4. f. Falklandsinseln.

Calycanthus L., Gewürzstrauch (Kelchblume).

philadelphicus Noisett., philadelphischer, ⚭. f. Nordamerika.

prunifolius Sweet (= *carolinianus* Hort.).

1) „Species mirifice varians“ Choisy.

Calycomelia acuminata, alba, caroliniana, elliptica
Kostel., v. *Fraxinus acuminata* etc.

Calycothrix LaBill. (= *Calythrix* Auct. p. 151),
Haarkelch.

Billardieri Schauer (= *tetragona* LaBill. = *tetraptera*
DC. = *glabra* RBr.), Billardières, ⚭. t. k. Neuholl.
brunioides A. Cunningh., bruniaähnlicher, ⚭. t. k. Neuh.
conferta A. Cunningh., gedrängter, ⚭. t. k. Neuholland.
curtophylla A. Cunn., kurzblättriger, ⚭. t. k. Neuholl.
flavescens A. Cunningh., gelblicher, ⚭. t. k. Neuholland.
Fraseri A. Cunningh. (= *tetragona* Endl.), Fraser's, ⚭.
t. k. Neuholland.

microphylla A. Cunningh. (= *extipulata* DC.), klein-
blättriger, ⚭. t. k. Neuholland.

pubescens Sweet, weichhaariger, ⚭. t. k. Neuholland.

scabra DC. (= *glabra* Sieber, non RBr.).

Ob von nachstehenden einige in den Gärten eingeführt
worden, ist mir unbekannt, als: *angulata* Lindl., *aurea*
Lindl., *Baueri* Schauer, *brachyphylla* A. Cunningh.,
brevisetata Lindl., *Brownii* Schauer, *decandra* DC., *em-*
petrioides Schauer, *glutinosa* Lindl., *sapphirina* Lindl.,
simplex Lindl., *strigosa* A. Cunningh., *variabilis* Lindl.
Sämmtlich ⚭. und in Neuholland (größtentheils am
Schwanenfluss) heimisch.

Calymenia (Calyxhymenia) chilensis Dsf. etc., v.
Oxybaphus chilensis etc., p. 579, *aggregata* Ortega,
Cervantesii Dsf., *paniculata* Dsf., v. *Allionia albida*,
Cervantesii, et *ovata*. Vergl. p. 19 et 29. II.

Calyptanthes caryophyllifolia W. (= *caryophyllata*
Sw. = *Jambolana* W.), v. *Syzygium Jambolanum*.

Calystegia RBr, Kelchwinde.

dahurica Fisch., Chois. (= *Convolvulus dahuricus* Sims),
β) *pellita* Chois (= *Convolv. pellitus* Ledeb.), γ)
elongata Chois. (= *Convolv. subvolubilis* Don).

lucana G. Don (= *Convolv. lucanus* Tenore), lucani-
sche. 4. Sch. f. *Lucania*.

Keriana Sweet (= *Ipomoea bicolor* Sweet, p. 418),
v. *Shutteria bicolor, stans* RBr. = *tomentosa*.

Camarea St. Hil., *Camarea*, Malpighiaceae.

hirsuta St. Hil., rauhhaarige, ⚭. w. Brasilien.

Camaridium Lindl., *ochroleucum* Lindl.,

b. *album* Hortor.

Camarotis Lindl., *Camarotis*, XX. 1., Orchideae.

obtusa Bateman, stumpfe, 4. w. Ostindien.

purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Ostindien.

Camassia Lindl. (*Cyanotris* Rafin.).

esculenta Lindl., α) floribus purpureis (= *Phalangium*
Quamash Pursh = *Anthericum esculentum* Spgl. excl.
Nutt. et Sims), β) floribus albis Hook. (= *Scilla*
esculenta Hook., in Bot. mag.).

Cambogia Gutta L., v. *Garcinia Cambogia*, p. 345.

Camelina Crtz., Leindotter.

armeniaca DC., armenischer, ☉. f. Armenien.

foetida Fr., stinkender, ☉. f. Nordeuropa.

α) *integrifolia* Fr. (= *Myagrum sativum* L. fl. succ.).

β) *pinnatifida* Fr. (= *dentata* Auct., proparte).

ambigua Bess. (= *campestris* Spenn.) = *sativa*,
barbareaefolia DC., v. *Tetrapoma barbareaefolium*,
p. 802.

Camellia L., Camellie.

japonica L. Var. Acerbii, Acidalia, Adelaide, admirabilis, Admiral Nelson, Adonidea, (= *Gallesii* = *Dorusio a bords-blancs*), Adrien Lebrun (= *Graulhierii*), Agnesi, alba Casoretti, alba fenestrata (= *nova plena*), alba grandiflora, alba illustrata (= *Walltonensis* = *Skirvings Seedling*), alba londonensis (= *Alnutts alba* = *candida superba*), alba Lucina et plena, Alcina, Alessandro il grande, Alexina (= *Duchesse d'Orleans*), Alfred, Alnani et superba, alsatica J. Baumann, althaeiflora (= *Thunbergiana*), amabilis de New-York, Amalthea, americana, amoenissima, amplissima, annulata, Apollo, Apollinea d'Italie, Archinto, Ariosto, Augustiniana, Aurora, Bachante, baltimoriensis, Barnii d'Italie, Baron Sigism. de Pronay J. Baum., Baronne d'Udekem, basilica, Baumanniana nova Casoretti, Bazzoni d'Italie, Belle, Clymène Baum. (= *purpurea plenissima*), Bella Gioja, Bellina major, Bell., Erminia, Bellini novissima Caracciol., Benneyii, Berenice, Berlesiana, Bettegno, Bianchii, biflora, Bilotii, Birro, Bolongara, Bostoniana Floy, Botta, Bricchiana Caracciol., Brillante, Brocchii, Brofferio, Bronte, Brooklyniana, Brownii et nova, Brozzoni Lecchi, Bruceana, bruxellensis, Burchellii, Calciati, Calvi, Calypso, Campo Molendini, Canova, Cantoniana Donkelaar, Carbonara, Carmelita Lechi, carminea, Carolina, Caroline Smith, Carswelliana, Castellum antwerpense, Castiglioni, Catherine Longhi, Celsiana, Cenerentola, Centifolia Hugh Low, Cérito, Cesarini, Chandleri et elegans (= *Roulini*, = *Lord Crewe*, = *pulcherrima vera*, *Gloria Angliae*), Charles V., Chatillonii, Cinzia Caraccioli, Claritas, Cliveana, Clowetiana, coccinea, Cocquetii, coelestina, Colletii J. Mackoy, Colombo, Colvillii, Commandeur en chef, comnensa J. Mackoy, compacta Lodd., composita, Comte de Flandre, Comte Caraccioli, Comte Paolo Tosi Lechi, Comtesse Boutourlin, Comtesse Caraccioli, Comtesse de Castel Barco, Comtesse Rambaldo, Comtesse Samailoff, Comtesse Nencini, Comtesse de Spauri, Css. Hartig, conspicua Loddiges, (= *macrantha latifolia*, = *Russeliana*), Constantin de Caters, Coockii, Cooperi Young, Copeii Buist, Coquettii, coronata, Cradocki, credoca, crimson perfection, cruciata, Cunninghamii, curvatifolia, Cushingtonii, Dahleni (= *Rathmoreana*), dahliaeflora ignea, rosea et nivea, Dark imbricata Low, Darsi, Dauweriana, Davidea, Davio d'Italie, decus italicum, Denisiana, de Notaris, depressa d'Italie, despeintres, Derbyana (= *Amanda* = *Angressiae*), Diadema di Flora, diademata, diamanthina van Houtte, Dicksonii, Dilleni, Diva Maria, Dobreii, Donkelaarii, Dorine Lechi, Dorsetti (= *Rex Georgius*), Dorylas Lecchi, Douglasii, Drouard-Gouillon, Dryade, Duca di Caraman, Duca di Litta, Duca di Reichstadt, Duc de Brabant, Duc d'Orléans, Duchessa di Litta, Duchesse de Nemours, Duchesse d'Orleans, Eclipse Press et Preston, Egeria d'Italie, elata de Chandler, elata de Cunningham, elata de Londres, elata de Rollisson, Elena Sloane, Elena Ugoni, Eléonore, Elinsoni, Elleyana, Elphinstonianiana (= *flammeola superba Marsii*), Emilia Gavazzi et grandiflora, Emilia Taverna,

Camellia

Emmelina (= *Sommelliana*), Empereur Alexandre Sloane, Emperor Davies, erecta, Esperia, Estheri, Exquisite Hugh Low ¹⁾, exultans, Fabio Messimo, Fairleyi, Fanny Essler, fasciculata, fasciculata venosa, fastuosa d'Italie, faustina, Feastii, Felicita, fimbriata alba et rubra, flammea, Florentina nova Sloane et superba, foliosa, Forbesii Low., Foordii (= *devonien-sis*), formosa, fornarina, fortuita, francofurtensis, Frédéric le grand (= *Floyi Loddig.*), Frostii Buist., fulgens plenissima (= *fulgens d'Italie, Plutone, fulgens nova*). Futtung (= *Rawesiana, = speciosa, = Rozeana, = Parksii vera*), Galathea, Gallesii, Galluppi Caraccioli, Garvici, Général Washington, geometrica, Ghittina, Gielsii (= *Nancy Dawson, = Dark coccinea, = Dark crimson, = Reevesii carminea*), Giulio d'Italie, Gioberti Carraccioli, Gioconda, globe crimson Sloane, globosa coccinea et rosea, Gloria delle Isole Borromee, Gloria del Verbano, gubernativa, Goffredo, Gozzi, Grand Calderara, Grande Duchessa d'Etruria, Grand Napoléon Sloane, Gregorii, Groppo di Salomone, Grossii, Grunelli, Giunone, Guthriana, guttata (= *Sabiniana*), Hampsteadii, Hannah Moore, Harrisonii, Haylockii, Hébé, Hélène, Henchmanniana, Hendersonii (= *Lombardii*), Henri Favre, heteropetala alba (= *British queen Young*) et rubra, hibisciflora, Hookerii Low, Horsfalliae, Hosackii, Houdii, Humboldtiana, Husseisoni, Icaro, imbricata alba, magna et tricolor, Imperatrix, imperialis, incomparabilis Chandler, incomparabilis de Nantes s. vera, innocenza, insubria, Isabelle Moens, Jarba, Jeffersonii Buist., Jenny, Jubilee Hugh Low, Juliana (= *Tweediana superba*), Jupiter Smith, Jussieni (= *Emma Robin*), Kenny, King of the Camellia's (= *spectabilis maculata, Clusii, Linkii*), Kettly nobilis, lactea elegans, lactea nova, Lady Grafton (= *Lady Pretiosa*), Lady Henriette, Lady Hill, lainatensis, Lambertii, Landrethii (= *Jacksonii*), Lariense, latifolia, Lawrenceana d'Amérique, Lawrenceana d'Italie, Leda, Leeana superba (= *Palmers Beali des Anglais, coccinea magna = Sieboldtii*), Lefebvriana, Leonardii d'Italie, Leonidas, Leopoldina d'Italie, Licenza, liliiflora, lineata, superba, Lord Byron, Louckiana, Loudoni, lovely rose, Lowii Hugh Low, Luizia, luteo-alba Bot. reg., Madame Harrison, Maddalena (= *Magdaleine*), d'Italia, Madonna, Maeleni, magnifica (= *alba superba*) et rosea (= *Tancredi*), Maidenblush, Makoyi Hugh Low, Manetti, Manzoni d'Italie, Maometto, Marchioness of Exeter, Marco Paolo, Marguerite Gouillon, Maria Dorothea, Maria Elisa Buist., Maria Luigia di Parma, Maria Padilla, Maria Teresa, marmorata grandiflora, Marshall Wilder Baumann, Martheri, Marthii Buist., Mazuchelli, Medicea nova, Melindé, Melineti de Nantes, Mérope d'Italie, Meteor Harrison, Metronesson, micans, Mile End, Milleri, miniata striata, minuta, Mira d'Italie, Mistriss Uboldi, modesta rosea et rubra Grüneberg, Moensii, Monarch, John Halley, monstrosa Low, Montblanc Boddaert, Montii nova, Montironi,

1) Hybride von *Camellia Sasanqua* et *japonica imbricata*.

Camellia

Muller d'Italie, Murrayana vera, mutabilis Cunningh., mutabilis Traversi, myrtifolia alba (= *albicans*), Napoléon de Fresne, Napoleone d'Italia, Nassiniana, Negrii, Nemesis, neoboracensis, Nettuno, nitida Chandler, nivalis, nivea Loddig (= *lactea* de Young = *delectabilis*), nobilissima et simplex, ochroleuca, odorata novissima, Orfeo, Orlando, ornata coccinea, Orsolini, osburnea, Palagii, Palatinus hungaricus, Palladio, papilionacea, Paride, Parinii de Casoretti et Parinii de Mariani, Parkeri, Parthoniana, Pavolini, Pawlikowskii (= *rosea plenissima*), Paxtonii, Peintres, pendula, penicillata, peregrina, Perfection Palmer, Perpentii d'Italie, personata, philadelphica, pictorum coccinea (= *Jamma*) et rosea, picturata, Pinetti, Pirzio, Pisani, Pizarro, platypetala, plicatilis, Pluto, pomponia aurea d'Italie et grandiflora, Porta Casoretti, Powhattan Floy, Pratti, praeclara, praeexcellentissima, Press Eclipse (= *regina gallicarum*), Preston's Eclipse, Prince Albert Chandler (= *Altertii*)¹⁾, Prince of Wales, Princesse Baciochi, Princesse Marie van Houtte, Princess royal Low, Princess Sophie de Caters, Proserpine, Pulaski, pulcherrima striata, punctata (= *imperialis* Grays, = *invincible* = *splendida*), punicaeflora, purpurea nova, Queen of England Filder, Queen of great britain, Queen Victoria Priestley, Rachel Ruisch, radiata Sloane, Ralemona d'Italie, ranunculiflora striata, Rapallino, Redaellii, Redii, regalis, Regina d'Inghilterra, Reginae, reine de Fleurs Donkelaar, resplendens, Rhadamante, Richardii, Ridente, Ridolfii Marchese, Rising sun Mourant, Ristori, Rival, Robertsoni, Romagnesi, rosa punctata, Rosea Denholm, elegans et nova, Rosetta, Rothschildiana Gruneberg, Rubens Moens, rubescens Low, rubescens striata, rubina, rubra venusta, rugosissima major (= *graciosa*), Saccoli et nova, Saffo, salicifolia Floy (= *crassiflora*), Santiniana et speciosa, Sarah Frost, sarniensis vera Mourant, Schachkoenigin (= *Princesse royal* Gruneberg), Scilla, scintillans, semiduplex Andr., serratifolia, Servii d'Italie, Sherwoodii, Sophia d'Italie, Soulangiana plenissima d'Italie, Sovereign Hugh Low, spectabilis, spiralis, splendidissima alba, Spofforthii alba, squamosa, staminea, Sterope, Strassaldo, striata (= *variegata*), striped major, Strombio, sulcata, superba Palmer (= *Vandesiana carnea*, *Palmers carnea*, *Palmers superba*, *dulcis major*, *agathiflora*, *Chandlers magnificent*), Susanna (= *Nicholsii*, = *pictorum striata*), Swertii, Sylvia d'Italie, symmetrica, Tamponeana, Therpsicore, Terzii (= *Terziana*), Teutonia Gruneberg, theophylla striatiflora, Theresiana, Thompsoni superba, Tommasinii, Tornielli d'Italie, Tosi, Tourresiana, Traversii et plenissima, triphosa, Trotti, Tsubackii, tumida, (= *Carswelliana alba*), Turnbullii, Ugoni d'Italie, unica, Valeriana, Vanlini d'Italie, Varischii (= *General Zucchi*), Vauxii, venera, venosa, (= *Theresiana*, = *pompon-gris* = *paeoniflora aurea*), verecunda, Verger d'Italie, Vespuzio, vestalis, Vesuvio, Vexillo di Flora, Victoria Antwerpiensis, Victor

1) Aus China eingeführt.

Camellia

Hugo, Villageoise (= *Agenorea*), violacea superba (= *exuberans*), virginalis Sloane, virginalis miniata, Virginia d'Italie, virginica Floy, Visconti nova, Visiani d'Italie, Wallichii, waltoniensis, Wardii Floy (= *Floyi* de Brougham), Washingtoniana, Washingtonii, Watsoniana, Wilbrahamii, Wildiana, Wilhelmshöhe, William de IV., Woodsii alba, Youngii, Zeffiro, Zoli (= *Zali*), etc. etc.¹⁾.

laxa Hort., Hamburg., lockere, f. t. k. ?

nepalensis Hort., nepalsche, f. t. w. Nepal.

Noch nicht eingeführte:

caudata Wall., geschweifte, f. t Ostindien.

drupifera Lour. (= *Mesua bracteata* Speg.), steinfrüchtige, f. t. Cochinchina.

Scottiana Wall., Scotts, f. t. Ostindien.

Campanula T., Glockenblume.

alaris H. Berol., geflügelte, 4. Nordamerika.

azurea Soland, himmelblaue, 4. f. Südeuropa.

Barrelieri Marnock (non Presl), Barrelier's, 4 f. Italien.

cana Wall., graue, ♂. 4. k. t. Ostindien.

eximia Wender., ausgezeichnete, 4. f. ?

Hohenackeri Fisch., Mey. et Lallem., Hohenacker's, 4. f. Caucasus.

laniflora Hornein., wollblumige, 4. f. ?

latifolia L., ♂) natolica Fisch., Mey. et Lallem.

Lostritti Tenore, Lostrittis, 4. f. Campania.

plicatula Dumort., faltige, 4. f. Belgien.

rubra J. Booth, rothblumige, 4. f. ?

Steveni MB. var. altaica Fisch. et Mey.

alburnica Brigant. = *trichocalycina*, *hispida* Fisch. =

lactiflora, *hispida* Portensch. = *Morettiana*, *hortensis*

Meerb. = ? *rapunculoides*, *muralis* Portenschl. =

Portenschlagiana, *Perpentiae* Mor. Trevir. = *Rainerii*.

Campanuloides subulata H. Kew., v. *Lightfootia*

subulata, p. 462.

Campderia sicula Lagasc., v. *Kundmannia sicula*.

Campelia L. C. Rich., Campelia.

Boucheana Schult. fil. (= *Tradescantia marginata* Bouché (non Blume). Bouché's, 4, w. ?

glabrata Kunth, kahle, 4. w. ? Südamerika.

mexicana Mart., mexicanische, 4. w. Mexico.

Pseudo-Zanonia Kunth, (var. *Zanonia*?) unächte, 4. w. ?

Zanonia L. C. Rich. (= *Zanonia bibracteata* Stbg. = *Commelina Zanonia* L. = *Tradescantia Zanonia* Sw.).

marginata Blume et *mollissima* Blume, 4. Java, werden wahrscheinlich nicht kultivirt.

Campella caespitosa Lk. et *media* Lk., v. *Aira caespitosa* et *media*, p. 26.

Camphora N. E., Kampherbaum, IX. 1.

chinensis N. E. (= *Laurus chinensis* H. Berol.), chinesisches, f. k. China.

officinarum Bauh. (= *officinalis* N. E. = *Cinnamomum*

Camphora Sweet, Fr., N. E. jun., p. 197 = *Persea*

Camphora Speg. = *Laurus Camphora* L.), gebräuchlicher, f. k. Japan, China.

β) *gracilis* (= *Cinnamomum gracile* Sweet, p. 197 = *Laurus gracilis* H. Berol.).

1) Bei mehreren ist auch der Name des Autors und Züchters, als Caraccioli, Grüneberg, van Houtte, Lecchi etc. angegeben.

Champhoromyrtus Schauer, Camphermyrte, VIII. 1.,
Myrtaceae.

Brownii Schauer (= *Baeckea camphorata* B. Br. p. 109),
Brown's, f. t. k. Neuholland.

Champhorosma acuta L., v. *Halicnocnemis juniperina*.

Camptosorus Lk., v. *Asplenium* Sect. III. p. 50. II.

Campuloclinium DC., Nesseldost, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

macrocephalum DC. (= *Eupatorium macrocephalum* Less.), großköpfiger, 4. w. Brasilien, Mexico.

urticaefolium DC. (= *Eupatorium urticaefolium* Mut. L. fil., p. 320).

viridiflorum Bartl., grünblumiger, 4. f. w. Brasilien.

Campulosus falcatus P. B., v. *Harpochoa capensis*.

Campylia blattaria Sweet, *cana* Sweet, *carinata*

Sweet, *coronopifolia* Sweet, *elata* Eckl. Zeyh., *elegans*

Sweet, *holosericea* Sweet, *laciniata* Sweet,

Oenothera Sweet, *tricolor* Eckl., Zeyh., *verbasciflora*

Sweet, v. *Pelargonium blattarium*, *canum* etc., *variegata*

Sweet = *Pelargonium marginatum*.

Campyloneuron Presl, *brevifolium* Lk., *caespitosum*

Lk., *decurrens* Lk., *Phyllitidis* Presl, v. *Polypodium*,

Sect. III.

Camutia perfoliata Bonato, v. *Melampodium perfoliatum*, p. 505.

Canarium L., Canarium, VI. 1., Terebinthaceae.

commune L. (= *C. Mehenbethene* G. = *zephyricum* W.

= *Amyris zeylanica* Retz = *Balsamodendron zeylanicum*

Kunth, p. 110 = *Bursera paniculata* Lam.

= *Calophonia mauritiana* DC.), gebräuchliches, f. w.

Molucken.

Canavalia DC., Canavalie.

Gaudichaudiana Hort. belg. (= *bonariensis* Hort.), Gaudichaud's, f. Sch. w. Ostindien.

obtusifolia DC. (= *emarginata* G. Don = *Baueriana*

Endl. = *maritima* A. Pet. Th. = *miniata* DC. =

rosea DC. = *rutilans* DC.).

paranensis Hook. Arn. (= ? *bonariensis* Lindl.), paransische, f. Sch. w. Chili, Brasilien.

Candarum Rchb., *C. Roxburghii* et *Hookeri* Schott,

v. *Amorphophallus campanulatus*, p. 33. II.

Candollea LaBill., Candollea.

Brunonis Benth.

Cunninghami Benth. (= *Hibbertia Cunninghami* Hook. p. 394).

racemosa Endl., traubige, f. t. Neuholland.

tetrandra Lindl. (= *cuneiformis* Hort.), viermännige, f. t. Neuholland (Schwanenflufs).

Candollea setacea LaBill., v. *Styloidium graminifolium*, p. 792.

Canna L., Blumenrohr¹⁾.

I. *Eurystylus* Bouché.

flaccida (Salisb. Roscoe), (= *glauca* β *flaccida* W.).

Reevesii (Lindl.).

II. *Canna* Bouché.

cinnabarina Bouché, hellrothfarbiges, 4. w. Mexico.

concinna Bouché, nettes, 4. w. ?

1) Nach P. C. Bouché.

Canna

- densifolia* Bouché (= *densiflora* Hort.), dichtblätteri-
 ges, 4. w. China.
exigua Bouché, kleines, 4. w. Nepal.
Fintelmanni Bouché, Fintelmann's, 4. w. ?
flavescens Lk. (= *orientalis* var. *flava* Rosc.).
floribunda Bouché, blüthenreiches, 4. w. ?
formosa Bouché, schönes, 4. w. Brasilien.
fulgida Bouché, leuchtendes, 4. w. Insel St. Bartholom.
gigantea Dsf. (= *latifolia* Rosc. = *iridiflora* W. Fnum.
 Suppl. non R. et P.).
laeta Bouché, freudiges, 4. w. ?
leucocarpa Bouché, weifsfrüchtiges, 4. w. Mittägl. Amer.
longifolia Bouché, langblättriges, 4. w. Mexico.
maculata Lk. (= *pallida* var. Rosc.).
Moritziana Bouché, Moritz's. 4. w. Caracas.
nepalensis Wall.
orientalis Rosc. (= *chinensis* W. = *indica* Roxb.).
pallida Rosc. (= *commutata* Bouché).
paniculata R. et P., rispiges, 4. w. Peru.
pedunculata Sims (= *Bueckii* Weinm. = *reflexa* N.
 E. Mart.).
Poeppigii Bouché, Poeppig's, 4. w. Südamerika.
portoricensis Bouché, portoricensisches, 4. w. Portorico.
pulchra Bouché, (= *orientalis* Bouché), hübsches, 4.
 w. Ostindien.
recurvata Bouché, zurückgekrümmtes, 4. w. ?
Schlechtendaliana Bouché, Schlechtendal's, 4. w. ?
spectabilis Bouché, ansehnliches, 4. w. ?
stricta Bouché, steifes, 4. w. ?
surinamensis Bouché, surinamisches, 4. w. Surinam.
variabilis W. (= *carnea* Rosc.).
variegata Bouché, buntes, 4. w. ?
ventricosa Bouché, bauchiges, 4. w. ?
 Zweifelhafte oder von H. Bouché nicht beobachtete Arten:
angustifolia L., *divaricata* Klotzsch, Brasil., *esculenta*
 Lodd, Südamerika, *excelsa* Loddig., Brasilien, *juncea*
 Retz, *lanceolata* Lodd., Brasil., *litturata* Lk., *montana*
 Blume, Java, *nudata* Lodd., *pedicellata* Presl, Chili.
 Die übrigen s. p. 156 u. 157 mit Ausschluss der zur
 folgenden Abtheilung gehörigen Arten.

III. Distemon Bouché.

- brasiliensis* Bouché (Rosc.), (= *denudata* var. *brasi-*
liensis Rosc.).
Jacquini Bouché (= *C. brasiliensis* H. Vindob.), Jac-
 quin's, 4. w. Brasilien.
Kunzii Bouché, Kunze's, 4. w. Brasilien.
Linkii Bouché.
miniata Bouché.
Ottonis Bouché, Otto's, 4. w. Caracas.
Roscoeana Bouché (= *C. denudata* Rosc.), Roscoe's,
 4. w. Brasilien.

Cannabis sativa L. var. gigantea Hort.

- Canthium dubium* Lindl., v. *Diplospora viridiflora*.
Capnogonium nobile Bernh., v. *Corydalis nobilis*, p. 221.
Capnoides albida Bernh., *cava* Mch., *lutea* G., *glaucia*
 Mch., *nobilis* Mch., *rigidula* Bernh., *sempervirens*
 Borckh., *solida* Mch., v. *Corydalis capnoides*, bul-
 bosa, *lutea*, *sempervirens* et *solida*, p. 221, *scan-*
dens Mch., v. *Adlumia cirrhosa*, p. 20.

Capnophyllum G., Erdrauchdolde.

africanum G. (= *simplex* Lagasc. = *Cicuta africana* Lam. = *Conium africanum* L., non Jacq.).

Jacquin DC. (= *Conium africanum* Jacq., non L. = ? *Conium rugosum* Thbg.), Jacquin's, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Capnorchis spectabilis Borckh. = *Dielytra spectabilis*.

Capparis T., Kaper.

acutifolia Sweet (= *acuminata* Lindl. = *chinensis* G. Don), spitzblättrige, ♂. w. t. China.

carissoides Hort. Mackoy, Carissaähnliche, ♂. w. ?

comosa Jacq., schopfge, ♂. w. Domingo.

conferta Mill., gedrängte, ♂. w. Carthagera.

elaegnifolia Hort. anglor., Oleasterblättrige, ♂. w. t. China.

Loddigesii Steud. (= *undulata* Lodd., non Zeyh.), Loddige's, ♂. w. ?

peduncularis Presl, langstielige, ♂. k. t. Sicilien.

puberula DC., feinhaarige, ♂. w. Südafrika.

racemosa Mill., traubige, ♂. w. Südamerika.

undulata Zeyh., (non Loddig.), wellenblättrige, ♂. w. t.

Cap der guten Hoffnung.

viridiflora H. B. K., grünblumige, ♂. w. Cumana.

Unbestimmtere: *arborea* Hort., *inermis* H. Cels., *latifolia* Hort. Nymphenb., *aculeata* L. (= *sativa* P.), = *spinosa*, *aegyptiaca* Sieb. (= ? *rupestris* Sibth. Sm.) = *Fontanesii*, *capensis* Thbg. = *citrifolia*, *cordifolia* Lam. = *mariana*, *ferruginea* Sieb. = *amygdalina*, *siliquosa* L. = *Breynia*.

Capraria lanceolata L. Suppl. (= *salicifolia* Lk. et Otto) et *undulata* L. Suppl., v. *Freylinia cestroides* et *undulata*.

Capsicum T., Beilsbeere, (spanischer Pfeffer).

angulosum Mill. (= *Tournefortii* Bess., *annuum* ♂ Mart.),

β) *conicum* Auct. (= *africanum* Mill.), γ) *ovale* Auct.

annuum L., β) *rugulosum*, γ) *acuminatum*, δ) *subangulosum*,

ε) *ovoideum*, ζ) *abbreviatum*, η) *olivaeforme* Mill.,

θ) *fructibus abbreviatis rubris* Hort. Petropol. ι) *fructib.*

fuscescentibus, κ) *fructib. nigro-luteoque variegatis*

H. Petropol.

baccatum L., β) *microcarpum* DC. (= *ciliare* W. E.), γ) *darfuricum* H. Genev.

bicolor Jacq. (= *violaceum* Hort. Madrit. = *nigrum* W. E.), β) *purpureum* Hornem.

cerasiforme W. E., β) *minus* Bess. Cat. Hort. Krzm.

ceratocarpum Fingerh., hornfrüchtige, ♂. ♂. w. ?

cereolum Bertol., brasilianische, ♂. ♂. w. Brasilien.

Chamaecerasus N. E. (= *cerasiforme* Poir. nec W. = *purpureum* Wall.), kirschfruchtähnliche, ♂. ♂. w.

Ostindien.

conicum Mey., kegelfrüchtige, ☉. f. m. Essequebo.

conoideum Mill. (= *conicum* Lam. non Mey. = *annuum* var. *erectum* Mart. = ? *cerasiforme macrocarpum* Bess.),

kegelähnliche, ☉. ♂. w. m. Ost- und Westindien.

β) *sulcatum*, γ) *chordale*.

cordiforme Mill. (= *cordatum* Camerar.), β) *subangulosum*,

γ) *majus*, δ) *minus*, ε) *olivaeforme*, ζ) *globo-*

sum (et var. *fruct. conicis flavis et rubris*, et *fruct.*

subglobois flavis et rubris H. Petropol).

cumanense Fingerh. (= *baccatum* H. B. K. non L.), cumanischer, ♂. ♂. w. Cumana.

Capsicum

- fastigiatum Blume (= *minimum* Roxb. = *frutescens* L. Spec. pro parte), gipfelständige, ⚥. w. Ostindien.
frutescens L. H. Cliff. W. E., strauchige, Ost- u. Westind. β) minus.
globiferum Mey. (= *baccatum* Rodschied, non L.).
grossum W. E., α) pomiforme, (= *grossum a globosum* Bess.), β) ovatum (non DC.) (= gr. β *luteum* Bess.), γ) cordatum, δ) angulosum.
Hamiltonii G. Don (= *violaceum* Dsf. Cat. hort. Par., nec H. B. K.), Hamilton's, ♂. ⚥. w. Ostindien.
longum DC. H. Monspel. (= *annuum* W. Hort.), β) incrassatum, γ) latum, δ) rectum et varietates H. Petropolit.: fructibus breviorib. atrovioleaceis, aurantiacis, flavis, fuscescentibus, nigris, rubris, fructib. gracilibus flavis et rubris (= *C. teretiusculum* Savi); fruct. incrassatis flavis et miniatis; fructib. incurvatis flavis; fruct. rectis luteis.
pendulum W. E., β) minus (= *havanense* H. B. K.), Cuba, γ) torulosum, Amboina.
pubescens A. Braun, weißhaarige, ☉. m. f. Abyssinien.
pyramidale Mill., β) torulosum Hort.
sinense Jacq., sinesische, ⚥. w. China.
strictum Fingerh., steife, ☉. m. f. ? Südamerika.
tetragonum Mill. (= *annuum* γ Martyn = *cydoniaeforme* Hort.).
violaceum H. B. K. (= *quitense* W. Herb.), violette, ♂. ⚥. w. Quito.
zeylanicum H. Bot. = ? *pruniforme* Brot. = ?

Caragana Lam., Erbsenbaum.

- Bungei* Ledeb., Bunge's, ⚥. f. Altai.
mongolica Fisch., mongolischer, ⚥. f. Tatarei.
tragacanthoides Poir. (= *macroacantha* Lodd.), α) Palasiana Fisch. et Mey. (= *Robinia tragacanthoides* Pall.), β) Bongardiana Fisch. et Mey., γ) leucophylla Fisch. et Mey.
 Ungewisse Arten (? Gartenhybriden): *gracilis* Hort., *glomerata* Hort., *parvifolia* Hffg., *sophoraefolia* Tausch, *sylvatica* Hffg., *tenuis* Hffg.

Caralluma RBr., Caralluma.

- fimbriata* Wall., gewimperte, ⚥. 4. w. Ostindien.
umbellata Haw., v. *Bucerosia umbellata*, p. 80, II.

Cardamine T., Schaumkraut.

- chenopodiifolia* Juss. P., gänsefußblättriges, ☉. f. Südamerika.
dasyloba Turcz., Bernh. (= *macrophylla* var. Auct.), haarzipfelige, 4. f. Sibirien.
dentata Schult. (= *uliginosa* MB. = *sylvatica* Bess. = *buchtormensis* W.), gezahnte, ♂. 4. f. Osteuropa, Sibirien.

- flaccida* Chamiss. Schldl., schlaffe, 4. k. Chili.

Engelmanniana H. Berol. (= *Ludoviciana* Hook.), v. *Arabis Ludoviciana*, p. 41, II.

Cardaminum Nasturtium Mch., v. *Nasturtium officinale*, p. 543.

Cardaria amplexicaulis Desv., *crassifolia* Spach, *Draba* Desv. (= *Cochlearia* Spach), *latifolia* Spach, v. *Lepidium amplexicaule* etc., p. 454.

Cardiaca arvensis Lam., v. *Stachys arvensis*, p. 780, *crispa* Mch., *Marrubiastrum* Schreb., *vulgaris* Mch.

(= *Stachys* Medic.), v. *Leonurus crispus*, Marrubiastrum et Cardiaca, p. 453.

Cardiolepis dentata Wallr., v. *Lepidium Draba*, p. 454.

Cardiospermum L., Herzsaaame.

corycodes Kunze, helmähnlicher, ☉. Sch. w. Cuba.

molle H. B. K. = *pubescens* Lagasca.

Cardiotheca pubescens Ehb., v. *Anarrhinum pubescens*, p. 34, II.

Carduus T. G., Distel.

acanthocephalus C. A. Mey., bärenklaublätterige, ♂. f. Caucasus.

acanthoides L. (= *axillaris* Gaud. = *crispus* Huds. = *polyacanthus* Curt. Schreb.), β) *squarrosus* Rchb., γ) *collaris* Rchb., δ) *horridus* Rchb.

acicularis Bertol., nadelähnliche, ☉. f. Italien.

adpressus C. A. Mey., angedrückte, ♂. f. Caucasus.

albidus MB. (= *argentatus* W. Herb. = *pycnocephalus* Pall. = *tenuiflorus* β DC.), weifliche, ☉. f. Tau-rien, Caucasus.

Barrelieri H. Par. (= *Cnicus Barrelieri* Zeyh.), Barrelieri's, 4. f. ? Südeuropa.

callosus Steud. (= *Cnicus callosus* Roth et *discolor* Roth), schwielige, ☉. f. ?

Candollei Moretti (= *arenarius* DC. fl. fr. = *litigiosus* Nocca et Balbis = *montanus* Suffr.), Candolles, ♂. f. Frankreich, Italien.

cephalanthus Moris, Visian. (= *congestus* Gussone = *pycnocephalus* Spgl.), dichtköpfige, ♂. f. Sardinien.

confertus Moris, gedrängte, ♂. f. Sardinien, Spanien. β) *purpureus* DC.

desertorum Fisch., Wüsten-D., ♂. 4. ? Sibirien.

fasciculiflorus Vivian (= *Morisii* Balb.), büschelblumige, ♂. f. Corsica, Sardinien.

laxiflorus Tausch (= *defloratus* L. var. Rchb.), lockerblumige, 4. f. Oestreich.

multiflorus Gaud. (= *nutans* β DC. = *polyanthemos* Schlchr.), vielblumige, ♂. f. Schweiz.

myriacanthos Salzm., tausendstachelige, ☉. ♂. f. Nordafrika.

sardous DC. (= *litigiosus* Moris), sardinische, ♂. f. Sardinien.

sibiricus Hort., sibirische, ☉. f. Sibirien.

tenuiflorus Curt. Sm., α) *acanthifolius* DC., γ) *pycnocephalus* DC. Jacq. hort. Vindob. ? L. (= *microcephalus* Gaud.) 1).

Thoermeri Weinm., Thoermer's, ♂. f. Rußland.

Carex Michel. Dillen, Segge, Rietgras.

atrofusca Steven, schwarzbraune, 4. f. Caucasus.

Bastardiana DC. (= *alba* Bast.), Bastard's, 4. f. Frankreich.

Blyttii Fr., Blytt's, 4. f. Norwegen.

borealis Lang, nördliche, 4. f. Norwegen.

caespitosa L. (= *stricta* Gooden).

kamtschatcensis Kunth (= *longerostrata* C. A. Mey.), kamtschatkaische, 4. f. Kamtschatka.

caucasica Steven, caucasische, 4. f. Caucasus.

1) p. 161 sind daher bei *C. tenuifolius* die Var. β et γ zu streichen.

Carex

- cherokcensis Swein. Torrey (= *recurva* Mühlbg., non Steven), cherokcische, 4. f. Nordamerika.
 commutata Gay (= *acuta* Mühlbg. = *verrucosa* Schweinitz, Torrey), verwechselte, 4. f. Nordamerika.
 coriophora Fisch. et Mey. (= *maculata* Turcz. = *ustulata* γ Ledeb.), wanzentragende, 4. f. Dahurien.
 costata Presl, gerippte, 4. f. Böhmen.
 cristata Schweinitz (= *lagopodioides* Schk.), kammähnliche, 4. f. Nordamerika.
 cuspidata Wahlbg., langspitzige, 4. f. Norwegen, Schweden.
 decipiens Gay (= *macrostyla* Lapeyr.), täuschende, 4. f. Pyrenäen.
 Deweyana Schweinitz (= *remota* Richards.), Dewey's, 4. f. Nordamerika.
 diluta MB. (= *axillaris* H. Berol. = *extensa* C. A. Mey.), hellgrüne, 4. f. Iberien, Caucasus.
 Drejeri Lang (= *pacifica* Drejer = *homalocarpa* Peterm.), Drejer's, 4. f. Deutschland, Dänemark.
 b) *neglecta* Peterm.
 duriuscula C. A. Mey. (= *stenophylla* Less.), härtliche, 4. f. Sibirien, Kamtschatka.
 emarginata Schk. (= *caryophyllata* Gmel. ? = *praecox* Poll. = *montana* L. var. Szgl.), ausgerandete, 4. f. Ungarn.
 enervis C. A. Mey., nervenlose, 4. f. Altai.
 eriophora Fisch., wolltragende, 4. f. Dahurien.
 erythrostachys Hoppe, rothhäbrige, 4. f. Litorale.
 filipendula Drej., fadighängende, 4. f. Island.
 β) *variegata* Drej., γ) *concolor* Drej.
 fimbriata Schkhr. (= *fuliginosa* Host, = *hispidula* Gaud.), gewimperte, 4. f. Oestreich, Schweiz.
 folliculata L., balgfrüchtige, 4. f. Nordamerika.
 Fraseri Andr. (= *Fraseriana* Ker, Nutt. = *Lagopus* Mühlbg. ? = *Mapania sylvatica* Pursh.).
 genuensis DC., genuesische, 4. f. Genua.
 glaucescens Elliot (= *inundata* W. Herb. = *sempervirens* Schweinitz = *verrucosa* Mühlb.), blaugrünliche, 4. f. Carolina, Georgien.
 Goodenovii Gay. (= *caespitosa* Good. Auct., nec L. = *vulgaris* Fr.), Goodenough's, 4. f. Europa.
 Grahmi F. Boot, Graham's, 4. f. Schottland.
 guestphalica Bönningh. (= *divulsa* Good. var.), westphälische, 4. f. Deutschland.
 haematolepis Drej., blutschuppige, 4. f. Grönland.
 hordeiformis Whlbg. nec Host. (= *hordeistichos* Vill. = *secalina* W. non Wahlbg.), 4. f. Frankreich, Caucasus.
 Hosteana DC. (= *fulva* Host = ? *Hornschuchiana* Auct.), Host's. 4. f. Oestreich.
 leiorrhyncha C. A. Mey. (= *nemorosa* H. Berol.), glattschnäbelige, 4. f. Dahurien.
 lepidocarpa Tausch (= *lipsiensis* Peterm.), schuppenfrüchtige, 4. f. Deutschland.
 macrolepis DC. (= *platystachya* Tenore), großschuppige, 4. f. Italien.
 Mairii Germ. et Coss., Maire's, 4. f. Frankreich.
 marginata Mühlbg. (= *pensylvanica* Lam.), berandete, 4. f. Nordamerika.

Carex

- melanantha* C. A. Mey., schwarzblumige, 4. f. Altaï.
microstyla Gay. (= *lobata* Schleichr. Th.), kleingriffelige, 4. f. Schweiz.
Moenchiana Wender. (= *ambigua* Mch.), Mönch's, 4. f. Deutschland.
multiflora Mühlbg. (= *bracteosa* Schweinitz = *microsperma* Wahlbg. = *polymorpha* Swt.).
nardina Fr., borstengrasähnliche, 4. f. Grönland.
nubigena Don, nepalsche, 4. k. f. b. Nepal.
obtusata Liljebl. (= *affinis* Dewey, non RBr. = *microcephala* C. A. Mey.), stumpfe, 4. f. Oeland.
Ohmülleriana O. F. Lang, Ohmüller's, 4. f. Baiern.
parviflora C. A. Mey. (= *melanocephala* Turcz.), 4. f. Caucasus, Sibirien.
pedata L. (non Auct.), fußförmige, 4. f. Lappland.
pediformis C. A. Mey., fußähnliche, 4. f. Sibirien, Kamtschatka, Nordchina.
pubescens Mühlbg. Schk., weichhaarige, 4. f. Nordamer.
punctata Gaud. (= *Balbisii* Sogl. = *corsicana* Lk. = *helvetica* Schleichr.).
pyrenaica Wahlbg. (excl. Synon. Schk.) (= *acutissima* Degl. = *Davalliana* Devey = *denudata* Lapeyr. = *Fontanesia* DC. = *Marschandiana* Lapeyr. = *pulicarioides* Ramond = *Ramondiana* DC.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen, Nordamerika.
repens Bellardi (= *arenaria* β *repens* Wahlbg.), kriechende, 4. f. Italien, Wallis, ? Deutschland.
retroflexa Schkhr. Mühlbg., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.
rhyngocarpa Heuff., schnabelfrüchtige, 4. f. Ungarn.
rhyngophysa Fisch., Mey. et Lallemand., schnabelblasige, 4. f. Dahurien, Caucasus, Norwegen.
rostrata Mühlbg. (= *tentaculata* Mühlbg.).
scoparia Schk. W. (= *arida* Schweinitz et Torrey = *ovalis* W. Herbar. = *leporina* Mchx. = *muskirguinensis* Schweinitz = *viridula* Mchx.).
secalina Wahlbg. (= *hordeiformis* Host, non Wahlbg.), Mähren, Unterösterreich, Ungarn, Litorale.
sparganioides Mühlbg., igelskopfähnliche, 4. f. Nordamerika.
sparsiflora Liljebl. (= *panicea* β *sparsiflora* Wahlbg.), zerstreutblumige, 4. f. Grönland, Schweden, Norddeutschland.
spectabilis Dewey, ansehnliche, 4. f. Nordamerika.
spicata Schk. (= *pyrenaica* Auct. non Wahlbg.), ährige, 4. f. Sachsen.
squarrosa L. (= *typhina* Mchx. = *typhynoides* Schweinitz), sparrige, 4. f. Nordamerika.
triceps Mchx. (= *hirsuta* W. = *viridula* Schweinitz Torrey.), dreiköpfige, 4. f. Nordamerika.
tristis MB. (= *ferruginea* Steven = *stenocarpa* Turcz. = *frigida* All. var.), traurige, 4. f. Caucasus.
umbellata Schkhr., doldige, 4. f. Nordamerika.
Willdenowii Schkhr. (= *Jamesii* Schweinitz), Willdenow's, 4. f. Nordamerika.
xanthophysa Wahlbg. (= *rostrata* Mchx. = *folliculata* β *xanthophysa* Mühlbg. = *longocarpa* W. Herbar.), gelbblasige, 4. f. Nordamerika.

- Carica digitata** Spgl. (= *spinosa* Aubl. = *heptaphylla* Arrabida = *Papaya spinosa* Poir.).
- Carissa** L., Carissa.
Arduina Lam. (= *Arduina bispinosa* L., p. 75.)
ferox E. Mey. (= *Arduina bispinosa* Lodd. et Hortul., non L.), starkbewehrte, ♂. t. w. Cap d. g. Hoffn.
myrtoides Dsf. (? = *ferox* E. Mey.), myrtenähnliche, ♂. t. w. Cap der guten Hoffnung.
spinarum Lodd. non L., v. *Baumannia geminiflora*, p. 62, II.
- Carlina** T., Eberwurz.
Biebersteiniana Hornem. Bernh. (= *nebrodensis* β DC.?),
 - Bieberstein's, 4. f. ? Caucasus.
- Carludovica** R. et S.
Plumieri Kunth (= *palmaefolia* Sweet = *Salmia palmaefolia* W.), Plumier's, ♂. w. Martinique, St. Domingo.
- Carolinea** L. fil., Carolinea.
fastuosa Sessé, prächtige, ♂. w. Südamerika.
grandiflora Spach (= *Pachira grandiflora* Tussac.),
 grofsblumige, ♂. w. Antillen.
robusta Lodd., starke, ♂. w. Südamerika.
tomentosa Mart. (= *alba* Lodd. sec. Spach = *villosa* Mart.), filzige, ♂. w. Brasilien.
- Carpesium** L., Kragenblume.
abrotanoides L., β) *Wulfenianum* Schreb. Oestr. Litorale.
- Carpinus** T., Hainbuche.
Betulus L., d. Carpinizza Host. Siebenbürgen.
edentula Kit., zahnlose, ♂. f. Banat.
Carpoceros longiflora Rich., v. *Martynia longiflora*, p. 498.
- Carpodinus** RBr., Rundfrucht, p. 167.
acida G. Don, saure, ♂. ♂. Sch. w. Sierra Leone.
dulcis G. Don¹⁾, süsse, ♂. ♂. Sch. w. Sierra Leone.
- Carpolyza** Salisb. (*Hessea* Berg.), *Carpolyza* VI. 1.,
 Nascisseae-Amaryllideae.
spiralis Salisb. (= *Amaryllis spiralis* L'Her. = *Crinum spirale* Andr. = *C. tenellum* Jacq. = *Haemanthus spiralis* Ait. = *H. tenellus* Steud. = *Strumaria spiralis* Ker, p. 791 = *Hessea spiralis* Berg.).
*stellaris** (= *Amaryllis stellaris* Jacq. = *Strumaria stellaris* Ker, p. 791 = *Hessea stellaris* Herb.).
Carponema filiformis Eckl. Zeyh., v. *Heliophila filiformis*, p. 386.
Carpopodium cleomoides Eckl. Zeyh., v. *Heliophila cleomoides*, p. 386.
- Carum** L. Spr., Kümmel (Karbe).
burjacticum Turcz., burjactischer, ☉. ♂. f. Sibirien.
hispanicum Mill., spanischer, ♂. f. Spanien.
rigidum K. (= *Selinum appuanum* Vivian. = *rigidulum* Vivian. = ? *Seseli pimpinelloides* L.), starrer, ♂. 4. Italien.
- Carya** Nutt., Hickorynuß.
porcina Nutt., α) *obcordata* Sweet, β) *ficiformis* Mchx. (= *pyriformis* Hort. = *Juglans glabra* Mühlbg.),
 vergl. p. 168.

1) Von den nordamerikanischen Colonisten zu Freetown Sweet pishamin (*Diospyros virginica dulcis*) genannt.

- Caryolopha** Fisch. et Mey., Trautvett., Kuhzunge, V. 1.
Asperifoliaceae.
sempervirens Fisch. et Mey. (= *Anchusa sempervirens* L. = *Omphalodes sempervirens* D. Don, p. 557 = *Buglossum sempervirens* All. G.).
- Caryopteris** Bunge, Flügelkörnchen, XIV. II., Verbenaceae.
mongolica Bunge, mongolisches, 4. ♀. k. Nordchina.
- Caryota** L., Brennpalme.
Cummingii van Houtte, Cumming's, ♀. w. Ostindien.
Rumphiana Mart. (= *urens* Gisecke), Rumph's, ♀. w. Ostindien.
sobilifera Wall. (= *urens* Jacq. nec L.), sprossentreibende, ♀. w. Ostindien.
- Casparea** Kunth, Casparea, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
acuminata Kunth (= *Bauhinia acuminata* L. p. 115).
porrecta Kunth (= *Bauhinia porrecta* Ait., p. 115).
- Casselia** N. E., Mart., (F. P. Cassel, deutscher Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.
serrata N. E., Mart., sägezähnlige, ♀. w. Brasilien.
Casselia Dumort (= *Platynema* Schrad., p. 634 = *Steenhammera* Rehb.), *C. davurica* Dumort, *denticulata* Dumort, *maritima* Dumort, *paniculata* Dumort, *virginica* Dumort, v. *Hippoglossum dahuricum* etc.
- Cassia** T., Cassie.
Absus L. (= *viscosa* Vahl, Roxb. = *Thonningii* DC.).
acutifolia Delil., Heyn. (= *elongata* Lemery = *lanceolata* Wight et Arn. = *ligustrinoides* Schrk.), spitzblättrige, ♀. ♀. t. w. Aegypten, Ostindien.
alata L. (= *bracteata* L. fil. = *herpetica* Jacq. fil.).
angustifolia Lam. (= *amoena* Hamilt. = *mimosoides* β Vogel = *Roxburghii* Grah. = *sensitiva* Roxb.).
arborescens Mill., baumartige, ♀. w. Südamerika.
australis Sims (= *umbellata* Rehb. = *Fraseri* Cunn.).
Barclayana Swt. (= *schinifolia* A. DC.).
Barrenfieldii Colla (= *Fieldii* Steud.), Barrenfield's, ♀. t. Neuholland.
bicapsularis L. (= *sennoides* Jacq. = *limensis* Lam. = *Alcaparillo* H. B. K. = *inflata* Speg. = *pentagona* Mill.), β) aristata DC. (= *Berteri* Colla = *Collae* G. Don = *Chamaefistula inflata* G. Don).
biflora L. (= *aversiflora* Hook. = *Marimari* Aubl. = *galegifolia* L. = *semperflorens* DC.).
bifoliolata DC. (= *monophylla* Arrabida = *nummularia* Vahl = *pentandra* Radd. = *roduntifolia* P. = *Grimaldia bifolialata* Schrank.).
calliantha W. Mey. (= *Selloi* G. Don = *magnifica* Mart. = *fulgens* Wall. = *multijuga* Wall. = *semifalcata* Vellozo), schönblumige, ♀. w. Brasilien.
Chamaecrista L. (= *pulchella* Salisb.), β) stricta Schrk.
chinensis Lam. (= *grandiflora* P. = *Sophora* L. var. ? Vogel = *Chamaefistula chinensis* G. Don).
chrysolina Notaris H. Genuens., goldsaumige, 4. Sch. 4. f. b. k. ?
chrysotricha Collad. (= *chrysocarpa* Desv. = *virgata* Rich.), goldhaarige, ♀. t. w. Guiana.
cordistipula Mart., herzförmigblättrige, ♀. w. Brasilien.
corymbosa Lam. (= *crassifolia* Ortega = *falcata* Dum.

Cassia

- Cours. = *bonariensis* Hortul. = *Chamaefistula corymbosa* G. Don).
- discolor Desv. (= *oxyadena* DC. = ? *frutescens* Mill.), verschiedenfarbige, f. f. w. Antillen.
- Ehrenbergii G. Bischoff. (= *acutifolia* Fr. N. E.), Ehrenberg's, f. w. Aegypten.
- floribunda Cavan. (= *corymbosa* Ortega nec Lam. = *Chamaefistula florib.* G. Don), β) *elegans* H. B. K., γ) *Herbertiana* Lindl.
- florida Vahl (= *sumatrana* Roxb. = *gigantea* Bertero = *Chamaefistula gigantea* G. Don = *Senna sumatrana* Roxb.).
- foliolosa G. Don, blattreiche, f. f. w. Peru.
- fraxinifolia H. B. K. (= *cuspidata* W. E.), eschenblättrige, f. w. Südamerika.
- frondosa Ait. (= *biflora* δ Vogel = *geminiflora* Schrk. = *Crista* Jacq.).
- fruticosa Mill., strauchige, f. f. w. Vera Cruz.
- glandulosa L. (= *acuminata* Mch. = *parvifolia* Wend. = *virgata* Sieb.).
- glauca Lam. (= *arborescens* Vahl = ? *coluteoides* Colla = *enneaphylla* Koen. = *planisiliqua* Burm. = *sulphurea* DC.).
- geminiflora* Collad., paarblunige, f. f. w. Mexico.
- glaucescens* Hoffg., blaugrünliche, f. f. w. Cuba.
- graveolens* Colla (= *emarginata* Bertero, non L.), starkriechende, f. f. w. Westindien.
- hispidula* Collad. (= *Absus* Aubl. = *hispidula* Vahl).
- humilis* Collad. (= *obtusifolia* L. var. β Vahl = *Tala* Desv. = *Tora* β L.).
- indecora* H. B. K. (= *Chamaefistula indecora* G. Don), wenigzierliche, f. f. w. Südamerika.
 β) *pendula* W. E. (= *Chamaefistula pendula* G. Don = *Reinwardtii* Hort. Bogor.)
- laevigata* W. E. (= *tropica* Vellozo = *septentrionalis* Zucc. = *grandiflora* Dsf. nec P. = *Chamaefistula laevigata* G. Don).
- lanceolata* Forsk. (= *orientalis* P. = *Senna officinalis* G. = *S. alexandrina* Mill.).
- ligustrina* L. (= *aegyptiaca* W. E. = *robinoides* W. E. = *bahamensis* Mill. = *marylandica* Mch. non L.).
- linearifolia* G. Don, gleichbreitblättrige, f. w. Brasilien.
- macrophylla* Kunth, großblättrige, f. w. Neugranada.
- monantha* DC. (= *uniflora* Mill., non Sogl.), einblumige, \odot . m. w. Südamerika.
- obliquifolia* Schrank, schiefblättrige, \odot . f. Brasilien.
- occidentalis* L. (= *planisiliqua* L. = ? *caroliniana* Walt. = ? *ciliata* Rafin. = *foetida* Roxb.), α) *Sophora* L. (= *coromandelina* Jacq. = *chinensis* Jacq. = *torosa* Cav. = *torulosa et indica* Poir. = *sophoroides* Collad. = *purpurea et esculenta* Roxb. = *Chamaefistula coromandelina*, *Sophora et torosa* G. Don = *Senna esculenta*, *purpurea et Sophora* Roxb.), β) *glabra* Vog. (? = *geminiflora* Schrk. H. Monac., vergl. C. *frondosa*).
- polyphylla* Jacq. (= *marginata* W. E.).
- pulchra* H. B. K. (= *Desvauxii* Collad. = *tetraphylla* Desv.), hübsche, f. w. Südamerika.
- pumila* Lam. (= *prostrata* Roxb.).

Cassia

racemosa Mill., traubige, f. w. Carthagenä.

reticulata W. E. (= *dumetorum* Bertero = *strobilacea* H. B. K.).

rostrata Mart., schnabelförmige, f. w. Brasilien.

rugosa G. Don, runzelige, f. w. Brasilien.

Schimperi Steud. (= *cana* Wender. = *obtusata* Hochst. et Steud.), Schimper's, f. w. t. Arabien.

Schultesii Colla, Schultes's, f. t. Neuholland.

sericea Sw. (= *sensitiva* Jacq. = *ornithopodioides* Lam.),
β) *ciliata* Hffing.

speciosa Schrad. (= *micans* W. E.).

stipulacea Ait. (= ? *mexicana* Auct. = *opaca* Grah.).

suffruticosa Koen. (= *speciosa* Roxb.).

tetraphylla Collad. (= *procumbens* Mill., non L.), vierblättrige, ⊙. m. w. Neuspanien.

tomentosa L. (= *cana* Schrk. = *lutescens* G. Don = *multiglandulosa* Jacq. = *pubescens* R. et P. = *Wightiana* Grah.).

Tora L. (= *foetida* Salisb. = *Gallinaria* Collad. = *inodora* Grah. = *obtusifolia* Burm. = *Senna Tora* Roxb.).

venosa Castigl. (= *chamaecrista* L. var. = *triflora* Jacq.), aderige, ⊙. m. w. Westindien.

Vogeliana Schtdl., Vogel's, f. t. w. Mexico.

vulgaris Roxb., Fisch., gemeine, ⊙. w. m. Ostindien.

Wallichiana DC. (= *dimidiata* Roxb. = *Lechenaultii* Wall. = *mimosoides* L. var. Vogel) ¹⁾.

Unbestimmtere: *acisperma* Schrk., f. ?, *amoena* Brotero, ?, *chamaecristoides* Collad. (= *chamaecrista* Mill., non L.), f. Veracruz, *eglandulosa* Dum. Cours., f. ?,

elegans Voigt (= *pinnata* Hortul.), f. ?, *graveolens* Colla, f. f. Guadeloup, *hirta* W., f. ?, *homophylla* Hffg., f. ?, *Hornemanni* DC. (= *venosa* Hornem. H. Hafn. nec Castigl.), ⊙. ?, *Houstoniana* Colla (= *biflora* Mill.), f. Jamaica, *juglandifolia* Brotero, ?, *Milleri* Colladon (= *emarginata* Mill. non L. = *pilosa* L.), f. Jamaica, *myrtifolia* Brotero, ?, *papulosa* Hffg., f. Brasil., *pulcherrima* Dehnh. f. Surinam, *subpubescens* Brotero, *torosa* Brotero, *villosa* Mill., f. Campech.

Cassine L., Cassine.

oppositifolia Mill., gegenblättrige, f. k. ?

caroliniana Lam. (= ? *corymbosa* Mill. = *Peragua* Mill.), v. *Ilex vomitoria*, p. 414, *humilis* Hort.,

oleifolia P. (= *oleoides* Lam.), v. *Celastrus lucidus* et *oleoides*, p. 174, *laevigata* Lam., v. *Pterocelastrus tricuspidatus*, *sphaerocarpa* Cels = C.

Colpoon.

Cassinia RBr., Cassinie.

aculeata RBr. (= *Calea aculeata* LaBill.), stachelige, f. t. k. Van Diemens Land.

Castanea T. G., Kastanie.

chrysophylla Hook., goldblättrige, f. k. Columbia.

Castilleja Mutis, Castilleja.

coccinea Speg. (= *Bartsia coccinea* L. = *Euchroma coccinea* Nutt., p. 318).

grandiflora Speg. (= *sessiliflora* Pursh, = *Bartsia grandiflora* Speg. = *Euchroma grandiflora* Nutt., p. 318).

1) Zur Ergänzung und Berichtigung der Synonyme p. 198—170.

Castilleja

- lithospermoides* H. B. K. (= *hyssopifolia* W. Herb.), steinsamenähnliche, f. k. Mexico.
longiflora Kunze, langblumige, f. k. Mexico.

Casuarina Rumph, Keulenbaum (Casuarstrauch).

- Hügeliana* Miquel, Hügel's, f. t. k. Neuholland.
Lehmanniana Miquel, Lehmann's, f. t. k. Neuholland.
repens Sieber, kriechender, f. t. k. Neuholland.

Ob von nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir unbekannt, als: *C. microstachya* Miquel, *obesa* Miquel, *Preissiana* Miquel, *selaginoides* Miquel, *thuyoides* Miquel, *trichodon* Miquel. Sämmtlich f. und in Neuholland heimisch. — Unbestimmtere: *litoralis* Salisb., *sparsa* Tausch, *excelsa* Salisb. = *stricta*, *quadridentata* Dsf. = *quadrivalvis*, *suberosa* Hort. = *torulosa*, *verticillata* Lam. = *nodiflora*.

Catabrosa aquatica B. P., *distans* Lk., *Engelmanni* Lk. etc., v. *Glyceria aquatica* etc., p. 360.

Catachaetum Hffg. emend. (= *Catasetum* Rich.), Faden- (Borstenstendel), p. 172.

- craniomorphum* Hoffmg., veränderlicher, 4. Brasilien.
integerrimum Hook., ganzer, 4. w. Guatimala.
litratum Hffg., bandstreifiger, 4. w. Brasilien.
macrocarpum H. B. K. (= *tridentatum* Hook.), großfrüchtiger, 4. w. Cayenne.
maculatum H. B. K., β) viride.
planiceps Lindl., flachköpfiger, 4. w. Südamerika.
purpurascens Hffg., purpurfarbiger, 4. w. Brasilien.
recurvatum Lk. Kl., zurückgekrümmter, 4. w. Südamer.
Russelianum Hook., Russel's, 4. w. Guatimala.
squalidum Hffg., dunkelfarbiger, 4. w. Brasilien.
tridentatm Hook., β) *Claveringii* Lindl., γ) *floribundum* Hook., δ) *viridiflorum* Hook., ε) *maximum* Hort., ζ) *pallidum* Hort., η) *reflexum* Hort.
turbinatum Hffg., aufgetriebener, 4. w. Brasilien.
 Noch kommen in den Pflanzen-Catalogen vor: *barbatum*, *Calceolus*, *ciliare*, *laminatum*.

Catalpa Scop. Juss., Catalpabaum.

- bignonioides* Scop. (= *cordifolia* Duham. Mch. = *syringaeifolia* Sims = *communis* Dum. Cours.).
 β) ? *Kaempferi* DC. (= *ovata* G. Don), γ) *pumila*.
Bungei C. A. Mey., Bunges, f. f. b. China.

Cathartocarpus P., Purgirfrucht¹⁾.

- bacillaris* P. (= *Bacillus* Lindl. = *Cassia bacillaris* L., p. 169).
brasilianus Loud. (= *Cassia brasiliana* Lam. = *grandis* L. Suppl. = *C. javanica* Aubl. = *mollis* Vahl = *Bactrylobium grande* Hornem. Lk.), β) *ferrugineus* G. Don (= *Bactrylobium ferrugineum* Schrad.).
Fistula P., β) *rhombifolius* G. Don (= *Cassia rhombifolia* Roxb.).

Cattleya Lindl., Cattleya.

- Arembergii* Scheidw., Aremberg's, 4. w. Brasilien.
Aucklandiae Lindl., Auckland's, 4. w. Brasilien.
aurea H. Belg., goldfarbige, 4. w. Südamerika.
citrina Lindl. (= *Sobralia citrina* Llave).
crispa Lindl., b) *purpurea*.
domingensis Lindl., domingoische, 4. w. Domingo.

1) Nach Vogel u. a. nur Unterabtheilung von *Cassia*.

Cattleya

Forbesii (= *isopetata* Hort.), b) *pallida*.

granulosa Lindl. (= *guttata* β Russeliana Hook.), körnige, 4. w. Brasilien.

guttata Lindl. (= *elatior* Lodd.).

Harrisoniana Batem. Paxton, Harrison's, 4. w. Brasil.

Karwinskii Mart., Karwinsky's, 4. w. Brasilien.

labiata Lindl., b) *atropurpurea*, β) *Mossiae* Hook., (= *labiata grandiflora* Hort.).

Loddigesii Lindl. (= *Epidendron violaceum* Lodd.).

β) *floribus pallidioribus* (= *intermedia* Graham.),

b) *variegata* Hook., γ) *floribus subalbis* (= *intermedia pallida* Lindl. = ? *vestalis* Hffg.).

marginata Lodd., herandete, 4. w. Südamerika.

maritima Lindl. (= *Loddigesii* var. ?), Meerstrand's, 4. w. Südamerika.

maxima Lindl., größte, 4. w. Peru.

Perrinii Lindl., Perrini's, 4. w. Brasilien.

Pinellii Hort., Pinelli's, 4. w. Südamerika.

pumila Hook. (= *marginata* Hort. = ? Lodd.).

superba Lindl. (= *Schomburghkii* Lodd.), stolze, 4. w. Guiana.

Walkeriana Gardn., Walker's, 4. w. Brasilien.

Noch kommen nachstehende in den Pflanzenverzeichnissen vor: *alba*, *candida*, *concolor*, *epidendroides*, *gigantea*, *purpurea* Lowii.

Caucalis T., Haftdolde.

abyssinica Hochst., abyssinische, \odot . f. Taurien.

muricata Bischoff, weichstachelige, \odot . f. Taurien.

Ungewisse: *elongata* Lk., Gerardi Schwägr., *macrocarpa* Hort. Turin.

glabra Forsk., v. *Daucus pubescens*, *nodosa* Crtz., v. *Chaerophyllum nodosum*, p. 187.

Caulinia fragilis W. (= *Ittnera minor* Gmel.), v. *Najas minor*, p. 539.

Caulinia rubicunda Mch., v. *Kennedyia rubicunda*, p. 435.

Caulotretus Tenore, *Caulotretus*, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

eriphorus Tenore (vergl. = *Bauhinia eriophora*, p. 62, II.), wolltragender, \mathfrak{f} . Sch. w. Mittägl. Amerika.

Cavallium urens Schott, Endl., v. *Sterculia urens*, p. 787.

Cavanillea philippensis Lam., v. *Diospyros Embryopteris*, p. 267¹).

Caylusea St. Hil., (Graf Caylus franz. Gelehrter), XI. VI., Resedaceae.

abyssinica Fisch. et Mey. (= *Reseda abyss.* Fresen, p. 680).

canescens St. Hil. (= *Reseda canescens* L., p. 680).

Ceanothus L., Säckelbaum.

albiflorus Hort. belg., weifsblumiger, \mathfrak{f} . k. ?

americanus L., β) *decumbens* Hort. (*macrocarpus* Hort.).

Burmannianus Spach, Burmann's, \mathfrak{f} . k. f. b. ?

buxifolius W., buchsbaumblättriger, \mathfrak{f} . k. t. Mexico.

collinus Dougl., Hügel-S., \mathfrak{f} . k. f. b. Columbia.

Delilianus Spach, Delil's, \mathfrak{f} . k. f. b. ?

divaricatus Nutt., ausgespreizter, \mathfrak{f} . f. Nordamerika.

1) *Cavendishia nobilis* Lindl., Vaccinieae, \mathfrak{f} . aus Südamerika, wird wohl kaum kultivirt.

Ceanothus

glaber Spach (= *americanus* pl. Auct.), kahler, ♀. f.
? Nordamerika.

Hartwegii ? Hook., Hartweg's, ♀. k. Mexico.

Milleri Tausch (= *americanus* Mill., non L.), Miller's,
♀. f. Nordamerika.

Neumanni Tausch, Neumann's, ♀. f. Nordamerika.

ovatus Dsf. (= *Fontanesianus* Spach, = ? *perennis*
Pursh).

perennis Pursh (= *herbaceus* Rafin. = *reclinatus* Pursh).

thyrsiflorus Eschw. (= *divaricatus* Hort., nec Nutt.),
straufsblümiger, ♀. k. f. b. Californien.

Unbestimmtere: *macrophyllus* Dsf., *ovalifolius* Wender.

africanus L. Mill. (= *Hollia africana**, p. 880),
v. *Noltea africana*, *globulosus* LaBill. et *spathula-*

tus LaBill., v. *Trymalium globulosum* et *Billardieri*,

Hügelii Hort., v. *Pomaderris Hügelii*, *capensis* DC.,

paniculatus Heyne et *zeylanicus* Roth., v. *Scutia*
capensis, *paniculata* et *indica*.

Cecropia L., Hohlschaft (Kanonenbaum).

digitata Tenore, fingerförmiger, ♀. w. ? Südamerika.

Cedrela P. Br., Cedrela.

febrifuga Blume (= *C. ? Toona* Roxb. = *Swietenia*
Sureni Blum.), fiebertreibende, ♀. w. Java.

Cedronella Mönch, Benth., Cedronella.

triphylla Mch. (= *Dracocephalum canariense* L., p. 274),
dreiblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

Celastrus L., Celaster.

cassinoides L'Her., β) *lycioides* W.

edulis Vahl (= *Catha edulis* Forsk.), genießbarer, ♀.
♀. w. t. Arabien, Abyssinien.

heterophyllus Savi, verschiedenblättriger, ♀. k. ?

humilis Eckl. Zeyh., niedriger, ♀. t. k. Cap d. g. H.

lanceolatus Brotero, lanzettblättriger, ♀. t. k. Madeira.

lucidus L. (= *concavus* Lam. = *Cassine concava* Lam.
= *C. humilis* Hort.).

microphyllus L. fil., kleinblättriger, ♀. t. k. Cap der
guten Hoffnung.

Wallichianus Speg. (= *buxifolius* Roxb. = *rigidus* Wall.
= *Catha Wallichii* G. Don), Wallich's, ♀. w. Ostindien.

europaeus Boiss., ♀. Spanien, wird wahrscheinlich nicht
kultivirt. *C. Hamelii* Speg. (= *Rhamnus racemosus*

Duham.), ohne Angabe des Vaterlandes, scheint eine
unsichere Art.

hispanicus Hort. = *cymosus*, *laurinus* Thbg. et
oleoides Lam., v. *Scytophyllum laurinum* et *oleoi-*

des, *nutans* Roxb. (= *paniculatus* W.) et *zeylanicus*
Roth), v. *Scutia paniculata* et *indica*, *pterocarpus*

DC. et *tricuspidatus* Lam. (= *Asterocarpus typi-*
cus DC.), v. *Pterocelastrus typicus* et *tricuspidatus*,

pyracanthus L. (= *bullatus* Hort. = *Colpoon* Hort.
= *octogonus* Hort.), v. *Putterlickia pyracantha*,

verticillatus R. et P., *Maytenus* W. et *octogonus*
L'Her., v. *Maytenus verticillatus*, *chilensis* et *octo-*

gonus, p. 501.

Celosia L., Hahnenkamm.

aspera Roth, rauher, ☉. w. m. Ostindien.

extipulata Schrank., zwischenblattloser, ☉. w. m. ?

longifolia Mart., langblättriger, ♀. w. Brasilien.

Celosia

melanocarpos Poir., schwarzfrüchtiger, ☉. w. m. Senegambien, Senaar.

sanguinea Hoffg., blutrother, ☉. w. m. Ostindien.

stricta Fisch., steifer, ☿. w. Brasilien.

axillaris Mart., v. *Alternanthera axillaris*, *diffusa*

Hffg., v. *Mogiphanes diffusa*, *lanata* L., *Monsoniae*

L., v. *Aerva lanata*, p. 20 et *A. Monsonia*, p. 11,

II. muricata Spgl., v. *Cladostachys frutescens*, p.

202, *pallida* Hort. = *pyramidalis*.

Celsia L., Celsie.

acaulis Bory et Chaub., stengellose, ♂. 4. k. f. b. Griechenland.

brachysepala Fisch. et Trautv., kurzkelchige, ♂. 4. f. b. Natolien.

glandulosa Bouché (= *Arcturus* plur. Hort., non L.), drüsige, ♂. k. f. b. Candia.

persica C. A. Meyer, persische, ♂. 4. k. f. b. Persien, Caucasus.

sinuata Tenore (= *Verbascum orientale* All.), buchtigblättrige, 4. f. Italien.

sublanata Jacq, Ker, wenigwollige, ♂. k. f. b. ?

tomentosa Zuccar., filzige, ♂. k. f. b. Griechenland.

viscosa Roth, N. E., schmierige, 4. t. w. Ostindien.

Unbestimmtere Arten oder Gardenhybriden: *australis* Hort., *erecta* Fisch., *glabrata* Roth, *grandiflora* Hort., *incarnata* Rchb., *striatiflora* Hort. ♂.

caduca Mch. = *orientalis*, *dentata* Mch. = *coro-*

mandelina, *horizontalis* Mch. = *Arcturus*, *urticae-*

folia Curt., v. *Alonsoa urticaefolia*, p. 26. II.

Celtis T., Zuergelbaum.

aspera Dsf. (= *occidentalis* γ *scabriuscula* Loud.), rauhbblätteriger, ♀. f. Nordamerika.

Audibertiana Spach, Audibert's, ♀. f. Orient.

canescens H. B. K. (= *albicans* W. Herb. = *Sponia canescens* G. Don), graulicher, ♀. w. t. Mexico.

mississippiensis Bosc. Dsf., Mississippi's, ♀. f. Nordamer.

occidentalis L. (= *obliqua* Mch. = *tenuifolia* Lam. = *Sponia occidentalis* G. Don), β) *latifolia* (= ? *cordata* Hort.).

rhamnoides W. (= *Rhamnus iguaneus* Cavanill.), wegdornähnlicher, ♀. t. w. Neuspanien.

spinosa Spgl., dorniger, ♀. w. Brasilien.

Cenchrus L., Stachelgras.

I. Genuin.

Cavanillesii Tausch (= *echinatus* Cavan, non L.), Cavanille's, 4. m. f. Brasilien.

pennisetiformis Hochst. et Steud. (= ? *bulbosus* Fresen. = *echinoides* Wight), federborstenähnliches, 4. w. Arabien.

pilosus H. B. K., behaartes, ☉. m. f. Südamerika.

II. *Trachyozus* Rchb. (= *Trachys* P. Trin.).

muricatus L. (= *mucronatus* Auct. = *Panicum cenchrroides* Lam. = *P. dimidiatum* Burm. = *Trachys muricata* Trin. = *T. mucronata* P.), weichstacheliges, ☉. m. f. Ostindien.

Cenia Commers. P. Juss, Cenie.

anthemoides DC., Chamillenähnliche, ☉. f. Cap d. g. H.

flosculosa DC., mehrblüthige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

microcephala E. Mey. (= *Cotula microcephala*, p. 876).

Cenia

- nudicaulis E. Mey. (= *discoidea* Less. = *Cotula nudicaulis* Thbg., p. 223).
 subheterocarpa Less. (= *Cotula pumila* Houtt.), verschiedenfrüchtige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
 turbinata P. (= *Cotula turbinata* L. = *Lidbeckia turbinata* Thbg.).
 villosa* (= *Cotula villosa* DC.), zottige, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Cenocline C. Koch, Cenocline, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- aurea C. Koch (= *Cotula aurea* L., p. 223).
 chamaemelifolia C. Koch (= *Cotula chamaemelifolia* Ehbg.), stinkchamillenähnliche, ☉. f. Aegypten.
 cinerea C. Koch (= *Tanacetum cinereum* DC. = *Brocchia cinerea* Visian. = *Cotula cinerea* Delil. = *Grangea cinerea* Loud., p. 367).
 globifera C. Koch (= *Cotula globifera* Thbg. = *Tanacetum globiferum* DC. = *obtusum* Thbg., p. 798).
 pauciflora C. Koch (= *Cotula matricarioides* Bong. = *Tanacetum pauciflorum* Richards., p. 798).

Außerdem stellt Herr Prof. C. Koch noch folgende wahrscheinlich nicht kultivirte Arten zu dieser Gattung: *acutiloba* C. Koch (= *Tanacetum acutilobum* DC.), ♂. Cap d. g. Hoffn. ? *albida* C. Koch (= *Tanacetum albidum* DC.), ☉. Cap d. g. Hoffn. und ist auch der Meinung *Matricaria corymbifera* DC. et *discoidea* DC., p. 499, hierher zu ziehen.

Cenolophium DC. K., s. Coenolophium p. 876.

Centaurea L. Less., Flockenblume.

- ammophila Bess. (= *diffusa* γ DC.), sandliebende, 4. Südpodolien.
 coelolepis Fisch. et Mey., hohlschuppige, 4. f. Asiat. Rußland.
 cuspidata Visian., langspitzige, 4. f. Dalmatien.
 Gmelini Steud. (= *integrifolia* Tausch, non Mey.), Gmelin's, 4. f. Sibirien.
 gymnocarpa Moris et Notaris, nacktsaamige, 4. Insel Caprea.
 Hladnickiana Fisch., Hladnick's, 4. f. Krain.
 integrifolia C. A. Mey., ganzblättrige, 4. f. Caucasus.
 Kotschyana Heuff., Kotschy's, 4. f. Ungarn.
 laciniata Guss. (= *ambigua* Tenore), schlitzblättrige, 4. f. Neapel.
 latisquama DC. (= *centauroides* β MB. = ? *tatarica* W.). β) salonitana Visiani.
 Ledebouri Steud. (= *cana* Meyer (non Sib. Sm.) = *Stoebe* Ledeb.), Ledebour's, 4. f. Altai.
 melitensis L. (= ? *lappacea* Tenore = *Calcitrapa conferta* Mch. = *Calcitrapa melit.* Dum. Cours. = *Triplocentron melitense* Cass.).
 montana L. 1), β) *angustifolia* Mill.
 nigrescens W. (= *bracteata* Balb. = *denticulata* Lejeune = *dubia* Suter = *schemnitzensis* Hort. etc.).

1) Nach Endlicher Catal. horti academici Vindobon. I. p. 395 mit den Abarten folgendermassen geordnet: a) *cyanea*, aa) *montana* Jacq., bb) *axillaris* W., cc) *stricta* W. K., dd) *carniolica* Host, β) *purpurascens* (= *Fischeri* W. E. Suppl.), γ) *albida* (= *ochroleuca* W. = *leucantha* Web. et Mohr. = *caucasica* MB.), δ) *citrina* (= *cheiranthifolia* W. = *ochroleuca* Sims).

Centaurea

orientalis L. (= *theiantha* Spgl.), β) *brachylepis* Fisch. et Mey., γ) *macrolepis* Fisch. et Mey. (= *tatarica* Rchb.).

ovina Pall. (= *ciliata* Frivalds.).

Parlatoris v. Heldr., Parlotores, 4. f. Sicilien.

parviflora Dsf. (= *spinosa* Frivalds.).

Pestalotti Notaris, *Pestalotti's*, ? \odot f. Italien.

phrygia L., β) ? *nervosa* W. (= *Berinii* Sieb.), γ) *ambigua* Thomas.

polyacantha W. (= *hystrix* Boiss.).

procera Fisch., Mey., Lallemand, hohe, 4. f. Natolien.

pullata L. (= *Melanoloma humilis* Cass. = *pullata* Cass.), β) *excelsior* Cass.

punctata Visian. (= *glaberrima* Tausch), *punktirte*, \odot f. Dalmatien.

pusilla Thuill., niedrigste, \odot f. Aegypten.

rhizantha C. A. Mey., wurzelblumige, 4. f. Caucasus.

rigens Lagasc. (= *Stoebe* L.), starre, 4. f. Spanien.

rigidifolia Bess. (= *versicolor* Fisch. = *sulphurea* Lagasca, non W.), 4. f. Nordcaucasus.

rupestris L. (= *arachnoidea* Vivian. = *ceratophylla* Tenore, non L. = *collina* Scopol., non L. = *variabilis a rupestris* Bartl.), β) *adonidifolia* Rchb.

saxicola Lagasca, Steinliebende, 4. f. Spanien.

Scabiosa L., ϵ) *tenuifolia* Schleich., ζ) *badensis* Trattin.

sicula L. (= *Pottii* Hort. = *scabra* Presl), β) *multiflora* P.

sordida W. (= *collino-scabiosa* Schied. = *pubescens* W. Herb. = *variabilis \gamma sordida* Bartl.), schmutziggelbe. 4. f. Oestr. Litorale.

sulphurea W. (= ? *Pottii* Hort. = *sicula* Hort. = *Triplocentron sulphureum* Webb.)

Torreana Tenore, Torre's, ♂. f. Neapel.

trichocephala MB. (= *capillata* L. var.), β) *latifolia* Lallemand.

Unbestimmtere: *acrolepis* Hffg., *acromaura* Hffg., *chrysanthemifolia* Tausch, *eriophylla* Spgl., *fistulosa* Wender., Forardi Hornem., 4. ? Ital., *inusta* Hoffg., *leucocephala* Hort., *macrophylla* Hort., *multifida* P. (= ? *pubescens* P.), *orthacantha* Tausch, *ramosissima* Tausch (= ? *nitens* MB.), \odot ., *rhaetica* Moritzi (= ? *Phrygia* var.), 4. f. Rhaetien, *sanguinea* Spgl., *Schmidtiana* Tausch, *Stoebe* Hort. (? L.), *ucranica* H. Berol.

III. *Microlonchus* Cass., DC.

salmantica L., b. *foliata*.

IV. *Crupina* P., Cassin.

Crupinastrum Moris., bartblumenähnliche, \odot f. Sardinien.

Centaurella Mchx., Rich, *Centaurella*, IV. 1., *Contortae-Gentianeae*.

autumnalis Pursh (= *paniculata* Mchx. = *Andrewsia autumnalis* Spgl. = *A. paniculata* Bartl. = *Bartonia tenella* Mühlbg. = *Sagina virginica* L.), Herbst-C., \odot f. Georgia, Carolina.

vernalis Pursh (= *verna* Mchx. = *Andrewsia verna* Spgl.), Frühlings-C, \odot f. Virginien, Georgien.

Centaureum Erythraea (= *vulgare*) Borckh. Rafn., v. *Erythraea Centaureum*, p. 314. — *Centaureum autumnale* P. et *vernum* P., v. *Centaurella* autum-

- nalis et verna. — *Centaureum africanum* Cass., *officinale* Cass. et *ruthenicum* Cass., v. *Centaurea africana*, *Centaureum* et *ruthenica*, p. 176 etc. — *Centhriscus fumarioides* Spgl. et *nemorosa* Spgl., v. *Anthriscus fumarioides* et *nemorosa*, p. 65.
- Centotheca** lappacea Desv. (= *latifolia* Trin.).
Centrachaena viscida Schott msc., v. *Chrysanthemum viscosum*, p. 193.
- Centradenia** G. Don, *Centradenie*, VIII. I., *Lythraeae-Melastomaceae*.
grandifolia Lemaire (= *Rhexia grandifolia* Schltld. = *Plagiophyllum grandifolium* Schltld.), großblättrige, 4. h. w. Mexico.
inaequilateralis G. Don (= *Rhexia inaequilateralis* Chamiss. Schltld.), ungleichseitige, ♂. ? h. w. Mexico.
rosea Lindl. (= *Donkelaaria diversifolia* H. belg. = *Arthrostemma Parietaria* Hort. belg. = *Plagiophyllum parvifolium* Schltld.), rosafarbige, 4. h. w. Mexico.
- Centranthus** Neck. DC., *Sporubaldrian*.
longiflorus Steven (= *angustifolius* MB., non DC.), langblumiger, 4. f. Armenien, Caucasus.
nervosus Moris (= *Valeriana trinervis* Vivian.), nerviger, 4. f. Corsica, Sardinien.
Centratherum intermedium Less. (= *brevispinum* Cass.), *muticum* Less., *punctatum* Less. (= *longispinum* Cass.), v. *Ampherephis intermedia*, *mutica* et *aristata*, p. 49.
Centrophyllum Auct. v. *Kentrophyllum*.
Centropogon Andropogon DC., *fastuosus* Scheidw., *grandis* Presl etc., v. *Lobelia* Sect. I.
- Centrosema** DC., Benth., *Centrosema* XVII. IV. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.
brasilianum Benth. (= *Clitoria* ? *amoena* Roth. = *Clit. brasiliensis* L., p. 206 = *Cl. formosa* H. B. K. = *Vexillaria brasiliensis* Hffg.).
conjugatum Benth. (= *Sleganotropis conjugata* Lehm.), verbundenblättriges, ♂. Sch. w. Südamerika.
Plumieri Benth. (= *Clitoria calcarata* L'Her. = *Cl. fluminensis* Arrabida = *Cl. mexicana* Moçin. = *Cl. Plumieri* Turp., p. 206).
virginianum Benth. (= *Clitoria amoena* Roth = *Clit. calcarigera* Salisb. = *Cl. micrantha* Sm. = *Cl. virginiana* L., p. 207).
Cepa angulosa Bernh., *cernua* Mch. etc. etc., *vulgaris* Bernh., v. *Allium angulosum* etc. etc., p. 29 etc. et A. *Cepa*.
- Cephaelis** Sw., *Kopfbeere*.
Ipecachuanha Rich. (= *emetica* P. = *Callicocca Ipecachuanha* Brotero = *Ipechahuancha officinalis* et *præta* Arruda), *Brech-K.*, h. w. Brasilien,
Swartzii DC. (= *violacea* Sw., non W.), *Swartz's*; h. w. Caribäen, Westindien.
violacea W. (non Sw.).
- Cephalandra** Schrad., *Kopfnäulein*, XXI. x., *Cucurbitaceae*.
quinqeloba Schrad. (= *Bryonia quinqeloba* Thbg., p. 135 = *Melothria quinqeloba* Eckl. Zeyh.).
- Cephalanthus** L., *Knopsbaum*.
floribundus H. Berol., blüthenreicher, h. f. ? Nordamerika.

- Cephalopappus** N. E. Mart., Kopffederchen, XIX. 1.,
Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).
- sonchifolius* N. E. Mart. (= *Sparganophorus sonchifolius* Spr.), gänsedistelblätteres, 4. w. Brasilien.
Ob kultivirt?
- Cephalophora** Cavan., Köpfehtträger.
- aromatica* Schrad. (= *tenera* Cav. = *Graemia* (= *Grahamia*) *aromatica* Hook.).
- decurrens* Less. (? = *Helenium pubescens* Ait.), herablaufende, 4. f. Californien.
- Doniana* Hook. et Arn. (= *suffruticosa et elongata* Don), Don's, 5. 4. k. Chili.
- Ceramia blenna* G. Don = *Erica Vernix*, *calathiflora* G. Don = *Erica bicolor*, *cordata* G. Don = *Erica cordata*, *helianthemifolia* G. Don = *Erica marifolia*, *humifusa* G. Don, *latifolia* G. Don, *marifolia* G. Don, *obliqua* G. Don, *oxycoccifolia* G. Don, *planifolia* G. Don = *Erica humifusa* etc., *serpyllifolia* G. Don = *Erica hispidula*, *teucrifolia* G. Don et *urceolaris* G. Don, v. *Erica teucrifolia et urceolaris*.
- Cerastium** Hornkraut.
- alsinefolium* Tausch, mierenblätteres, 4. f. Deutschl.
- arabicum* Fisch. et Mey., arabisches, ☉. f. Arabien.
- Biebersteinii* DC. (= *repens* MB. = *tomentosum a* L.), Bieberstein's, 4. f. Taurien.
- falcatum* Bunge (= *lithospermifolium* Ledeb.), sichelförmiges, 4. f. Sibirien.
- Fischerianum* Seringe (= *hirsutum* Fisch. = ? *pau-ciflorum* Turtsch. = ? *pilosum* Ledeb.), Fischer's, 4. f. Kamtschatka.
- gracile* Dufour (= ? *semidecandrum* L.), schlankes, ☉. f. Spanien.
- inflatum* Lk., aufgeblasenes, ☉. f. Persien.
- macranthum* C. A. Mey., großblumiges, 4. f. Rußland.
- micranthum* C. A. Mey., kleinblumiges, ☉. f. Rußland.
- pumilum* Curt. (= *Grenieri* γ Schulz).
- Sannianum* Sering. (= *longifolium* Tenor.), neapolitanisches, 4. f. Neapel.
- Sprengelii* Sering. (= *tenuifolium* Speg.), Sprengel's, ♂. f. ?
- tomentosum* L. (= *Columnae* Tenore).
- anomalum* W. K., v. *Stellaria viscida*, p. 786.
- manticum* L., v. *Mönchia mantica*, *umbellatum* Huds., v. *Holostemum umbellatum*.
- Cerbera** L., Schellenbaum.
- laurifolia* Lodd. (= *Tanghinia laurifolia* G. Don).
- Odollam* Hamilt. G. (= *C. Manghas* Sims, nec L. = *Tanghinia Odollam* G. Don).
- Unbestimmtere: *dichotoma* Hort., *longifolia* Hortor.
- Cercis** L., Judasbaum.
- clinensis* Bunge, chinesischer, 5. f. b. k. China.
- Cereus** Juss. Haw., v. Cactae, p. 872 et p. 84. II.
- Cerinth** T., Wachsblume.
- auriculata* Tenore, geöhrte, ☉. f. Neapel.
- gymnandra* Gasparini, nacktinännige, ☉. f. Neapel.
- longiflora* Viviani, langblumige, ☉. f. Corsica.
- purpurea* Vis. = *retorta*.
- Cerionanthus alpinus* Schott etc., v. *Succisa alpina* etc., p. 793.

Ceropegia L., Leuchterblume.bulbosa Roxb. (= *edulis* Hort.).

oculata Hook., geäugelte, 4. Sch. w. Bombay.

vincaeflora Hook., sinngrünblumige, 4. w. Südafrika.

Ceropteris Lk., *calomelaena* Lk., *chrysophylla* Lk., *distans* Lk. etc., v. *Gymnogramma* Sect. II.*Cervaria nigra* Bernh. (= *rigida* Mch.), v. *Peucedanum Cervaria*, *Rivini* G., v. *Libanotis montana*, p. 461.**Cestrum** L., Hammerstrauch.

aurantiacum Lindl., orangefarbiger, 5. w. Guatimala.

candidum Seemann et J. Schmidt (= *elongatum* Hort.), weißlicher, 5. t. Mexico.citrifolium Retz (= *fasciculare* Otto = *venenatum* Auct.).

hirsutum Jacq., rauhhaariger, 5. w. ?

laurifolium L'Her. (= *grandiflorum* Hort. = *venenatum* Lam. (non Thbg.).pallidum Lam. (= ? *diurnum* Auct. = *venenatum* Mill.).roseum H. B. K. (= *Habrothamnus fascicularis* Hort.), rosafarbiger, 5. t. w. Mexico.

subpulverulentum Mart., wenigbestaubter, 5. w. Brasil.

venenatum Thbg. (= *Acocanthera venenata* G. Don).

viridiflorum Hook., grünblumiger, 5. w. Südbrasilien.

Unbestimmtere: *dubium* Steud. (= *racemosum* Tausch), *magnoliaefolium* Hort., *parviflorum* W., *Plucknetii* Tausch, *ramosissimum* NoCCA (= *undulatum* Auct., non R. et P.), *spicatum* Mill., *Carthagera*, *viridipurpureum* Hort.**Ceterach** W., Milzfarn.

capense Kunze, capischer, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

Chabraea DC. (*Chabraeus*, alter deutscher Botaniker), XIX. iv., Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).cinerea DC. (= *Lasiorrhiza cinerea* Less. = *Leuceria cinerea* Don = *Leuchaeria Gilliesii* Hook. Arn. = *Leuchaeria hieracioides* Gill. et Don), aschgraufarbige, ☉. f. Chili.glandulosa Don (= *Leuchaeria Cumingii* Hook. Arn.), drüsige, ☉. f. Chili.runcinata Hook. (= *rosea* DC. = *Perdicium roseum* Poeppig = *Lasiorrhiza rosea* Poepp. = *Leuchaeria runcinata* Gill. et Don.), schrotsägenförmige, ☉. ♂. f. k. Chili.tomentosa DC. (= *Lasiorrhiza tomentosa* Less. = *Homocanthus tomentosus* Less. = *Leuchaeria Bridgesii* Hook. Arn.), filzige, ☉. f. Chili.*Chaenomeles japonica* Lindl., v. *Cydonia japonica*, p. 242.**Chaenostoma** Benth., Mundblümchen, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.aethiopicum Benth. (= *Buchnera aethiopica* L. = *Manulea aethiopica* Thbg., p. 495).foetidum Benth. (= *Buchnera foetida* Andr. = *Sutera foetida* Roth = *Manulea foetida* P., p. 495).linifolium Benth. (= *Manulea linifolia* Thbg., p. 496).pedunculatum Benth. (= *Manulea pedunculata* Andr., p. 496).polyanthum Benth. (= *orchioides* Hortul.), vielblumiges, ♂. 4. 5. k. Cap der gut. Hoffn.β) *adscendens* Kunze, γ) *macranthum*.

Chaerophyllum T., Kälberkropf.hirsutum L., β magellense Tenore.

hybridum Tenore, Bastard-K., 4. f. Neapel.

Hladnikianum Rehb., Hladnik's, 4. f. Krain.

millefolium DC. (= *brachycarpum* MB. = *myrrhidifolium* Hort.), garbenblättriger, 4. f. Caucasus.Prescottii DC. (= *bulbosum* Ledeb., non L.), Prescott's, ♂. Sibirien.*canadense* P., v. *Cryptotaenia canadensis*, *Claytoni*P., v. *Osmorrhiza longistylis*, *daucifolium* Dsf., v.*Anthriscus sylvestris* β p. 38, II., *odoratum* Lam.,v. *Myrrhis odorata*, p. 538.**Chaetocapnia** Sweet, Schweiflilie, VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae.*geminiflora* Sweet, paarblumige, 4. k. Mexico.**Chaetogastra** DC., Schweifschlund.*canescens* DC. (= *Rhexia canescens* Bonpl.), graulicher, ♂. w. Südamerika.*cardinalis* DC. (= *Melastoma cardinalis* Speg. = *Rhexia cardinalis* Bonpl.), scharlachfarbiger, ♂. w. Brasilien.*ciliaris* DC. (= *Meriana ciliaris* Vent. = *Osbeckia ciliaris* Seringe), gewimperter, 4. w. Bogota.*hirsuta* DC., rauhhaariger, 4. w. Brasilien.*hypericoides* DC. (= *Melastoma villosa* Aubl. = *Rhexia hypericoides* W., p. 683).*Chaiturus Marrubiastrum* Ehrh. (= *leonuroides* Mch.), v. *Leonurus Marrubiastrum*, p. 452.*Chamaecrista nictitans* Mch. etc., v. *Cassia nictitans*, p. 170 etc.*Chamaedaphne calyculata* Mch., v. *Cassandra calyculata*, p. 168.**Chamaedorea** W., Bergpalme.*elatior* Mart., hohe, ♂. w. Mexico.*elegans* Mart. (= *Kunthia Deppei* Hortul.), zierliche, ♂. w. Mexico.*gracilis* W. (= *Borassus pinnatifrons* Jacq. H. Schönbr. = *lancoolata* Kunth = *Martinezia lanceolata* R. et P.).*Lindeniana* Hort. belg., Linden's, ♂. w. Südamerika.*mexicana* Hort. belg., mexicanische, ♂. w. Mexico.*oblongata* Mart., verlängerte, ♂. w. Mexico.*Schiedeana* Mart. (= *Kunthia xalapensis* Otto et Dietr.).*simplicifrons* Hort. belg., einfachwedelige, ♂. w. Südamerika.Ob nachstehende kultivirt werden ist mir unbekannt, als: *C. concolor* Mart. ♂ Mexico, *linearis* Mart. (= *Martinezia linearis* R. et P.) ♂ Peru, *pauciflora* Mart. ♂. Brasilien.*Chamaefistula corymbosa* G. Don etc., v. *Cassia corymbosa* etc., p. 169 etc.**Chamaelaucium** Dsf., Chamaelaucie, X. 1., Myrtaeae-Chamaelaucieae.*albiflorum* Hort. belg., weißblumige, ♂. k. t. Neuholl.*C. ciliatum* Dsf. und *virgatum* Endl., beide ♂. und in Neuholland heimisch, werden wohl kaum kultivirt.*Chamaeledon procumbens* Lk., v. *Loiseleuria procumbens*, p. 474.

Chamaemeles Lindl., Zwergmispel, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

coriacea Lindl. (= *Crataegus coriacea* Soland.), lederartige, ♀. k. Madeira.

Chamaemelum arvense G., *austriacum* Presl etc., v. *Anthemis arvensis* etc., p. 62, *C. Cotula* Presl (= *foetidum* Baumg.), v. Maruta *Cotula*, p. 498, *proliferum* Mch., v. *Cladanthus arabicus*, p. 202.

Chamaemyrrhis eriopoda Endl., v. *Caldasias eriopoda*, p. 106, II.

Chamaepithys vulgaris Lk. (*trifida* Dumort.), v. *Ajuga Chamaepitys*, p. 26.

Chamaeplium officinale Wallr., v. *Sisymbrium officinale*, p. 762, II.

Chamaerhodos Bunge, Zwergröschen, V. v., Rosaceae-Pomaceae.

altaica Bunge (= *Sibbaldia altaica* L.), altaisches, 4. f. Altai.

erecta Bunge (= *Sibbaldia erecta* L., p. 751).

grandiflora Bunge (= *Sibbaldia grandiflora* Pall.), großblumiges, 4. f. Altai.

Chamaerops L. Mart. Endl., Zwergpalme.

Birro Siebold, *Birro*, Zw. ♀. t. w. Japan.

excelsa Thbg. (excl. Synon.), hohe, ♀. t. w. Mittel- und Südchina.

Hystrix Fras. (= *arundinacea* Sm. = *Corypha repens* Bartram = *Rhapis arundinacea* Ait., p. 683).

Martiana Wall. (= ? *excelsa* Wall. = *Loudonia excelsa* H. Engl.), Martius's, ♀. w. Nepal.

stauracantha Hort. belg., starkstachelige, ♀. w. ?

acaulis Mchx. (= *glabra* Mill.), v. *Sabal Adansonii*, p. 709, *cochinchinensis* Mart., v. *Rhapis cochinchinensis*, *Palmetto* Mchx., v. *Sabal Palmetto*.

Chamaescidium C. A. Mey., Zwergdolde, V. II., Umbelliferae.

acaule C. A. Mey. (= *Bunium acaule* Hoffm. = *Ammi acaule* Spgl., p. 48), stengellose, ♂. 4. f. Caucasus.

Chamissoa albida Mart., *nodiflora* Mart., v. *Celosia argentea et nodiflora*, *arabica* Spgl., v. *Cladostachys alternifolia*, p. 202.

Chamomilla Hall. C. Koch, Chamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

inodora C. Koch (= *Matricaria inodora* L. fl. suec. et DC. prodr. = *Pyrethrum inodorum* Sm., p. 669, = *Chrysanthemum inodorum* L. spec.), β) *salinum* Wallr.

meridionalis C. Koch (= *Matricaria pusilla* W., p. 499), mittägliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Georgien, Armenien.

officinalis C. Koch (= *Matricaria Chamomilla* L., p. 499).

praecox C. Koch (= *Matricaria praecox* DC. = *Pyrethrum praecox* MB., p. 670).

Chaptalia Vent., Chaptalie.

lyrata Don, (non Vent. Spgl.) (= *Hieracium stipitatum* Moç. Sess.), leyerförmige, 4. k. Mexico.

integrifolia Vent. = *tomentosa*, p. 187.

Charieis Cass. DC., Charieis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

heterophylla Cass., verschiedenblättrige, ☉. ♂. m. f.

Cap der guten Hoffnung.

β) *coerulea* Cass., γ) *Neesii* Cassin. (= *Kaulfussia amelloides* N. E., p. 436).

Charlwoodia australis G. Don, *congesta* Swt., *indivisa* G. Don, *stricta* Swt., v. *Cordyline australis*, p. 218 etc.

Chartolepis glastifolia Cass., v. *Centaurea glastifolia*, p. 177.

Chartoloma platycarpum Bunge, v. *Isatis platycarpa*.

Chascanum E. Mey., Chascanum, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

cuneifolium E. Mey. (= *Buchnera cuaeifolia* Thbg., p. 136).

pinnatifidum E. Mey. (= *Buchnera pinnatifida* Thbg.), fiederspaltiges, 4. h. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Chascolytrum Desv., Oehrchengras, III. II., Gramineae.

barbatum Kunth, N. E. (= *Calotheca barbata* N. E. = *Briza barbata* Trin.), härtiges, ♂. m. f. Brasilien.

nutans Lindl., N. E., nickendes, 4. w. Valparaiso.

trilobum N. E. (= *Briza triloba* N. E. = *Calotheca triloba* Lk. H. Berol.), dreilappiges, 4. w. Montevideo.

β) *panicula angustiori* (= *Calotheca dilatata* Lk. = *Briza auriculata* Trevir., p. 131).

Chasmanthium gracile v. *Uniola gracilis*, p. 830.

Chasmone Andrewsiana E. Mey. et *calycina* E. Mey., v. *Trichasma ciliatum* et *calycinum*, *argentea* E. Mey., v. *Argyrolobium* Linnaeanum, p. 44, II.

Chayota edulis Jacq., v. *Sechium edule*, p. 738.

Cheilanthes Sw., Schuppenfarn.

I. *Pteroides* Kze. et *Eucheilanthes* Endl.

canescens Kunze, graulicher, 4. w. ? Südamerika.

cuneata Kaulf., Lk.

fimbriata Visian. (= *Szowittsii* Fisch. et Mey.), gefranzter, 4. k. Dalmatien, südöstl. Asien, Carabagh.

hirta Sw. (= *Adiantum caffrorum* Sw.).

Kaulfussii Kunze (= *viscosa* Kaulf.), Kaulfuss's, 4. w. Südamerika.

Linkiana Kunze (= *microphylla* Lk., non Sw.), Link's, 4. w. Südamerika.

leucopoda Lk., weißstieliger, 4. w. Mexico.

microphylla Sw. (= *micromera* Lk.).

multifida Sw., vieltheiliger, 4. w. t. Cap d. g. H.

pruinosa Kaulf. (= *Mathewsii* Kunze), bereifter, 4. w. ? Südamerika.

Sieberi Kunze (= *tenuifolia* Sieb., non Sw.), Sieber's, 4. w. Neuholland etc.

squamosa Gill., Hook. et Grev., ächter, 4. w. Chili.

viscosa Lk., schmieriger, 4. w. Mexico.

II. *Hypolepis* Bernh., Presl.

chlorophylla Sw. (= *brasiliensis* Raddi = *spectabilis* Kaulf. = *Hypolepis spectabilis* Lk., *H. conifolia* Presl), grünblättriger, 4. w. Brasilien.

dicksonioides Endl. (= *hastata* Hort. = *Dicksonia davallioides* Lk. et Hort. Angl. = *Hypolepis dicks.* Presl), dicksoniaähnlicher, 4. w. t. Norfolk-Insel.

repens Kaulf. (= *aculeata* Kaulf. = *Hypolepis repens* Presl = *Dicksonia aculeata* Spgl. = *Lonchitis repens* L. W. spec.).

Hinsichtl. der übrigen s. *Allosorus*, p. 22, II.

Cheiranthera A. Cunn., Fingerbeutel, V. I., Pittosporae.

linearis A. Cunningh. (= *cyanea* Brogn.), gleichbreiter, h. t. k. Westl. Neuholland.

Cheiranthodendrum pentadactylon Lareat., v. *Cheirostemon platanooides*, p. 188.

Chéiranthus L., Lack.

- arboreus Sweet, baunartiger, f. f. k. Aegypten.
- asper Chamiss. Schltdl. (= *capitatus* Dougl.), rauher, 4. k. Columbia, Californien.
- axillaris Brouss. (= *scoparius* DC. prodrom., non Brouss.), achselblumiger, f. 4. t. k. Canarische Inseln.
- flexuosus Sib. Sm., hin- u. hergebogener, $\odot. f.$ Cypern.
- scoparius Brouss. et W. E. (= *scaber* B. Webb. = *Dichroanthus scoparius* B. Webb.)
- *Cheirinia Andrzejowskiana* Lk. etc., v. *Erysimum* Sect. I. p. 313 etc.

Chelonanthera Blum. Lindl., Schildbeutel, XX. I., Orchideae.

- sulphurea Blume, schwefelgelber, 4. w. Java.
- ventricosa Blume, bauchiger, 4. w. Java.
- *speciosa* Blume, v. *Coelogyne speciosa*.

Chenopodium T., Gänsefuß.

- album L., $\epsilon)$ armeniacum H. Berol.
- benghalense Spielm. (= *C. Atriplicis* L. var.? = *Atriplex benghalensis* Lam.), bengalischer, $\odot. f.$ Bengalen.
- bonariense Tenore, bonarischer, $\odot. f.$ Bonaria.
- chilense Schrad. (= *anthelminticum* Bertero, non L. = *Ambrina chilensis* Spach), chilesischer, $\odot. 4. f. k.$ Chili.
- ficifolium Sm. (= *album* et *populifolium* Hort. = *Frankianum* DC. et Hort.).
- foetidum Schrad. (= *C. Botrys* β Hort. Wratislav. = *graveolens* Lagasca = *trilobatum* et *trilobum* Hort.).
- lanceolatum Mühlbg. (= *concatenatum* Hort.).
- nepalense Hort., nepalscher, $\odot. f.$ Nepal.
- Pseudo-Botrys Hort., unächter Trauben-G., $\odot. f. ?$
- rubricaulis Schrad. (= *Quinoa* var.), rothstengelicher, $\odot. f.$ Chili.
- virens Wender., grünlicher, $\odot. f. ?$
- *Chiazospermum erectum* Bernh., v. *Hypecoum erectum*, p. 409.
- *Chiliadenus camphoratus* Cassins., v. *Jasonia glutinosa*, p. 430.

Chirita Hamilt. Don, Chirita, XIV. II., Personatae-Cyrtandreae.

- grandiflora Wall. (= *urticaefolia* Don = ? *Calosacme grandiflora* Wall. = *Bonnaya grandiflora* Speg. = *Gratiola grandiflora* Retz. = *Henckelia urticaefolia* A. Dietr.), großblumige, $\odot. w.$ Ostindien.
- sinensis Lindl., chinesische, f. w. China.
- zeylanica Hook., zeylonische, f. w. Ceylon.

Chironia L., Chironie.

- baccifera L. (= *Roeslinia baccifera* G. Don = *R. tetragona* Mch.).
- $\beta)$ grandiflora Griseb., $\gamma)$ dilatata E. Mey.
- floribunda Paxt., blüthenreiche, f. t. Cap d. g. Hoffn.
- Fischeri Hort., Fischer's, f. t. Cap d. g. Hoffn.
- maritima Eckl. (= *melampyriifolia* E. Mey.), Meerstrands-Ch., f. t. Cap d. g. Hoffn.
- $\beta)$ frutescens Grisebach.
- peduncularis Lindl. (= *latifolia* E. Mey. = *Barclayana* et *trinervia* Hortul.).
- serpyllifolia Lehm. (= *ovata* Speg.), quendelblättrige, f. t. Cap d. g. Hoffn.
- $\beta)$ laxa Griseb., $\gamma)$ microphylla Griseb.
- speciosa E. Mey., prächtige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

Chironia

Unbestimmtere: *conferta* Hort., *tabularis* Page, *tenuiflora* Lk.

floribunda Hort. v. *Logania floribunda*, p. 474.

frutescens L. (= *decussata* Vent. et var. *angustifolia* Curt.), v. *Orphium frutescens* etc.

Chitonia Moç. Sess. (non D. Don), Chitonie, VIII. 1., Zygophylleae.

mexicana DC., mexicanische, ♀. w. t. Mexico.

Chlamydophora Ehrbg., Hüllchenträger, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

tridentata Ehrbg. (= *Balsamita tridentata* Delil.), dreizähniger, ☉. f. Aegypten.

Chlamysporum juncifolium Salisb., v. *Thysanothus junceus*, p. 810.

Chloanthes RBr., Grünling.

Bartlingii Lehm., *Bartling's*, ♀. t. Neuholland.

Chlora L., Chlore.

exaltata Griseb. (= *Erythraea Plumieri* H. B. K. = *Eustoma silenifolium* G. Don, Salisb. p. 326 = *Lisianthus glaucifolius* Jacq., p. 469), hohe, ☉. f. Nord- und Südamerika.

grandiflora Steud. et Hochst. (= *perfoliata* ♂ *grandiflora* Griseb.), großblumige, ☉. f. Italien.

imperfoliata L. fil. (= *crenulata* Salzm. = *dubia* Lam. = *sessilifolia* Desv.).

β) *lanceolata* K.

perfoliata L. (= *Blackstonia perfoliata* Huds. = *Gentiana perfoliata* L.), β) *acuminata* K. (= *intermedia* Tenore), γ) *serotina* K.

Chloraea Lindl., Grünstendel.

virescens Lindl. (= ? *chrysantha* Poepp. Endl. = *Limodorum Piquichia* Lam.), hellfarbiger, 4. w. Chili.

Außerdem kommen in Chili noch folgende vor: *affinis* Lindl., *alaris* Lindl., *alpina* Poepp. Endl., *campestris* Poepp. Endl., *cristata* Lindl., *cylindrostachya* Poepp. Endl., *decipiens* Poepp. Endl., *discoides* Lindl., *fimbriata* Poepp. Endl., *galeata* Lindl., *Gavila* Lindl., *grandiflora* Poepp. Endl., *incisa* Poepp. Endl., *multiflora* Lindl., *nudilabia* Poepp. Endl., *speciosa* Poepp. Endl., *viridiflora* Poepp. Endl., *volucris* Lindl. Sämmtlich 4. Ob davon einige kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Chloranthus Sw., Grünblume.

erectus Wall. (= *elatior* Lk., non RBr. et G. Don = *Cryphaea erecta* Hamilt.), aufrechte, ♀. w. Ostindien.

officinalis Blum. (= *inconspicuus* plur. Auct.), gebräuchliche, ♀. w. Java, China¹⁾.

C. japonicus Sieb. scheint in den europäischen Gärten noch nicht eingeführt.

Chloraster Haw., v. *Narcissus* Sect. III, p. 540.**Chloris** Sw., Chloris.

abyssinica Hochst., abyssinische, ☉. f. m. Abyssinien.

compressa DC. (= *ciliata* P. B., non Sw.) = *penicillata* Hort. = *polydactyla* Durand. Jacq. fil.), flachhalmige, ☉. f. m. Südamerika.

1) Van Houtte empfiehlt sie in seinem neuesten Pflanzenverzeichnisse als „Plante d'un haut intérêt. Les Chinois s'en servent pour aromatiser le thé. Elle exhale une odeur suave d'une nature très fine.“

Chloris

distichophylla Lagasc. (= *fasciculata* Schrad.), zweizeiligblättrige, ☉. 4. w. Brasilien.

Gayana Kunth, Gay's, 4. w. Senegambien.

humilis Kunth (= *pyncotrix* Trin.), niedrige, ☉. m. f. Brasilien.

meccana Hochst. et Steud. (= *mexicana* Hort.), meccaische, ☉. m. f. Arabien.

penicillata P. (= *Cynosurus penicillatus* Vahl = *Eleusine penicillata* Spgl.), pinselförmige, 4. w. Ostindien.

Unbestimmt: peregrina Durand.

procumbens Durand, v. *Chondrosium tenue*.

Chlorophytum Ker, Grünstilbe.

? graminifolium Kunth (= *Anthericum graminifolium* W., p. 63 = *Anthericum undulatum* Jacq.).

? triflorum Kunth (= *Anthericum triflorum* Ait., p. 64) et β) bipedunculatum.

micranthum Hort. = ?, *Sternbergianum* Steud., v. *Hartwegia comosa*.

Chondrilla T. L., Knorpelsalat.

piptocoma C. A. Mey., fallschopfiger, ♂. Asiat. Rußland.

muralis Lam., v. *Lactuca muralis*, p. 442, *viminea*

Lam. et *ramosissima* Zeyh., v. *Phoenixopus vimineus* et β) *ramosissimus*, p. 884.

Chondrosea Aizoon Haw. etc., v. *Saxifraga Aizoon* etc., p. 725.

Chondrosium Desv., P. B., Knorpelgras, III. II., Gramineae.

gracile H. B. K. (= *Actinochloa gracilis* W. = *Atheropogon gracilis* Spgl. = *Eutriana gracilis* Trin.), schlankes, 4. w. Mexico.

hirtum H. B. (= *Actinochloa hirsuta* R. et S. = *Bouteloua hirsuta* Lagasca = *Atheropogon hirtus* Spgl. = *Eutriana hirta* Trin.), rauhhaariges, ☉. f. Mexico.

prostratum Kunth (= *Actinochloa prostrata* R. et S. = *Bouteloua prostrata* Lagasca), gestrecktes, ☉. f. Mexico.

tenue P. B. (= *procumbens* Desv. = *Actinochloa tenuis* W. = *Atheropogon procumbens* Jacq. = *Chloris filiformis* Poir. = *C. procumbens* Durand = *C. tenuis* Poir. = *Eutriana tenuis* Trin.), dünnes, 4. w. Neuspanien, Mexico.

Chonemorpha dichotoma G. Don, *reticulata* G. Don, v. *Echites Heynii* et *reticulata*, p. 281.

Choretrum RBr., Choretrum, V. I., Santalaceae.

lateriflorum RBr., seitenblumiges, ♀. t. k. Neuholland.

Ob *C. glomeratum* RBr., *Preissianum* Miquel et *spinosum* Miquel, sämmtlich ♀. und in Neuholland heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Chorilaena Endl., Chorilaena, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

myoporoides Endl. (= *Boronia à fleurbleue* Hort. belg.), porenblattähnliche, ♀. t. Neuholland.

quercifolia Endl. Hügel, eichenblättrige, ♀. ♀. t. Neuh.

Chorisema LaBill., Fisch. emend. (= *Chorizema*, *Chorozema* Auct.). ¹⁾

angustifolium Benth. (= *Dillwynia glycinæfolia* Sm., p. 275), schmalblättrige, ♀. t. Neuholland.

1) „*χωρίς* et *σημα* (vexillum separatum). Man schreibt ja auch *Brachysema*, *Platysema*“. Staatsrath v. Fischer.

Chorisema

Baueri Benth, Bauer's, f. t. Neuholland.

Brownii Hort. belg., Brown's, f. t. Neuholland.

Dicksonii Henslow (= *Hügelii*, *coccineum* Hort.).

ericoides Hort. belg. (= *ericaefolium* Hort.), heideähnliche, f. t. Neuholland.

macrophyllum Hort. belg. (= *elegans* Hügel), großblättrige, f. t. Neuholland.

mucronatum Hort. belg., stachelspitzige, f. t. Neuholl.

parviflorum Benth., kleinblumige, f. t. Neuholland.

ruscifolium Hort. belg., mäusedornblättrige, f. t. Neuh.

spectabile Lindl., ansehnliche, f. t. Neuholland.

varium Benth. (= *elegans* Hort.), veränderliche, f. t. Neuholland (Schwanenflufs).

β) rotundifolium Hort., γ) grandinosum Hort.,

δ) multiflorum.

dillwyniaefolium Hort. = ? *Manglesii* Hort. = *cordatum*, *coriaceum* Sm., *scandens* Sm. (= *Baxteri* Grah.) et *trilobum* Sm., v. *Podolobium coriaceum*, *scandens* et *trilobatum*, p. 638 seq., *lanceifolium* Hort. (= *longifolium* Hort.), v. *Callistaelys linearifolia*, p. 107, II., *oppositifolium* Hort. belg., v. *Gastrolobium spinosum*.

Chorisia Kunth, Chorisie, XVI. VIII., Bombaceae.

speciosa Cambess. Juss. et St. Hil., prächtige, f. w. Brasil.

Chorisma tetragona Lindl., v. *Pelargonium tetragonum*, Sect. II. p. 594.

Chorispermum tenellum RBr., v. *Chorispora tenella*, p. 192.

Choristeu carnosa Thbg. et *spinosa* Thbg., v. *Didelta carnosum* et *spinosa*, p. 262.

Chrysantellina fasciculata Cass., v. *Chrysanthellum procumbens*, p. 192.

Chroilema Bernh., Chroilema, XIX. II., Compositae-Corymbiferae,

subcanescens Bernh. grauliche, f. k. Chili.

Chrysanthellum R., Zwergwucherblume.

abyssinicum Schultz, abyssinische, \odot . f. Abyssinien.

Chrysanthemum T. L., Wucherblume.

I. Genuini = *Chrysanthemum* DC.

foeniculaceum DC. (= *Pyrethrum foeniculaceum* Choisy).

α) pinnatifidum DC. (= *Pyrethrum foeniculaceum* W. Enum.), β) crithmifolium Steud. (= *Pyrethrum crithmifolium* W. Enum.), γ) bipinnatifidum DC. (= *Pyrethrum anethifolium* W. Enum. = *P. foeniculaceum* Bot. reg. ¹).

grandiflorum W., α) adauctum DC. (= *tanacetifolium* H. Par. = *Pyrethrum adauctum* Lk. = *P. Broussonetii* β Choisy), β) intermedium Hort. monspel. (= *foliosum* Brouss. = *Pyrethrum grandiflorum* W.), γ)

subnudum DC. (= *Pyrethr. speciosum* W. E.), δ)

cuneiforme DC. (= *Pyrethr. coronopifolium* W. = *P. grandiflorum* Dsf. H. Par.).

leptophyllum DC., schlankblättrige, f. k. Cap d. g. H.

nodosum DC. (= *Arctotis nodosa* Thbg. = *Ismelia nodosa* Less. = *Pinardia nodosa* Less.), knotige, f. k. Cap der guten Hoffnung.

1) Diese Varietäten sind daher p. 193 bei *Ch. frutescens* zu streichen, da sie zu *Ch. foeniculaceum* gehören.

Chrysanthemum

viscosum Dsf. (= *anisocephalum* Hort. = *Pinardia anisocephala* Cass. = *Centrospermum Chrysanthemum* Spgl. = *Heteranthemis viscoso-hirta* Schott = *H. hirta* H. Berol. = *Centrachena viscida* Schott).

Zawadskii Herbich, Zawadski's, 4. ♀. f. Galicien.

Unbestimmtere: *asteroides* Dsf. H. Par. ♀., Barrelieri Tausch ♂., *caespitosum* Weinm., *daucifolium* P., *lacerum* Hortor. ♀. Canar. Inseln, *moschatum* W. 4.

aureum Hort., v. ? *Anthemis aurea*, p. 62, *disciforme* C. A. Mey., v. *Matricaria disciformis*, *hirtum* Thbg., v. *Matricaria hirta*, *indicum* Thbg. et Hort., v. *Pyrethrum sinense*, *umbrosum* Hort., non W. = *C. Roxburghii*.

II. Leucanthemum T. DC.

Bauhini Tausch (= *atratum* β L.), Bauhins, 4. f. Oberitalien.

Leucanthemum L. (= *Leucanthemum vulgare* Lam.), β) *sylvestre* W.

pectinatum L., kammförmige, ♂. f. Spanien.

Chryseis glauca Cass. (= *odorata* Cass.), *moschata* Cass. et *odorata* Cass., v. *Amberboa odora* et *moschata*, p. 175 u. p. 32, II.

Chryson biflorum Spach, v. *Viola biflora*, p. 849.

Chrysiphiala Lamb. Ker, Goldnarcisse.

latifolia Lindl. (= *Panocratium latifolium* R. et P. = *Leperiza latifolia* Herb.), breitblättrige, 4. Zw. w. t. Peru.

recurvata Lindl. (= *Panocratium recurvatum* R. et P. = *Carpodetes recurvatus* Herb.), zurückgekrümmte, 4. Zw. w. t. Peru.

Chrysocephalum Walp., Goldköpfchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

flavissimum Steetz (= *Helichrysum flavissimum* DC. = *Gnaphalium flavissimum* Sieber), hellgelbes, 4. t. k. Neuholland.

Chrysocoma juncea Dsf. = ?, *Linosyris* L. et var. *palustris* Savi etc., v. *Linosyris vulgaris* etc.

Chrysocoryne Endl., Goldkeulchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

pusilla Endl. (= *Crossolepis pusilla* Benth.), niedriges, ♂. f. Südwestl. Neuholland.

ChrysoGLOSSUM Blume, Lindl., Goldzüngel, XX. I., Orchideae.

ornatum Blume, zierliches, 4. w. Java.

villosum Blume, zottiges, 4. w. Java.

Chrysoliga salicifolia Hffg. W., v. *Heimia salicifolia*, p. 380.

Chrysophyllum L., Goldblatt.

fuscum Fisch. Page, braunes, ♀. w. Ostindien.

grandifolium Steud. (= *macrophyllum* Dsf. nec alior.), großblättriges, ♀. w. Philippinen.

macrophyllum Lam. (nec alior.), v. *Lucuma Rivicoa*, *Manglillo* Lam. et *melanophleos* Lam., v. *Myrsine Manglillo* etc., *Millerianum* Lam. etc., v. *Sideroxylum* mite, *C. splendens* Spgl. ♀. Brasil., Peru ist nach Martius nicht = mit *Nycterisition ferrugineum*.

Chrysopsis Nutt., Goldalant.

gossypina Ell. (= *Conyza asteroides* Walt. = *Diplopappus lanatus* Cass. = *Inula glandulosa* Lam. = *I. gossypina* Mchx. p. 416 = *I. lanata* Banks.).

Chrysopsis

Mariana Ell. (= *Diplogon Marianus* Rafin. = *Inula glandulosa* Lam. = *I. Mariana* L., p. 418).

villosa Nutt., p. 195, (= *Amellus villosus* Pursh = *Diplopappus villosus* Hook. Arn. = *Inula villosa* Spgl. = *Sideranthus integrifolius* Fras. = *S. villosus* Sweet).

Chrysopteris Lk. sect. Polypod., *C. aurea* Lk., *Billardieri* Lk., *lepidopoda* Lk., *longipes* Lk., *phymatodes* Lk., *peltidea* Lk., *pulvinata* Lk., *sporodocarpa* Lk., *terminalis* Lk., v. *Polypodium aureum* L. etc., p. 645.

Chrysoscias E. Mey., Goldwicke, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

calycina E. Mey. (= *Cylista angustifolia* Eckl. Zeyh. = *Glycine angustifolia* Jacq. = *Rhynchosia angustifolia* DC., p. 688 = *Ononis villosa* Sieb.), großkelchige, ♂. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Chryso splenium T., Goldmilz, Milzkraut.

ovalifolium M. B. Ledeb., eiblätteriges, 4. f. Altai.

Chrysostoma aurea Lilja (= *Creolobus* Lilja), v. *Bartonia aurea* Lindl., p. 114.

Chusquea Humb., Bonpl., K. (einheimischer Name), III. II., Gramineae.

scandens Kunth (= *Bambusa Chusque* Poir. = *Mustelia arundinacea* Cav. = *Nastus Chusque* H. B.), klimmende, ♂. Sch. w. Südamerika.

Chymocarpus brachyceras etc., p. 195, gehören mit Ausschluss *C. pentaphyllus* zu *Tropaeolum*.

Chymocormus Zeyh. Hook., Speisestock, V. II., Asclepiadeae.

edulis Zeyh. Hook. (= *Pergularia edulis* Thbg. = *Cynanchum edule* Andr.), genießbarer, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

Chysis Lindl., Chysis.

bractescens van Houtte, deckblättrige, 4. w. Südan.

Makoyi* („species du Mexique à fleur blanche“ Makoy Catal.), Makoy's, 4. w. Mexico.

Cibotium Kaulf., Knorpelfarn.

glaucescens Kunze (= *Balantium glaucescens* Dicks. = *Dicksonia Baranetz* Lk. = *Aspidium*, *Nephrodium* et *Polypodium Baranetz* Auct. et H. anglor.), blaugrünlischer, 4. w. Cochinchina, China, Bugaria.

Schiedei Chamiss. et Schltldl., Schiede's, 4. w. Mexico.

Billardieri Kaulf., v. *Balantium antarcticum* Presl, p. 58, II.

Cicendia Adans., Cicendie, IV. I., Contortae-Gentianeae.

Candollei Griseb. (= *Exacum Candollei* Bast. = *E. glaucum* Bast. = *E. pusillum* β DC.), Candolles, ☉. f. Westeuropa.

pusilla Griseb. (= *Chironia minima* Thuill. = *C. pusilla* Lam. = *Exacum pusillum* DC. = *Microcale pusilla**, p. 523).

filiformis Rchb., v. *Microcale filiformis*, p. 523. ↓

Cicer T., Kichern.

arietinum L., α) vulgare Walpers, (= *physodes* Rchb.), β) ryditospermum Walp., γ) macrocarpum Walp. (= *sativum* Schk.).

floribundum Fenzl, blüthenreiche, ☉. f. Taurien.

Cicerbita acuminata Wallr., *alpina* Wallr. etc., v.

Mulgedium acuminatum, *alpinum* etc., p. 533.

Ciconium acetosum Hffg. etc., v. *Pelargonium* (Sect. III.) *acetosum* etc., p. 594.

Cicuta L., Wasserschieferling.

occidentalis Dougl., westlicher, 4. f. Nordwestl. Amerika.

Ciliaria aspera Haw. et *bryoides* Haw., v. *Saxifraga aspera* etc., p. 724.

Cinchona L., Fiebrerrindenbaum.

alba Makoy, weißer, 5. w. Südamerika.

pubescens Vahl, weichhaariger, 5. w. Peru.

caribaea Jacq., v. *Exostemma caribaeum*, p. 328.

Cineraria L., Aschenpflanze.

alba Loddig., weißer, 5. k. t. Cap d. g. Hoffn.

distans Kunze, absteigende. 5. 4. k. t. Cap d. g. H.

pumila Thbg. (= ? *humifusa* L'Her.), niedrige, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

polycephala DC., vielköpfige, 4. k. t. Cap d. g. H.

pulchella Sweet (non Meyer), hübsche, k. t. Canarische Inseln.

Von *C. aurita* L'Her. (= *Senecio maderensis* DC.),

cruenta Mass. (= *Senecio cruentus* DC.) et β *hybrida*

W. (= ? *lactea* Jacq. fil.), *lobata* L'Her., *populifolia*

L'Her. (= *Senecio populifolius* DC.), hat man in

neuerer Zeit mehrere sehr schöne Hybriden gezogen,

von denen hier einige erwähnt werden, als: *Adelaide*,

alba odorata, *azurea*, *bicolor* (= *pulcherrima*), *blak*

eyed maid (Gaine's), *blue eyed maid*, *carminea*, *Cissa*,

Cunninghamii, *Delachii*, *Dutchess of Gloucester*, *Eclipse*

(Henderson's et Jvery's), *elegantissima*, *enchantress*,

formosa, *fulgida*, *Gen*, *Grandesse*, *grandis*, *grandis-*

sima, *Granii*, *Hendersonii*, *inperial blue*, *King* (Greéns),

King major, *Lady of de lake*, *Laveistoniensis*, *Lilac*

triumphant, *Louisa*, *Madonna*, *magniflora* (Miller's),

Maréchal Bugeaud (De Lachés), *mont blanc*, *nec plus*

ultra, *Ovid*, *Prince Albert*, *Prince of Wales* (Gaine's),

Princess royal (Piper's), *Queen of May* (May's), *Queen*

Victoria (Ivery's), *rival King*, *royal blue*, *Shawieana*,

spectabilis, *splendens* (Woodhall's), *splendidissima*,

superbissima, *Taglionii*, *Triumph* (Ivery's), *true blue*,

unique, *Urania*, *Victoria reginae* (Ivery's), *violacea*,

Waterhousiana, *Weberiana*, etc. etc.

Cinnamomum Burm., Zimmbaum.

albiflorum N. E. (= *C. Cassia* D. Don, p. 197 =

Laurus albiflora Wall. = *L. Soncaurium* Hamilt. =

L. Cassia Roxb. = *L. triplinervia* Reinw.), weiß-

blumiger, 5. w. Ostindien.

aromaticum N. E. (= *officinarum* N. E. = *C. Cassia*

Fr. N. E. = *Laurus Cassia* N. E. fratr. = *L. Cin-*

namomum Andr. = *L. Malabathrum* Reinw. = *Per-*

sea Cassia Sngl.), gebräuchlicher, 5. w. China.

camphoratum Blume (= *calophyllum* Reinw. = *Laurus*

Pseudocassia Reinw.), kampferähnlicher, 5. w. Java.

eucalyptoides Fr. N. E. (= *nitidum* Blume, Hook. =

Laurus Cassia Hortor. = *L. malabathrica* Roxb. =

L. nitida Hamilt. = *Persea nitida* Sngl.), schön-

mützenähnlicher, 5. w. Java.

obtusifolium N. E. (= *C. Bejolgota* Sweet).

Reinwardti N. E. (= *C. Culilawan javanicum* N. E. =

C. nitidum oblongifolium Blume = *L. Culilawang*

Reinw., non L.), Reinwardt's, 5. w. Java, Sumatra.

Cinnamomum

pedunculatum N. E. (= *japonicum* Siebold = *Laurus pedunculata* Thbg.), gestielter, ♂. t. Japan.

Tamala Fr. N. E. (= *Laurus Tamala* Hamilt. = *Persea Tamala* Spgl.), Tamala-Z. ♂. w. Ostindien.

zeylanicum Blume, N. E. (= *verum* Sweet = *Laurus Cassia* Bot. mag. excl. Synon. = *L. Cinnamomum* N. E. fr. = *Persea Cinnamomum* Spgl.), zeylanischer, ♂. w. Zeylon, Java.

Camphora Sweet, Fr. N. E. et *gracile* Sweet, v. *Camphora officinarum* et β *gracilis*, p. 114, II., *glaucum* G. Don, v. *Litsaea glauca*.

Cipura humilis Humb. Bonpl. var. *lutea*.

Cirrhaea Lindl., *Cirrhaea*.

adpersa Hoffg., angesprenkelte, 4. w. Brasilien.

atropurpurea Hoffg., schwarzpurpurfarbige, 4. w. Brasil.

livida Hoffg., braunblaue, 4. w. Brasilien.

olivacea Hoffg., olivenfarbige, 4. w. Brasilien.

pallida Hort., bleiche, 4. w. Südamerika.

picta Lindl., bemalte, 4. w. Südamerika.

purpurascens Hoffg., purpurfarbige, 4. w. Südamerika.

rubro-purpurea Lindl., rothpurpurfarbige, 4. w. Südamer.

Russeliana, Lindl., Russel's, 4. w. Südamerika.

squalens Lindl., gelbbunte, 4. w. Südamerika.

violaceo-virens Hoffg., violettgrüne, 4. w. Brasilien.

violascens Hoffg. (= *viridipurpurea* Hoffg., non Lodd.), violette, 4. w. Brasilien.

Cirrhopetalum Lindl., Braunstendel.

antenniferum Lindl., fühlhorntragender, 4. w. Ostindien.

auratum Lindl., goldfarbiger, 4. w. Manilla.

Blumii Lindl. (= *Ephippium ciliatum* Blume), Blume's, 4. w. Java.

Candelabrum Hort. belg., leuchterförmiger, 4. w. Ostindien.

? *capitatum* Lindl., (= *Ephippium capitatum* Blume), kopfförmiger, 4. w. Java.

chinense Lindl., chinesischer, 4. w. China.

compressum Lindl. (= *Ephippium uniflorum* Blume), platter, 4. w. Java.

cornutum Lindl., gehörnter, 4. w. Ostindien.

Cummingii Lindl., Cumming's, 4. w. Philippinen.

? *elongatum* Lindl. (= *Ephippium elongatum* Blume), verlängerter, 4. w. Java.

fimbriatum Lindl., gefranzter, 4. w. Ostindien.

Macraei Lindl., Macraei's, 4. w. Zeylon.

maculosum Lindl., geflecker, 4. w. Ostindien.

maxillare Lindl., kerfähnlicher, 4. w. Ostindien.

Medusae Lindl., Medusen-B., 4. w. Ostindien.

nutans Lindl., nickender, 4. w. Manilla.

picturatum Lodd., bemalter, 4. w. Ostindien.

Roxburghii Lindl. (= *Aerides radiatum* Roxb.), Roxburgh's, 4. w. Ostindien.

Thouarsii Lindl. (= *Bulbophyllum longiflorum* Pet. Th. = *Cymbidium umbellatum* Spgl. = *Epidendrum umbellatum* Forst. (non Sw.) = *Zygoglossum umbellatum* Reinw.).

vaginatum Lindl. scheidiger, 4. w. Ostindien.

Cirsium T., Federdistel.

carminans Dumort., hellrothe, ♂. 4. f. Belgien.

dentatum DC. (= *anglicum* DC. var. Spgl.), gezahnte, 4. f. ?

Cirsium

polyacanthum Karel. et Kiril., vielstacheliche, 4. f. Altai.
ponticum C. A. Mey., pontische, ♂. f. Natolien.

Wiedemannii Fisch. et Mey., Wiedemann's, ♂. 4. f. Natolien.

Hybriden: oleraceo-acaule Schied., oleraceo-arvense Nägeli, oleraceo-bulbosum Nägeli, oleraceo-heterophyllum Nägeli, lanceolato-palustre Nägeli, pallens Wallr., palustri-oleraceum Rchb. (= *oleraceo-palustre* Nägeli), palustri-rigens Rchb. etc. Unbestimmtere: coloriceps (Brotero) lilacinum Hort. — *Kochianum* Löhr. = palustri-bulbosum, *medium* All. = ? *Zizianum*.

Cissus L., *diversifolia* DC. (= *heterophylla* W., non Poir.), b. fol. variegat.

Cistanthe discolor Spach, *glauca* Spach, *speciosa* Lilja, v. *Calandrinia discolor*, *glauca et speciosa*, p. 145 et p. 105, II.

Cistocarpium utriculatum Spach, v. *Vesicaria utriculata*, p. 845.

Cistomorpha lanceolata Caley, v. *Hibbertia saligna*, p. 395.

Cistus T., Ciströschen.

corberiensis Pourr. (= *hybridus* Pourr = *populifolius* β W. = *Ledonia peduncularis* β Spach).

floribundus Tausch (= *laurifolius* Hort.), blüthenreiches, ♀. k. Südeuropa.

grandiflorus Tausch (= *longifolius* Hort.), großblumiges, ♀. k. ?

hirsutus Lam. (= *platysepalus* Sweet = *psilocarpus* Sweet = *Ledonia hirsuta* Spach).

hybridus Vahl (non Pourr.), Bastard-C., ♀. k. Spanien.

longifolius Lam. (= *asperifolius* Sweet = *nigricans* Pourr. = *oblongifolius* Sweet = *obtusifolius* Sweet).

parviflorus Lam. (= *complicatus* Lam. = *lilacinus* Hffg.), β) *cymosus* Dunal.

populifolius L. (= *cordifolius* Mch. = *acutifolius* Sweet = *Cupanianus* Presl = *latifolius* Sweet = *Ledonia populifolia* Spach).

Pouzolzii H. Monspel., Pouzol's, ♀. k. ? Südl. Frankreich.

tauricus Presl (= *creticus* MB. = *salviaefolius* Pall.), taurisches, ♀. k. f. b. Taurien.

villosus Lam., β) *garganicus* Tenore, γ) *rotundifolius* Sweet (= *eriosepalus* Visian.).

viscosissimus Tausch, schmierigstes, ♀. k. ?

Cithareloma Bunge, Geigensaum, XV. II., Cruciferae-Camelinae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ♂. f. Caucasus.

Citrullus Neck., Schrad. (= *Colocynthis* T.), Wassermelone (Gurke, Angurie), XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.

amarus Schrad. (= *Cucumis* s. *Colocynthis amarissima* Schrad., p. 212).

caffer Schrad. (= *Cucurbita caffra* Eckl., Zey. = *Cucumis caffer** p. 238).

Colocynthis Arn. (= *Colocynthis officinalis* Schrad., p. 212, = *Cucumis Colocynthis* L.).

vulgaris Schrad. (= *edulis* Spach = *Cucurbita Citrullus* L. = *C. Anguria* Duch. = *Cucumis Citrullus* Sering., p. 238).

Citrus T., Orangenbaum.

amara Hassk., bitterer, ꝑ. w. Java.

Aurantium L. (= *corniculata* Hort. = *dulcis* Hort. = *hispanica* Hort. = *lunata* Hort. = *lusitanica* Hort. = *maxima* Hort. = *multiflora* Hort. = *myrtifolia* Hort. = *olissiponensis* Hort. = *pumila* Hort. = *racemosa* Hort. = *rubra* Hort. = *stellata* Hort. = *striata* Hort. = *sulcata* Hort. = *sylvestris* Hort. = *violacea* Hort.).

Nach Risso kommen folgende Varietäten vor: a) balearica, b) sinensis, c) nicaeensis, d) genuensis, e) cortice crasso, f) gibbosa g) microcarpa, h) duplex, i) hierochontica, k) fructu depresso, l) fructu costato, m) fructu minutissimo, n) ilicifolia, o) fructu aurato, p) fructu variegato, q) fructu variabili, r) limettiformis, s) limoniformis, t) vulgaris; nach Loiseleur noch: u) olivaeformis, v) multiflora, w) grassensis.

Bigaradia Tussac, Bigaradia-O., ꝑ. w. t. Antillen.

deliciosa Tenore, wohlschmeckender, ꝑ. k. t. ? China.

grandis Hassk., großblättriger, ꝑ. t. w. Java.

α) sphaerocarpa Hassk., β) oblonga Hassk.

javanica Blume, javanischer, ꝑ. t. w. Java.

Lima Macfadyen, Lima-O., ꝑ. t. w. Jamaika.

Linetta Risso, a) fructu pumilo, b) limoniformis, c) fructu stellato, d) Bergamium, e) Peretta, f) pomum Adami, g) pomum Rosae Risso, h) hispanica, i) romana, k) tuberculata Loisel.

Limonellus Rumph, Hassk., Limonellen-O., ꝑ. t. w. Java.

α) oxycarpa Hassk., β) amblycarpa Hassk.

Limonium Risso nebst folgenden Varietäten: a) cortice tenui, b) striatum, c) calabrinum, d) Shardonii, e) incomparabilis, f) fructu pusillo, g) Caly, h) pulpa dulci, i) ponzinum, k) rosolinum, l) citratum pumilum, m) Bignetta, n) Bignetta fructu maximo, o) citratum, p) Ceriescum, q) gnetana, r) imperialis, s) fructu elongato, t) amalplitana, u) Balotina, v) racemosa, w) Laurae, x) paradisi, y) fructu bipapillata Risso, et z) pusilla, aa) rosea, bb) barbodorum, cc) cajetana, dd) Rheginorum, ee) himamillata Loisel.

macracantha Hassk., großstacheliger, ꝑ. t. w. Java.

medica L. (= *acida* Hort. = *balotina* Hort. = *bergamotta* Hort. = *cedra* Hort. = *florentina* Hort. = *Limon* Loisel. = *macrocarpa* Hort. = *paradisiaca* Hort. = *saloniana* Loisel. = *tuberosa* Mill. Risso = *umbilicata* Hort. = *Limon racemosum* Mill. = *L. spinosum* Mill. = *L. vulgare* Mill.).

microcarpa Bunge, kleinfrüchtiger, ꝑ. k. t. Nordchina.

nobilis Lour., α) chrysocarpa Hassk., β) melanocarpa Hassk. (= *japonica minor* Auct.).

ovata Hassk., eiförmiger, ꝑ. t. w. Java.

paniculata Schum. et Thonn., rispiger, ꝑ. t. w. Guinea.

Paradisi Macf. (= *medica β acida* Tussac), Paradies-O., ꝑ. t. w. Jamaika.

Peretta Tussac, Peretta-O., ꝑ. w. Westindien.

β) domingensis Tussac.

pyriformis Hassk., birnförmiger, ꝑ. t. w. Java.

vulgaris Risso, n) *corniculata*, o) *florifera*, p) *hispanica*, q) *rugosa*, r) *pulpa dulci*, s) *glaberrima*, t) *chinensis*, u) *fructu maximo* Risso etc. etc. Unbestimmtere: *australis* Hort., *emarginata* Dsf., *triptera* Dsf. — *buxifolia* Hort., v. *Severinia buxifolia* Tenore.

- Cladochaeta** DC., Aestchenborste, XIX. II., Compositae-Helichryseae.
 candidissima DC. (= *Gnaphalium candidissimum* MB. (non Lam.) = *Helichrysum candidissimum* D. Don, p. 384.
- Cladrastis** Rafin., Cladrastis, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.
 tinctoria Rafin. (= *Virgilia lutea* Mchx., p. 852), färbende, ♀. k. f. b. Nordamerika (Tennessee).
- Clarkia** Pursh, Clarkie.
 pulchella Pursh, var. denticulata.
 unguiculata Lindl., nägelkronige, ☉. f. Californien.
- Clausena** Burm., Clausena.
 heptaphylla Wight et Arn. (= *Amyris anisata* Roxb. = *A. heptaphylla* Roxb., DC., p. 50).
 punctata Wight et Arn. (= *Amyris punctata* Roxb.), punktirte, ♀. w. Ostindien.
- Clausia** Trotzky, Clausie, XV. III., Cruciferae.
 aprica Trotzky (= *Hesperis aprica* Poir., p. 393).
- Clavija** R. et P., Clavija.
 lancifolia Dsf. (= *Potalia amara* H. Par.), lanzettblät-
 terige, ♀. w. Cayenne.
 C. longifolia Don, macrocarpa Don, pendula Don, spatulata Don, undulata Don, in Südamerika heimisch und ♀. scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu werden.
- Claytonia** L., Claytonie.
 alsinoides Sims (= *unalaschkensis* Fisch. = *Limnia alsinoides* Haw.), β) rosea (= *sibirica* Bot. mag.), γ) heterophylla Nutt., mierenähnliche, ☉. f. Oregon-
 gebiet, Unalashka.
 arctica Adans. (= *Chamissoi* DC. = *Joannea* R. et S. = *sibirica* Pall.), nördlichste, ☉. f. Nördl. Sibirien.
 caroliniana Mchx. (= *spatulaefolia* Salisb. = *virginica* β) *latifolia* Torr. = *virginica* γ) *spatulaefolia* DC.).
Cleanthe bicolor Salisb., v. *Aristea melaleuca*, p. 77.
Cleithria hirta Schrad., v. *Venidium Schraderi*.
- Clematis** L., Waldrebe.
 aquifolia DC., stechhülsenblättrige, ♀. Sch. t. k. Japan.
 campaniflora Brotero (= *viornoides* Hort.).
 coerulea Lindl., β) grandiflora Hook.
 cordata Pursh (non Sims), herzförmige, ♀. Sch. f. Nordamerika.
 discolor Gard., verschiedenfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.
 erecta All. (= *recta* L.), γ) cordifolia Notaris.
 Hügelii Hort. Mak., Hügel's, ♀. Sch. t. k. ? Neuholland.
 japonica Thbg. (= *crassifolia* Hort.), japanische, Sch. t. k. Japan.
 integrifolia L., β) elongata Trattin.
 Kerii Steud. (= *brachiata* Ker, non Thbg.), Ker's, ♀. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 lasiantha Fisch. (= *angustifolia* Jacq. var. ?), wollblumige, 4. f. Dahurien.
 longicaudata Ledeb., langschwänzige, ♀. Sch. f. Gegend des Caspischen Meeres.
 β) orientalis Lepech. (= *glauca* Claus).
 microphylla DC., kleinblättrige, ♀. Sch. t. k. Neuholland.
 parviflora DC. (= *campaniflora* Lodd. = *revoluta* H. Par.), kleinblumige, 4. ♀. Sch. f. ?
 patens Morren et Decais., abstehende, ♀. Sch. t. k. Japan.

Clematis

pubescens Hugel, weichhaarige, ♀. Sch. t. k. Neuholland.
soongarica Bunge (= *Gebleriana* Bong. et C. A. Mey.),
 soongarische, 4. ♀. f. Sonngarische Wüste.

β) *integrifolia* Schrenk.

stricta Wender. (= *lathyrifolia* Bess. = *erecta* L. var.?),
 steife, 4. f. Süd- und Osteuropa.

trifoliata Thbg., dreiblättrige, ♀. Sch. k. t. Japan.

Vitalba L., β) *bannatica* Wierzb.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen noch
 folgende aufgeführt: *californica*, *candida* fl. pleno,
hybrida, *hybrida odoratissima*, *insulensis*, *magniflora*
 Hffg., *odora* Wender., *odoratissima nova plena*.

Cleome L., Senfkapper.

affinis DC., ähnelnde, ☉. w. Brasilien.

flexuosa Hort., hin- und hergebogene, ☉. w. ?

glutinosa Schrad., klebrige, ☉. w. ?

purpurea DC., purpurfarbige, ♀. w. Peru.

urens Brotero, brennende, ☉. ♀. w. Brasilien.

lutea Hook., v. *Peritoma lutea*, *monandra* DC., v.

Dactylaena micrantha, *muricata* Schult., v. *Gynandropsis muricata*.

Clerodendron L., Loosbaum.

capense G. Gon, capischer, ♀. t. Cap d. g. Hoffa.

emirnense Bojer, Hooker (= *floribundum* Lindl. non RBr.).

fallax Lindl. (= *speciosissimum* Paxt. = *squamatum* H.
 Anglor.), täuschender, ♀. w. ? Ostindien.

fragrans W. (= *Volkameria fragrans* Vent. = *Volk-
 mannia japonica* Jacq. = *Agricolaea fragrans* Schrk.),
 c) *flore rubro simpl.*

glandulosum Lindl. (= *speciosissimum* Hort. Anglor.),
 drüsiger, ♀. w. ?

Hügelii Hort. belg. (= ? *splendens* de Hügel Makoy),
 Hügel's, ♀. w. ? Ostindien.

Kaempferi Siebold (= *Volkameria japonica* Thbg., p.
 853). Kämpfer's, ♀. t. Japan.

laevifolium Blume, glattblättriger, ♀. ♀. w. Java, Timor.

odoratum Wall. (= *Volkameria odorata* Roxb.), gut-
 riechender, ♀. ♀. w. Ostindien.

splendens G. Don, Lindl., schimmernder, ♀. Sch. w.
 Sierra Leone.

squamatum Vahl (= *coccineum* Hort. = *Kaempferi*
 Fisch. = *Volkameria Kaempferi* Jacq.).

villosum Blume (= *infortunatum* Dennst., non L.),
 zottiger, ♀. ♀. w. Ostindien, Java.

viscosum Vent. (= *canescens* Wall. = *infortunatum* W.,
 non L. = *Volkameria laurifolia* Hort.).

phlomoides Hort. Ital., v. *Verbesina atriplicifolia*,
 p. 840.

Clethra L. G., Else.

corcovadensis Hort. belg., corcovadensische, ♀. t. Süd-
 amerika.

divaricata Loisel., ausgesperrte, ♀. t. Südamerika.
mexicana Hort. et (? DC.) (= *integrifolia* Moç. Sess.
 = *ovalifolia* Moç. Sess.), mexicanische, ♀. t. Mexico.

Michauxii Courtois, Michaux's, ♀. f. Nordamerika.

nervosa Loisel., nervige, ♀. t. Peru.

quercifolia Schltdl., Lindl., eichenblättrige, ♀. t. Mexico.

Außerdem kommen in Mexico noch eine *C. lanata* Martens
 et Galiotti u. *macrophylla* Martens et Galeotti vor, die
 wohl noch nicht kultivirt werden.

Clianthus Soland., Prachtwicke.

Dampieri A. Cunningh. (= *Donia formosa* G. Don),
Dampier's, 4. ⚭. t. Neuholland.

Oxleyi A. Cunningh. (= *Donia speciosa* G. Don), Ox-
ley's, 4. ⚭. t. Neuholland.

pictus Endl. (= *carneus* Lindl. = *Baueri* A. Cunn. = *Stre-*
blorhiza speciosa Endl.), prächtiger, 4. ⚭. t. Norfolkinsel.

punicus Soland. (= *Donia punicea* Sweet, G. Don).

Clintonia Dougl., Clintonie.

corymbosa DC., traubendoldige, ☉. f. Nordwestl. Amerika.

Clitoria L., Clitorie.

arborea Benth. (= *Vexillaria arborea* Hoffg.), baum-
artige, ⚭. ⚭. w. Brasilien.

arborescens Ait., baumähnliche, ⚭. ⚭. w. Trinidad.

fulgens van Houtte, leuchtende, ⚭. Sch. w. ? Südamer.

laurifolia Desv. (= ? *Galactia coriacea* N. E.), lorbeer-
blättrige, ⚭. Sch. w. Brasilien.

mexicana Lk. (= *C. Mariana* Schltl.).

coccinea Schrad., v. *Periandra coccinea*.

Hinsichtlich der übrigen s. *Centrosema*.

? **Clodanthus chinensis** H. Booth. 4. ? ?**Clowesia** Lindl. (Rev. Clowes zu Broughton Hall bei
Manchester), XX. 1., Orchideae.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Brasilien.

Chytia collina Roxb., *patula* Roxb., p. 207, ge-
hören zur Gattung *Bridelia*, p. 131, werden aber
wohl kaum kultivirt.

Clypeola L., Schildkraut.

cyclodonta Delile, kreisförmige, ☉. f. Südfrankreich.

Cnicus diacantha LaBill. (= *Cirsium diacantha*
DC.) et *fruticosus* Dsf., v. *Chamaepeuce diacantha*
et *fruticosa*, p. 186 et 187. Die übrigen s. *Cir-*
sium, p. 197 et 198, II.

Cnidium Cuss., Brenndolde.

anomalum Ledeb., abweichende, 4. f. Altai. Sibirien.

argenteum Cesati, silberfarbige, 4. f. Dahurien.

carvifolium MB. (= *Laserpitium caucasicum* MB., p. 446).

Petroselinum DC. (= *Peucedanum Petroselinum* Dsf.),
Steinsilgenähnliche, 4. f. ?

atropurpureum Spgl., v. *Thapsium cordatum* β *atro-*
purpureum, *Fischeri* Spgl. = *Coenolophium Fi-*
scheri, p. 876, *pyrenaeum* Spgl., v. *Ligusticum*
pyrenaeum, *tenuifolium* Mch., v. *Helosciadium la-*
teriflorum s. *leptophyllum*, p. 879.

Cnidioscolus Pohl, Brennnufs.

Marcgravii Pohl (= *Jatropha herbacea* Auct. et ? L.),
Marcgrav's, ☉. 4. w. Neuspanien.

Michauxii Pohl (= *Bivonaca stimulosa* Rafin. = *Jatro-*
pha stimulosa Mchx. = *J. urens* Walt.), Michaux's,
☉. 4. w. k. Nordamerika.

neglectus Pohl (= *Jatropha urens* Hort., non L.),
übersehene, ⚭. w. Südamerika.

palmatus Pohl (= ? *Jatropha aconitifolia* Jacq. = *J.*
palmata W.), handförmige, ⚭. w. Südamerika.

quinquelobus Pohl (= *Janipha urens* Poir. = *Jatropha*
urens L.), fünfflappige, ⚭. w. Südamerika.

Cnoophora Kaulf. ¹⁾, Wollfarnn, XXIV. 1., Pteroidae.

elegans H. Hügel., zierlicher, ⚭. w. Ostindien.

1) Wohl richtiger *Chnoophora*.

Cobaea Cav., Cobaea.

macrostemma Pav. in Hook. bot. mag. (= *lutea* D. Don = *acuminata* DC.), grobsfadige, 4. ♀. Sch. t. k. Guatemala.

stipularis Lindl., Benth., zwischenblättrige, 4. ♀. Sch. t. k. Guatemala.

Coburgia Swt., Coburgie.

humilis Hort. belg., niedrige, 4. Zw. w. Südamerika.

versicolor Lindl., buntfarbige, 4. Zw. w. Südamerika.

flava Hort. belg. = ? *fulva* Herb.

Coccinia Wight Arn., Coccinie, XXII. x. (XVI. i.), Cucurbitaceae.

indica Wight. Arn. (= *Bryonia grandis* L., p. 135 = *B. Momoi* Sering. = *B. ? palmata* L. = *Cucurbita dioica* Roxb. = *Momordica Cowel* Dennst. = *M. monadelpha* Roxb.), indische, 4. Sch. w. Ostindien.

Coccocypselum P. Br., Beerenröthe.

glabrum Bartl., glatte, 4. w. Panama.

Coccoloba Jacq. L., Seetraube.

fagifolia Jacq. (= *nitida* Dsf., non H. B.), buchenblättrige, ♀ w. Südamerika¹⁾.

latifolia Lam (= *rheifolia* Dsf.).

ferruginea H. Berol. et Endl., H. Vindob., rostfarbige, ♀ w. ?

macrophylla Dsf., grobsblättrige, ♀ w. ?

pyrifolia Dsf. (= *excoriata* β Lam.), birnblättrige, ♀ w. Antillen.

rugosa Dsf., runzelige, ♀ w. Antillen.

sagittata Poir. (= *Conobaea sagittaeifolia* Bertero = *Menispermum sagittatum* Spgl. = *Polygonum acetosaefolium* Vent.), pfeilblättrige, ♀. Sch. w. Südam.

scandens Brotero (= ? *sagittaeifolia* Ortega) klimmende, ♀. Sch. w. Südamerika²⁾.

Cocculus C. Bauh, DC., Fischkörnerbaum.

japonicus DC. (= *Menispermum japonicum* Thbg.), japanischer, ♀. Sch. k. Japan.

Coccyganthe flos cuculi Rehb., v. *Lychnis flos cuculi*, p. 482.

Cochlearia T., Löffelkraut.

arctica Schltl. (= *officinalis* L. var. Spach), nördlichstes, 4. f. Nördl. Sibirien.

sagittaeifolia Desv., pfeilblättriges, ♂. f. ?

fenestrata RBr., v. *Eutrema Rossii*.

Cochliospermum altissimum Lagasca, v. *Schangiunia altissima*, p. 729, *Cavanillesii* Lagasca, *Clemente* Lag., *hispanicum* Lag., *salsum* Lag., v. *Schoberia crassifolia*, *Clemente*, *trigyna* et *salsa*.

Cochlospermum Kunth, Schneckensaame, XIII. i., Ternstroemiaceae.

insigne St. Hil., Juss. et Cambess. (= *Maximiliana regia* Mart. et Schrk. = *Wittelsbachia insignis* Mart. et Zuccar.), ausgezeichnete, ♀ w. Brasilien.

Cocos L., Kokospalme.

amara Jacq., bittere, ♀ w. Martinique.

australis Hort. Par. südliche, ♀ w. Paraguay.

1) Endlicher Catalog. hort. academ. Vindob. führt eine *C. fagifolia* Hort. Carlsr. ohne Angabe des Vaterlands auf.

2) Vielleicht mit vorhergehender =.

Cocos

fernambucensis van Houtte, Fernambuco - K., 5. w. Fernambuco.

Mikaniana Mart., Mikans, 5. w. Brasilien.

oleracea Mart., kohlgebende, 5. w. Brasilien (Minas Geraé's).

Außerdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen (zumal niederländischen) noch folgende (deren Autor und Vaterland mir unbekannt ist), vor: *C. Cheribu*, *frigida*, *melanococca*, *ovata*, *reflexa* H. Anglor., *simplificifolia*. — *C. lapidea* G. (= *Lithocarpus cocciformis* Targ. Tozz. = *C. de Piacaba* Max. Neuw.), v. *Atalea funifera*, p. 106).

Codonocephalum Fenzl, Glockenköpfchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae (Inuleae).

inuloides Fenzl., alantähnliches, 4. k. f. b. Kurdistan. *Codonophora grandiflora* Lindl. et *lanceolata* Lindl., v. *Rytidophyllum prasinatum* et *tomentosum*.

Codonoprasum carinatum Rchb., *flavum* Rchb., *flexum* Rchb., *fuscum* Rchb., *intermedium* Rchb., *longispatum* Rchb., *oleraceum* Rchb., *pallens* Rchb., et *paniculatum* Rchb., v. *Allium carinatum* L. etc. p. 29 etc.

Codonopsis Wall., DC., Glöckchen, V. I., Campanulaceae.

lurida Hort. Lips., schmutzfarbiges, 4. k. f. ?

purpurea Wall. (= *Campanula purpurea* Spgl. = *Wahlenbergia purpurea* DC.), purpurfarbiges, 4. k. f. Nepal.

Codoricalyx Hasskarl., Schweifelch, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

conicus Hassk., kegelförmiger, 5. w. Java.

gyrans Hassk. (= *Desmodium gyrans* DC., p. 257 = *Hedysarum gyrans* L.), 5. ♂. Bengalen.

*gyroides** (= *Desmodium gyroides* DC., p. 257 = *Hedysarum gyroides* Roxb.).

Coelachyrum Hochst. et N. E. (= *Coelochloa* Hochst.),¹ Hohlspelze, III. II., Gramineae.

brevifolium Hochst. et N. E. (= *Eleusine brevifolia* Hochst. et Steud.), kurzblättrige, ♂. f. Arabien.

Coelanthus W., Hohlblümchen, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

complicatus W. herb. (= *Lachenalia pusilla* Eckl. = *reflexa* Thbg. = *Phormium orchiioides* Thbg.), zusammengefaltetes, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Coelestina Cass., Coelestine.

paleacea Gay, spreublättrige, 4. k. Mexico.

Coelia Lindl. (= *Caelia* Don, Coelie, XX. I., Orchideae.

albiflora H. Cels., weißblumige, 4. w. ? Südamerika.

Galeottiana van Houtte, Galeotti's, 4. w. Mexico.

glacialis van Houtte, Gletscher-C., 4. w. ? Südamer.

macrostachya van Houtte, großsährige, 4. w. ? Südamer.

purpurea H. Cels., purpurfarbige, 4. w. ? Südamer.

triptera Don (= *Baueriana* Lindl. = *Cymbidium tripterum* Sw. = *Epidendrum tripterum* Sm.), dreiflügelige, 4. w. Jamaica¹).

1) *Coeloglossum* Lindl. (non Hartm.), Hohlzüngel, XX. I., Orchideae.

acuminatum Lindl. Nepal, *brevifolium* Lindl. Nepal, *densum* Lindl. (= *Gymnadenia tenuis* Lindl.), *lacertiferum* Lindl. (= *Gymn. tenuiflora* Lindl.), *secundum* Lindl. (= *Gymn. secund.* Lindl.). Die letztern in Ostindien heimisch. Scheinen bis jetzt sämtlich noch nicht kultivirt zu werden.

Coelobogyno ilicifolia Hort. Kew., v. *Sapium ilicifolium*, p. 721.

Coelogyne Lindl., Hohnnarbe.

- candida* Lindl., blendendweisse, 4. w. Ostindien.
Cummingii Lindl., Cumming's, 4. w. Ostindien.
elata Lindl., hohe, 4. w. Ostindien.
fuscescens Lindl., bräunliche, 4. w. Nepal.
interrupta Lindl., unterbrochene, 4. w. Ostindien.
nitida Lindl. (= *punctulata* Lindl.), glänzende, 4. w. Nepal.
odoratissima Lindl., wohlriechendste, 4. w. Ostindien.
testacea Lindl., scherbengelbe, 4. w. Ostindien.
undulata Lindl., wellenförmige, 4. w. Ostindien.

fuliginosa H. Belg. = ? *prolifera*.

Coffea L., Kaffeebaum.

- hirsuta* G. Don, rauher, 4. w. Sierra Leone.
mauritiana Lam. (= *arabica* β W. = *sylvestris* W.),
 mascarenischer, 4. w. Mascarenas.
paniculata Aubl. (= *Tetramerium paniculatum* Spgl.,
 p. 802).
stenophylla G. Don, schmalblättriger, 4. w. Sierra Leone.
C. Moka Hort. = *arabica*, *occidentalis* Jacq., v.
Faramea odoratissima, *opulina* Forst., v. *Pavetta*
opulina.

Coix *Lacryma* L., β) *gigantea* Hort.

Colchicum T., Zeitlose.

- atticum* Sprunger, attische, 4. Zw. f. Griechenland.
autumnale L., h) *polyanthum* Ker, i) *multiflorum* Brotero.
Bertolonii Steven (= *montanum* Bertol. = *Cupani* Guss.),
 Bertolone's, 4. Zw. f. Italien, Dalmatien, Griechenl.
Bivonae Guss. (= *variegatum* Bivon. = *latifolium* Sibth.
 = *byzantinum* Tenore = *tessulatum* Mill.), Bivone's,
 4. Zw. f. Sicilien, Griechenland, Portugal.
laetum Steven, freudige, 4. Zw. f. Syrien, Caucasus.
neapolitanum Tenore, neapolitanische, 4. Zw. f. Neapel.
parvulum Tenore, kleine 4. Zw. f. Neapel.
speciosum Steven (= ? *illyricum* Friwaldsky), prächtige,
 4. Zw. f. Iberien, Macedonien.
Stevani Kunth (= *montanum* Dsf. excl. syn.), Steven's,
 4. Zw. f. b. k. Nordafrika, Syrien, Persien.
umbrosum Steven, Fisch. (= *arenarium* β *umbrosum*
 Bot. reg.).

Hinsichtlich der übrigen s. *Bulbocodium*, p. 81, II.

Colea Bojer, *Colea*, XIV. II., Bignoniaceae.

- floribunda* Boj., Lindl., blüthenreiche, 4. w. Madagasc.
mauritiana Boj. (= *Bignonia Colei* Boj. mss. Hook.),
 mascarenische, 4. w. Mauritius.
Telfairiae Boj. (= *Bignonia Telfairiae* Boj. mss. Hook.),
 Telfair's, 4. w. Mascarenas, Madagascar.

Coleonema Bartl. et Wendl., *album* Bartl. et Wendl.,

β) *virgatum* Schldtl., Eckl., Zeyh., γ) *gracile* Schldtl.,
 Eckl., Zeyh.

rubrum Hort. (= *tenuifolium* Hort.) = *pulchrum*.
Coleosanthus tiliacifolius Cass., v. *Eupatorium* II.,
Hebeclinium macrophyllum, p. 321.

Coleus Lour., Scheidenlippe.

- aromaticus* Benth. (= *crassifolius* Benth. = *Plectranthus aromaticus* Roxb. = *P. crassifolius* Hort. = *amboinensis* Spgl.).
scutellarioides Benth. (= *Plectranthus scutellarioides*
 RBr., p. 634), 4. 4. w. ?

Colicodendron Mart., Pumperbaum, XIII. I., Capparideae.

Breynia Endl. (= *Capparis Breynia* L., p. 158).

Zwei andere brasilianische Arten *longifolium* Mart. et Yco Mart., werden kaum kultivirt.

Colladonia DC., (Colladon Botaniker zu Genf), V. II., Umbelliferae.

triquetra DC. (= *Cachrys triquetra* Spgl. = *Laserpitium triquetrum* Vent., p. 446).

Collaea DC. (A. Colla, Besitzer eines reichen Gartens zu Rivoli bei Turin), XVII. I. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

pendula Benth. (= *Clitoria Galactia* L. = *Galactia pendula* P., p. 342).

Collania urceolata Schult., v. *Urceolina pendula*, p. 831.

Colletia Commers., Colletie.

ferox Gill. et Hook. (= *horrida* Brogn. (non W.) = *spinosa* Bertero).

parvifolia Hort., kleinblättrige, ♂. w. t. ?

Collinsia micrantha Wender., v. *Clintonia elegans*, p. 206.

Collinsonia L., Collinsonie.

punctata Ell., punktirte, 4. f. Carolina, Georgien.

verticillata Baldw., Nutt., wirtelblättrige, 4. f. Georgien.

cuneata Wenderoth = ? *canadensis*.

Collomia coccinea Lehm. (= *Cavanillesii* Hook.).

heterophylla Hook., v. *Navarretia heterophylla*.

Colocasia Raj., Schott, Endl., Colocasiawurz, XXI. IX., Aroideae.

antiquorum Schott, (= *Arum Colocasia* L., p. 85).

Boryi Kunth (= *Arum cordifolium* Bory d. St. Vinc. Dsf. Catal.), Bory's, 4. Kn. w. Bourbon.

cucullata Schott (= *Caladium cucullatum* P.).

esculenta Schott (= *Caladium esculentum* Vent., p. 143).

humilis Hassk., niedrige, 4. Kn. w. Java.

indica Kunth (= *Arum indicum* Lour.), indische, 4.

Kn. w. Bengalen, Cochinchina.

macrorrhiza Schott (= *Arum macrorrhizum* L., p. 85).

nymphaefolia Kunth (= *Caladium nymphaefolium* Vent., p. 143).

odorata Brogn. (= *Caladium odoratum* Bot. reg., p. 143).

ramosa Schott (= *Arum ramosum* Hort. Angl. Lk., p. 86).

Colophonon mauritiana DC., v. *Canarium commune*, p. 115, II.

Columnnea L., Columnnea.

flava Martens et Galeotti, hellgelbe, ♂. Sch. w. Mexico.

scandens L. (= *villosa* P. = *rotundifolia* Salisb.).

Schiedeana Schldtl. (= *longiflora*, = *Lindeniana*, = *spectabilis* Hort.), Schiede's, 4. ♂. w. Mexico.

splendens Schlcht., Paxt. (= *Nematanthus Guillemiana* = *C. grandiflora* Hort. Angl.), schimmernde, 4. ♂. w. Mexico.

Außerdem kommen in den Verzeichnissen der belgischen Handelsgärtner noch vor: *C. chloronema*, *crassifolia*, *pilosa*, wahrscheinlich sämmtl. aus Südamerika.

erecta Lam., v. *Achimenes coccinea*, p. 6, II.

henkelioides Spgl., v. *Streptocarpus Rexii*, *speciosa* W., v. *Rytidophyllum prasinatum*.

Colutea tanacetifolia Hort. Turin. ?

Comaropsis Rich., Sumpfbeere.

pedata DC. (= *Dalibarda pedata* Steph. = *Rubus pedatus* Sm.), fußförmige, 4. f. Nordamerika.

sibirica DC. (= *Dalibarda ternata* Steph. = *Waldsteinia sibirica* Tratt), sibirische, 4. f. Sibirien.

Comarostaphylis arguta Zuccar. (? = *arbutoides* Bot. reg.), v. *Arctostaphylos arguta*, p. 42, II.

Comarum L., Sumpfröschen.

Salesowii Bunge (= *Potentilla Salesowii* Steph. W. p. 652).

Combretum Löffl., Langfaden.

acuminatum Roxb., zugespitzter, ♀. w. Ostindien.

latifolium G. Don (? Blum.) (= *macrophyllum* Roxb.), breitblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.

leucophyllum G. Don, weißblättriger, ♀. w. Sierra Leone.

racemosum P. B. (= *corymbosum* Schum. = *trigonoides* Perr.).

Roxburghii G. Don (non Sngl.), Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

Comesperma LaBill., Schopfsaame.

virgatum LaBillard, ruthenförmiger, ♀. t. Neuholland.

integerrimum Endl., *simplex* Endl. und *strictum* Endl., werden wahrscheinlich noch nicht kultivirt.

Commelyna Dill., Commelyna.

carnea Schltl. (= *scabra* Benth. = *Ehrenbergiana* Lk. Kl. Otto), fleischfarbige, 4. Kn. k. Mexico.

debilis Ledeb., schwache, 4. k. ?

dianthifolia DC. Red., nelkenblättrige, 4. Kn. t. w. Mexico.

diffusa Burm., Vahl, weitschweifige, ♂. w. m. f. Ostind.

elegans H. B. (= *hirsuta* W.), zierliche, 4. w. Südamerika.

erecta L. (= *communis* Walt.), aufrechte, 4. k. Virginien.

Karwinskii Mart., Karwinsky's, 4. k. t. Mexico.

lanceolata RBr., lanzettblättrige, 4. k. Neuholland.

lineolata Blume, linirte, ♂. m. w. Java.

Loddigesii Steud. (= *undulata* Lodd.), Loddiges's, 4. k. t. Mexico.

pallida H. B. K. et W. E. (= *rubens* Redouté = *Aclisia foetida* H. Berol.), bleiche, 4. w. Mittägl. Amer.

paludosa Blume, Sumpfliebende, 4. w. Java.

persicariaefolia DC., Red. knöterigblättrige, 4. w. ?

puberula H. Berol., feinhaarige, 4. t. Mexico.

scapigera H. Berol., schafttragende, 4. k. t. ?

β) *orchioides* H. Berol. (non Booth).

stricta Dsf. (= *pallida* H. Par. = *caroliniana* H. Par. = *repens* H. Berol.), steife, 4. k. t. Mexico.

(*C. angustifolia caroliniana*, *debilis*, *rubens* Hort.

(nec Auct.) et ? *puberula* H. Berol. sind nach Kunth nur Formen dieser Art).

variabilis Schltl., veränderliche, 4. Kn. t. k. Mexico.

virginica L., virginische, 4. f. b. k. Nordamerika.

Willdenowii Kunth (= *communis* Herb. reg. Berol.), Willdenow's, ♂. w. m. f. ?

(*C. dubia*, *erecta*, *japonica*, *longicaulis*, *paniculata*, *stricta*, *tuberosa* Hort. (nec Auct.), sind nach Kunth nur Formen d. *C. coelestis*).

C. axillaris L. spec., v. *Cyanotis axillaris*, p. 241,

dubia Jacq., v. *Leptanthus gramineus*, p. 455, *rosea*

Schltl., v. *Tinantia fugax*, *Zanonia* L., v. *Campelia*

Zanonia, p. 156. — *C. affinis* Poir., *Brownii* A. Dietr.

etc., v. *Aneilema affinis*, *acuminata* etc., p. 58 et p. 35, II.

- Commersonia** Forst. *aspera* Colebr. in Roxb. fl. ind. (= *Büttneria grandifolia* DC., p. 136), rauhe, 4. w. Ostindien.
? *vitifolia* Hort., weinblättrige, 5. w. ?
- Commidendron** DC., Gummistrauch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae¹⁾. Vergl. p. 217.
gummiferum DC. (= *Conyza gummifera* Roxb.).
rugosum DC. (= *Aster glutinosus* Roxb. = *Conyza rugosa* Ait.).
- Comocladia** P. Br., *ilicifolia* Sw., p. 214 (= *angulosa* W. = *tricuspidata* Lam. = *Ilex Dodonaea* L.).
- Comparettia** Poepp., Endl., Comparettia.
rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Spanisches Amerika.
Ob *C. saccata* Poepp., Endl. in Peru heimisch, kultivirt wird, ist mir nicht bekannt.
Conanthera Echeandia P., v. *Echeandia terniflora*.
Conchium aciculare Sm. etc., v. *Hakea acicularis* etc., p. 374²⁾.
- Coniandra** Schrad., Coniandra, XXI. x. (XVI. i.), Cucurbitaceae.
dissecta Schrad. (= *Bryonia dissecta* Thbg., p. 135).
glauca Schrad., blaugrüne, 4. Sch. t. k. Cap d. g. H.
Conioselinum canadense Torr. et Grey, v. *Cnidium canadense*, p. 208.
- Conium** L., Schierling.
maculatum L., γ) *sibiricum*, δ) *tenuifolium* Mill., ϵ) *strictum* Tratt.
nodosum H. Par., Fisch., Tenor., knotiger, ζ . f. Neapel.
moschatum H. B., v. *Arracachia moschata*, p. 45, II.
- Conobea** Aubl., Conobea, XIV. II., Personatae.
ovata Otto H. Berol., eiförmige, 5. w. Südamerika.
- Conoclinium** DC., Kegelhüllchen, XIX. I., Compositae-Eupatorineae. Vergl. p. 320. Sect. III.
coelestinum DC. (= *Eupatorium coelestinum* L., p. 320).
oligolepis Kunze, wenigschuppiges, 5. k. Mexico.
Conopodium canadense K., v. *Cryptotaenia canadensis*, *Claytoni** v. *Osmorrhiza longistylis*.
- Conospermum** Sm., Kegelsaane.
acerosum Lindl., nadelblättriger, 5. t. Neuholland.
amoenum Meissn., lieblicher, 5. t. Neuholland.
brachyphyllum Lindl., kurzblättriger, 5. t. Neuholland.
densiflorum Lindl., dichtblumiger, 5. t. Neuholland.
Hügelii RBr., Hügel's, 5. t. Neuholland.
incurvum Lindl., einwärtsgekrümmter, 5. t. Neuholland.
laniflorum Endl., wollblumiger, 5. t. Neuholland.
Stoechadis Endl. (= *sclerophyllum* Lindl.), knorpelblättriger, 5. t. Neuholland.
taxifolium Sm. (= ? *salicifolium* Knight. Salisb.).
tenuifolium RBr. (= *repens* Sbr.), dünnblättriger, 5. t. Neuholland.
teretifolium RBr., stielrundblättriger, 5. t. Neuholland.
undulatum Lindl., wellenblättriger, 5. t. Neuholland.
- Conostegia** Don, DC., Conostegie, X. I, Melastomaceae.
arborea Schldtl. (= *Melastoma arbor.* Schldtl.), baumartige, 5. w. Mexico.

1) Schon p. 217 als Untergattung II. von *Conyza* aufgeführt, verdient aber nochmals als besonderer Gattung Erwähnung.

2) *Conchochilus* Hassk. *distichus* et *oppositiflorus* Hassk., Orchideae, beide in Java heimisch, werden bei uns wohl kaum kultivirt.

Conostegia

holosericea Don (= *Melastoma holosericea* Pavon., non Hort.), sammethaarige, ⚔. w. Peru.

semicrenata Sering. (= *Melastoma acuminata* Desv. = *ebracteata* Dietr. = *elongata* Vahl = *semicrenata* Rich.), halbkerbige, ⚔. w. Westindien.

superba Don (= *Melastoma superba* Bonpl.), stolze, ⚔. w. Mittägl. Amerika¹⁾.

Conradia Mart., Conradie, XIV. II., Person.-Gesnerieae.

calycina Mart. (= *Gesneria calycina* Sw., p. 354 = *Gloxinia calycina* Hort. = *Sinningia calycina* Hort.).

Craniolaria Mart. (= *Craniolaria fruticosa* L. = *Gesneria Craniolaria* Sw. = *G. fimbriata* Lam. = *Martynia fruticosa* Gloxin), Craniolarienähnliche, ⚔. w. Domingo.

ventricosa Mart. (= *Gesneria ventricosa* Sw. = *Pentarrhaphia longiflora* Lindl., p. 605), bauchige, ⚔. w. Westindien.

Conringia alpina Lk., v. *Arabis brassicaeformis*, p. 70.

Convallaria majalis L., d. foliis variegatis, β) Mappii Gmel., γ) latifolia Mill. (non Jacq.).**Convolvulus** L., Chois., Winde.

althaeoides L. (= ? *flexuosus* Buch.), β) *nanus* Chois., γ) *hirsutus* Tenor. (non Stev. M. B.), (= *bryoniaefolius* W. = *italicus* R. et S.), δ) *ferrugineus* Chois., ε) *sericeus* Tratt., ζ) *argyreus* DC. (= *althaeoides* Bot. mag. = *argyrophyllus* Hoffg.), η) *pedatus* Forsk. (= *tenuissimus* Sibth. = *elegantissimus* Mill.).

arvensis L. (= *sagittaeifolius* Salisb. = *prostratus* Schm.), β) *pumilus* Wallr., γ) *obtusifolius* Chois. (= *corsicus* R. et S.), δ) *crassifolius* Chois. (= *chinensis* Ker = *Malcolmi* Roxb.), ε) *biflorus* Chois. (= *hastatus* Forsk. Vahl = *hastifolius* Poir.), ζ) *multiflorus* Bess., η) *linearifolius* Chois. (= *sagittifolius* Fisch. h. Gor.), θ) *parvifolius* Chois., ι) *auriculatus* Desv., χ) *villosus* Choisy. In Europa, Asien, Afrika und Südamerika verbreitet.

bonariensis Cav. (= *Aniseia diversifolia* Walp.).

californicus Chois. (= *Calystegia subacaulis* Hook.), californische, 4. f. Neu-Californien.

canariensis L. (= *pannifolius* Dryand. Ait. = *pallidus* Salisb.).

capensis Burm., capische, 4. Sch. k. Cap d. g. Hoffn.

dianthoides Karel. et Kir. (= *pseudocantabrica* Schrenk et C. A. Mey.), nelkenähnliche, 4. f. Asiat. Rufsland.

dissectus Cav. (non L.) (= ? *variabilis* Weinm. ?), schlitzblättrige, 4. k. Sch. Chili, Cap d. g. Hoffn.

erinaceus Eichw., Erinusähnliche, ⚔. f. b. k. Gegend des caspischen Meeres.

erubescens Sims (= *rubescens* Poir. = ? *geniculatus* Lehm.), β) *angustissimus* RBr., γ) *dilatatus* Chois., ♂. 4. ?

Falkia Jacq., *Falkia*-W., 4. Sch. k. Cap d. g. Hoffn.

farinosus L. (= *hirtus* Mill. ? L.), ☉. 4. Griechenland, Madeira, Mascarenas, Madagascar, Cap d. g. Hoffn.

fatmensis Kunze (= *ambliocalyx* Steud.), fatmeische, ☉. f. Sch. Aegypten, Arabien.

1) *Conostephium* Benth., Epacrideae minus Lindl. et pendulum Benth. ⚔. Neuholland. Ob kultivirt?

Convolvulus

- Forskoliï Del. (= *Cneorum* Forsk., non L.), Forskol's, §. k. Aegypten, Sinai.
- Hermanniae L'Her. (= *crenatus* Jacq. = *stellaris* Salisb. = *Vahlîi* R. et S. = *Ipomoea Hermanniae* G. Don).
- hirsutus Stev., M. B. (= *betonicifolius* Mill. = *sagittifolius* Sibth. = *Sibthorpii* R. et S. = *pubescens* Russ.).
- holosericeus MB. (= *procumbens* Pall. = *mollissimus* Pall.), sammethaarige, §. f. b. k. Taurien, Kleinasien.
- lanuginosus Desr. (non Vahl) (= *saxatilis* Vahl), wolliche, 4. f. b. k. Westeuropa, Taurien.
- lineatus L. (= *spicaefolius* Desr. = *intermedius* Lois. = *Cneorum* β Gouan = *humilis* Salisb. = *Besseri* Spgl. = *Gerardi* R. et S.).
- Massoni Dietr. (? = *solanifolius* Lowe = *suffruticosus* Ait. Kew. (non Desf.) = *Dryandri* Spgl. = *suberosus* W. mss. h. = *rupestris* Buch. = *volubilis* Brouss.), Masson's, §. Sch. k. Madeira.
- micranthus R. et S. (non W.) (= *parviflorus* Desr., non Vahl, non Salisb. = *polycarpus* H. B. K. = *Plumieri* Spgl. = *Jacquemontia micrantha* et *polycarpa* G. Don), kleinblumige, §. Sch. w. Westindien, Mexico.
- ocellatus Hook., geäugelte, §. t. Mittägl. Afrika.
- oleaefolius Desr. (= *linearis* Curt, non DC. = *Tournefortii* Sieb.), oelbaumblättrige, 4. §. k. Griechenland, Creta, Kleinasien.
- pentapetaloides L. (= *prostratus* Forsk. Roth), Süd- und Westeuropa, Majorca, Griechenland.
- persicus L., persische, 4. §. k. f. b. Persien, asiat. Türkei, Sibirien.
- pilosellaefolius Desr. (= ? *tenuis* Tenor. = ? *linearifolius* Mill.), mausöhrchenblättrige, ©. f. Persien, Kleinasien.
- scoparius L. (= *Rhodorrhiza scoparia* Webb. = *Breweria* ? *scoparia* Lindl.).
- sericeus Burm. (= *lanatus* Vahl = *salviaefolius* Sieb.), seidenhaarige, 4. §. k. Aegypten, Arabien, Kleinasien, Kreta.
- siculus L. (= *ovatus* Mch. = *parviflorus* Sal., non Vahl = *Berardi* Hort. Mutin. = *neglectus* Hort.).
- tricolor L., β) meonanthus Hffmsg. et Lk.
- undulatus Cav. (= *strictus* Lehm.).
- Nicht hinlänglich oder nur den Namen nach bekannte Arten: *albus* H. Ticin., *arenosus* Cyrill., *Boerhavii* H. Neapol., *emarginatus* Lk. 4., *erianthus* W. Nordamer., *hircinus* Cat. Parm., *laniger* W., *monospermus* Hort. Parm., *nudus* Hort., *Otites* W., *reniformis* Hort. Carlsr., *stellatus* Brot., *superbus* H. Tic., *villosus* Dietr. — *albivenus* Lindl., *arborescens* H. B. K., *cairicus* L., *candicans* Soland., *ciliatus* Vahl, *dentatus* Vahl, *ebracteatus* Desr., *filicaulis* Vahl, *glaber* Aubl., *macrocarpus* L., *ochraceus* Bot. reg., *ocularis* Endl., *panduratus* L., *reptans* L., *scrobiculatus* Bot. reg., *tiliaceus* W., *verrucipes* Tenor., v. *Ipomoea albivenia*, *arborescens*, *palmata*, *pandurata*, *tannifolia*, *chryseidis*, *ebracteata*, *filicaulis*, *glabra*, *operculata*, *ochracea*, *ocularis*, *pandurata*, *reptans*, *scrobiculata*, *tiliacea*, *verrucipes*, — *acetosaefolius* Vahl, *cissoides* Vahl (=

Convolvulus

colycinus H. B. K.), *edulis* Thbg. (= *Batatas* L. = *esculentus* Spgl.), *glaucifolius* Spgl., *Jalapa* L., *littoralis* L. (= *arenarius* Vahl = *Imperati* Vahl = *obtusilobus* Mchx. = *sinuatus* Petagna = *stoloniferus* Cyrill.), *paniculatus* L. (= *roseus* H. B. K.), *pentaphyllus* L. (= *hirsutus* Roxb.), *quinquefolius* L. (= *palmatus* Mill.), v. *Batatas acetosaefolia* etc., p. 61, II., — *argenteus* Wall., *capitatus* Vahl, *cuneatus* W., *ellipticus* Heyne (= *laurifolius* Roxb. = *peduncularis* Wall.), *malabaricus* L., *mollis* Burm., *Roxburghii* Wall., *speciosus* L. fil. (= *nervosus* Burm.), *splendens* Hornem. etc., v. *Argyrea argentea* etc., p. 83 et 44, II., — *bicolor* Vahl, v. *Shuteria bicolor*, — *candicans* R. et S. (= *hypocrateriformis* Desr. = *hypoleucus* R. et S.), *gangeticus* Roxb. (= *tiliaefolius* Desr.) etc., v. *Rivea hypocrateriformis*, *tiliaefolia* etc., — *pentanthus* Jacq., *verticillatus* L., v. *Jacquemontia violacea* et *azurea*, — *bogotensis* W., *pudibundus* Lindl., *purpureus* L., *serotinus* DC. etc., v. *Pharbitis bogotensis*, *cathartica*, *hispida*, *serotina* etc. Hinsichtlich der übrigen s. überhaupt *Ipomoea* u. noch die Gattungen *Aniseja*, *Calonyction*, *Calystegia*, *Exogonium* et *Quamoilit*.

Conyza T. Less., Dürrwurz.

absinthifolia DC. (= *micrantha* Spgl. = *montana* et *stricta* Heyne), wermethblättrige, 4. w. Ostindien.

β) *pinnatifida* Roxb. (= *Baccharis trifurcata* Trevir. = *Erigeron pinnatifidum* Don).

chilensis Spgl. (= *diversifolia* Weinm. = *longifolia* et *procera* Dsf. H. Par. = *Blumea longifolia* et *sene-galensis* Hort.).

decurrens L. (= *glomerata* Lk.), herablaufende, ☉. f. m. Ostindien.

laxiflora Dsf., lockerblumige, ☉. f. ?

mauritiana Bojer, mascarenische, ☉. m. f. Mauritius.

pinnatifida Less. (non Roxb.) (= *Erigeron pinnatifidum* Thbg.), fiederspaltige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

viscosa Bojer, schmierige, ☉. m. f. Mauritius.

ovatifolia Hort. = ?, *candida* L., *limonifolia* Sm. et *verbascifolia* W., v. *Inula candida* et β, *squarrosa* L., v. *Inula squarrosa*.

Cookia Sonn., Cookia.

anisata Dsf., anisriechende, ♀. w. ?

macrophylla Lindl., großblättrige, ♀. w. Ostindien.

Copaifera (= *Copaiba* Adans. = *Copaiva* Jacq.),

officinalis L. (= *C. Jacquini* Dsf.).

Coprosma Forst., L. fil., Coprosma, V. r., Rubiaceae.

lucida Forst., L. fil., glänzende, ♀. k. t. Neuzeeland.

Ob *C. pilosa* Endl. (♀. Norfolkinsel) kultivirt wird, ist mir nicht bekannt.

Corallorrhiza Hall., RBr. Korallenwurz.

ericetorum Drej., Heide-K., 4. Kn. f. Dänemark (Seeland).

innata RBr. (= *C. Halleri* Rich. = *C. Neottia* Scop.).

verna Nutt. (= *innata* Eaton, non RBr.), Frühling's, 4. Kn. f. Nordamerika.

virescens Drej., grünliche, 4. Kn. Dänemark (Insel Möen).

Coralluma Haw., v. *Caralluma*, p. 159.

Corbularia Haw. Sal, v. *Narcissus* Sect. IV. p. 540.

Corchorus L., Mufspflanze.

acutangulus Lam. (= ? *tetragonus* Mill. = *aestuans* Wall., non L. = *subscandens* Wall.).

bifurcatus Mill., zweigabelige, ☉. w. Jamaika.

catharticus H. Monspel., Purgier-M., ☉. w. m. Nubien.

fascicularis Lam., büschelförmige, 4. ♀. w. Ostindien.

linearis Mill. (= ? *siliquosus* L. var. DC.), gleichbreite, ☉. w. m. Neuspanien.

hirtus et *siliquosus* Hort. (= *tetragulus* Langsd.)

= *pilolobus*, *patens* Lehm. (= *Burmanni* DC. = *senegalensis* Juss.) = *tridens*.

Cordia Plum., Brustbeere.

bifurcata R. et S. (= *Varronia bifurcata* R. et P. = *dichotoma* R. et P. = *parviflora* Hort.), zweigabelige, ♀. w. Peru.

β) *parviflora* Ortega (non Dsf.).

canescens H. B. K. = *rugosa*.

Cordiopsis Desv., Hamilt., Herzbeere, V. 1., Asperifoliaceae.

mirabiloides Desv. Hamilt. (= *Varronia mirabiloides* Jacq., p. 837 = *V. geniculata* P. = *V. bullata* Auct. = *Tournefortia serrata* L. = *Cordia mirabiloides* R. et S.).

monosperma Hamilt. (= *Varronia monosperma* Jacq., p. 837 = *V. corymbosa* Desv. = *V. ulmifolia* Dum. Cours. = *Cordia monosperma* R. et S. = *C. corymbosa* G. Don = *C. ulmifolia* Spgl.).

Cordyline Commers., Cordyline.

australis Endl. (= *Charlwoodia australis* G. Don, p. 187 = *Dracaena australis* Forst. = *D. oblecta* Grah.).

cernua Endl. (= *Dracaena cernua* Jacq. = *D. candelaria* Hort.), übergebogene, ♀. w. Mauritius.

congesta Steud. (= *Charlwoodia* et *Dracaena congesta* Sweet, p. 187).

ferrea Endl. (= *Dracaena ferrea* L. W. = *D. terminalis* Jacq., p. 274).

β) *rosea* Endl.

indivisa Steud. (= *Charlwoodia indivisa* Sweet, G. Don = *Dracaena indivisa* Forst.).

marginata Endl. (= *Dracaena marginata* Lam. = *D. angustifolia* H. Par. = *D. tessellata* W. E., p. 274), gerandete, ♀. w. Mauritius.

parviflora H. Bonpl. (= *Dracaena parviflora* W. Herb. = ? *D. ensifolia* Haw., p. 274), kleinblumige, ♀. ♀. w. Mexico.

reflexa Endl. (= *Dracaena reflexa* Lam., p. 274).

stricta Steud. (= *Charlwoodia stricta* Sweet, p. 187 = *Dracaena stricta* Sims).

dracaenoides Hort. = ?, *C. vivipara* Hort., v. *Hartwegia comosa*.

Coreopsis L., Wanzenblume.

aristata P. W. (= *aristosa* Mchx.), gegrannte, 4. f. Nordamerika.

aurea Ait. (= *arguta* Pursh = *Diatonta aurea* Nutt.). *Boykiniana* Nutt., Boykin's, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Hogg., β) *longipes* Hook.

heterophylla Nutt., verschiedenblättrige, 4. f. Arkansas.

philadelphica Hort., philadelphische, 4. f. Nordamerika.

praecox Fresen., frühe, 4. f. Nordamerika.

purpurea Moç. Sess., purpurfarbige, ☉. f. Mexico.

Coreopsis

trichosperma Michx. (= *aurea* Lindl.).

Unbestimmtere: *Ackermanni* Hort. angl., *minima* H. anglor., *sambucifolia* W. — *C. Bidens* L., *diversifolia* Jacq. (non DC.), *ferulaefolia* Jacq. etc., v. *Bidens cernua*, *grandiflora*, *ferulaefolia* etc., *filifolia* Hook., v. *Cosmidium filifolium*, *formosa* Hort. et *odoratissima* Cav., v. *Cosmea bipinnata* et *odoratissima*, p. 222. Vergl. überhaupt *Bidens* et *Calliopsis*, p. 121 u. p. 67 II, p. 147 u. p. 107 II.

Coreosma florida Spach, *viscosissima* Spach, v. *Ribes floridum* et *viscosissimum*, p. 689 et 690.

Corethrogyne bracteata H. Hügel., v. *Corethrostyles bracteata*, p. 876.

Coriandrum T. Hoffm., Coriander.

mephitense Ten. et Guss., amalfitanischer, ☉. f. Neapel.

sativum L., β) *microcarpum* DC.

testiculatum L. et *testiculatum* MB., v. *Bifora testiculata* et *radians*, p. 121.

Coriaria Nissol., Gerberstrauch.

nepalensis Wall., nepalscher, ☿. t. k. Nepal.

Corion testiculatum Lk., v. *Bifora radians*.

Corispermum L., Wanzensame.

crassifolium Stev. Turcz., dickblättriger, ☉. f. Asiat. Rußland.

glomeratum Lagasca (= *salsoloides* Hort.).

heteracanthum Ledeb., verschiedenstachelicher, ☉. f. Sibirien.

Marschallii Steven (= *bracteatum* Vivian. = ? *baccatum* et *elatum* Hort. ? = *hyssopifolium* Bertol. = *squarrosum* Vahl.).

nitidum Kitaib. (= *purpurascens* Host.).

Pallasii Steven (= *latifolium* Lk. = *pentandrum* W. Herb. = *hyssopifolium* Pall. (non L.) = *subpentandrum* Pall.), Pallas's, ☉. f. Sibirien.

sabulosum Ledeb., sandliebender, ☉. f. Sibirien.

tenuis Lk. (= *microspermum* Host.), dünner, ☉. f. Osteuropa.

Unbestimmtere: *apetalum* Hort., *marginatum* Cav., *spicatum* Dsf., *patens* R. et S. = *intermedium*, *polygaloides* Fisch. et Mey., v. *Anthochlamys polygaloides*, p. 38, II.

Cornulæa muricata Delil., v. *Kochia muricata*.

Cornus T., Hartriegel.

alba L. (= *sibirica* Lodd. = *purpurea* Tausch = *tatarica* Mill.).

sericea L'Her. (= *ferruginea* Hort.), γ) *minor* H. Par. *stolonifera* Mich. (= *alba* Auctor.), sprossentreibender, ☿. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *ferulacea* Jacq. (= *ferulaefolia* NoCCA), *latifolia* Bray (Liesland), *plicata* Tausch (= *alternifolia* Hort.), — *capitata* Wall., v. *Benthamia fragifera*, p. 117.

Coronaria coeli rosa Fries, *flos cuculi* A. Br., v. *Lychnis coeli rosa* et *flos cuculi*, p. 482.

Corone quinquevulnera et *vespertina* Hffg., v. *Silene quinquevulnera* et *vespertina*.

Coronopus Hall., v. *Senebiera*.

Correa Sm. Spgl. (= *Corraea* Ait. = *Correas* Hffg.), *Correa*.
Backhousiana Hook., Backhous's, f. t. Van Diemens Land.
cordifolia Lindl., herzblätterige, f. t. Neuholland.
glabra Lindl., kahle, f. t. Neuholland.
leucoclada Lindl., weifsästige, f. t. Neuholland.
Lawrenzia Hook., Lawrenc's, f. t. Van Diemens Land.
rotundifolia Lindl., rundblätterige, f. t. Neuholland.
speciosa Andr. (= *revoluta* Vent. = *rubra* Sm. =
Antommarchia speciosa Colla).

Hybriden aus den p. 221 u. p. 876 verzeichneten Arten
erzeugt: *alba ochroleuca et superba*, *Alexandrina*,
ampullacea, *bicolor Lowii et Knightii* (= *elegans*
maxima), *Bootheana*, *Cavendishii*, *cerina*, *cerise*, *color*
di laca, *cordata*, *densa*, *elegans*, *Goodii*, *Grevillei*,
Harrisii, *Lindleyana*, *longiflora*, *multiflora et rubra*,
mutabilis nana, *nec plus ultra*, *pumila*, *quadrangula-*
ris, *quadriformis*, *rosea et major*, *rubra elegans et*
major, *speciosa major* (= *ventricosa*), *speciosis-*
sima, *Stockwelliana*, *tricolor*, *triumphans* *Milleri*, *tur-*
gida etc.

Cortusa Gmelini L., v. *Androsace Gmelini*, p. 57.

Cortusina odoratissima Eckl. Zeyh., *reniformis* Eckl.

Zeyh., *rubropurpurea* Eckl. Zeyh., v. *Pelargonium*
odoratissimum, *reniforme*, *echinatum*, p. 595 seq.

Coryanthes macrantha Hook., *maculata* Hook., *Par-*
kerii Hook., *speciosa* Hook., v. *Gongora macran-*
tha etc., p. 364.

Corydalis Vent., Kappenmohn.

acaulis P. (= *rigidula* Tausch).

alpestris C. A. Mey., Voralpen-K., 4. f. Caucasus.

alpina Gay (= *fabacea* DC. = *intermedia* Lois. =
Fumaria intermedia Schk.), Alpen-K., 4. Kn. f.
Südeuropäische Alpen.

glauca Pursh (= *sempervirens* P.).

Lobelii Tausch (= *pumila* Host. Rchb.), Lobel's, 4.
Kn. f. Deutschland.

Corylus *Avellana* L., *a*) *sylvestris* Ait., *β*) *humilis* W.

(= ? *pumila* Lodd.), *γ*) *heterophylla* Lodd. (= *la-*

cininata et urticaefolia Hort.), *δ*) *purpurea* Lodd., *ε*)

ovata W., *ζ*) *globosa*, *η*) *depressa*, *θ*) *tubulosa* W.

(= *maxima* Mill. = *sativa rubra* Ait.), *b*) *alba*,

ι) *barcelonensis* Lodd. (= *grandis* Lodd.), *κ*) *Lam-*
berti Lodd., *λ*) *sicula* etc.

Corypha L., Schirmpalme.

Gebanga Mart. (= *Gembanga rotundifolia* Blume =
Taliera Gembanga R. et S.), *Gebanga-S.*, f. w. Java.

Miraguana H. B., *Miraguana-S.*, f. w. Cuba.

rotundifolia Lam. (= *Livistona rotundifolia* Mart.),
rundblätterige, f. w. Molucken.

sylvestris Mart. (= *Utan* Lam. = *Lontarus sylvestris*
Rumph = *Gembanga sylvestris* Blume = *Taliera*
sylvestris Bl.), *wilde*, f. w. Java, Molucken.

Palmetto Walt. et *umbraculifera* Jacq. (non L.),
v. *Sabal Palmetto et umbraculifera*.

Corysanthes macrantha Hook., *maculata* Hook., v.
Gongora macrantha etc., p. 364.

Cosmanthus Nolte, Franzenblume.

finbriatus Nolte, p. 222.

grandiflorus A. DC. (= *Eutoca grandiflora* Benth.),
grofsblumige, c. f. Californien.

Cosmanthus

mexicanus A. DC. (= *Eutoca mexicana* Benth. = *Polemonium achilleaeifolium* et *pimpinelloides* herb. Willd.), mexicanische, ☉. f. Mexico.

parviflorus A. DC. (= *Phacelia parviflora* Pursh = *Polemonium dubium* W. = *Eutoca parviflora* RBr.), kleinblumige, ☉. f. Nordamerika.

viscidus A. DC. (= *Eutoca viscida* Benth., p. 327 = *E. viscosa* Hook.).

Cosmea W. (= *Cosmos* Cav.), Cosmea.

diversifolia Fr. Otto, verschiedenblättrige, ☉. f. Mexico.

Cosmidium Nutt., Cosmidie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

filifolium Nutt. (= *Coreopsis filifolia* Hook., p. 218), ☉. f. Texas.

Costus L., Costwurz.

angustifolius Ker (= *speciosus* Sm. var. ? Ker), schmalblättrige, 4. w. Nepal.

niveus C. F. W. Meyer, schneeweiße, 4. w. Surinam.

spiralis Rosc. (= *Anachiri* Jacq. = *quintus* Aubl. = *Amonum spirale* Auct. = *Alpinia spiralis* Jacq. = *Glissanthe spiralis* Salisb.), β) *cylindricus* Jacq. (= *quartus* Aubl. = *Pisonis* Lindl.).

villosissimus Jacq. (= *septimus* Aubl.), zottigster, 4. w. Insel St. Vincent.

Cotinus Coccynia Mch. (= *C. Coriaria* Duham.), v. *Rhus Cotinus*, p. 687.

Cotoneaster Medik., Quittenmispel.

denticulata H. B. (= *Mespilus denticulata* Spgl.), gezähnelte, 5. k. Mexico.

emarginata Hoffg., ausgerandete, 5. k. ?

Fontanesii Spach (= *Mespilus racemiflora* Dsf.), Desfontaine's, 5. f. ?

Lindleyi Steud., (= *elliptica* Hort. = *laevis* Hort. = *Nummularia* Lindl. (non Fisch. et Mey.) = *Eriobotrya elliptica* Lindl. = *Mespilus Cuile* Hamilt.), Lindley's, 5. k. Nepal.

multiflora Bunge, Ledeb., vielblumige, 5. 5. f. Altai.

Nummularia Fisch. et Mey. (= *tomentosa* C. A. Mey.), pfennigkrautblättrige, 5. f. Caucasus, Arabien.

obtusata Wall., stumpfe, 5. k. Nepal.

uniflora Bunge, Ledeb., einblumige, 5. f. Altai.

Cotula L. G., Laugenblume.

multifida DC. (= *nudicaulis* Hort.), vielspaltige, ☉. f. Südafrika.

abrotanifolia W., v. *Lyonettia abrotanifolia*, p. 485, *aurea* L., *cinerea* Delil., *matricarioides* Bong., v. *Cenocline aurea* etc., p. 130, II., *microcephala* DC. (= ? *bipinnata* Thbg.), *villosa* DC., v. *Cenia microcephala*, *villosa* etc., p. 129 et 130, II.

Cotyledon T. DC., Fettblatt.

fascicularis Ait. (= *paniculata* Thbg. = *tardiflora* Bonpl.).

orbiculata L., α) *rotundifolia* DC. (Haw.), β) *obovata* DC. Außerdem werden als Abarten *C. elata* Haw.,

oblonga Haw., *ovata* Haw. et *ramosa* Haw. (= *paniculata* L. = *ramosissima* Mill. Haw.) hierher gezogen.

purpurea Thbg., purpurfarbiges, 4. 5. t. Cap d. g. H.

ungulata Lam. (= *canaliculata* Haw.).

horizontalis Guss., v. *Umbilicus horizontalis*, *pinnata* Lam., v. *Bryophyllum calycinum*, p. 135.

- Coumarouna odorata* Aubl., v. *Dipterix odorata*, p. 269.
- Couralia fluviatilis* Splitg., v. *Zeyheria fluviatilis*.
- Couroupita** Aubl. (einheimischer Name), XIII, 1., Lecythideae.
 guianensis Aubl. (= *Lecythis bracteata* W., p. 451 = *Peckea Couroupita* Juss.), guianische, ♂. ♀. w. Cayenne.
- Coursetia** DC. (Dumont de Courset, Verfasser eines Werkes über Gartenbotanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 tomentosa DC. (= *Lathyrus fruticosus* Cav. = *L. tomentosus* Auct. = *Orobus fruticosus* P. = *O. tomentosus* Dsf. = *Vicia fruticosa* W.), filzige, ♂. t. Peru.
Courtoisia bipinnatifida Rchb. (= *daucifolia* Rchb.), v. *Navarretia heterophylla*.
- Cousinia** Cass., Coussinie.
 affinis Fisch. et Mey., ähnelnde, ♂. f. Asiat. Rußland.
 alata Schrenk., Fisch. et Mey., geflügelte, ♂. f. Asiat. Rußland.
 arachnoidea Fisch. et Mey. (= *Carduus pterocaulos* Stephan. = *C. pycnocephalus alatus* Stev.), spinne-
 webenartige, ♂. f. Caucasus.
 Hystrix C. A. Mey. (= *Carthamus pterocaulos* C. A. Mey.), starkstachelige, ♂. 4. f. Caucasus, Persien.
 lappacea Fisch. et Mey., klettenähnliche, ♂. f. Asiat. Rußland.
 platylepis Fisch. et Mey., breitschuppige, ♂. f. Asiat. Rußland.
 wolgensis C. A. Meyer (= *Carduus wolgensis* MB.), wolgaische, ♂. f. Sarepta.
- Coutarea** Aubl., Coutarea.
 mexicana Mart. et Zuccar., mexicanische, ♂. w. t. Mexico.
Coutoubea verticillata G. Don, v. *Slevogtia occidentalis*.
- Crambe** T., Meerkohl.
 glabrata DC. (= *cordifolia* Dufour, non Stev.), glatter, ☉. f. Spanien.
 pinnatifida RBr. (= *laciniata* Dsf., H. Par. = *orientalis* Jacq. = *suecica* Mill.).
 strigosa L'Her. (= *fruticosa* Murray = *scabra* Lam. = *Myagrum arborescens* Jacq.).
cordata W. E. = *cordifolia*.
- Craniolaria** L., Craniolarie.
 fallax A. DC. (= *Martynia Craniolaria et proboscidea* Hort. = *M. fallax* Kunze), trügerische, ☉. m. w. ?
 integrifolia Chamiss. (= *Martynia integrifolia* Steud.), ganzblättrige, ☉. m. w. Brasilien.
 unibracteata N. E. et Mart. (= *Holoregmia viscida* N. E. = *Martynia spathacea* Speg.), eindeckblättrige, 4. ♂. w. Brasilien.
- Craniospermum** Lehm., Schädelssaame, V. I., Asperifoliaceae.
 subvillosum Lehm., wenigzottiger, 4. f. Sibirien.
- Craspedia** Forst., Speg., Craspedia.
 plebeja Cunningh., gewöhnliche, 4. ♂. t. k. Neuholland.
 uniflora Forst. (= *glauca* Speg., Lindl. = *C. Richea* Cass. = *Richea glauca* LaBill.).
Craspedaria chinensis Lk., *pertusa* Lk. et *rupestris* Lk., v. *Niphobolus Lingua*, *pertusus* et *rupestris*,

p. 549 — *ciliata* Lk. et *vaccinifolia* Lk., v. *Polypodium ciliatum* et *vaccinifolium*, p. 645 et. 655. *Crassocephalum cernuum* Mch. v. *Cremonocephalum* (Senecio Sect. III.), *cernuum*, p. 746, *sonchifolium* Less., v. *Emilia sonchifolia*, *valerianaefolium* Less., v. *Erechtites valerianaefolius* (Senecio Sect. IV. p. 746). *Crassouvia floripendula* Lam., v. *Bryophyllum calycinum*, p. 135.

Crassula L. Haw., Dickblatt.

debilis Thbg., schwaches, ♂. t. Cap d. g. Hoffn. *pharnaceoides* Fisch. et Mey. (= *Tillaea pharnaceoides* Hochst.), pharnaceumähnliches, ⊙. ♂. m. f. t. Abyssinien. *Schimperi* Fisch. et Mey., *Schimper's*, ⊙. ♂. m. f. t. Abyssinien.

sulphurea Kunze, schwefelgelbes, ♂. t. k. Cap d. g. H. Unbestimmt: *livida* H. Erford. — *articulata* Hort. = *obliqua*, *coronata* Don = *perfilata*, *lucida* Lam. (= *cordata* Lodd. et Hort., non Ait.) = *spathulata*, *lycopodioides* Lam. (= *muscosa* Thbg.) = *imbricata*, *marginata* Thbg. = *marginalis*, — *glabra* Haw., *glomerata* L., v. *Thisantha glabra*, *glomerata*.

Crataegus T. L., Weißdorn.

acanthocarpa Hort., stachelfrüchtiger, ♂. f. ?

alpina Mill., Alpen-W., ♂. f. Italien.

Aronia Bosc (= *fissa* Lodd. = *Mespilus Aronia* W.).

Bosciana Steud. (= *badiata* H. Angl. = *Mespilus badiata* Bosc = *M. Bosciana* Spach), Bosc's, ♂. f. Nordamerika.

coccinea L. (= *aestivalis* Booth = ? *viridis* L.), ε)

C. neapolitana Hort. (= *Mespilus constantin.* Godefr.).

cordata Mill. (= *acerifolia* Poir. = *corallina* L'Her.

= *phaenopyrum* Borck. = *Mespilus acerifolia* Burgsd.

= *M. corallina* Dsf. = *M. phaenopyrum* Mill.).

corymbosa Dsf. H. Par. (= *flabellifolia* Spach = *Pyrus*

edulis Wats. (non W.) = *Sorbus corymbosa* Lodd.),

traubendoldiger, ♂. f. ?

crenulata Roxb. (= *Mespilus crenulata* Don = *C. Py-*

racantha β P.), kerbiger, ♂. k. f. b. Nepal.

Crus galli L. (= *cuneifolia* Lodd. = *lucida* Wangenh.

= *Mespilus Crus galli* Poir. = *M. cuneifolia* Mch.

= *M. hyemalis* Walt. = *M. lucida* Ehrh.), ε) *linearis*

P. DC. (= *Poiretiana* DC. = *Mespilus linearis*

Dsf. Poir.), ζ) *nana* Sweet (= *Mespilus nana*

Dum. Cours.).

cuspidata Spach (= *Sorbus vestita* Lodd. = *Pyrus*

nepalensis Hort.), zugespitzter, ♂. f. b. k. Nepal.

elliptica Ait. (= *prunifolia* Bosc Poir. = *Mespilus*

elliptica W.), elliptischer, ♂. f. Nordamerika.

fissa Bosc (= *cordata* Mill. var. Spgl. = ? *incisa* Hort.

= *Mespilus fissa* Poir.), gespaltener, ♂. f. Nordamer.

flava Ait. (= *flavissima* Hort. = *caroliniana* P. =

Mespilus caroliniana Poir. = *M. flava* W. = *M.*

flexispina Mch.).

flavescens Bosc (= *Mespilus flavescens* Bosc), gelb-

licher, ♂. f. ?

flexuosa Poir. (= *pyrifolia* Ait. var. Spgl. = *Mespilus*

flexuosa Bosc), gebogener, ♂. f. Carolina.

florentina Zucc. (= *Mespilus florentina* Bertol. = *Pyrus*

crataegifolia Savi), florentinischer, ♂. f. Italien.

Fontanesiana Steud. (= *Mespilus Crus galli* Dsf. h. Par.

Crataegus

- = *M. Fontanesiana* Spach = *M. glandulosa* Bosc, non W.), Desfontaine's, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.
glabra Lodd., kahler, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.
glandulosa Ait. (= *rotundifolia* Borckh. = *Mespilus glandulosa* W. = *M. rotundifolia* Ehrh. = *Pyrus glandulosa* Mch.) ¹⁾, drüsiger, f. Nordamerika.
 β) *succulenta* Fisch., Schrad., γ) *subvillosa* Fisch.,
 δ) *macracantha* Lodd. (= *spina longissima* Lee).
heterophylla Flügge (= *monogyna* Jacq. var. Spgl. = ? *Mespilus constantinopolitana* Hort.). Vaterland unbekannt.
laciniata Ucria, schlitzblättriger, \mathfrak{h} . f. Sicilien.
laevigata DC. (= *Oxyacantha* L. var. Spgl.), glatter, \mathfrak{h} . f. Vogesen.
microcarpa Lindl. (= *spathulata* Ell., non Mch.), kleinfrüchtiger, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.
orientalis MB., β) *sanguinea* Schrad. (= *tanacetifolia* β *taurica* DC.).
prunellaeifolia Bosc (= *Mespilus prunellaeifolia* Poir. = *M. prunifolia* Poir. var. Spgl.), prunellenblättriger, \mathfrak{h} . f. ?
punctata Ait. (= *cuneifolia* Borckh. = *Mespilus cornifolia* Poir. = *M. cuneifolia* Ehrh.).
pyrifolia Ait. (= *C. Calpodendron* Borckh. = *edulis* Lodd. = *Mespilus Calpodendron* Ehrh. = *M. pyrifolia* W.).
sanguinea Pall. (non Schrad.) (= *purpurea* Bosc = *Mespilus purpurea* Poir. = *sanguinea* Spach), blutrother, \mathfrak{h} . f. Sibirien.
spathulata Mchx. (= *virginica* Lodd. = *viridis* Hort. = *Mespilus spathulata* Spgl.).
spinosissima Lodd., dornigster, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.
stipulacea Lodd. (= *Mespilus Loddigesiana* Spach = *M. stipulacea* Dsf.), zwischenblättriger, \mathfrak{h} . f. ?
tanacetifolia Pursh (= ? *Celsiana* Bosc).
Trewiana (Tausch) (= *Crus galli* Trew.), Trew's, \mathfrak{h} . f. ?
trifoliata DC. (= *Mespilus trifoliata* Bosc), dreiblättriger, \mathfrak{h} . f. ? Nordamerika.
turbinata P. (= *flava* β *lobata* Lindl.).
unilateralis P. (= *Mespilus unilateralis* Poir.), einseitiger, \mathfrak{h} . f. Carolina.
Watsoniana Steud. (= *Mespilus Crus galli* Wats. = *M. Watsoniana* Spach), Watson's, \mathfrak{h} . f. Nordamer.
 Unbest.: *corallina* (Tausch), *lancifolia* Wender., *media* Bechst., *serratifolia* Dsf., *sorbifolia* Dsf., *umbellata* Dsf.
 lobata Bosc, v. *Mespilus Smithii*, p. 521, *obtusata* Spach, v. *Sorbus obtusata*, *rubra* Wender., v. *C. monogyna punicea*.
- Crataeva** L., Crataeva.
Adansonii DC. (= *laeta* DC. = *Tapia* Adans.), Adanson's, \mathfrak{h} . w. Senegal.
odora Hamilt. (= *religiosa* Hamilt. = *Roxburghii* RBr. p. 229 = *Tapia* Vahl, non L.).
religiosa Forst., heilige, \mathfrak{h} . w. Malabar. Societätsinseln.
Crematostemon capense Hort., v. *Olinia capensis*.
- Cremocephalum cernuum** Cass., v. *Senecio*, Sect. III., p. 746.

1) *C. sanguinea* Pall. gehört nicht hierher.

Cremopyllum Scheidw., Nickblatt, ? XI. III, Euphorbiaceae.

spathulatum Scheidw., spatelförmiges, ⚥. t. Mexico.
Crepis L. Mönch, Pippau.

A. Genuinae.

abyssinica Schultz, abyssinischer, ☉. f. Abyssinien.
baicalensis Ledeb. (= *elegans* Fisch. = *Prenanthes diversifolia* Ledeb. = *P. versicolor* Fisch.).
corymbosa Tenore, β) *glabra* C. A. Mey.
laevigata Dumort., glatter, ♂. f. Belgien.
lappacea W., klettenähnlicher, ☉. f. ?
multiflora Sibth., Sm., vielblumiger, ☉. f. Thracien.
parviflora Dsf., Aegypten, }
pauciflora Dsf., Orient, } vergl. p. 229.

II. *Brachyderea* Cass.

lacera Tenore (= *latialis* Sebast.) ¹⁾.
rigida W. Kit (= *latifolia* Balb. = *Hieracium pannonicum* Jacq.).

III. *Phaegasium* Cass.

pulchra L. (= *Phaegasium lampanoides* Cass. = *Chondrilla pulchra* Lam. = *Intybellia pulchra* Monn. = *Lapsana pulchra* Vill. = *Prenanthes hieracifolia* W. = *P. pulchra* DC. = *P. viscosa* Baumg. = *Sclenophyllum pulchrum* Gaud.).

β) *lampanifolia* Rchb.

IV. *Geracium* Rchb. (= *Intybelloides* DC.).

Froelichiana DC. (= *auriculaefolia* Froel. = *G. parviflorum* Rchb. = *Hieracium parviflorum* Schleich. = *H. praemorsum corymbosum* Gaud.).

V. *Aetheorrhiza* Cass.

bulbosa Tausch. (= *Hieracium bulbosum* W. = *Leontodon bulbosus* L. etc.).

VI. *Calliopea* Don.

aurea Cass., Tausch (= *Andryala aurea* Scop. = *Apargia aurea* Hoppe = *Geracium aureum* Rchb. = *Hieracium aureum* Scop. = *Leontodon aureus* L.).

VII. *Berinia*.

tenuifolia W., v. *Barkhausia tenuifolia*, p. 60, II.

VIII. *Catonia*.

alpestris Tausch (= *albida* All.).
Columnae Froel. (= *Apargia lucida* Tenore = *Catonia crocea* Moessl. = *Hieracium Columnae* Tenore = *parvulum* et *pumilum* Tenore), Columna's, 4. f. Calabr.
grandiflora Tausch (non W.) (= *Hieracium grandiflorum* All.).

β) *conyzaefolium* (Gouan), γ) *leucopappum* (P.).

heterogyna Froel. (= *Hieracium glaucum* Asch. = *H. stuppeum* Rchb. = *H. Tommasinii* Host.), verschiedenweibiges, 4. f. Istrien, Dalmatien.

Jacquini Tausch (= *Froelichii* Steud. (non DC.) = *chondrilloides* Froel. (non Jacq.) = *Hieracium chondrill.* Jacq. = *H. rhaeticum* et *taraxacifolium* Froel.).

lyrata Froel. (= *Hieracium lyratum* L.).

macrocephala DC. (= *grandiflora* W., non Tausch), gröfßköpfiger, 4. f. ?

pinnatifida Froel. (= *Hieracium pinnatifidum* W.), fiederspaltiger, 4. f. Armenien.

1) Herba venenatissima, vulgo „Angina“ et „Cichoria di montagna dicta“, Endl. Catal. hort. acad. Vindob. I. p. 426.

Crepis

pygmaea L. (= *Hieracium prunellaeifolium* Gouan. = *H. pumilum* L. = *H. pygmaeum* L.).

Crescentia L., Crescentie.

cucurbitina L. (= *latifolia* Lam. Mill.).

edulis Desv., genießbare, f. w. Neuspanien.

Crinitaria biflora Cass. (= *punctata* Cass.), v. Aster-IX. Sect., *Galatella punctata*, p. 99 et p. 51, II.

C. Linosyris Less., v. *Linosyris vulgaris* (= *Chrycocomma Linosyris*, p. 194), *viscidiflora* Hook., v.

Bigelovia viscidiflora, p. 68, II.

Crinum L., Hackenlilie.

asiaticum L. (= *americanum* Redout. = *floridanum* Fraser = *toxicarium* Roxb.), β) *plicatum* Livingst., Hook., γ) *declinatum* Herb., δ) *bracteatum* W. (= *brevifolium* Roxb.), ϵ) *sinicum* Carey (= ? *Sinense* Lodd.), ζ) *angustifolium* Herb.

australasicum Herb., neuholländische, 4. Zw. w. Neuholland, Ostindien.

β) *confertum* Herb., γ) *angustifolium* RBr., δ) *arenarium* Sims, ϵ) *blandum* Bot. mag., ζ) *verecundum* Herb.

Broussonetii Herb. (= *Broussonetianum* Sweet = *yuccaeoides* Herb. = *yuccaeiflorum* Salisb. = *Amaryllis Broussonetii* Red. = *A. Jagus* Hort. = *A. longa* Hort. = *A. ornata* Ker = *A. spectabilis* Andr. = *A. yuccaeoides* Thomps.).

capense Herb. = *longifolium* Thbg. = *Amaryllis bulbisperma* Burm. = *A. capensis* Mill. = *A. longifolia* L'Her., Ait.) β) *longiflorum* Herb., δ) *riparium* Herb.

Commelyni Jacq. (= *angustifolium* Hort. = *Dieterichii* Schult.).

concinnum Mart., nette, 4. Zw. w. Brasilien.

distichum Herb. (= *Amaryllis disticha* Bot. mag. (non L.) = *A. ornata* Afz. = *A. scillifolia* Hort.).

erubescens Ait. (= *rubrolimbium* Sweet = *americanum* Rodsch., non L.), β) *corantinum* Herb., γ) *octoflorum* Herb., δ) *aquaticum* Herb., ϵ) *glabrum album* Herb., ζ) *undulatum* Hook. (= ? *attenuatum* W.).

giganteum Andr. (= *petiolatum* Herb. = *Amaryllis candida* Tratt. = *gigantea* Ait. = *A. Jagus* Thomps. = *A. ornata* β Bot. mag.), β) *spectabile* Herb.

graciliflorum Kunth et Bouché, schlankblumige, 4. Zw. w. ?
Herbertianum Schult. (non G. Don) (= *strictum* Herb.), Herbert's, 4. Zw. w. Zeylon.

inodorum Tausch (= *americanum* H. Prag.), geruchlose, 4. Zw. w. ? Südamerika.

latifolium Roxb. (= *amabile* Roxb.).

Lindleyanum Schult. (= *revolutum* Lindl. = *undulatum* Hook. var. ?), Lindley's, 4. Zw. w. Ostindien.

odoratissimum Tausch (= *erubescens* H. Prag., non Ait.), wohlriechendste, 4. Zw. w. ?

Osbeckii Schult. (= *Amaryllis Osbeckii* Dsf.), Osbeck's, 4. Zw. w. ?

Paxtoni Herb., Paxton's, 4. Zw. w. Ostindien.

pratense Herb., Wiesen-H., 4. Zw. w. Ostindien.

β) *longifolium* Roxb., γ) *lorifolium* Roxb.

revolutum Herb. (= *Herberti* G. Don = *Amaryllis revoluta* Ait. = *A. variabilis* Jacq.), zurückgerollte 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.

Crinum

rigidum Herb., starre, 4. Zw. w. Ostindien.

β) *sumatranum* Roxb., γ) *macrocarpum* Carey.
scabrum Sims (= *scaberrimum* Sims = *undulaefolium* Herb.).

strictum Hornem. (non Herb.) et Bot. mag., steife, 4. Zw. w. Südamerika.

submersum Herb. (= ? *Binsii* Hffg. = *erubescens* Ait. var. Sogl.).

variable Sweet (= *crassifolium* Herb. = *Amaryllis revoluta* β Bot. mag.), veränderliche, 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.

β) *roseum* Bot. reg. (= *Amaryllis variabilis* Jacq.).
Zaguapana H. Booth., Zaguapana-H., 4. Zw. w. ? Südamerika.

zeylanicum L., Herb. (= *latifolium* Andr. = *Amaryllis ornata* Bot. mag. (β Ait.) = *A. zeylanica* L.), β) *longistylum* Herb., γ) *insigne* Schult. (= *Amaryllis insignis* Ker), δ) *Careyanum* Herb. (= *mauritianum* Lodd. = *ornatum* Carrey), ε) *speciosum* Sims (= *speciosissimum* Herb.), ζ) *moluccanum* Roxb. (= *Amaryllis moluccana* Sogl.).

Hybriden: *americano-brevifolium* Herb., *americano-capense* Herb., *americano-erubescens* Herb. (= *duplex* Herb.), *brevifolio-capense* Herb., *canaliculato-capense* Herb. (= *fertile* Herb.), *candidum* Herb. (= *americano-bracteatum* Hort.), *capensi-erubescens* Herb., (= *bulbulosum* Herb.), *Cooperi* Herb. (= *specioso-longifolium* Hort.), *corantino-canaliculatum* Herb., *cruento-erubescens* Herb., *cupitum* Herb. (= *cruento-capense* Herb.), *Digweedii* Herb. (= *scabro-americanum* Hort.), *diversum* Herb. (= *Careyano-tortuosum* Hort.), *egregium* Herb. (= *pedunculato-riparium* Hort.), *elongatum* Herb., (= *corantino-capense* Herb. = *erectius* Herb.), *erubescenti-capense* Herb., *exaltato-scabrum* Herb., *exaltato-speciosum* Herb., *felix* Herb. (= *latifolio-capense* Hort.), *flaccido-brevifolium* Herb., *flaccidulum* Herb. (= *specioso-defixum* Hort.), *Forbesi-Careyanum* Herb. (= *promissum* Herb.), *Govenianum* Herb. (= *zeylanico-capense* Herb.), *Highclerianum* Herb. (= *asiatico-capense* Hort.), *ingens* Herb. (= *pedunculato-capense* Herb.), *lorifolio-defixum* Herb., *microspermum* Herb. (= *revoluto-capense* Hort.), *mirabile* Herb. (= *flaccido-canaliculatum* Herb.), *modestum* Herb. (= *specioso-capense* Hort.), *moluccano-capense* Herb., *praestans* Herb. (= *canaliculato-riparium* Hort.), *pudicum* Herb. (= *Careyano-capense* Herb.), *pulchrum* Herb. (= *scabro-erubescens* Herb.), *quadruplex* Herb. (= *candido-fertile* Hort.), *rubricaulis* Herb. (= *erubescenti-bracteatum* Hort.), *scabro-capense* Herb., *Spofforthianum* Herb. (= *Herbertianum* Sweet), *tortuosum* Herb. (= *defixio-capense* Herb.), *toxicario-capense* Herb., *triplex* Herb. (= *Careyano-fertile* Hort.), *unicum* Herb. (= *flaccido-bracteatum* Hort.), *zeylanico-americanum* Herb., *zeylanico-capense* Herb., *zeylanico-erubescens* Hort. (= *Baconi* Herb.), *zeylanico-pedunculatum* Herb. (= *amatum* Herb.).

Unbestimmtere: *hybridum* Hort., *javanicum* Hort. — *Candelabrum* Hort. *falcatum* Jacq., v. *Brunswigia multiflora* et *falcata*, p. 135, *caspium* Pall., v. *Allium*

Crinum

caspium, p. 29, *Forbesii* Schult., v. *Amaryllis Forbesii*, p. 44, *speciosum* L., v. *Vallota purpurea*, p. 836, *speciosum* Hort., v. *Pancratium speciosum*, p. 852, *spirale* Andr. (= *tenellum* Jacq.), v. *Carpolyza spiralis*, p. 122, II., *urceolatum* R. et P., v. *Urceolina pendula*, p. 831.

Cristaria Cav., Kammmalve.

betonicaefolia P. (= *Sida chilensis* Spgl.), betonienblättrige, ♂. ♀. t. Chili.

Berteriana Hort. bot. (= ? *Sida Berteriana* Balb.), Bertero's, ☉. ♀. m. f. w. Portorico.

heterophylla Hook. Arn. (= *Sida heterophylla* Cav.), verschiedenblättrige, ☉. 4. f. t. Chili.

multifida P. (= *Sida multifida* Cav. = *pterosperma* L'Her.), vieltheilige, ☉. f. Peru.

Critamus dahuricus Hoffm. (= *Cicuta dahurica* Fisch.), v. *Falcaria dahurica*.

Critesion geniculatum Rafin., v. *Hordeum jubatum*, p. 403.

Crithmum T., Meerfenchel.

maritimum L. (= *Cachrys maritima* Spgl.), β) canariense Cav.

campestre Güldenst. (= *mediterraneum* MB.), v. *Silaus longifolius*, *latifolium* L., v. *Astydamia canariensis*, *pyrenaicum* Forsk., v. *Deverra tortuosa*.

Critonia P. Br., Critonie, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

Dalea DC. (= *Calydermos jamaicensis* Spgl. = *Eupatorium Dalea* L. = *Wickstroemia glandulosa* Spgl. = *Isocarpha Berterii* Balb.), Dalea's, ♀. w. Jamaika.

parviflora DC. (= *Eupatorium Dalea* Hort. = *E. parviflorum* Sw., non Aubl.), kleinblumige, ♀. w. Jamaika.

Crocodylium Galactites Dum. Cours., v. *Galactites tomentosa*, p. 342, *syriacum* Spgl., v. *Centaurea Crocodylium*, p. 177.

Crocoxylon excelsum Eckl. Zeyh. (= *Ilex crocea* Thbg.), v. *Elaeodendron croceum*.

Crocus T., Safran.

argenteus Sabin. Sweet (= *biflorus* Mill. var.), silberfarbiger, 4. Zw. f. ?

aureus Sm. (= *lagenaefflorus* var. η Sm. = *moesiacus* Sims), goldfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa, England.

banaticus Heuff., banatischer, 4. Zw. f. Banat.

biflorus Mill. (? = *praecox* Haw. = *vernus* β *bicolor* Adam., Silberlacken, Hort. Holland).

Boryi Gay, Bory's, 4. Zw. f. Griechenland, Cephalonien.

byzantinus Parkins., Ker, byzantinischer, 4. Zw. f. Türkei.

Cambessèdianus Gay., Cambessède's, 4. Zw. f. Majorka.

Cartwrightianus Herb., Cartwright's, 4. Zw. f. Levante, Canea.

β) *creticus* Herb.

Clusianus Gay, Clusiu's, 4. Zw. f. ? Südeuropa.

damascenus Herb., Damascener-S., 4. Zw. f. Syrien.

Imperati Tenore (= *incurvus* Don = *minimus a italicus* Gay. = *recurvus* Hort.).

insularis Gay., Insel-S., 4. Zw. f. Corsica, Sardinien.

a) major, b) medius, c) minimus (DC.), d) geminiflorus.

Crocus

- iridiflorus Heuff. (= *multifidus* et *speciosus* Rochel et plur. Auct. = *banaticus* Gay., non Heuff.), schwertelblumiger, 4. Zw. f. Banat, Ungarn, Siebenbürgen.
 lacteus Sabin. Haw., β) *penicillatus* Sabin.
 laevigatus Bory et Chaub., glatter, 4. Zw. f. Griechenland.
 nervifolius Rchb., nervigblättriger, 4. Zw. f. ?
 nudiflorus Sm. (= *autumnalis* Brotero = *fimbriatus* Lapeyr. = *medius* Balb. = *serotinus* Salisb.).
 odorus Bivon. Bernard. (= *longiflorus* Rafin. = *neapolitanus* Hoppe = *sativus* Bivone).
 β) *longiflorus* Herb.
 pulchellus Herb., hübscher, 4. Zw. f. Byzanz, Athos.
 pusillus Tenore (= *biflorus* Tenorii Rchb. = *minimus* Tenore = *nanus* Herbig = *sativus minor* Savi = *vernus* Sebast. Mauri.), β) *Janii* (= *vernus* Janii Rchb. = *lineatus* Jan.).
 sativus L. (= *hybernus* Frivaldsky = *autumnalis* Sm. = *officinalis* P.).
 sculus Tineo (= *minimus* Red. var. ? Cesati), sicialianischer, 4. Zw. f. Sicilien.
 stellaris Sabin. Haw. (= ? *stellatus* Hort.).
 suaveolens Bertol. (= *Imperati* Colla (non Tenor.) = *sativus* Tenore), feinriechender, 4. Zw. f. Italien.
 Susianus Ker (= *praecox* H. Berol.).
 Tournefortianus Gay., Tournefort's, 4. Zw. f. ? Levante.
 vernus All. (= *acutiflorus* Opitz = *Reineggeri* Opitz *sativus* β *vernus* L.), β) *obovatus* Haw. (= *neapolitanus* Sims), γ) *pictus* Tausch, δ) *semifasciatus* Tausch.
Croilema Auct., v. *Chroilema*, p. 141, II.
- Crossandra** Salisb., Franzenbeutel.
 infundibuliformis N. E. (= *undulaefolia* Salisb., p. 233 = *Justicia infundibuliformis* L. = *Ruellia infundibuliformis* Andr. = *Harrachia speciosa* Jacq. fil.).
 spicata Hamilt. (= *Ruellia auriculata* Wall.), ähriger, 4. w. Ostindien.
- Crotalaria** T. L., Klapperschote.
 anthylloides Lam. (= *calycina* Schrk. = *crenata* Wall. = *linearis* Wall. = ? *nepalensis* Lk. = *Roxburghiana* DC. = *stricta* Roxb.).
 biflora L. (= *hirta* Roth (non W.) = *nummularia* W. = *Rothii* Spgl. = *Rothiana* DC. = *Astragalus biflorus* L.).
 Bojeri Sweet (= *dichotoma* Boj., nec Alior.), Bojer's, \mathfrak{h} . \mathfrak{h} . w. Madagascar.
 brasila Schrank, Zuccar., brasilianische, \mathfrak{h} . \mathfrak{h} . w. Brasil.
 Brownei Berter. (= *lanceolata* Roxb. = *latifolia* Roxb.).
 cytisifolia Hffg., Geißkleeähnliche, \mathfrak{h} . w. Peru.
 cytisoides Roxb. (= *psoralioides* Don = *Priotropis cytisoides* W. A.).
 digitata Hook. (= *quinquefolia* Hook. = *tomentosa* Wight), fingerförmige, \mathfrak{h} . w. Ostindien.
 Drummondii H. Anglor., Drummond's, \mathfrak{h} . k. t. ?
 formosa Grah., schöne, 4. w. Ostindien.
 genistella H. B., Ginster-K., 4. w. t. Südamerika.
 genistoides Lam., Ginsterähnliche, \mathfrak{h} . k. Cap d. g. H.
 hirsuta W. (= *clavata* Roxb.).
 Hookeri Walk. Arn., Hooker's, \mathfrak{h} . w. Insel St. Vincent.
 impressa N. E., eingedrückte, \odot . w. m. f. Abyssinien.
 juncea L. (= *benghalensis* Lam. = *fenestrata* Sims =

Crotalaria

- perrecta* Wall. = *sericea* W. = *tenuifolia* Hornem., Roxb. = *viminea* Wall.).
- laburnifolia* L. (= *pedunculosa* Desv. = *pendula* Bertero = *Clavulium pedunculatum* Desv.).
- linifolia* L. (= *caespitosa* Roxb. = *diffusa* Roxb. = *tecta* et *montana* Heyne = *sobolifera* Grah.).
- Linkiana* Steud. (= *diffusa* Lk., p. 234, non Arrab.).
- lupulina* DC., hopfenähnliche, ☉. m. f. Mexico.
- macrophylla* Weinm., großblättrige, ♀. ♀. w. Ostindien.
- medicaginea* Lam. (excl. Synon. W. et Roth. (= *divaricata* Grah. = *foliosa* W. = *procumbens* Roxb.).
- mollis* Weinm. (non E. Mey.), weiche, ♀. t. China.
- pilosa* Mill., behaarte, ☉. w. m. f. Vera Cruz.
- pubera* Vahl (= ? *pubescens* Hort.), feinhaarige, ♀. w. Westindien.
- pulchella* Andr. (= *Calobata pulchella* Eckl., Zeyh. = *Lebeckia decipiens* E. Mey. = *L. pulchella* Walp.).
- pulcherrima* Roxb. (= *cuneata* Hort. Mission. = *pulchra* Andr. = *tetrasperma* Dietr.).
- purpurea* Vent. (= *elegans* Hort. = *speciosa* Hort.).
- retusa* L. (= *cuneifolia* Schrk. = *Dolichos cuneifolia* Forsk. = *Lupinus cochinchinensis* Lour.).
- sagittalis* L., β) *bialata* Schrank.
- Schimperi** (= *striata* A. Br.), Schimper's, ☉. w. m. f. Abyssinien.
- splendens* Vogel, schimmernde, ♀. t. China (Macao).
- styracifolia* Hornem., Dsf., Storaxblättrige, ♂. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- Trifolium* W. (= *medicaginea* W. (non Lam.) = *stricta* Roth. = *virgata* Roxb. = *Lupinus trifoliatum* Rottl.), kleeblättrige, 4. ♀. w. Ostindien.
- undulata* Knowl. et Westc., wellenförmige, ♀. t. Mexico.
- Willdenowiana* DC. (= *genistoides* W. (non Lam.) = *spartioides* Speg.), Willdenow's, ♀. t. k. Cap d. g. H.
- Unbestimmtere: *magnifolia* Tenore, *pubescens* Hort.
- argentea* Jacq., v. *Argyrolobium argenteum*, p. 44, II., *cuneiformis* Lam., v. *Rafnia cuneifolia*, p. 675, *floribunda* Lodd., v. *Loethainia (Wiborgia) floribunda*, *glycinea* Lam., v. *Fagelia bituminosa*, p. 328, *oxalidifolia* Hort., v. *Loddigesia oxalidifolia*, p. 474.
- Croton** L., Croton.
- adenophyllum* Bertero, drüsenblättriger, ♀. w. Jamaika.
- althaeifolium* Mill. (non Vahl), eibischblättriger, ♀. w. Jamaika.
- angustifolium* Hort., schmalblättriger, ♀. w. Ostindien.
- argyranthemum* Mchx. (= *punctatum* Jacq.), silberblumiger, ♀. k. Nordamerika.
- elaegnifolium* Vahl, Oleasterblättriger, ♀. w. ?
- hircinum* Vent., stinkender, ♀. w. Ostindien.
- hirtum* L'Her., rauher, ☉. w. m. Westindien, Mexico.
- lucidum* L. (= *pallens* Sw. = *portoricense* Vahl = *spicatum* Berg.).
- rosmarinifolium* Cunn., rosmarinblättriger, ♀. t. Neuh.
- Tigilium* L. (= *Jamalgota* Hamilt.).
- Unbestimmtere: *pentaphyllum* Hort., *salviaefolium* Mill. *digitatum* Fisch., v. *Manihot digitata*, *lobatum* L., v. *Astraea lobata*, p. 52, II., *pictum* Hort. (= *variegatum* L.), v. *Codiaeum chrysostictum*, p. 876, *plicatum* Vahl etc., v. *Crozophora plicata* etc.

- Crotonopsis argentea** Pursh (= *linearis* Pursh, Mchx. *Friesia argentea* Sngl.), β) elliptica W., vergl. p. 236.
- Crowea** Sm., Crowea.
canaliculata H. Belg., rinnenförmige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
myoporoides Hort. = ? *Chorilaena myoporoides*, p. 140, II.
- Crozophora** Neck., Crozophore.
plicata Juss. (= *Croton plicatum* Vahl = *C. tinctorium* γ Lam.), gefaltete, \odot . m. f. Ostindien, Arabien.
verbascifolia Juss. (= *Croton verbascifolium* W.), königskerzenblättrige, \odot . f. Griechenland.
- Crucianella** L., Kreuzpflanze.
chlorostachys Fisch. et Mey., grünährige, $\frac{1}{2}$. f. Caucasus.
Decaisnei Steud. (= *hispidula* Dec, non Fisch. et Mey. ?), Decaisne's, \odot . f. Arabien.
exasperata Fisch. et Mey., rauheste, $\frac{1}{2}$. f. Persien.
gilanica Trin. (= *glauca* Rich.).
molluginoides MB. (= *anomala* Balb. = *Asperula molluginoides* Rehb. = *A. tubiflora* Hort. = *Galium longiflorum* Güldenst.).
rigida Tausch (= *Asperula brevifolia* Vent. = *A. rigida* Sibth., Sm., p. 90).
Cruciella candida Lesch., v. *Xanthosia rotundifolia*, p. 859.
- Crupina** P. Cass., Bartflockenblume, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.
Crupinastrum Moris, sardinische, \odot . f. Sardinien.
vulgaris P. Cass. (= *pauciflora* Kar. et Kiril. = *Centraurea Crupina* L., p. 179 = *C. acuta* Lam.).
- Crusea** Cham. et Schltl., Crusea.
aspera Bartl. (= *rubra* Cham. et Schltl. excl. Synon.), rauhe, \odot . m. f. Mexico.
rubra Bartl. (= *strigosa* H. Monac. = *Spermacoce rubra* Jacq. = *strigosa* Sims = *S. longiflora* H. B. K.).
Cryphaea erecta Hamilt., v. *Chloranthus erectus*, p. 139, II.
- Cryphiacanthus** N. E., Kleinklau, XIV. II., Acanthaceae.
barbadensis N. E. (= *Ruellia clandestina* L. et R. *tuberosa* L., p. 705 et 706), barbadensischer, $\frac{1}{2}$. w. Antillen.
lacteus N. E. (= *Ruellia lactea* Cav., p. 705).
- Crypsis** Ait., Dornengras.
geniculata R. et S. (= *alopecuroides* Schrad. var. Trin. = *Alopecurus geniculatus* Sibth. = *Phalaris geniculata* Sibth. Sm.), gelenkförmiges, \odot . f. Griechenland.
- Cryptadenia** Meissn., Cryptadenie, VIII. I., Thymeleaceae.
uniflora Meissn. (= *Passerina uniflora* L., p. 588).
- Cryptandra** Sm., Hüllbeutel.
arbutifolia Fenzl. (= *arbutiflora* Hort., p. 237).
buxifolia Fenzl, buchsbaumblättriger, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
pomaderroides Rissek, wesenstrauchähnlicher, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
propinqua Cunningh., verwandter, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
suavis Lindl., lieblichriechender, $\frac{1}{2}$. t. Schwanenfluß.
tubulosa Fenzl, röhriger, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
spinosa Cunningh., v. *Solenanthe spinosa*.
- Cryptocalyx** Benth., Ohnkelch, XIV. II., Verbenaceae.
nepetaefolia Benth., katzenmünzenblättriger, \odot . m. Guiana.

Cryptocarya RBr, Kelchnufs.

Peumus N. E. (= *Adenostemon nitidum* Bert. = *Laurus Peumus* Dombey, Hook. = ? *Peumus rubra* Molin.), chilesische, ♀. t. w. Chili.

Cryptocoryne Fisch., Cryptocoryne, XX. ix., Aroideae. *ciliata* Fisch. et Blume (= *Ambrosinia ciliata* Roxb.), gewimperte, ♀. w. Bengalen, Java, Amboina.

spiralis Fisch. (= *Arum spirale* Retz. Sims, p. 86 = *Ambrosinia spiralis* Roxb.).

Cryptodiscus Schrenk., C. A. Mey., Kleinscheibler, V. II., Umbelliferae.

cachroides Schrenk., C. A. Mey., nufsdoldenähnlicher, ♂. f. Südl. Sibirien.

Cryptolepis elegans Wall., Ostindien. Zu berichtigen p. 237.**Cryptomeria** Don, Endl., Cryptomerie, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

japonica Don (= *Cupressus jap.* Thbg. L. fil.), japanische, ♀. k. Japan.

Crptophragmium N. E., venustum N. E., v. *Justicia*, Sect. IV., p. 434.

Cryptopyrum Richardsonii Hort. bot., v. *Triticum Richardsonii* Schrad., p. 824.

Cryptosanus Scheidw., Cryptosanus, XX. i. Orchideae. *scriptus* Scheidw., brasilianischer, ♀. w. Brasilien.**Cryptotaenia** DC, Fadendolde, V. II., Umbelliferae. *canadensis* DC. (= *Chaerophyllum canadense* P. = *Conopodium canadense* K., p. 214 = *Cyrtospermum trifoliatum* Rafin. = *Myrrhis canadensis* G., Nutt. = *Scandix ternata* Mch. = *Sison canadense* L. = *Sium canadense* Lam.).

Thomasii DC. (= *Sison Thomasii* Tenore), Thomas's, ♀. f. Calabrien.

Cucullaria excelsa W., v. *Vochysia excelsa*, p. 853.

Cucumis T. Gurke.

abyssinicus Hort., abyssinische, ⊙. m. f. Abyssinien.

campechianus H. B. (= *prophetarum* L. var. Spgl.), Campeche-G, ⊙. m. f. Südamerika.

dipsaceus, Ehrbg., kardenähnliche, ⊙. m. f. Gegend des rothen Meeres.

Dudaim L. (= *odoratissimus* Mch.).

flexuosus L, β) *reflexus* Zeyh.

macrocarpus Wender., großfrüchtige, ⊙. m. f. Brasilien.

Melo L. (= *bucharicus* Hort. = *erivanicus* Hort. = *sacharinus* Hort. = *verrucosus* Hort. = *viridis* Hort.),

β) *princeps* Wender.

metuliferus E. Mey., säulentragende, ⊙. m. f. Südafrika.

pedatifidus Schrad., fiederspaltige, ⊙. m. f. ?

prophetarum L. (= *grossularioides* Hort.).

pseudocolocynthis Wender. (= ? *colocynthis* Hort.), Coloquintenähnliche, ⊙. m. f. ?

pubescens W. (= *maderaspatanus* Roxb. Wall.).

Reginae Schrad., königliche, ⊙. m. f. ?

sativus L., ζ) *semperfructiferus*.

serotinus Haberle, späte, ⊙. m. f. Türkei.

amarissimus Schrad., *caffer* (Eckl., Zeyh.), *Colocynthis* L., *Citrullus* Sering., v. *Citrullus amarus* etc., p. 146, II.

Cucurbita T., Kürbis.

asteroides Schrad., sternförmiger, ⊙. m. f. ?

ceratoceros Haberle, hörnerfrüchtiger, ⊙. m. f. ?

Cucurbita

- cucumifera Schrad., gurkentragender, ☉. m. f. ?
 elongata Beauv., Schrad., verlängerter, ☉. m. f. ?
 foetidissima H. B., stinkender, ☉. m. f. Mexico.
 lignosa Mill., holziger, ☉. m. f. Mittägl. Amerika.
 mammeata Molina, zitzenähnlicher, ☉. m. f. Chili.
 marsupiformis Jacq., Haberle, beutelförmiger, ☉. m. f. ?
 maxima Duch. (= *Potiro* P. = *Pepo macrocarpus* Rich.).
 medullaris Haberle, markreicher, ☉. m. f. ?
 Melopepo L. (= *C. polymorpha* Melopepo Duch. =
Pepo Melopepo Mönch.), β) radiata.
 picta Brotero, bemahlter, ☉. m. f. ? Südamerika.
 pileiformis Duch. (= *polymorpha pileiformis* Spach),
 haarförmiger, ☉. m. f. Orient.
 pinnatifida Schrank, fiederspaltiger, ☉. m. f. Brasilien.
 spathularis Schrad., spatelförmiger, ☉. m. f. Mexico.
 Hybriden oder Varietäten: picta Haberl ☉., tiarata maculata Haberl ☉.

Citrullus L. et *variegata* Steud., v. *Citrullus vulgaris*, p. 146, II., *dioica* Roxb., v. *Coccinia indica*, p. 151, II., *latior* Hort. (= *leucantha* Duch. = *longa* Hort. = *pyrotecha* Hort.), v. *Lagenaria vulgaris*, *idolatrix* W., v. *Lagenaria idolatrix*, p. 443.
Cuellaria ferruginea R. et P., v. *Clethra ferruginea*, p. 205.

Culcasia P. B. Endl., Culcasie, XXI. ix., Aroideae.

scandens P. Beauv., (= *Caladium scandens* W., p. 143 = *Denhamia scandens* Schott.).

Culcitium salicinum Speg., v. *Bedfordia salicina*.

Culhamia platanifolia Forsk., v. *Sterculia platanifolia*, p. 787.

Cullumia RBr., Cullumie,

patula Less. (= *Berkheya patula* W. = *Gorteria ciliata* Thbg. W., p. 366 = *Rohria patula* Thbg.), ausgebreitete, ⚥. k. t. Cap der guten Hoffn.

pectinata Less. (= *Berkheya pectinata* W., p. 119 = *Rohria pectinata* Thbg.).

sulcata Less. (= *Berkheya sulcata* W. = *Gorteria spinosa* Jacq. = *Rohria sulcata* Thbg.), gefurchte, ⚥. t. k. Cap der guten Hoffn.

Cuminia Colla, Cuminie, XIV. i., Labiatae.

eriantha Colla (= *Bystropogon erianthus* Benth.), wollblumige, ⚥. w. Insel St. Juan Fernandez.

Cuminum L., Kreuzkümmel.

hispanicum Merat, spanischer, ☉. f. Spanien, Soongaria.

minimum Urvill. (= *Cuminum* L. var. Speg.), kleinster, ☉. f. Griechenland.

Cummingia campanulata D. Don (= *bifolia* Sims).**Cunila** L., Cunila.

microcephala Benth., kleinköpfige, 4. f. ?

coccinea Nutt., Hook., v. *Gardoquia Hookeri*, p. 346.

Cunninghamia lanceolata RBr., β) glauca Hort. angl.**Cupania** Plum., Cupanie.

Akeesia Cambess. (= *Akeesia africana* Tussac = *Blighia sapida* Koen., p. 125 = *Bonannia nitida* Rafin.),

Akeesia-C., ⚥. w. Guinea.

discolor Vahl, verschiedenfarbige, ⚥. w. ?

glabra Sw. (= *americana* L.).

Cuphea P. Br. (= *Cuphaea* Jacq.).

floribunda Lehm., blüthenreiche, ⚥. t. k. Mexico.

Cuphea

- fruticulosa* Schrad. (= *fruticosa* N. E.), strauchlige, ♀. t. Brasilien.
glabra Gill., kahle, ♀. t. Bonaria.
malvacea Hort., malvenähnliche, ♀. t. ? Südamerika.
procumbens Cav. (= *erecta* Hffg.).
strigulosa H. Bonpl., stiegeliche, ♀. t. Südamerika.
viscosissima Jacq. (= *petiolata* Auct. = *Lythrum Cuphea* L. fil. = *L. petiolatum* L.).

Cupressus T., Cypresse.

- expansa* Audib., ausgebreitete, ♀. k. ? Orient.
pendula Thbg. (= *patula* P.).
sempervirens L., a) *stricta* Mill. (= *fastigiata* DC. = *pyramidalis* Targ. Tozz.).
 Unbestimmtere: *angustifolia* Hort., *capensis* Hort. Cels., *sinensis* Hort. — *africana* Mill., *americana* Trautv., *arbor-vitae* Targ. Tozz., *Thuja* Targ. Tozz., *thyoides* L., v. *Thuja cupressoides*, *excelsa*, *occidentalis*, *orientalis* et *sphaeroidea*, p. 808, — *australis* P., *Fothergillii* Hort. (= *triquetra* Lodd.), v. *Callitris australis* et *quadrivalvis*, p. 149 et p. 108, II., — *japonica* Thbg. L. fil., v. *Cryptomeria japonica*.

Curcas Adans., Curcasbaum, XXI. x. (XVI. vi.), *Tri-coecae-Euphorbiaceae*.

- Adansonii* Endl. (= *purgans* Medik. = *Jatropha Curcas* L., p. 430 = *Castiglioni lobata* R. et P. = *Ricinus americanus* Mill. = β *R. urens* Mill.), Adanson's, ♀. w. Südamerika.

Curculigo G., Curculigo.

- chinensis* Lodd., chinesische, 4. w. China.
sumatrana Roxb. (= *latifolia* Voigt = *Molineria plicata* Colla).

Curcuma L., Gelbwurz.

- purpurascens* Blume, purpurfarbige, 4. w. Java.
Roscoeana Wall., Roscoe's, 4. w. Ostindien.
rubescens Roxb. (= ?*erubescens* Roxb. = *longiflora* Salisb.).
Zerumbet Roxb. (= *officinalis* Salisb. = *speciosa* Lk. *Zedoaria* Salisb. = *Amomum latifolium* Lam. = *A. Zerumbet* Koen.).

Curtogyne Auct., v. *Cyrtogyne*.

Cuscuta T., Flachsseide.

- approximata* Babingt., genäherte, ☉. Sch. f. England.
bonariensis H. Berol., bonarische, ☉. Sch. f. Bonaria.
californica Dougl., californische, ☉. Sch. f. Neucaliforn.
corymbosa R. et P. (= *hassiac* Pfeiff. = *Trifolii* Hensl.)¹⁾, traubendoldige, ☉. Sch. f. Peru, Chili, Holland, Deutschland, Schweiz.

β) *pauciflora* Choisy.

- major* C. Bauh., Choisy. (= *europaea* α L. = *vulgaris* P. = *alba* Presl.), Europa, Nordafrika, Asien.
minor C. Bauh. (= *europaea* β L. = *Epithymum* Sm. = *planiflora* Tenore = *halophyta* Fr. = *alpina* Kotsch.), β) *Trifolii* Babingt. Europa, Griechenland, Syrien, Caucasus, Canarische Inseln.
reflexa Roxb. (= *verrucosa* Swt.), zurückgebogene, ☉. Sch. w. f. Ostindien, Nepal.

Uebrigens ist p. 240 u. 241 zu allen noch das Zeichen Sch. zu setzen.

1) Gehören nach Choisy (DeCandolle prodrom. syst. nat. reg. veget. vol. IX. p. 456 et 565) zu *C. corymbosa*.

Cuspidia araneosa G. (= *castrata* Cass.), v. *Delta cernuum*, p. 262.

Cussambium glabrum Hamilt. (= *pubescens* Hamilt.), v. *Melicocca trijuga*, p. 507.

Cussonia Thbg., *Cussonie*.

paniculata Eckl., Zeyh., rispige, §. t. k. Cap d. g. H. *triptera* Colla (= *quercifolia* Hort.).

Cyamopsis DC., Afterbohne.

psoraleoides DC. (= *Dolichos fabaeformis* L'Her. = *D. psoraloides* Lam. = *Lupinus trifolius* Cav. = *Psoralea tetragonoloba* L. = *Trigonella Goalia* Hamilt. = *T. tetrapetala* Roxb.).

senegalensis Guillem. et Perr., senegalsche, ☉. m. f. Senegal.

Cyamus flavicomus Salisb. (= *luteus* Tratt.), v. *Nelumbium luteum*, p. 544.

Cyanella coerulea Eckl. (= *alba* L., Suppl. p. 241).

Cyanopsis radicatissima Cass., v. *Amberboa muricata*, p. 32, II.

Cyanospermum Wight et Arn., Blausaame, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

albiflorum Wight et Arn. (= *Cylista albiflora* Sims, p. 242).

tomentosum Wight et Arn. (= *Cylista tomentosa* Roxb., p. 242) ¹⁾.

Cyanotis D. Don, Endl., Blauhaar.

hirsuta Fisch. et Mey. (= ? *abyssinica* H. bot. = *Commelyna hirsuta* Hochst. et Schimp.), rauhaarige, 4. Kn. t. Adoa.

imbricata Kunth (= *Tradescantia imbricata* Roxb.), ziegeldachförmige, ☉. m. f. Ostindien.

nodiflora Kunth (= *Tradescantia nodiflora* Lam. = *T. formosa* W. = *T. speciosa* L. fil., p. 814 = *Commelyna speciosa* Thbg.), knotenblumige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

papilionacea R. et S. (= *Tradescantia papilionacea* L. = ? *Commelyna papilionacea* Burm.), schmetterlingsblumige, ☉. m. f. Ostindien.

Cyanus arvensis Mch. (= *segetum* G. M. Scherb.) etc., v. *Centaurea Cyanus* etc., p. 177 seq.

Cyathæa Kunze, Becherfarn.

Dregei Kunze, Drege's, 4. §. w. Südafrika.

Cyathodes LaBill., Becherheide.

abietina RBr. (= *Epacris juniperina* Forst. = *Styphe- lia abietina* LaBill.), tannenähnliche, §. t. Neuholl.

Cybele umbellifera Knight et Salib., v. *Stenocarpus Forsteri*, — *Cybelion tenerum* Steud., *teres* Steud., *Utricularia* Spgl., v. *Jonopsis tenera*, *teres* et *utricularioides*, p. 431.

Cycas L., Farrnpalme.

celebica Miq., celebische, §. w. Celebes.

circinalis L., β) javana Miq.

inermis Lour., unbewehrte, §. w. Cochinchina, China.

madagascariensis Miq. (= ? *Thouarsii* RBr. = *circinalis* A. du Pet. Thouars), madagascarische, §. w. Madagascar.

1) *Cyanothamnus* Lindl., Blaustrauch, Tricoccae-Rutaceae. *ramosus* Lindl., *tenuis* Lindl. Beide § und in Neuholland am Schwanenfluss heimisch, werden wohl noch nicht kultivirt.

Cycas

media RBr., mittlere, ♂. w. Neuholland.

revoluta Thbg. ¹⁾, β) planifolia Miq.

Riedlei Fisch., Riedl's, ♂. w. Neuholland.

Rumphii Miq., Rumph's, ♂. w. Molucken, Amboina, Ternate.

sphaerica Roxb., kugelige, ♂. w. Molucken ²⁾.

undulata Gaudich., Dsf. Hort. Par., wellenförmige, ♂. w. ?

Wallichii Miq., Wallich's, ♂. w. Ostind. („Colitur in hort. bot. Calcuttensi“).

Unbestimmt: Laguna de Verde Hort. Booth.

Cyclamen T., Erdscheibe, Saubrod.

aleppicum Fisch. (= *persicum* fl. albo Hort.).

europaeum L. (= *aestivum* Rchb. = *hungaricum* Hort. = *litorale* Sadl. = *officinale* Wender. = *Clusii* W. Shm.), b. flore albo.

hederaefolium Ait. (= *autumnale* Boos = *europaeum* Mill., Sm. = *neapolitanum* Tenor. h. Neapol. = *graecum* Lk. = *ficariaefolium* Rchb.).

β) subhastatum Rchb., γ) linearifolium DC. (= *lancaefolium* Hort belg.).

neapolitanum Tenore Prodr. fl. neapol. Suppl. II. 66 (nec fl. neapol. III. p. 197 etc.).

Poli Delle Chiaje, Poli's, 4. Kn. k. Mittelitalien, Südfrankreich.

repandum Sibth. Sm. (= *neapolitanum* Auct.).

vernum Lobel., Rchb. (= *vernale* Mill. = *hederaefolium* Bot. mag.), Südeuropa, Caucasus (Georgia).

Unbestimmtere: *anemonoides* Hort., *corniculatum* H. Hügel., *indicum* L., *intermedium* Wender., *orbiculatum* Mill., *pictum* Hort., *purpurascens* Mill. = *utopicum* Hffg. = *persicum*.

Cyclanthera Schrad., Scheibenbeutel, XXI. x. (XVI. VIII.), Cucurbitaceae.

pedata Schrad., fußförmiger, ☉. m. f. Mexico.

Cyclobothra Don, Sweet, Scheibentraube.

elegans Benth., Lindl. (= *Calochortus elegans* Pursh, Hook., p. 149).

flava Benth., Lindl. (= *Calochortus flavus* Schult. fil.), hellgelbe, 4. Zw. t. Mexico.

fusca Benth., Lindl. (= *Calochortus fuscus* Schult. fil.), braune, 4. Zw. t. Mexico.

? *Hartwegii* Kunth (= *Calochortus Hartwegii* Benth.), Hartweg's, 4. Zw. t. Mexico.

lutea Lindl. (= *barbata* Sweet).

nitida Kunth (= *Calochortus nitidus* Dougl., p. 149).

pallida Lindl. (= *Calochortus pallidus* Schult. fil.), bleiche, 4. Zw. t. Mexico.

paniculata Benth., Lindl., rispige, 4. Zw. k. f. b. Californien.

1) „Teste Millero Anno 1758 in Angliam introducta; sed antea jam in Hollandiam. Floret apud nos verno tempore. Specimina culta omnia fere foeminea. Masc. in horto Petropolitano exstat, ubi bis floruit“ (Otto et Dietr. Gartenzeit. VII. 24). „In hortis Calcuttae stirps foeminea abunde colitur“ (Roxb.); „saepe prope domos colitur, etiam in China“ (Thbg.). Conf. Miquel genera et species Cycadearum viventium, 24. (Im Dresdener botanischen Garten blühte 1841 ein weibliches Exemplar sehr reichlich. G. H.).

2) „In hortum Calcuttensem Anno 1798 introduct., ubi uterque sexus m. Majo floret; sem. Jan. et Febr. maturescunt“ Miquel l. c.

Cyclobothra

purpurea Sweet (= *Fritillaria purpurea* Humb. B. K.
= *Calochortus Bonplandianus* R. et S.).

uniflora Kunth (= *Calochortus uniflorus* Hook.), einblumige, 4. Zw. k. f. b. Californien.

Cyclolepis Gill. et Don, Kreisschuppe, XIX. II., Compositae-Eupatorineae (Mutisiaceae).

genistoides Gill. et Don (= *Gochnatia genistoides* Hook.), ginsterähnliche, 5. k. t. Chili, Patagonien.

Cycloloma Moq. Tand., Endl. (= *Cyclolepis* Moq. Tand. = *Petermannia* Rchb.), Scheibensaum, V. II., Atripliceae-Aizoideae (Chenopodeae).

platyphylla Moq. Tandon (= *Cyclolepis platyph.* Moq. Tand. = *Salsola platyphylla* Mchx. = *S. radiata* Dsf. = *S. atriplicifolia* Spgl. = *S. atriplicis* Schult. = *Kochia atriplicifolia* Roth = *K. dentata* W., p. 438 = *Chenopodium radiatum* Schrad. = *Salsola chenopodioides, latifolia, paniculata et stellata* Hort.), breitblättrige, 0. f. Nordamerika.

Cyclogyne Benth., Kreisnarbe, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

canescens Benth., grauliche, 4. 5. t. Ostwestl. Neuholl.

Cyclosia Kl., Scheibenstendel, XX. I., Orchideae.

maculata Kl. (= *Mormodes pardina* Batem., p. 531), gefleckter, 4. w. Mexico (Oaxaca).

Cyclosorus gongylodes Lk., v. *Aspidium* Sect. II, p. 49, II.**Cynoches** Lindl., Schwänenstendel.

chlorochiton Lindl., grünlichblumiger, 4. w. Demerara.
maculatum Lindl., Lodd., gefleckter, 4. w. Brasilien, Mexico.

pentadactylon Lindl., fünffingeriger, 4. w. Brasilien.

ventricosum Batem., β) *Egertonianum* Lindl., Mexico, Guatemala.

Cynoseris Endl., Schwänenblümchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

australis Endl., neuholländisches, 0. m. f. Südwestl. Neuholland (Schwanenflufs).

Cylista polystachya Spgl. (= *pyncostachya* DC.).

C. albiflora Sims et *tomentosa* Roxb. (= ? *mollis* Hort.), v. *Cyanospermum albiflorum et tomentosum*.

Cymbalaria Elatine G. M. Scherb., *muralis* G. M. S. = *vulgaris* Auct.), *spuria* G. M. S., v. *Linaria Elatine, Cymbalaria, spuria*, p. 465.

Cymbidium Sw., Cymbelstendel (Kahnlippe).

bicolor Lindl. (= *aloifolium* Blum., non Sw.), zweifarbig, 4. w. Ceylon.

chinense W. (= *sinense* Auct. = *fragrans* Salisb.).

cruentum Hffg., blutrother, 4. w. Brasilien.

cuspidatum Blum., langspitziger, 4. w. Java.

diurnum Sw. (= *Limodorum diurnum* Jacq.), Tag-C., 4. w. Caracas.

elegans Lindl. (= *Limodorum cyperifolium* Hamilt.), zierlicher, 4. w. Ostindien.

giganteum Wall. (non Sw.) (= *Limodorum longifolium* Hamilt. = ? *iridioides* Don), riesenhafter, 4. w. Nepal.

grandiflorum W. (= *Limodorum grandiflorum* Aubl.), großblumiger, 4. w. Guiana.

marginatum Lindl. (= *emarginatum* Hort. = *Maxillaria gracilis* Lodd., p. 500).

Mastersii Griff., Master's, 4. w. Ostindien.

Cymbidium

pendulum Sw., Lindl. (= *crassifolium* Wall. = *Epidendrum pendulum* Roxb.), überhängender, 4. w. Ostindien.
 β) *brevilabre* Lindl.

speciosissimum Don, prächtigster, 4. w. Nepal.

triste W. (= *Epidendrum teres* Thbg. = *E. triste* Forst. = *Luisia teretifolia* Gaudich. = *Trichorrhiza teretifolia* Lindl. = *Vanda trichorrhiza* Hook., p. 836), trauriger, 4. w. Japan, Ostindien, Hebriden.

veixilliferum Llav. et Lex., fahnenähnlicher, 4. w. Mexico.
Wallichii Lindl. (= *aloifolium* Wall., non Sw.), Wallich's, 4. w. Ostindien.

II. *Camaridium* Lindl., p. 151 et p. 110, II.

ochroleucum Lindl. (= *Ornithidium album* Hook., p. 568).

vestitum Sw. (= *Camaridium purpureum* Sngl. = *Epidendrum vestitum* Sw.), bekleideter, 4. w. Jamaika.

In den Pflanzenverzeichnissen kommen noch vor: *C. pubescens*, *purpureum*.

allum W., *floridum* Salisb., *hyacinthinum* Sm. (=

striatum Sw.), v. *Bletia verecunda*, *florida* et *hyacinthina*, p. 125, *coccineum* Sw., v. *Ornithidium coccineum*, p. 568, *Corallorrhiza* Sw., v. *Corallorrhiza innata*, p. 217, *cucullatum* Sw. et *nodosum* Sw., v. *Brassavola cucullata* et *nodosa*, p. 130, *giganteum* Sw., v. *Cyrtopera gigantea*, *imbricatum* Hook., v. *Pholidota pallida*, p. 617, *iridifolium* Roxb., v. *Oberonia iridifolia*, *iridifolium* Sw. (= *pusillum* Sw.), *juncifolium* W., v. *Oncidium iridifolium* et *Cebolleta*, p. 557 et 558, *madidum* Hort., v. *Maxillaria madida*, *pallens* Sw., v. *Cephalanthera pallens*, p. 180, *palustre* Sw., v. *Epipactis palustris*, p. 290, *stapelioides* Lk., v. *Maxillaria stapelioides*, p. 500, *tripterum* Sw., v. *Coelia triptera*, p. 152, II., *umbellatum* Sngl., v. *Cirrhopetalum Thouarsii*, p. 145, II., *virescens* W., v. *Chloraea virescens*, p. 139, II. *Cymburus urticaef.* Salisb., v. *Stachytarpheta urticaef.* *Cyminosma oblongifolia* A. Cunnigh., Hook. et *ovata* Hort., v. *Acronychia oblongifolia* et *ovata*, p. 8, II. *Cynanchum capense* L., *crassifolium* RBr. (= *obtusifolium* L. Suppl.), v. *Cynoctonum capense* et *crassifolium*, *crispum* Jacq., v. *Fockea capensis*, *foetidum* H. B. K. (= *racemosum* Jacq.), v. *Roulinia Jacquini*, *maritimum* L. mant., v. *Ibatia maritima*, *medium* RBr. (= *fuscatum* Lk.), *nigrum* P., *Vincetoxicum* P., v. *Vincetoxicum medium* etc., *mauritianum* Hort. (= *capense* Sbr. = *laevigatum* Vahl = *indicum* Lam.), *parviflorum* Hort., *viridiflorum* Sims (= *vomitorium* Lam.), v. *Tylophora laevigata*, *laevis* et *asthmatica*, *radians* Lam., v. *Steinheiliana radians*, *sibiricum* RBr., v. *Skylakanthus sibiricus*, *villosum* R. et S., v. *Lachnostoma Balbisii*.

Cynara T. Vaill., Artischocke.

Cardunculus L. (= *sylvestris* Lam.), β) *hortensis* Mill. *ferox* Tenor., starkbewehrte, ♂. 4. f. Unteritalien.

Cynocardamum Webb. et Berth., Hundskresse, XV. II., Cruciferae.

Menziesii Endl. (= *Lepidium Menziesii* DC., p. 454).

virginicum Webb. et Berth. (= *Lepidium virginicum* L., p. 454 = *L. Iberis* Schk., non L.).

Wahrscheinlich werden zu dieser neuen Gattung noch mehrere *Lepidia* gestellt werden.

- Cynoctonum** E. Mey., Hundsschlinger, V. II., Asclepiadeae.
capense E. Mey. (= *Cynanchum capense* L., p. 243).
crassifolium E. Mey. (= *Cynanchum crassifolium* RBr., p. 243 = ? *obtusifolium* L. Suppl.), β) *pilosum* E. Mey. (= *Cynanchum pilosum* RBr. = *Periploca africana* Poir.).
- Cynodon** Dactylon Rich. P. (= *maritimus* H. B. K. = *occidentalis* et *portoricensis* W. = *Chloris Cynodon* et *maritima* Trin.), β) *linearis* W. (= *Panicum lineare* Burm.), γ) *stellatus* W.
virgatus W., v. *Leptochloa tenerrima*, p. 455.
- Cynoglossum** T. L., Hundszunge.
canescens W. (= *hirtum* et *hispidum* Hort. = *racemosum* Roxb.).
erectum Schrank, Schweigg., aufrechte, σ . f. ?
furcatum Wall., gabelförmige, 4. f. b. k. Nepal.
glochidiatum Wall., widerhackige, 4. k. Ostindien.
longiflorum Lehm., langblumige, \odot . f. Sibirien.
montanum Lam. (= *Dioscoridis* Vill. = *elongatum* Hornem. = *Mönchii* Nocca = *apenninum* Roth = *germanicum* Jacq. = *Haenkei* Schult. = *officinale* β L. = *sylvaticum* Haenk. Sm. = *virens* Schreb. = *virginicum* Schreb., W. E.).
valentinum Lagasc., valentinische, 4. f. Spanien.
virginicum L. (= *amplexicaule* Mchx. = *pensylvanicum* Hort.).
- Cyperus** T., Cypergras.
asperifolius Dst., rauhblättriges, 4. w. ?
australis Schrad. (= *alopecuroides* β Poir. = *cinnamomeus* et *confertus* Hort. = *multumbelliferus* Hort. = *paniculatus* et *thyrsiflorus* Hort.).
bulbillosus Brotero, zwiebeltragendes, 4. Kn. w. ? Südamerika.
congestus Vahl (= *badius* Auct. = *bulbosus* Lagas. = *ligularis* Thbg. Lk. = *Linkianus* Schult. = *multiceps* Lk. = *polycephalus* Lk. = *spiculosus* Rchb. = *strigosus* W. = *subbulbosus* R. et S.), gedrängtähriges, 4. k. Cap der guten Hoffn.
dentatus Torr. (= *micranthus* Schult. = *parviflorus* Mühlbg.), gezahntes, 4. f. Nordamerika.
diaphanus Schrad., durchschimmerndes, \odot . f. Nepal.
difformis L. (= *complanatus* Forsk. = ? *holoschoenoides* Jan = *protractus* Sbr., non Delil.).
Eragrostis Vahl (= *albidus* Lam. = *cruentus* Retz = *nitidus* Lam. = *sanguinolentus* Vahl = *turfosus* Salzm.).
fasciculatus Ell. (= *Elliottianus* Schult.).
flabelliformis Rottb. (= *gradatus* Forsk.), fächerförmiges, 4. w. Arabien.
flavicomus Mchx. (= *elegans* Walt. = *Distimus flavicomus* Rafin.), gelbschopfiges, 4. k. Nordamerika.
fuscus L. (= *brachystachys* Presl = *ferrugineus* Forsk. = *protractus* Delil.).
giganteus Rottb. (= *densiflorus* Rchb.), riesenhaftes, 4. w. Portorico, Surinam.
globosus All. (= ? *conglomeratus* var. Rottb. = *fascicularis* DC. = *humifusus* Clem. = *vulgaris* Sieb.), kügelähriges, \odot . f. Italien, Nordafrika.
glomuliferus Schrad., knaulähriges, 4. w. Brasilien.

Cyperus

- holosericeus Hornem., Lk. (= *incrassatus* Beyr.), sammethaariges, 4. k. f. Nordamerika.
- Iria L. (= *chrysomelinus* Lk. = *panicoides* Lam. = *Santonici* Rottb.).
- kyllingioides Vahl (= *dubius* Rottb. Roxb. = *monocephalus* Roxb. = *striatulus* var. *major* W. herbar.).
- lanceus Thbg., lanzettähriges, 4. w. t. Cap d. g. H.
- lateralis Forsk. (= *mucronatus* Retz, Rottb. = *mucronatus* β *albidus* Vahl = *Roxburghii* A. Dietr. = *Roxburghianus* Presl = *Pycreus lateralis* N. E.), seitenähriges, 4. w. Ostindien, Arabien.
- longus L., β) *thermalis* Dumort.
- Luzulae Rottb. (= *conoideus* Rich. = *globuliferus* et *sphaerostachyus* Willd. herb. = *surinamensis* Vahl herb. = ? *Kyllingia scirpina* Rchb. = *Mariscus panicus* H. Berol.).
- macrostachyos Lam. (= *puncticulatus* β Kunth), großähriges, 4. w. Ostindien.
- Michauxianus Schult. (= *erythrorhizus* Torr., non Mchx.), Michaux's, \odot . f. Nordamerika.
- micromegas N. E., kleinähriges, \odot . f. Cap d. g. Hffn.
- Mundtii Kunth (= *Pycreus Mundtii* N. E.), Mandt's, 4. w. t. Cap der guten Hoffnung.
- olivaris Targion. (= *esculentus* Gouan, Vill. Savi, (non L.) = *Hydra* Tenore = *radicosus* Sib. Sm. = *rotundus* DC., Tenor.), olivenförmiges, 4. Kn. k. f. b. Frankreich, Italien.
- patulus Kit. MB. (= *canescens* et *caucasicus* Hort. = *fascicularis* Philippi = *imbricatus* Vill. = *pictus* Tenor. = *squarrosus* Afzel.), 4. f. Süd- und Osteuropa.
- polystachyus Rottb. (= *brizaeus* W. herb. = *fascicularis* Lam., Dsf. = *tetraphyllus* P. B.).
- procerus L. Rottb., Vahl (= *elongatus* Sbr.), hohes, 4. w. Ostindien, Aegypten.
- prolixus H. B. K. (= *Schottii* H. Berol., A. Dietr. = *Comostemum Schottii* N. E.), Schott's, 4. w. Brasilien, Neugranada.
- puncticulatus Vahl (= *diluvialis* Schult. = *inundatus* et *procreus* Roxb.), punktirtes, 4. w. Ostindien.
- radicans N. E., wurzelndes, \odot . m. f. China.
- reflexus Vahl (= *montevidensis* Lk. = *Sellowii* Lk.), zurückgebogenes, 4. w. Montevideo.
- repens Ell. Nutt. (= *esculentus* Mühlbg., non L. = *gracilis* W. herb. = *gracilescens* Schult. = *phymatodes* Mühlbg. = *tuberosus* Pursh), kriechendes, 4. Kn. f. k. Nordamerika.
- rotundus L. (= *agrestis* W. herb. = *ferrugineus* Forsk. = *jemicus* Retz = *Pangorei* Vahl herb. = *radicosus* Sib., Sm. = *rubicundus* W. herb. = *stolonifer* W. herb. = *heterostachyus* Dsf., Tenore, Presl), 4. Kn. k. f. b. Südeuropa, Asien, Afrika, Amerika, Neuholland.
- Schraderianus Mart., Schrader's, 4. w. Brasilien.
- Sieberianus Lk. (= *damiettensis* A. Dietr.).
- speciosus Vahl (= *virginicus* Jacq.), prächtiges, 4. k. Nordamerika.
- spectabilis Lk. (= *Monti* h. Berol. = *Paramatta* Mart. = *paramattensis* Lk. = *patulus* Hort. = *scaber* Lagasc.).

Cyperus

- sphaerocephalus* Vahl (= *flavissimus* Schrad.), kugel-
ähriges, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.
sphaerospermus Schrad. (= *corymbosus* Steud.), kugel-
saamiges, 4. t. w. Cap der guten Hoffnung.
strigosus L. (= *Ensenii* Pursh = *incompletus* Lk.).
surinamensis Rottb. (= *compressus* Sbr. = *formosus*
Vahl herb. = *microcephalus* N. E. = *polycephalus*
Schrk. = *Sieberianus* Spgl. = *tortulanus* Vahl herb.
= *virens* Rchb., in Weigelt herb.), surinamisches, 4.
w. Westindien, Südamerika.
tenuiculus Kunth (= *angustifolius* A. Dietr. = *tenellus*
Presl), dünnes, ☉. f. Californien.
tenuiflorus Rottb. (= *incurvus* Roxb.).
textilis Thbg. (= *pungens* H. Berol.), stechendes, 4. t.
w. Cap der guten Hoffnung.
thyrsiflorus Schltl., strausblumiges, 4. w. t. Mexico.
venustus RBr. (= *alopecuroides* Koen. = *fastigiatus*
Rottb. = *auricomus* Sieber = *xanthocomus* Lk. =
Papyrus venustus N. E.), liebliches, 4. w. Südl.
Asien, Afrika, Neuholland.
virens Mchx. (= *elegans* Schreb. = *glomeratus* Walt.),
grünliches, 4. k. Nordamerika.
Hinsichtlich der übrigen s. *Dichostylis*, *Kyllingia*, *Ma-
riscus* et *Papyrus*.

Cyrtopodium L., Frauenschuh.

- barbatum* H. belg., bärtiger, 4. Kn. w. ? Ostindien.
japonicum Thbg., japanischer, 4. Kn. t. Japan.
purpuratum Lindl. (= *Knightii* H. Anglor.), purpurfar-
biger, 4. Kn. w. Malayen.
speciosissimum Hort. Hügel., prächtigster, 4. Kn.
w. Nepal.
spectabile Sw. (= *hirsutum* Mill. = *Reginae* Walt.).
ventricosum Sw., bauchiger, 4. Kn. f. Sibirien.

Cyrtilla pulchella L'Her., v. *Achimenes coccinea*, p.

6, II. — *spinosa* Spgl., v. *Bursaria spinosa*, p. 140.

Cyrtanthus Ait., Bogen-(Hacken-)lilie.

- albus* Hort. angl., weißer, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.
carneus Lindl., fleischfarbiger, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.
helictus Lehm., gewundene, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.
ochroleucus Burch. (= *Monella ochroleuca* Herb.), weiß-
gelber, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffn.
Pumilio Schult. fil. (= *Amaryllis Pumilio* Ait. = *A.
humilis* Lk., Enum.), kleine, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.
puniceus Eckl., H. Dyck, hochrothe, 4. Zw. w. t.
Cap der guten Hoffnung.
spiralis Burch. (= *angustifolius* Jacq. = *Amaryllis bi-
vaginata* Don = *Monella spiralis* Herb.).
striatus Herb. (= *Amaryllis falcata* Lee), gestreifte, 4.
Zw. w. t. Cap d. g. Hoffn.
uniflorus Ker (= *Amaryllis falcata* L'Her. = *Gastro-
nema clavatum* Herb., p. 347), einblumiger, 4. Zw.
w. t. Cap d. g. Hoffn.

longiflorus Gmel., v. *Posoqueria longiflora*, p. 649.

Cyrtoceras Bennet, (= *Centrostemma* Decaisn.), Bo-
genhorn, V. II., Asclepiadeae.

- coriaceum** (= *Centrostemma coriaceum* Meissn. = *Hoya
coriacea* Bot. reg.), lederartiges, 4. w. Molucken.
multiflorum (Decaisn.) (= *Hoya multiflora* Blum.), viel-
blumiger, 4. w. Java.

Cyrtoceras

reflexum Bennet (= *Centrostemma Cyrtoceras* Meissn. = *Hoya reflexa* Hort.), zurückgebogenes, ♂. w. Java.

Cyrtochilum H. B. K., Bogenlippe.

candidum Hort. belg., reinweisse, 4. w. ? Südamerika.

filipes Hort., fadenstielige, 4. w. Südamerika.

floribundum Hort. belg., blüthenreiche, 4. w. Südamer.

hastatum Hort. belg. (= *Odontoglossum hastatum* Auct.),
spontanförmige, 4. w. Südamerika.

ixioides Lindl., Ixienähnliche, 4. w. Neugranada.

maculatum Lindl., β) ecornutum H. belg.

pardinum Lindl., buntfleckige, 4. w. Peru.

• Russelianum H. Anglor., Russel's, 4. w. Südamerika.

stellatum Lindl., sternförmige, 4. w. Brasilien.

undulatum H. B. K., wellenförmige, 4. w. Neugranada.

volubile Poepp. et Endl., windende, 4. Sch. w. Peru.

Cyrtolepis Less., DC., Bogenschuppe.

monantha Less. (= ? *Santolina rigida* Sibth., Sm. =
S. terrestris Forsk. = *Tanacetum monanthum* L.),
einblumige, ☉. f. Aegypten, Orient.

Cyrtomium falcatum Presl, v. *Aspidium* Sect. VI.,
p. 50, II.**Cyrtonema** Schrad., Bogengurke, XXI. x. (XVI. i.),
Cucurbitaceae.

digitata Schrad. (= ? *Bryonia digitata* Thbg.), finger-
förmige, 4. Sch. t. k. Cap d. g. Hoffn.

triloba Schrad. (= *Bryonia triloba* Thb., p. 135).

Cyrtopera Lindl., Bogenstendel, XXI. i., Orchideae.

bicarinata Lindl. (= *Epipactis bicarinata* Hamilt.),
zweikieliger, 4. w. Ostindien.

flava Lindl. (= *Dipodium flavum* Hamilt.), hellgelber,
4. w. Ostindien.

gigantea Lindl. (= *Cymbidium giganteum* Sw. = *Li-
modorum giganteum* Thbg. = *Satyrium giganteum*
L. fil.), riesenhafter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

obtusata Lindl., stumpfer, 4. w. Ostindien.

plantaginea Lindl. (= *Limodorum plantagineum* Aub.
d. Pet. Th.), wegetrittähnlicher, 4. w. Madagascar.

plicata Lindl. (= *Dipodium plicatum* Hamilt.), gefalte-
ter, 4. w. Ostindien.

scabrilinguis Lindl., scharfzügeliger, 4. w. Peru.

Woodfordii Lindl. (= *Cyrtopodium glutiniferum* Radd.
= *C. Woodfordii* Sims, p. 247).

Cyrtopodium RBr., Bogenfufs.

cruentum H. Hügel. (= ? *punctatum* Lindl. var.), blut-
farbiger, 4. w. Westindien.

cupreum H. Hügel., kupferfarbiger, 4. w. Westindien.

flavescens Lindl., gelblicher, 4. w. Mexico.

grandiflorum H. Hügel., grofsblumiger, 4. w. Westind.

speciosissimum Hort. Hügel., prächtigster, 4. w. Süd-
amerika.

venustum H. Hügel., lieblicher, 4. w. Südamerika.

maculatum Hort., v. *Cyrtochilum maculatum*, p. 247,
Woodfordii Sims, v. *Cyrtopera Woodfordii*.

Cyrtospermum trifoliatum Rafin., v. *Cryptotaenia*
canadensis.

Cystibax Mart., Genesstrauch, XIV. ii., Bignoniaceae.

antisiphilitica Mart. (= *Bignonia antisiphilitica* Mart.
= *viridiflora* Lodd.), antivenerischer, ♂. Sch. w.

Brasilien.

Cystopteris Bernh., Blasenfarren.

albescens Lk. (= *islandica* Hort.), weifslicher, 4. f. Island.
alpina Lk., β) *regia* Lk. (= *alpina* Hook. = *Cystea regia* Sm. = *Aspidium regium* Sw.).

crenata Fr. (= *Aspidium crenatum* Sommerf.), gekerbter, 4. f. Norwegen.

dentata Sm, Lk. (= *Cystea dentata* Sm Engl. bot. = *Polypod. dentatum* Dicks.).

fragilis Bernh., γ) *angustata* Lk. Fil. (= *rhaetica* Lk. Hort. Berol. = *Cystea angustata* Sm. = *Aspidium rhaeticum* Sw.).

obtusa Presl (= *Aspidium obtusum* Sw.), stumpfer, 4. f. Pensylvanien¹⁾.

Pontederac Lk. (= *Polypodium Pontederac* All.), Pontederac's, 4. f. Oberitalien.

tenuis Presl, Schott. (= *Aspidium tenue* Sw.), dünner, 4. f. Nordamerika. Vergl. p. 876 seq.

Cytisanthus radiatus O. F. Lang., v. *Genista radiata*, p. 349.

Cytisophyllum sessilifolium O. F. Lang., v. *Cytisus sessilifolius*, p. 248.

Cytisus T., Geißklee.

africanus Loisel., afrikanischer, \mathfrak{h} . k. Nordafrika.

alpinus Mill. (= *angustifolius* Moench. = *Laburnum alpinum* Griseb.).

β) *albus*, γ) *macrostachys*.

Alschingeri Visian., Alschinger's, \mathfrak{h} . \mathfrak{h} . f. Dalmatien.

chrysobotrys Fisch. (= ? *racemosus* Marnock = *Genista racemosa* Hort.), goldtraubiger, \mathfrak{h} . f. ?

β) *grandiflorus*.

elongatus W. K. (= *biflorus* Bot. reg.).

emeriflorus Rchb., kronenwickenähnlicher, \mathfrak{h} . f. Oberitalien.

Laburnum L. (= *Laburnum vulgare* Griseb.), e) *purpurascens* Hort. (= *carneus* Hffsg. = *Laburno-purpureus* Hort.), f) *serotinus*.

laniger DC. (= *Colycotome villosa* Lk. = *Genista villosa* Lam. = *Spartium lanigerum* Dsf. = *S. villosum* Poir.).

leucanthus W. P. (= *austriacus* L. var. K. = *pallidus* Schrad.).

multiflorus G. Don (= *petiolaris* Hffg. = *falcatus* var. Auct.).

nigricans L. (= *Lembotropis nigricans* Griseb.).

parviflorus Boiss. (= *Genista parviflora* DC. = *G. angulata* Lk. = *Spartium parviflorum* Vent.), kleinblumiger, \mathfrak{h} . k. Anatolien.

peregrinus Hffg. (= *Lebeckia cytisoides* Hort., non Thbg.), fremder, \mathfrak{h} . k. ?

purpureus Scopol., c) *roseus* Hort.

serotinus Kit. (= ? *hirsutus* L. var.), spätblühender, \mathfrak{h} . f. Ungarn.

triflorus L'Her. (= *villosus* L'Her.).

Unbestimmtere: *bracteolatus* Hort. anglor., *filipes* Hort., *Lobellii* Tausch, *longissimus* Hffmsg., *onustus* Tausch, *polycephalus* Tausch (= *austriacus* Hort.), *tomentosus* Hort. — *canariensis* Hort., v. *Genista canariensis*.

Czernaevia laevigata Turcz., v. *Conioselinum Czernaevia*, p. 876,

¹⁾ Vergl. *Physematium Perrinianum* Presl (= *Cystopteris Perriniana* Lk. hort.).

- Dacrydium** Banks. Soland. Lamb., Gummitanne.
 fuscum H. belg. (= *cupressinoides* Hort.), braune, ♀.
 t. k. Neuholland.
 Mayi H. Anglor., May's, ♀. t. k. Neuholland.
 spicatum Hort., ährige, ♀. t. k. Neuholland.
 taxifolium H. angl. et belg., taxusblättrige, ♀. t. k.
 Neuholland.

plumosum Don, v. Thuja Doniana.

- Dactylaena** Schrad., Fingerkaper, I. I., Capparideae.
 micrantha Schrad., (= *Cleome monandra* DC.), klein-
 blunige, ☉. w. m. f. Brasilien.

Dactylagrostis Richardsonii Lk. = ? *Triticum* Ri-
 chardsonii, p. 824.

- Dactylis** L., Knaulgras.

glomerata L., β) *abbreviata* Bernh., γ) *altaica* Bess, δ)
glaucescens W., ε) *nemoralis* *.

distichophylla Brignol. (= *litoralis* W. = *mari-*
tima Schrad.), *repens* Dsf. etc., v. *Aeluropus laevis*,
villosus etc., p. 11, II.

Dactylogramm acinoides Lk., v. *Mühlenbergia glo-*
merata, p. 533.

- Daemonorops** Blum., Teufelspalme, VI. I., Palmae.
melanochaetes Blum., (= *Calamus niger* W., p. 144),
 schwarzborstige, ♀. w. Java.

- Dahlia** Cav. (A. Dahl, ehem. Prof. d. Botanik zu Abo),
 (= *Georgina* W., p. 352), XIX. II., Compositae-
 Corymbiferae.

astrantiaeflora Swt., sterdoldenblumige, 4. Kn. k. Mexico.

Barkeriae Knowl. et Westc., Barker's, 4. Kn. k. ?

Cervantesii Lagasc. (= *acutiflora* Moç., Sess. = *Ge-*
orgina Cervantesii Auct., p. 352).

coccinea Cavan. (= *bidentifolia* Salisb. = *crocata*
 Lag. = *crocea* Poir. = *frustranea* Ait. = *fulgens*
 Hort. = *Georgina coccinea* W. = *Coreopsis Geor-*
gina pruinosa Cass.).

Merkii Lehm. (= *minor* Visian. = *glabrata* Lindl.),
 Merk's, 4. Kn. k. Mexico.

scapigera Bartl. (= *Georgina scapigera* Otto et Dietr.).

variabilis Dsf. (= *pinnata* Cav. = *purpurea* Poir. =
rosea Cav. = *sambucifolia* Salisb. = *superflua* DC.
 = *sphondiliifolia* Salisb. = *Georgina purpurea, ro-*
sea et variabilis W. = *Coreopsis Georgina nuda*
 Cassin.).

β) *excelsa* Henslow (= *arborea* Hort.).

- Varietäten u. Hybriden v. *D. coccinea* u. *variabilis*.

A. Aeltere¹⁾:

Admirable (Spary's), Agathe imperiale, Agathe royal,
 alba, Arabelle (Wieck's), Atilla (Whale's), atropurpurea,
 atosanguinea, Beauty of Bedford (Maley's), Beauty
 of England, Beauty superbe, Belladonna, Belvedere,
 Bloomsbury (Pamplin's), Brides maid (Brown's),
 brightpurple, Brillant (Whale's), Calliopse (Spencer's),

1) Alljährlich werden neue Varietäten dieser ausgezeichnet
 schönen Zierpflanze gewonnen; die neueren und schöneren der-
 selben, den Anforderungen einer kritischen Blumenästhetik mehr
 und mehr entsprechend, verdrängen allmählig die älteren, da letz-
 tere aber ebenfalls schön, die vorzüglichern auch in den Ver-
 zeichnissen der Herren Cultivateurs noch aufgeführt werden, so
 verdienen sie auch hier unter einer besondern Rubrik Erwähnung.

Dahlia

camelliaeflora, Canute (Ingram's), Carno (Ansel's), Chancellor, changeable purple, Charles XII. (Miller's), Climax (Jeffrie's), Colonel Schwanenfeld (Girling's), Comet (Sweet's), Countess of Pembroke (Dood's), crinson, cuprea, Cyclops (Neville's), de Mirbel (Baltets), Dodonaeus, Dutchess of Gloucester, Dutchess of Kent (Mitchel's), Dutchess of Nordhumberland (Newten's), Eclipse, elegans, Emilie Trebsen, Evêque de Tournay (Mackoy's), excellent, Fanny (Simon Louis), fawncoloured, Fire Ball (Squibbe's), flava, floribunda, floribunda nana, Freischütz (Rinz's), fulgida, Fürst Poniatowsky (Hanisch), Gem (Smith's), Gem (Willison's), Grand Alexander, Grand Tournament (Union's), Grenadier (Jackson's), Gris de Lin, Henriette, Herzogin von Meiningen, Hornzey Surprize (Pamplin's), imperiosa (Sweet's), insignis, Isabelline, Junoniana (Sweet's), Koning Aza, Lady Bathurst (Squibb's), Lady Dartmouth (Widnall's), La Ruel (Dufresne's), Leonore (Girling's), l'honneur d'Anvers, lilacina (Salish.), lilac-striped, luteola, ma favorite, Marquis, Miss Golebourn (Sheppard's), Morison, mutabilis, nana (Andr.), Nicolas de Sauvage, Nicolaus Nickelby (Cormack's et Knigh't's), nigra, nigra et alba, non pareil (Girling's), orange flag, pallida, Peruvian chief (Harrison's), Prinzess Alexandrina Victoria, Prinzess Elizabeth, pulchra, punicea (Bot. reg.), purpureo-nigra, Rival Praesident (Elliot's), Rival Queen of Dahlias (Barnes) (= *Agnes Graham*), Rival Sussex (Stanford's), royal-olive, rouge et noir (Ansel's), royal purple, Rubis superb (Girling's), rubra (Bot. mag.), Sabini, sanguinea, sansrival, Shaklewell Rivel (Gellan's), sovereign, speciosa, sphaerocephala, Staar of Buckland (Truclove's), stellaris (Sweet), sulphurea grandiflora, sulphurea speciosa, sunflower, superba (Bot. mag.), superb crinson, Surprize, tendre Agathe, Victory, Virgin Queen, Vitruvius (Davie's), Waratah, Whit Dutch, William (Forster's) etc. etc.

B. Neuere¹⁾:

Achilles (Schmidt's), Admiral Stopfordt (Trenfield's), Advancer (Squibb's), Africa (Drummond's), Aglaja Girardoni, à la mode (Whale's), Alba purpurea grandiflora, Albert (Dietrich's), Alexander v. Humboldt, Alexander Schulz (Deegen's), Alice Hawthorn (Harrison's), Aline (Hoffmann's), Aloys Götz (Lesor's), Alphonse (du Mortier), Altkönig (Rinz's), Ammy Robsart (Gill.), Andrew Marvel (Woodmansey's), Aniane (Sieckmann's), Antagonist (Bragg's), Argo (Widnall's), Argus (Montjoy's), Array (Walter's), Asmodeus (Davie's), Atar Gull (Pachott's), August Ehrig (Deegen's), August Raabe (Deegen's), Aurantia (Sparry's), Bacchus (Deschold's), Bangup (Girling's), Baron v. Toll (Deegen's), Baudin (Salter's), Beauty of Birmingham (Harrison's), Beauty of Chelmsford (Wick's), Beauty of Sussex (Mitchell's), Beauty (Parson's), Beauty of Wackefield (Barrat's), Beeswing (Drummond's), Belsice Rival

1) Vergl. C. F. Schreiber Eilftes Verzeichniss einer Auswahl der neuern und neuesten deutschen, englischen, französischen u. belgischen Georginen oder Dahlien etc. Dresden 1846.

Dahlia

(Pipe's), Bermondsey Bree (Proctor's), Bertha v. Jena (Koch's), Bianca (Wildman's), Bischof Adhemar von Boy (Reichert's), Bizarre (Allen's), Blanche Shelly (Mitchell's), Bloomsbury (Lee's), Bouquet noir, British Queen (Back's), Brittish Yeoman, Bunte von Gotha (Weichselfelder's), Butterfly (Girling's), Candidate (Silverlock's), Capitain Schmitt (Denant's), Carl der Große (Mardner's), Cendrillon (Dubras's), Champion of Essex (Turvill's), Charbonneaux Denizet (Baldet's), Chateaubriand (Lenson's), Charlotte (Mootz), Cheltenham Queen (Hodge's), Chrysocoma (Rinz's), Comte de Cussy (Delafontaine's), Comte de Mannsfeld (Bake's), Confidence (Cook's), Conqueror of the World (Stein's), Coronation (Harrison's), Coronation (Smith's), Countess of Cornwallis (Smith's), Delight (Brown's), De Ram (Boutin's), Desirable (Brown's), Deutsche Jungfrau (Sieckmann's), Diaconus Martini (Sieckmann's), Diadem (Sieckmann's), Diademe (Tassart's), Diamant (Deegen's), Diane de Beaucourt (Salter's), die Schneerose vom Elsterthal (Deegen's), Doctor Dijon (Wachy's), Doctor Meyer (Deegen's), Doctor Schmaltz (Deegen's), Doctor Struve (Deegen's), Dowager Lady Cooper (Jackson's), Duke of York (Keyne's), Dumont de Courset (Wachy's), Dumont de Courset (Whale's), Dupetit Thouars (Millet's), Electra (Salter's), Elisabeth Meyer (Knes's), Emilie (Bretschneider's), Emilie (Peter's), Emilie (Schmidt's), Emperor of Chadwick's, Englands Rival (Sieckmann's), Erbgraf Gustav (Stork's), Erfurter Glocke (Salter's), Erzherzog Ludwig (Mühlbeck's), Erzherzog Palatinus (Deegen's), Erzherzog Stephan (Deegen's), Essex scarlet (Wick's), Essex triumphant (Turvill's), Évêque de Bayeux (Oudin's), Eximia (Girling's), Fancy (Tebay's), Fanny (Keyne's), Fanny Wagh (Forster's), Favorite (Dood's), Favorite (Girling's), Ferdinand I. (Deegen's), Firebrand (Smith's), Fire King (Ansell's), Flambeau (Bailly's), Flora (Stauden's), Francis (Johnes), Fräulein Mutzel (H. Schmitt's), Freiherr v. Biedenfeld (Deegen's), Freiherr v. Pasqualati (Deegen's), Freund Pfister (Mardner's), Friedrich Dietrich (Deegen's), Friedrich Wilhelm IV. (Harnisch), Fritz Knapp (Pohle's), Fürst Poniatowsky, Fürst Wolkonsky (Sieckmann's), Fürstin Trautmannsdorf (Girardoni), Garland (Girling's), Gellert (Rinz's), General Benard, General Bedeau (Millez's), General v. Hedemann (Schmit's), General v. Stockhausen (Bernkopf's), German Defiance (Booth's), Gountled (Smith's), Gräfin Orloff (Sieckmann's), Gräfin v. Stollberg (Deegen's), Grand Duke (Daviés), Grand Maréchal (Bouzin's), Grand Perpetual (Brown's), Gustav (Richter's), Hanseatenstern (Deegen's), Haverland Hero (Harrison's), Hauptmann Schmitt (Sieckmann's), Helene Schmitt (Deegen's), Hero of Maida (Syred's), Hero of Stonehenge (Whale's), Homer (Millet's), Honorable Miss Abbot (Smith's), Ida (Dubra's), Jeanne de Flanres (Descholdt's), Illuminator (Keyne's), Indian Queen, Indispensable (Girling's), Indispensable (Tassart's), Johannes Bosse, oder Sonne vom Elsterthale (Sieckmann's), Johannes Ronge (Sieckmann's), Johannes Ronge (Werker's), Joseph Weyringer (Deegen's), Isi-

Dahlia

dora (Schmidt's), J. Sieckmann (Girardoni), Jupiter (Sieckmann's), Kaufmann Maurer (Deegen's), King of the Goths (Union's), King of Lilac's (Girling's), Königin Elisabeth von Preussen (Pohle), Lady Antrobus (Sparry's), Lady Catharine Jermyn (Girling's), Lady Charlotte (Tomphson's), Lady Grey (Harrison's), Lady Leycester (Girling's), Lady Seymour (Willmer's), Lady St. Mour (Brown's), La Lionne (Lucoz), Lamoriciere (Belleperche), Landrentmeister Bliessener (v. Helldorf), Laura (Sieckmann's), Leila (Wildmann's), Leontina (Dubras's), Leuchtkugel (v. Tettenborn's), Lieutenant Hermann (Deegen's), Lochill (Robertson's), Locomotive (Schmidt's), Lord Grey (Every's), Ludwig Marquardt (Sieckmann's), Ludwig Pems (Deegen's), Ludwig Ranniger (Deegen's), Lynn Rival (Church's), Madame Chauvière (Girling's), Madame Dresser (Deegen's), Madame Forster (Deegen's), Madame Humann (Mardner's), Madame Pems (Deegen's), Madame v. Marsch (Mackoy's), Madame Dumortier Bavais (Girling's), Mademoiselle Louise Messière, Mädchen vom Elsterthal (Sieckmann's), Majestic (Widnall's), Major Lettjau, Marchioness of Aylesbury (Whale's), Marchioness of Exeter, Marchioness of Ormond (Brown's), Maria (Schmidt's), Marie Theresia (Haugk's), Mark Antony (Dood's), Melchior (Sieckmann's), Miranda (Brown's), Miss Chester (Stein's), Miss Funnel (Girling's), Miss Lecharlier (Dufresne's), Miss Wattson (Girling's), Model (Bourne's), Modesta (Girling's), Modesta (Sieckmann's), Mons. Piccy (Tassart's), Moritz Weltz (Sieckmann's), Mstr. Richardson (Edward's), Mstr. Shelly (Mitchell's), Napoleon (Peter's), Natalie (Bretschneider's), Nicolaus Becker (Rinz's), Nihil (Bailly's), Noir et blanc (Descholt's), Nonpareil (Proctor's), Novelty (Whale's), Orange Climax, Orange Perfection (Henbrey's), Orange superb (Dood's), Oriental pearl (Attwell's), Painted Lady (Girling's), Pappenheim (H. Schmitt's), Pauline (Sieckmann's), Perle (Grüneberg's), Peter I. (Haugk's), Pfarrer Kotzschy (Deegen's), Polarstern (Deegen's), Pound Hill Rival (Willmer's), Präsident von Lichtenberg (Rinz's), Präsident Pittschaff (Mardner's), Premier de Voisenau (Guènav's), Preussens Kokarde (Deegen's), Princesse de Joinville (Fourquet's), Princesse de Liège (Mackoy's), Prinz Albert (Adam's), Prinz Albert (Whiteacker's), Prinz Carl von Preussen (Sieckmann's), Prinz of Wales (Dood's), Prinzess Alexandra (Bretschneider's), Prinzess Alicie (Gain's), Prinzess royal (Cook's), Prinzess royal (Hudson's), Prinzess royal (Thompson's), Prinzess Sophie, Pulla (Dubras's), Purpurea alba (Young's), Queen of the Isles (Low's), Queen of Perpetuals (Girling's), Queen of Sommer (Union's), Queen of Trumps (Brown's), Rainbow (Smith's), Raphael (Brown's), Rembrandt (Brown's), Reiny (Mardner's), Revenge (Cook's), Rival White (Whiteacker's), Rival Yellow (Smith's), Rouillard (Soutif's), Rudolph, Edler von Arthaber (Deegen's), Rubens (van Gaert's), Ruthenia (Sieckmann's), Satyrst (Headley's), Schöne Erfürterin (Schmidt's), Sir Frederic Johnstone (Hilleir's), Sir John Stew

Dahlia

Richardson (Union's), Sophie, Erbgrossherzogin von Sachsen-Weimar (Gebser's), Souvenir de Gand (van Houtte's), Spitfire (Fischer's), Standart of Perfection (Keyne's), Standart of Perfection (Union's), Stern von Himmelsthür (Diederich's), Sultana (Appleby's), Sure enough (Harrison's), Surprize (Oakley's), Talma, Tancred (Wildman's), Teutonia (Firl's), The bride (Tancred's), Th. Sieckmann (Sieckmann's), Thiers (Fauvel's), Thorwaldson (Motz), Tournament (Cattleugh's), Tricolor (Meiert's), Triumph de belle perche (Bouzin's), Triumph de Liège (De Fresnes), Triumph de Tours (Messire's), Triumph von Köstritz (Sieckmann's), Twyfordt Perfection (Young's), Uranus (Pohle), Vanguard (Girling's), Venus (Atwell's), Venus (Brown's), Vivid (Thompson's), Weisse Dame (von Weissenborn's), White Defiance (Langellier's), Wilhelm II. (Mardner's), Wilhelmine von Weissenborn, Will Watsch (Girling's), Winterton Rival (Low's), Wratislavia (Hanisch), Yellow Climax (Wildmann's), Zamba (von Tettenborn's), Zeitgeist (Rinz), Zigeunerin (Krauskopf), Zoroaster (Schmitt's), Zrini (Stork's) etc. etc.

Dahlia crinita Thbg., v. *Trichocladus crinitus*, p. 816.

Dais L., Dais.

urticaefolia Hort., nesselblättrige, ♀. t. ?

Dalbergaria sanguinea Tuss. Juss., v. *Tussacia sanguinea*.

Dalbergia L. fil., Dalbergie.

frondosa Roxb. (= *arborea* Heyn.).

latisiliqua Dsf., breitschotige, ♀. w. Südamerika.

pendula Tenore, herabhängende, ♀. w. Ostindien.

Barclayi Hook., v. *Tephrosia mimosoides*.

Dalea L., Dalea.

alopecuroides W. (= *alba* Mchx. = *Cliffortiana* W. = *Linnaei* Mchx. = *Petalostemon alopecuroideum* Pursh = *Psoralea alopecuroides* Poir. = *P. annua* Mill. = *P. Dalea* L.).

citriodora W. (= *lateripes* Moç. Sess. = *Psoralea citriodora* Cav. = *P. foliolosa* Ait.).

laxiflora Pursh (= *enneandra* Fras. = *Kuhnistera laxiflora* Ait. = *Petalostemon laxiflorum* Steud. = *Psoralea laxiflora* Poir.).

versicolor Zuccar., buntfarbige, ♀. t. w. Mexico.

Dalrymplea domingensis Spgl. et *pomifera* Roxb., v. *Turpinia paniculata* et *pomifera*.

Damasonium indicum W. (= *alismoides* RBr. = *Hymenotheca laxifolia* Salisb. = *Ottelia alismoides* P. = *Stratiotes alismoides* L.), — *australe* Salisb., v. *Actinocarpus minor*, p. 17, *maximum* Burm., v. *Limnocharis Plumieri*, p. 464.

Damironia cernua Cass., v. *Helipterum variegatum*, p. 388.

Dammara Rumpf, Dammaratanne.

pinnata Hort., Mack. (= ? *Taxodium* p. Hort. Hügel.), gefiederte, ♀. w. Ostindien.

Danaa aquilegifolia All., v. *Physospermum aquilegifolium*. — *Danthia palustris* Pet., Th., v. *Isnardia palustris*, p. 425.

Danthonia DC., Danthonie.

airoides N. E., schmielenähnliche, ♂. f. ? Cap d. g. Hoffn.

Daphne L., Seidelbast.

Aucklandiae Hort., Auckland's, ♂. k. t. ? China.

Blagayana Freyer, vergl. p. 251.

collina b) fol. luteo-marginatis, c) latifolia.

Laureola L., b) fol. variegatis.

multiflora Thore (= *Laureola* L. var. Rchb.), vielblumiger, ♂. f. Pyrenäen.odora Thbg. (= *japonica* Thbg. = *indica* Hort. = *sinensis* Lam.), d) hybrida fol. variegatis.Noch kommen in den Pflanzenverzeichnissen vor: *luteiana*, *marginata*.**Daphnidium** N. E. (= *Laurus* Auct.), Daphnidie, IX. 1., Laurineae.gracile N. E. (= *Laurus Culilawan* H. Berol. = *L. glauca* Hort. Herbipolit. = *L. gracilis* H. Dresd.), schlanke, ♂. w. ?Myrrha N. E. (= *Laurus Myrrha* Lour. = *Litsaea Myrrha* Mirb. = *Litsaea trinervis* Juss. P. = *Tetranthera trinervis* Spgl. ex parte), Myrrha-D., ♂. w. Cochinchina.*Daphnitis capensis* Spgl., v. *Laurophyllus capensis*.**Dasyliirion** Zuccar., Rauchlilie, VI. 1., Bromeliaceae¹⁾.

acrotliche Zuccar., spitzhaarige, 4. w. Mexico.

filifolium Hort., fadenblättrige, 4. w. Mexico.

longifolium Zuccar., Endl. (= *Roulinia longifol.* Brogn. = *Yucca longifol.* Karw.), langblättrige, 4. w. Mexico.

serratifolium Zuccar., sägezähnlige, 4. w. Mexico.

Dasystemon DC., Rauchfaden, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.calycinum DC. (= *Crassula calycina* Dsf. H. Par.), kelchiger, ☉. m. f. Neuholland.**Datura** L., Stechapfel.

I. Brugmansia P., p. 134.

arborea L. (= *B. candida* P.).bicolor D. Don (= *sanguinea* R. et P. = *B. bicolor* P. = *B. sanguinea* Auct.), α) lutea Hort., β) sanguinea Hort., γ) Lowii*.suaveolens H. B. K. (= *arborea* Hort. = *B. suaveolens* W.).Waymanni Steud. (= *Waymanni* Paxt. t.).Gartenhybriden: *Arbuscula*, *Knigthii*.*floribunda* Paxt. (= *parviflora* Hort.), v. *Juanulloa peregrina*, p. 829.

II. Stramonium Bernh.

alba Wall., N. E. (= *Metel* Roxb., Wall., non L.), weißer, ☉. m. f. Ostindien.

Bojeri Delil., Bojer's, ☉. m. f. ? Mascarenas, Madagasc.

discolor Bernh., verschiedenfarbiger, ☉. m. f. Ostindien.

fastuosa Mill. (= *Hummata* β Bernh.).

fruticosa Hornein., Sw., strauchiger, ♂. ♀. m. f. w. Südam.

Hummata Bernh. (= *dubia* Rich. P.), *Hummata*-St. ☉.m. f. w. Malabar. b) flore pleno. β) *parviflora* N. E.*humilis* Dsf., niedriger, ☉. m. f. ?*muricata* Bernh., Lk. (= *fastuosa* plur. hort. = *Hummata* δ Bernh. = *hybrida* Tenore = *laevis* Schk.),

weichstachelicher, ☉. m. f. Ostindien.

Stramonium L. (= *capensis* Hort. = *loricata* Sbr. = *Pseudostramonium* Sieb.).*Trapezia* Wall., N. E., *Trapezia*-St., ☉. m. f. Ostindien.

1) Nach Endlicher gener plantar. Suppl. ist die Gattung *Roulinia* Brogn. nicht davon verschieden. Auch *Cordyline parviflora* H. B. K. p. 160 gehört nach Endlicher zu dieser Gattung.

Daubentonia DC., Daubentonie.

coccinea Hort. belg., scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.
Tripetii Poit. 1) (= *Tripetiana* Hort.), Tripet's, ♀. w.
 t. Südamerika.

Daubeya Lindl., Daubeyne.

aurea Lindl. (= *Massonia lutea* Hortul.).

fulva Lindl., rothbraune, 4. Zw. t. Süd- u. Ostafrika.

Daucus T. L., Möhre.

abyssinicus C. A. Mey. (= *Carota* var. *abyssinic.* A. Braun), abyssinische, ☉. ♂. f. Abyssinien.

australis Poepp. (= *Carota* Gill. et Hook.), südliche, ☉. f. Chili.

bessarabicus DC. (= *Cachrys littoralis* Spgl. = *Caucalis littoralis* MB. = *Platyspermum littorale* K., p. 634), bessarabische, ♂. Bessarabien, Caucasus.

bicolor Sibth., Sm. (= *Carota* L. var. Spgl.), zweifarbige, ☉. f. Griechenland.

Bocconi Guss., Boccone's, ♂. f. Calabrien.

coadunatus Tenore (= *polygamus* β *maximus* Auct.), verbundene, ☉. ♂. Neapel.

Gingidium L. (= *mauritanicus* Salzm. = *maximus* Dsf.).

glaberrimus Dsf., kahlste, ☉. f. Nordafrika.

glochidiatus Fisch. et Mey. (= *Caucalis glochidiata* Poir. = *Scandix glochidiata* LaBill.), widerhackige, ☉. f. Neuholland.

grandiflorus Dsf., großblumige, ☉. f. Nordafrika.

hispanicus DC., Gouan (= *Carota* var. γ Sm. = *gummifer* Lam. = *maritimus* Wither.), spanische, ♂. f. England, Süd- und Westeuropa.

involucratus Sibth., Sm. (= *creticus* Mill.), vielhüllige, ☉. f. Cypern, Creta.

laserpitioides DC. (= *Caucalis virgata* Poir. = *Laserpitium daucoides* Dsf.), laserkrautähnliche, ♂. 4. k. Mauritien.

mauritanicus All. (? L.) (= *Carota* L. var. Spgl. = *carnosus* Mch. = ? *maximus* Dsf. = ? *prolifer* Auct. et Hort. = *Caucalis hispanica* Crtz.).

muricatus L. (= *alatus* Poir. = *Artemisia muricata* L. = *Platyspermum muricatum* Hoffm., p. 634).

prolifer Presl (= ? *siculus* Tineo), sprossende, ☉. f. Sicilien.

pubescens K. (= ? *littoralis* Sib. Sm. = *Caucalis glabra* Forsk.), feinhaarige, ☉. f. Aegypten.

pulcherrimus K. (= *Caucalis orientalis* MB. = *C. pulcherrima* W. = *Platyspermum pulcherrimum* K. p. 634).

setifolius Dsf. (= ? *verticillatus* Hornem.), borstenblättrige, ♂. 4. f. b. k. Nordafrika.

setulosus Guss., horstige, ☉. f. Unteritalien.

Unbestimmtere: *cuminoides* Lam., *pectinatus* DC., *rigidus* H. Par., *serratus* Hort.

Davallia Sm., Davallie.

arborescens W. (= *concinna* Presl), baumartige, 4. ♀. w. Hispaniola.

Schlechtendalii Presl, Lk. (= *divaricata* Chamiss. et Schldl.), Schlechtendal's, 4. w. Mexico.

solida Sw. (= *Trichomanes solidum* Forst.), dichte, 4. w. Inseln des stillen Meeres.

1) J. J. Tripet, berühmter Tulpenkultivateur.

Daviesia Sm., *Daviesia*.

- alternifolia* Endl., wechselblättrige, f. t. Neuholland.
angulata Benth., kantige, f. t. Neuh. (Schwanenflufs).
brevifolia Lindl., kurzblättrige, f. t. Neuholland.
colletoides Cunningh., colletiaähnliche, f. t. Neuholl.
coluteoides A. Cunn., blasenstrauchähnliche, f. t. Neuh.
divaricata Benth., ausgesperrte, f. t. Neuholland.
falcata H. Belg., sichelförmige, f. t. Neuholland.
flexuosa Benth., hin- und hergebogene, f. t. Neuholl.
Frazeri H. angl. et belg., Frazer's, f. t. Neuholland.
genistaefolia Benth., ginsterblättrige, f. t. Neuholl.
intermedia H. Belg., mittlere, f. t. Neuholland.
longifolia Benth., langblättrige, f. t. Neuholland.
macrophylla Endl., großblättrige, f. t. Neuholland.
mimosoides RBr. (= *corymbosa* Andr., non Sm.).
oppositifolia Endl., gegenblättrige, f. t. Neuholland.
paniculata Benth., rispige, f. t. Neuholland.
pedunculata Benth., gestielte, f. t. Neuholland.
pectinata Lindl., kammförmige, f. t. Neuholland.
physodes A. Cunningh. (= *cornuta* Hort. belg.).
polyphylla Benth., vielblättrige, f. t. Neuholland.
pubigera Cunn., feinhaarige, f. t. Neuholland.
pungens Hort. belg., stechende, f. t. Neuholland.
quadrilatera Benth., vierseitige, f. t. Neuholland.
ramulosa Benth., ästige, f. t. Neuholland.
ruseifolia Cunn., mäusedornblättrige, f. t. Neuholl.
saligna H. Anglor., weidenblättrige, f. t. Neuholland.
ternata Endl., dreizählige, f. t. Neuholland.
umbellulata Sm. (= *umbellata* LaBill.).
villifera Cunn., zottige, f. t. Neuholland.

denudata Vent. (= *juncea* P.), v. *Viminaria denudata*, p. 849, *ericoides* P., v. *Aotus villosa*, p. 40, II.

Debraea floribunda R. et S. et *violacea* Mart. et Zuccar., v. *Erisma floribundum*, p. 310 et *violaceum*.

Decaneurum DC., Zehnnervler.

- amygdalinum* DC. (= *Vernonia amygdalina* Delil.), mandelblättriger, f. w. Nubien.
senegalense DC. (= *Baccharis senegalensis* P. = *Chrysocoma amara* Schum. = *Conyza rutilans* Poir. = *Eupatorium coloratum* W. = *Gymnanthemum cupulare* Cass. = *Vernonia senegalensis* Less., non Dsf.).

Decaspora RBr., Zenhsaamler, V. I., Epacrideae.

- Cunninghami* DC. (= *thymifolia* Cunn., non RBr.), Cunningham's, f. t. Neuholland.
disticha RBr. (= *Cyathodes disticha* LaBill. = *Trochocarpa disticha* Speg.), zweizeiliger, f. t. Neuholland.
thymifolia RBr. (= *oxycoccoides* Cunningh. = *Trochocarpa thymifolia* Speg.), thymianblättriger, f. t. Van Diemens Land.

Deckera canescens C. A. Mey., v. *Picris laevis*.

Decodon aquaticus Gmel. (= *verticillatus* Ell. =

Anonymos aquatica Gm. = *Lythrum verticillatum* L. = *Nesaea verticillata* H. B. K.), vergl. v. 254.

Decumaria barbara L. (= *Forsythia* Mchx. = *radicans* Mch. = *scandens* P.).

Deilosma matronalis Andrzy (= *sibirica* Andrzy), *suaveolens* Andrzy, *tristis* Spach., v. *Hesperis matronalis*, *runcinata*, *tristis*, p. 393.

Deloderium taraxacifolium Cass., v. *Millina hyoseroides*, p. 524.

Delphinium T., Rittersporn.

- axilliflorum DC., achselblumiger, ☉. f. Syrien.
 azureum Mchx. (= *carolinianum* Walt.), β) ochroleucum Nutt., γ) puberulum, δ) velutinum, ε) minute puberulum.
 Bovei Decaisn., Boves, ☉. f. Syrien.
 camptocarpum Fisch. et Mey., bogenfrüchtiger, ☉. f. Nord-Turcomanien.
 Carumnae Lapeyr. (= *Garumnae* Auct. = *verdunense* Balb.), Carumna's, ☉. f. Südfrankreich.
 cheilanthum Fisch. (= *dahuricum* Stev. Bess.).
 elatum L., ζ) speciosum MB. (= *crassifolium* Schrad.), amoenum Bernh., angustum Hort. gratum Hffg., fol. albo marginatis Hort. neglectum Colla, sulcatum Hffg., sind ebenfalls hierher gehörige mehr oder wenig beständige Gartenvarietäten.
 exaltatum Ait. (= *americanum* Hort. = *anomalum* Szgl.).
 flavum DC., hellgelber, ☉. f. Orient.
 Forskohlei Rehb. (= *grandiflorum* Forsk.), Forskohl's, ☉. f. Dardanellen.
 glabellum Turcz. (= *palmatifidum* β *glabellum* DC.), glatter, 4. f. Baikal.
 gracile DC. (= *junceum* L. var. Szgl.), schlanker, ☉. f. Spanien.
 grandiflorum, Gartenvariet.: *anomalum* fl. pleno, azureum et fl. pleno, flore rubro et pleno, monstrosum, pallidum fl. pleno, pallidum tricolor, purpureo-coeruleum etc.
 hybridum Steph. W., α) orientale Fisch., Mey. et Lallemand. (= *hybridum* Rehb.), a) albiflorum DC., b) ochroleucum Stev., c) puniceum Pall., β) fissum W. K., γ) velutinum Bertol., δ) dasyanthum Lallemand. (= *velutinum* γ *orientale* DC.)¹⁾
 lepidum Fisch. et Lallemand., schilferiger, 4. f. Caucasus.
 macropetalum DC., grofskroniger, ☉. f. Nordafrika.
 Menziesii DC. (= *simplex* Hook.).
 mesoleucum Lk.
 nanum DC. (= *peregrinum* Delille), zwergiger, ☉. f. Aegypten.
 ornatum C. Bouché (= *commutatum* Bouché = *Consolida* fl. pleno Hort. = *anglicum* Hort. = *humile* Hort.), zierlicher, ☉. f. England. b) fl. pleno.
 parviflorum Turcz., kleinblumiger, 4. f. Baikal.
 pubescens DC. (= *Ajacis* L. var. Trevir. = *ambiguum* Loisel. = *Consolida* Gouan), b) flore pleno.
 triste Fisch. (= *obscurum* Steven = *puniceum* L. var. Szgl.).
 vestitum Wall., bekleideter, ♂. k. Ostindien.

Demazeria sicula Dumort., v. *Brizopyrum siculum*, p. 131.

Demetria glutinosa Lagasc. et *inuloides* Lagasc., v. *Grindelia glutinosa* et *inuloides*, p. 369.

Dendrium buxifolium Desv., v. *Leiophyllum thymifolium*, p. 452.

1) Vergl. Index nonus seminum quae hortus botanicus imperialis Petropolitani pro mutua commutatione offert. Auct. Fischer, G. A. Mey. et Avé Lallemand.

Dendrobium Sw. Baumstendel.

- aduncum Hort. Mak., hackiggekrümmter, 4. w. ? Ostind.
 aqueum Lindl., wässeriger, 4. w. Ostindien.
 aureum Lindl. (= *pallidum* Bot. reg.), goldfarbiger, 4. w. Ceylon.
 calamiforme Lodd., federkielartiger, 4. w. Ostindien.
 catenatum Lindl. (= *Epidendrum monile* Thbg.), kettenförmiger, 4. w. Japan.
 compressum Lindl., platter, 4. w. Ceylon.
 crispatum Sw. (= *denudans* Hort. belg. = *Epidendrum crispatum* Forst.), krauser, 4. w. Societätsinseln.
 cucullatum RBr. (= *Pierardi* Roxb.), α) latifolium, β) lutescens.
 cucumerinum Lindl., gurkenähnlicher, 4. w. Neuholl.
 Cunninghamsi Steud. (= *pygmaeum* Cunnigh., non Sm.), Cunningham's, 4. w. Neuholland.
 cuspidatum Lindl., langspitziger, 4. w. Ostindien.
 Devonianum Hort. Mak., Devon's, 4. w. Ostindien.
 fimbriatum Wall., Hook., β) oculatum Hook. Nepal.
 flavescens Lindl. (= *Onychium flavescens* Blum.), gelblicher, 4. w. Java.
 flavum Hort. belg., hellgelber, 4. w. ? Ostindien.
 grandiflorum Lindl. (= *Desmotrichum grandiflorum* Blum.), großblumiger, 4. w. Java.
 Griffithii Lindl., Griffith's, 4. w. Ostindien.
 heterocarpum Wall., Lindl. (= *Cambridgeanum* Paxt.), verschiedenfrüchtiger, 4. w. Nepal.
 japonicum Lindl. (= *Onychium japonicum* Blume), japanischer, 4. w. Japan.
 Jenkinsii Lindl., Jenkin's, 4. w. Ostindien.
 Kingianum van Houtte, King's, 4. w. ? Ostindien.
 Lindleyi Steud. (= *aggregatum* Lindl. (non H. B.) = *Epidendrum aggregatum* Roxb.), Lindley's, 4. w. Ostindien.
 Macraei Lindl., Macraei's, 4. w. Ceylon.
 macranthum Rich., großblumiger, 4. w. Insel Vanikoro, Manilla.
 macrophyllum Rich., großblättriger, 4. w. Neuguinea.
 Maelenii Hort. belg., Maelen's, 4. w. ? Ostindien.
 multicaule Hort., vielstengelig, 4. w. ? Ostindien.
 mutabile Lindl. (= *Onychium mutabile* Blume), veränderlicher, 4. w. Java.
 nutans Lindl. (non Presl), nickender, 4. w. China.
 paniculatum Sw., rispiger, 4. w. Sierra Leone.
 Paxtonii Lindl., Paxton's, 4. w. Ostindien.
 pulchellum Roxb. (= *buxifolium* Hort.).
 pygmaeum Lindl., Wall. (= ? *pusillum* Don), zwergiger, 4. w. Ostindien.
 recurvum Hort., zurückgekrümmter, 4. w. ? Ostindien.
 rhombeum Lindl., rautenförmiger, 4. w. Manilla.
 Ruckeri Lindl., Rucker's, 4. w. Philippinen.
 sanguinolentum Lindl., blutfarbiger, 4. w. Ceylon.
 secundum Wall., Lindl. (= *Pedilonum secundum* Blum.), Ostindien, Java.
 taurinum Lindl., stierähnlicher, 4. w. Manilla.
 Wallichianum Lindl., Wallich's, 4. w. Ostindien.
 undulatum RB. (= *discolor* Lindl.).
 album Hook., *Barringtonia* Sm., *ciliatum* Sw., *Harrisoniae* Hook., *Houttei* Hort. belg., *plicatum* Dietr. (= *paniculatum* P.), *palmifolium* Sw., pro-

liferum Sw., *squalens* Lindl., v. *Maxillaria alba*, *Barringtoniae*, *ciliata* *Harrisoniae*, *Houttei*, *palmifolia*, *paniculata*, *prolifera* et *squalens* (zum Theil p. 500), — *cultriforme* Pet. Th., *polystachyum* Pet. Th., v. *Polystachya cultriformis* et *zeylanica*, — *graminifolium* W., v. *Octomeria graminifolia*, p. 553, — *galeatum* Sw., *leopardinum* Wall., *pumilum* Sw., v. *Bulbophyllum galeatum*, *leopardinum* et *pumilum* p. 137 et p. 81, II., *ruscifolium* Sw., v. *Pleurothallis ruscifolia*, p. 635, — *veratrifolium* Roxb., v. *Phajus veratrifolius*.

Denhamia scandens Schott, v. *Culcasia scandens*, p. 175, II.

Dentaria T., Zahnwurz.

bipinnata C. A. Mey., doppeltgefiederte, 4. Kn. f. Caucasus.
canescens Tenore, grauliche, 4. Kn. f. Neapel.

leucantha Tausch, weißblumige, 4. Kn. f. ?

microphylla W., kleinblättrige, 4. Kn. f. Caucasus.

quinquefolia MB. (= *caucasica* W.).

tenuifolia Ledeb. (= *trifida* Lam. = *Cardamine tuberosa* Patrin), dünnblättrige, 4. Kn. f. Sibirien.

dasyloba Turcz., v. *Cardamine dasyloba*, p. 118, II.

Descourainia Irio Webb Berthel., *pinnatifida* Webb Berthel., v. *Sisymbrium Irio* et *pinnatifidum*, p. 762.

Desmanthus W., Schopfblume, Büschelschopf.

divergens W. (= *leptostachys* DC. = *nutans* DC. = *trichostachys* DC. = *Dichrostachys nutans* Benth. = *Caillea dichrostachys* Guill. et Perr.). Senegambien, Aethiopien, Port Natal.

natans W. (= *Mimosa natans* Roxb. = *M. prostrata* Lam. = *Neptunia oleracea* Lour.), — *lacustris* W. (= *Acacia lacustris* Dsf. = *Mimosa aquatica* P. = *M. lacustris* H. B. K.), — *stolonifer* DC. (= *Neptunia stolonifera* Guillem. et Perr. gehören nach Benth. und Walpers auch zu *natans*), Ostind. Cochinchina, Mittägl. Amerika, Senegal. Vergl. p. 257.

plenus W. (= *Mimosa plena* L. = *Neptunia plena* Benth.).

strictus Bertol. Antillen.

virgatus W. (= *leptophyllus* H. B. K. = *Acacia virgata* G. = *A. angustisiliqua* Dsf. = *Mimosa angustisiliqua* Lam. = *M. virgata* L.), Ostindien, Cumana.

Desmochaeta Bandhaar.

sanguinolenta Lk., blutfarbiges, ♂. w. Ostindien.

densiflora H. B. K. (= *uncinata* R. et S.), v. *Pupalia densiflora*, — *alternifolia* DC. et *muricata* DC., v. *Cladostachys alternifolia* et *frutescens*, p. 202.

Desmodium Desv., DC., Bandesparsette.

altissimum Sweet, höchste, ♂. w. Ostindien.

ancistrocarpum DC. (= *Hedysarum ancistrocarpum* Ledeb. = *H. uncinatum* Jacq.), stachelfrüchtige, ♂. w. Brasilien.

canescens DC. (= *Hedysarum scaberrimum* Ell.).

caudatum DC. (= *Hedysarum caudatum* Thbg.), geschwänzte, 4. k. Japan.

congestum Wall. (= *Hedysarum congestum* Rottl. = *H. umbellatum* Roxb., non L.), gedrängte, ♂. w. Ostindien.

gangeticum DC. (= *collinum* Loud. = *maculatum* DC. = *Aeschynomene gangetica* et *maculata* Poir. =

Desmodium

Hedysarum Asperula Hamilt. = *H. collinum* Roxb.
= *H. gangeticum* et *maculatum* L. = *H. ochroleu-*
cum Mch. = *H. styracifolium* Roxb.).

glabrum DC. (= *Hedysarum glabrum* Mill.), kahle,
☉. w. m. f. ?

heptaphyllum Sweet, siebenblättrige, ♀. w. Ostindien.

incanum DC. (= *Aeschynomene incana* Meyer = *Hedy-*
sarum canescens Mill. = *H. incanum* Sw.).

laburnifolium DC. (= *Hedysarum laburnifolium* Poir.),
bohnenbaumblättrige, ♀. w. Java.

leiocarpum G. Don, glattfrüchtige, ♀. w. Montevideo.

mauritanium DC. (= *Aeschynomene arborea* Sbr. =
Hedysarum mauritanicum W.), mascarenische, ♀. w.
Mauritius.

mexicanum Sweet (= *Hedysarum adscendens* β *coeruleum*
Liudl.), mexicanische, ♀. t. k. Mexico.

multiflorum DC. (= *floribundum* Don = *Hedysarum*
floribundum Don).

polycarpum DC. (= *angulatum* DC. = *capitatum* DC.
= *Hippocrepis* DC. = *heterocarpum* DC. = *serpens*
Wall. = *siliquosum* DC. = *tenuis* Grah. = *Hedy-*
sarum capitatum Burm. = *H. conicum* P. = *H. he-*
terocarpum L. = *H. polycarpum* Poir. = *H. retu-*
sum Don = *H. siliquosum* Burm. = *H. Wallichianum*
Spgl. = *H. purpureum* Roxb. = *Hippocrepis barbata*
Lour.), vielfrüchtige, 4. ♀. w. Ostindien, China.

repens DC. (= *Hedysarum repens* L.), kriechende, 4.
f. Nordamerika.

rhomboideum Sweet (= *Hedysarum rhombifolium* Ell.,
non Roxb.), rautenförmige, ♀. w. Ostindien.

sagittatum DC. (= *Hallia sagittata* Desv. = *Hedysa-*
rum sagittatum Poir.).

serotinum DC. (= *Hedysarum serotinum* W.), späte,
4. k. Mexico.

Thunbergii DC. (= *Hedysarum heterocarpum* Thbg.),
Thunberg's, 4. k. Japan.

uncinatum DC. (= *Hedysarum uncinatum* Jacq.), ha-
kenförmige, ♀. w. Caracas.

velutinum DC. (= *Hedysarum velutinum* W.), sammet-
haarige, ♀. w. Mittägl. Amerika.

hamosum Loud., v. *Uraria hamosa*.

Desmoncus Mart., Bandpalme.

americanus Lodd. (= *Calamus americanus* Hort. angl.).

macroacanthus Mart., großstachelige, ♀. w. Brasilien.

polyphyllus Poit., vielblättrige, ♀. w. Guiana.

mitis Mart., *oxyacanthus* Mart., *pyncacanthus* Mart.,

setosus Mart., ♀. sämmtl. Brasilianer, und *prunifer*

Poepp., ♀. Peru, werden bis jetzt noch nicht kultivirt.

Desvauxia Billardieri RBr. (= *Centrolepis fascicularis*
LaBill. = *cuspidigera* Rudge), p. 258.

Desvauxia fluitans P. Beauv., v. *Glyceria fluitans*.

Detridium Bergianum N. E., v. *Agathæa Bergiana*,
p. 13, II.

Deutzia Thbg., Deutzia.

canescens Sieb., grauliche, ♀. k. f. b. Japan.

crenata Sieb. et Zuccar., kerbblättrige, ♀. k. f. b. Japan.

corymbosa RBr. (= *Philadelphus corymbosus* Wall.),
traubendoldige, ♀. k. f. b. Nepal.

gracilis Sieb. et Zuccar., schlanke, ♀. k. f. b. Japan.

Deutzia

Außerdem kommen von dieser interessanten Gattung noch folgende (die mit der Zeit vielleicht auch noch in den Gärten eingeführt werden), vor: *Brunoniana* RBr. (= *Leptospermum scabrum* Wall.), Ostindien, grandiflora Bunge, Nordchina, parviflora Bunge, Nordchina, staminea RBr. (= *Philadelphus stamineus* Wall. = *Leptospermum stamineum* Wall.), Ostind. Sämml. ♂ . ♂ .

Deverra DC., Deverra, V. II., Umbelliferae.

tortuosa DC. (= *Bubon tortuosum* Dsf., non Lk. Hffg. = *Athamantha tortuosa* Spgl. = *Crithmum pyrenaicum* Forsk.), gewundene, ♂ . k. Nordafrika.

Deyeuxia acutiflora P. B., *confinis* Kunth, *Langsdorffii* Kunth, *lapponica* Kunth, *montana* Clar. Poir. (= *varia* Kunth), *neglecta* Kunth, *purpurea* Kunth, *sylvatica* Kunth, v. *Calamagrostis acutiflora*, *confinis*, *Langsdorffii*, *lapponica*, *montana*, *stricta*, *purpurea et sylvatica*, p. 143 et 144, — *aemula* Kunth, *Billardieri* Kunth, *Forsteri* Kunth, *retrofracta* Kunth, v. *Lachnagrostis aemula*, *Billardieri*, *Forsteri et retrofracta*, p. 887, — *megapotamica* Spgl., v. *Andropogon laguroides*, p. 56.

Dianella Lam., Dianelle.

humilis Lodd., niedrige, 4. Kn. t. ?

scabra Lodd., schärfliche, 4. Kn. t. ?

Dianthera americana Forsk. (= *flava* Vahl), v. *Barleria flava*, p. 113.

Hinsichtl. der übrigen s. *Dicliptera et Justicia*.

Dianthus L., Nelke.

actinopetalus Fenzl, strahlenkronige, 4. ♂ . k. Taurus. albens Ait. (= *incurvus* Thbg.).

arenarius L. (= *dubius* Hornem. = *praecox* W. = *uniflorus* Gilib.).

atrorubens All. (non M. B.) (= *Carthusianorum* β Poir. DC. = *diutinus* Rehb. = *glomeratus* Bess.).

attenuatus Sm. (= *fimbriatus* Brotero = *geminiflorus* Loisel. = *inodorus* G. = *longiflorus* Lam. = *lusitanicus* Brotero = *malacitanus* Hens.), verschälerte, 4. f. Frankreich, Spanien.

barbatus L., c) splendidissimus Hort.

bicolor MB. (= *lanceolatus* Steven, *saxatilis* Pall.).

biflorus Sm. (= *binatus* Bartl.).

caesius Sm. (= *suavis* W. = *virgineus* β L.).

Carthusianorum L., e) nanus Sweet.

Caryophyllus L., β) *imbricatus* L., γ) *coronarius* Lam., δ) *corsicus* Fisch. Außerdem viele Gartenvarietäten, die vorzüglichsten nach Sweet: *Bacchus*, *coeruleo-purpureus*, *Clintoniae*, *Franklini*, *fruticans* (= *fruticosus*) *inimitabilis*, *tricolor*, *Leopoldi*, *multiplex*, *pulchellus*, *puellulus*, *purpureo-cinctus*, *rubro-cinctus*, *striatulus*, *Tarrara*, *triumphans* etc. etc.

ciliatus Gussone, gewimperte, ? 4. f. Unteritalien.

clavatus Dsf. (non Spgl.) (= *cornutus* Hort.), keilförmige, 4. f. ?

compactus Kit. (? = *pulchellus* Schrad.), dichtblumige, 4. f. Ungarn.

crinitus Sm., mähenförmige, 4. f. b. k. Orient.

dentatus Fisch. (= *dentosus* Auct. = ? *inodorus* Pall.).

elatus Ledeb., hohe, 4. f. Altai.

Dianthus

- elongatus C. A. Mey., verlängerte, 4. f. Caucasus.
 filiformis Tenore, fadenförmige, ? ♂. f. ? Unteritalien.
 floribundus Spach, blüthenreiche, ♂. f. ?
 fragrans MB. (= *multifidus* W. herb. = *plumarius* MB.).
 graminifolius Presl (= *Arrostii* γ Presl), grasblättrige,
 4. f. Süditalien.
 hirtus Vill. MB. (= *scaber* Chaix = *virginus* Habl.),
 rauhe, 4. f. Südfrankreich, Taurien.
 hyssopifolius Hort. Angl., ysopterblättrige, 4. Sibirien.
 integer Visian., ganze, 4. f. Dalmatien.
 juniperinus Sm. (= *aciphyllus* Sbr. = *arboreus* L. var. P.),
 wachholderähnliche, ♀. k. Griechenland.
 longicaulis Tenore (= *nodosus* Tausch).
 monspessulanus L., β) alpestris Stbg. Hoppe (non Balb.)
 (= *Sternbergii* plur. Auct. = *speciosus* Rchb.), γ)
 marsicus Tenore.
 nitidus W. K. (= ? *alpestris* Balb.),
 pavonius Tausch (= *alpinus* L. var. ?), Pfauen-N., 4.
 f. ? Schweiz.
 plumarius L. (= *blandus* Rchb.), β) hortensis Schrad.,
 γ) portensis Libosch., δ) moschatus Dsf. Mey. Garten-
 varietäten: plenus, albus, carneus, Aclandae, Barrati,
 Cheeseanus, heroicus, Houseanus, inclitus, regalis,
 Uxbridgeanus Sweet.
 polymorphus MB. (= *atratus* Beaupré), vielgestaltige,
 4. f. Taurien, Caucasus, Sibirien.
 β) diutinus Kit. Lk. (= *brevifolius* Frivalds.).
 pomeridianus L. (= *tricolor* Adam).
 pratensis MB. (= *chloroleucus* Fisch. Hornem. = *ta-
 taricus* Fisch.).
 pulchellus P. Rchb., schöne, 4. f. Mont Cenis.
 pulcherrimus Loisel., schönste, 4. k. China.
 racemosus Visian., traubige, 4. f. Dalmatien.
 scaber Thbg., scharfe, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
 Schraderi Rchb. (= *chinensis* L. var. = *pulchellus*
 Schrad. non P.), Schrader's, ♂. 4. f. ? (Hybride).
 serotinus W. K. (= *arenarius* Towns., non L. = *hun-
 garicus* P. = *plumarius* β Whlbg. K.).
 serrulatus Dsf., feinsägezahnige, 4. k. Nordafrika.
 suaveolens Spgl. (= *dubius* Hornem.).
 suffruticosus W. (= *arborescens* Hort. Carlsruh.).
 tataricus Fisch. Schrank, tatarische, 4. f. Tatarei.
 trifasciculatus Kit. (= *pseudobarbatus* Bess. = *lanci-
 folius* Tausch), dreibüschelige, 4. f. Banat.
 virginus L. (= *Arrostii* Presl = *rupestris* L. fil. =
pungens Poir., non L.), 4. f. Südeuropa, Sibirien.
 b) flore pleno, β) subcaulis Vill. Loisel.
 viridescens Visian., grünende, 4. f. b. k. Dalmatien.
 viscidus Bory et Chaub., schmierige, 4. k. Griechenland.
 vulturius Guss. et Tenore, neapolitanische, ♂. 4. f.
 Süditalien.
 Waldsteinii Stbg., Waldstein's, 4. f. Krain, Ungarn.
 Gartenhybriden: badinus, glaucophyllus Colla (non
 ? Hornem.), Goethalsii, grandiflorus, hybridus H.
 Angl., Napoleonis, purpureus Lam.
recticaulis Ledeb., v. *Tunica stricta*.
Diaphane edulis Salisb., v. *Moraea Sisyrinchium*,
 p. 530.

Diasia DC., Diasie.

graminifolia β intermedia* (= *Melasphaerula intermedia* Swt.).

parviflora Steud. (= *Melasphaerula parviflora* Lodd.), kleinblumige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Diastella bryiflora Salisb., v. *Leucospermum puberum*, p. 459.

Diatonta aurea Nutt., *coronata* Nutt., v. *Coreopsis aurea et trichosperma*, p. 218 et 119 et p. 160 et 191 II.

Dibrachia peltata Eckl. Zeyh., *scutata* Eckl. Zeyh., v. *Pelargonium peltatum et scutatum*, p. 597 et 598.

Diceratium prostratum Lagasc., v. *Notoceras hispanicum*, p. 550.

Dichaea Lindl., Schweifstendel, XX. I., Orchideae.

glauca Lindl. (= *Cymbidium glaucum* Sw. = *Epidendrum glaucum* Sw.), blaugrüner, 4. w. Jamaica.

graminoides Lindl. (= *Cymbidium graminoides* Sw. = *Epidendrum graminoides* Sw. = *Isochilus graminoides* Hook.), grasähnlicher, 4. w. Westindien.

panamensis Lindl., panamischer, 4. w. Panama.

trichocarpa Lindl. (= *Cymbidium trichocarpum* Sw. = *Epidendrum trichocarpum* Sw.), haarfrüchtiger, 4. w. Jamaica.

Dichantium nodosum Willem., v. *Andropogon annulatus* p. 56.

Dichelostemma Kunth, Spaltkrone, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

congestum Kunth (= *Brodiaea congesta* Sm., p. 131, = *Hookera pulchella* Salisb.).

Dichodon Bartl., Doppelmieri, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae (Stellarieae).

anomalum Bartl., Rchb. (= *Cerastium anomalum* W.K. = *Stellaria anomala* Rchb. = *St. cerastoides* Merlet = *St. dubia* DC. = *St. sabulosa* Fisch. = *St. viscida* MB., p. 786).

cerastoides Rchb. (= *Cerastium carinthiacum* Vest. = *C. elegans* Fisch. = *C. lapponicum* Crantz = *C. refractum* All. = *C. stellarioides* Hartm. = *C. trigynum* Vill. = *Stellaria elegans* Sering. = *cerastoides* L., p. 786 = *glareosa* Turtsch. = *multicaulis* W.).

Dichondra Forst., Doppelkorn.

repens Forst., β) sericea Sw., γ) carolinensis Mchx.

Dichopogon Kunth, Doppelbart, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

setosus Kunth (= *Arthropodium fimbriatum* RBr., p. 85).

Dichorisandra Mik., Doppelbeutel.

Aubletiana R. et S. (= *Commelyna hexandra* Aubl. = *Tradescantia divaricata* Vahl), Aublet's, 4. w. Südamerika.

hirtella Mart. (= *puberula* β N. N. Mart.), kurzhaarige, 4. w. Brasilien.

ovata Mart., eiförmiger, 4. w. Brasilien.

procera Mart., hohe, 4. w. Brasilien.

Dichostylis N. E., Zinkengriffel, III. I., Cyperaceae. Vergl. p. 262.

Micheliana N. E. (= *Isolepis Micheliana* R. et S. = *Fimbristylis Micheliana* Rchb. = *Scirpus Michelianus* L.).

pygmaea N. E. (= *Cyperus pygmaeus* Rotth., p. 246 = *C. diffusus* Roxb. = *C. Michelianus* Lk. = *pugioni-*

Dichostylis

formis A. Dietr. = *C. squarrosus* Roxb. (non L.) = *Kyllingia uncinata* Lk., p. 440 = *Pycreus pygmaeus* N. E. = *Scirpus Michelianus* Sieb., non L.), zwerger. ☉. ♂. w. f. Ostindien, Aegypten.

Dichromena Rich., Doppelbinse, III. 1., Cyperaceae. *leucocephala* Mchx. (= *Rhynchospora ochroleuca* Baldw. = *Schoenus stellatus* Sw. = *Scirpus cephalotes* Walt.), weisköpfige, 4. k, Nordamerika, Westindien.

Dicksonia L'Her., Dicksonie.

squarrosa Lodd. (non Sw.), sparrige, 4. w. ? Südamer. *tenera* Presl (= *adiantoides* Hort. Berol. non Humb.), zarte, 4. w. Südamerika.

Zippeliana Kunze (= *aculeata* Zipp., non Spgl.), Zippelius's, 4. w. Ostindien.

antarctica LaBill. et *arborescens* L'Her., v. *Balanium antarcticum* et *arborescens*, p. 58, II., *Baranetz* Lk., v. *Cibotium glaucescens*, p. 143, II.

Diclidostigma Kunze, Doppelnarbe, XVII. 1. (V. 1.). *melothrioides* Kunze, kümmerlingähnliche, 4. Kn. Sch. w. Cuba.

Dicliptera Juss., Doppelklappe.

ciliata S. Schauer, gewimperte, ♂. w. Caracas.

Moritziana S. Schauer, Moritz's, ♂. w. Caracas.

multiflora Juss. (= *Dianthera multiflora* R. et S. = *Justicia multiflora* Vahl), vielblumige, ☉. 4. w. Quito.

pectinata Juss., v. *Rungia pectinata*, *spinosa* Lodd., v. *Barleria lupulina*, p. 113, *verticillaris* R. et S., v. *Hypoestes verticillaris*.

Dicoma Cass., Doppelschopf, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

carduoides Schultz Bipont. (= *Schaffnera carduoides* Schultz), distelähnlicher, ☉. m. f. Abyssinien.

speciosa Less., prächtiger, 4. k. t. Südafrika.

Dicrypta Lindl., Dicrypte.

Baueri Lindl. (= *Heterotaxis crassifolia* Lindl.), Bauer's. 4. w. Jamaika.

glaucescens Lindl., blaugrüne, 4. w. Südamerika.

Dictyoloma Juss., Netzsaum, X. 1., Rutaceae-Xanthoxyleae.

Vandellianum Juss. (= ? *incanescens* DC.), Vandelli's, ♂. w. Brasilien.

Dictyopteris *attenuata* Kunze, v. *Polypodium* (Sect.) *attenuatum*, p. 645.

Didelta *carnosum* Ait. (= *tetragoniaefolia* L'Her. = *capensis* Lam. = *Choristea carnosum* Thbg. = *Polymnia carnosum* L. fil.), ♂. ?

Didymocarpus Rexii Bowie, v. *Streptocarpus Rexii*.

Dieffenbachia Schott (D. Dieffenbach, Naturforscher und Reisender etc.), XXI. IX., Aroideae.

Seguine Schott (= *Caladium seguinum* Vent., p. 143 = *Arum seguinum* L.), β) *maculata* Sweet (= *Caladium maculatum* Lodd., p. 143).

Dienia Lindl., Dienie, XX. 1., Orchideae.

congesta Lindl. (= *Malaxis latifolia* Sm. = ? *Stelis hirta* Sm.), gedrängte, 4. w. Mexico.

cordata Lindl., herzförmige, 4. w. Ostindien.

cylindrostachya Lindl., cylinderährige, 4. w. Ostindien.

muscifera Lindl., fliegenblumige, 4. w. Ostindien.

Diervilla T., Dierville.

hortensis Sieb. et Zuccar., Garten-D., ♣. f. b. k. Japan.
 Ob von den Nachverzeichneten einige in unsern Gärten eingeführt worden, ist mir unbekannt: *floribunda* Sieb. et Zuccar., Japan, *florida* Sieb. et Zucc. (= *Calysphyrum floridum* Bunge), Nordchina, Japan, *grandiflora* Sieb. et Zuccar. (= *corensis* DC.), Japan, *versicolor* Sieb. et Zuccar. (= *japonica* DC. = *Weigelia japonica* Thbg.), Japan. Sämmtlich ♣.

Diets *crassifolia* G. Don (= *Iris crassifolia* Lodd., p. 422).

Dietrichia bicolor Eckl., *coccinea* Tratt., *jasminea* Eckl., *odoratissima* Tratt., *versicolor* Eckl., v. *Kalosanthes bicolor*, *coccinea* etc., p. 436.

Digera Forsk., *Digera*, V. I., Aizoideae-Amaranthaceae. *arvensis* Fork. (= *Achyranthes Digera* Poir. = *A. polygonoides* Retz), Acker-D., ☉. m. f. Ostindien.

ciliata Mart. (= *Achyranthes ciliata* Lam. = *Desmodchaeta ciliata* R. et S.), gewimperte, ☉. m. f. Ostind.

Digitalis T., Fingerhut.

Buxbaumii Bess., Buxbaum's, ♂. 4. f. Kleinasien.

Fontanesii Steud. (= *aurea* Dsf., non Lindl.), Desfontaine's, 4. f. ?

intermedia Lindl., mittlerer, ♂. 4. f. b. Portugal.

laciniata Lindl., geschlitzter, ♣. k. Spanien.

laevigata W.K. (= *epiglottis* Hort. = *integrifolia* Seenus).

Libertiana Dumort. (= *purpurascens* Lejeun. excl. Synon.), Libert's, 4. f. Belgien.

Lindleyana Tausch (= *erubescens* Ait. = *purpurascens* Lindl., non Roth), Lindley's, ♂. f. ?

Milleri G. Don (= *orientalis* Mill.), Miller's, ♂. 4. f. Kleinasien.

ochroleuca Jacq. (= *grandiflora* Lam. var. K. = *lutea* Auct. = *truncata* Auct.).

β) *fuscescens* W. K.

nervosa Steud., nerviger, 4. f. Caucasus.

purpurascens Roth (= *fucata* Ehrh. = *hybrida* Koelr.).

purpurea L., b) *alba* (= *candida* Haberl.), c) *carnea* Meig. Wenig., d) *monstrosa* Hort., e) *superba* Hort.

Unbestimmtere: *bicornuta* Hort., *denticulata* Tausch, *fuscopunctata* Tausch, *paniculata* Hort., *pyramidalis* Hort., *tubulosa* Tausch.

Dilepyrum aristatum Mchx., *diffusum* B. Beauv. (= *minutiflorum* Mchx. = *multiflorum* P. B.), v. *Mühlenbergia aristata* et *diffusa*.

Dilivaria Neck., Juss., *Dilivarie*, XIV. II., Acanthaceae. *ilicifolia* P. (= *Acanthus ilicifolius* L.), stechhülseblättrige, ♣. w. Ostindien.**Dillwynia** Sm., Dillwynie.

adenophora Endl., drüsentragende, ♣. t. Neuholland.

angustifolia H. Hügel., schmalblättrige, ♣. t. Neuholl.

clavata H. Cels., Makoy, Paxton, keulenförmige, ♣. t. Neuholland.

conferta Hort., gedrängte, ♣. t. Neuholland.

elegans Endl., zierliche, ♣. t. Neuholland.

filifolia Endl., fadenblättrige, ♣. t. Neuholland.

floribunda Sm. (= *ericaeifolia* Sims et Hort., non Sm.).

glaucescens Hort. angl. et belg., blaugrüne, ♣. t. Neuh. Hügelii Hort., Hügel's, ♣. t. Neuholland.

latifolia Hort., breitblättrige, ♣. t. Neuholland.

Dillwynia

laxiflora Benth., lockerblumige, ⚥. t. Neuholland.
peduncularis Benth., langstielige, ⚥. t. Neuholland.
pungens Makoy (= *Eutaxia pungens* Swt., p. 327).
plumosa Hort. belg., federige, ⚥. t. Neuholland.
racemosa Hort. belg., traubige, ⚥. t. Neuholland.
ramosissima Benth., ästigste, ⚥. t. Neuholland.
seriphoides Endl., seriphiumähnliche, ⚥. t. Neuholland.
Sieberi Steud. (= *cinerascens* Sieb.), Sieber's, ⚥. t. Neuholland.

speciosa Hügel., prächtige, ⚥. t. Neuholland.
subaphylla Colla, fastblattlose, ⚥. t. Neuholland.
tomentosa H. anglor. et belg., filzige, ⚥. t. Neuholland.

Dimacria affinis Sweet, *Andrewsii* Swt., *apiifolia* Swt., *aristata* Swt., *astragalifolia* Swt., *auriculata* Swt., *barbata* Swt., *bipartita* Swt., *carnea* Swt., *coronillaefolia* Swt., *depressa* Swt., *elegans* Swt., *fissifolia* Swt., *floribunda* Swt., *foliolosa* Swt., *fulgens* Swt., *heracleifolia* Swt., *imbuta* Swt., *lanceolata* Swt., *lineare* Swt., *longiflora* Swt., *longifolia* Swt., *oxalidifolia* Swt., *pinnata* Swt., *radiata* Swt., *recurvata* Swt., *rumicifolia* Swt., *setigera* Swt., *Smithiana* Swt., *spathulata* Swt., *sulphurea* Swt., *tenella* Swt., *undulata* Swt., *virginica* Swt., v. *Pelargonium affine*, *Andrewsii*, *apioides*, *aristatum*, *astragalifolium*, *ciliatum*, p. 599 etc.

Dimorphanthus Miq., Unformblume, V. 1., Araliaceae.
elatus Miquel (= *Aralia chinensis* L. excl. Synon.), hohe, ⚥. t. China, Java.

edulis Miquel (= *Aralia cordata* Thbg. = *A. edulis* Sieb. et Zuccar.), genießbare, ⚥. k. t. Japan.
japonicus Endl. (= *Aralia japonica* Thbg., p. 71).

Dimorphanthus aegyptiaca Cass., *angustifolia* Cass., *Gouani* Cass., *procera* Cass., *stipulacea* Cass., v. *Conyza aegyptiaca*, *ambigua*, *Gouani*, *chilensis* et *incisa*, p. 216 — *sicula* Cassin., v. *Jasonia sicula*, p. 430.

Dioclea Humb. B. K., non Spgl. (alter griechischer Arzt und Kräuterkenner), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

bicolor Benth. (= *Dolichos bicolor* Hfsg.), zweifarbige, 4. ⚥. Sch. w. Brasilien.

glycinoides Hort. belg. (= *Kennedyia splendens* Hort.), glycinenähnliche, ⚥. Sch. t. k. ?

grandiflora Mart., großblumige, ⚥. Sch. w. Brasilien.

Jacquiniana DC. (= *Dolichos ruber* Jacq. = *Hymenospron rubrum* Spgl.), Jacquin's, ⚥. Sch. w. Martinique.

mollis DC. (= *Dolichos mollis* Jacq. = *Hymenospron molle**, p. 608).

sericea H. B. K. (= *Hymenospron sericeum* Spgl., p. 408).

violacea Mart. (= *Dolichos altissimus* Arrab. = *Mucuna altissima* Boj., non DC.), violette, ⚥. Sch. w. Brasilien.

Dioclea hispidissima Spgl., v. *Meneghinia asperrima*.

Dionysia Fenzl, odora Fenzl, V. 1., Primulaceae, 4. ⚥. Kurdistan. Ob kultivirt?

Dioscorea L., Yamswurzel.

bonariensis Tenore, bonarische, 4. Kn. w. Bonaria.

macrophylla Martens (= ? *mexicana* Hort.), großblättrige, 4. Kn. k. t. Mexico.

septemloba Thbg., siebenlappige, 4. Kn. k. f. b. Japan.

Elephantopus Spgl., v. *Testudinaria Elephantipes*, p. 801, *parvifolia* Fisch. ?

Diosma Berg., Göttergeruch.

ciliata Berg. (non L., nec Lam. et Thbg.), gewimperter, \S . t. Cap der guten Hoffnung.

Meyeriana Spgl. (= *virgata* Mey. Bartl. Wendl., non Thbg.).

Simsiana Eckl. (= *ericoides* Sims, non L.), Sim's, \S . t. Cap der guten Hoffnung.

vulgaris Schldl. (ambigua Bartl. et Wendl., *longifolia* Wendl., *oppositifolia* L., *hirsuta* L. et *rubra* L., werden vom H. Prof. v. Schldl. als Abarten hierher gezogen).

acuminata Dsf. et *cordata* Hort., v. *Agathosma acuminata* et β *cordata*, p. 23, *acuminata* Lodd, v. *Adenandra acuminata* Don, p. 18, *buckoo* H. angl. = ?, *capitata* Dum. Cours. Hort., v. *Agathos. ciliata* et *concinna*, p. 23, *ciliata* L., *ciliata* Lam. et *ciliata* Thbg., v. *Agath. ciliata*, *obtusa* et *Thunbergiana*, p. 23, *corifolia* Nois. = ?, *crassifolia* H. angl. = succulenta, *crenatifolia* Vent. = ?, *dioica* Ker, v. *Barosma dioica*, p. 114, *foetidissima* Spgl., v. *Barosma foetidissima*, *fragrans* Sims, v. *Adenandra fragrans*, p. 18, *glandulosa* Hort. (= *graveolens* Lichtenst.), v. *Barosma ovata*, *glandulosa* Thbg., v. *Agathosma Ventenatiana*, p. 23, *hircina* Hort. angl. = ?, *hybrida* Hort., v. *Agathosma hybrida*, p. 23, *imbricata* Dum. Cours., v. *Audouinia capitata*, p. 106, *lanceolata* Mill.; *lasiophylla* Spgl., v. *Agathosma obtusa* et *villosa*, p. 23, *latifolia* Andr., *latifolia* Lodd. et *latifolia* Thbg. (= *odoratissima* Mont.), v. *Barosma serratifolia* β *crenulata* et *latifolia*, p. 114, *laxa* Spgl. (= *speciosa* H. Cels. = *rugosa* Hortul.), v. *Agathosma laxa*, p. 23, *odorata* DC., v. *Barosma crenata*, *orbicularis* Hort., v. *Barosma ovata*, *reclinata* Hort., anglor. = ?, *reflexa* Lodd. et *serpyllacea* DC., v. *Agathosma reflexa* et *serpyllacea*, p. 23, *serratifolia* Curt. (= *serrulata* H. angl.), v. *Barosma serratifolia*, p. 114, *squarrosa* Wendl., v. *Macrostylis squarrosa*, p. 487, *tenuissima* Lodd., v. *Agathosma tenuissima*, p. 23, *tetragona* L. et *tetragona* Thbg., v. *Acmadenia tetragona* et *laevigata*, p. 12, *umbellata* Hort., v. *Adenandra umbellata*, p. 18, *uniflora* Schrad. Wendl., v. *Adenandra uniflora*, *ursina* Nois. = ?, *villosa* Thbg., v. *Adenandra villosa*, p. 18, *villosa* Wendl. et *virgata* Thbg. (non Hort.), v. *Agathosma villosa* et *virgata*, p. 23.

Diospyros L., Dattelpflaume.

angustifolia H. Cels., schmalblättrige, \S . w. ? Ostindien.

digyna Jacq., zweiweibige, \S . w. Insel Celebes.

Kaki L. fil. (= *chinensis* Blume).

*Loddigesii** (= *lucida* Lodd.), Loddiges's, \S . f. b. Nordamerika.

lucida Wall., glänzende, \S . w. Ostindien.

Sapota Roxb., *Sapota*-D., \S . w. Ostindien, Philippinen. β) *nigra* L.

Diotis Schreb., Doppelohr.

ferruginea N. E. (= *ceratoides* Auct.), rostfarbiges, \S . f. Caucasus.

Diphyes angustifolia Blume, *odorata* Blume, v. *Bulbophyllum angustifolium* et *odoratum*, p. 81, II.

Diplacus Nutt., Maskenblume, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrophularineae).

glutinosus Nutt. (= *aurantiacus* Don = *Mimulus glutinosus* Wendl., p. 525 = *aurantiacus* Curt.).

puniceus Nutt., p. 268, b) *coccineus* Hort., *latifolius* Nutt., *leptanthus* Nutt. et *longiflorus* Nutt. Sämmtlich 4. und in Californien heimisch, scheinen noch nicht kultivirt zu werden.

Dipladenia A. DC., Doppeldrüse, V. I., Contortae-Apocynae.

atropurpurea A. DC. (= *Echites atropurpurea* Lindl.), schwarzpurpurfarbige, 4. ♂. w. Brasilien.

crassinoda A. DC. (= *Echites crassa* Hort. = *E. crassinoda* Gardn.), dickknotige, 4. ♂. w. Brasilien.

Gardneria A. DC., Gardner's, ♂. w. Brasilien.

splendens A. DC. (= *Echites splendens* Lindl.), schimmernde, 4. ♂. w. Brasilien.

Diplasia karataefolia Rich. (= *Fimbristylis bromeliaefolia* Sgl. fil. = *Scirpus bromeliaefolius* Rudge).

Diplazium Sw., Aderfarn.

brevifolium Kunze (= *fraxinifolium* H. Angl.), kurzblättriger, 4. w. ? Brasilien.

coarctatum Lk. gedrängter, 4. w. ? Brasilien.

dubium Lk. (= *ambiguum* Raddi), zweifelhafter, 4. w. Brasilien.

Lasiopteris Kunze (= *decussatum* H. Anglor.), haarflügeliger, 4. w. ?

obtusum Lk., stumpfer, 4. w. Brasilien.

plantagineum Raddi (= *acuminatum* Raddi).

pubescens Lk. (= *serampurensis* Hort., non Sgl.), weichhaariger, 4. w. Ostindien.

Shepherdi Lk. (= *Asplenium ambiguum* Raddi = *A. striatum* Hortul.), Shepherd's, 4. w. Brasilien.

Diplochita DC., Doppelweiderich.

caudata DC. (= *Chitonia caudata* Don), schweifiger, ♂. w. Peru.

Fothergilla DC. (= *Fothergilla mirabilis* Aubl. = *Melastoma compressa* Vahl = *M. Fothergilla* Rich. = *M. rubiginosa* H. B. K.).

macrophylla DC. (= *Chitonia macrophylla* Don = *Melastoma macrophylla* Pav.).

serrulata DC. (= *Melastoma lasiopetala* Mart.), sägezahniger, ♂. w. Brasilien.

β) *Balbisiana* (Sering) (= *Melastoma patens* Sgl. = *M. serrulata* Rich.). Vergl. p. 877.

Diplolaena Dsf., RBr., Diplolaena.

angustifolia Hook., schmalblättrige, ♂. t. Neuholland.

Diplolepis apiculata Lindl., *Menziesii* R. et S. (= *vomitaria* Lindl.), *ovata* Lindl., v. *Sonninia apiculata* etc.

Diplopappus Cass., DC., *asper* Less., *asperrimus* DC.,

caucasicus DC., *extenuatus* N. E. (= *Aster coriaceus* Hort.),

filifolius DC. (= *Aster chrysanthemifolius* Hort.

= *Diplostephium teretifolium* N. E.), *fruticulosus* Less.,

incanus Lindl., *linariaefolius* Lindl., *obtusatus* Less,

(= *Aster fruticulosus* β W. = *A. rosmarinifolius* Sgl.),

pluriflorus Steud. (= *Aster fruticulosus* β

Hookeri), *rigidus* Lindl. (= *Aster fragilis* Jacq. =

Diplopappus

linarifolius Mchx. = *Aster pulcherimus* Lodd.), v. Aster Sect. V., p. 98.

Diplopappus chinensis Less., v. *Callistephus chinensis*, p. 98, — *dubius* Cassin., v. *Stenactis annua*, p. 786, *pinnatifidus* Hook., v. *Aplopappus spinulosus*, p. 68, = *albus* Hook. (= *ptarmicoides* Lindl.) et *paludosus* Lindl., v. *Heleastrum album* et *paludosum*, p. 99 Aster Sect. X. — *pinifolius glaber* H. Berol., *pinifolius* Less., H. Berol., *graminifolius* Less., v. *Neja ciliaris*, *filiformis* et *gracilis*.

Diplopeltis Endl., Doppelschild.

Lehmanni Miquel, Lehmann's, f. t. Neuholland.

Diplophractum Dsf., Spgl., Diplophracte, (= *Diplofractum* Hort.), XIII. 1., Tiliaceae.

auriculatum Dsf., geöhrte, f, w. Java.

Diplospora DC., Doppelsämmler, V. 1., Rubiaceae.

viridiflora DC. (= *Canthium dubium* Lindl., p. 157), f. t. w. China, Ostindien.

Diplostephium Cass. (= *Doellingeria* N. E.), acuminatum DC., amygdalinum Cass. (= *Aster divaricatus* Spgl. = *A. humilis* W. = *Chrysopsis humilis* Nutt.), cornifolium DC., (= *Aster humilis* Ell. = *A. firmus* Mchx.), dichotomum DC., obovatum DC. (= *boreale* Spgl. = *Chrysopsis obovata* Nutt.), umbellatum Nutt. (= *Chrysopsis amygdalina* Nutt. = *Diplopappus umbellatus* Nutt.), v. Aster, p. 98, Sect. VI.**Diplotaxis** DC., Mauersenf.

biloba C. Koch, zweilappiger, ☉. f. Armenien.

erucoides DC. (= *Eruca erucoides* Rchb. = *Euzomum erucoides* Spach = *Moricandia hesperidiflora* Hort. = *Sinapis erucoides* L. = *Sisymbrium erucoides* Dsf.).

Diplothemium Mart., Doppelscheide (palme).

caudescens Mart., strunkige, f. w. Brasilien.

litorale Mart., (= *Cocos arenarius* Gomez.), Ufer-D., f. w. Brasilien.

Diplusodon Pohl, Zahnweiderich, XI. 1.

amoenus DC. (= *Friedlandia amoena* Chamiss. Schldl.), lieblicher, f. w. Brasilien.

speciosus DC. (= *Dubyaea melastomoides* DC. = *Nesaea speciosa* H. B. K.), prächtiger, f. w. Brasilien.

virgatus Pohl (= *amoenus* DC. = *Friedlandia albiflora* Mart. herb.), ruthenförmiger, f. w. Brasilien.

Diporidium Wendl., Diporidie, XIII. 1., Tricoccae-Ochnaceae.

arborescens Wendl. (= *Ochna arborea* Burch., p. 552 = *O. capensis* Page = *O. chrysantha* Mund = *Tetracera lutea* Spgl.).

atropurpureum Wendl. (= *Ochna atropurpurea* DC., p. 552).

Dipsacus Vaill., Karden.

azureus Schrenk. (= *Cephalaria dipsacoides* Kar. et Kirilow), azurblaue, ♂. f. Soongarien.

divaricatus Presl (= ? *laciniatus* Ucria), ausgespreizte, ♂. f. Sicilien.

recurvus Haberl, zurückgekrümmte, ♂. f. Osteuropa.

Diptera Borckh., Zweiflügler, X. 11., Corniculatae-Saxifrageae.

*cuscutaeformis** (= *Saxifraga cuscutaeformis* Lodd. = *grandiflora* Hort.).

Diptera

sarmentosa Borckh. Lk. (= *Saxifraga sarmentosa* L. Suppl. = *chinensis* Lour. = *stolonifera* Jacq.).
Vergl. p. 724.

Dipteracanthus N. E. (= *Calophanes* Don, Endl.), Flügelklau.

biflorus N. E. (= *Ruellia biflora* L. = *oblongifolia* Mchx. = *Calophanes oblongifolia* D. Don, p. 149).

ciliatus N. E. (= *Ruellia ciliata* Hornem.).

ciliatus N. E. (= *Ruellia ciliata* Pursh).

hybridus N. E. (= *Ruellia hybrida* Pursh = *strepens* Torrey, non L.), Bastard-F., 4. k. Nordamerika.

lanceolatus N. E. (= *Ruellia repens* L. mant.), lanzettförmiger, 4. w. Ostindien.

oblongatus N. E., verlängerter, 4. w. ?

parviflorus N. E. (= *Jucticia parviflora* Ortega, Vahl = *Eranthemum parviflorum* RBr.), kleinblumiger, 5. t. Mexico.

patulus N. E. (= *Ruellia aromatica* Roxb. = *R. patula* Jacq., p. 705).

pilosus N. E., behaarter, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.

Schauerianus N. E. (= *Ruellia brasiliensis* Hort., non Sgpl.).

strepens N. E. (= *Ruellia strepens* L.).

strictus N. E. (= *Ruellia strepens* Hort.)

vagans N. E. (= *oblongatus* N. E.), zerstreuter, 4. w. ?

viscidulus N. E. (= *Ruellia viscidula* Mart. Catal. h. reg. Monac.).

Zu berichtigen und zu vergleichen p. 269 et p. 705.

Dipterygium Decaisne, Flügelschötchen, XV. I., Crucif.

glaucum Decaisne (= *Pteroloma arabicum* Hochst. et Steud.), blaugrünes, ♂. 4. k. Arabien.

Dipterocarpus G., Zweiflügelfrucht, XIII. I., Tiliaceae.

elegans Blume, zierliche, 5. w. Java.

trinervis Blume, dreinervige, 5. w. Java.

Disa Berg., Disa.

fasciata Lindl., gebänderte, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

gracilis Lindl., schlanke, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

grandiflora L. Suppl. (= *uniflora* Berg. = *Satyrium grandiflorum* Thbg.).

longifolia Lindl., langblättrige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

flexuosa Sw., v. *Schizodium flexuosum*, *graminifolia* Ker, v. *Herschelia coelestis*, *patens* Thbg., v. *Penthea patens*.

Dischisma Choisy, Dischisma, XIV. II., Globulariaceae (Selagineae).

capitatum Choisy. (= *Hebenstreitia capitata* Thbg., p. 377).

ciliatum Choisy (= *Hebenstreitia albiflora* Lk., Enum. = *H. ciliata* Berg., p. 377).

chamaedryfolium Walp. (= *Hebenstr. chamaedryfolia* Lk.).

erinoides G. Don (= *ciliatum* var. ? Choisy. = *Hebenstreitia erinoides* Thbg.), leberbalsamähnliche, ♂. 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Discocactus insignis Pfeiff. etc., v. Cacteeae, p. 93 II.**Discocapnus** Chamiss., Schltldl., Scheibenmohn, XVII. v. (IV.), Papaveraceae-Fumariaceae.

Mundtii Chamiss., Schltldl. (= ? *Fumaria capreolata* Thbg. = *F. Mundtii* Sgpl. = *F. scandens* E. Mey.),

Mundt's, ☉. Sch. f. Cap d. g. Hoffn.

- Disemma** LaBill., DC., Doppelkrone.
aurantiaca Lindl. (= *Murucuja aurantiaca* P. = *Passiflora aurantia* Forst., non Andr.), orangefarbige, ♀. 4. Sch. w. t. Neucaledonien.
Bauerianum Endl. (= *Baueri* Don = *Herbertiana* DC. var. Spgl. = *Murucuja Baueri* Lindl.), Bauer's, ♀. 4. Sch. t. w. Norfolkinsel.
coccinea DC. (= *Passiflora coccinea* Banks herb., non Aubl.), scharlachfarbige, 4. ♀. Sch. t. w. Neuholland.
- Disperis** Sw., Disperis.
tripetaloidea Lindl. (= *Dryopeia tripetaloidea* Pet. Th.), dreikronenblättrige, 4. w. Mascarenas, Ceylon.
- Disporum** Salisb., Don, Endl., Lochlilie.
calcaratum Don (= *Uvularia calcarata* Wall.), gespornte, 4. t. Ostindien, Nepal.
fulvum Salisb. (= *pullum* Schult. = *Fritillaria cantoniensis* Lour. = *Streptopus chinensis* Sm. = *Uvularia chinensis* Ker, p. 269).
Pitsutum Don (= *Uvularia Pitsutu* Hamilt. = *U. umbellata* Wall. = *Streptopus peduncularis* Sm.), langstielige, 4. t. Ostindien.
- Disisocactus** (= *Distocactus* Auct.), *biformis* Lindl., v. Cacteeae, Sect. XVI., p. 103, II.
- Distemon** P. C. Bouché, v. Canna, Sect. III., p. 116, II.
- Distictis** A. DC., *Distictis*, XIV. II., Bignoniaceae.
lactiflora A. DC. (= *Bignonia lactiflora* Vahl, p. 122).
rigescens A. DC. (= *Bignonia rigescens* Jacq., p. 122).
- Ditaxis** Vahl, *Ditaxis*, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
chiropetala Bertero (= *Croton lanceolatum* Cav.), handkronige, ♀. w. t. Chili.
heteracantha Zucc., verschiedenstachelige, ♀. w. t. Mexico.
- Dithyrocarpus** Kunth., Doppelklappler, VI. I., Comelyneaceae.
paniculatus Kunth (= *Tradescantia paniculata* Roxb., p. 814).
- Dobrowskya** Presl, (Dobrowsky, Prof. d. Philologie an der Universität zu Prag, †), V. I., Campanulaceae-Lobeliaceae.
aspera DC., *unidentata* DC., v. Lobelia, Sect., p. 470.
- Dodecatheon** L.
Meadia L., c) *giganteum striatum*, e) *bicolorum*.
- Dodonaea** L., Dodonaea.
Baueri Endl., Bauer's, ♀. t. k. Neuholland.
ceratocarpa Endl., hornfrüchtige, ♀. t. k. Neuholland.
dioica Roxb. (= ? *oblongifolia* Lk. = ? *triquetra* Andr.).
discolor Desf., verschiedenfarbige, ♀. t. ?
filiformis Lk. (= *angustissima* Hort.).
 ? *glutiosa* van Houtte, klebrige, ♀. w. ?
heterophylla Colla, verschiedenblättrige, ♀. t. k. Neuholl.
humilis Endl., niedrige, ? ♀. t. k. Südneuholland.
praemorsa Hort. angl., abgebissene, ♀. k. t. Neuholland.
Doellingera amygdalina N. E., *cornifolia* N. E., *obovata* N. E., v. *Diplostegium amygdalinum* etc., Aster Sect. VI., 98.
- Doemia** guineensis Sweet (= *scandens* G. Don = *Asclepias scandens* P. B.).
- Dolichos** L., Faseole.
capensis L. (= *Scytalis tenuis* E. Mey. = *Vigna capensis* Walp.).

Dolichos

Catjang L. (= *Scytalis tenuis* E. Mey. = *Vigna Catjang* Walp.).

chinensis L. (= *chinensis* Auct. = *cylindricus* Mch. (non Desv.) = *Catjang* Wall.).

β) tranquebaricus Jacq. (= *Catjang* Roxb. non L.).
glycinoides H. B. K., glycinenähnliche, 4. Sch. w. Peru.
leucomelas Kunze, weißschwarze, ☉. Sch. m. f. Cap
der guten Hoffnung.

melanophthalmus DC. (= *unguiculatus* Thore).

monachalis Brot. (= *Catjang* L. var. Link.).

niloticus Delil. (= *sinensis* Forsk., non L.), Nil-F., ☉.
w. m. f. Aegypten.

pubescens L. (= *Glycine tomentosa* β W.), feinhaarige,
☉. Sch. w. Südamerika.

Unbestimmtere: Brunelli Zuccar., caribaeus Mart., farinaceus Hort., muricatus Hort., myodes Tenore, pictus Hortor. — *bicolor* Hffg., *mollis* Jacq. etc., v. *Dioclea bicolor* etc., *hirtus* Andr., v. *Cylista villosa*, p. 242, *helvolus* Nutt. et *trilobatus* L., v. *Phaseolus helvolus* et *trilobus*, p. 613 et 614, *japonicus* Spgl., v. *Wistaria floribunda*, *pruriens* L., v. *Mucuna pruriens*, p. 533, *tetraspermus* W., v. *Lablab vulgaris*, p. 440.

Dollinera Endl. (George Dolliner), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

sambuensis Endl. (= *Ototropis sambuensis* N. E. Schauer, p. 574 = *Hedysarum sambuense* Don = *Desmodium sambuense* DC.).

Dombeya Cav., Dombeya.

Amelia Guillem. (= *Astrapaea viscosa* Sweet, p. 104), Amelia's, 5. w. Madagascar.

cannabina Bojer, hanfähnliche, 5. w. Mauritius.

nivea H. Cels, schneeweisse, 5. w. ?

acerifolia G., v. *Pterospermum acerifolium*, p. 665,

Erythroxyton W., v. *Melhania Erythroxyton*, p. 506.

Dondisia DC., Dondisie, V. I., Rubiaceae.

foetida Hassk., übelriechende, 5. w. Java.

Donia canariensis Less., v. *Jasonia laevigata*, *D.*

ciliata Nutt., v. *Aplopappus ciliatus*, p. 68.

Donzella spinosa Tenore? Nicht hinlänglich bekannt, ob kultivirt?**Doodia** RBr., Doodie.

Kunthii Lk., Kunth's, 4. t. w. Neuholland.

lunulata H. belg., mondformige, 4. t. w. Neuholland.

rupestris Sieb., Kaulf. (= *caudata* Hook. ? RBr.), felsenliebende, 4. t. w. Neuholland.

Doronicum T. L., Gemswurz.

causicum MB. (= *eriorrhizon* Gussone).

Columnae Tenore (= *cordifolium* Sthg. = *orientale* Rehb. = *Arnica cordata* Wulf.), Columna's, 4. f. Tyroler Alpen, Italien.

Nentwichii Sadler, Nentwich's, 4. f. Ungarn.

Unbestimmt: *lucidum* Hort.

altaicum Pall., *Clusii* Tausch (= *longifolium* Rehb.),

corsicum Poir., Tausch, *Jacquini* Tausch, *scorpioides* Lam., v. *Aronicum altaicum*, *Doronicum*, *corsicum*,

scorpioides α et β, p. 80 et p. 45 II, *glutinosum* W., v. *Grindelia glutinosa*, p. 369.

Dorstenia Plum., Dorstenie.

fruticulosa Schott, strauchige, 5. w. Brasilien.

- Dorycnium** herbaceum Vill. (= *pentaphyllum* Scop.),
 latifolium W. (= *ibericum* W. = *intermedium* Ledeb.),
rectum Sering., v. *Bonjeanea recta*, p. 73, II.
- Dorycnopsis** Boiss., *Dorycnidie*, XVII. IV. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.
 Gerardi Boiss. (= ? *Anthyllis heterophylla*, L., p. 66
 = *onobrychoides* Cav.), Gerard's, h. k. Spanien,
 Portugal.
- Draba** Dill., L., Hungerblümchen.
 Aizoon Wahlbg. (= *aizoides* γ Auct. = *ciliaris* Schrank
 = *hispida* W. = *lasiocarpa* Roch.), haarfrüchtiges,
 4. f. Deutschland, Ungarn.
 algida Adams (= *pilosa* Adams), kaltes, 4. f. Sibirien.
 altaica Bunge (= *rupestris* β *altaica* Flora Altaica),
 altaisches, 4. f. Altai.
 arabisans Mchx. (= *Arabis* P.), gänsekrautähnliches, ♂.
 f. Nordamerika.
 aspera Adams, rauhes, 4. f. Sibirien.
 brachystemon DC. (= *aizoides* Curt. = ? *ciliaris* L.).
 confusa Ehrh. (= *incana* L. var. W. = *stylaris* Gay.),
 β) *pauciflora* Chamiss. (? = *paucifolia* Auct.).
 dasycarpa C. A. Mey., rauchfrüchtiges, 4. f. Altaisch.
 Sibirien.
 Gmelini Adams (= *stellarioides* W. herb. = *repens* MB.).
 hirta L. (= *incano-hirta* Hartm. = *confusa* Hartm.,
 non Ehrh.).
 lactea Adams (= *Wahlenbergii* Hartm. = *androsacea*
 Wahlbg. = *lapponica* Wahlbg.), milchweißes, 4. f.
 Nördl. Sibirien, Lappland.
 laxa Lindbl., lockeres, ♂. f. Scandinavien.
 Liljebladii Wallm. (= *caesia* Adams = *rivularis* Bernh.).
 lutea Gilib. (= *intermedia* Andrzy. = *muralis* Stephan.
 MB. = *nemoralis* L. var. Goldb. = *pontica* Dsf.),
 Armenien, Dahurien.
 mollissima Steven, weichstes, 4. f. Ostcaucasus.
 rivularis Hornem. (non Bernh.) (= *confusa* Turczch.,
 non W.), Bach-H., ♂. f. Baical.
 scandinavica Lindblom (= *hirta* β *lapponica* Wahlbg.),
 nördliches, 4. f. Scandinavien.
 tomentosa Wahlbg. (= *dubia* Suter = *hirta* Towns.
stellata Jacq. var. Sogl.).
 trichella Fr., feinhaariges, ♂. 4. f. Scandinavien.
 tridentata DC. (= *hispida* MB. = *rupestris* W. herb.).
 unalaskiana DC. (= *unalascensis* Auct.). ♂.
nummularia Ehrbg., Lk., v. *Koniga nummularia*,
 p. 439, *ruderalis* Baumg., v. *Lepidium Draba*,
 p. 454.
- Dracaena** Vandell., L., Drachenbaum.
 Draco L. (= *yuccaeformis* Vandell. = *Störkia Draco*
 Crantz.).
 β) *Boerhavia* Tenore.
 flabelliformis Bory, fächerförmiger, h. w. Mauritius.
 Fontanesiana Schult. (= *elliptica* Dsf. h. Par.), Desfon-
 taine's, h. w. Mascarenas.
 umbraculifera Jacq. (= *pumila* Hort.).
 Unsichere: *flexuosa* Hort., *frutescens* Hort., *reclinata*
 Hort., *viridis* Hort.
angustifolia H. Par. (= *marginata* Lam. = *tessel-*
lata W. E.), *australis* Forst. (= *oblecta* Grah.),
cernua Jacq. = *candelaria* Hort.), *congesta* Sweet

(= *coerulea* H. Angl.), *ferrea* L. (= *terminalis* Jacq.), *hemichrysa* Salm, *indivisa* Forst., *parviflora* W. (= ? *ensifolia* Haw.), *reflexa* Lam., *stricta* Sims, v. *Cordyline australis*, *cernua*, *congesta*, *ferrea*, *hemichrysa*, *indivisa* etc., p. 218 et 160, II. — *borealis* Sims, Ait., v. *Smilacina borealis*, p. 764, *Boscii* Hort. Cels. (= *filamentosa* Scanag.), v. *Agave geminiflora*, p. 24 et 14, II. — *dentata* P. (= *marginata* Ait.), v. *Lomatophyllum borbonicum*, — *filiformis* Thbg. et *obliqua* Thbg., v. *Xerotis filiformis* et *flexifolia*, p. 860, — *medeoloides* L., v. *Myrsiphyllum asparagoides*, — *nemorosa* Jacq. (= *ensifolia* L.), v. *Dianella nemorosa*, p. 258.

Dracocephalum L., Drachenkopf.

discolor Bunge, verschiedenfarbiger, 4. f. Altai.

foetidum Bunge (= *Moldavica* L. var. ? Bunge), stinkender, ♂. f. Sibirien.

fruticulosum Stephan., strauchiger, ♀. f. Sibirien.

Ludovicianum Hort., Ludovici's, 4. f. ? Nordamerika.

pinnatum L. (= *pinnatifidum* Lam.).

speciosum Benth., prächtiger, 4. k. Himalayagebirge.

spinescens Wender., stacheliger, 4. f. ?

alpinum H. Hffg. = ?, *canescens* L., *ibericum* MB.,

peltatum L. (= *ocymifolium* Mill.), v. *Lallemantia canescens*, *iberica*, *peltata*, p. 881, — *mexicanum*

H. B. K. (= *Cedronella mexicana* Benth.), v. *Gardoquia betonicoides*, p. 346, — *sibiricum* L., v. *Nepeta macrantha*.

Dracontium L., Drachenwurz.

dubium Kunth, zweifelhafte, 4. w. Guiana.

lacerum Hort. (= *nymphaeifolium* Hort.), v. *Colocasia nymphaeifolia*, p. 154, II. — *lancaefolium*

Jacq. et *sagittaeifolium* Meyer, v. *Spatiphyllum lanceolatum* et *sagittaeifolium*, — *pertusum* L., v. *Monstera Adansonii*, ? *spinosum* L., v. *Lasia heterophylla*,

— *triphyllum* Hort. angl., v. ? *Arisaema brasilianum*, p. 45, II.

Dracophyllum LaBill., Drachenblatt.

cuspidatum Hort. belg., feinspitziges, ♀. t. Neuholland.

Hügelii ? Benth., Hügel's, ♀. t. Neuholland.

rosmarinifolium RBr., (= *Epacris rosmarinifolia* Forst.),

rosmarinblättriges, ♀. t. Neuholland.

capitatum Lindl., v. *Sphenotoma capitatum*, p. 777.

Dracunculus T., Otterwurz, XXI. ix., Aroideae.

canariensis Kunth, canarische, 4. Kn. k. Teneriffa.

crinitus Schott (= *Arum crinitum* Ait., p. 85).

vulgaris Schott (= *polyphyllus* Blume = *Arum Dracunculus* L., p. 85), gemeine, 4. Kn. f. b. Südeuropa.

Drimia Jacq., Drimia.

Eckloniana Schult. (= *humilis* Berg.), Ecklon's, 4. Zw. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Gawleri Schrad. (= *lancaefolia* β minor Ker = *revoluta* Sims = *Hyacinthus revolutus* Ait.), Gawler's, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

lancaefolia Ker, β) *densiflora* Schrad. (= *maculata* Tratt.), γ) *longepedunculata* Schrad. (= *Scilla maculata* Schrk. H. monac.).

lancaolata Schrad. (= *Lachenalia reflexa* Andr.), lanzettförmige, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Drimia

ovalifolia Schrad. (= *lanceaefolia* Lodd.), eiblätterige,
4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Dryandra RBr., *Dryandra*.

Brownii Meissn., Brown's, f. t. Neuholland.
carduacea Lindl., distelähnliche, f. t. Neuh. (Schwanenfl.).
favosa Lindl., bienenzellige, f. t. Neuholland.
Lindleyana Meissn., Lindley's, f. t. Neuholland.
nobilis Lindl., edle, f. t. Neuholland.
planifolia H. Hügel., flachblättrige, f. t. Neuholland.
proteoides Lindl., wunderfichtenähnliche, f. t. Neuholl.
speciosa Hort. angl., (= *elegans* Hort.), prächtige, f.
t. Neuholland.

stuposa Lindl., wergartige, f. t. Neuholland.

tenuifolia RBr. (= *uncata* Cunningh. = *Josephia tenuifolia* Poir).**Dryas integrifolia** Vahl (= *tenella* Pursh).**Drymaria** W., Hainling.

ciliata H. Berol. et H. Hafn. (= *cubensis* Hort. berol.),
gewimperter, ☉. m. f. Cuba.

cordata W. (= *Holosteum cordatum* L.), ☉. m. f. Südam.

gracilis Chamiss. et Schtdl., schlanker, ☉. m. f. Mexico.

erubescens H. Berol., röthlicher, ☉. m. f. Südamerika.

Drymonia Mart., Waldglocke.

grandiflora G. Don (= *Besleria grandiflora* H. B. K.,
p. 119).

punctata Lindl. (= *Sinningia Hartwegii* H. angl. et belg.),
punktirte, 4. f. w. Guatimala.

spectabilis Mart. (= *Besleria spectabilis* H. B. K. =
B. splendens Hort.), ansehnliche, 4. f. w. Neugranada.

suberecta van Houtte, fastaufrechte, 4. f. w. Brasilien.

Drymophloeus Zipp., Hainpalme, ? XXII. VI. (VI.
III.), Palmae.

Zippelii Hassk., Zippelius's, f. w. Java.

Dubyaea DC. (J. C. Duby, Pastor in Genf, Verfasser
mehr. bot. Werke), XIX. 1., Compositae - Cichoriaceae.

sonchoidea DC. (= *Lasiopus sonchoides* DC., p. 446).

Dubyaea melastomoides DC., v. *Diplusodon speciosus*,
p. 206, II.

Duchesnea fragarioides Sm., v. *Fragaria indica*,
p. 336.

Duranta L., *Duranta*.

Fischeri Mart., Fischer's, f. w. Brasilien.

microphylla Desf. (= *D. Ellisia* L. var. Sngl.), klein-
blättrige, f. w. Westindien.

Duvaua Kunth, *Duvaua*.

dependens DC. (= *Amyris polygamá* Cav. = *Schinus*
dependens Ortega).

longifolia Lindl., langblättrige, f. k. f. b. Buenos Ayres.
ovata Lindl. (= *D. Molle* Bertero).

Dyckia Schult. fil. et Mart., *Dyckia*.

altissima Hort. Makoy., höchste. 4. w. Brasilien.

rariflora Mart., Schult. fil., sparsamblumige, 4. w. Brasil.

remotiflora Otto, Diatr., entferntblumige, 4. w. Brasilien.

densiflora Mart. Schult. fil., et *dissitiflora* Schult. fil.
Mart., beide 4. und in Brasilien heimisch, scheinen
nicht kultivirt zu werden.

Dyschoriste N. E., *Dyschoriste*, XIV. II., Acauthaceae.

littoralis N. E. (= *Ruellia littoralis* L. Suppl.), strand-
liebende, 4. w. Ostindien.

Dyschoriste

radicans N. E. (= *Ruellia radicans* Hochst. et Steud. (non Wall.) = *R. Hochstetteri* Steud.), wurzelnde, 4. ♀. w. Abyssinien.

α) *diffusa* N. E., β) *minor* N. E.

Dysophylla Blume, Stinkmünze. Vergl. p. 277.

Auricularia Blume (= *Mentha Auricularia* L. mant., p. 510 = ? *M. foetida* Lam.).

pumila Benth. (= *Mentha pumila* Grah. = *M. quadrifolia* Hamilt. = *M. verticillata* D. Don, Hook. in Bot. mag., non Roxb.), kleine, 4. Wa. k. Ostindien, Nepal.

quadrifolia Benth. (= *Choteckia sericea* Opiz et Corda = *Mentha quadrifolia* Roxb., non Don).

stellata Benth. (= *Mentha malabarica* Heyne = *M. quaternifolia* Roth = *stellata* Hamilt., non Lour.), sternförmige, 4. t. w. Ostindien, China.

Ob *D. cruciata* Benth. (= *Mentha quadrifolia* Don, non Roxb.) et *verticillata* Benth. (= *Mentha verticillata* Roxb. = *stellata* Lour.), beide 4. in Nepal und Ostindien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Dyssodia Cav., Dyssodia.

fastigiata DC. (= *Boebera fastigiata* H. B. K.), gipfelständige, ♂. f. m. Mexico.

Ebenus L. Adans., Ebenus.

Sibthorpii DC. (= *pinnata* Sibth. et Sm.), Sibthorp's, ♂. k. f. b. Griechenland.

Echeandia Ortega, Echeandia, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae-Conanthereae.

terniflora Ortega (= *Conanthera Echeandia* P. = *Anthericum reflexum* Cavan.), dreiblumige, 4. t. k. Chili.

Echenais Cass., Rauschdistel.

Sieversii Schrenk., C. A. Mey., Siever's, ♂. f. Asia-tisches Rußland.

Echeveria DC., Echeverie.

acutifolia Lindl., spitzblättrige, ♀. k. t. Mexico.

bifida Schltdl., zweispaltige, ♀. k. t. Mexico.

bracteolata Lk., Kl., Otto, deckblättrige, ♀. t. Caracas.

caespitosa DC. (= *Cotyledon caespitosa* DC. = *C. linguiformis* RBr. = *C. reflexa* W. = *Sedum Cotyledon* Jacq.), rasenartige, 4. ♀. t. k. Californien.

campanulata Kunze, glockenblumige, ♀. t. k. Mexico.

fulgens van Houtte, funkelnde, ♀. t. k. Mexico.

pumila van Houtte, kleine, 4. ♀. t. k. Mexico.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. ♀. t. k. Mexico.

Scheerii Lindl., Scheeri's, 4. ♀. t. k. Mexico.

secunda Lindl., einseitige, 4. ♀. t. k. Mexico.

teretifolia DC. (= *Sedum teretifolium* Moç. Sess.), stielrundblättrige, 4. ♀. t. k. Mexico.

Echinacea Mönch., Stachelkopf.

angustifolia DC. (= *pallida* Nutt. = *americana* Hort.), schmalblättrige, 4. f. b. k. Mittelamerika.

serotina DC. (= *Rudbeckia hispida* Hoffings. = *serotina* Sweet = *speciosa* Lk. (non Wender.), = *R. purpurea* β Nutt.).

Echinocactus Salm Dyck, v. Cactaeae, p. 182, 872 et 84, II.

Echinoloma arenarium Jacq. fil., v. *Acicarpha spatulata*, p. 12.

Echinonyctanthus Lemaire, v. *Echinopsis*, p. 873 et p. 93, II.

Echinops L., Kugeldistel.

cornigerus DC., hörnertragende, 4. k. Ostindien.

dahuricus Fisch. (= *Gmelini* Ledeb. = *latifolius* Tausch.).

Gmelini Turcz. (= *Turczaninowii* Trautv.).

horridus Dsf. (= *orientalis* Trautv. = *sphaerocephalus* L. var. Spgl.).

humilis MB. (= *eriophorus* Steven = *lanatus* Stephan.).

niveus Wall., schneeweisser, 4. k. Ostindien.

persicus Stev., Fisch. (= *pungens* Trautv.).

platylepis Trautv. (= *humilis* Rehb. (non MB.) = *tauricus* Hort., non W.).

Ritro L., β) *tenuifolius* Fisch. (= *ruthenicus* MB.), γ)

polycephalus Gouan, δ) *wolgaricus* Endl., ϵ) *hybridus* Endl.

sphaerocephalus L. (= *maximus* Siev. = *multiflorus* Lam. = *strictus* Sims).

tricholepis Schrenk, haarschuppige, 4. f. Asiat. Rufsländ.

Echinopsilon Moq. Tand., Stachelborste, V. II., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

eriophorum Moq. Tand. (= *Willemetia eriophora* Moq.

Tand. = *Kochia eriophora* Schrad., p. 483 = *Salsola eriantha*, *eriophora*, *lanata* et *laniflora* Hort.),

⊙. f. Spanien, Berg Sinai.

lanatum Moq. Tand. (= *Kochia hyssopifolia* Roth, p. 438 = *Chenopodium lanuginosum* Roth, Mch. = *C.*

villosum Hort. = *Salsola hyssopifolia* Pall. MB. =

Suaeda hyssopifolia Pall. = *Willemetia lanata* Maerkl.), wollige, ⊙. f. Sibirien, Ungarn, Caucasus,

Barbarei.

muricatum Moq. Tand. (= *Kochia muricata* Schrad.

= *Bassia muricata* All. = *Cornulaca muricata* Delil.

= *Salsola muricata* L. = *Suaeda muricata* Pall. =

Willemetia muricata Moq. Tand.), weichstachelige, ♂. k. Südeuropa, Nordafrika.

sedoides Moq. Tand. (= *Kochia sedoides* Schrad., p.

438 = *Salsola cinerea* W. K. = *S. muricata* MB.

= *S. sedoides* Pall. = *Willemetia sedoides* Moq. Tand.).

Echinospermum Sw., Lehm., Stachelsaame.

affine Kar. et Kiril., ähnelnder, ⊙. f. Soongaria.

brachycentrum Ledeb., kurzhaackiger, ♂. f. Sibirien.

diploloma Fisch. et Mey., Schrenk, doppelsaumiger, ⊙. f. Sibirien.

heteracanthum Ledeb., verschiedenhaackiger, ⊙. f. Astrachan.

macranthum Ledeb., großblumiger, ⊙. ♂. f. Sibirien.

microcarpum Ledeb., kleinfrüchtiger, ⊙. ♂. f. Sibirien.

patulum Lehm. (= *Rochelia squarrosa* R. et S. excl. Syn. = *Myosotis squarrosa* MB., non Retz).

Redowskii Lehm. (= *intermedium* Ledeb. = *Myosotis Redowskii* Hornem. = *Rochelia Redowskii* R. et S.),

Redowski's, ♂. f. Asiat. Rufsländ.

semiglabrum Ledeb., halbkahler, ⊙. f. Sibirien.

strictum Ledeb., steifer, ⊙. f. Sibirien.

tenuis Ledeb., dünner, ⊙. f. Sibirien.

stylosum Kar. et Kiril., langgriffeliger, ⊙. f. Soongaria.

cristatum Bong. Bunge, v. *Omphalodes cristata*, *gracile* Lehm., v. *Pectocarya chilensis*, *leiocarpum* Fisch. et Mey., v. *Krynitzkia leiocarpa*, p. 881, *minimum* Lehm. et *Szovitzianum* Fisch. et Mey., v. *Heterocaryum minimum* et *Szovitzianum*, *virginicum* Lehm., Frank., v. *Cynoglossum Morisoni*, — *cynoglossoides* Hort., v. *Cryptantha microcarpa*, p. 237.

Echiochilon (= *Chilochium* Rafin.), Stachellippe, V. 1., Asperifoliaceae.

fruticosum Dsf. (= *Lithospermum divaricatum* Sieber), strauchige, ⚥. k. t. Nordafrika, Arabien, Palästina.

Echioides grandiflora Dsf., *lutea* Dsf., *nigricans* Dsf., *rosea* Poir., *violacea* Dsf., v. *Nonnea grandiflora*, *lutea* etc., p. 549 etc.

Echites P. Brown, Klammerstrauch.

auriculata Stadelm., geöhrt, 4. ⚥. w. Brasilien.

bicolor Pohl, Hort. belg., zweifarbiger, 4. ⚥. w. Südamer. Carassa Hort. belg., Carassa-K., ⚥. w. Südamerika.

Catesbaei G. Don (= *Vinca lutea* L. spec.), *Catesbaei's*, 4. ⚥. Sch. t. w. Bahama.

chilensis A. DC. (= *pubescens* Hook.), chilesischer, 4. Sch. w. Chili.

Cururu Mart., Cururu-K., ⚥. Sch. w. Brasilien.

lasiocarpa A. DC. (= *hirsuta latifolia* Stadelm., non R. et Pav. nec Rich.), haarfrüchtiger, ⚥. Sch. w. Brasilien.

β) *angustifolia* Stadelm., γ) *Lobbiana* DC. (= *hirsuta* Hook. bot. mag.).

longiflora Dsf. (= *augusta* Vellozo).

speciosa H. B. K. (= *Exothostemon speciosum* G. Don), prächtiger, 4. ⚥. Sch. w. Südamerika.

suaveolens A. DC. (= *Mandevilla suaveolens* Lindl.), gutriechender, 4. ⚥. Sch. w. Buenos Ayres.

torosa Jacq., β) *Brownei* A. DC. (= *torulosa* Lam.).

trichotoma Dsf., dreizinkiger, ⚥. Sch. w. ?

Velame St. Hil., Velame-K., ⚥. w. Brasilien.

Außerdem kommen in den Verzeichnissen der belgischen Gärten noch vor: *picta* (= ? *melaleuca*), *primula*, *rosacampestris*.

annularis L. fil., *nutans* Anders. (= *venosa* Hort.), *sanguinolenta* Juss., v. *Haemadictyon annulare*, *nutans et sanguinolentum*, *corymbosa* Jacq. et *floribunda* Sw., v. *Forsteronia corymbosa et floribunda*, — *atropurpurea* Lindl., *crassa* Hort. (= *crassinoda* Gardn.), *splendens* Lindl., v. *Dipladenia atropurpurea* etc., p. 205, II., *purpurea* Hort. belg., v. *Tylophora lutescens*, *scholaris* L., v. *Alstonia scholaris*, p. 39, *suberecta* Andr., v. *Neriandra suberecta*, *venenata* Roxb., v. *Blaberopus venen.*, p. 70, II.

Echium T., Natterkopf.

albicans Lagasc., weißlicher, ♂. f. Spanien.

β) *Mertensii* Lehm.

altissimum Jacq. (= *linearifolium* Mch. = *asperimum* MB., non Lam. = *italicum* Lehm.), höchster, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Caucasus.

arenarium Gussone (= *diffusum* Guss. = *setosum* Delil, non Vahl), sandliebender, ⊙. ♂. f. Sicilien, Calabrien, Aegypten.

β) *Sieberi* DC. (= *prostratum* Sieb.).

Echium

- calycinum Vivian. (= *lusitanicum* All. = *ovatum* Poir. = *prostratum* Tenore), großskelchiger, ☉. f. Italien, Griechenland, Mauritien.
- β) *erectum* DC. (= *parviflorum* Mch., Roth = *micranthum* Schousb.).
- candicans* L. fil. (= *virescens* DC. = *madeirense* Hort.).
- creticum* L. (= *angustifolium* Mill., non Lam. = *australe* Lam., non Tenor. = *rubrum* Mch., non Jacq.).
- cynoglossoides* Dsf. Hort. Paris.
- dahuricum* G. Don, dahurischer, ♂. f. Dahurien.
- fastuosum* Jacq. (= ? *nervosum* Ait. = *candicans* DC. Cat. hort. monspel., non L. fil.).
- Fontanesii* DC. (= *flavum* Dsf. = *valentinum* Lagasc.), Desfontaine's, ♂. k. f. b. Südsanien, Nordafrika.
- formosum* P. (= *grandiflorum* Andr. Vent. etc. = *tubiferum* Poir. = *regulariflorum* Ker = *longiflorum* Dum. Cours. = *Lobostemon formosus* Buek.).
- giganteum* L. fil. (= *rupestre* Salisb.).
- glomeratum* Poir., knaulförmiger, ♂. f. b. Syrien.
- β) *elongatum* Lam. (= ? *papillosum* Lehm.).
- lusitanicum* L. (= *italicum* Brotero Hffg., Lk., non L. = *salmanticum* Lagasca).
- plantagineum* L. (= *lusitanicum* Mill.).
- pyramidatum* DC. (non Dum. Cours.) (= *italicum* L. spec. (non Lehm.) = *pyrenaicum* Dsf. = *asperrimum* Lam. (non MB.) = *pyramidale* et *luteum* Lapeyr. = *brachystachyum* Pall.), pyramidenförmiger, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa, Oriental. Nordafrika.
- β) *bifidum* DC.
- pustulatum* Sibth., Sm. (= *pictum* Jan = *vulgare* var. Bertol.).
- Rauwolfii* Delil. (= *margaritaceum* Lehm. = *Lycopsis Dioscoridis* Rauw.), Rauwolf's, ☉. f. Aegypten.
- rubrum* Jacq. (= *rossicum* Gmel.), β) *acutifolium* Lehm., γ) *thyrsoides* Vent.
- sericeum* Vahl (= *prostratum* Dsf. H. Par. Delil.), seidenhaariger, 4. ♂. k. Aegypten.
- simplex* DC. (= *fastuosum* Salisb., non Banks, nec Jacq.).
- Simsii* G. Don, Sweet (= *creticum* Bot. mag.), Sims's, ☉. f. Südeuropa.
- strictum* L. fil., β) *ambiguum* DC. cat. hort. monspel.
- tenuis* Roth (= *parviflorum* W. E. = *humile* Auct., non Dsf.), ☉. f. Vaterland unbekannt.
- thyrsiflorum* Masson (= *fastuosum* Banks, non Salisb. nec Jacq.), straußblumiger, ♂. k. Canar. Inseln.
- violaceum* L. mant. (= *creticum* Lam., non L. = *plantagineum* Jacq. Boiss.), β) *grandiflorum* Dsf. fl. Atl. non ejusd. arb. nec Andr. Tenor. (= *megalanthos* Lapey. = *macranthum* R. et S.), Süd- u. Westeuropa, Orient, Nordafrika, Südamerika.
- vulgare* L. (= *collinum* Fieb. = *pannonicum* Wierzb. = *pentagonum* Fieb. = *Opizii* Fieb. = *polymorphum* Fieb. = *recurvum* Fieb. = *Schüchti* Fieb.), γ) *dalmaticum* Tausch, δ) *Schifferi* Lang.
- Unbestimmtere: *arborescens* Hort., *canescens* Presl, *dahuricum* G. Don, *indicum* Bernh.
- argenteum* Berg., *argenteum* β) Lehm. (= *argenteum* Roth = *ferocissimum* Andr. = *ferox* P.) etc., v. *Lobostemon argenteus*, *ferocissimus* etc., — *humile*

Dsf., v. *Anchusa aggregata*, p. 53, — *petraeum* Tratt., *rosmarinifolium* Vahl, v. *Lithospermum petraeum* et *rosmarinifolium*.

Eclipta L., Mehlblume.

brachypoda Mchx. (= *Amellus carolinianus* Walt. = *Grangea lanceolata* Poir.), kurzfüssige, ☉. f. Carolina.

hirsuta Bartl., rauhharige, ☉. f. ?

longifolia Schrad., β) *linearis* C. A. Mey., gleichbreitblättrige, ☉. m. f. Bahia.

marginata Steud. (= *erecta* MB., Fisch. et Mey. excl. Synon.), berandete, ☉. f. Gegend d. caspisch. Meeres.

patula Schrad. (= *procumbens* β DC.), ausgebreitete, ☉. f. ?

thermalis Bunge, Wasser-M., ☉. f. China.

latifolia L., v. *Blainvillea latifolia*, p. 71, II.

Eclopes G., DC.

cuneata Less. (= *Athanasia uniflora* L. fil. = *Relhania cuneata* L'Her.), keilförmige, ♀. t. k. Cap d. g. H. genistaefolia DC., vergl. p. 680.

trinervis Less. (= *pungens* Cass. = *Relhania pungens* Ker), vergl. p. 680.

Edwardsia Salisb., Edwardsie.

grandiflora Salisb. (= *macrophylla* Wender.).

intermedia Tausch (= *grandiflora* var. ?), mittlere, ♀. k. t. ?

Macnabiana Grah., Macnab's, ♀. k. t. ?

chilensis Miers. et *velutina* Hort., v. *Sophora macrocarpa* et *velutina*, p. 772.

Ehretia L., Ehretie.

affinis Wall. (= *laevis* Roxb. var. ? Wall.), ähnelnde, ♀. w. Ostindien.

aspera Roxb. (= *tomentosa* Heyne) etc., v. *Beureria aspera* etc., p. 67, II. et p. 121.

Ehrharta Sm., Ehrharta.

longiflora Sm. (= *aristata* Thbg. = *Banksii* Gmel.), langblumige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

distichophylla LaBill., v. *Tetrarrhena distichophylla*.

Eichhornia Kunth, (F. Eichhorn, k. preuss. Staatsminister), VI. 1., Commelynaceae.

azurea Kunth (= *Pontederia azurea* Sw., p. 647).

speciosa Kunth (= *Pontederia crassipes* Mart., p. 647 = *P. azurea* Hook., non Sw.).

Elaeagnus T., Oleaster (wilder Oelbaum).

acuminata Lk., Loud. (= *argentea* Colla, non Pursh).

hortensis MB., α) *angustifolia* L. spec., β) *songarica* Fisch., γ) *tiflensis* Fisch., δ) *eriwanensis* Fisch., ε)

dactyliformis Hort., ζ) *orientalis* L. (= *tomentosa* Mch.), η) *spinosa* L.

nepalensis Hort. Dyck, nepalscher, ♀. k. t. Nepal.

parvifolia Royle, Wall. (= *reflexa* Hort.), kleinblättriger, ♀. k. t. Ostindien.

pungens Thbg., stechender, ♀. k. t. Nepal.

Unbestimmtere: *chrysophylla* Hort., *cyanea* Ait., *flava* Hort., *fusca* Hort.

Elaeis melanococca G. (= *Alfonsia oleifera* H. B. K.).

Elaeocarpus L., Oelfrucht.

albus Makoy, weisse, ♀. t. k. ? Ostindien.

grandiflorus Sm., großblumige, ♀. t. Neuholland.

resinosus, Bl., harzgebende, ♀. w. Java.

dentatus Vahl, *reticulatus* Sm. (= *cyaneus* Sims), v. *Monocera dentata* et *reticulata*.

Elaeodendron Jacq., Oelstrauch.

- angustifolium H. Cels., schmalblättriger, ⚭. ⚭. w. ?
 capense Eckl., Zeyh., capischer, ⚭. t. k. Cap d. g. H.
 trinerve H. Madrit., dreinerviger, ⚭. t. w. ?
 xylocarpum DC. (= *Cassine sphaerocarpa* H. Par. =
C. xylocarpa Vent.).

laurinum et *oleoides* (Eckl. Zeyh.), v. *Scytophyllum*
laurinum et *oleoides*.

Elaeoselinum K., Oelsilge, V. II., Umbelliferae.

- foetidum Boiss. (= *Thapsia foetida* L., p. 806).
 meoides K. (= *Laserpitium meoides* Dsl., p. 446 =
Thapsia meoides Gussone), meumähnliche, 4. k. f. h.
 Nordafrika, Sicilien.

Elatine T. L., Tannenwedel.

- minima Fisch. et Mey. (= *americana* Auct. = *Peplis*
americana Pursh = *Crypta minima* Nutt.), kleinster,
 ☉. f. Nordamerika.

- paludosa Seubert (= *Hydropiper* Sm. et Auct.), α) he-
 xandra DC., β) octandra Seub. (= *Hydropiper* Schk.
 = *major* A. Braun).

Eleogiton atropurpurea A. Dietr., v. *Heleocharis*
atropurpurea, *fluitans* Lk., v. *Isolepis fluitans*, p. 425,
parvula Lk., v. *Limnochloa parvula*, p. 464.

Elephantopus L., Elephantenfuss, XIX. I., Compositae-Vernoniaceae.

- carolinianus W. (= ? *tomentosus* L. = *flexuosus* Rafin.
 = *scaber* Mch., Sw.).

angustifolius Sw. (= *nudiflorus* Spgl. non W.),
 v. *Elephantosis angustifolia*.

Elephantorrhiza Benth., Elephantenwurzel, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

- Burchellii Benth. (= *Prosopis elephantorrhiza* Spgl. =
P. elephantina E. Mey. = *Acacia elephantorrhiza*
 Burch.), Burchell's, ⚭. t. Cap d. g. Hoffn.

Elephantosis Less., Elephantose, XIX. I., Compositae-Vernoniaceae.

- angustifolia Less. (= *Distreptus angustifolius* Cass. =
Elephantopus angustifolius Sw., p. 284 = *E. nudi-*
florus Spgl. non W.).

biflora Less., zweiblumige, 4. w. Brasilien.

- quadriflora Less. (= *liatroides* Fisch. et Mey., p. 285),
 vierblumige, 4. w. Brasilien.

Eleusine G., Eleusine.

cerealis Ehb., Getreidegebende, ☉. f. Aegypten.

- flagellifera N. E. (= *arabica* Hochst. et Steud.), peit-
 schentragende, 4. w. Arabien, Ostindien.

- floccifolia Spgl., Kl. (= *Cynosurus floccifolius* Forsk.
 = *Chloris floccifolia* Poir.), flockigblättrige, ♂. 4.
 w. Arabien.

gonantha Schrank, kantenblumige, 4. w. Brasilien.

- indica G. (= *Chloris repens* Hort.), β) distachya Trin.
 (= *Agropyrum geminatum* Schult. = ? *Cynosurus*
pectinatum Lam. = ? *Triticum geminatum* Spgl.).

- oligostachya Lk. (= *erythrosperma* Jan = *indica* γ *bra-*
chystachya = *leucosperma* Bernh. = *rigida* Spgl. =
Cynosurus rigidus H. Berol.).

ovalis Ehb., eiförmige, ☉. f. Aegypten.

Tocusso Fresen. (= ? *stricta* Roxb.).

- tristachya Kunth (= *Cynosurus tristachyus* Lam.), drei-
 ährige, ☉. f. Montevideo.

- brevifolia* Hochst. et Steud., v. *Coelachyrum brevifolium*, p. 152, II. — *aegyptiaca* P. (= *pectinata* Mch.), *mucronata* Mühlbg., *prostrata* Sogl., v. *Dactyloctenium aegyptiacum*, *mucronatum* et *prostratum*, p. 250. Hinsichtl. d. übrigen s. *Leptochloa*. p. 355.
- Eleutherine** Herb., Lindl., Käferschwertel, VI. 1., Irideae.
- anomala* Herb. Bot. reg., abweichende, 4. t. ?
- Elisena** Herb. (= *Liriopsis* Rchb.), Elisena, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
- longipetala* Herb. Lindl., langkronige, 4. Zw. t. w. Lima. *Elmigeria barbata* Rchb., v. *Pentastemon barbatus*.
- Elodea** Adans. (*Helodea*), *Elodea*, XVIII. II., Guttiferae-Hypericineae.
- aegyptiaca* Endl. ¹⁾ (= *Hypericum aegyptiacum* L., p. 409 = *Triadenia microphylla* Spach.).
- axillaris* Spach (= *petiolata* Pursh = *Hypericum paludosum* Chois. = *H. axillare* Mchx. = *petiolatum* Walt.), achselständige, 4. f. Nordamerika.
- floribunda* Spach (= *Hypericum petiolatum* Leconte, non Walt.), blüthenreiche, 4. f. Nordamerika.
- Fraseri* Spach (= *canadensis* Fras. fil. = *Hypericum Fraseri* Steud.), Fraser's, 4. f. Nordamerika.
- palustris* Ledeb. (= *Hypericum Elodes* L., p. 409).
- pulchella* Roxb. (= ? *Hypericum pulchellum* W. E. Suppl.), schöne, 4. k. Ostindien. Zu ergänzen p. 285.
- virginica* Nutt. (= *campanulata* Pursh. = *Martia campanulata* Sogl. = *Triadenia purpurascens* Rafin. = *Hypericum virginicum* L., p. 411).
- Elodea canadensis* Mchx., v. *Udora verticillata*, p. 828.
- Elsholtzia** W., Elsholtzie.
- blanda* Benth. (= *Aphanochilus blandus* Benth., p. 68 = *Mentha blanda* Wall. = *Perilla elata* D. Don).
- incisa* Benth. (= *Aphanochilus foetens* Benth. = *A. incisus* Benth., p. 68 = *A. paniculatus* Benth. = *Hyptis stachyoides* Lk. = *Mentha blanda* DC., Lindl. (non Wall.) = *M. foetens* Wall. = *M. incisa* Wall. = *Perilla leptostachya* D. Don).
- pilosa* Benth. (= *Aphanochilus pilosus* Benth.), behaarte, 4. f. Ostindien.
- polystachya* Benth. (= *Aphanochilus polystachyus* Benth. = *Mentha polystachya* Wall. = *Perilla fruticosa* D. Don, p. 607), vielährige, 4. k. t. Ostindien.
- Stauntoni* Benth., Staunton's, 4. 4. k. Ostindien.
- ocymoides* P., v. *Geniosporum prostratum*, *paniculata* W., v. *Pogostemon paniculatum*.
- Elvira** Cass., Elvira, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.
- biflora* DC. (= *Martini* DC. = *Delilia Berterii* Spr. = *Meratia Sprengelii* Cass. = *Milleria biflora* L., p. 524), zweiblumige, 4. w. m. f. Südamerika.
- Elymus** L., Haargras.
- angustatus* Trin., verschmälertes, 4. f. Sibirien.
- canadensis* L. (= *philadelphicus* L. = *Hordeum patulum* Mch.).
- condensatus* Presl, grdrängtähriges, 4. f. Nordamerika.
- crinitus* Schreb. (= *hordeiformis* Hort. = *intermedius* MB. = *Hordeum crinitum* Dsf. = *H. jubatum* Dsf.).
- dasystachys* Trin., rauchähriges, 4. f. Sibirien.

1) Catalog. hort. academ. Vindob. II., p. 369.

Elymus

- hordeiformis Dsf., gerstenähnliches, 4. f. ?
 junceus Fisch., simsenähnliches, 4. f. Sibirien.
 lanuginosus Trin., Ledeb., wolliges, 4. f. Sibirien.
 mexicanus Cavan., mexicanisches, 4. f. b. k. Mexico.
 ovatus Ledeb. Trin. (= *obtusus* Kunth), eiförmiges,
 4. f. Sibirien.
 virginicus L. (= *durus* Hort. = *Hordeum cartilagineum* Mch.).

Elyna Schrad., Hüllriet.

- schoenoides C. A. Mey., Ledeb. (= *Carex curvula* MB.),
 knopfgrasähnliches, 4. f. Caucasus.

Elytraria tridentata Vahl (= *imbricata* P., p. 286 = *Justicia imbricata* Vahl).**Elytropappus** Cassin., DC., Schildfederchen, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- ambiguus DC. (= *Achyrocome ambigua* Schrk. = *Stoebe cinerea* Sieb. (non Thbg.) = *St. mucida* E. Mey. = *St. ? subulata* Sm.), zweifelhaftes, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Embothrium Forst., Prachtstrauch.

- integrifolium H. Mackoy., ganzblättriger, 5. t. ?

Emerus major et minor Mill., v. *Coronilla Emerus*.

Emilia Cass., Emilie, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.
 citrina DC. (= *Cacalia citrina* Boj.), citronfarbige, ☉.
 m. f. Madagascar.

- sagittata DC. (= *flammea* Cass. = *Cacalia sagittata* Vahl excl. Synon., p. 141 et 871), β) coccinea Swt. (= *Cacalia coccinea* Curt. = *C. sonchifolia* Hortul., non L.).

- sonchifolia DC. (= *purpurea* Cass. = *Cacalia glabra* Wall. = *C. prenanthoides* Sieber = *C. sonchifolia* L. = *Crassocephalum sonchifolium* Less. = *Senecio sonchifolius* Mch. = *Sonchus amboinensis* Hort.), gänse-distelblättrige, ☉. m. f. Ostindien, China.

Empleurum Soland., Empleurum.

- ensatum Eckl., Zeyh. (= *Diosma ensata* Thbg.), schwertförmiges, 5. t. Cap d. g. Hoffn.
 serrulatum Ait. (= *Aitoni* Gmel. = *Diosma unicusularis* L. fil.).

Empusaria Rchb. (= *Empusa* Lindl.), Empusarie, XX. I., Orchideae.

- paradoxa (Lindl.) (= ? *Bletia bicallosa* Don = *Malaxis lancifolia* Smith = *Stelis racemosa* Sm.), wunderbare, 4. w. Nepal.

Enarthrocarpus LaBill., Gliederschote.

- lyratus DC. (= *Raphanistrum recurvatum* Juss. = *Raphanus recurvatus* P. = *R. lyratus* Forsk.), leierförmige, ☉. f. Aegypten.

Encephalartos Lehm., Hirnpalme, XXII. XII., Cycadeaceae¹⁾. Vergl. p. 862.

- Altensteinii Lehm. (= *Zamia spinulosa* Hortul. = *Zamia spinosissima* Hortul. belg. = *spinosa* Lodd.), Altenstein's, 5. w. Cap d. g. Hoffn.

- β) *angustifolia* Miq. (= *glaber* Hort.), γ) *semi-*
dentata Miq. (= *E. Marumii* Vriese = *Zamia spinosissima* Hort.).

1) Nach Miquel genera et species Cycadearum viventium.

Encephalartos

brachyphyllus Lehm. (= *Zamia cycadifolia* H. belgor.), kurzblättrige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

caffer Lehm. (= *Cycas caffra* Thbg. = *Zamia Cycadis* L. fil. = *Z. caffra* Thbg. = ? *Z. villosa* G. = *Z. elliptica* Lodd.), caffersche, ♀. w. Cap d. g. H.

cycadifolius Lehm. (= *Zamia cycadifolia* Jacq.), cycasblättrige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

elongatus Lehm. (= *procer* Miq. = *Zamia pungens* Lodd.), verlängerte, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

Friederici Guilelmi Lehm., Friedrich Wilhelm's, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

horridus Lehm. (= *Zamia horrida* Jacq. = *Zamia tricuspidata* Hortul.), stachelige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

A. *horridus genuinus* Miq. (= *Zamia horrida* Jacq. fragm.). B. *horridus Hallianus* Miq. (= *E. van Hallii* Vriese).

lanuginosus Lehm. (= *horridus* var. *lanuginosa* Miq. = *Zamia lanuginosa* Jacq. = *Z. horrida* Lodd.), wolliche, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

β) *tridens* Miq. (= *tridentatus* Hort., non Lehm.).

latifrons Lehm. (= *Aquifolium* Lodd.), breitwedelige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

Lehmanni Ecklon (= *Cycas glauca* van Royen = *Zamia Lehmanniana* Eckl. et Zeyh.), Lehmann's, ♀. w. Cap der guten Hoffnung.

longifolius Lehm. (= *pungens* Lodd. = *Zamia longifolia* Jacq. = *Z. caffra* et *Cycadis* plur. Hort.), langblättrige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

β) *revoluta* Miq., γ) *angustifolia* Miq.

mauritanus Miq.¹⁾, mascarenische, ♀. w. ? Mauritius.

nanus Lehm. (= *Zamia nana* Hort. = *aurea* H. Belg. = *Z. gleina* Hort.), zwergige, Cap d. g. Hoffn.

pungens Lehm. (= *Zamia pungens* Ait. = *Z. cycadifolia* et *spiralis* plur. Hort. = *Z. occidentalis* Lodd.), stechende, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

spinulosus Lehm. (= *spinosa* Hortul.), feinstachelige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

tridentatus Lehm. (= *spiralis* H. Roterod. = *Zamia tridentata* W. = *Z. occidentalis* Hort.), dreizählige, ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

pruniferus Sweet, v. *Zamia debilis*, *spiralis* Lehm., v. *Macrozamia spiralis*.

Encholirium Mart, Steinlilie, VI. 1., Bromeliaceae.

spectabile Mart. (= *Puya saxatilis* Mart.), ansehnliche, 4. ♀. w. Brasilien.

Enchysia Presl (= *Laurentia* Neck.), Enchysie, V. 1., Campanulaceae-Lobeliaeae, (Lobelia Sect. III., p. 470).

erinoides Presl, *repens* Presl.

Enckea glaucescens Kunth, *plantaginea* Kunth etc., v. *Otonia glaucescens*, *plantaginea* etc.

Encliandra Autor, v. *Eucliandra*.

Encyanthus Lour. (= *Enkyanthus* Lour., DC.), Prachtglocke.

uniflorus Benth., einblumige, ♀. t. China.

Außerdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen noch *E. longifolius* u. *undulatus* vor.

1) „Colitur in Palmophylacio insulae Pavonum“ Miq.

- *Endoptera aspera* DC., v. *Nemauchenes aspera*,
Dioscoridis DC., v. *Gatyna Dioscorides* s. *globu-*
lifera, p. 347.
- Endressia** Gay. (Endress, hat mehrere ausgezeichnete
 botan. Reisen unternommen), V. II., Umbelliferae.
pyrenaica Gay. (= *Meum pyrenaicum* Gay. in DC.
 prodrom. = *Laserpitium simplex* Lapeyr. excl. Synon.),
 pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- Entada** Adans., Entada.
Gandu Hffg., javanische, ♀. Sch. w. Java.
scandens van Houtte, klimmende, ♀. Sch. w. ? Java.
- Entelea** RBr., Entelea.
australis RBr. (= *Apeiba* A. Rich.), südliche, ♀. t.
 Neuzeeland.
palmata Lindl. (= *Sparmannia palmata* Hort.).
pubescens Lindl., weichhaarige, ♀. t. Neuzeeland.
- Epacris** Forst., Sm., Felsbusch.
autumnalis Hort. belg. (= *coruscans*, *elegans*, *refulgens*
 Hort.), Herbst-F., ♀. t. k. Neuholland.
Copelandii Hort. belg., Copeland's, ♀. t. k. Neuholland.
flammea Makoy, flammender, ♀. t. k. Neuholland.
grandiflora Sm., β) *coccinea* Hort. belg. (= ? *splen-*
dens Hort.).
laevigata Hort., glatter, ♀. t. k. Neuholland.
miniata Lindl. (= ? *carminibrata* Hort.), mennigrother,
 ♀. t. k. Neuholland.
mutabilis Hort., veränderlicher, ♀. t. k. Neuholland.
tomentosa Lindl., filziger, ♀. t. k. Neuholland.
 Noch werden in den Pflanzenverzeichnissen nachstehende
 zum Theil ? Varietäten oder Hybriden aufgeführt:
brevifolia, *Hügelii*, *longiflora splendens*, *lutescens*,
Mühlbeckii, *sparsa*, *Willmoreana*, — *tubiflora* Hort.
 = *obtusifolia*. Hinsichtlich der übrigen siehe über-
 haupt *Lysinema*.
- Epaltes** Cass., *Epaltes*, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.
divaricata Cass. (= *Ethulia divaricata* L., p. 316).
linearifolia DC. (= *Ethulia divaricata* Wall.), gleich-
 breitblättrige, ♂. f. m. Ostindien.
- Ephedra** L., Meerträubel.
fragilis Dsf. (= *distachya* Bové), brüchiges, ♀. k.
 Creta, Nordafrika, Arabien.
major Host, großes, ♀. k. f. h. Dalmatien.
- Ephippium** Blume, v. *Cirrhopetalum*, p. 145, II.
- Epidendrum** L., Baumstendel.
altissimum Batem. (non Jacq.), höchster, 4. w. Bahama.
apiculatum Lk., Kl., Otto, kurzspitziger, 4. w. Mexico.
armeniaceum Lindl., armenischer, 4. w. Brasilien.
articulatum Burm., Lam., gegliederter, 4. w. Westindien.
basilare Kl. (= *Stamfordianum* H. Angl.), grundständiger,
 4. w. Caracas, Guiana.
bifarium Sw. (= *anceps* Sw., non Jacq.), zweireihiger,
 4. w. Jamaika.
bifidum Aubl., Burm., Sw. (= *papilionaceum* Westc.),
 zweispaltiger, 4. w. Westindien, Guiana.
biforatum H. belg., paarigdurchbohrter, 4. w. ? Südamer.
Candollei Lindl., Candolle's, 4. w. Mexico.
cepiforme Parkins., zwiebelähnlicher, 4. w. Mexico.
ciliare L., β) *latifolium* Booth, γ) *majus* Booth.
cinnabarinum Salzm., hellrother, 4. w. Bahia.
citrosimum v. Houtte, orangeduftender, 4. w. ? Südamer.

Epidendrum

- cochleatum L., β) majus Booth, γ) minus Booth.
 crassifolium Lindl. (= *ellipticum* Lodd., non Grah.),
 dickblättriger, 4. w. Antillen.
 densiflorum Hook., dichtblumiger, 4. w. Mexico.
 dichotomum Presl (non Paxt.), zweizinkiger, 4. w. Peru.
 diffusum Sw., β) fuscum van Houtte.
 dipus Lindl., zweistieliger, 4. w. Brasilien.
 erubescens Makoy Cat., rötlicher, 4. w. ? Südamerika.
 ferrugineum Ruiz et Pav., rostfarbiger, 4. w. Peru.
 filicaule Lindl., fadenstengeliger, 4. w. Brasilien.
 flexuosum Meyer, gebogener, 4. w. Guiana.
 fragrans Sw. (= *cochleatum* Curt (non L.) = *lineatum*
 Salisb.), β) cinnamomum Booth, γ) minus Booth.
 giganteum H. belg. (= *Guilleminianum* Hort.), riesen-
 hafter, 4. w. ? Südamerika.
 glaucescens H. Hügel., blaugrünlicher, 4. w. Jamaika.
 glumaceum Lindl., spelzenartiger, 4. w. Brasilien.
 glutinosum Scheidw. (= *odoratissimum* Lindl.), klebri-
 ger, 4. w. Brasilien.
 grandiceps H. Hügel, grofsköpfiger, 4. w. Jamaika.
 haematotum Bartl., blutfarbiger, 4. w. ? Südamerika.
 japonicum H. Booth, japanischer, 4. w. Japan.
 insigne H. Hügel, ausgezeichnete, 4. w. Brasilien.
 inversum van Houtte, einwärtsgekehrter, 4. w. ? Süd-
 am.
 ionoleucum Hffg., veilchenweißlicher, 4. w. Brasilien.
 lancifolium Pavon, Lindl., lanzettblättriger, 4. w. Mexico,
 Guatimala.
 latilabre van Houtte, breitlippiger, 4. w. ? Südamerika.
 leucochilon Lk., Kl., Otto, weißlippiger, 4. w. ? Süd-
 am.
 lentiginosum van Houtte, linsenförmiger, 4. w. ? Süd-
 am.
 longiflorum H. B. K., langblumiger, 4. w. Neugranada.
 luteum H. Hügel., gelber, 4. w. Brasilien.
 macrochilum Hook., β) roseum Booth.
 marginatum Lk., Kl., Otto, (*Osmophytum*), berandeter,
 4. w. Südamerika.
 mexicanum Booth, mexicanischer, 4. w. Mexico.
 obtusum A. DC., stumpfer, 4. w. Südamerika.
 ochroleucum H. Hügel., weißgelber, 4. w. Brasilien.
 pallidiflorum Lindl., bleichblumiger, 4. w. Ostindien.
 pallidum Courtois, bleicher, 4. w. ?
 paniculatum R. et P., rispiger, 4. w. Peru.
 Parkinsonianum Hook. (= *falcatum* Hort.), Parkinson's,
 4. w. Mexico.
 Parmentierii van Houtte, Parmentier's, 4. w. ? Süd-
 amer.
 patens Sw., absteher, 4. w. Westindien.
 Paxtonianum Steud. (= *dichotomum* Paxt., non Presl),
 Paxton's, 4. w. Brasilien.
 phoeniceum van Houtte, hochrother, 4. w. ? Süd-
 amer.
 polyanthum Lindl. (= *polystachyum* Pav.), vielblumiger,
 4. w. Mexico.
 pterocarpum Lindl., Hook., flügelfrüchtiger, 4. w. Mexico.
 Quesnelianum Hort. belg. (= *dichromum* Hort.), Ques-
 nel's, 4. w. ? Südamerika.
 radiatum Lindl., strahliger, 4. w. Mexico.
 radicans Pavon, wurzelnder, 4. w. Mexico.
 ramosum Jacq. (= *rigidum* Lodd. (non Jacq.) = *Iso-*
chilus ramosus Speg.), ästiger, 4. w. Jamaika.
 raniferum Lindl., froschähnlicher, 4. w. Mexico.
 repens H. Hügel., kriechender, 4. w. Brasilien.

Epidendrum

- roseum H. Hügel., rosafarbiger, 4. w. Brasilien.
 Skinneri Batem. (= *clavatum* Lindl., non Retz).
 speciosissimum H. Hügel., prächtigster, 4. w. Brasilien.
 sphaerobulbon Hort. belg., kugelförmiger, 4. w. ? Süd-am.
 squalidum Hort. belg., gelbbunter, 4. w. ? Südamerika.
 subumbellatum Hffg., wenigdoldiger, 4. w. Brasilien.
 superbum H. Hügel., stolzer, 4. w. Brasilien.
 violaceum Jacq. (non Lodd.), violetter, 4. w. Südamer.
 viscidum van Houtte, schmieriger, 4. w. ? Südamerika.
 virens Hoffg., grünender, 4. w. Brasilien.
 virescens Lodd., grünlicher, 4. w. Domingo.
 vitellinum Lindl., dottergelber, 4. w. Mexico (Oaxaca).
 ybagueense H. B. K., ybagueensischer, 4. w. Neugranada.
Barringtoniae Sm., v. *Maxillaria Barringtoniae*, p. 500, *carthagenense* Jacq., *Ceboletta* Jacq., v. *Oncidium carthagenense* et *Ceboletta*, p. 557, *coccineum* Jacq., v. *Ornithidium coccineum*, p. 568, *cucullatum* L. (non Lindl.), v. *Brassavola cucullata*, p. 130, *glaucum* Sw., *graminoides* Sw. etc., v. *Dichaea glauca* et *graminoides* etc., p. 200, II., *graminifolium* L., v. *Octomeria graminifolia*, p. 553, *grandiflorum* H. B. K., v. *Anguloa grandiflora*, p. 60, *lineare* L., v. *Isochilos lineare*, p. 425, *moschatum* Buchan., v. *Dendrobium Calceolaria*, p. 255, *ophioglossoides* L., v. *Stelis ophioglossoides*, p. 786, *pendulum* Roxb., v. *Cymbidium pendulum*, p. 180, II., *polybulbon* Sw., v. *Dinema polybulbon*, p. 877, *praemorsum* Roxb. et *retusum* L., v. *Saccolobium papillosum* et *guttatum*, *Renanthera* Lour., v. *Renanthera coccinea*, p. 680, *ruscifolium* L., v. *Pleurothallis ruscifolia*, p. 635, *striatum* Sw., v. *Bletia hyacinthina*, p. 125, *tibicinum* Batem. (= *tibicinis* Loud.), v. *Schomburgkia tibicinis*, *uniflorum* Lindl. (= *monanthum* Steud.), v. *Hormidium uniflorum*, p. 880, *violaceum* Lodd., v. *Cattleya Loddigesii*, p. 173, *volucris* Pet. Thouars, v. *Aeonium volucris*, p. 11, II.

Epilobium L., Weidenröschen.

- algidum MB. (= *organifolium* Lam. var. Sptgl.), Eifsw., 4. f. Caucasus.
 anceps Fries, zweischneidiges, 4. f. Schweden.
 angustifolium L. (= *Antonianum* Hort. = *speciosum* Lodd.).
 chilense H. Berol., chilesisches, ☉. f. Chili.
 Durieui Gay., Durieu's, 4. f. Frankreich.
 dahuricum Fisch. (= *cylindricum* Don).
 decumbens Dumort., niederliegendes, 4. f. Belgien.
 denticulatum Wender. (= *angustissimum* Rchb. = *angustissimum* MB. β = *crassifolium* Lehm. = *Fleischeri* Hochst. = *rosmarinifolium* β DC.), gezähneltes, 4. f. Europäische Alpen.
 Dodonaei Vill. (= *angustifolium* Lam. = *angustissimum* Ait. = *Halleri* Retz = *rosmarinifolium* Haenke = *Chamaenerion Halleri* Sweet), Dodonaeus's, 4. f. Europäische Alpen.
 minutum Lindl. (= *Crossostigma Lindleyi* Spach), kleinstes, ♂. 4. f. Nordamerika.
 sparsifolium Dumort., zersteutblättriges, 4. f. Belgien.
 umbrosum Dumort., schattenliebendes, 4. f. Belgien.

Epimedium T., Sockenblume.

colchicum Hort. belg., colchische, 4. k. f. b. Kleinasien.
elatum Morr. et Decaisn., hohe, 4. k. f. b. Persien,
 Ostindien.

pubigerum Morr. et Decaisn. (= *alpinum* β DC.),
 weichhaarige, 4. k. Kleinasien, Japan.

diphyllum Lodd., v. *Aceranthus diphyllus*, p. 6, II.,
hexandrum Hook. (= *Caulophyllum gracile* Dougl.),
 v. *Vancouveria hexandra*.

Epiphyllum Haw., Pfeiff., v. Cacteeae, p. 872 et 98, II.**Episcia** Mart., *Episcia*, XIV. II., Personatae-Gesneriaceae.

melittifolia Mart. (= *Besleria melittaeifolia* L., p. 119).

pulchella Mart. (= *Besleria pulchella* Sims, Don, p. 119
 = *B. umbellata* Banks).

Eragrostis P. B., Liebesgras.

abyssinica Lk. (= *Poa abyssinica* Jacq.) α) leucosperma,
 β) erythrosperma.

airoides N. E. (= *Aira brasiliensis* Raddi = *Poa airoi-*
des Kunth), schnielenähnliches, 4. w. Brasilien.

β ? *microstachya*.

articulata N. E. (= *Poa articulata* Schrank), geglie-
 dertes, \odot . w. m. f. Brasilien.

aspera N. E. (= *Poa aspera* Jacq., p. 636).

bahiensis Schult. (= *brasiliensis* N. E. = *Poa bahien-*
sis Schrad. = *P. brasiliensis* Radd. = *P. polymor-*
pha W.), Bahia-L., 4. w. Brasilien.

benghalensis Hort. bot., bengalisches, \odot . w. m. f. Ostind.

capillaris N. E. (= *Poa capillaris* L. = *P. caroli-*
niana Spgl.).

ciliaris Lk. (= *villosa* Trin. = *Megastachya ciliaris*
 P. B. = *Poa ciliaris* L. = *P. ciliata* Auct. = *P.*
elegans Poir.).

cinnaeformis Schrad. (= *Poa cinnaeformis* Hort. Hafn.
 = *P. cinnoides* Hort.), Cinnaähnliches, 4. w. ?

compta Lk. (= *ciliaris* Lk. var. N. E. = *Poa compta*
 Kunth).

coromandelina Trin. (= *bifaria* β Wight = *Poa bifa-*
ria Vahl), coromandelinisches, 4. w. Coromandel.

cynosuroides P. B. (= *bipinnata* P. B. = *Briza bi-*
pinnata L. = *Cynosurus durus* Forsk. = *Megasta-*
chya bipinnata P. B. = *Poa cynosuroides* Retz =
Uniola bipinnata L.), kammgrasähnliches, 4. w.
 Aegypten, Arabien, Ostindien.

delicatula Trin. (= *Poa delicatula* Fisch. Hort. Petropol.),
 zartes, \odot . w. f. Brasilien.

elegans N. E. (= *brasiliensis* N. E. = *Poa brasilien-*
sis Spgl. = *P. elegans* Hffg. = *Megastachya brasi-*
liensis Schult.), brasilianisches, \odot . w. m. f. Brasilien.

elongata Lk. (= *brasiliensis* γ N. E. = *Poa elongata*
 Jacq. = *Megastachya elongata* P. B. = *P. depen-*
dens Hornem. = ? *P. glomerata* Dsf.).

filiformis Lk. (= *Poa Linkii* Kunth = *P. tenella* Pursh
 = *P. punctata* Lk. Enum.).

gracilis Schrad. (= *Poa chilensis* H. Par. (non Moris)
 = *P. plumosa* H. Par.), schlankes, \odot . f. Chili.

hirsuta N. E. (= *Poa hirsuta* Mchx. = *P. simplex*
 Walt.), rauhhaariges, \odot . f. Nordamerika.

Jacquini Schrad., *Jacquini's*, \odot . f. ?

japonica Trin. (= ? *caudata* N. E. = *namaquensis* N.
 E. = *tenuissima* Schrad. = *Poa japonica* Thbg. =

Eragrostis

- P. tenella* RBr. (= *P. tenellula* Kunth), japanisches, ☉. f. Japan, Neuholland, Cap d. g. Hoffn.
- inconstans* N. E. (= *cuspidata* Link = *floribunda* Schrad. = *rufescens* Schrad. = *Calotheca cuspidata* Spr. = *Megastachya cuspidata* Schult. = *M Swainsonii* Radd. = *Poa cuspidata* Roth = *P. floribunda* Schrad.), unbeständiges, ☉. w. f. Südamerika.
- interrupta* P. B. (= *Poa interrupta* RBr. = *P. glomerata* Dsf. = ? *P. intercepta* Spgl.), unterbrochen-rispiges, ☉. f. Neuholland.
- laxiflora* Schrad., lockerblumiges, ☉. f. Cap d. g. H.
- linearis* Trin., gleichbreites, ☉. f. Nordchina.
- mexicana* Lk. (= *Poa capillaris* Lk. = *P. mexicana* Lag.).
- microstachya* Lk. (= *airoides* β N. E.), kleinähriges, ☉. f. Montevideo.
- Neesii* Trin. (= *brasiliensis* δ N. E. = *Poa auriculata* Hornem. = *P. Neesii* Kunth), Nees's, ☉. w. f. Brasilien.
- paniciformis* A. Braun, hirseförmiges, ☉. m. f. Abyssinien.
- peruviana* Trin. (= *Poa nana* Savi = *P. peruviana* Jacquin = *Koeleria peruviana* P. B.), peruvianisches, ☉. w. m. f. Peru, Chili.
- pilosa* P. B. (= *Poa pilosa* L. = *P. tenella* Pall.), β) *pectinacea* (Mchx.) (= *Poa pallida* Lagasca), γ) *verticillata* P. B. (= *Poa chinensis* Lk., Enum. = *P. verticillata* Cav.), δ) *Purshii* Schrad. (= *P. diantra* Hort., non RBr.), behaartes, ☉. f. Süd-, Mittel- u. Westeuropa, Asiat. Rufsland, Nord- u. Südamer.
- poaeformis* Lk. (= *poaeoides* P. B. = *minor* Host. = *vulgaris* Presl).
- polytricha* N. E. (= *Poa capillaris* Salzmann = *P. polytricha* Kunth), vielhaariges, ☉. w. m. f. Bahia.
- reptans* N. E. (= *Megastachya hypnoides* P. B. = *M. reptans* P. B. = *Poa dioica* Vent. = *P. carinata* Poir. = *P. hypnoides* Lam. = *P. reptans* Mchx. = *P. subsecunda* Lam. = *P. Weigeltiana* Rchb.), kriechendes, ☉. f. Nord- und Südamerika.
- solida* N. E. (= *rufescens* Schult., non Schrad. = ? *Megastachya Berteroniana* Schult. = *Poa solida* Kunth), dichtes, ☉. w. m. f. Brasilien.
- spectabilis* Steud. (= *Megastachya spectabilis* R. et S. = *Poa amabilis* Walt. = *P. refracta* Mühlbg. = *P. spectabilis* Pursh), ansehnliches, ☉. f. Nordamerika.
- spinosa* Trin. (= *Festuca spinosa* L. fil. = *Poa spinosa* Thbg.), dorniges, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- tenella* P. B. (= *Poa tenella* L.), zartes, ☉. w. f. Ostindien, Molucken.
- tephrosanthes* Schult. (= *poaeoides* γ Trin. = *P. polymorpha* Sieb. = *P. tephrosanthes* Spgl.), grauähriges, ☉. w. m. f. Martinique.
- Vahlü* N. E. (= ? *Megastachya Swainsonii* Raddi = *Poa racemosa* Vahl = *P. Vahlü* R. et S.), Vahl's, ☉. w. m. f. Brasilien.
- Hiernach zu berichtigen u. zu ergänzen, p. 292 et 878.
- Eranthemum* L., RBr., Frühlingsblume.
- ambiguum* Schult. (= *parvifolium* Lk. Enum. = *Justicia parvifolia* Hort.).
- montanum* Roxb (= *Justicia montana* Roxb.), Berg-F., ♀. w. Ostindien.

Eranthemum

parviflorum RBr. (= *Justicia parviflora* Ortega), kleinblumige, 4. t. w. Mexico.

punctatum N. E., punktirte, 5. w. ? Ostindien.

Eranthis Salisb., Frühlingsnieswurz.

uncinata Turcz., hakenförmige, 4. f. Dahurien.

Erechtites Rafin., DC., Erechites, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

ambigua DC. (= *Senecio cacalioides* Lk., non Spgl.), zweifelhafte, 6. m. f. Brasilien.

carduifolia DC. (= *Neoceis carduifolia* Cass. = *Senecio carduifolius* Dsf.), distelblättrige, 6. f. ?

Die übrigen zu dieser Gattung gehörigen Arten als: *cacalioides* Less., *glomerata* DC. (= *Neoceis microcephala* Cass. = *Senecio glomeratus* Dsf. = *S. ? multicaulis* Rich.), *hieracifolia* Rafin., *valerianaefolia* DC. (= *Crassocephalum valerianaefolium* Less.), vergl. *Senecio*, Sect. IV., p. 746.

Eremaea Lindl., Eremaea, XVIII. II., Myrtaceae.

ericifolia Lindl., fimbriata Lindl., pilosa Lindl., 5. Neu-holland. Ob kultivirt?

Eremanthe calycina Spach, v. *Hypericum calycinum*, p. 409.

Eremodaucus Bunge, Wüstenmöhre, V. II., Umbelliferae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, 6. f. Asiat. Rußland.

Eremogone Fenzl, Wüstenmiere.

cephalotes Fenzl (= *Arenaria cephalotes* M. B.), großköpfige, 4. f. Taurien.

graminifolia Fenzl (= *Arenaria graminifolia* Schrad.), α) glabra Fenzl, β) pubescens Fenzl. (= *Arenaria filifolia* MB.).

procera Rchb. (= *Arenaria graminifolia* Auct. = *A. procera* Spgl.), hohe, 4. f. Ungarn, Dalmatien.

Die übrigen sind p. 878 verzeichnet.

Eremosparton Fisch. et Mey., Wüstenginster(pfriemen), XVII. IV. (XVI. VI.).

aphyllum Fisch. et Mey. (= *Genista aphylla* DC., p. 348 = *virgata* Lam. = *Spartium aphyllum* Pall.), blattloser, 5. f. Sibirien.

Eremostachys Bunge, Ledeb., Wüstenziest, XIV. I., Labiatae.

gymnocalyx Schrenk., kahlkelchiger, 6. f. Asiat. Rußland.

laciniata Bunge (= *Phlomis laciniata* L., p. 616).

molucelloides Bunge (= *Phlomis lanigera* Sievers), trichterkelchähnlicher, 4. f. Altaisch. Sibirien, Songaria.

phlomoïdes Bunge, phlomisähnliche, 4. f. Caucasus, Sibirien.

rotata Fisch., Mey. et Lallem., radförmiger, 4. f. ? Asiat. Rußland.

tuberosa Bunge (= *Moluccella tuberosa* Pall., p. 528).

Eremurus MB., Schweifaffodile.

caucasicus Stev., caucasische, 4. f. Caucasus.

tauricus Stev., Weinm., taurische, 4. f. Taurien.

spectabilis MB. (= *sibiricus* Weinm. = *Asphodelus altaicus* Pall., p. 293).

Eria Lindl., Wollstendel.

armeniaca ? Lindl., armenischer, 4. w. ? Ostindien.

bractescens Lindl., deckblättriger, 4. w. Sincapore.

Eria

- convallarioides Lindl. (= *Octomeria convallarioides* Wall. = *O. spicata* D. Don, p. 553 = *Pinalia alba* Hamilt.), maiblumenähnlicher, 4. w. Ostindien.
- Dillwynii Hook., Dillwyn's, 4. w. Philippinen.
- excavata Lindl. (= *Octomeria excavata* Wall.), ausgehölet, 4. w. Ostindien.
- ferruginea Lindl., rostfarbiger, 4. w. Ostindien.
- floribunda Lindl., blüthenreicher, 4. w. Sincapore.
- longilabris Lindl., langlippiger, 4. w. Philippinen.
- obesa Lindl., fetter, 4. w. Ostindien.
- ovata Lindl., eiförmiger, 4. w. Philippinen.
- paniculata Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.
- platycaulis H. Booth., breitstengeliger, 4. w. ? Ostindien.
- pubescens Lindl. (= *flava* Lindl. = *Dendrobium pubescens* Hook. = *Octomeria flava* Wall. = *O. pubescens* Spgl., p. 293).
- pumila Lindl., kleiner, 4. w. Ostindien.
- vestita Lindl. (= *Dendrobium vestitum* Wall.), bekleidet, 4. w. Sincapore, Philippinen.
- Eriachne** RBr., Wollspelze, III. II., Gramineae.
- obtusa RBr. (= *Achneria obtusa* P. B. ? = *Aira obtusata* Spgl.), stumpfe, 4. k. Neuholland.
- Zu berichtigen p. 293¹⁾.
- Erica** T. Heide, Sect. I. et IV.
- anthura Lk., blüthenschweifige, 5. 5. k. Dalmatien.
- tenera Kl. (= *gracilis* Andr. et Hort., non Wendl.), zarte, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- In den Pflanzenverzeichnissen der Gärten werden noch folgende erwähnt: Banksii Andr. b. fl. purpureo, Cavendishiana, cerinthoides L. b. magna, colorans Andr. b. verna, cuneata, hyacinthiflora, hyemalis, Murrayana Hamilt. (Hybride), Ottonis, pubescens L. b. major, ruffa, Sebana L. b. lutea, undulata Rollison, vernix Andr. b. coccinea et c. ovata, — *rubrosepala* Sweet = *rubida* Lodd., p. 295 Hybrid.
- Ericilla** Juss., Ericilla, X. I., Rutaceae (Diosmeae).
- volubilis Juss. (= *Bridgesia spicata* Hook., Arn. = *Galvezia spicata* Bertero), windende, 5. Sch. t. Chili.
- Erigeron** L., Flöhkraut (Berufskraut).
- amplexicaulis Poir., H. Par., stengelumfassendes, 4. f. Nordamerika.
- angustissimus Lindl., schmälstes, 4. 5. k. Ostindien.
- asperulus Fisch. et Mey., wenigrauhes, 0. f. ?
- coronopifolius Schrk., krähensfußblättriges, ? 5. k. Cap der guten Hoffnung.
- fastigiatus Hornem., gipfelständiges, 0. f. ?
- fragrans Spgl. (= *Senecio fragrans* Lehm.), wohlriechendes, ? 0. f. ?
- lanatus Hook., wolliges, 4. f. Nordamerika.
- Lehmanni Spgl. (= *pusillus* Lehm., non Nutt.).
- quercifolius Lam. (= *Aster quercifolius* Less.), eichenblättriges, 4. f. b. Florida.
- radicatus Hook., langwurzelliges, 4. f. Nordamerika.
- spinulosus Hook. et Arn. (= *E. fasciculatus* Colla), feinstacheliges, 0. ♂. f. Chili.
- squarrosus Lindl., sparriges, 4. f. Nordamerika.

1) *Aira obtusata* Mchx. (= *truncata* Mchx., p. 26), gehört als Synonym nicht hierher, sondern zu *Reboulea gracilis* Kunth.

Erigeron

spathulatus Vest., spatelförmiges, ☉. f. Para.
 strictissimus Wender., steifstes, 4. f. ?
 uniflorus L., β) oreades Schrenk.
 uralensis Less., uralsches, 4. f. Ural.

annuus L., v. *Stenactis annua*, p. 786, *Beyrichii*
 H. Berol. (= *Stenactis Beyrichii* Fisch. et Mey.),
 v. *Phalacrocoma Beyrichii*, *aegyptiacus* L., *bonariensis*
 Hort. (= *canadensis* Tenor. = *linifolius* W.
 = *contortus* Dsf. = *crispus* Pourr.), *chilensis* Dou,
Gouani L., *hirtus* Thbg., *incisus* Thbg., v. *Conyza*
aegyptiaca, *ambigua*, *chilensis* etc., p. 216 et 159,
 H., *graveolens* L., v. *Inula graveolens*, *obliquum* L.,
 v. *Blumea amplexans*, p. 870, *siculum* L. et *tuber-*
osum L., v. *Jasonia sicula* et *tuberosa*, p. 430,
sulcatum Mey., v. *Conyza chilensis*, *viscosum* Dsf.
 (non L.), v. *Psiadia glutinosa*, p. 661, — *virginicus*
 Hort. = *carolinianus*.

Erinacea Boiss., Wollklee, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

pungens Boiss. (= *Anthyllis erinacea* L., p. 65), stehender, ♀. k. Südspanien, Nordafrika.

Erinia Campanula Noullet, v. *Campanula Erinus*, p. 153.

Erinus procumbens Mill., v. *Herpestes chamaedryoides*, *verticillatus* Mill., v. *Stemodia parviflora*.

Eriobotrya Lindl., Wolltraube.

cordata Lindl. (= *Crataegus ferruginea* P. = *Mespilus lanuginosa* R. et P. = *Osteomeles ferruginea* H. B. K.), herzförmige, ♀. t. Peru.

elliptica Lindl., v. *Cotoneaster Lindleyi*, p. 163, II.

Eriocalia Sm., Wolldolde.

leucocephala* (= *Actinotus leucocephala* Benth.), weisköpfige, ☉. t. f. Neuholland. Ob kultivirt?

Eriocephalus Dill., Wollkopf.

africanus L. (= *septifer* Cass. = *corymbosus* Mch. = *frutescens* Ait.).

glaber Thbg. (= *decussatus* Burch. = *Tarchonanthus senecioides* L. fil.).

Eriochloa punctata Hamilt. (= *Oedipachne punctata* Lk.), v. *Helopus punctatus*.

Eriocladium pyramidatum Lindl., XIX. I., Compositae-Corymbiferae, Neuholland (Schwanenflufs). Ob kultivirt?

Eriodendron DC., Wollbaum.

aesculifolium DC., rofskastanienblättriger, ♀. w. Neuspanien.

caribaeum Don, Hook. (= *anfractuosum* β *caribaeum* DC. = *Bombax occidentale* Spgl. = *B. pentandrum* Jacq.).

orientale Steud. (= *anfractuosum* α *indicum* DC. = *Ceiba Casearia* Medik. = *C. pentandra* G. = *B. pentandrum* L. (non Jacq.) = *Gossampinus alba* Hamilt.). Zu ergänzen p. 309.

Eriophorum L., Wollgras, Sect. B.

Chamissonis C. A. Meyer (= *intermedium* Chamiss.), Chamisso's, 4. f. Altaisch. Sibirien, Schweden.

Eriophyllum caespitosum Dougl. et *oppositifolium* Nutt., v. *Bahia lanata* et *oppositifolia*, p. 58, II.

Eriospermum Jacq., Wollsame.

virgatum Hort., ruthenförmiger, 4. Zw. k. t. ?

Eriostemon Sm., Wollfaden.

Banksii Cunningh., Banks's, ƒ. t. Neuholland.

brevifolius Cunningh., kurzblättriger, ƒ. t. Neuholland.

buxifolius Sm., β) intermedius Makoy.

lanceolatus G. fil. (= *australasium* Sm.).

oblongifolius Hook., länglichblättriger, ƒ. t. Neuholl.

paradoxus Sm., wunderbarer, ƒ. t. Neuholland.

racemosus Endl., traubiger, ƒ. t. Neuholland.

rotundifolius Cunningh., rundblättriger, ƒ. t. Neuholl.

scaber Hort. belg., scharfer, ƒ. t. Neuholland.

Eriostemon alpinum Hffg., *germanicum* Hffg., *lanatum* Hffg., *lusitanicum* Hffg. etc., v. *Stachys alpina* etc., p. 780.

Eriotheca Schott, Endl., Wollbüchsenbaum, XVI. VIII.,
Bombaceae.

parviflora Schott, Endl. (= *Bombax parviflorum* Mart.),
kleinblumiger, ƒ. w. Brasilien.

pubescens Schott, Endl. (= *Bombax pubescens* Mart.),
weichhaariger, ƒ. w. Brasilien.

Erisma Rudge, *Erisma*.

niveum Lk., schneeweisses, ƒ. w. Brasilien.

violaceum Mart. (= *Debraea violacea* Mart. et Zuccar.
= *Ditmaria violacea* R. et S. = *Qualea calcarata*
Lk.), violettes, w. Brasilien.

Eritheis maritima Gray, v. *Inula crithmoides*, p. 417.

Eritrichum Schrad., Bunge, v. *Myosotis*, Sect. II.

Erodendrum amplexicaule Salisb., *bombycinum* Salisb.,
eximium Salisb., *formosum* Salisb., *longifolium* Sa-
lisb., *magnificum* Salisb., *mellifluum* Salisb., *tenax*
Salisb., *turbiniflorum* Salisb., *umbonale* Salisb., v.
Protea amplexicaulis, *longiflora*, *latifolia*, *formosa*
laevis, *speciosa*, *mellifera*, *tenax*, *turbiniflora* et
longiflora, p. 658.

Erodium L'Her., Reiherschnabel.

affine Tenore (= *decipiens* Delil. = *gruinum* Tenor.
= *laciniatum* Guss.), ähnelnder, ☉. f. Neapel.

arabicum Decaisn. (= *Bowei* Delil.), arabischer, ☉. f.
Arabien.

asplenioides W. (= *muticum* L'Her. = *Geranium as-
plenioides* Dsf.), milzfarnähnlicher, 4. k. Nordafrika.

fumarioides Steven, erdrauchähnlicher, 4. f. Oestl. Caucas.

Jacquinianum H. Petropol. (= *hirtum* H. Par., non
W.), Jacquin's, ☉. ♂. f. k. ?

melanostigma Mart. (= *bipinnatum* Moris), schwarz-
narbiger, ☉. 4. f. Italien.

niveum Decaisn. (= ? *glaucophyllum* Bové), schneo-
weisser, ☉. f. Arabien.

petraeum W. (= *foetidum* L'Her.).

romanum W. (= *Geranium acaule* L. syst. = *G. pinna-
tifidum* Mch. = *G. romanum* L.), β) (*Geranium*) alpi-
num H. Par.

Salzmanni Delil. (= *viscosum* Salzm.).

sebaceum Delil., talgiger, ? ☉. f. Südfrankreich.

verbenaefolium Delil., eisenkrautblättriger, ☉. f. ? Süd-
frankreich.

viscosum Steud. (= *Geranium viscosum* Mill., non
Salzm.), schmieriger, ☉. f. ?

Erophilla DC., v. *Draba*, Sect. B., p. 274 u. 877.

Eruca elongata Baumg., v. *Erucastrum elongatum*.
Erucago campestris Desv. (= *dentata* Mch. =
glandulosa Roel. = *monspeliaca* J. St. Hil. =
runcinata Hornem.), v. *Bunias Erucago*, p. 138.

Erucaria G., Räupling.

hyrcanica DC., hyrcanischer, ☉. f. Nordpersien.
latifolia DC., breitblättriger, ☉. f. Aegypten, Syrien.
persica Hort., v. *Erucastrum incanum*, p. 312.

Erucastrum Schimp., Spenn., Rchb., K., Mauerrauke.

elongatum Ledeb., Rchb. (= *Brassica elongata* Ehrh.,
p. 130 = *B. nova* Winterl = *Eruca elongata* Baumg.
= *Güntheria elongata* Andrzy. = *Sinapis elongata*
Spach = *S. laevigata* Habl., Pall.), verlängerte, ♂.
4. f. Ungarn, Taurien, Caucasus.

Lamarckii Spenn. (= *obtusangulum* Rchb. = *Brassica*
Erucastrum L. = *Sinapis hispanica* Lam.).

Pollichii Schimp. et Spenn. (= *inodorum* Rchb. =
Brassica ochroleuca Soyer, Willem. = *B. Pollichii*
Schuttlew.).

obtusangulum Rchb. (= *Brassica obtusangula* Schuttlew.
= *Sisymbrium obtusangulum* Schleich.).

laevigata Presl, v. *Sinapis laevigata*, p. 760.

Hiernach zu ergänzen p. 312.

Ervilia sativa Lk., v. *Ervum Ervilia*.

Ervum T., Erve.

diphyllum Bess., zweiblättrige, ☉. f. ? Vollhynien.

Lenticula Schreb. (= *punctatum* Hort. = *soloniense*
Wulf. = *uniflorum* Tenor. = *Cicer ervoides* Brignol.
Cicer punctulatum Hort.).

nigricans MB. (= *sylvaticum* Fisch.).

pendulum Roth (= *dispermum* W.), überhängende, ☉.
Sch. f. Ostindien.

Tenorei Guss., Tenore's, ☉. Sch. f. Neapel.

parviflorum Bertol., v. *Vicia disperma*, p. 846.

Eryngium T., Mannstreu.

anomalum Hook., Arn., ungewöhnliche, ☉. f. Chili.

aquaticum L. (= *yuccaefolium* Mchx.).

Bonplandi Delarb. (= *Bonplandianum* H. B. K. =
microcephalum W.), Bonpland's, 4. k. Mexico.

caucasicum Fisch., caucasische, 4. f. Caucasus.

corniculatum Lam. (= *cornutum* Don = *odoratum* H.
Par. = *palustre* H. Madrit. = *suaveolens* Brouss.).

dichotomum Dsf. (= *coeruleum* MB. = *syriacum* Lam.).

dilatatum Lam. (= *amethystinum* Salzin. = *australe*
Wulf. = *Bourgati* Vahl, Host. (non Gouan) = *foe-*
tidum Forsk. = *purpuratum* Sm.).

flaccidum Hook., Arn., schlaffe, ☉. f. Bonaria.

giganteum MB. (= *asperrimum* Delarb. = *glaucum* W.).

glomeratum Lam. (= *parviflorum* Sibth., Sm.).

intermedium Weinm., mittlere, 4. Rufsland.

Oliverianum Delarb. (= *alpinum* γ Schott), Olivier's,
4. f. Orient.

pallescens Mill. (= *amethystinum* L. var. ?), bleiche,
Europa.

paniculatum Cav., rispige, 4. k. Chili.

tricuspidatum L. (= *Bocconi* Lam. = *Zanoni* Lam.).

tripartitum Dsf., dreitheilige, 4. f. ?

virens Lk., grünende, 4. f. Griechenland.

Zweifelhafte: *dubium* Tratt., *jamaicense* Hort., *laeve*
Brouss., *pentanthum* Lk.

Erysimum T. L., Hederich.I. *Cheirinia* Lk.

altaicum C. A. Mey., altaischer, 4. f. Altaisch. Sibirien.
bicolor DC. (= *Cheiranthus bicolor* Hornem.), zweifarbiger, ♂. f. Schweiz.

binerve C. A. Mey., zweinerviger, ♂. f. Asiat. Rußland.
Geyeri Rehb., Geyer's, ♂. f. ?

linariaefolium Tausch, leinkrautblättriger, ♀. f. b. Dalmatien.

Marschallianum Andrzy., Marschall's, ♂. f. Podolien, Sibirien.

sabulosum Fisch., sandliebender, ♂. f. Sibirien.

squarrosus Jan, sparriger, ♂. f. ? Südeuropa.

tenellum DC. (= *repandum* var. Spgl.), zarter, ☉. f. Orient.

Unbestimmtere: *brevirostre* Tausch, *chidopodum* Tausch, *cinereum* Mch. (= *canescens* Mch.), *integrifolium* Tenore, *longirostre* Tausch, *macranthum* Tausch, *micranthum* Buek., *patens* Hort., *patulum* Hornem., *Schaererianum* Wallr., *Schultesii* Schrad. (= *Cheiranthus quadrangulus* Schult.).

II. *Syrenia* Andrzy.

sessiliflorum RBr. (= *cornutum* P. = *quadrangulum* Dsf. = *Cheiranthus angulatus* Schult. = *C. cornutus* Lam. = *C. montanus* Pall. = *C. quadrangulus* L'Her. = *Cheirinia sessiliflora* Lk. = *Syrenia Lamarckii* Andrzy.)¹⁾.

III. *Conringia* Lk. (= *Coringia* P., DC.).

planisiliquum Fisch. et Mey., flachsotiger, ☉. Iberien (Tiflis).

β) *ochroleucum* Schrenk.

alpinum Roth, Baumg., v. *Arabis brassicaeformis*, p. 70, *polyceratum* Lk., *supinum* Lk., v. *Sisymbrium polyceratum* et *supinum*, p. 762, *tanacetifolium* Clairv., v. *Huegenia* (*Sisymbrium* Sect. III), *tanacetifolia*, p. 762.

Erythraea Ren., Rich., P., Tausendgüldenkraut.

Centaurium P. (= *Gentiana Centaurium* a L spec. = *Chironia Centaurium* W. = *Hippocentaurea Centaurium* Schult.), β) *grandiflora* Bivon., γ) *major* Lk., δ) *suffruticosa* Griseb.

chilensis P. (= *Cachanlahuan* R. et S. = *pallida* W. = *Chironia chilensis* W.).

latifolia Sm., β) *tenuiflora* Lk. (= *centauroides* Schrad. = *arenaria* Presl = *conferta* Steud. et Hochst.).

linarifolia P. (= *compressa* Hayne = *angustifolia* Wallr. = *paludosa* Schrad.), β) *humilis* Griseb. (= *littoralis* Sm. = *conferta* P. = *caespitosa* Lk. = *palustris* Schrad. = *Chironia pulchella* DC.), γ) *tenuifolia* Griseb. (= *uliginosa* W. K. = *triphyllo* Schm. *Chironia linarifolia* DC. = *Hippocentaurea uliginosa* Schult.).

maritima P. (= *Chironia maritima* W. = *Gentiana maritima* L.), β) *lutea* R. et S. (= *Chironia lutea* Bertol.).

Massoni Sw. (= *diffusa* Woods.).

1) *E. Perofskianum* Fisch. et Mey., p. 314, gehört nach Lilja auch zu dieser Abtheilung. Vielleicht auch *E. Schultesii* Schrad.

Erythraea

romosissima P. (= *pulchella* Hornem. = *inaperta* Schltl. = *Gerardi* Baumg. = *intermedia* Poll. = *Chironia inaperta* W. = *C. ramosissima* Ehrh. = *C. pulchella* Sm.), β) *pulchella* Fr. (= *Chironia pulchella* DC. = *Gentiana pulchella* Sw.), γ) *emarginata* Kit.

Zu ergänzen und zu berichtigen p. 314.

Erythrina L., Korallenbaum.

alba H. Cels., weißer, \mathfrak{h} . w. t. ?

Andersonii Hort., Anderson's, \mathfrak{h} . w. t. ?

Corallodendron L. (= *spinosa* Mill.).

fissa Presl, gespaltener, \mathfrak{h} . w. t. ?

laeta Dehnb., freudiger, \mathfrak{h} . w. t. ?

lithosperma Sweet, steinsaamiger, \mathfrak{h} . t. Neuholland.

marginata van Houtte, gerandeter, \mathfrak{h} . w. t. ?

mitis Jacq. (= ? *inermis* Mill.).

nana Bowie, Swt., zwergiger, \mathfrak{h} . t. Cap d. g. Hoffn.

poianthos Brot., rispighlumiger, \mathfrak{h} . w. t. Südamerika.

β) *subinermis* Bot. reg.

princeps A. Dietr., fürstlicher, \mathfrak{h} . t. Mexico.

rosea A. Dietr., rosafarbiger, \mathfrak{h} . t. Mexico.

arborescens Roxb., v. *Uraria Lagopus*, p. 830.

Erythrochiton N. E., Erythrochite, V. 1., Rutaceae.

brasiliense N. E., brasilianische, \mathfrak{h} . w. Brasilien.

Erythronium L., Hundszahn.

americanum Ker (= *aquatile* Salisb. = *flavum* Sm.

= *aureum* Lk. = *luteum* Hort. = *angustatum* Rafin.

= *Dens-canis* var. Mchx. = *lanceolatum* Pursh),

amerikanischer, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

Dens-canis L., γ) *sibiricum* Fisch. et Mey.

grandiflorum Pursh, α) *minor* Kunth, β) *giganteum*

Lindl., Kunth, γ) *albiflorum* Kunth.

Nuttallianum R. et S. (= *lanceolatum* Schweinitz, non

Pursh), Nuttall's, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

revolutum Sm. (= *grandiflorum* δ *Smithii* Kunth), zu-

rückgerollter, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

Erythropsis Lindl., Roth-Sterculie, XXI. x. (XVI. VII.), Sterculiaceae.

Roxburghiana Schott, Endl. (= *Sterculia colorata* Roxb., p. 787), Roxburgh's, \mathfrak{h} . w. Ostindien.

Erythrostemon Gilliesii Lk., Kl., Otto, v. *Poinciana Gilliesii*, p. 639.

Erythrostictus Schltl., Rothmelanthie, VI. III., Melanthaceae.

gramineus Schltl. (= *Melanthium angustifolium* W. = *M. gramineum* Cav., p. 505).

punctatus Schltl. (= *Melanthium punctatum* Cav.),

punktirte, 4. Zw. k. Nordafrika.

Erythroxylon L., Rothholz.

? *americanum* Hort., amerikanisches, \mathfrak{h} . w. Südamerika.

Escallonia Mutis, Escallonie.

Cunningii H. Cels., Cuming's, \mathfrak{h} . t. Südamerika.

Grahamiana Gill. (= *glandulosa* Sweet¹), Graham's, \mathfrak{h} . k. f. b. Chili.

rubra P. (= *glandulosa* Lodd. = *Stereoxylo rubrum* R. et S.). β) *albiflora*.

rubricaulis Colla, rothstengelige, \mathfrak{h} . t. k. Chili.

1) Nicht Sm. wie p. 316 steht, daher daselbst zu berichtigen.

Escallonia

- Sellowiana DC. (= *resinosa* var. *dodonaeifolia* Cham., Schltl.), Sellow's, ⚥. t. Brasilien.
 spectabilis H. Monac. (= *glandulosa* Hort. ? Lodd.),
 ansehnliche, ⚥. t. Südamerika.

Eschscholtzia Chamiss., Eschscholtzie.

- caespitosa Benth. (= *Chryseis caespitosa* Lindl.), rasenartige, ♂. 4. f. Californien.
 californica Chamiss. (= *crocea* Benth. = *Chryseis crocea* Lindl. = *Chelidonium multifidum* Moç. Sess.).
 compacta Steud., Walp. (= *Chryseis compacta* Lindl.).
 Douglasii Hook. et Arn. (= *californica* Lindl. = *Chryseis californica* Lindl. = *C. Douglasii* Torr. et Gr.), Douglas's, ♂. f. Nordamerika (Oregongebiet).
 Ob *E. hypocoides* Benth. et *tenuifolia* Benth., beide in Californien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

fumariaefolia Hort., v. *Huonemania fumariaefolia*, p. 405.

Ethulia L., Cass., Ethulie.

- conyzoides L. (= *Vernonia formosa* Hort. Patav.).
 corymbosa H. Berol. (= *Conyza scabrida* H. Berol.), traubendoldige, ♂. f. Cap d. g. Hoffn.
 eupatorioides H. Erfur., Walddostähnliche, ♂. f. ?
 gracilis Delile, schlanke, ♂. f. Nordafrika, Senaar.

divaricata L. et *divaricata* Wall., v. *Epaltes divaricata* et *linearifolia*, p. 222, II., *glomerata* Sngl., *paniculata* Schkr., v. *Dichrocephala latifolia* et *sonchifolia*, p. 262, *repanda* N. E., v. *Cephalophora glauca*, p. 180, *sparganophora* L., v. *Sparganophorus Vaillantii*, p. 774.

Eucalyptus L'Herit., Schönmütze.

- alata Hort. angl., geflügelte, ⚥. k. t. Neuholland.
 albicaulis Hort. angl., weisstengelige, ⚥. k. t. Neuholl.
 ambigua DC., zweifelhafte, ⚥. k. t. Neuholland.
 amygdalina LaBill. (= ? *globularis* Hort.).
 biglandulosa H. Cels., zweidrüsige, ⚥. k. t. Neuholland.
 calophylla Lindl. (= *splachnocarpa* Hook.), schönblättrige, ⚥. k. t. Neuholland (Schwanenflufs).
 capitellata Sm. (= *triantha* Lk. = *Metrosideros coriacea* Salisb.).
 decipiens Endl., täuschende, ⚥. k. t. Neuholland.
 diversifolia Bonpl. (= ? *connata* Dum. Cours. = ? *perita* H. Berol.), verschiedenblättrige, ⚥. k. t. Neuh.
 elata Dehnh., hohe, ⚥. k. t. Neuholland.
 floribunda Hügel, blüthenreiche, ⚥. k. t. Neuholland.
 glandulosa Dsf. (= ? *tuberculata* Otto), drüsige, ⚥. k. t. Neuholland.
 glauca DC. (= *perfoliata* Nois. = *pulverulenta* Lk.), blaugrüne, ⚥. k. t. Neuholland.
 ligustrina DC. (= ? *salicifolia* Cav.), ligusterblättrige, ⚥. k. t. Neuholland.
 Lindleyana DC. (= *longifolia* Lindl.).
 linearis Dehnh., gleichbreite, ⚥. k. t. Neuholland.
 longifolia Lk. (= *glaucophylla* Hfg. = *multiflora* Poir.), langblättrige, ⚥. k. t. Neuholland.
 macrocarpa Hook., großfrüchtige, ⚥. k. t. Neuholland.
 microphylla W., kleinblättrige, ⚥. k. t. Neuholland.
 occidentalis Endl., westliche, ⚥. k. t. Westl. Neuholland.
 pendula Page, überhängende, ⚥. k. t. Neuholland.

Eucalyptus

perfoliata Dsf. (non Nois.), durchwachsene, f. k. t. Neuh.
persicifolia Lodd., β) *incrassata* Sieb. (= *multiflora* Poir.).
populifolia Dsf., pappelblättrige, f. k. t. Neuholland.
procera Dehnh., erhabene, f. k. t. Neuholland.
pulchella Dsf. et ? Lodd.

pulverulenta Sims (non Lk.) (= *cordata* H. Berol Lodd.),
 bestäubte, f. t. k. Neuholland.

purpurascens Lk. (= *discolor* Dsf.), β) *oppositifolia* Dsf.

radiata Sbr., strahlige, f. k. t. Neuholland.

rigida Hffg., starre, f. k. t. Neuholland.

robusta Sm, β) *rostrata* Cav.

rubricaulis Dsf., rothstengelige, f. k. t. Neuholland.

rudis Endl., rauhe, f. k. t. Neuholland.

salicifolia Cav., weidenblättrige, f. k. t. Neuholland.

saligna Sm. (= *angustifolia* Lk.).

scabra Dum. Cours., (= *eugenioides* Sbr. = *penicillata* Hort.).

serratifolia Dum. Cours., sägezahnblättrige, f. k. t.
 Neuholland.

tuberculata Otto, kleinhöckerige, f. k. t. Neuholland.

turbinata Page, aufgetriebene, f. k. t. Neuholland.

umbellata Dum. Cours., doldige, f. k. t. Neuholland.

undulata Hort. Lond., Page, wellenblättrige, f. k. t.
 Neuholland.

verrucosa H. Lond., warzige, f. k. t. Neuholland.

Unbestimmtere: Mahoni H. Cels. ¹⁾.

hirsuta Lk., v. *Angophora cordifolia*, p. 869.

Eucapnos eximius et formosus Bernh., v. *Dielytra*
eximia et formosa, p. 263.

Eucharidium Fisch. et Mey., Schönkerze.

grandiflorum Fisch. et Mey., großblumige, \odot . f. Neu-
 californien.

Euchilus RBr., Euchilus.

linearis Benth., gleichbreiter, f. t. Neuholland.

Euchiton Forsteri Cass. (= *pulchellus* Cass.), v.
Gnaphalium involucratum, p. 362.

Euchroma coccinea et grandiflora Nutt., v. *Castilleja*
coccinea et grandiflora, p. 125, II.

Euclea L., *Euclea*, XXII. x. (XI. II.), Sapotaceae-
 Ebenaceae.

elliptica DC. (= *Royena polyandra* L. fil., Thbg., p.
 701 = *Diplonema elliptica* G. Don), elliptische, f. k.
 Cap der guten Hoffnung.

β) *ambigua* (= *Royena ambigua* Vent. = *Diplonema ambigua* G. Don).

Eucliandra microphylla Zuccar., *parviflora* Zuccar.,
thymifolia Zuccar., v. *Fuchsia* (Sect.) *microphylla*,
parviflora et thymifolia, p. 340.

Eucnide Zuccar., *Eucnide*, XVI. VIII., Loasaceae.

bartonioides Zuccar., bartonienähnliche, \odot . m. f. Mexico.

Eucomis L'Her., Schopflilie.

punctata L'Her., β) *striata* Don Hort. Cantabr.

Eudianthe Rchb., *coeli rosa* Fenzl, *oculata* (Lindl.),
 v. *Lychnis coeli rosa* etc., p. 482.

¹⁾ Ein Theil der p. 317 als „Unbestimmtere“ verzeichneten
 Arten, sind hier berichtigend wiederum aufgeführt worden.

Eugenia Michel., Eugenie.

acris Wight et Arnott (= *Caryophyllus racemosus* Mill. = *Eugenia Pimenta* β *ovalifolia* DC. = *Myrcia acris* DC., p. 537 = *M. pimentoides* DC. = *Myrtus acris* Sw. = *M. aromatica* Poir. = *M. caryophyllata* Jacq. = *M. Pimenta* var. *latifolia* Roxb.).

Berberiana DC. (= *australis* Colla = *Myrtus Berberiana* Spgl.), Bertero's, $\frac{1}{2}$ w. Sudamerika.

bracteosa DC. (= ? *bracteata* Arrabida), deckblätterige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

brasiliensis Lam. (= *bracteolaris* Lam. = *Myrtus Dombeyi* Spgl.), brasilianische, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

citrifolia Poir. (= *Myrtus cayennensis* Spgl. = *M. Pimenta* L. var. Spgl.), citronenblätterige, $\frac{1}{2}$ w. Cayenne.

disticha DC. (= *Myrtus disticha* Sw. = *Olynthia disticha* Lindl., p. 557).

fragrans W. (= ? *montana* Aubl. = *paniculata* Jacq. = *Myrtus fragrans* Sw.).

Lindleyana DC. (= *Myrtus Lindleyana* H. B. K.), Lindley's, $\frac{1}{2}$ w. Mittägl. Amerika.

Pimenta DC. (= *Myrtus Pimenta* L. = *Pimenta vulgaris* Lindl.), Pimenta-E., $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

pseudocaryophyllus DC. (= *Myrtus Oleaster* Mart. = *M. pseudocaryophyllus* Gomez), gewürznelkenähnliche, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

In den Verzeichnissen der belgischen Gärten werden noch *E. albinervia* et *Berberiana* erwähnt.

elliptica Sm., v. *Acmena floribunda* β p. 13, *javonica* Lam., v. *Jambosa laurifolia*, *Mini* Aubl., v. *Myrcia Mini*, *obovata* Poir., *obsusifolia* Roxb., v. *Syzygium obovatum* et *Jambolanum*, *pseudomulacensis* H. Par., v. *Jambosa purpurascens*.

Fulophia RBr., Kammstendel.

pulchra Lindl. (= *Limodorum pulchrum* P. Th.), schöner, 4. Kn. w. Mascarenas.

viridiflora Steud. (= *virens* Bot. reg. non Spgl.), grünblumiger, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

cochlearis Steud., *crinita* Loud., *Mackai* Lindl., *maxillaris* Loud., *Murrayana* Steud., *rostrata* Steud., *stenochila* Steud., v. *Zygopetalum cochleare* etc., p. 865, *gracilis* Lindl., v. *Galeandra gracilis*.

Eumorpha elegans Eckl., Zeyh., *grandiflora* Eckl., Zeyh., *laevigata* Eckl., Zeyh., *nobilis* Eckl., Zeyh., *tabulare* Eckl., Zeyh., *variegata* Eckl., Zeyh., v. *Pelargonium elegans* etc., p. 595.

Eupatorium T., Walddost.

Sect. I. Genuin.

Bartlingianum Steud. (= *australe* Bartl., non Thbg.), Bartling's, $\frac{1}{2}$ t. k. Chili.

biceps Hort., zweiköpfiger, $\frac{1}{2}$ t. k. ?

deltoides Jacq. (= *triangulare* Moç, Sess.).

dubium Poir. (= *maculatum* Hort. = *punctatum* W., non Lam.), zweifelhafter, 4. f. Nordamerika.

Engelmannianum H. Berol., Engelmann's, 4. f. Nordamerika

glabellum H. Berol., wenigkahler, 4. k. Mexico.

Milleri Steud. (= *punctatum* Mill.), Miller's, $\frac{1}{2}$ w. Vera Cruz.

mysotifolium Jacq., mausöhrchenblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

Eupatorium

occidentale Hook., westlicher, 4. f. Westl. Nordamerika.
omphaliaefolium Kunth et Bouché, omphaliablätteriger,
 ♀. k. t. Mexico.

paniculatum Schrad. (= *microstemon* Cass.).

perfoliatum L. Auct. (= *connatum* Mchx.).

pinnatifidum Ell., fiederspaltiger, 4. f. b. k. Carolina.

punctatum Lam. (non W.), punktirtiger, ♀. w. Westindien.

purpureum L. spec. (? = *laevigatum* Poir. = *verticillatum* Lam., non Mühlb.). Nach Walpers gehören als Variet. hierher: *E. maculatum* L., *dubium* Poir. (= *punctatum* W.) u. *verticillatum* Mühlbg., W. (= *amoenum* Pursh).

resinosum Torr., harziger, 4. f. Nordamerika.

triplinerve Vahl (= *Ayapana* Vent), dreinerviger, ♀. w. Caribäen, Brasilien.

truncatum Mühlbg., W. (= *perfoliatum* L. var. = *salviaefolium* Bot. mag., non H. B. K.).

variifolium Bartl., verschiedenblätteriger, 4. f. Nordam.

verticillatum Mühlbg. (= ? *fuscobrum* Walt. = *purpureum* Mchx., non L.), wirtelblätteriger, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *affine* Wender., *pumilum* Wender., *ramosum* Mill. Maryland.

II. *Bulbostylis* DC.

squarrosum Cav. (= *B. Cavanillesii* DC. = *Coleosanthus Cavanillesii* Cass.).

veronicaefolium H. B. K. (= *glechomaefolium* Moç.) ¹⁾.

E. Dalea L., *parviflorum* Sw. (= *Dalea* Hort.),

v. *Critonia Dalea* et *parviflora*, p. 170, II.

Euphorbia L., Wolfsmilch.

agraria MB. (= *nitens* Trevir.).

Anacantha Ait. (= *tridentata* Lam. = *Dactylanthus tridentata* Haw.).

androsaemifolia Steud. (non Schousb. nec Presl) (= *palustris* L. var. Braun = *Galarrhoeus androsaemifolius* Haw.), blutheilblätterige, 4 f. Ungarn.

antisyphilitica Zucc., syphilisheilende, ♀. t. Mexico.

ariensis H. B. K., ariensische, 4. w. t. Neuspanien.

arvensis W. K., Acker-W., ☉. f. Ungarn.

Baselices Tenore, Baselicische-W., ♀. k. f. Italien.

Bivonae Steud. (= *fruticosa* Bivon.), Bivone's, ♀. k. Unteritalien.

Bonplandii Sweet (= *marginata* H. B. K., non Pursh), Bonpland's, 4. w. t. Neuspanien.

caespitosa Guss., Tenore, rasenartige, 4. f. b. k. Unteritalien.

Characias L., β) *melapetala* Gasparini.

Clava Jacq. (= *canaliculata* Lam.).

clusiaefolia Hook., clusiablätterige, ♀. t. Sandwichinseln.

coerulescens Haw., bläuliche, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

coscosperma Rchb., (= *ragusana* Auct.), löchersaamige, 4. f. Italien, Dalmatien.

cotinifolia L. (= *Tithymalus cotinifolius* Haw.), perückenbaumblätterige, ♀. w. Surinam.

decumbens W. (= *procumbens* DC., non Mill.).

dendroides L. (= *laeta* Ait. = ? *divaricata* Jacq.)

1) p. 320 beide schon aufgenommen, aber fälschlich unter Sect. I. gestellt, daher hier berichtet.

Euphorbia

- diversifolia* P. (= *heterophylla* Dsf. = *marginata* Hort. = *taurinensis* All. = *valentina* W.).
echinata Salm Dyck, stachelige, ♀. t. ?
Ehrenbergii Sweet (= *heterophylla* Ehbg.), Ehrenberg's, ☉. f. Aegypten.
eriocarpa Bertol., wollfrüchtige, ♀. f. Italien.
Esula L., β) *racemosa* Tausch, γ) *mosana* Lejeun.
filicina Portenschl. (= *pilosa* var. Roch.), farnähnliche, ♀. f. Dalmatien.
flavicomma DC. (= *carniolica* DC., non Jacq. = *flavissima* DC. H. monspel.), gelbschopfige, ♀. f. Frankreich.
Fontanesii Steud. (= *dentata* Dsf., non Mchx.), Desfontaine's, ☉. f. ?
Fructus pini Mill. (= *Commelyni* DC.).
guineensis Brot., guineische, ? ♀. w. Guinea.
Hystrix Jacq. (= *loricata* Lam.).
incompta Cesati, ungezierte, ? ♀. f. Italien.
isatidifolia Lam. (= *androsaemifolia* Schousb. = *Isatis* P.), waidblättrige, ♀. k. Spanien, Portugal.
Kunzei Lehm., Aegypten.
latifolia C. A. Mey., breitblättrige, ♀. f. Sibirien, Caucasus.
Martiusiana Steud. (= *Kunzii* Mart., non Lehm.), Martius's, ♀. w. Brasilien.
Neumanniana H. Cels, Neumann's, ♀. w. ? Südamerika.
nicaensis All. (= *Barrelieri* Savi = *oleaefolia* Gouan = *pulverulenta* Kit. = *serotina* Host.).
octogona H. Cels., achtkantige, ♀. t. ?
paniculata Dsf., rispige, ♀. f. Nordafrika.
praecox Fisch. (= *longifolia* Güldenst. = *temifolia* MB.), frühe, ♀. f. Taurien.
Preslii Gussone (= *maculata* L. mant. = *androsaemifolia* Presl, non Steud. = *hypericifolia* Jan, non L. = *trinervis* Bertol., non *trinervia* Boiss.), Presl's, ☉. f. Sicilien.
procumbens Mill. (non DC.) (= *Caput medusae* W. γ = *Medusea procumbens* Haw.), niederliegende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
provincialis W. (= ? *italica* Lam.), Provence-W., ☉. f. Südfrankreich.
Pseudo-Chamaesyce Fisch. et Mey. (= *Chamaesyce* Ledeb.), unächtgrauliche, ☉. f. Mittägl. Sibirien, Mongolei.
pulcherrima Karwinsk. (non W.) (= *fastuosa* Hort.), β) *lutescens* (= *lutea*) Hort.
rigida MB. (= *biglandulosa* Dsf., non W.).
serpens H. B. K. (= *humifusa* et *begoniaefolia* Hort.).
serrata L., sägezahnige, ☉. f. Spanien, Frankreich.
spongiosa Ledeb., schwammige, ♀. t. ?
stellata W., sternförmige, ♀. t. Südafrika.
subcordata C. A. Mey., fastherzförmige, ♀. f. Sibirien.
triangularis Dsf., dreiwinkelige, ♀. t. ? Cap d. g. Hoffn.
trigonocarpa Fisch, dreikantigfrüchtige, ♀. f. Südrussland.
uncinata DC. (= *procumbens* Meerb., non Mill. = *Scolopendria* Haw.).
valentina Ortega (non Auct.), valentianische, ♀. f. Spanien.
 Unbestimmtere: *adenophylla* Hort., *densifolia* Hort., *echinocarpa* Brotero (non Sbr.), *Mönchiana* Steud. (= *Tithymalus glaucus* Mch.), *sanguinea* Hort., *virginica* Hort.)
pulcherima W. (non Karw.) (= *Poinsettia* Buist.), v. *Poinsettia pulcherrima*, p. 640.

Euphrasia T., Augentrost.

azorica Wats., azorischer, ☉. f. Azoren.

gracilis Fries, schlanker, ☉. f. Schweden.

Euphrosyne DC., Euphrosyne, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae (Senecionideae).

parthenifolia DC. (= *Gymnostyles parthenifolia* Moç., Sess.), mutterkrautblättrige, ☉. f. Mexico.

xanthiifolia H. Prag. = ? *Cyclachaena xanthiifolia*, p. 241.

Eurotia Adans., Eurotia, XXI. iv., Aizoideae - Atripliceae (Chenopodeae).

ceratoides C. A. Mey., Moq., Tand. (= *Ceratosperrum papposum* P. = *Diotis ceratoides* L., p. 267 = *Krascheninikowia ceratoides* Gült.).

ferruginea (N. E.) (*Diotis*, p. 204, II).

Eurycles Salisb., Eurycles.

australasica G. Don (= *alata* Sweet = *australis* Schult. fil. = *Pancreatium australasicum* Bot. reg.).

nervosa G. Don (= *nuda* Sweet. = *Crinum nervosum* Roxb.).

sylvestris Salisb. (= *amboinensis* Loud. = *coronata* Sweet = *Pancreatium amboinense* L.). Vergl. p. 326.

Euryomyrtus Schauer, Aftermyrte, VIII. (x.) 1., Myrtaceae.

diffusa Schauer (= *Baeckea affinis* Hook. = *B. prostrata* Hook. = *diffusa* Sieb.), weitschweifige, ♀. t. Neuholl.

thymifolia Schauer (= *Baeckea thymifolia* Hook.), thymianblättrige, ♀. t. Neuholland.

Euryops Cass., Euryops.

abrotanifolius DC. (= *comosus* Cass.).

linifolius DC. (= *Agathaea linifolia* G. Don, p. 22 = *Cineraria linifolia* L.),

tenuissimus Less. (= *carosus* Cass. = *Othonna linifolia* Burm. = *O. speciosa* Hort. = *O. tenuissima* L.).

virginicus DC. (= *flabelliformis* Cass. = *Othonna flabellifolia* Lodd. = *O. virginica* L.), jungfräulicher, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Eurystylus P. C. Bouché, v. Canna, Sect. I., p. 115, II.**Eustachys** Desv., Schönähre.

polystachya Kunth (= *Chloris polystachya* Lagasc., non Roxb. = *C. inermis* Trin.), vielstrahlige, 4. k. t. Mexico.

Eustoma G. Don, Griseb. in DC. prodr., Schönmund.

chironioides Griseb. (= *Urananthus chironioides* Benth.), chironienähnlicher, 4. t. k. Mexico.

exaltatum Griseb. (= *silenifolium* G. Don = *Gentiana exaltata* Juss. = *G. connata* W. herb. = *Lisianthus exaltatus* Lam. = *L. glaucifolius* Jacq., p. 469 = *Erythraea Plumieri* Kunth = *Chlora exaltata* Griseb., p. 139, II. = *Urananthus glaucifolius* Benth.).

Russelianum G. Don (= *Lisianthus glaucifolius* Nutt., non Jacq. = *L. Russelianus* Hook., p. 496 = *Urananthus Russelianus* Benth.).

Eutacta Salisb., Säulentanne, XXII. XIII., Coniferae.

excelsa Lk. Abiet., Endl. H. Vindob. (= *Eutassa heterophylla* Salisb. = *Araucaria excelsa* RBr., p. 72 = *Dombeya excelsa* Lamb. = *Colymbea excelsa* Spgl. = *Alingia excelsa* Loud.).

Eutacta

Cunninghamii Lk., Endl. (= *Araucaria Cunninghamii* Ait., p. 72 = *Altingia Cunninghamii* Loud.) ¹⁾.

Eutaxia RBr., Hülseneihe.

floribunda H. belg., blüthenreiche, ⚥. t. Neuholland.

parvifolia Benth., kleinblättrige, ⚥. t. Neuholland.

virgata Benth., ruthenförmige, ⚥. t. Neuholland.

Außerdem wird in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch *E. stricta* erwähnt.

pungens Sweet = *Dillwynia pungens*, p. 203, II.

Euterpe G., Jissarapalme.

edulis Mart., genießbare, ⚥. w. Brasilien.

globosa G. (= *Areca rubra* Hort.).

caribaea Spgl., v. *Oreodoxa oleracea*.

Euthales RBr., Euthales.

macrophylla Lindl., großblättrige, 4. t. Neuholland.

Eutoca RBr., Eutoca.

divaricata Benth., β) *Wrangeliana* Fisch. et Mey., A. DC.

Douglasii Benth., Douglas's, ⊙. f. Californien.

loasaefolia Benth., loasablättrige, ⊙. f. Californien.

Menziesii RBr. (= *Hydrophyllum lineare* Pursh), Menzies's, ⊙. f. Californien, Oregongebiet.

α) *multiflora* Lehm., Dougl. (= *Menziesii* Hook.

bot. mag.), β) *congesta* Lehm. (= *echioides* et *glomerata* Dougl.).

phacelioides Benth., phacelienähnliche, ⊙. f. Californien.

sericea Grah. (= *pulchella* Lehm.).

grandiflora Benth., *mexicana* Benth., *parviflora* RBr.;

viscida Benth. (= *viscosa* Hook.), v. *Cosmanthus*

grandiflorus etc., p. 162, II.

Eutriana curtispindula Trin., v. *Atheropogon apludoides*, p. 105.

Euxenia grata Chamisso (= *Baccharis chilensis* Weinm.).

Euzomum erucoides Spach, v. *Diplotaxis erucoides*,

p. 268, *hesperidiflorum* Spach, v. *Moricandia hesperidiflora*,

p. 531, *sativum* Lk., v. *Eruca sativa*, p. 312.

Evax G., Evax, XIX. iv., Compositae-Helichryseae.

asterisciflora P. (= *Gnaphalium asterisciflorum* Lam.), sternblumige, ⊙. f. Südeuropa, Orient.

Heldreichii Parlatores, Heldreich's, ⊙. f. Sicilien.

pygmaea P. (= *umbellata* G. = *Filago acaulis* All. =

F. pygmaea L. = *Gnaphalium pygmaeum* Lam. =

Micropus pygmaeus Dsf., p. 523).

Evodia Forst., Evodia.

hortensis Forst. (= *Fagara Evodia* L. fil.), Garten-E., ⚥. ⚥. w. Hebriden.

triphylla DC., v. *Xanthoxylum Lamareckianum* et *Roxburghianum*.

Evolvulus L., Faltenblume.

argenteus Pursh (= *Nuttallianus* R. et S.), silberfarbige, ⊙. 4. f. Nordamerika.

gypsophiloides Moric. (= *ericaefolius* Schrank), gypskrautblättrige, 4. ⚥. w. Brasilien.

holosericeus H. B. K. (= *distichophyllus* Mart.), sammethaarige, 4. w. Südamerika.

1) *Araucaria Bidwillii* Hook., p. 41, II. gehört auch zu dieser Gattung, daher *E. Bidwillii* *.

Evolvulus

- incanus* P. (= *virgatus* W., non Chois. = *cuspidatus* H. B. K. = *cressoides* Mart. = *Nama sericea* W.).
linifolius L. (= *fugacissimus* Hochst. = *debilis* H. B. K. = *decumbens* RBr. = ? *javanicus* Blum. = *Convolvulus linifolius* Br., L. = *C. fugacissimus* Hochst.), leinblättrige, 4. k. Neuholl., Afrika, mittägl. Amerika.
nummularius L. (= *veronicaefolius* H. B. K. = *capreolatus* Mart.).
sericeus Sw. (= *Commersonii* R. et S. = *angustissimus* H. B. K. = *Convolvulus minimus* Vitm.).
emarginatus Burm. (= *gangeticus* L.), v. *Ipomoea reniformis*.

Evonymus T., Spindelbaum.

- bullatus* Wall., blasiger, 5. k. Nepal.
chinensis Lindl. (nec Lour.), chinesischer, 5. k. f. b. China.
europaeus L., d) *pumilus* Loud.
fibrilliflorus Fisch. et Mey., faserblumiger, 5. f. Talysch.
fimbriatus Wall., gefranzter, 5. k. t. Nepal, Ostindien.
nepalensis Hort. anglor., nepalscher, 5. k. f. b. Nepal.
tingens Wall., färbender, 5. t. Ostindien.
Colpoon Lam. (non L.), v. *Fusanus compressus*, p. 341, *grandiflorus* Wall., *lucidus* D. Don, v. *Lophopetalum grandiflorum* et *lucidum*.
Evosma radicans van Houtte Cat. = ? *Loganiae* spec.
Evosmus aestivalis Nutt., *Benzoin* Nutt., *Diospyros* Nutt., v. *Benzoin aestivalis*, odoriferum et *melissae-folium*, p. 65, II., *albida* Nutt., *Sassafras* Nutt., v. *Sassafras albidum* et officinale.

Exacum L., Bitterblatt.

- bicolor* Roxb., zweifarbiges, ☉. w. Ostindien.
zeylanicum Roxb. (= *Chironia trinervis* L. = *Lisianthus zeylanicus* Speg.), zeylonisches, ☉. w. Ceylon.
Candollei Bast. (= *glaucum* Bast.) et *pusillum* DC., v. *Cicendia Candollei* et *pusilla*, p. 143, II., *cordatum* L. suppl., v. *Belmontia cordata*, p. 64, II., *filiforme* W., v. *Microcalis filiformis*, p. 523, *viscosum* Sm., v. *Ixanthus viscosus*, — *pulchellum* Pursh (= *Sabbatia pulchella* Speg. = *Microcale pulchellum* G. Don) = *Cicendia* ? *pulchella* Griseb., ist nach Grisebach eine nicht hinlänglich bekannte Art.

Exogonium Choisy, Afterwinde, V. r., Convolvulaceae.

- filiforme* Choisy (= *Convolvulus filiformis* Desr. = *Ipomoea filiformis* Jacq., p. 419).
pedatum Choisy (= *Ipomoea pedata* Poit.), fußförmige, 4. 5. Sch. w. St. Domingo.
repandum Choisy (= *Convolvulus repandus* Desr. = *Ipomoea repanda* Jacq., p. 420), ausgeschweifte, 4. 5. Sch. w. Westindien.
curviflorum Moç. et *umbellatum* Moç., v. *Quamoclit hедераefolia* et *vitifolia*, *dumosum* Benth. (= *Purga* Benth.), v. *Ipomoea Purga*, p. 420.
Eyselia bellidiflora Rehb., v. *Egletes bellidiflora*, p. 283.

Fabiana R. et P., Solanaceae. Zu berichtigen p. 329.**Fabricia** G., Fabricie.

- ? *glauca* van Houtte, blaugrüne, 5. k. t. Neuholland.
argentea Hort. (= *incana* Dum Cours. = *sericea*

Nois., Sweet = *minor* Hort.), v. *Leptospermum tonsum*, *myrtifolia* Hort. (non G.) et *angustifolia* Otto, v. *Billiotia marginata* et β *angustifolia*, p. 70, II. *Facchinia lanceolata* Rchb., v. *Alsine lanceolata*, p. 39. *Fagara microphylla* Dsf., v. *Xanthoxylon tragodes* β .

Fagraea Thbg., *Fagraea*.

diversifolia van Houtte, verschiedenblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

oblonga van Houtte, längliche, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

Fagus T. Buche.

americana Sweet (= *sylvatica* β *americana* P.), amerikanische, f. Nordamerika.

betuloides Mirb. (= *Betula antarctica* Forst.).

ferruginea Ait. (= *grandifolia* Hort. = *latifolia* L'Her. = *purpurea* Dsf. = *americana latifolia* DuRoi).

sylvatica L., e) *heterophylla* Loud. (= *comptoniaefolia* Dsf.).

Falcaria Dill., Host, Sichelholde.

dahurica DC. (= *Cicuta dahurica* Fisch., p. 195 = *Critamus dahuricus* Hoffm. = *Sium cicutaefolium* Gmel. syst. = *S. latifolium* β MB.).

Rivini Host. (= *Sium Falcaria* L. = *Critamus agrestis* Bess. = *Drepanophyllum agreste* Hoffm.).

Faldermannia Bunge, Faldermannie, II. 1. (XIV. 1.), Labiatae.

parviflora Schrenk, C. A. Mey. (= *Ziziphora tenuior* Flor. altaic., excl. Synon.), kleinblumige, \odot . f. Iberien, Soongarien.

taurica Bunge (= *Ziziphora taurica* MB., p. 864 = *Thymbra spicata* Pall.).

Falimiria bromoides Bess., (= *coarctata* Bess. = *Arthrostachya coarctata* Lk., p. 85), v. *Gaudinia geminiflora*.

Faramea Aubl., *Faramea* V. 1., Rubiaceae.

odoratissima DC. (= *Coffea occidentalis* L. = *Ixora americana* L. = *Tetramerium occidentale* N. E., Mart. = *T. odoratissimum* G. fil., p. 802).

Farnesia odora Gaspar., v. *Vachelia Farnesiana*.

Farobaea nemorensis Schrank et *tropica* Schrk. = ??

Farsetia Turra, *Farsetia*.

triquetra DC. (= *Alyssum triquetrum* Portenschl.), dreikantige, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Dalmatien.

Favonium spinosum G., v. *Didelta spinosum*, p. 262.

Fedia Mch., *Fedia*.

Cornucopiae Vahl (= *graeca* Dufr. = *incrassata* Mch. ? = *pulchella* Hort.).

graciliflora Fisch. et Mey. (= *algerica* Hort.), schlankblumige, \odot . f. Nordafrika, Sardinien.

orientalis Schltld., morgenländische, \odot . f. Aleppo.

paniculata Colla, rispige, \odot . f. ??

scorpioides Dufresn., vergiftmeinnichtähnliche, \odot . f. Nordafrika.

intermedia Hornem., *rupestris* Vahl, *ruthenica* Mirb. (= *sibirica* G.), v. *Patrinia intermedia*, *rupestris*, *sibirica*, p. 591.

Felicia Cass., v. *Aster*, Sect. VIII., p. 99 et 51, II.,

F. Fontanesii Cass., v. *Nolletia chrysocomoides*.

Fenzlia dianthiflora Benth., v. *Gilia*, Sect. V.

Fernandezia R. et P., *Fernandezie*.

lunifera van Houtte Catal., mondformige, $\frac{1}{2}$. w. Südamer.

Ferraria L., Ferrarie.

Ferrariola Thbg. (= *antherosa* Ker = *minor* P. = *viridiflora* Andr. = *Moraea Ferrariola* Jacq.).
 major Eckl., grofse, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.
 purgans Mart., purgirende, 4. Zw. w. Brasilien.
pusilla Lk., Otto, v. *Herbertia pusilla*.

Ferula T., Steckenkraut.

caspicum MB. (= *pumila* W. = *Peucedanum gracile* a Ledeb. = *P. caspicum* Lk. = *P. dubium* Ledeb.).
desertorum Ledeb., Wüsten-St., 4. f. Sibirien.
geniculata Guss. (= *rigida* Tenor. = *Bubon rigidus* Ucria), gegliedertes, 4. f. b. Sicilien, Neapel.
gigantea Hornem., riesenhaftes, 4. f. ?
rigidula β songarica Schrenk. et H. Petropolit., starres, 4. f. Soongaria.
Szowitsiana DC., Szowits's, 4. f. b. Persien.

Ungewifs: *verticillata* Maerkl.

Barrelieri Tenor. = *nodiflora* s. *sulcata* Dsf. — *meoides* L., v. *Lophosciadium millefolium*, *obtusifolia* Spgl., v. *Pastinaca obtusifolia*, *sibirica* Spgl., v. *Peucedanum sibiricum*, *racemifera* Szowits, v. *Dorema glabrum*, p. 272.

Ferulago *nodiflora* K., *sylvatica* K., *thyrsiflora* K., v. *Ferula nodiflora* etc., p. 330 et 331.**Festuca** L., Schwingel.

binodosa Kl., zweiknotiger, 4. f. Nordamerika.
ferruginea Rchb. (= *Schedonorus ferrugineus* Vest.), rostfarbiger, 4. f. Kärnthen.
flavescens Bellardi (= *Bellardi* Schott = *dimorpha* Gussone).

Hemipoa Delile, rispengrasähnlicher, 4. f. Südfrankreich.
scabra Vahl (= *aspera* Poir.), scharfer, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Zu den zweifelhaften gehören noch: *macrostachya* Dsf., *Urii* H. Edinb. Was die übrigen anlangt, die allenfalls in botanischen Gärten kultivirt und als *Festucaceae* aufgeführt werden, so ist p. 332 auf die Gattungen verwiesen, unter welchen sie verzeichnet worden und wohin sie gehören.

Ficaria Dill., Feigwarzenkraut.

fascicularis C. Koch, büschelförmiges, 4. Kn. f. Caucasus, Armenien.

Ficinia Schrad., Ficinie.

antarctica N. E. (= *Isolepis antarctica* R. et S. = *I. diabolica* Schrad. = *Scirpus antarcticus* Thbg. L. fil., non Vahl), südliche, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

filiformis Schrad. (= *Bacothryum crinitum* A. Dietr. = *Isolepis marginata* A. Dietr. = *I. oliganthos* N. E. = *Scirpus marginatus* Thbg. = *S. oliganthos* Steud.), fadenförmige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

scariosa N. E. (= *Eleogiton scariosa* A. Dietr. = *Isolepis scariosa* N. E. = *Schoenus deustus* Berg. = *S. scariosus* Vahl (non Thbg.), *Scirpus bulbosus* Rothb. = *S. trigynus* L. mant.), trockenhäutige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Ficus T., Feigenbaum.

americana Aubl. (= *arbutifolia* Hort. = *ciliolata* Hort.).
benghalensis L. (= *vasta* Forsk.).
camelliaefolia Dieffenb., camellienblättriger, 4. w. t. Neuholland.

Ficus

- Catesbaei* Steud. (= *citrifolia* Mill.), Catesbaei's, f. w. Westindien.
cerasiformis Parment., Dsf., kirschkförmiger, f. w. ?
coccolobifolia Lodd., seetraubenähnlicher, f. w. ?
cordata Thbg. (= *glauca* Dum. Cours. = *glauco-phylla* Dsf.).
cuneata Hffg., keilförmiger, f. w. Brasilien.
denticulata Vahl (= *aquatica* Koen.), gezähnelter, f. w. Ostindien.
diversifolia Blume, verschiedenblättriger, f. w. Java.
exasperata Vahl (= *aspera* Hort.).
ferruginea Parment., Dsf., rostfarbiger, f. w. ?
Fontanesii Steud. (= *pyrifolia* Dsf., H. Par., non Burm.), Desfontaine's, f. w. ?
fulva Sogl. et ? Dsf. H. Par., rothbrauner, f. w. Brasilien.
hirsuta Schott, rauhhaariger, f. w. Brasilien.
intermedia Hort. Schönbr. (non Caill. et Delil.), mittlerer, f. w. Ostindien.
ligustrifolia Dieffenb., ligusterblättriger, f. w. ?
*Loddigesii** (= *quercifolia* Lodd., non Blum.), Loddige's, f. w. Ostindien.
macrocarpa Blume, großfrüchtiger, f. w. Java.
magnoliaefolia Blume, magnolienblättriger, f. w. Java.
Neumannii Cels. (= *rigida* Dsf., non Hamilt), Neumann's, f. w. ?
pendula Nestl., Lk. (= *cuspidata* Dsf.).
phytolaccaefolia Dsf., kermesbeerenblättriger, f. w. ?
polita Vahl (= *myrtifolia* Lk.), geschmückter, f. w. Guinea.
populeaster Dsf., Pappel-F., f. w. ?
pumila L. (= *vestita* Dsf.).
purpurascens Dsf. (non Blum.), purpurfarbiger, f. w. ?
radicans Dsf., wurzelnder, f. w. ?
reclinata Dsf., zurückgebeugter, f. w. ?
Reinwardtii Lk., Otto (= *fulva* Reinw., Blum., non Sogl.), Reinwardt's, f. w. Java.
rubra Vahl (= *pyrifolia* Lam.), rother, f. w. Ostindien.
rufescens Vahl (= *heterophylla* Lam., non L. fil. = *aquatica* W.), fuchsröthlicher, f. w. Ostindien, China.
Saussureana DC. (= *Galactodendron* spec. Hort.), Saussures, f. w. ?
symphitifolia Lam. (= ? *scabra* Jacq.), schwarzwurzelblättriger, f. w. Java.
terebrata W. (= *pertusa* Bory).
undulata Dsf., wellenblättriger, f. w. Antillen.
variolosa Lindl., kleinblättriger, f. w. China.
- Filago** L., Faden-(Filz-)kraut.
Candolleana Parlatore (= *congesta* DC., non Gussone), Candolle's, ☉. f. Sicilien.
- Fimbriaria** Juss., Fimbriarie, ?X. III., Malpighiaceae.
elegans Juss., zierliche, f. w. Brasilien.
- Fimbristylis** Vahl, Franzengriffel.
Candelabrum Lk. (= ? *F. laxa* Vahl = *Scirpus Candelabrum* W.), candelaberförmiger, ? ☉. 4. w. Brasilien.
geminata Kunth (= *Trichelostylis geminata* N. E.), gepaarter, 4. w. ?
globulosa Wall., Kunth (= *umbellaris* Vahl = *Isolepis globulosa* R. et S. = *Scirpus globulosus* Retz, non Roxb. = *S. umbellaris* Lam. = *Trichelostylis globulosa* N. E.), kugelförmiger, 4. w. Ostindien.

Fimbristilis

Humboldtii Presl (= ? *laxa* Vahl = *pallescens* Lk., non N. E. = *Isolepis dichotoma* H. B. K. = *Scirpus pallescens* W.), Humboldt's, ☉. w. Südamerika.

pilosa Vahl (= *communis* Kunth = *elongata* Sbr. = *Scirpus fimbriatus* W.), behaarter, 4. w. Guinea.

squarrosa Vahl (= *comata* N. E. = *hirta* R. et S. = *Isolepis hirta* H. B. K. = *Scirpus aestivalis* Wall. = *S. hirtus* W. herb.), sparriger, ☉. 4. w. Ostindien, Cap d. g. Hoffn., Südamerika.

VahlII Lk. (= *Isolepis VahlII* H. B. K. = *Scirpus trichophyllus* W. herb. = *S. VahlII* Lam.), Vahl's, ☉. w. Südamerika.

bromeliaefolia Spgl., v. *Diplasia karataefolia*, p. 268 et 205, II., *Micheliana* Rehb., v. *Dichostylis Micheliana*, p. 262 et 200, II.

Fingerhuthia ciliata N. E. (= *africana* Lehm. = *capensis* N. E.). Vergl. p. 335.

Firmiana platanifolia Schott et Endl., v. *Sterculia platanifolia*, p. 787.

Fischeria DC. (v. Fischer, K. russ. Staatsrath u. Director des k. botan. Gartens zu Petersburg), V. II., Asclepiadeae.

scandens DC. Catal. h. monspel. (= *Holostenma Candolleianum* Spgl.), klimmende, ♀. Sch. w. Südamerika.

Floerkea marsupiiiflora Spgl. etc., v. *Adenophora marsupiiiflora* etc., p. 18.

Florestina Cass., Florestina, XIX. I., Compositae-Corymbiferae (Eupatorineae).

callosa DC. (= *Stevia callosa* Nutt), schwielige, ☉. f. Nordamerika.

pedata Cass. (= *Achyropappus pedatus* Less. = *Ageratum pedatum* Ortega = *Hymenopappus pedatus* Lagasca, p. 408 = *Stevia pedata* Cav.).

Flüggea japonica Rich. et *spicata* Schult., v. *Ophiopogon japonicus* et *spicatus*, p. 562.

Fluvialis minor P., v. *Najas minor*, p. 539.

Fockea Endl., Fockea, V. II., Asclepiadeae.

capensis Endl. (= *Cynanchum crispum* Jacq. fragm.), capische, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

glabra Decaisne, kahle, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Foeniculum T., Adans., Fenchel.

dulce DC. (= *Anethum dulce* DC. H. monspel.), süfser, ☉. ♂. f. Italien, Portugal.

luteum Fisch., gelber, ♂. f. Persien.

piperitum DC. (= *Anethum Foeniculum* β DC. H. monspel. = *A. piperitum* Bertol. = *Meum piperitum* R. et S.), Pfeffer-F., 4. f. Südeuropa.

vulgare G. (= *officinale* All.), β) *azoricum* Hort.

Forbesia plicata Eckl. (= *angustifolia* Eckl.), v. *Curculigo plicata*, p. 240.

Forestiera Poir., Forestiera, XXII. II., Urticaceae-Forestiereae.

acuminata Poir. (= *Adelia acuminata* Mchx. = *Borya acuminata* W. et *nitida* W. E., p. 128).

ligustrina Poir. (= *Adelia ligustrina* Mchx. = *Borya ligustrina* W., p. 128).

porulosa Poir. (= *Adelia porulosa* Mchx. = *Bigelovia porulosa* Sm. = *Borya porulosa* W., p. 128).

retusa Poir. (= *Borya retusa* W., p. 128).

Fornicium rhaponticoides Cass., v. *Leuzea conifera*, p. 460.

Forskolea L., Forskolea.

viridis Ehbg., grüne, ☉. f. Aegypten.

Forsteronia Mey., Forsteronie, V. 1., Contortae-Apocynae.

corymbosa Mey. (= *Parsonsia corymbosa* RBr., p. 587 = *Echites corymbosa* Jacq.).

floribunda Mey., G. Don (= *Parsonsia floribunda* RBr., p. 587 = *Echites floribunda* Sw.).

Forsythia scandens Walt., v. *Decumaria sarmentosa*, p. 254.

Fougerouxia alba DC. (= *Milleria alba* H. Parolin), *recta* DC. (= *Fougeria tetragona* Mchx.), v. *Baltimora recta* et β *alba*, p. 111.

Fourcroya Vent. (= *Furcraea* Auct., p. 340).

cubensis Haw. (= *agavephylla* Brotero = *tuberosa* β Ait. = *Agave mexicana* β Lam. = *A. odorata* P.).

rigida Haw., β) ? *Agave aspera* Jacq.

tuberosa Ait. (= *spinosa* Targ., Tozzet. = *Agave angustifolia* H. Par.).

Fragaria T., Erdbeere.

calycina Loisel. (= ? *collina* Ehrh. = *grandiflora* Thuill. = *vesca grandiflora* DC.), großkelchige, 4. f. Frankreich.

californica Schltl., californische, 4. f. Californien.

chilensis Molin., β) *ananassa* Duches., γ) *calyculata* Duches. (= *carolinensis* Duches., δ) *tincta* Duchesn.

collina Ehrh., β) *breslingia* Duches. (= *abortiva* Duches.),

b) *nigra* Duches., c) *pendula* Duches., d) *hispida* Duches., e) *viridis* Duches., f) *pratensis* Duches. (= *vesca* β *pratensis* L.).

Hagenbachiana Lang. (= *collina* Ehrh. var. ? = ? *majaufea* Duches. = *bifera* Duches.), Hagenbach's, 4. f. Breisgau.

indica Andr. (= *malayana* Roxb.).

mexicana Schltl., mexicanische, \ddagger . f. Mexico.

vesca L., η) *minor* Duches., θ) *hortensis* Duches., i) *monophylla* Duches. (= *abnormis* Tratt. = *unifolia* Hall.),

κ) *multiplex* Duches., λ) *botryformis* Duches., μ) *pentaphylla*, ν) *fol. variegatis*.

Franciscea Pohl, (Franz II., Kaiser von Oesterreich, großer Beförderer der Botanik), XIV. II., Personatae-Brunfelsiae.

hydrangeaeformis Pohl, wasserstrauchähnliche, \ddagger . w. Brasilien.

latifolia Pohl, breitblättrige, \ddagger . w. Brasilien.

ramosissima Pohl (= *Gardoquia obovata montevidensis* Spgl. = *Gerardia brasiliensis* Spgl.), ästige, \ddagger . w. Brasilien.

uniflora Pohl (= *Hopeana* Hook. = *Brunfelsia uniflora* Don, p. 336).

villosa Lodd. (= *Pohleana* Hort. belg.), zottige, \ddagger . w. Brasilien.

mutabilis Hort. = ?

Frankenia L., Frankenie.

pauciflora DC. (= *virens* Dsf.), wenigblumige, \ddagger . k. t. Van Diemens Land.

β) *scabra* Schult. (= *pauciflora* Grah.).

Frankenia

thymifolia Dsf. (= *capitata* γ Webb. et Berth.), thymianblätterige, \mathfrak{h} . k. Nordafrika, Spanien.

Frankia ramiflora Bertero, v. *Cicca disticha*, p. 195.

Franklinia Alatomaha Marsh., et *americana* Marsh., v. *Gordonia Franklini* et *pubescens*, p. 366.

Fraseria Walt., Frasierie.

speciosa Dougl., Hook., prächtige, 4. f. Nordamerika.

Fraxinus T., Esche.

cerasifolia Hffg. (= *pubescens* β *longifolia* Vahl = *subvillosa* Bosc.), kirschblätterige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

curvidens Hffg. (= *caroliniana* W. β), gekrümmtzahnige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

heterophylla Vahl (= *integrifolia* Hort.), γ *angustifolia*.

lenticifolia Dsf. (= *microphylla* Bosc, W.).

macrophylla Hffg., ? Thouin (= *juglandifolia* Hort., non Lam.), großblätterige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

mexicana Sweet, mexicanische, \mathfrak{h} . k. Mexico.

platyphylla Hffg. (= *pubescens* β *latifolia* W., R. et S.), breitblätterige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

polycarpa W., vielfrüchtige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

pubescens Walt. (= *pensylvanica* Marsh.).

rostrata Guss. (= *parvifolia* Auch. Ell., non W.), geschnäbelte, \mathfrak{h} . f. Kleinasien, Süd- u. Westeuropa.

Schiedeana Schldtl., Schiedes, \mathfrak{h} . k. Mexico.

Unbestimmtere: *lyrata* Hort., *salicifolia* Hort.

Hinsichtl. der übrigen s. *Ornus*, p. 570.

Freesea crispa Eckl., *flava* Eckl., *longiflora* Eckl.,

miniato-lateritia Eckl., v. *Montbretia crispa* etc.,

(*Waitzia crispa* etc., p. 854).

Freirea Gaudich. (Freire, ehem. portugiesischer Staatsminister), XXIII. I. (IV. I.), Urticaceae.

alsinesifolia Gaudich. (= *Parietaria alsinesifolia* Delil.), mierenblätterige, \odot . f. Aegypten.

filiformis Endl. (= *Parietaria filiformis* Tenore), fadenförmige, \odot . f. Neapel.

microphylla Endl. (= *Parietaria microphylla* Ledeb.), kleinblätterige, \odot . f. Altai, Sibirien.

Fresnelia Mirb., Fresnelie, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

glaucescens Hort. belg., blaugrüne, \mathfrak{h} . k. t. Neuholland.

Hügelii Hort. belg., Hügel's, \mathfrak{h} . k. t. Neuholland.

pendula Hort. belg., überhängende, \mathfrak{h} . k. t. Neuholland.

Fontanesii Mirb., v. *Callitris quadrivalvis*, p. 149.

Freycinetia Gaudich. (C. L. D. v. Freycinet, Naturforscher und Weltumsegler), XXII. I., Pandaneae.

Baueriana Endl., Bauer's, \mathfrak{h} . Sch. w. t. Norfolkinsel.

Freylinia Benth., Colla, Freylinie, XIV. II., Personatae-Gratiroleae.

lanceolata G. Don (= *cestroides* Colla = *oppositifolia* Spin. = *Capraria lanceolata* L. Suppl., p. 158), β)

salicifolia (= *Capraria salicifolia* Lk. et Otto = *Andrewsia salicifolia* Hort. = *Buddlea glaberrima* Hort. Taur. = *Cestrum aurantiacum* Hort.).

undulata Benth. (= *Capraria undulata* L. Suppl.).

Fridericia Mart. (Friedrich Wilhelm III. und IV., Könige von Preussen, erl. Mäcene d. Botanik u. Gartenkunst), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

Guilielma Mart., Wilhelm's, \mathfrak{h} . Sch. w. Brasilien.

- Friedlandia albiflora* Mart., *amoena* Chamiss. Schldl.,
v. *Diplusodon virgatus* et *amoenus*, p. 206, 11.
- Friedrichsthalia** Fenzl, *incana* Bunge, *physaloides*
Fenzl etc., v. *Trichodesma*, Sect. 11.
- Fritillaria** T., I. Genuina, Schachblume.
biflora Benth., Lindl., zweiblumige, 4. f. Zw. Californien.
cantschatcensis Ker (= *Lilium quadrifoliatum* E. Mey.
= *Amblirion cantschatcense* Swt.), kamschatkaische,
4. Zw. f. Nordamerika, Unalaska, Kamtschatka.
cirrhusa Don, wickelrankige, 4. Zw. f. b. k. Nepal.
Fleischeriana Steud. et Hochst. (= *pyrenaica* Sibth.),
Fleischer's, 4. Zw. f. b. Griechenland, Smyrna.
glaucescens W., blaugrünliche, 4. Zw. f. ?
latifolia W. (= *esculenta* Adam = *italica* P. = *persica*
Pall.), β ? *aquitana* Mill. (= ? *involuta* All.).
leucantha Grah, Fisch. (= *verticillata* H. Berol.).
liliacea Benth., lilienartige, 4. Zw. f. Californien.
messanensis Rafin. (= *pyrenaica* Guss.), sicilische,
4. Zw. f. Sicilien, Calabrien, Spanien, Nordafrika.
montana Hoppe (= *pyrenaica* M. et K. = *tenella* Rehb.),
Bergliebende, 4. Zw. f. Illyrien, Istrien.
mutica Benth., Lindl., unbewehrte, 4. Zw. f. Californien.
nervosa W. (= *serotina* P.).
pallidiflora Schrenk, bleichblumige, 4. Zw. f. Soongaria.
parviflora Mart., kleinblumige, 4. Zw. f. Caucasus.
plantaginifolia Lam. (= *plantaginea* P.), wegrittblättrige,
4. Zw. f. Orient.
pontica Wahlbg. (= *pyrenaica* d'Urville), pontische, 4.
Zw. f. Asiat. Türkei.
pudica Spgl. (= *Lilium pudicum* Pursh = *Amblirion*
pudicum Sweet), schamhafte, 4. Zw. f. Nordamerika.
racemosa Sm. (= *pyrenaica* Ker = *nigra* Mill.), trau-
big, 4. Zw. f. Taurien, Caucasus.
 α) *orientalis* Adam (= *tenella* MB.), β) *major*
 pluriflora Kunth (= *pyrenaica* Ait. Kew.).
verticillata W. (= *altaica* Lamb.), β) *multiflora* R. et S.).
Unbestimmtere: *cantoniensis* Lour., *cornuta* H. Gorenk.,
Cornuti H. Dorpat., *tardiflora* Lehm., *umbellata* Mill.,
vittata H. anglor.
- Froelichia** Mch. (= *Hoplotheca* Nutt., p. 403),
(v. Froelich, Arzt u. Botaniker, Bearbeiter d. G. Hie-
racium u. Gentiana †), V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.
*floridana** (= *Hoplotheca floridana* Nutt.)
*interrupta** (= *lanata* Mch. = *Hoplotheca interrupta*
Nutt. = *Gomphrena interrupta* L. = *G. spicata* Lam.
= *Celosia procumbens* Jacq., Murr.).
*lactea** (= *Hoplotheca lactea* Mart. = *Gomphrena*
lactea DC.).
*lanata** (= *Hoplotheca lanata* Mart. = *Gomphrena*
Humboldtiana R. et S. = *G. lanata* H. B. K., nec Alior.).
*sericea** (= *Hoplotheca sericea* Mart. = *Gomphrena*
sericea Hffg.).
Froelichia caricoides Wulf., v. *Elyna spicata*, p. 286.
- Fuchsia** L., Fuchsie.
I. Genuina.
alpestris Gardn., Voralpen-F., \ddagger . k. t. Brasilien.
arborescens Sims (= *amoena* Hort. = *Schusia arbores-*
cens Spach).
coccinea L. (= *elegans* Salisb. = *magellanica* Lam.
= *pendula* Salisb.).

Fuchsia

- conica Lindl. (= *macrostemma* γ Sweet).
 cordifolia Benth., Lindl., herzblättrige, \S . k. t. Mexico, Peru.
 discolor Lindl. (= *macrostemma* var. *discolor* Don, Swt.),
 verschiedenfarbige, \S . k. Falklandsinsel.
 globosa Lindl., Lodd. (= *elegans* Paxt. = *macrostemma*
 δ Don, Sweet), kugelförmige, \S . k. t. Mexico.
 b) fol. variegatis, c) superba, d) crassa, e) deal-
 bata, f) grandiflora, g) maxima.
 gracilis Lindl. (= *decussata* Grah. = *multiflora* Lindl.,
 Hort. = *macrostemma* ϵ Don, Sweet).
 integrifolia Cambess. (= *pyrifolia* Presl = *affinis* Gardn.),
 ganzblättrige, \S . t. k. Brasilien.
 lycioides Andr. (= *rosea* R. et P.).
 macropetala Presl, großskronige, \S . t. k. Peru.
 macrostemma R. et P., β) tenella Loud., γ) recurvata Hook.
 montana Cambess., Bergliebende, \S . t. k. Brasilien.
 Ob eingeführt?
 procumbens A. Cunningh., niederliegende, \S . k. Neu-
 zeeland.
 radicans Miers, starkwurzelnde, \S . t. k. Brasilien.
 splendens Zucc., Lindl., schimmernde, \S . t. k. Mexico.
 unguiculata Lindl. (= *mutabilis* Hort.), nagelförmige,
 \S . t. k. Südamerika.

II. Eucliandra Zuccar. (= *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach et *Kirschlegera* Spach).

- Eucliandra Steud. (= *E. parviflora* Zuccar., = *F. par-*
viflora Zuccar., non Lindl.), Eucliandra-F., \S . t. k.
 Mexico.
 parviflora Lindl. (= *ovata* Moç., Sess. = *Kirschlegeria*
Lindleyi Spach).
 thymifolia H. B. K. (= *alternans* Moç., Sess. = *Bre-*
bissonia thymifolia Spach = *Lopezia thymifolia* Bonpl.
 = *Lyciopsis thymifolia* Spach).
 Nachverzeichnete scheinen noch nicht eingeführt, als:
 ayavacensis H. B. K., petiolaris H. B. K., pubescens
 Cambess., quindivensis H. B. K., racemosa Lam. (= *triphyl-
 la* L.), simplicicaulis R. et P., spinosa Presl,
 sämtlich \S . und in Südamerika heimisch.

Hybriden:

- Admirable, Adonia, affinis, Albion, Alfred, Amulet, Anna
 Pawlowna, arborea grandiflora, Argo (Harrison), At-
 kinsonii, Audot, Ballonii, Barclayana, Bellii, Berge-
 manni (Warscewicz), Bertramii (Warsc.), bicolor, Boydii
 (Hally.), Brannii (Warsc.), Brennus, Brewsterii, Bride-
 groom (Epp), Britannia, Brockmannii, capitata (Warsc.),
 carnea, cardinalis, Carswelliana, Chandleri, champion,
 Chinois (Salter), Clara, Clio, coccinea vera (J. Smith),
 Comet, conspicua et arborea (Cattleugh) (= *Prince*
of Wales), Conqueror, Constellation (Miller), Cooperi,
 Coronet (J. Smith), Curtisii, cylindracea, Dalstoniana,
 decora (J. Smith), defiance, delicata, Denisiana, Duke
 of Wellington (Epp), elegans superba, Elvira, Em-
 peror of China (Buisby), Enchantress et superba,
 Epsii, Espartero (Knight), excelsa, eximia, exoniensis
 (Harrison), (*globoso cordifolia*), expansa, exquisita,
 Fairy, Fair Helen (Hally), Fair Rosamond (Harrison),
 Fintelmanni, Flora (Harrison), Florence (Epp) et Flo-
 rence (Harrison), formosa (Harrison), formosa elegans

Fuchsia

(Thompson), *Frostii*, *fulgens multiflora*, Gem, *gigantea* (Smith), *glabrata multiflora*, *Godfreydii*, *Goldfinch* (Harrison), *grandis*, *grandiflora et maxima*, *Guillouma II.*, *Hartwegiana*, *Hector* (et Harrison's), *Hoepnerii* (Warsc.), *ilicifolia* (Smith), *incarnata*, *inflata fulgida* (May), *insignis* (Smith), *invincible* (Smith), *Iveryana*, *Josephus*, *Juno*, *Kentish hero* (Epp), *Kentish bride*, *King*, *King John* (Hally), *Koopmanni*, *Lady Sale* (Rogers), *Lami* (Harris.), *Laneii*, *Leader*, *Leonore*, *lilacina alba* (Warsc.), *London rival* (G. Smith), *linifolia*, *longiflora splendens floribunda*, *longiflora superba*, *Lord Sandon* (Roger's), *Madonna* (Harris.), *Magnet* (W. Pawley), *magnifica*, *majestica* (Smith), *marginata* (Hally), *Maria* (Epp), *mirabilis* (Smith), *Miss Talfourd* (Salter), *modesta* (J. Smith), *Monypennii*, *Neptune* (J. Smith), *Nietneriana* (Warsc.), *nobilissima*, *Norfolk Hero* (Barkway), *Nymph* (Epp), *Paragon*, *patens*, *pearl* (Harrison), *pendula elegans et pendula terminalis*, *picta*, *Prima Donna* (Harrison), (= *fulg.-splendens*), *Prince Albert* (Th. Brown), *Prince of Wales* (Buisby), *Prince of Wales* (W. Pawley), *princeps* (Smith), *Princess Sophie* (Marnock), *pulchella* (May), *pulcherrima* (Harrison), *Queen* (W. Pawley), *Queen Victoria* (Harrison), *Queen of Seba*, *racemosa* (Smith), *reflexa*, *reflexa aurantiaca* (Warsc.), *Regelii* (Warsc.), *Rienzi* (Knight), *Richardsonii*, *Rogersiana*, *Rosalba* (Harrison), (= ? *roseo-alba*), *rosea*, *rosea superba*, *Sellowii* (Warsc.), *Sidmouthii* (Bartlett), *speciosa*, *speciosissima* (Sheffield), *spectabilis* (Harrison), *Standishii dependens et majestica*, *Stanwelliana*, *St. Clare* (Youell), *striatiflora* (Warsc.), *stylosa maxima* (May), *superba* (Mortlock), *surpass racemiflora*, *Targetti*, *Theophrastus* (Roger), *the President*, *Theresita*, *Thyneana*, *Toddiana*, *transparentis*, *tricolor* (Pontey), *triumphans* (Smith), *unique*, *Uttoxeter beauty* (Roger), *Uttoxeter rival*, *Van Guard* (Harrison), *Venus Victrix*, *vernalis*, *Vesta* (J. Smith), *Vesta* (Harrison), *venusta* (= *arborea*), *Victory*, *Wat-Tyler* (Hally), *Woodsii*, *Youellii*, *Zenobia* (Harrison) etc. etc.

Fugosia Juss., P., *Fugosie*, XVI. VIII., Malvaceae.
heterophylla Spach (= *Redoutea heterophylla* Vent., p. 679), verschiedenblättrige, ♂. ♀. w. Südamerika.
sulphurea Juss., schwefelgelbe, ♀. w. Brasilien.

Fuirena Rottb., *Fuirena*.

cephalotes Schrad., großköpfige, 4. k. t. Cap d. g. H.
quinguangularis Hassk., fünfkantige, 4. w. Java.
scirpoidea Vahl (= *Vaginaria Richardi* P.), binsenähnliche, 4. f. Nordamerika.

squarrosa Mchx. (= *β pumila* Speg. = *Torreyana* Beck), sparrige, 4. f. Nordamerika.

Fulchironia senegalensis Lestib. = *leonensis* Hort.), v. Phoenix leonensis, p. 617.

Fumana Dun., Spach, *arabica* Spach, *laevipes* Spach, *viscida* Spach, *viridis* Spach, *vulgaris* Spach, v. *Helianthemum arabicum*, *laevipes*, *glutinosum*, *viride et Fumana*, p. 380 etc.

Fumaria T., *Erdrauch*.

alexandrina Ehrbg., alexandrinischer, ☉. f. Aegypten.

Fumaria

Burchelli DC. (= *capreolata* β DC.), Burchell's, ☉.

Sch. f. Cap d. g. Hoffn.

calycina Babingt., kelchiger, ☉. f. Schottland.

flabellata Gasparini, fächerförmiger, ☉. f. Calabrien.

media Lois. (= *agraria* Lagasca = *capreolata* Aut.

= *cirrhatta* Rohde = *officinalis* L. var. Huds. Spgl.),

mittlerer, ☉. f. Europa.

β) *prehensilis* Kit.

macrocarpa Parlatores, großfrüchtiger, ☉. f. Sicilien.

parviflora Lam. (= *diffusa* Mch. = *leucantha* Vivian.

= *sicula* Pison.).

Funkia Spgl., Funkie.

lancifolia Spgl. (= *ovata* β Schult = *ovata* β flore albo Kunth = *Hemerocallis coerulea* a Ker = *H. lancifolia* Thbg.).

Sieboldiana Hook. (= *Sieboldi* Lindl. = *cucullata* Hort.

= *cordata* Sieb. = *Hemerocallis Sieboldiana* Lodd.),

b) flore candido, c) fol. albo variegatis, d) fol. luteo variegatis; zu ergänzen p. 340.

Gagea Salisb., Gagea.

bonariensis R. et S. (= *Ornithogalum bonariense* P. = *O. spathaceum* Poir.), bonarische, 4. Zw. t. k. Buenos Ayres.

chrysantha R. et S. (= *Ornithogalum chrysanthum* Jan), goldfarbige, 4. Zw. f. Sicilien.

Clusiana R. et S. (= *Ornithogalum Clusii* Tausch = *O. marginatum* Pall. = *pusillum* MB. = *trigonophyllum* Auct. = *pratense* Sadl.), Clusius's, 4. Zw. f. Deutschland, Italien, Ungarn, Caucasus, Sibirien.

β) *pusilla* Rchb., R. et S. (= *Ornithog. arvense* β Pohl = *O. pusillum* Schm. = *O. uniflorum* Zauschn.), γ) ? *tunicata* (= *Ornithogalum tunicatum* Presl).

erubescens R. et S. (= *Ornithogalum erubescens* Bess.), röthliche, 4. Zw. f. Podolien, Volhynien.

fibrosa R. et S. (= *Ornithogalum fibrosum* Dsf.), faserige, 4. Zw. k. Nordafrika.

filiformis Kunth (= *Ornithogalum filiforme* Ledeb.), fadenförmige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

foliosa R. et S. (= *Ornithog. foliosum* Presl = *O. luteum* L. var.), blattreiche, 4. Zw. f. Sicilien.

glauca Sweet (= *Ornithogalum luteum* W. E., nec P. = *O. sylvaticum* Schleichr.), blaugrüne, 4. Zw. f. Schweiz.

Liotardi R. et S. (= *fistulosa* Duby = *pygmaea* Salisb. = *Ornithogalum bohemicum* Balb. = *fistulosum* Ram. = *O. fragiferum* Vill. = *O. intermedium* Schleichr. = *O. Liotardi* Stbg. = *O. luteum* Gaud.).

lutea R. et S. (= *Ornithogalum luteum* L. = *O. luteum* β majus Red. = *O. luteum* λ . *sylvaticum* W. = *O. Persoonii* Hoppe = *O. sylvaticum* P.).

minima Sweet, Rchb., R. et S. (= *Sternbergii* Loud. = *Ornithogalum gracile* Hagen = *O. acutipetalum* Auct. = *O. minimum* L. = *O. Sternbergii* Hoppe).

pratensis K., Rchb. (= *Ornithogalum pratense* P. = *O. stenopetalum* β *pratense* M. et K.).

reticulata R. et S. (= *circinnata* Loud. = *Hornungia* Bernh. = *Ornithogalum circinnatum* L. fil. = *O.*

Gagea

reticulatum Pall.), netzförmige, 4. Zw. f. Caucasus, Taurien.

saxatilis R. et S., K. (= *arvensis* var. *subuniflora* Rehb. = *Ornithogalum bohemicum* β *saxatile* M. et K. = *O. luteum* β Roth = *O. saxatile* K.).

spathacea Ker (= *Ornithogalum minimum* β *spathaceum* Whlbg. = *O. Heynei* Roth = *O. spathaceum* Heyne = *O. transversale* Pall.).

stenopetala Rehb. (= *pratensis* R. et S., non K. = ? *bracteolaris* Salisb. = *lutea* Duby = *Ornithogalum belgicum* Lej. = *O. glaucum* Dethar. = *O. luteum* W. et reliq. Auct. = *O. stenopetalum* Fr.).

Szovitsii Besser (= *Ornithogalum Szovitsii* Lang = *O. pygmaeum* Fleisch., non W.), Szovits's, 4. Zw. f. Odessa, Smyrna.

triflora R. et S. (= *chlorantha* R. et S. var. Spgl. = *Ornithogalum triflorum* Ledeb.), dreiblumige, 4. Zw. f. Sibirien.

uniflora R. et S., v. *Orithyja uniflora*.

Hiernach p. 341 zu ergänzen und zu berichtigen.

Gaillardia Fouger, DC., Gaillardia.

Amblyodon Gay., grofszahnige, \odot . f. Mexico.

aristata Pursh (= *bicolor* β *aristata* Nutt. = *perennis* H. Par. = *rustica* Cass. = *lanceolata* DC., nec Mchx.).

picta Sweet (= *bicolor* β *Drummondii* Hook.), bunte, 4. k. Texas.

b) *coccinea* Hort., c) *grandiflora* Hort.

pinnatifida Torr. (= *lyrata* Hort.), fiederspaltige, σ . 4. f. Nordamerika.

pulchella Fouger. (= *bicolor* Lam. = *Drummondii* DC.).

Hybriden u. Varietäten: *cyaniflora* Hort. (*aristato-picta*), *Herberti*, *Kartwrightii*, *Kirtlandii*, *maxima*, *Rollissonii*, *Schomburgkii*, *Smeathmanni*, *splendida*, *Welsiana*.

Galactia pendula P., v. *Collaea pendula*, p. 154, II.

Galanthus plicatus M. B. (= *Clusii* Fisch.).

Galarrhoeus aleppicus Haw., *androsaemifolius* Haw., *Apios* Haw. etc., v. *Euphorbia aleppica*, *androsaemifolia*, *Apios* etc., p. 321 etc., p. 237, II.

Galasia (= *Gelasia* Cass.) *villosa* Less., v. *Scorzonera* Sect. II., p. 735.

Galatella (= *Galatea* Cass.), v. Aster, Sect. IX., p. 99 et 51, II., *obtusifolia* Lehm., v. *Seriocarpus solidagineus* (Aster, Sect. XIV.), p. 100.

Galathenium floridanum Nutt., *multiflorum* Nutt., v. *Mulgedium floridanum* et *multiflorum*, p. 341 u. 884.

Galaxia Thbg., Galaxie.

grandiflora Andr. (= *ciliata* P. = *multiflora* Spgl. = *ovata* α Ker), β) *mucronularis* Salisb.

ixiaeflora DC. Redout. (= *Ixia columnaris* Andr., Salisb., p. 427 = *I. curta* Andr. = *I. monadelphina* Delarb. = *I. variegata* Banks), Ixienblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

minuta Ker (= *Ixia minuta* L. = *Romulea minuta* Eckl.), kleinste, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

ovata Thbg. (= *obtusifolia* Salisb.), β) *versicolor* Salisb. (= ? *violacea* Eckl.).

ramosa DC. (= *Ixia columnaris angustifolia* Andr. = *I. columellaris* Ker, p. 426 = *I. monadelphina* Delarb. var. ?), ästige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Galbanum officinale Don, v. *Ferula Ferulago*, p. 330.

Galeandra Lindl., *Galeandra*, XX. 1., Orchideae.

Baueri Lindl., Batem., Bauer's, 4. w. Südamerika.

cristata Lindl., kammförmige, 4. w. Cayenne.

Devoniana H. Angl., Devon's, 4. w. ? Südamerika.

extinctoria Lindl., nichtfärbende, 4. w. Sierra Leone.

gracilis Lindl. (= *Eulophia gracilis* Lindl., p. 319 =

Limodorum ciliatum Schum.).

Galeuria Cupani Presl, *fragifera* Presl, *resupinata*

Presl, *tomentosa* Presl, v. *Trifolium alatum*, *fragi-*

ferum etc., p. 818 etc.

Galega T., Geißraute.

frutescens Mill, strauchige, †. w. Vera Crux.

persica P. (= *africana* Mill.).

tricolor Hook. (= *Callotropis tricolor* G. Don), drei-
farbige, 4. k. t. Neuholland.

Ungewiß: *glandulosa* Hort.

Galeobdolon *luteum* Huds., Sm., (= *vulgare* P. =

Lamium Galeobdolon Crantz = *Galeopsis Galeobdo-*
lon L.), β) *montanum* Hoffm.

Galeopsis *versicolor* Curt. (= *speciosa* Mill.).

Galinsogea Cav. (= *Sogalgina* Cass.), Galinsogea.

dentata Rchb., Hffg. (= *trilobata* Hort., non Cav.),
gezahnte, ☉. f. ?

brachystephana H. bot., v. *Wiborgia brachystephana*.

Galium L., Scop., Labkraut.

anglicum Huds. (= *gracile* Wallr., M. et K. = *parvi-*
folium Gaud.).

aristatum L. (= *erectum* Don = *glaucum* Suter, He-
getsch. = *sylvaticum* Vill., non L.).

bermudianum L. (= *pilosum* Ait., Ell. = *punctatum*
P. = *punctulosum* Mchx. = *purpureum* Walt., non

L.), bermudisches, 4. f. Nordamerika.

capillare Decaisn. (non Cav.), haarförmiges, ☉. f. Arabien.

caspicum Stev., caspisches, 4. f. Persien.

chloroleucum Fisch. et Mey., grünlichweißes, ☉. f. Persien.

cinereum All., β) *corrudaefolium* Vill. (= *pallidum* Presl
= *tenuifolium* All.).

cordatum R. et S. (= *articulatum* Lam. var. ? Poir. =

Valantia cordata P.), herzförmiges, ☉. f. Orient.

coriaceum Bunge, Ledeb., lederartiges, 4. f. Altaisch.
Sibirien.

Cruciata Scopol. (= *chersonense* R. et S. = *G. Valantia*

Baung. = *Valantia chersonensis* W. = *V. ciliata*

Opiz, Presl = *V. Crucjata* L.).

ellipticum Presl (= *Barrelieri* Salzm. = *ovalifolium*

Schott = *rotundifolium* β R. et S., M. et K.).

erectum Huds. (= *Bocconi* Tenore = *lucidum* All. =

provinciale Lam. = *pubescens* Schleichr. = *rigidum*

Vill. = *scabrum* Jacq.).

eriocarpum Bartl., wollfrüchtiges, †. k. Chili.

firmum Tausch, dichtes, 4. f. Dalmatien.

hyrcanicum C. A. Mey., hyrcanisches, 4. f. Caucasus, Persien.

linifolium Lam. (= *atrovirens* Lapeyr. = *laevigatum*

Lam. = *aristatum* Auct.), gleichbreitblättriges, 4. f.

Südeuropa.

maritimum L., β) *villosum* Lam. (= *humifusum* MB.

= *ruthenicum* W.).

montanum L., Berg-L., 4. f. England, Frankreich.

Mollugo L., β) *tyrolense* W. (= *splendens* Hornem.).

Galium

- Neesianum Req. (= *hirsutum* N. E., Buch. = *ovalifolium* Schott), Nees's, 4. k. Teneriffa.
 pauciflorum Bunge, wenigblumiges, ☉. f. Nordchina.
 pedemontanum All. (= *chloranthum* Brotero = *minus* Hort. = *Vaillantia pedemontana* Bellard. = *V. granulata* Roth).
 persicum DC., persisches, 4. f. Persien.
 pumilum Lam., δ) caespitosum Ram. (= *Jussieui* Vill.).
 pygmaeum DC. (= *articulatum* R. et S. var. Tausch. = *Vaillantia pusilla* Stev. = *V. muralis* MB.), zwerdiges, ☉. f. Iberien.
 retrorsum DC. (= *pedemontanum* MB., non All. = *Vaillantia pedemontana* W. K., non Bell.), rückwärts-hackeriges, ☉. f. Sicilien, Ungarn, Caucasus.
 saccharatum All., γ) granulatum Schrad (= *Vaillantia granulata* Sgpl.).
 setaceum Lam. (= *capillare* Cavan., non Decais. = *eriospermum* Chaix = *floribundum* Sm. = *microcarpum* Vahl), borstiges, ☉. f. Spanien, Frankreich, Sicilien, Nordafrika.
 sylvestre Poll., ε) alpestre Gaud. (= *sudeticum* Tausch).
 vernum Scopol. (= *Vaillantia glabra* Vill.), β) Bauhini R. et S. (= *glabrum* Rochel = *Scopolianum* Bess. = *Vaillantia glabra* L. = *V. verna* G. Don).
 verticillatum Danth. Lam. (= *murale* MB. = *Sherardia muralis* Pall.), wirtelförmiges, ☉. f. Sicilien, Frankreich, Taurien.
 verum L., γ) caucasicum Lagasca. ? Fisch.

Cucullaria R. et S., v. *Callipeltis Cucullaria*, p. 107, II.

Garcinia L., Garcinie.

- emarginata H. Cels., ausgerandete, ♀. w. Ostindien.
 speciosa Wall., prächtige, ♀. w. Ostindien.

Gardenia Ellis, Gardenie.

- Moruba Siebold, Blume, Moruba-G., ♀. k. Japan.
 pallida Lindl., bleiche, ♀. w. Südamerika.
 Sherbourniae Hook., Sherbourn's, ♀. Sch. w. Sierra Leone.
 Stanleyana Lindl., Hook., Stanley's, ♀. w. Sierra Leone.
 tetrasperma Roxb., viersaamige, ♀. ♀. w. Ostindien.
 Thunbergia L. fil. (= *crassicaulis* Salisb. = *verticillata* Lam. = *Thunbergia capensis* Montin).

Whitfieldii Lindl., Whitfield's, ♀. w. Sierra Leone.

Außerdem kommen in den Pflanzenverzeichnissen der Handelsgärten noch vor: *australis* H. Cels., *litoralis*, *macrophylla* H. Cels.

- armata* Sw., *Bowieana* A. Cunn., *dumetorum* Retz, *longispina* Sgpl., *micrantha* Thbg., *Mussaenda* L. fil., *nutans* Sgpl., *propinqua* Lindl., *spinosa* Thbg., *uliginosa* Retz, v. *Randia armata*, *Bowieana*, *dumetorum*, *longispina*, *parviflora*, *Mussaenda*, *nutans*, *propinqua* etc., *fragrans* Roxb., v. *Griffithia fragrans*, *Pavetta* Roxb., v. *Stylocoryne* Webera.

Gardoquia R. et P., Gardoquie.

elegans H. B. K. (= *pulchella* H. B. K.), zierliche, ♀. k. t. Peru.

elliptica R. et P. (= *Stachys speciosa* Hook.), elliptische, ♀. k. t. Peru.

Gilliesii Grah. (= *chilensis* Hook.).

grandiflora H. B. K. (= *incana* W. herb. = ? *quitensis* W. herb.), großblumige, ♀. k. t. Quito.

Gardoquia

Hookeri Benth. (= *Cunila coccinea* Nutt. = *Melissa coccinea* Sngl.), Hooker's, f. k. Florida.

Garrya Dougl., Garrya, Urticaceae-Garryeae.

laurifolia ? Lindl., lorbeerblättrige, f. k. Neucalifornien.

Garuleum Cass., Garuleum, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae (Calendulaceae).

bipinnatum Less. (= *Osteospermum bipinnatum* Thbg.), doppeltgefiedertes, f. k. Cap d. g. Hoffn.

viscosum Cass. (= *pinnatifidum* DC. = *Chrysanthemoides coerulea* Mch. = *Osteospermum coeruleum* Jacq., Ait., p. 573 = *O. pinnatifidum* L'Her.), schmieriges, f. k. Cap d. g. Hoffn.

Gasparrinia virescens Bertol., v. *Bunium virescens*, p. 82, II.

Gasterolychnis Fenzl, v. *Lychnis*, Sect. III^b.**Gastonia** Commers., Gastonie.

cutispongia Lam. (= *spongiosa* P.), schwammige, f. w. Mauritius.

? *dentata* H. Makoy., *palmata* Roxb., v. *Gilibertia dentata et palmata*.

Gastrochilus Wall., Bauchlippler, I. I., Scitamineae-Zingiberaceae¹⁾.

longiflorus Wall., langblumiger, 4. w. Ostindien.

Gastrochilus calceolaris Don, v. *Sarcochilus nepalensis*.

Gastrolobium RBr., Bauchläppler.

acutum Benth., Hook., spitziger, f. t. Neuholland (Schwanenflufs).

calycinum Benth., großkelchiger, f. t. Neuh. (Schwanenfl.).

cordatum Benth., herzförmiger, f. t. Neuh. (Schwanenfl.).

Makoyanum Hort. belg., Makoy's, f. t. Neuholland.

parvifolium Benth., kleinblättriger, f. t. Neuh. (Schwfl.).

spinosum Benth., dorniger, f. t. Neuholl. (Schwanenfl.).

Noch kommen in den Verzeichnissen der Handelsgärten *G. splendens* u. *verticillatum* vor.

Ob von Nachverzeichneten einige kultivirt werden, ist mir nicht bekannt, als: *obovatum* Benth., *oxylobioides* Benth., *spathulatum* Benth., *trilobum* Benth., *villosum* Benth. Sämmtlich f. und in Neuholland (am Schwanenflufs) heimisch.

Gastromeria G. Don, Gastromerie, XIV. II., Personatae-Antirrhinae.

physaloides G. Don (= *Lophospermum physaloides* Don = *Scrophularia physaloides* Moç., Sess.), schlutenähnliche, 4. f. k. t. Mexico.

Gastronema clavatum Herb. Sims, *pallidum* Lodd., *spirale* Eckl., Zeyh., v. *Cyrtanthus uniflorus*, p. 184, II. et *Cyrtanth. pallidus et spiralis*, p. 247.

Gaudinia P. B., Gaudinie.

geminiflora Gay. (= *Arthrostachya coarctata* Lk. = *Avena coarctata* Dsf. = *A. geminiflora* Kunth = *Bromus coarctatus* Hornem. = *Triticum coarctatum* Sngl. = *Falimiria bromoides et coarctata* Bess.), paarblumige, ©. f. ?

tenuis Trin. (= *Avena dubia* Leers = *A. tenuis* Mch.,

p. 107 = *A. triaristata* Vill. = *Bromus triflorus* Poll.

= *Holcus biaristatus* Web. = *Trisetum tenue* R. et S.

= *Ventenata avenacea* Koel. = *V. bromoides* Koel).

1) Orchideae p. 347 3te Zeile v. o. ist zu streichen.

Gaulthieria L. (*Gautiera* Kalm, Endl.), *Gaulthiera*.
coccinea H. B. K., scharlachfarbige, \S . t. ?
cordifolia H. B. K., herzblättrige, \S . t. Neugranada.
ferruginea Schldl. (= ? *tomentosa* H. B. K. = *Andromeda hirsuta* Arrabida), rostfarbige, \S . t. Brasilien.
Oblanigera Hook. \S . Südamerika, *myrsinites* Hook. \S . Nordamerika, *venusta* DC. (= *Andromeda pulchra* Arrabida, non Cham. Schldl.), \S . Brasilien, in den Gärten eingeführt worden, ist mir unbekannt.

Gaura L., Prachtkerze.

angustifolia Mchx. (= *fruticosa* Jacq. = *undulata* Dsf.).
coccinea Fras., β) *marginata* Lehm., γ) *parvifolia* Torrey, δ) *glabra* Lehm.

Drummondii Torr. et Gr. (= *Schizocarya Drummondii* Spach), Drummond's, 4. \S . k. Texas.

epilobioides H. B. K. (= *angustifolia* et *tripetala* W. herb. = *Schizocarya Kunthii* Spach), weidenröschenähnliche, 4. k. Mexico.

mollis H. B. K. (= *Gauridium Kunthii* Spach = *G. molle* Spach), weiche, 4. k. Mexico.

odorata Lagasca, Sessé, wohlriechende, 4. k. Neuspanien.

oenotheraeflora Zuccar. (= *canescens* Hort. = *mutabilis* Cav. var. ? DC.).

parviflora Dougl., Hook. (= *Schizocarya micrantha* Spach).

suffrutescens Moç., Sess., wenigstrauchige, 4. \S . k. Mexico.

tripetala Cav. (= *hexandra* Ortega).

Gauridium Kunthii Spach (= *molle* Spach), *mutabile* Spach, v. *Gaura mollis* et *mutabilis*.

Gaya nutans Sweet, *occidentalis* Sweet, v. *Sida nutans* et *occidentalis*, — *Gaya platyphylla* Spgl., v. *Seringia platyphylla*, p. 747.

Gaylussacia Humb., Blonpl., K. (= *Lussacia* Spgl.), (Gaylussac, ber. franz. Chemiker u. Physiker), X. 1., *Vaccinieae*.

cordifolia Mart. et Galeotti, herzblättrige, \S . t. Mexico.

dependens G. Don, herabhängende, \S . t. Peru.

Pseudo-Vaccinium Schldl. (= *Lussacia Vaccinium* Spgl.), heidelbeerähnliche, \S . t. Brasilien.

serrata Lindl. (= *Agapetes serrata* G. Don = *Thibaudia serrata* Wall.), sägezahnige, \S . \S . t. w. Ostindien.

Gazania G., Gazanie.

pinnata Less. (= *Arctotis asplenifolia* Burm. = *Gorteria incisa* Thbg. = *G. lyratopinnata* Poir. = *G. pinnata* Thbg. = *Mussinia incisa* W. = *M. pinnata* W.), gefiederte, 4. \S . k. Cap d. g. Hoffn.

rigens RBr. (= *Gorteria rigens* L. = *Melanchrysum rigens* Cass.), β) *heterophylla* Hort.

speciosa Less. (= *pectinata* Spgl. = *Gorteria pectinata* Thbg. = *G. rigens* Thbg., non L. = *Melanchrysum spinulosum* Cass. = *Mussinia speciosa* W.), prächtige, 4. \S . k. Cap d. g. Hoffn.

Geissomeria Lindl., Ziegelkelch.

fulgida Sweet (= *Ruellia fulgida* Andr., p. 705).

Geissorhiza Ker, Dachzwiebel.

ciliaris Salisb. (= *inflexa* Ker = *Ixia ciliaris* Salisb. = *I. inflexa* Delarb.).

scillaris Ker (= *Ixia ramosa* Ker = *I. phalangioides* R. et S. = *I. scillaris* Thbg., non L.), scillaähnliche, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.

Gela lanceolata Lour., v. *Ximenia lanceol.*, *oblongifolia* Cunn., v. *Acronychia oblongifolia*, p. 8, II.

- Gelasine** Herb., Gelasine, III. 1., (XVI. 1.), Irideae.
azurea Herb., azurblaue, 4. Zw. k. t. Banda oriental.
- Gendarussa** N. E., Adhadota Steud., *debilis* N. E.,
furcata N. E. (= *Diptanthera furcata* Schrk.), ven-
triosa N. E., *vulgaris* N. E., v. *Justicia*, Sect. V.,
 p. 434 etc.
Genesiphylla asplenifolia L'Her., v. *Phyllanthus*
speciosus, p. 620¹).
- Geniosporum** Benth., Bartsaame, XIV. 1., Labiatae.
prostratum Benth. (= *Elsholtzia ocymoides* Lam. =
Lumnitzera prostrata Spgl. = *Mentha ocymoides* P.
 Spgl., p. 285 = *Ocimum menthoides* Burm., L. fil.
 = *O. prostratum* L. = *Thymus indicus* Burm.),
 gestreckter, 4. w. Ostindien.
- Geniostoma** Forst., Bartmund, V. 1., Contortae-Lo-
 ganiaceae.
ligustrifolium A. Cunningh. (= *rupestre* A. Rich., non
 Forst. = *Aspilotum laevigatum* Banks et Soland.),
 ligusterblättriger, 5. t. k. Neuzeeland.
- Genista** L., Ginster.
albida W., weifslischer, 5. f. Taurien, Bessarabien.
amsantica Tenore (= *anxantica* Auct. = ? *januensis* Ber-
 tolone), amsantischer, 5. f. Neapel.
anglica L. (= *britannica* Hort. = *minor* Lam.).
aspalathoides Lam. (= *Cytisus aspalathoides* Spgl. =
Spartium aspalathoides Dsf.), witschenähnlicher, 5. k.
 Nordafrika.
canariensis L. (= *Cytisus paniculatus* Loisel. = *ra-*
mosissimus Poir. = *Spartium albicans* Cav.).
 β) *Atleeana* Harrison.
candicans L. (= *canariensis* Bot. reg. = *Cytisus can-*
dicans L. = *C. pubescens* Mch.).
carinalis Griseb. (= *micrantha* et *incerta* Frivalds.),
 nachenförmiger, 5. f. b. Macedonien, Thracien.
elata Wender. (= ? *virgata* W., non DC. = *tinctoria*
 L. var. Auct. = *sibirica* Mch. et Hort., nec L.), er-
 habener, 5. f. ?
Gasparinii Presl, Gasparini's, 5. f. b. k. Corsica, Sar-
 dinien, Sicilien.
humilis Tenore (= *depressa* Tenore, nec MB. = *Te-*
norii Steud.), niedriger, 5. f. b. k. Neapel.
Morisii Colla, Steud. (= *microphylla* Moris, non DC.
 = *parvifolia* G. Don), Moris's, 5. k. f. b. Sardinien.
multibracteata Tausch (= *sibirica* Hort.), vieldeckblät-
 teriger 5. f. ?
nodosa Tausch, knotiger, 5. f. b. Oestr. Litorale.
numidica Spach, numidischer, 5. k. Numidien.
parviflora Brotero (non DC.) (= *Broteri* Poir.).
pulchella Visian., schöner, 5. f. b. Dalmatien.
radiata Scop. (= *Cytisus radiatus* K. = *Spartium*
radiatum L.).
scariosa Vivian. (= *januensis* Bertol. = *genuensis* P.²).

1) *Genethyllis* DC., Myrtaceae, *citriodora* Endl. (= *Heda-*
roma latifolium Lindl.), *diosmoides* DC., *pinifolia* Schauer (= *Hedaroma*
pinifolium Lindl.), *thymoides* Schauer (= *Hedaroma*
thymoides Lindl.), *vestita* Endl. Sämmtlich 5. b. und im westl.
 Neuholland heimisch, scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu
 werden.

2) Die übrigen Synonyme sind auszuschliessen, vergl. p. 349.

Genista

triangularis W. (= *triquetra* W. K.), dreikantiger, ♀.
f. b. Banat.

tricuspidata Dsf. (= *hirsuta* Vahl var. Lk. = *Spartium tricuspidatum* Dsf.), dreispitziger, ♀. k. Nordafrika.

triquetra L'Her., Ait. (? = *Spartium triquetrum* Lam.).

versiflora Tausch (= *triangularis* Hort.), wendigblumiger, ♀. f. ?

virgata DC. (= *gracilis* Poir. = *Spartium virgatum* Ait. = *Cytisus tener* Jacq.).

monosperma Lam. (= *Spartium monospermum* L.),
v. *Retama monosperma*, *racemosa* Hort. et *parviflora* DC., v. *Cytisus chrysobotrys* et *parviflorus*,
p. 185, II.

Genistella racemosa Mch., v. *Genista sagittalis*.

Genistoides elata Mch., *linifolia* Mch., *tinctoria* Mch.,
tuberculata Mch., v. *Genista elata*, *linifolia*, *tinctoria*
et *pilosa*.

Genlisia corymbosa Rchb., v. *Witsenia corymbosa*,
p. 858.

Genosiris fragilis LaBill., v. *Patersonia glauca*, p. 591.

Gentiana T., Enzian.

acaulis L. (= *grandiflora* Lam. = *excisa* K. = *Ciminalis acaulis* Borkh.), β) *angustifolia* Vill., γ) *alpina* Vill. (= *excisa* Presl).

acuta Mchx. (= *Amarella* Richards. = *plebeja* Bunge = *Ericala acuta* G. Don), spitzblättriger, ☉. f. Nordamerika.

Amarella L. (= *pratensis* Fröl. = *Eurythalia Amarella* Borkh. = *E. pratensis* G. Don), β) *uliginosa* W., γ) *axillaris* Rchb. (= *lancifolia* Rafn. = *tetragona* Mayer), δ) *pyramidalis* W. (= *obtusifolia* Fr.).

Andrewsii Griseb. (= *Saponaria* Fröl. excl. syn. Vahl), Andrew's, 4. f. Nordamerika.

β) *linearis* Griseb. (= *Catesbaei* Andr.).

aquatica L. (= *Ledebourii* Rchb. = *Ericala aquatica* G. Don), Wasser-E., ☉. ♂. f. Altai, Nordchina.

asclepiadea L. (= *Coilanthus asclepiadea* G. Don), d) fl. albo.

aurea L., ☉. (nicht 4).

Burseri Lapeyr. (= *Coilanthus Burseri* G. Don), β) *Villarsii* Griseb. (= *punctata* Vill. = *macrophylla* Bertol., nec Pall. = *Burseri-punctata* Griseb.).

campestris L., β) *montana* Griseb. (= c. β *chloraefolia* Mey.), γ) *Columnae* Tenore.

* *chloraefolia* N. E. (campestri-germanica).

clavata Bot. mag. (= *Pneumonanthe intermedia* G. Don), keulförmiger, 4. f. Nordamerika.

conferta Fisch. (= *Eurythalia conferta* G. Don), gedrängter, ♂. f. Altaisch. Sibirien.

decumbens L. Suppl. (= *adscendens* Pall. = ? *daurica* Fisch. = *Dasystephana adscendens* Borkh.), niederliegender, 4. f. Altaisch. Sibirien.

β) *Gebleri* Ledeb.

detonsa Rottb. (= *ciliata* et *serrata* Gunn. = *Gentianella serrata* Borkh. = *G. detonsa* G. Don), bärtige, ☉. f. Lappland, Island, Görnland, Nordam., Sibirien.

β) *barbata* Froel. (= *Gentianella barbata* G. Don), γ) *simplex* Bunge.

frigida Haenke, β) *algida* Pall.

Gentiana

- Froelichii Jan (= *caulescens* Lam. = *angustifolia* Sturm., Rchb., non Vill.).
- germanica W., β) minor Mey. (= *obliqua* N. E. = *uniflora* W. = *compacta* Hegetschw. = *Eurythalia uniflora* G. Don), γ) *præcox* Griseb. (= *obtusifolia* W. = *flava* Merat = *spathulata* Bartl. = *montana* N. E. = *pyramidalis* N. E. = *crispata* Vis. = *aspera* Hegetschw. = *Eurythalia obsusifolia* G. Don), δ) *caucasica* MB. (= *collina* Adams = *oppositifolia* Zawadski = *Biebersteinii* Bunge = *Eurythalia caucasica* G. Don).
- glauca Pall. (= *caespitosa* Grah.), blaugrüner, 4. f. Kamtschatka.
- livonica Eschscholtz (= *lancifolia* Bess.), liefländischer, \odot . f. Lithauen, Liefland.
- lutea L., Hybriden von lutea, punctata u. purpurea nach Grisebach: * *biloba* DC. (punctato-lutea Griseb.), ** *Charpentieri* Thom. (luteo-punctata Griseb.), *** *hybrida* Vill. (pannonico-lutea Griseb. = *Asterias hybrida* G. Don), **** *purpurascens* Griseb. (= *Thomasii* β Gaud. = *hybrida secundaria* Griseb.), ***** *rubra* Clairv. (purpureo-lutea Griseb. = *Thomasii* Gilabog = *hybrida* DC. = *campanulata* Reyn.).
- ochroleuca Fröl. (= *villosa* L. = *Saponaria* Walt., non L. = *Pneumonanthe ochroleuca* G. Don = *P. villosa* Schm.), Hybriden: * *incarnata* Sims (Saponario-ochroleuca Griseb.), ** *intermedia* Sims (Andrews-ochroleuca Griseb.), *** *heterophylla* Rafin.
- pannonica Scopol. (= *purpurea* Schrk., Vill. = *punctata* Jacq., non L. = *semifida* Hffg.).
- prostrata Haenke (= *bavarica* L. var. Whlbg. = *Eri-coila prostrata* Borkh.), gestreckter, \odot . f. Tyroler, Kärnthner, altaische, nordamerikanische Alpen, Magellanische Meerenge.
- Pseudo Pneumonanthe R. et S. (= *Pneumonanthe Michauxii* et *Pseudo-Pneumonanthe* G. Don = *G. Saponaria* β *linearis* Griseb. = *G. Pneumonanthe* Mchx. = *puberula* Mchx. = *Ericalia linearis* G. Don), unächte, 4. f. Nordamerika.
- punctata L., * *Gaudiniana* Thomas (punctato-purpurea Griseb. = *pannonica* Schlecht., non Scopol. = *spuria* Lebert), Gaudin's, 4. f. Südl. Schweiz.
- verna L., β) *heterophylla* Vill., γ) *alata* Griseb. (= *angulosa* MB. = *discolor* Hffg.).
aurea Thbg., v. *Sebaea aurea*, p. 737, *carinthiaca* Fröl., v. *Pleurogyne carinthiaca*, *exacoides* L., v. *Belmontia cordata*, p. 64, *exaltata* Juss. (= *con-nata* W. herb.), v. *Eustoma exaltatum*, p. 239 II., *perfoliata* L., v. *Chlora perfoliata*, p. 191, *verticillata* L. et *verticillaris* Retz, v. *Hippion verticillatum* et *hyssopifolium*, p. 491, *viscosa* Ait., v. *Ixanthus viscosus*.
- Geonoma W., Erdpalme.
- Pohlina Mart., Pohl's, ξ . w. Brasilien.
Geophila pyrenaica Berger, v. *Bulbocodium montanum*, p. 81, II.
Georgina (= *Georgia* Spgl.) *Cervantesii* Sweet etc., v. *Dahlia Cervantesii* etc., p. 186, II.

- Geracium** Rchb., *aureum* Rchb., *chondrilloides* Rchb., *incarnatum* Rchb., *lapsanoides* Rchb., *paludosum* Rchb., *parviflorum* Rchb., *praemorsum* Rchb., *succisaefolium* Rchb. (= *croaticum* Rchb.), v. *Crepis aurea*, Jacquini, *incarnata*, *lampsanoides*, *paludosa*, Frölichiana, *praemorsa*, *succisaefolia*, p. 229 et 230, et p. 167, II., — *cydoniaefolium* Rchb., *prenanthoides* Rchb., v. *Hieracium cydoniaefolium* et *prenanthoides*, p. 399 et 400.
- Geranium** T., L'Her., Storchschnabel.
affine Ledeb., ähnelnder, 4. f. Altaisch. Sibirien.
albiflorum Ledeb. (= *baicalense* Turczan.).
altaicum Hort., altaischer, 4. f. Altai.
amethystinum Ledeb., amethystfarbiger, 4. f. Caucasus.
angulatum Curt. (= *venosum* P.), kantiger, 4. f. Thracien.
asphodeloides Burm. (= *orientale* Mill.).
bifolium Patrin. (= *laetum* Ledeb.).
Briceanum Sweet (= *Robertianum pinodorum* DC.), Brice's, ☉. f. Nordamerika.
brutium Gasparini (= *villosum* Rchb., non Tenore), calabrischer, ☉. f. Calabrien.
Donianum Sweet (= *multifidum* Don, nec Alior.), Don's, 4. k. Nepal.
Endressii Gay, Endress's, 4. f. Pyrenäen.
erianthum DC., Lindl. (= ? *Richardsonii* Fisch. et Trautv.), wollblumiger, 4. f. Nordwestl. Amerika.
Hookerianum Walp. (= *albiflorum* Hook., nec Ledeb.), Hooker's, 4. f. Nordamerika (Rockymountains).
leiocaulon Ledeb., glattstengeliger, ☉. f. Talytsch.
linearilobum DC. (= *tuberosum* MB. = *tuberosum* var. *sibiricum* W.), gleichbreitzipfeliger, 4. Kn. f. Caucasus, Sibirien.
multifidum Sweet, vieltheiliger, 4. k. t. Cap d. g. H.
nemorosum Tenore, hainliebender, 4. f. Neapel.
psilostemon Ledeb., dünnhaarfadiger, 4. f. Caucasus.
rubifolium Lindl., brombeerblättriger, 4. f. b. k. Himalayagebirge.
Schiedeanum Schtdl., Schiede's, 4. k. Mexico.
tuberosum L., Kn., β) ramosum Lindl.
villosum Tenore, zottiger, 4. f. Neapel.
 Unbestimmtere: *declinatum* Mch. 4., *micranthum* Hort., *montanum* Rausch. Sibir., *rubellum* Mch. ? Wender.
Gerascanthos vulgaris Mart., v. *Cordia Gerascanthus*, p. 218.
- Gerbera** Gronov., Gerbera.
asplenifolia Spgl. (= *Linnaei* Cass. = *Arnica Gerbera* L. = *Doronicum asplenifolium* Lam.), strichfarnblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Gerontogea Deppeana Lk. et Otto, v. *Hedyotis Deppeana*.
- Geropogon** glaber L. (= *australis* Spgl.), *G. calyculatus* Jacq. (= *hirsutus* All.), v. *Scorzorera hirsuta*, p. 735, *hirsutus* L. v. *Tragopogon hirsutus*.
Geryonia cordifolia Schrk., *crassifolia* Schrk., v. *Saxifraga*, Sect. I., p. 724.
- Gesneria** Plum., Mart., Gesnerie.
aggregata Ker (= *pendulina* Lindl.).
canescens Mart., grauliche, 4. Kn. w. Brasilien.
caracasana Otto et Dietr., caracasansische, ♀. 4. Kn. w. Caracas.
cochlearis Hook., löffelförmige, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

Gesneria

Deppeana Schltl. (= *elongata* var. Grah. = *quaterniflora* Moç., Sess.), Deppe's, 4. ♀. Kn. w. Mexico.

Douglasii Lindl. (= *maculata* Mart. = *verticillata* Hook.),
β) *verticillata* Hort., γ) *thyrsoides* v. Houtte.

flavo-virens N. E., Mart., gelbgrüne, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

Gardneriana Hook., Gardner's, 4. ♀. Kn. Brasilien.

Geroldtiana Kunth et Bouché, Geroldt's, 4. ♀. Kn. w. Mexico.

Houttei Dumort., van Houtte's, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

lasiantha Zuccar., haarblumige, 4. ♀. Kn. w. Mexico.

lateritia Lindl. (= *Sellowii* H. angl. non Mart.).

longifolia Lindl., langblättrige, 4. ♀. Kn. w. Guatemala.

macrorrhiza Dumort., großwurzelige, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

macrostachya Lindl. (= *latifolia* Mart.).

Merckii Wendl. jun. (in Otto et Dietr. Gartenzeitung),

Merck's, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

mollis H. B. K. (= *lanata* Hort.), weichblättrige, 4.

♀. Kn. w. Neugranada, Caracas.

polyantha DC. (= *discolor* Lindl.), vielblumige, 4. ♀.

Kn. w. Brasilien.

reflexa Know. et Westc., zurückgebogene, 4. k. Kn. w. Chili.

Schiedeana Hook. (= *spicata* β *Schiedeana* DC.),

Schiede's, 4. ♀. Kn. w. Mexico.

Schomburgkii Kunth et Bouché, Schomburgk's, 4. ♀.

Kn. w. Guiana.

splendens Klotzsch, schimmernde, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

stricta Hook., Arn., steife, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

tribractea Otto et Dietr., dreideckblättrige, 4. ♀.

Kn. w. Brasilien.

trifoliata Mart., dreiblättrige, 4. ♀. Kn. w. Südamerika.

tuberosa Mart. (= *rupestris* Grah., non ? Paxt.), knol-

lige, 4. ♀. Kn. w. Brasilien.

tubiflora Cavan. (= ? *albiflora* Hort.).

uniflora Moç., Sess. (= ? *pendulina* Lindl.), einblumige,

4. ♀. Kn. w. Mexico.

zehrina Paxt., Lindl., scheckige, 4. ♀. Kn. w. Südamerika¹⁾.

Außerdem sind in den Pflanzen-Catalogen verschiedener Gärten, noch nachstehende (zum Theil wohl Hybriden) verzeichnet: *Bethmanni*, *digitaliflora*, *fulgentissima*, *Herbertiana*, *hislapiana*, *hybrida*, *montevidensis*, *oblongata*, *palustris*, *placentifera* Lodd., *Tweediana*.

barbata N. E., Mart., v. *Tapina barbata*, *calycina*

Sw., *Craniolaria* Sw., *ventricosa* Sw., v. *Conradia*

calycina etc., p. 157, II., *crenulata* DC. fil., *prasi-*

nata Ker, *tomentosa* L., v. *Rytidophyllum crenula-*

tum etc., *pulchella* Sw., v. *Achiomenes coccinea*,

p. 6, II. — *acaulis* L. (= *Conradia Sloanei* DC)

et *humilis* L. (= *Conradia humilis* Mart.), schei-

nen nicht kultivirt zu werden.

Gesnouinia Gaudich., Gesnouinie, XXI. IV., Urticaceae.

arborea Gaudich. (= *Böhmeria rubescens* Jacq, p. 126

= *Parietaria arborea* Ait. = *Urtica arborea* L. Suppl.),

baumartige, ♀. k. Canarische Inseln.

1) Walpers (Repertor. Botanic. systemat.) stellt folgende als Abarten zu *G. bulbosa* Ker: α) *dentata* Hornsch, β) *macrorrhiza* Dumort., γ) *Suttoni* Booth, δ) *lateritia* Lindl., ε) *fascialis* Lindl. (= *fascialis* Hook.), ζ) *Cooperi* H. Woburn., η) *Houttei* Dumort., θ) *Merckii* Wendl., ι) *magnifica* Otto et Dietr., κ) *splendens* Kl.

Gethyra occidentalis Salisb., v. *Alpinia occidentalis*, p. 38.

Geum L., Nelkenwurz.

canadense Murray (= *hirsutum* Mühlbg., Lk., Enum.), canadische, 4. f. Nordamerika.

geniculatum Mchx., gelenkige, 4. f. Nordamerika.

intermedium Ehrh. (= ? *brachypetalum* Seringe = *urbano-rivale* Schiede), ♂) *dubium* Hornem.

japonicum Thbg., japanische, 4. f. b. k. Japan.

nutans Rafin. (= *Rafinesqueanum* Steud.).

obliquum Steud. (= *Caryophyllata obliqua* Mch. = *Waldsteinia Mönchii* Tratt.), schiefe, 4. f. ?

pyrenaicum Ramond (= *nutans* Lam. = *inclinatum* Schlehr. = *sudeticum* Tausch).

strictum Ait. (= *aleppicum* Jacq. = *Besserianum* Sweet = *Fischeri* Bess. = *heterophyllum* Fisch. = *hispidum* Fries. = *intermedium* Bess., MB. = *ranunculoides* Sering. = *rugosum* Dsf.), steife, 4. f. Nordamerika, Sibirien, Vollanden, Schweden.

Thomsonianum Sering., Thomas's, 4. f. Pyrenäen.

virginianum L. (= *canadense* Jacq., non Murray = *heterophyllum* Dsf. = *laciniatum* Murray).

Geunsia rosea Moç., Sess., v. *Calandrinia caulescens*, p. 145.

Gilia R. et Pav., Gilie ¹⁾.

I. *Collomioides* Endl. (= *Hügelia* Benth. = *Welwitschia* Rchb., p. 856).

densifolia Benth. (= *Hügelia* Steud. = *H. densifolia* Benth.).

elongata Steud. (= *Hügelia elongata* Benth.).

gossypifera Gill. (= *Douglasii* Gill.), wolltragende, ? 4. k. Mendoza. (Wohl kaum kultivirt).

virgata Steud. (= *Hügelia virgata* Benth. = *W. virgata* Rchb.).

II. *Pseudocollomia* Benth.

lutescens Steud. (= *H. lutea* Benth. = *W. lutea* Rchb.).

III. *Eugilia* Benth., p. 356.

congesta Hook., gedrängtblumige, 4. f. b. k. Nordwestl. Amerika.

crassifolia Benth., dickblättrige, ♂. f. Chili, Mendoza.

foetida Gill., stinkende, 4. k. Mendoza. (Kaum kultiv.).

incisa Benth., schlitzblättrige, ♂. ♂. k. f. Texas. (Ob kultivirt?)

millefoliata Fisch. et Mey., garbenblättrige, ♂. f. Neucalifornien.

multicaulis Benth. (= *achilleaeifolia* Lindl., Hook., Swt., non Benth.).

rigidula Benth., starre, ♂. 4. k. Texas. (Kaum kultiv.).

Die übrigen s. p. 356.

IV. *Ipomopsis* Mchx., Benth. (= *Ipomeia* Nutt., p. 356).

aggregata Speg. (= *Cantua aggregata* Pursh = *Ipomeia aggregata* Nutt.), angehäuftblumige, ♂. k. Nordamerika.

Beyrichiana Bouché.

coronopifolia P. (= *Polemonium rubrum* L. = *Ipomoea rubra* L. = *Cantua thyrsoides* Juss. = *C. pinna-*

1) Nach Bentham in DeCandolle prodrom. s. n. r. veget. IX. p. 310 seq.

Gilia

tifida Lam. = *C. coronopifolia* W. = *C. elegans* Poir. = *Ipomopsis elegans* Mchx. Sm. = *Ipomeria coronopifolia* Nutt.).

glomeriflora Juss. (= *Collomia Cavanillesiana* G. Don = *Phlox pinnata* Cav.), knaulblumige, ♂. ? 4. k. Mexico, Neuspanien, Buenos Ayres. (Ob kultiv. ?).

pulchella Dougl. (= *aggregata* Swt. = *Ipomopsis elegans* Lindl., non Mchx.).

floridana G. Don (= *Cantua floridana* Nutt.), ♂. Florida, *longiflora* G. Don (= *Cantua longiflora* Torrey), ☉. Nordam. (Rocky mountains), *sinuata* Dougl., ☉. Nordwestl. Amerika, werden wohl kaum kultivirt.

V. *Dianthoides* Endl. (= *Fenzlia* Benth.).

dianthoides Endl. (= *Fenzlia* Steud. = *Fenzlia dianthiflora* Benth., p. 330).

VI. *Linanthus* Endl., Benth.

dichotoma Benth. (= *Linanthus* Steud. = *L. dichotomus* Benth., p. 464).

VII. *Dactylophyllum* Benth., Endl.

linifolia Benth., *pharnaceoides* Benth., *pusilla* Benth., v. p. 356.

VIII. *Microgilia* Benth.

minutiflora Benth., winzigblumige, ☉. f. Nordwestamerika¹⁾. (Kaum kultivirt).

IX. *Leptosiphon* Endl., Benth.

androsacea Steud., *densiflora* Benth. (= *Leptosiphon* Steud.), *grandiflora* Steud., *lutea* Steud., *micrantha* Steud. (= *L. parviflorus* Benth.), v. p. 455.

X. *Leptodactylon* Hook. et Arn., Benth.

californica Benth. (= *L. californicum* Hook.), 4. Nordwestl. Amerika, *Hookeri* Benth. (= *Phlox Hookeri* Dougl.), Neucalifornien, *pungens* Benth. (= *Cantua pungens* Torrey = *Aegoglochoa Torreyi* G. Don), ? 4. Nordamer. (Rocky mountains), scheinen in unseren Gärten noch nicht eingeführt.

Hinsichtlich der übrigen siehe *Navarretia*.

Gilibertia R. et P. (J. E. Gilibert, ehem. Prof. der Naturgesch. zu Wilna †), ? VIII. 1., Araliaceae.

? *dentata* (Makoy) (= *Gastonia dentata* Makoy), gezahnte, ♀. w. ? Ostindien.

palmata DC. (= *Aralia palmata* Speg. = *Hedera palmata* Wall. = *Gastonia palmata* Roxb., p. 346).

Gilibertia heterophylla W., v. *Quivisia heterophylla*, p. 674.

Ginginsia DC. (Baron F. de Gingins Lassaraz, franz. Botaniker), V. III., Portulacaceae-Paronychieae.

albans DC. (= *Pharnaceum albans* Thbg. = ? *P. lineare fl. albo* Andr.), weißliche, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

aurantiaca DC. (= *Pharnaceum lineare* Ait., non Thbg.), orangefarbige, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

elongata DC. (= *Pharnaceum incanum* L. mant., p. 613 = *Pharnaceum lineare* Andr.), verlängerte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

pruinosa G. Don (= *Pharnaceum pruinosa* Haw., p. 613).

1) „Species a *Dactylophyllis* generice non removenda, nisi omnes *Giliae* sectiones pro genera haberes,“ Benth. l. c.

Ginoria Jacq. (= *Ginora* L. = *Genora* P.), Ginorie, XI. 1., Lythrarieae (Salicariae).

americana L., Jacq., amerikanische, 5. w. Cuba.

flava Moç., Sess., v. *Heimia salicifolia*, p. 380.

Gissonia collina Salisb., v. *Leucadendron plumosum*, p. 458. — *Githago segetum* Dsf. et β) *nicaeensis* W., v. *Agrostemma Githago*, p. 25.

Gladiolus T., Siegwurz.

aequinoctialis Lindl., *aequinoctiale*, 4. Zw. k. t. Sierra Leon.

affinis P. (= *cuspidatus* β Andr.), ähnelnde, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

aphyllus Ker, blattlose, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

aristatus Schrank, begrannete, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

bockfeldensis Herb., bockfeldische, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

brevifolius Jacq. (= *amoenus* Bank's = *carneus* Andr.

= *hirsutus* var. *a* β Ker = *tristis* var. Thbg. =

villosiusculus Bank's), kurzblättrige, 4. Zw. k. f. b.

Cap d. g. Hoffn.

Breynianus Ker (= *versicolor* β *inaequalis* Ker), Breyn's,

4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

communis L., β) *italicus* Mill. (= *dalmaticus* Tausch),

γ) *leucanthus* Bouché (= *fl. albo* Hort.), δ) *pallidus*

Bouché (= *carneus*, *fl. roseo* Hort.).

discolor Schrank, verschiedenfarbige, 4. Zw. k. f. b.

Cap d. g. Hoffn.

elatus Balb., hohe, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

excelsus Ker (= *blandus* δ *excelsus* Bot. mag.), sehr

hohe, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

expallescens Schrk. (= *floribundus* Jacq. var. ? Schrk.),

verbleichende, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

fasciatus R. et S. (= *vittatus* Hornem.), bebänderte,

4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

flabellifer Tausch, fächerförmige, 4. k. f. b. Cap d. g. H.

gracilis Jacq. (= *debilis* Sims = *recurvus* W.E. Suppl.

= *punctatus* β Banks, Soland.).

gramineus Hornem., grasblättrige, 4. k. f. b. Cap d. g. H.

Gueinzii Kunze, Gueinzius's, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

hirsutus Jacq., β) *roseus* Ker, Andr. (= *rubro marginatus*

Schrad. = *Watsonia amoena* β *rosea* P.), γ) *Merianellus*

Thbg. (= ? *biflorus* Curt. = *Watsonia humilis* P. = ?

Merianella Eckl.), γ) *Orobanche* DC.

hyalinus Jacq. (= *strictus* Jacq., non Ait.).

Jacquini Schrank (= *Merianus* var. Jacq.), Jacquin's,

4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

inflatus Thbg. (= *cuspidatus* Jacq. var. Ker = ? *blandus*

Ait. var. = *tristis violaceus* Thbg.), aufgeblasene,

4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

ixioides Thbg. (= *longiflorus* Jacq., non L.), ixienähn-

liche, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

magnificus H. Berol., prächtige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

marmoratus Tausch (non Lam.), marmorirte, 4. Zw. k.

f. b. Cap d. g. Hoffn.

oppositiflorus Herb., gegenblumige, 4. Zw. k. t. Madagascar.

psittacinus Lindl., Hook., β) *sulphureus* H. belg.

recurvus L. (= *alatus* Schneev. = *carinatus* Ait. = *odorus*

Salisb. = *ringens* Andr. = *violaceus* P. = *punctatus* Jacq.).

scaber Lk. (= *gracilis* W. herb.), scharfe, 4. Zw. k.

f. b. Cap d. g. Hoffn.

setifolius L. fil. (= *gracilis* Jacq. var. Spgl.), borsten-

blättrige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. Hoffn.

Gladiolus

tenellus Jacq. (= *setifolius* β *flavus* P. = *tristis* var. *humilis et luteus* Thbg.).

umbellatus Schrank, doldige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

versicolor Andr., γ) tenuior Ker (= *suaveolens* Sweet).

vittatus Zuccar., bandstreifige, 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

vomerulus Ker, pflugschaarähnl., 4. Zw. k. f. b. Cap d. g. H.

Watsonia Jacq, Thbg. (= *praecox* Andr. = *recurvus*

Houtt. = *Antholyza revoluta* Burm. = *Watsonia*

praecox P. = *W. revoluta* P.).

Hybriden:

Arenberghii H. belg., Candollii H. Belg., cardinalis ma-

ajor, Colvillii Sweet, delicatus Herb. (recurvo-blandus),

fragrans Herb. (recurvo-tristis), gandavensis H. belg.

(oppositifloro-psittacinus), Gretry, Haylockianus Herb.

(versicolori-blandus), Herbertianus Sweet (tristi-Spof-

forthianus), Hermannianus H. belg., mitchamiensis

Herb. (tristi-hirsutus), propinquus Herb. (floribundo-

blandus), pudibundus Sweet, pyramidalis H. belg., ramo-

sus Hor. belg. et holl. (oppositifloro-cardinalis Herb.),

mit folgenden Varietäten:

Amélie, Amsterdam, Batavia, Beauté rouge, Belvédère,

Christianus, Dumont d'Urville, Eclatant, emicans,

Ernest Maltravers, Fanny Elsler, Feu brillant, formo-

sissimus, fulgens, gloriosus, Haarlem, Hendricus, im-

perialis, insignis, John Russel, Lafayette, Lehmann,

Lisette, Lord Palmerston, monstrosus, Pawlowna,

Prince Albert, Prince of Galitzin, Prince of Wales,

Princesse Sophie, Queen Bess, Queen Victoria, Re-

gina, reticulatus, Robin hood, Rosa mundi et superba,

rouge clair et éblouissant et royal, speciosus, splen-

dens, unique rouge, Van Dam van Isselt, van Hall,

vitellinus, Wilhelmus, William II., — reine de Belges,

rigidus Herbert (tristi-blandus), Salmianus, Schwar-

zenbergianus, Spofforthianus Herb. (blando-cardinalis),

? superbus Fisch., vividus etc. — Baron de Pronay,

Lowii, Pfeifferi.

alopecuroides L. (= ? *micranthus* Schrank = *plan-*

tagineus P.), v. *Miranthus alopecuroides*, *flavus*

Ait. etc., v. *Montbretia flava* etc., *orchidiflorus* Andr.

etc., v. *Hebea orchidiflora* etc., *tubulosus* Jacq. (=

aletroides Vahl = *Merianus* Thbg.), v. *Watsonia*

aletroides, p. 855.

Glaucium T. G., Hornmohn.

persicum DC., persischer, ♂. f. Persien.

Gleditschia L., Gleditschie.

heterophylla Bunge, verschiedenblättrige, β . f. Nordchina.

macracantha Dsf. (= *Fontanesii* Spach).

micracantha Lodd., kleindornige, β . f. ?

triacanthos L. (= *meliloba* Walt. = *spinosa* Duh.), β)

inermis DC. (= *laevis* Hort.), γ) *latisiliqua* Hort.,

δ) *flava* Hort.

Glinus L., Glinus.

Mollugo Fenzl (= *Pharnaceum Mollugo* L. mant., p. 613).

Gliricidia sepium Kunth, v. *Lonchocarpus sepium*,

p. 475.

Globba L., Globba.

maculata Blume, gefleckte, 4. w. Java.

saltatoria Roxb. (= *mantifera* Hort. = *Mantisia sal-*

tatoria Sims).

Glochidion Forst., Widerhackler, XVI. i., (XXI. x.),
Tricoccae-Euphorbiaceae.

? *laurifolium** (= *Bradleja laurifolia* H. Cels.), lorbeerblättriger, f. w. ?

nitidum (Roxb.) (= *Bradleja nitida* Roxb.), glänzender, f. w. Ostindien.

sinicum Hook., Arn. (= *Bradleja sinica* G.), chinesischer, f. w. China.

Gloriosa nepalensis Lindl., *simplex* L., *superba* L. etc., v. *Methonica nepalensis* etc.

Glossarrhen floribundus N. E., Mart., *mexicanus* Steud., *pauciflorus* N. E., Mart., v. *Schweiggeria floribunda*, *mexicana*, *pauciflora*.

Glossogyne Cassin., Zungenweibchen, XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

chinensis Cassin. (= *Bidens chinensis* W., p. 121), chinesisches, c. f. China.

Gloxinia L'Her., Gloxinia.

I. *Eugloxinia* DC. (Genuina).

arborea Colla, baumartige, f. Kn, w. ?

caulescens Lindl. (= *Martynia caulescens* Dsf.), b) *grandiflora* Hort.

cerina v. Houtte, wachsähnliche, 4. Kn. w. Südamerika.

discolor Kunze et ? H. Cels. (= *speciosa* var. DC.), verschiedenfarbige, 4. Kn. w. ? Brasilien.

macrophylla N. E., Mart, b) *variegata* Hort.

speciosa Lodd. (= *formosa* Hortul. = *Martynia speciosa* Hortul.), a) *albiflora* Hook. (= *alba* Hort. = *candida* Hort.), b) *alba maxima* A. P. (= *candidissima* Hort), c) *bicolor* Bot. reg., d) *Cartoni* Bot. reg.,

e) *coelestina* Hort., f) *digitaliflora* Knigth et Rolliss., g) *grandiflora* Hort., g^b) *Handleyana* Harris. (*rubroalba*), h) *incarnata* Hort., i) *insignis* H. angl., k) *magnifica* H. angl., l) *maxima* Hort.), m) *Menziesii* Hort.,

n) *pallida maxima* A. P., o) *Pressii* Hort., p) *praecellentissima* H. Monac., q) *Priestleyana* Hort., r) *rosalba* H. belg., s) *rubra* Hort. et b) *rosea*, t) *violacea*

A. P., u) *Youngii* H. angl.

* *hybrida carnea* Möhring (*specioso-rubra-Helleri*).

II. *Sinningia* N. E., Lindl.

Lindleyi Schauer (? = *Gesneria calycina* Sw. = *Sinningia Helleri* Lindl., non Mart.), Lindley's, f. w. Brasilien.

III. *Houttea** (van Houtte, Besitzer eines reichen Gartenetablissements etc. in Gent).

tubiflora Hook., röhrenblumige, 4. f. w. Südamerika, (? Buenos Ayres).

G. calycina Hort., v. *Conradia calycina*, p. 157, II.

Glyceria RBr., Süßgras.

I. *Catabrosa* P. B.

aquatica Presl (= *airoides* Rchb. = *Colpodium aquaticum* Trin. = *Hydrochloa aquatica* Hartm. = *Poa airoides* Koel. = *P. dulcis* Salisb.).

Engelmanni (Lk.), Engelmann's, 4. f. Nordamerika.

humilis (Trin.) (= *Aira humilis* MB. = *Colpodium bulbosum* Trin.).

scabra (Kunth) (= *Aira scabra* Zuccag.), scharfes, 4. f. ?

viridula (R. et S.) (= *Aira scabra* Hort. = *A. viridula* Poir.).

minuta Trin., v. *Airopsis minuta*, p. 26.

Glyceria

II. Euglyceria (Genuina).

acutiflora Torrey (= *brevifolia* Schult. = *Festuca bicornis* Schreb. = *F. brevifolia* Mühlbg.), spitzblumiges, 4. f. Nordamerika.

arundinacea Kunth (= *spectabilis* δ Trin. = *Hydrochloa arundinacea* Sweet = *P. arundinacea* MB.).

conferta Fr., gedrängtähriges, 4. Wa. f. Schweden.

*delawarica** Endl. Hort. Vindob. p. 49.

distans Wahlbg. (= *Aira aquatica* β Huds. = *Festuca distans* Kunth), β) *capillaris* Wahlbg. (= *Festuca capillaris* Liljebl = *Molinia capillaris* Hartm.).

*festucaeformis** (= *Festuca Hostii* Kunth = *F. palustris* Seenus = *Poa festucaeformis* Host).

fluitans RBr. (= *Festuca fluitans* L. = *Hydrochloa fluitans* Hartm. = *Poa fluitans* Scopol.), α) *poaeformis* Fr., β) *festucea* Fr., γ) *triticea* Fr.

maritima M. et K. (= *Diachroa maritima* Nutt. = *Festuca thalassica* Kunth = *Hydrochloa maritima* Hartm.), α) *palustris* Fr., β) *arenaria* Fr. (= *Poa arenaria* Trin. = *convoluta* Hartm. = *P. festucaeformis* Hort.).

Michauxii Kunth (= *nervata* Trin.).

pendulina Laestad., herabhängendes, 4. f. Schweden.

plicata Fries, gefaltetes, 4. Wa. f. Schweden.

remota Fr. (= *norwegica* Sommerf. = *Poa remota* Forselles), entferntähriges, 4. f. Norwegen, Schweden.

songarica Schrenk (= ? *Poa paradoxa* Karel. et Kiril., C. A. Mey.), songarisches, \odot . ? 4. Soongaria.

spectabilis M. et K. (= *aquatica* Wahlbg. = *Hydrochloa aq.* Hartm. = *Poa altissima* Mch. = *P. aquatica* L.), *arundinacea* Fr. (non Kunth), v. *Scolochloa festucea*, p. 734. Hiernach p. 360 et 361 zu berichtigen und zu ergänzen.

Glycine L., Glycine.

labialis L. Suppl. (= *anonychia* Walp. = *debilis* Ait. = *filiformis* Wall. = ? *pallens* Grah. = *parviflora* Lam. = *pentandra* Roxb. = *Bujacia anonychia* E. Mey. = *Teramnus labialis* et *parviflorus* Spgl.), lippenförmige, σ . δ . Sch. w. Ostindien.

americana Tenore, H. Par. (= *bracteata* L. = *monoica* L.), *comosa* L. (= *monoica* L. var. Auct.), *elliptica* Sm. (= *filosa* Hornem. = *heterocarpa* Hegetschw. = *monoica* Schk. = *sarmentosa* Roth), v. *Amphicarpaea comosa*, *monoica* et *sarmentosa*, p. 49, *Backhousiana* Hort. angl., *chineñsis* Curt, *rosea* Hort. belg., v. *Wistaria Backhousiana* etc., *clandestina* Wendl., v. *Leptocyanus clandestinus*, *hedysaroides* W. (= *pentandra* Spgl., non Roxb.), v. *Teramnus hedysaroides*, *humifusa* W., v. *Westonia humifusa*, *secunda* Thbg., v. *Rhynchosia secunda*. — *sagittata* H. B. K. (= *Centrosema hastatum* Benth.), scheint nicht kultivirt zu werden.

Glyciphylla hispidula Rafin., v. *Phalerocarpus hispidulus*, p. 612.

Glycosmis Correa, Süßbaum.

citrifolia Lindl. (= *parvifolia* Steud. = *Limonia citrifolia* W., p. 404 = *Limonia parvifolia* Sims).

madagascariensis H. Cels., madagascarischer, δ . w. Madagascar.

Glycyrrhiza T., Süßholz(wurzel).

astragalina Gill., tragantähnliches, ♀. k. Chili.

grandiflora Tausch (= *hirsuta* H. Prag.), großblumiges, 4. f. ?*triphylla* Fisch. et Mey., v. *Meristotropis triphylla*.**Gmelina** L., asiatica L. (= *lobata* G.).**Gnaphalium** Vaill., DC., Ruhrkraut.acuminatum Lk. (= *Helichrysum acuminatum* Don, p. 384).candidissimum Lam. (non MB.) (= *campestre* Schrank = *carroense* Schrank = *macilentum* E. Mey.), reinweißes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.cephaloideum W. (= *asteroides* Balb. ? = *globosum* Hornem. = *Willdenowii* Dietr. = *Filago cephaloidea* Lk.), kopfförmiges, ♂. 4. k. Neuholland.

citrinum Hook., citrofarbiges, ♂. k. Chili.

collinum LaBill. (= ? *cephaloideum* W. = *Euchiton collinum* Cass.), Hügel-R., ♂. k. Neuholland.confusum DC. (= *arenarium* Thbg. = *martabanicum* Wall. = *pallidum* Hamilt. = *Helichrysum affine* D. Don, p. 384) verwechseltes, ☉. f. m. Ostindien.Gaudichaudianum DC (= ? *decurrens* Schrank), Gaudichaud's, ☉. m. f. Brasilien.indicum L. (= *multicaule* W. = *pluricaule* Poir. = *polycaulon* P.), indisches, ☉. m. f. Ostindien, Chili.

β) chilense Fisch., Mey. et Lalleu.

involucratum Forst. (= ? *collinum* LaBill. = *globosum* Dsf., H. Par. = *hemisphaericum* Hornem. = *glomeratum* H. Par. = *sphaericum* W. = *Euchiton Forsteri* et *pulchellum* Cass.).lasiocaulon Lk. (= *Helichrysum lasiocaulon* Don, p. 185).luteo album L. (= *Helichrysum luteo album* Rchb.), β) depressum P. (= *Pompejanum* Tenore = *sphaericum* Perrott. = *trifidum* Thbg.), Europa, Asien, Afrika, Amerika, Neuholland.niliacum Raddi (= *spathulatum* Delil.), Nil-R., ☉. f. Aegypten.paniculatum Colla (= *Pira* s. *Vira Vira* Less. (non Mol. et DC)).pensylvanicum W. (= *americanum* Hortul. = *chilense* H. Par. = *Cruickshankii* plur. Hort.).polycephalum Mchx. (= *conoideum* Lam. = *obtusifolium* L.).Sprengelii Hook., Arn. (= *chilense* Spgl. = *decurrens* Hook. = *luteo-album* β *occidentale* Nutt.), Sprengel's, ☉. f. Californien, Oregongebiet.

suffrutescens Brotero, halbstrauchiges, ♀. k. ? Südamer.

velutinum Willd. herb., sammethaariges, ☉. f. ?

Vira-Vira Molin. (= *Pira-Vira* Less., excl. Synon.), Vira-Vira-R., ☉. f. Chili.

Unbestimmtere: australe Fisch. Neuholl., linarifolium Wendl., longifolium Hort., nitidum Hornem. ☉.

alpinum L., *carpathicum* Whlbg., *dioicum* L. etc.,v. *Antennaria alpina* etc., p. 62, *arborescens* L.,*asperum* Thbg., v. *Anaxeton arborescens* etc., p. 53,*arenarium* L. etc., v. *Helichrysum arenarium* etc.,p. 384 etc., *arvense* W. etc., v. *Filago arvensis*, p.334, *candidissimum* MB., v. *Cladochaeta candidis-**sima*, p. 148, II., *celosioides* H. B. K. et *flaccidum*Weinm. etc., v. *Achyrocline celosioides*, *flaccida* etc.,p. 7, II., *cynoglossoides* Trev. (= *nepalense* Hort.

Gnaphalium

= *perfoliatum* Wall. = *quintuplinerve* Hamilt.) et *margaritaceum* L., v. *Antennaria tripliervis* et *margaritacea*, p. 62, *diosmaefolium* Vent. (= *piluliferum* Hort.), v. *Ozothamnus diosmaefolius*, *divergens* Thbg. (= *glabrescens* Schrank), *fastigiatum* Thbg. etc., v. *Metalasia divergens*, *fastigiata* etc., p. 521, *legitimum* G., v. *Otanthus maritimus*, p. 573, *Leontopodium* Jacq., v. *Leontopodium alpinum*, p. 453, *modestum* Hook., *phlomoides* Lam., v. *Helipterum gnaphalodes*, *phlomoides*, p. 388, *spathulatum* Thbg. (= *spadiceum* Lam.), *squarrosum* L., v. *Leontonix spathulatus*, *squarrosus*, p. 453, *umbellatum* L., v. *Erythropogon umbellatum*, p. 316, *umbellatum* Schrk., v. *Metalasia muricata*, p. 521, *virgatum* L., v. *Pterocaulon virgatum*, p. 885. — Hiernach zu berichtigen und zu ergänzen, p. 362 et p. 878.

Gnephosis Cass., *Gnephosis*, XIX. II., *Compositae-Helichryseae*.

tenuissima Cass. (= *Podolepis divaricata* Cunningh.), feinste, ☉. m. f. Neuholland.

Gnidia L., *Gnidie*.

filamentosa L. fil. (= *Lachnaea buxifolia* Lam., p. 441), fadenförmige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *glauca* Sims (= *grandis* Hort. = *Lachnaea glauca* Salisb., p. 442).

grandiflora W. E. Suppl., großblumige, ♀. t. Cap d. g. H.

radiata L. (= *pinifolia* Lodd., non L.), strahlige, ♀. t.

Cap d. g. Hoffn.

sericea L. (= *oppositifolia* Andr., non L.).

tomentosa L. (= *pubescens* Berg. = *punctata* Lam.).

Godetia Spach (*Godet*, franz. Botaniker), VIII. I. *Onagraridae*.

albescens Lindl., weißliche, ☉. ♂. f. Columbia.

Bottae Spach (= *Oenothera Godetia* Steud.), Botta's, ☉. f. Californien.

Cavanillesii Spach (= *tenella* Spach = *Oenothera tenella* Cav., Swt., p. 555).

decumbens Spach (= *Oenothera decumbens* Dougl., 554).

Gayana Spach (= *Oenothera tenella* β *tenuifolia* Lindl. = *O. Gayana* Steud.), Gay's, ☉. f. Chili.

grandiflora Lindl., großblumige, ☉. f. Nordamerika.

Lehmanniana Spach (= *amoena* Sweet, Lilja = *roseoalba* Hort. = *Oenothera amoena* Lehm. = *O. roseoalba* Hornem., p. 555), Lehmann's, ☉. f. Californien.

lepida Lindl. (= *Oenothera lepida* Torr. et Gr.).

Lindleyana Spach (= *Oenothera Lindleyi* Dougl., p. 555 = *O. macrantha* Nutt.).

quadrivulnera Spach (= *Oenothera quadrivulnera* Dougl., p. 555).

Romanzowii Spach (= *Oenothera Romanzowii* Ledeb., Hornem., p. 555).

rubicunda Lindl. (= *Oenothera rubicunda* Torrey et Gr.), röthliche, ☉. f. Californien.

tenuifolia Spach (= *Oenothera tenuifolia* Cav., p. 555).

viminea Spach (= *Oenothera viminea* Dougl., p. 556).

vinosa Lindl. (= *macrantha* Lilja = *venosa* Hortul. = *Oenothera vinosa* Torrey et A. Gr.).

Godetia

Willdenowiana Spach (= *purpurea* Sweet = *Oenothera purpurea* Curt. W. = *humilis* Don = *Onagra purpurea* Mch.), Willdenow's, ☉. f. Westl. Nordamer. Hiernach p. 363 zu ergänzen.

Goepertia bicolor N. E. (= *Calathea bicolor* Steud.), v. *Maranta bicolor*, p. 496, *G. zebrina* N. E., v. *Calathea zebrina*, p. 145.

Goetzea Rchb., v. *Westonia*.

Goldfussia N. E., Goldfussie.

anisophylla N. E. (= *Ruellia anisophylla* Wall. = *R. amygdalaeifolia* Hort. = *persicifolia* Bot. reg.).

Dicksonii H. Cels., Dickson's, ♀. w. ?

glomerata N. E. (= *Ruellia glomerata* Wall.), knaulförmige, ♀. w. Ostindien.

Gomezia RBr., Gomezie.

chrysostoma Hffg., goldmundige, 4. w. Brasilien.

densiflora Hffg., dichtblumige, 4. w. Brasilien.

divaricata Hoffg., ausgesperrte, 4. w. Brasilien.

intermedia Hoffg., mittlere, 4. w. Brasilien.

multiflora Hoffg. (= *pauciflora* Hffg.), vielblumige, 4. w. Brasilien.

pyncantha Hffg., ballblumige, 4. w. Brasilien.

reclinata Hffg., zurückgebeugte, 4. w. Brasilien.

undulata Hffg., wellenförmige, 4. w. Brasilien.

virescens Hffg., grünliche, 4. w. Brasilien.

Gomphia Schreb., obtusifolia DC. (= *laevigata* Lodd.), *zeylanica* DC. (= *angustifolia* Vahl).

Gomphocarpus RBr., Nagelfrucht.

angustifolius Lk. (= *Asclepias angustifolia* W.), schmalblättrige, ♀. k. t. Mexico.

viridiflorus Spgl. (= *Acerates viridiflora* Ell. = *Asclepias viridiflora* Pursh), grünblumige, 4. f. Nordamer. *viridis* Spgl. = *Anantherix viridis* Nutt., scheint nicht kultivirt zu werden.

Gompholobium Sm., Nagelhülse.

aciculare Rchb. (= ? *ericoides* Hort.), nadelblättrige, ♀. t. Neuholland.

Drummondii H. Angl., Drummond's, ♀. t. Neuholland.

glaucescens Cunn. (= *grandiflorum* β *setifolium* DC. = ? *glaucum* H. Angl. = *setifolium* Sbr.).

Hendersonii Paxt., Henderson's, ♀. t. Neuh. (Schwanenfl.).

Hügelii Benth., Hügel's, ♀. t. Neuholland.

intermedium Makoy, mittlere, ♀. t. Neuholland.

Knightianum Lindl. (= *heterophyllum* Cunn.).

mucronatum Makoy, stachelspitzige, ♀. t. Neuholland.

polymorphum RBr. (= *grandiflorum* Andr. non Sm. = *sparsum* Cunn.).

splendens Low, schimmernde, ♀. t. Neuholland.

subulatum Benth., pfriemenförmige, ♀. t. Neuholland.

uncinatum Cunningh., hackenförmige, ♀. t. Neuholland.

versicolor Benth., Lindl. Bot. reg., buntfarbige, ♀. t. Neuholland.

tenuifolium Hort. = ? *tenue* Lindl. — *ellipticum* LaBill., v. *Oxylobium ellipticum*.

Gomphrena L., Kugelamaranth.

arborescens L. (= *officinalis* Mart. = *Bragantia Vandelii* R. et S.).

callosa Sweet, schwieliger, ♀. w. Südamerika.

carnea Jacq., Sweet, fleischfarbiger, ♀. w. Südamerika.

Gomphrena

decumbens Jacq., Sweet (= *bicolor* Hort. = *prostrata* Dsf. = *tumida* Hort. = *Achyranthes ternata* Hort.).
pulchella Mart., Hook., schöner, ☉. w. m. f. Montevideo.
virgata Mart., ruthenförmiger, 4, w. Brasilien.

aggregata W. et *vermicularis* Sw., v. *Philoxerus aggregatus* et *vermiculatus*, p. 615, *brasiliensis* Jacq. etc., v. *Telejanthera brasiliensis* etc., Sect. III. *Mogiphanes*, *ficoidea* L., *polygonoides* L., *procumbens* Zuccagn., *sessilis* L., v. *Alternanthera ficoidea* etc. p. 40, *elongata* W. (= *fruticosa* Hort.), v. *Telejanthera porrigens*, Sect. II. *Brandesia*, *floridana* Sogl., *interrupta* L. etc., v. *Froelichia floridana* etc., p. 248, II.

Gonatanthus Kl., Sprossenwurz, XXI. IX., Aroideae.
sarmentosus Kl. (= *Caladium sarmentosum* H. Berol.),
 brasilianische, 4. w. ? Brasilien.

Gongora R. et P. (= *Gongoras* Hffg.), *Gongora*.
atropurpurea Hook., a) *albescens* Hort. Booth., b) *major* Hort., c) *nigra* Hort. Booth., d) *picta* Hort., e) *picta albescens* Hort. Booth.

citrina Hort. belg., citronfarbige, 4. w. Südamerika.

fulva Lindl., rothbraune, 4. w. Demerara.

irrorata Hffg., getüpfelte, 4. w. Brasilien.

macrantha Lindl., Hook., (= *Coryanthes* s. *Corysanthes macrantha* p. 222).

maculata Lindl. (= *Coryanthes* s. *Corysanthes maculata* Hook., p. 222), b) *alba* Hort. (= *leucochila* Hort.), c) *fulgida* Hort. (= *fulgens* Hort.), d) *grisea* Lodd., e) *pallida* Hort., β) *Histrio* Hort.

nigrita Lindl., schwärzliche, 4. w. Demerara.

quinquenervis R. et P., fünfnervige, 4. w. Peru.

speciosa Lindl., Hook. (= *Coryanthes speciosa* Hook.).

truncata Lindl., abgestutzte, 4. w. Mexico.

versicolor H. Booth., buntfarbige, 4. w. Südamerika.

Goniophlebium Bl., *Preslianum* Sm., *ramosum* Sm. etc., v. *Polypodium*, Sect. VI.

Goniopteris Presl, *asplenioides* Presl, *crenata* Lk., *prolifera* Presl, v. *Polypodium*, Sect. IX.

Gonogona discolor Lk., v. *Goodyera discolor*, p. 365.

Gonolobus Mchx., Ringelkranz.

Baldwinianus Sweet (= *carolinianus* Nutt. = *hirsutus* Lodd., non Mchx.), Baldwin's, 4. Sch. f. Nordamer.

hispidus Hook., Arn., steifhaariger, 4. ♀. Sch. w. Südbrasilien.

macrophyllus Mchx. (= *carolinensis* RBr.).

maritimus RBr., v. *Ibatia maritima*.

Gonospermum Less., *elegans* DC. (= *Achillea arborea* Hornem. = *Hymenolepis elegans* Cass. = *Tanacetum canariense* DC. Catal. h. monspel.), *multiflorum* DC. (= *canariense* Less.).

Goodenia Sm., Goodenie.

cistifolia Cunn., ciströschenblättrige, 4. k. t. Neuholl.

coronopifolia RBr., krähenufsblättrige, ☉. ♂. k. f. Neuholland.

paniculata Sm. (= *lanceolata* Hort. = *Boutonia pomifera* Hort.).

radicans P. (= *Selliera radicans* Cav.), starkwurzelnde, 4. k. t. Neuholland.

rigida Benth., starre, 4. ♀. k. t. Neuholland.

Goodia Salisb., Goodie.

- retusa* Makoy, Sweet, abgestutzte, ⚥. t. k. Neuholland.
subpubescens Sweet, wenighaarige, ⚥. t. k. Neuholland.
latifolia Hort. (non Salisb.), v. *Trichasma ciliatum*,
simplicifolia Spgl., v. *Platychilum Celsianum*, p. 633.

Goodyera RBr., Goodyera.

- macrophylla* Lowe, grofsblätterige, 4. w. t. Madeira.

Gordonia Ellis, Gordonie.

- axillaris* Endl. (= *anomala* Spgl. = *Canellia axillaris* Roxb. = *Polyspora axillaris* Sweet, p. 646).
nepalensis ? Wall., nepalsche, ⚥. t. w. Nepal.
semiserrata Spgl. (= *Haemocharis semiserrata* Mart. = *Lindleya fruticosa* N. E. = *Laplacea inaequilatera* Schott = *Wikstroemia fruticosa* Schrad.), halbsägezähne, ⚥. w. Brasilien.

- Wallichii* DC. (= *Chilaunea* Don = *integrifolia* Roxb. H. Benghalensis), Wallich's, ⚥. w. t. Nepal, Java.
Gorinkia orientalis Presl, v. *Erysimum orientale*, Sect. III., p. 314.

Gorteria L., Gorteria.

- calendulacea* DC. (= *Chrysostemma calendulaceum* E. Mey.), ringelblumenähnliche, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
ciliata Thbg., v. *Cullunia patula*, p. 175, II.
Gossampinus alba Hamilt. (= *Rumphii* Wight), v. *Eriodendron orientale*, p. 229, *rubra* Hamilt., v. *Salmalia malabarica*.

Gossypium L., Baumwolle.

- album* Hamilt., Wight et Arn. (= *herbaceum* L. = *hirsutum* L. = *obtusifolium* Roxb. = *tricuspidatum* Lam.), weisse, ☉. ♂. 4. w. Ostindien.
arborescens L. (= *nigrum* γ Wight et Arn. = *purpurascens* Poir., Dsf. = *rubicundum* Roxb. = *vitifolium* Wall.).
barbadense L. (= *javanicum* Blume = *nigrum* β Wight Arn. = *racemosum* Poir. = *glabrum* Poir.).
chinense Fisch. et Otto (= ? *siamense* Tenore).
nigrum Hamilt., Wight, Arn. (= *indicum* Lam. = *latifolium* Murr. = *macedonicum* Murray = *peruvianum* Cav. = *vitifolium* Lam.), schwarze, ♂. w. Ostindien.
religiosum L. (= *croceum* Hamilt. = *Nanking* Meyen).
brasilense Macf. Brasil., *jamaicense* Macf. Jamaika, *javanicum* Decaisne, Molucken (*nigrum* var. ?), *oligospermum* Macf. Jamaika, *prostratum* Schum. et Thonn. Guinea, *punctatum* Schum. et Thonn. Guinea, werden in den europäischen Gärten wohl kaum kultivirt.

Gouania L., Gouanie.

- brasilensis* Hffg., brasilianische, ⚥. ⚥. Sch. w. Brasilien.
corylifolia Raddi, haselnußblätterige, ⚥. ⚥. Sch. w. Brasilien.
domingensis L. (= *glabra* Jacq.).
mauritaniana Lam. (= *incisa* Vahl).
tiliaefolia Lam. (= ? *nepalensis* Wall. = *Stadtmanni* Willem.).

Gouffeia Robil. et Cast., Gouffeia.

- arenarioides* Robill. et Cast., Sandnierenähnliche, ☉. f. Südfrankreich.
holosteoides Fisch. et C. A. Mey., v. *Lepyrodiclis holosteoides*.

Govenia Lindl., Gowenie.

- aurea* H. belg., goldfarbige, 4. w. ? Mexico.

Govenia

- fasciata H. Belg., querbändrige, 4. w. Südamerika.
 Gardneri Hook., Gardner's, 4. w. Brasilien.
 lagenophora Lindl., flaschentragende, 4. w. Brasilien.
 superba Lindl. (= *Maxillaria superba* Lex. et Lall.),
 b) fl. albo H. Booth.
 utriculata Lindl. (= *Cymbidium utriculatum* Sw. =
Limodorum utriculatum Jacq.), schlauchförmige, 4.
 w. Jamaika, Domingo.

Grabowskia Grabowskia.

- duplicata W. Arn. (= *brasiliana* Schldl. = *Ehretia*
duplicata N. E.), brasilianische, 5. t. Brasilien.
Grahamia (= *Graemia*) *aromatica* Spgl., v. Cepha-
 lophora *aromatica* p. 180 et p. 133, II.

Grammanthes DC., Schriftblüthen.

- chloraeifolia DC. (= *dichotoma* Auct. = *Crassula dichotoma*
 L. = *Vananthes chloraeifolia* Haw.), chlorablät-
 teriges, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
 β) *retroflexa* Sweet (= *Crassula retroflexa* Thbg.).
 gentianoides DC. (= *Crassula gentianoides* Lam.), en-
 zianähnliches, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
Grammarthron scorpioides Cass., v. *Doronicum scorpioides*,
 p. 272.

Grammatocarpus Presl, Schriftfrucht, XVIII. II.
(XIII. I.), Loasaceae.

- volubilis Presl (= *Scyphanthus elegans* Don), windende,
 4. Sch. t. k. Chili.
 β) *grandiflorus* * (= *Scyphanthus grandiflorus*
 Sweet, p. 737 = *Loasa volubilis* Hort.).

Grammatophyllum Blum., Lindl., Schriftstendel.

- Finlaysonianum Lindl., Wall., Finlayson's, 4. w. Ostind.
 multiflorum Lindl., β) *tigrinum* Lindl.

Grammatotheca Presl, Bergiana Presl, v. Lobelia,
Sect. III^b.**Grammitis** Sw., Schriftfarn.

- linearis W., gleichbreitblättriger, 4. w. Java.
 villosa Presl, v. *Gymnogramme villosa*.

Grammoscadium DC., Keulendolde, V. II., Um-
belliferae

- daucoides DC., möhrenähnliche, ☉. f. Armenien, Persien.
 meoides DC. (= *Myrrhis clavata* Spgl. = *Scandix*
macrocarpa W. herb), bärwurzähnliche, ☉. f. Armenien.

Grangea Adans., Grangea.

- aegyptiaca DC. (= *maderaspatana* Dsf., non Lam. =
Tanacetum aegyptiacum Jacq. = ? *T. humile* Forsk.),
 aegyptische, ☉. f. Aegypten.
 maderaspatana Lam. (= *Adansonii* Cassin. = *Artemisia*
maderaspatana L. = *Cotula maderaspatana* W.).
 bicolor Dsf (= *latifolia* Lam.), *sonchifolia* Loud.,
 v. *Dichrocephala latifolia* et *sonchifolia*, p. 262, *ci-*
nerea Loud., v. *Tanacetum cinereum*.

Grangeria Commers., borbonica Lam. (= *buxifolia* Sm.).**Graptophyllum** N. E., hortense N. E., v. Justicia,
Sect. VI. = *J. picta* L., p. 434.**Gratiola** L., Gnadenkraut.

- auagalloidea Mchx (= *dilatata* Mühlbg. = *inaequalis*
 Walt. = ? *tetragona* Ell. = *Lindernia dilatata* Ell. =
L. pyxidaria Pursh, gauchheilblättriges, ☉. f. Nordam.
oppositifolia W. h. (= *serrata* Roxb.), *reptans* Roxb.,
veronicaefolia Retz., v. *Bonnaya brachiata* etc., p. 127.

- Greenovia** Webb. (G. B. Greenough, berühmter engl. Geolog), XI. VII., Corniculatae Crassulaceae.
aurea Webb. (= *Sempervivum aureum* Ch. Sm., p. 741 = *calyciforme* Haw.), goldfarbige, ⚔. 4. k. t. Canarische Inseln.
Gregoria Vitaliana Duby, v. *Aretia Vitaliana*, p. 77.
- Grenvillea** Swt., *conspicua* Swt., v. *Pelargonium*, Sect. VI. p. 599.
- Grevillea** RBr., *Grevillea*.
anethifolia RBr., dillblättrige, ⚔. t. Neuholland.
angulata RBr. (= *ilicifolia* Cunn.), kantige, ⚔. t. Neuholland.
angustata RBr., verschmälerte, ⚔. t. Neuholland.
Aquifolium Meisn., (= *aquifolia* Cunningh. = *agrifolia* Hort. = *Anadenia Aquifolium* Lindl.), stechlül-senblättrige, ⚔. t. Neuholland.
australis RBr., südliche, ⚔. t. Neuholland.
Baueri RBr. (= *daphnoides* Sbr. = *myrtilifolia* Cunn.), β) *pubescens* Hook. (non Grah.).
Baxteri RBr., Baxter's, ⚔. t. Neuholland.
bipinnatifida RBr., doppeltfiederspaltige, ⚔. t. Neuholl.
Brownii Meisn., Brown's, ⚔. t. Neuholland.
buxifolia RBr. (= *collina* Knight = *Embothrium buxifolium* Sm. = *E. genianthum* Cavan. = *Stylurus buxifolius* Knight., Salisb. = *St. collinus* Knight., Salisb.).
Candolleana Meisn., Candolle's, ⚔. t. Neuholland.
chrysodendron RBr. (= *pteridifolia* Knight. et Salisb.), goldfarbige, ⚔. t. Neuholland.
crithmifolia RBr., meerfenchelblättrige, ⚔. t. Neuholland.
Cunninghamii RBr. (= *carduifolia* Cunningh.), Cunnin-
 gham's, ⚔. t. - Neuholland.
depauperata RBr., ärmliche, ⚔. t. Neuholland.
Drummondii Meisn., Drummond's, ⚔. t. Neuholland.
Endlicheriana Meisn., Endlicher's, ⚔. t. Neuholland.
ericifolia RBr., heideblättrige, ⚔. t. Neuholland.
eriostachya Lindl., wollähri-ge, ⚔. t. Neuholland.
fasciculata RBr., büschelförmige, ⚔. t. Neuholland.
ferruginea Sieb., rostfarbige, ⚔. t. Neuholland.
floribunda RBr., blüthenreiche, ⚔. t. Neuholland.
Gaudichaudii RBr., Gaudichaud's, ⚔. t. Neuholland.
gibbosa RBr. (= *glauca* Knight. et Salisb.), höckerige, ⚔. t. Neuholland.
glabella RBr. (= *acicularis* Cunningh., non Schult.), kahle, ⚔. t. Neuholland.
Goodii RBr., Good's, ⚔. t. Neuholland.
Hookeriana Meisn., Hooker's, ⚔. t. Neuholland.
Hügelii Meisn., Hügel's, ⚔. t. Neuholland.
ilicifolia RBr. (= *Anadenia ilicifolia* RBr.), ilexblät-
 terige, ⚔. t. Neuholland.
Lawrenceana H. angl., Lawrence's, ⚔. t. Neuholland.
Lindleyana Meisn., Lindley's, ⚔. t. Neuholland.
longifolia RBr. (= *argentea* Hort.), langblättrige, ⚔. t. Neuholland.
mimosoides RBr., simpfpflanzenähnliche, ⚔. t. Neuholl.
mucronifolia Cunn., stachelspitzblättrige, ⚔. t. Neuholl.
mucronulata Salisb. (= *Lysanthe podalyriaefolia* Knight. et Salisb.).
obtusiflora RBr., stumpfblumige, ⚔. t. Neuholland.
polystachya RBr. (= *parallela* Knight. et Salisb.), viel-
 ährige, ⚔. t. Neuholland.

Grevillea

- pulchella* Meisn. (= ? *Anadenia pulchella* RBr.), schöne, f. t. Neuholland.
- pungens* RBr., stechende, f. t. Neuholland.
- pyramidalis* Cunningh., pyramidenförmige, f. t. Neuh.
- quercifolia* RBr. (= *brachyantha* Lindl.), eichenblättrige, f. t. Neuholland.
- rigens* Cunningh., starre, f. t. Neuholland.
- salicifolia* Endl., weidenblättrige, f. t. Neuh. (Schwfl.).
- Sternbergiana* Hügel, Sternberg's, f. t. Neuholland.
- sulphurea* Cunningh. (= *acicularis* Schult., non Cunn. = *acifolia* Spgl. = *aciphylla* Sbr.).
- Synapheae* RBr. (= *Anadenia gracilis* Lindl.), schlanke, f. t. Neuholland.
- tenuifolia* RBr., dünnblättrige, f. t. Neuholland.
- tenuiflora* Meisn. (= *Anadenia tenuiflora* Lindl.), dünnblumige, f. t. Neuholland.
- Thelemanniana* Hügel (= *absinthifolia* Hort. belg.), Thelemann's, f. t. Neuholland.
- trifida* Meisn. (= *Anadenia trifida* RBr.), dreispaltige, f. t. Neuholland.
- triternata* RBr. (= *Anadenia triternata* Cunningh.), dreimaldreizählige, f. t. Neuholland.
- vestita* Hort., bekleidete, f. t. Neuholland.
- glabrata* Meisn. (= *Manglesii* Hortul.), v. *Manglesia cuneata*, *silatifolia* Don, v. *Lomatia silatifolia*, p. 475.

Grewia Juss., Grewie.

- abutifolia* Juss. (= *arbutifolia* P. = *aspera* Roth = *macrophylla* Don), sammetmalvenblättrige, f. w. Java.
- africana* Mill. (= ? *mollis* Juss.), africanische, f. w. Senegal.
- asiatica* L. (= *subinaequalis* DC.).
- cuneifolia* Juss., keilblättrige, f. w. Madagascar.
- glabra* DC., kahle, k. t. Canarische Inseln.
- Heynei* Steud. (= *villifera* Swt. = *villosa* Heyne, Roth), Heyne's, f. w. Ostindien.
- hirsuta* Vahl (= *montana* Koenig = *pilosa* Roxb, non Lam. = *Roxburghii* Don = *salvifolia* Wall. = *tomentosa* Roxb).
- Microcos* L. (= *affinis* Lindl. = *ulmifolia* Roxb. = *Arsis rugosa* Lour. = *Microcos Mala* Hamilt. = *M. paniculata* L. = *M. Stauntoniana* Don).
- pendula* Brotero, herabhängende, f. t. ?
- pilosa* Lam. (= *carpinifolia* Roxb. = *commutata* DC. = *flavescens* Juss. = *orientalis* G., Vahl = *scabrida* Wall.).
- serrulata* DC. (= *laevigata* Vahl = *sepiaria* Roxb.).

Griffinia Ker, Griffinia.

Libonina H. belg., Libon's, 4. Zw. w. Südamerika.

Griffithia RBr. (Griffith, Will., Dr., Prof. u. Conservator am botanischen Garten in Singapore etc., †), V. 1., Rubiaceae.

- fragrans* Walk., Arn. (= *Gardenia fragrans* Roxb., p. 346 = *G. Pandaki* Vahl = *Posoqueria fragrans* Roxbr. = *Randia malabarica* Lam. = *Stylocoryne malabarica* DC. = *St. Pandaki* DC.), wohlriechende, f. f. w. Ostind.
- Grimaldia assurgens* Schrk. (= *decumbens* Schrk.), *bifolialata* Schrk., v. *Cassia nictitans et bifolialata*, p. 169 et 170, p. 123, II.

Grindelia W., Grindelie.

crispa H. Berol., krausblättrige, ? 4. ♂. k. ? Südamer.
fruticosa Dunal (= *Donia fruticosa* Dsf.), strauchige, ♂. k. ?
pulchella Dunal, schöne, ♂. k. t. Chili.

villosa Courtois = ?

Grisebachia Kl. (Grisebach, Prof. der Botanik in Göttingen, Verfass. mehr. schätzbarer botan. Werke), (= *Erica* Sect. VI., p. 307).

bruniades Benth. (= *Finckea bruniades* Kl.), brunia-
 ähnliche, ♂. t. k. Cap d. g. Hoffn.

ciliaris Kl. (= *Blaeria ciliaris* L. fil. = *Erica plu-*
mosa Thbg.).

hispida Kl. (= *Blaeria Thunbergii* G. Don = *Erica*
hirsuta Salisb.).

plumosa Kl. (= *Blaeria nodiflora* G. Don = *Erica*
nodiflora Salisb.).

Guajava pisiformis G., v. *Psidium pyriferum*, p. 662.

Guettarda L., Guettarda.

Fontanesii DC. (= *hirsuta* Dsf., non P.), Desfontai-
 ne's, ♂. w. ?

hirsuta P. (= *Laugeria hirsuta* R. et P.).

scabra Lam., Vent. (= *Matthiola* P. = *M. scabra* L.).

lucida P. et *tomentosa* P., v. *Stenostomum luci-*
dum et *tomentosum*.

Guilielma Mart. (? Wilhelmie), XXI. VI. (VI. t.), Palmae.

speciosa Mart (= *Bactris Gasipaës* Humb., Bonpl. K.),
 prächtige, ♂. w. Brasilien.

Guizotia Cass., oleifera DC. (= *abyssinica* Cass. =

Polymnia abyssinica L. = *P. frondosa* Bruce =

Bidens Rantilla Wall. = *Helianthus oleifer* Wall.

= *Jaegeria abyssinica* Spgl. = *Parthenium luteum*

Spgl., Lk. = *Rantilla oleifera* DC. = *Tetragono-*

theca abyssinica Ledeb. = *Verbesina sativa* Roxb.

= *Iwerinnua* Heyne = *Heliopsis platyglossa* Cassin.

= *Veslingia scabra* Visian. sem. Hort. Patav. 1840) 1).

Gunnera L., Gunnera.

scabra R. et P. (= *chilensis* Lam. = *tinctoria* Mirb.

= *Panke acaulis* Molin. = *P. tinctoria* Auct.),

scharfe, 4. t. k. Chili, Peru.

sonchifolia Mirb., v. *Frankoa sonchifolia*, p. 337.

Gunnia Lindl., Gunnie, XX. I., Orchideae.

australis Lindl., südliche, 4. w. Van Diemens Land.

pieta Lindl., bemalte, 4. w. Neuholland.

Gyas florida Salisb., *humilis* Salisb. et *verecunda*

Salisb., v. *Bletia florida*, *hyacinthina* et *verecunda*,

p. 125.

Gymnachaena bruniades Rehb., v. *Perotriche tortilis*.

Gymnadenia RBr., Richard, Händleinwurz.

humilis Lindl. (= *Orchis Hostii* Tratt. = *O. Nicodemi*

Cyrl., p. 566), niedrige, 4. Kn. k. Neapel.

pauciflora Lindl. (= *Orchis pauciflora* Fisch.), wenig-
 blumige, 4. Kn. f. b. Dahurien.

tridentata Lindl. (= *Habenaria clavellata* Spgl. = *H.*
tridentata Hook., p. 373 = *Orchis clavellata* Mchx.

= *O. tridentata* W.).

albida Rich., v. *Leucorchis albida*, *viridis* Rich.,

v. *Peristylus viridis*.

1) Das letztere Synonym gehört nach H. Prof. Endlicher auch hierher, dagegen sagt Visiani „Genus (*Veslingia*) *Heliopsidi*, *Guizotiae* et *Tetragonothecae* affinis, at diversum“.

- Gymnagathis** J. C. Schauer, Nacktmyrte*, XVIII. II., Myrtaceae.
teretifolia J. C. Schauer (= *Melaleuca teretifolia* Endl.), stielrundblättrige, ♂. ♀. t. Neuholland.
- Gymnandra** Pall., Kletschblume.
altaica C. A. Mey., altaische, 4. f. Altai.
Gymnanthemum cupulare Cass. (= *senegalense* C. H. Schulz), v. Decaneuron senegalense, p. 254 et p. 193, II.
- Gymnarrhena** Dsf., Nacktbeutel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
micrantha Dsf. (= *Frankia Schimperii* Steud.), kleinblumiger, ☉. f. Persien.
- Gymnobalanus** N. E., Nacktlorbeer, IX. I., Laurineae.
Catesbyanus N. E. (= *Laurus borbonica* a Lam. = *L. Catesbaei* P. = *L. Catesbyana* Mchx., p. 449).
Gymnocline Vaillantii Cass., v. *Pyrethrum achilleae-folium* var. β , p. 669.
- Gymnogramme** Desv., Schriftfarn.
 I. *Anogramma* Lk. (= *Chloropteris* Kze.).
asplenioides Sw.
chaerophylla Desv. (= *Hemionitis chaerophylla* Poir.), kerbelblättriger, 4. w. Jamaika, Bonaria, Montevideo, Brasilien.
leptophylla Desv. (= *Grammitis leptophylla* Sw.), schlankblättriger, 4. k. t. Morea, Neapel, Sicilien, Portugal, Spanien.
rutaefolia RBr., rautenblättriger, 4. w. Neuholland.
 II. *Ceropteris* Lk. (= *Calomelanos* Presl).
Calomelanos Kaulf. (= *Acrostichum Calomelanos* L.).
chrysophylla Kaulf. (= *Acrostichum chrysophyll.* Sw.).
dealbata Lk. (= *tartarea* Desv. = *Hemionitis dealbata* W.).
distaus Lk.
flavens Kaulf. (= *Acrostichum flavens* Sw.), gelblicher, 4. w. Mittägl. Amerika.
L'Herminieri Bory (chrysophyllo - peruviana Regel), L'Herminier's, 4. w. Guadeloupe.
ochracea Presl.
peruviana Desv. (= *dealbata* Presl, non Lk.).
sulfurea Desv. (= *Acrostichum sulfureum* Sw.).
trifoliata Desv.
- Hybriden:
- Calomelaena-dealbata* Regel, *chrysophyllo-Calomelaena* Regel, *dealbato-Calomelaena* Regel, *distante-Calomelaena* Regel, *distante-dealbata* Regel, *Martensii* Lk. (*chrysophyllo-dealbata* = *hybrida* Martens), *Massoni* Lk. (*chrysophyllo-distaus*).
- III. *Ceterach* W., p. 185 et p. 134, II.
capensis (Kunze) (= *cordata* Hook. et Grevill.).
Ceterach Spgl. (= *Ceterach officinarum* W. = *Asplenium Ceterach* L.).
cordata Schltdl. (= *crenata* Kaulf. = *Ceterach cordatum* Kunze = *C. crenatum* Kaulf. = *Grammitis cordata* Sw. = *Nothochlaena cordata* Desv.), herzförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.
sinuata Presl (= *Nothochlaena sinuata* Kaulf., p. 550 = *Acrostichum sinuatum* Sw.).

Gymnogramme

IV. *Gymnogramma genuina* Lk.

polypodioides Spgl. (= *Ceterach polypodioides* Raddi = *Polystichum gymnogrammoides* Gaudich.), β Raddiana Lk. villosa Lk. (= *aspidioides* Kaulf. = *Grammitis villosa* Presl), zottiger, 4. w. Caracas, Brasilien.

V. *Neurogramma* Presl, Lk.

myriophylla Sw.

pedata Kaulf. (= *Hemionitis pedata* Sw.).

rufa Desv. (= *Hemionitis rufa* Sw.).

tomentosa Desv. (= *Hemionitis tomentosa* Raddi = *Ceterach lobatum* (= *barbatum*) Presl).

palmata Lk., v. *Hemionitis palmata*, p. 389.

Gymnopogon P. B., Nacktbart, III. II., Gramineae.

mollis N. E., weicher, \odot . w. m. f. Brasilien.

racemosus P. B. (= *scoparius* Trin. = *Aloatherus ambiguus* Ell. = *Andropogon ambiguus* Mchx. = *Anthopogon lepturoides* Nutt. = *Stipa expansa* W.), traubiges, 4. f. Nordamerika.

Gymnopsis connata Steud., *triplineria* DC., v. *Gymnoloma connatum*, triplinerve, p. 371, — *maculata* Ker, v. *Wulffia maculata*.

Gymnosperma Less., DC., Nacktsaame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

corymbosum DC., traubendoldiger, \S . t. k. Mexico.

glutinosum Less. (= *Molina viscosa* H. Berol. = *Selloa glutinosa* Spgl., p. 741).

multiflorum DC. (= *Molina glutinosa* Alam.), vielblumige, \S . t. k. Mexico.

Gymnostyles Juss., Nacktgriffel, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

anthemifolia Juss. (= *Soliva anthemifolia* RBr., p. 711).

lusitanica Spgl. (= *stolonifera* Juss. = *Hippia stolonifera* Brot. = *Soliva lusitanica* Less. = *S. stolonifera* Loud.), portugiesischer, \odot . f. Portugal.

Gymnothrix P. B., *adoensis* Hochst., *cenchroides* R. et S., v. Pennisetum, Sect. I.

Gynandropsis DC., Zwitterkapper.

muricata Schrad. (= *Cleome muricata* Schult.), weichstachelige, \odot . w. m. Ostindien.

Gynema balsamica Rafin., v. *Pluchea camphorata*, p. 885.

Gynerium W., Prachtrohr, XXII. III. (III. II.), Gramineae.

argenteum N. E. (= *Arundo Selloana* Schult. = *A. dioica* Spgl. = *A. Kila* Spgl.), silberfarbiges, σ . 4. w. Brasilien.

saccharoides H. B. K. (= *procerum* P. B. = *sagittatum* P. B. = *Arundo fastuosa* W. herb. = *A. sagittata* P. = *Saccharum sagittatum* Aubl.), zuckergrasähnliches, 4. \S . w. Südamerika.

Gynestum acaule Poit., v. *Geonoma acaulis*, p. 352.

Gynopleura linearifolia Cav., v. *Malesherbia linearifolia*, p. 490.

Gynopogon pugioniformis Cunningh., *scandens* Forst., v. *Alyxia pugioniformis et scandens*, p. 42 et 29, II.

Gynura Cass., Gynura, XIX. I. (II.), Compositae-Corymbiferae. (Senecio, Sect. V., p. 746).

bicolor DC. (= *Cacalia bicolor* Roxb., p. 141).

haematophylla DC. (= *Senecio africanus* Hort. = *S. bicolor* Balb. = *S. discolor* Dsf. = *S. cruentus* Roth = *S. haematophyllus* W. Enum.).

Gynura

nepalensis DC. (= *Cacalia aurantiaca* W. = *C. nepalensis* Szgl.), nepalsche, 4. k. Nepal.

ovalis DC. (= *Cacalia ovalis* Ker), eiförmige, 4. k. China.

Pseudo-China (= *Senecia Pseudo-China* L.).

Gypsophila L., Gypskraut.

Arrostii Gussone (= *dichotoma* Gussone, non Bess. = *Arrostia dichotoma* Rafin.), Arrostri's, ☉. f. Unteritalien.
β) *pubescens*.

dahurica Turcz., dahurisches, 4. f. Dahurien.

glomerata Pall. (= *dianthoides* Sib., Sm.).

Gmelini Bunge (= *Patrini* Sering. = *thesiifolia* Sering.).

hirsuta Szgl. (= *Saponaria hirsuta* LaBill. = *S. hirta* Steud.), rauhhaariges, 4. k. Syrien.

paniculata L. (= *effusa* Tausch), β) *grandiflora* Dsf.

perfoliata L. (= *sabulosa* Stev. = *scorzonerifolia* H. Par.), β) *tomentosa* L.

porrigens Fenzl (= *Saponaria porrigens* L., p. 721).

Rokejeka Delil. (= *Rokejeka capillaris* Forsk. = *R. deserti* Poir.).

stricta Bunge, steifes, 4. f. Altai.

Szowitsii Fisch. et Mey., Szowits's, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.

β) *glandulosa* Fisch. et Mey. (= *Dichoglottis linearifolia* Fisch. et Mey.).

venusta Fenzl, liebliches, 4. f. b. k. Syrien.

Unbestimmtere: *elata* Wender., *trichotoma* Wender.

Gyrocarpus Jacq., Rundnufs, Gyrocarpeae.

rugosus RBr., runzelige, 5. k. t. Neuholland.

Gyrostemum Dsf., ramulosus Dsf. p. 372 (= *Codonocarpus australis* Cunningh.).**Habenaria** W., RBr., Habenarie.

alata Hook. (= *bidentata* Poepp. = *Orchis foliosa* Sw.).

aranifera Lindl., spinnenblumige, 4. Kn. w. Bonaria.

arenaria Lindl., sandliebende, 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffu.

bractescens Lindl., deckblättrige, 4. Kn. w. Bonaria.

clypeata Lindl., schildförmige, 4. Kn. w. Mexico.

digitata Lindl. (= *Bonatea herbacea* Wall. = *B. panduana* Lindl.), fingerförmige, 4. Kn. w. Ostindien.

ensifolia Lindl. (= *intermedia* Wall.), schwertblättrige, 4. Kn. w. Ostindien.

filicornis Lindl. (= *Orchis filicornis* Thonn., Schum.), fadenhornige, 4. Kn. w. Guinea.

flexuosa Lindl., gebogene, 4. Kn. w. Mexico.

floribunda Lindl., blüthenreiche, 4. Kn. w. Peru.

Gourlieana Gill., Gourlie's, 4. Kn. w. Chili.

hexaptera Lindl., sechsflügelige, 4. Kn. w. Brasilien.

imbricata Lindl., ziegeldachförmige, 4. Kn. w. Brasilien.

Lindleyana Steud. (= *latifolia* Lindl., non H. B. K.), Lindley's, 4. Kn. w. Ceylon.

longicauda Hook., langschweifige, 4. Kn. w. Demerara.

maculosa Lindl., fleckige, 4. Kn. w. Westindien, Südamer.

maxillaris Lindl. (= *Platanthera foliosa* Brogu.), kerf-ähnliche, 4. Kn. w. Peru.

mystacina Lindl., kleinbartige, 4. Kn. w. Brasilien.

nuda Lindl., nackte, 4. Kn. w. Brasilien.

obtusata Lindl., stumpfe, 4. Kn. w. Brasilien.

parviflora Lindl., kleinblumige, 4. Kn. w. Brasilien.

pentadactyla Lindl., fünffingerige, 4. Kn. w. Bonaria.

Habenaria

- petalodes Lindl., großblumige, 4. Kn. w. Brasilien.
 pubescens Lindl., weichhaarige, 4. Kn. w. Ostindien.
 quadrata Lindl., gevierte, 4. Kn. w. Brasilien.
 repens Nutt., kriechende, 4. Kn. t. k. Carolina.
 rotundifolia Lindl. (= *grandiflora* Lindl. = *Orchis grandiflora* Heyne), rundblättrige, 4. Kn. w. Ostindien.
 secunda Lindl., einseitige, 4. Kn. w. Brasilien.
 stenopetala Lindl., schmalkronige, 4. Kn. w. Ostindien.
 tridactylites Lindl. (= *Orchis tridactylites* Webb.), dreitheilige, 4. Kn. t. Canarische Inseln.

albida RBr., v. *Leucorchis albida*, *blephariglottis* Hook., *ciliaris* RBr., *cristata* RBr., *dilatata* Hook., *flmbriata* RBr., *flava* RBr., *gigantea* Don, *Herbiola* RBr., *hyperborea* RBr., *incisa* Spgl., *lacera* RBr. (= *psychodes* Spgl.), *Susannae* RBr., v. *Platanthera blephariglottis* etc. -- *bracteata* RBr., *cordata* RBr., *goodyeroides* RBr., *virescens* Spgl., *viridis* Hook., v. *Peristylus bracteatus*, *cordatus* etc.

Habranthus Herb., Jugendblume.

- Bangoldianus Herb. (= *Amaryllis Bangoldiana* Steud.), Bangold's, 4. Zw. k. t. Chili.
 concolor Lindl., einfarbige, 4. Zw. k. t. Mexico.
 grandiflorus v. Houtte, großblumige, 4. Zw. k. t. Südam.
 intermedius Herb. (= *Amaryllis intermedia* Lindl.), mittlere, 4. Zw. w. Brasilien.
 kermesinus Sweet (= *Amaryllis kermesina* Lindl.), karminrothe, 4. Zw. w. Brasilien.
 pratensis v. Houtte, Wiesen-J., 4. Zw. w. Südamerika.

Habrosia Fenzl, Habrosie, V. II., Caryophyllaceae-Scleranthaeae.

- spinuliflora Fenzl (= *Arenaria spinuliflora* Sering.), stachelblumige, ☉. f. ?
Habrothamnus corymbosus Endl., *cyaneus* Lindl., *fasciculatus* Endl., *purpureus* Lindl. (= *elegans* Scheidweil.) etc., v. *Meyenia corymbosa* etc.

Haemadictyon Lindl., Blutling.

- annulare Lindl., DC. (= *Echites annularis* L. fil.), ringelförmiger, ♂. Sch. w. Surinam.
 sanguinolentum A. DC., ächter, ♂. Sch. w. Westindien.
 suberectum Don (= *Apocynum speciosissimum* Mill. = *Echites suberecta* L.), fastaufrechter, ♂. w. Ostindien.

Haemanthus L., Blutblume.

- Lambertianus Schult. fil., Lambert's, 4. Zw. w. Cap der guten Hoffnung.
 longifolius Hort., langblättrige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.
 multiflorus Martyn (= *Amaryllis multiflora* Tratt.), vielblumige, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.
 obliquus Don, schiefe, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.
 quadrivalvis Jacq. (= *pubescens* Thbg. = *trispathinus* Hort.).
 Unbestimmtere: *hydrophilus* Thbg., *roseus* Hort., *sinuatus* Thbg., *spathulatus* Hort.

Haemaria Lindl., Haemarie, XX. I., Orchideae.

- discolor Lindl., verschiedenfarbige, 4. w. China.

Haemocharis semiserrata Mart., v. *Gordonia semiserrata*, p. 272, II.

Haemodorum Sm., Blutnarzisse.

coccineum RBr. (= ? *corymbosum* Sm.), scharlachfarbige, 4. t. Neuholland.

Hagaea alsinesfolia Bivon., *polycarpoides* Bivon., *Teneriffae* P., v. *Polycarpaea alsinesfolia* etc., p. 641.

Hakea Schrad., Hakea.

aculeata Hügel (= *acuminata* Hort.), stachelige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

adnata RBr., angewachsene, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

amplexicaulis RBr., α) *latifolia* Meisn. (= *triformis* Lindl.), β) *angustifolia* Meisn.

bipinnatifida RBr., doppeltfiederspaltige, ♂. ♀. t. k. Neuh.

Bouchéana Kunth, Bouche's, ♂. ♀. t. k. Van Diemens Land.

Brownii Meisn., Brown's, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

canescens Lk., grauliche, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

corymbosa RBr., traubendoldige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

costata Meisn., gerippte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

crassinervia Meisn., dicknervige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

cucullata Cunningham, RBr., β) *couchifolia* Hook.

Cunninghamii RBr., (= *longifolia* Cunningham.), Cunningham's, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

cyclocarpa Lindl., rundfrüchtige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

dactyloides Cav. (= *nervosa* Knight. et Salisb. = *Conchium dactyloides* Vent. = *C. nervosum* Sm., Don, G.).

decurrens RBr., herablaufende, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

drupacea RBr. (= *Conchium drupaceum* G.), steinfrüchtige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

eucalyptoides Meisn., schönmützenähnliche, ♂. ♀. t. k. Neuh.

eriantha RBr., wollblumige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

falcata RBr., sichelförmige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

Fraseri RBr., Fraser's, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

gibbosa Cav. (= *pinifolia* Knight., Salisb. = *pubescens* Schrad., Wendl. = *Conchium gibbosum* Sm. = *C. pubescens* W.).

glabella RBr., kalte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

α) *paucidentata* Meisn., β) *denticulata* RBr.

heterophylla H. angl., verschiedenblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

ilicifolia RBr. (= *intermedia* Hook.).

incrassata RBr., verdickte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lasiantha RBr., haarblumige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lasiocarpa RBr., haarfrüchtige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

Lehmanniana Meisn., Lehmann's, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

Leucadendron Meisn., weißholzige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

leucoptera RBr. (= *leucocephala* Hort.), weißflügelige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lissocarpa RBr., glattfrüchtige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lorea RBr. (= *Grevillea lorea* RBr., Sngl.), riemenförmige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

macrocarpa RBr., großfrüchtige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

myrtoides Meisn., myrtenähnliche, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

oleaefolia RBr. (= *ligustrina* Knight., Salisb.).

patula RBr., ausgebreitete, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

petiolaris Meisn., gestielte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

propinqua Cunningham. (= *pachyphylla* Sbr.).

proteoides H. belg., proteaähnliche, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

pugioniformis Cav. (= *glabra* Schrad., Wendl. = *glauca* Knight., Salisb. = *Conchium pugioniforme* Sm. = *C. longifolium* Sm. = *Lambertia teretifolia* G.), β) *parilis* Knight., Salisb.

Hakea

- Preissii Meisn., Preiss's, ⚭. ⚭. t. k. Neuholland.
 repanda RBr. (= *ferruginea* Sweet), angeschweifte, ⚭.
 ⚭. t. k. Neuholland.
 smilacifolia Meisn., stechwindenblättrige, ⚭. t. k. Neuh.
 stenocarpa RBr., schmalfrüchtige, ⚭. ⚭. t. k. Neuholl.
 stenophylla RBr., schmalblättrige, ⚭. t. k. Neuholland.
 suaveolens RBr. (= *heterophylla* H. Cels. = *pinnata*
 Hort. = *Banksia heterophylla et pinnata* Hort.).
 tephrosperma RBr., grausaamige, ⚭. ⚭. t. k. Neuholland.
 virgata RBr., ruthenförmige, ⚭. ⚭. t. k. Neuholland.

Halenia Borkh., Halenie, V. I. (II.), Contortae - Gen-
tianeae.

- deflexa Griseb. (= *Michauxiana* Don = *Swertia ame-*
ricana Spgl. = *corniculata* Mchx. = *S. deflexa* Sm.
 = *S. Michauxiana* R. et S.), herabgebogene, ♂. f.
 Nordamerika.
 Fischeri Graham, Fischer's, ♂. f. Dahurien.
 sibirica Borkh. (= *Swertia corniculata* L.), sibirische,
 ♂. ♂. f. Sibirien.

Helianthus peploides Fr., v. Alsine, Sect. II, p. 38.
Halimium atriplicifolium Spach, *lasianthum* Spach,
lepidotum Spach, *rosmarinifolium* Spach, *umbellat-*
um Spach, v. *Helianthemum atriplicifolium*, *lasian-*
thum, *halimifolium*, *Libanotis et umbellatum*, p. 380
 etc., — *Clusii* Spach, v. *Cistus Clusii*, p. 200.

Halimocnemis C. A. Mey, Salzmelde, V. II. (III.
II., I. II.), Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

- brachiata C. A. Mey. (= *Anabasis conjugata* Hoffm. =
Polycnemum brachiatum MB. = *P. conjugatum* MB.
 = *P. oppositifolium* R. et S. = *P. triandrum* Pall.),
 armförmige, ♂. f. Taurien.
 crassifolia C. A. Mey. (= *Anabasis oppositifolia* MB.
 = *Polycnemum alternifolium* Pall. = *P. crassifolium*
 Pall. = *P. oppositifolium* MB.), dickblättrige, ♂. f.
 Altaisch. Sibirien.
 glauca C. A. Mey. (= *Polycnemum glaucum* Pall.), blau-
 grüne, ♂. f. Altaisch. Sibirien.
 juniperina C. A. Mey. (= *Anabasis caespitosa* Steph.
 = *A. Sieversii* W. = *Camphorosma acuta* Falk =
Polycnemum erinaceum Pall. = *P. juniperinum* MB.),
 wachholderähnliche, ⚭. f. Altaisch. Sibirien.
 malacophylla C. A. Mey. (= *Polycnemum malacophyllum*
 MB. = ? *Salsola arborescens* L. fil. = *S. pilosa* Pall.),
 weichblättrige, ♂. f. Caucasus, Sibirien.
 monandra C. A. Mey. (= *Polycnemum monandrum* Pall.),
 einmännige, ♂. f. Altaisch. Sibirien.
 pubescens Ledeb., weichhaarige, ♂. f. Sibirien.
 sclerosperma C. A. Mey. (= *Polycnemum nuciferum*
 Pall. = *P. sclerospermum* Pall.), knorpelsaamige, ♂.
 f. Taurien, Mittelasien.
 sibirica C. A. Mey. (= *Polycnemum sibiricum* Pall. =
Salsola oppositifolia Pall.), sibirische, ♂. f. Sibirien.
 Volvox C. A. Mey. (= *Anabasis triandra* MB. = *Pol-*
ycnemum salsum MB. = *P. triandrum* Pall. = *P.*
Volvox Pall.), dreimännige, ♂. f. Altaisch. Sibirien,
 Mittelasien.

Vergl. p. 641.

Halimolobus Tausch, XV. III., Cruciferae.

patula Tausch (= *Sisymbrium polystachyum* Hort.).

stricta Tausch (= *Arabis lasioloba* Hort.).

Angabe der Dauer, des Vaterlandes etc. fehlt, daher noch unsicher. —

Hallia Thbg., Hallia.

angustifolia DC. (= *virgata* Thbg.), schmalblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

ruscifolia Bot. mag., mäusedornblättrige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Halmyra stellaris Salisb., v. *Pancretium illyricum*, p. 582.

Halocharis altaica Fisch., *carthamoides* MB., v. *Leuzea altaica et carthamoides*, p. 460.

Halocnemum MB., Salzstrauch, V. II., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

caspicum MB. (= *Salicornia caspica* L., Pall.), caspischer, 5. k. f. b. Gegend des caspischen Meeres.

fruticosum Lk. (= *Arthrocnemum fruticosum* Moq. Tand. = *Salicornia fruticosa* L. et Auct., p. 710 = *S. Alpini* Lagasc.).

strobilaceum MB. (= *Salicornia caspica* Stev. = *S. glauca* Delil. = *S. mucronata* Lagasc. = *S. strobilacea* W.), zapfenförmiger, 5. k. f. b. Taurien, Gegend des caspischen Meeres.

Halogeton C. A. Mey., Salzgänsefuß, V. II. (I. II.), Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).

glomeratus C. A. Mey. (= *Anabasis glomerata* MB. = *Salsola glomerata* Stephan.), knaulförmiger, 6. f. Sibirien.

monandrus C. A. Mey. (= *Anubasis monandra* MB. = *Salsola monandra* Pall.), einmänniger, 6. f. Sibirien.

oppositiflorus C. A. Mey. (= *Anabasis oppositiflora* Schrad., p. 51 = *Chenopodium oppositiflorum* L.).

tamariscifolia C. A. Mey. (= *Anabasis tamariscifolia* L., p. 51 = *Salsola tamariscifolia* Lagasca).

Halolachna Ehbg., Salztamariske, V. III., Tamariscineae.

soongarica Ehbg. (= *Tamarix soongarica* Pall.), soongarische, 5. f. Soongaria.

Haloragis Forst., Meernüßchen.

capensis Nois., Cels., capisches, 5. k. t. Cap d. g. H.

Hamelia L., Hamelie.

axillaris Sw., β) *appendiculata* G. fil. (= ? *lucida* Dsf.).

patens L. (= *coccinea* Sw.), β) *erecta* Jacq. (= *chrysantha* Sbr.).

xorulensis H. B. K. (= *patens* Sw., non L.), xorulische, 5. t. Mexico.

Hamelinia veratroides A. Rich., v. *Astelia Banksii*, p. 94 et 51, II.

Hamiltonia scabra Don et *suaveolens* Don, v. *Spermatidctyon scabrum et suaveolens*.

Hanulium alatum Cass., v. *Verbesina alata*, p. 840.

Hapulanthus repens Jacq., v. *Callisia repens*, p. 148.

Hapalochlamys Cass. (= *Apalochlamys* Auct., p. 870), Zartdosten, XIX. v., Compositae-Eupatoriueae.

Billardieri DC., *Billardiere's*, 5. 5. t. k. Van Diemens Land.

Endlicheri DC. (= *Cassinia spathulata* Endl.), *Endlicher's*, 5. 5. t. k. Neuholland.

Kerii DC. (= *Cassinia spectabilis* Ker), *Ker's*, 5. 5. t. k. Neuholland.

- Haplopappus** Cass. (= *Aplopappus* Auct. p. 68).
- Haplophyllum** Adr. Juss. (= *Aplophyllum* Auct.), Schmalraute.
Sieversii Schrenk (= *perforatum* Karel. et Kiril.), Sievers's, 4. f. b. Soongaria.
spathulatum Rchb. (= *suaveolens* Sweet = *Ruta linifolia* MB. = *R. linifolia* β *grandiflora* Sims = *R. suaveolens* DC.), spatelförmige, 4. $\frac{1}{2}$. f. b. Griechenland, Taurien.
- Haplotaxis** DC. (= *Aplotaxis* Auct.), Schmalkelch, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.
albescens DC. (= *Serratula albescens* Wall.), weifslicher, \odot . f. Nepal, Ostindien.
Bungei DC. (= *Cirsium lyratum* Bunge = *Hemisteptia lyrata* Bunge, p. 389).
Frolovii DC. (= *Cnicus altaicus* Steph. = *Frolovia lyrata* Ledeb., p. 339 = *Saussurea Frolovii* Ledeb.).
gossypina DC. (= *Cnicus gossypinus* Wall. = *Eriocoryne nidularis* Wall. = *Saussurea gossypina* Wall. = *S. gossypiphora* Don), baumwolltragender, \odot . m. f. Ostindien.
- Hardenbergia** Benth, *Comptoniana* Benth. etc., v. *Kennedy* Sect. II.
- Harina** Hamilt., *Harina*, XXI. vi. (VI. III.), Palmae.
caryotoides Hamilt. (= *H. Wallichia* Steud. = *Wallichia caryotoides* Roxb., p. 855 = *Wrightea caryotoides* Roxb.), brennpalmenähnliche, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
- Harmogia** C. Schauer, *Harmogie*, VIII. 1., Myrtaceae.
parvula C. Schauer (= *Baeckea parvula* DC. = ? *B. virgata* Andr. = *Leptospermum parvulum* LaBill.), kleine, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland.
pinifolia C. Schauer (= *Baeckea pinifolia* DC. = *Leptospermum pinifolium* LaBill.), kieferblättrige, $\frac{1}{2}$. t. k. Neucaledonien.
virgata C. Schauer (= *Baeckea virgata* Ker, p. 110 = *Leptospermum virgatum* Forst. = *Melaleuca virgata* L. fil.).
Harpalyce alba Don, *altissima* Don, *cordata* Don, *racemosa* Don, *rubicunda* Don, *Serpentaria* Don, *virgata* Don, v. *Nabalus suavis*, *altissimus* etc.
- Harpechloa** Kunth, *Sichelspelze*, III. II., Gramineae.
capensis Kunth (= *falcata* Kunth = *Campulosus falcatus* B. P. = *Campuloa hirsuta* Desv. = *Chloris falcata* Sw. = *Cynosurus falcatus* Thbg. = *Dactyloctenium falcatum* W. = *Eleusine falcata* Spgl. = *Melica falx* L.), capische, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- Harpephora** Endl., *Sichelträger*, XIX II., Compositae-Corymbiferae.
Schottii Endl., Schott's, \odot . m. f. Ostafrika.
- Harriota** DC., v. Cacteeae, p. 874 et p. 99, II.
Harrisonia loniceroides Hook, v. *Baxtera loniceroides*, p. 62, II.
- Hartigsea** Juss., *Hartigsea* X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.
spectabilis Juss. (= *Trichilia spectabilis* Forst.), ansehnliche, $\frac{1}{2}$. t. w. Neuzeeland.
Hartmannia gauroides Spach (= *rosea* Sweet), *Kunthiana* Spach, *macrantha* Spach, *virgata* Spach, (= *affinis* Spach), v. *Oenothera rosea*, *pinnatifida*, *tetraptera*, et *virgata*.

Hartwegia Lindl. (Th. Hartweg aus Karlsruhe, berühmt als Reisender und fleißiger Pflanzensammler [in Südamerika], für Sir William Hooker etc.), XX. 1., Orchideae.

purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Mexico.

Hartwegia comosa N. E., v. *Hollia comosa*.

Haxtonia phlogopappa Caley, *tomentosa* Caley, v. *Olearia phlogopappa et tomentosa*, p. 99, Aster, Sect. XIII.

Haynea pedunculata Speg., v. *Vernonia pedunculata*, p. 841.

Hebea P. Eckl., Hebea, III. 1., Irideae.

alata P. (= *Gladiolus alatus* L., p. 346 = *G. galeatus* Burm. = *viperatus* Ker).

orchidiflora P., Eckl. (= *Gladiolus orchidiflorus* Andr.), knabenkrantähuliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

tabularis P. (= *Antholyza montana* Ker, p. 65 = *Gladiolus montanus* Thbg. = *G. parviflorus* Jacq. = *G. tabularis* P.), Tafelberg's H., 4. Zw. t. k. Cap der guten Hoffnung.

bicolor Eckl., *galeata* P., v. *Synnotia bicolor et galeata*, p. 794.

Hebeclinium DC., *macrophyllum* DC., v. *Eupatorium*, Sect. IV., p. 320.

Hebenstreitia L., Hebenstreitia.

aurea Andr., goldfarbige, 5. t. k. Cap d. g. Hoffn.

dentata Thbg. (= *pulchella* Salisb), β) *integrifolia* L.

tenuifolia Schrad. (= ? *angustifolia* Hort.), dünnblättrige, 4. 5. t. k. Cap d. g. Hoffn.

capitata Thbg., *ciliata* Berg. (= *albiflora* Lk.), *chamaedryfolia* Lk., *erinoides* Thbg.), v. *Dischisma capitatum, ciliatum etc.*, p. 207, II., *cordata* L., v. *Polycenia cordata*.

Heberdenia Banks, Heberdenie, V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.

excelsa Banks (= *Ardisia excelsa* Ait., p. 74 = *A. bahamensis* DC. = *Anguillaria bahamensis* G. = *Icacorea bahamensis* Lam = *Myrsine excelsa* Lk. = *M. Heberdenia* R. et S. = *Condalia coriacea* Holl.).

Hecastaphyllum Kunth (= *Ecastaphyllum* P. Br., p. 378).

Brownei Kunth, P. (= *E. frutescens* P. Br. = *Amerimum Sieberi* Rehb. = *Hedysarum Ecastaphyllum* L. = *Pterocarpus Ecastaphyllum* L.), Plumieri P., Sieberi Rehb.

Hechtia Klotzsch (Hecht, J. G. II, k. Preuss. Geheimer Regierungsrath, † 1837), XXII VI., Bromeliaceae.

stenopetala Klotzsch, smalkronige, 4. w. t. Mexico.

Ob *H. glomerata* Zuccar., *pitcairniaefolia* Zuccar., *planifolia* Zuccar. 4. Mexico, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Heckeria Kunth, *peltata* Kunth, *scutatata* Kunth, *sideaefolia* Kunth, *umbellata* Kunth, v. Piper, Sect.

Hedeoma P., Zwergmünze.

Drummondii Benth., Drummond's, 4. 5. f. b. k. Nordamerika, Texas.

? *thymoides* P., v. *Thymus Serpyllum*, β) *montanus* Benth.

Hedera T., Epheu.

arborea Sw. (= *Aralia arborea* L., p. 71).

Hedera

- capitata Sm. (= *Aralia capitata* Jacq., p. 71).
 ferruginea DC. (= *Aralia ferruginea* H. B. K., p. 71
 = *A. heptaphylla* W. herb.).
 flexuosa Broter., hin- und hergebogener, ♀. Sch. ??

Hedychium Koenig, Kranzblume.

- barbatum Wall., härtige, 4. w. Ostindien.
 Gomezianum Wall., Gomez's, 4. w. Ostindien.
 Hasselti Blume, Hasselt's, 4. w. Java.
 lingulatum Hassk., zungenförmige, 4. w. Java.
 Roscoi Wall., Roscoe's, 4. w. Nepal.
 thyriforme Sm. (= *heteromallum* Ker).

Hedyotis L., Ohrling (= *Oldenlandia* L., p. 556).

- Burmänniana RBr. (= *biflora* Lam., Roth = *diantha*
 Schult. mant. = *diffusa* W. = *Gerontogea biflora*
 Chamiss., Schldtl. = *Oldenlandia biflora* Lam., Roxb.
 = *O. dichotoma* W.), Burmann's, ☉. w. m. f. Ostind.
 corymbosa Lam. (= *lactea* Hort. = *Oldenlandia corym-*
bosa L.).
 Deppeana Stend., Endl. (= *Gerontogea Deppeana* Cham.,
 Schldtl., p. 354 = *Oldenlandia Deppeana* DC.).
 dichotoma W. A. (= *brachiata* Wall. = *affinis* R. et S.
 = *attenuata* W. = *diffusa et graminifolia* Speg. =
linifolia W. = *Oldenlandia affinis* DC. = *O. capil-*
laris DC. = *O. linifolia* DC. = *O. pusilla* DC.),
 zweizinkige, ☉. w. m. f. Ostindien.
 herbacea L. fil. (= *Oldenlandia herbacea* DC. = *O.*
madagascariensis Dsf. = ? *O. tenuifolia* Burm.).
 lactea W. (= *cymosa* Speg. = *Gerontogea lactea* Cham.
 et Schldtl. = *Oldenlandia corymbosa* Ait. = *O.*
lactea DC. = *O. umbellata* Hort.).
 ramosissima Speg. (= *Oldenl. ramosissima* Fisch.).
 umbellata Lam. (= *indica* R. et S. = *hispida* Roth =
Oldenl. umbellata L. = *O. hispida* DC.).

Hedypnois T., Röhrlinckraut.

- pendula Balb. (= *Hyoseris pendula* P.), β) pinnatifida
 (= *Hyoseris arenaria* Hort., non Schousb. = *H.*
crepoides P.).
 persica MB., Fisch. (= *cretica* W. var. = *rhagadioloi-*
des Steven), persisches, ☉. f. Persien, Caucasus.

Hedysarum T., Hahnenkopf.

- altaicum Fisch. (= *Gmelini* Ledeb. = *polymorphum*
 ♂ Ledeb.).
 argyrophyllum Fisch., silberblättriger, 4 f. Alt. Sibirien.
 brachypterum Bunge, kurzflügeliger, 4. k. f. b. Nordchina.
 capitatum Desf. (= *corsicum* Balb. = *decumbens* Denust.
 = *glomeratum* Dietr. = *pallidum* Dsf. var.), kopf-
 förmiger, ☉. f. Nordafrika, Corsica.
 esculentum Ledeb., genießbarer, 4. f. Ostsibirien.
 lanuginosum Dsf., wolliger, 4. f. b. Orient.
 lasiocarpum Ledeb. (= *Ledebourii* Speg. = *neglectum*
 Ledeb.).
 leucophyllum Lk. (= *bucophyllum* W. E.), weißblätte-
 riger, ♀. k. t. ?
 roseum Stephan, non Sims (= *ibericum* W. herb., non
 MB. = *polymorphum* β *prostratum* Ledeb. = *pro-*
stratum Sievers).
 soongaricum Bong. et C. A. Mey. (= *echinocarpum* Karel.
 et Kiril.), soongarisches, ♂. 4. f. Soongaria.
 tauricum Pall. (= *fruticosum* Habl. = *roseum* Sims).

Hedysarum

Thunbergianum Steud. (= *reflexum* Thbg.), Thunberg's, h. k. t. ?

uniflorum Lapeyr., einblumiger, 4. f. b. Pyrenäen.

variegatum Portensch., bunter, 4. f. b. k. Dalmatien.

Unbestimmtere: *bimaculatum* Brotero, *mutilatum* Brotero.

Heeria Meisn. (Oswald Heer, Profess. u. Director des botan. Gartens in Zürich), V. 1., Sapotaceae.

argentea Meisn. (= *Sideroxyylon argenteum* Thbg. = *Bumelia argentea* R. et S. = *Roemeria argentea* Thbg.), silberfarbige, $\text{h. k. t. Cap d. g. Hoffn.}$

inermis Meisn. (= *Sideroxyylon inerme* L., p. 755 = *S. atrovirens* Lam., W. = *Roemeria inermis* Thbg.), *melanophleos* Meisn., v. *Myrsine melanophleos*, p. 538.

Heeria elegans Schtdl., v. *Rhexia elegans*.

Hegemone Bunge, Engelblume, XIII. iv, Ranunculaceae.

lilacina Bunge (= *Trollius lilacinus* Bunge), lilafarbige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Hegetschweilera O. Heer (J. Hegetschweiler, Regierungs- und Staatsrath, Prof. der Botanik etc. zu Zürich, † Septbr. 1839), XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae (Hedysareae).

pulchella O. Heer, schöne, 4. w. Guiana.

Heimia Lk. et Otto, Heimie.

grandiflora Lindl. (= *salicifolia* Lk. var. β *grandiflora* Hook.), großblumige, $\text{h. h. t. k. Bonaria.}$

linariaefolia H. angl., leinkrautblättrige, h. h. t. Südäm.

myrtifolia Cham., Schtdl. (= *salicifolia* β var. Walp. = *Lythrum apetalum* Sngl.), myrtenblättrige, $\text{h. h. t. k. Brasilien.}$

Heinsia DC., Heinsie, V. 1., Rubiaceae.

jasminiflora DC., jasminblumige, $\text{h. w. Sierra Leone.}$

Helenium L., Helenie.

altissimum H. Berol., höchste, 4. f. Nordamerika.

autumnale L., β) *latifolium* Mill. (= ? *longifolium* Sm. ? = *pubescens* Ait), γ) *grandiflorum* Nutt., δ) *tubuliflorum* DC.

californicum Dougl., californische, ? \odot . f. Californien.

commutatum H. Berol., verwechselte, 4. f. Nordamerika.

elegans DC., zierliche, \odot . f. Mexico.

neglectum H. Berol., übersehene, 4. f. Nordamerika.

quadridentatum LaBill. (= *Milleri* Schult.).

undulatum Maund, wellenförmige, 4. f. Californien.

caespitosum Dougl. (= *lanatum* Sngl.), v. *Bahia lanata*, p. 58, II, *Douglasii* Hort., v. *Monolopia major*.

Heleocharis Lestib., Teichriet, (Sumpfbirse).

atropurpurea Kunth (= *Lereschii* Schuttlew. = *Scirpus Lereschii* Thom. = *monandra* Hochst. = *Aplostemum atropurp.* Rafin. = *Eleogenus atrop.* N. E. = *Eleogiton atrop.* A. Dietr. = *Isolepis atrop.* R. et S. = *S. atropurpureus* Retz, Vahl), dunkelpurpurfarbiges, \odot . f. Nord- u. Südamerika, Ostindien, Senegambien, Nubien, südl. Schweiz. β) *gymnocarpa* K.

capitata RBr. (= *atropurpurea* Presl, non Kunth = *sulciculmis* Rehb. = *Eleogenus capit.* N. E. = *Scirpus capitatus* L. = *S. caribaeus* Rotth. = *S. flavescens* Poir.), kopfförmiges, \odot . w. m. Südamerika, Ostindien, Neuholland.

Helogiton Lestib. (= *Eleogiton* Lk.), *fluitans* Lk., *verruculosa* A. Dietr., v. *Isolepis fluitans* et Ecklo-

niana, p. 425, *parvula* Lk. v. *Limnochloa parvula*, p. 464, — *glaucum* Rchb., *Lejeunii* Rchb., *litorale* Rchb., *pungens* Rchb., *trigonum* Rchb., *triquetrum* Rchb., v. *Scirpus Tabernaemontani*, *triqueter* γ, *litoralis*, *pungens*, *carinatus* et *triqueter*, p. 733.

Helianthemum T., Sonnenröschen.

arabicum P. (= *ibericum* Dsf.).

Broussonetii Dun., Broussonet's, ⚭. k. Teneriffa.

carolinianum Mchx. (= *Crocanthemum carolinianum* Spach).

corymbosum Mchx. (= *Heteromeris cymosa* Spach), traubendoldiges, ⚭. f. Nordamerika.

Fumana Mill. (= *calycinum* Auct. = *ericoides* Dun. = *fumarioides* Dsf. = *procumbens* Dun. = *Fumana vulgaris* Spach).

glomeratum Dun. (= *Cistus glomeratus* Lag. = *Lechea mexicana* H. Berol. = *Taeniostema micranthum* Spach).

glutinosum P. (= *Barrelieri* Tenore = *juniperinum* Lag. = *laeve* P. = *thymifol.* P. = *viride* Tenore).

guttatum Mill. (= *bupleurifol.* Dun. = *eriocaulon* Dun. = *heterodoxum* Dun. = *imbricatum* Lag. = *inconspicuum* Thib. = *macrosepalum* Salzm. = *plantagineum* P. = *praecox* Salzm. = *punctatum* Dun., P. = *Tuberaria annua* Spach).

halimifolium P. (= *multiflorum* L. = *Halimium lepidotum* Spach).

heterophyllum Steud. (= *algarviense* Dun. = *microphyllum* Sweet = *ocymoides* P. = *rugosum* Sweet, non Dun. = *Halimium heterophyllum* Spach), β) *candidum* Swt. (= *cheiranthoides* Swt.).

lasianthum P. (= *alyssoides* Vent. = *elongatum* P. = *formosum* P. = *rugosum* Dun. = *scabrosum* P.), β) *cheiranthoides* P., non Swt. (= *involucratum* P. = *Halimium lasianthum* Spach).

lavandulaefolium P., γ) *syriacum* Jacq., δ) H. Thibaudii P. (= *Cistus racemosus* Cav.).

ledifolium Mill. (= *lasiocarpum* Dsf. = *niloticum* P. = *pilosum* Mill. = *villosum* P., Thib.).

Libanotis P. (= *rosmarinifolium* Lagaca = *Halimium rosmarinif.* Spach.).

mexicanum Steud. (= *Heteromeris mexicana* Spach), mexicanisches, ⚭. k. Mexico.

nebrodense v. Heldr., nebrodisches, ⚭. k. Sicilien.

polyanthum P. (= *Cistus polyanthus* Dsf. = *Rhodax polyanthus* Spach), vielblumiges, ⚭. k. Nordafrika.

Rhodax Steud.¹⁾, (= *Rhodax Chamecistus* Spach), α) *cinereum* P. (= *crassifolium* P. *expartii*, = *marifolium* P. = *molle* P. = *paniculatum* Dun. = *rotundifolium* Dun.), β) *canum* Dun. (= *italicum* P. = *piloselloides* Dun. = *strigosum* Fisch. = *vineale* P.), γ) *alpestre* Dun. (= *obovatum* Dun. = *oclandicum* P. = *penicillatum* Dun. = *pulchellum* Swt.).

rosmarinifolium Pursh (= *Heteromeris rosmarinifolia* Spach = *Lechea major* Bigelow.), rosmarinblättriges, 4. ⚭. f. b. k. Nordamerika.

1) Stendel zieht hierher nach Spach's Vorgange mehrere als Varietäten, die bei andern Schriftstellern wohl mit Recht als Arten gelten, die aber des Vergleich's wegen hier noch einmal in anderer Weise aufgeführt werden.

Helianthemum

salicifolium P. (= *denticulatum* P. = *intermedium* Thib.
 = *fugacium* Mill. = *fugax* Dun. = *rubellum* Mch.).
 soongaricum Schrenk., soongarisches, 4. f. Soongaria.
 stellulatum Lk., sternförmiges, ? 4. f. ?
 Tuberaria Mill. (= *lignosum* Sweet = *Tuberaria pe-*
rennis Spach), β) *globulariaefolium* P.
 umbellatum Mill. (= *Cistus anthurus* Hort. = *C. um-*
bellatus L. = *Halimium umbell.* Spach).
 variabile Spach¹⁾ (= *H. Chamaecistus* Mill. = *H. vul-*
gare P. = *Cistus Helianthemum* L.), α) *barbatum* P.
 (= *cistifolium* Mill. = *echioides* P. = *grandiflorum*
 DC. = *hyssopifolium* Tenore = *Milleri* Swt. =
nummularium Mill. = *obscurum* P. = *sampsucifolium*
 Mill. = *sulphureum* W. = *tauricum* Swt.), β) *acu-*
minatum P. (= *hirsutum* Dun. = *lucidum* Hornem.
 = *macranthum* Swt. = *serpyllifol.* Dun. = *strami-*
neum Swt. = *surrejanum* Mill. = *tomentosum* Dun.
 = *Cistus helianthemoides* Dsf.), γ) *Andersonii* Swt.
 (= *croceum* P. = *glaucum* P. = *nudicaule* Dun. =
ovatum Dun.), δ) *apenninum* Mill. (= *cupreum* Swt.
 = *diversifolium* Swt. = *foetidum* P. = *lanceolatum*
 Sweet = *multiplex* Sweet = *mutabile* P. = *polifo-*
lium γ *roseum* K. = *roseum* DC. = *versicolor* Swt.),
 ϵ) *crassifolium* P. (= *Sexte* Lag. = *Cistus glaucus*
 Dsf., non Cav.), ζ) *asperum* Lagasc. (= *ciliatum* P.
 = *Cistus hirtus* Thib.), η) *racemosum* Dun. (= *re-*
flexum Mch.), θ) *polifolium* P. (= *apenninum* DC.
 = ? *arcuatum* Presl = *canescens* Swt. = *incanum*
 Mill. = *lusitanicum* Mill. = *pulverulentum* Swt., P.
 = *rhodanthum* Dun. = *venustum* Swt. = *rosmarini-*
folium Mart., non Presl, nec Pursh = *Cistus roseus*
 Jacq., non All. = *C. splendens* Lam.), ι) *pilosum* P.
 (= ? *bicolor* Presl = *confusum* Swt. = *lineare* P.
 = *linearifolium* Mch. = *racemosum* P. = *variega-*
tum Swt. = *violaceum* P. = *virgatum* P.), κ) *hispi-*
dum Dun. (= *majoranaefolium* β DC.), λ) *angusti-*
folium Dun. (= *leptophyllum* Dun. = *Cistus Barre-*
lieri Bot. mag. = *C. stoechadifolius* Hort.), μ) *hir-*
tum P. (= *aureum* P. = *baeticum* H. Madrit. =
Lagascæ Dun. = *Cistus teretifolius* Thib.).

Helianthus L., Sonnenrose.

annuus L., ϵ) *maximus* Hort., δ) *pyramidalis* Hort., γ)
albus H. Vindob.
atrorubens L. (= *sparsifolius* Ell. = *silphioides* Nutt.).
californicus DC. (= *longifolius* Hook.), californische,
 4. f. Californien.
Colossus Kunze, riesenhafte, \odot . f. Südamerika.
decapetalus L. (= *dodecapetalus* Jacq.), β) *frondosus* L.
doronicoides Lam. (= *Hookeri* G. Don = *pubescens* Vahl).
giganteus L. (= *virgatus* Lam.).
grosseserratus Mertens, grobsägezähne, 4. f. Nordam.
hirsutus Rafin., rauhaarige, 4. f. Nordamerika (Arkan-
 sas), Texas.
 β) *diversifolius* Ell.
lenticularis Dougl. (= *erythrocarpus* Bartl.).

1) Vergl. die Bemerkung bei *Helianthemum Rhodax* Steud.,
 auch p. 380–383.

2) Die übrigen Synonymen sind auszuschliessen, vgl. p. 383.

Helianthus

microcephalus Torr. et Gr. (= *divaricatus* Mchx., non L. = *parviflorus* Bernh.), kleinköpfige, 4. f. Nordam.
mollis Lam. (= *pubescens* W., non Vahl = *canescens* Mchx.).

orgyalis DC. (= *angustifolius* Mchx., non L.), klastert-hohe, 4. f. Nordamerika.

ovatus Lehm. (= *petiolaris* Hort., non Nutt.).

peruvianus Kl., peruanische, ☉. f. Peru.

rigidus Dsf. (= *atorubens* Mchx., (non L.), = *asper* Hort. = ? *luxurians* Hort. = *crassifolius* Nutt. β *diffusus* Sims = *laetiflorus* P. = *missouricus* Spgl. = *scaberrimus* Ell.), starre, 4. f. Nordamerika.
 Vergl. *Harpalium rigidum*, p. 377.

strumosus L. (= *macrophyllus* W. = *altissimus* β DC. = *mollis* W., Bot. mag.).

tomentosus Mchx., filzige, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *exaltatus* Hort., *flexuosus* Hort., *pilosus* Tausch, *ramosissimus* Mill., *serotinus* Tausch.

buphthalmoides Hort., v. *Heliopsis canescens*, p. 387,
oleifer Wall., v. *Guizotia oleifera*, p. 370.

Helichrysum Vaill., DC., Strohblume.

argenteum Thbg., W. (= *Stäbelina* W.).

armenium DC. (= *Gnaphalium armenium* Fisch. et Mey.), armenische, 4. \ddagger . f. b. k. Armenien.

auriculatum Less. (= *Gnaphalium auriculatum* Thbg. = *G. panduraefolium* Schrnk. = *G. patulum* Berg.), geöhrrte, \ddagger . t. k. Cap d. g. Hoffn.

Banksii Cunningh., Banks's, 4. \ddagger . t. Neuholland.

Baxteri Cunningh., Baxter's, 4. \ddagger . t. Neuholland.

bracteatum W. (= *chrysanthum* P. = *lucidum* Donnersm. = *Xeranthemum bracteatum* Vent.), c) plenum Hort., d) compositum Hort., e) horussorum rex Hort. etc.

ericaefolium Less. (= *ericoides* Don = *Gnaphalium ericoides* L., Thbg.).

expansum Less. (= *Gnaphalium drabaeforme* Schrank. = *G. notatum* Thbg. = *G. paniculatum* Berg.), ausgestreckte, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

farinosum Raddi, mehlig, 4. w. Brasilien.

felinum Less. (= *congestum* Don = *discolor* Don).

foetidum Mch. (= *Anaxeton foetidum* G. = *Gnaphalium foetidum* L.), β) *argenteum* (Mill.) (= *G. fruticans* Schrk.).

glutinosum A. Braun (= *foetidum* Schimp., non Mch.), klebrige, ☉. ♂. m. f. k. Abyssinien (Adoa).

imbricatum Less. (= *Astelma imbric.* Don = *Gnaph. imbric.* L.), ziegeldachförmige, \ddagger . t. k. Cap d. g. Hoffn.

macranthum Benth. (= *bracteatum* W. var. ?), großblumige, ☉. ♂. m. f. k. Neuholland.

b) fl. albo, c) fl. roseo.

molle Cunningh., weiche, ☉. m. f. Neuholland.

nebrodense v. Heldr., nebrodische, \ddagger . k. Sicilien.

niveum Grah., non Less., schneeweise, 4. k. t. Neuholl.

obconicum DC. (= *Antennaria leucophylla* Rehb. = *Gnaphalium crassifolium* Lowe), verkehrtekegelförmige, \ddagger . k. Madeira.

orientale G. (= *elongatum* Mch.), β) *fruticosum* (Mill.).

paniculatum Thbg. (= *angustifolium* P. = *argenteum* Andr., nec alior. = *Xeranthemum angustifol.* Lam. = *X. paniculatum* L.).

Helichrysum

plicatum DC. (= *Gnaphalium plicatum* Fisch. et Mey.), gefaltete, 4. ⚥. f. b. k. Persien.

retortum W. (= *argenteum* Schrk. = *radicans* Less. = *Argyrocome retorta* G. = *Astelma retortum* Don = *Xeranthemum retortum* L.), zurückgedrehte, ⚥. t. k. Cap d. g. Hoffn.

rubellum Less. (= *Gnaphalium rubellum* Thbg.), röthliche, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.

rupestre DC. (= *Gnaphalium glutinosum* Tenore = *G. pendulinum* Presl = *G. rupestre* Rafin.), Felsen-S., ⚥. k. Italien, Nordafrika.

sanguineum DC. (= *Gnaphal. sanguin.* L., p. 362).

saxatile Moris, steinliebende, ⚥. k. Sardinien.

scorpioides LaBill. (= *bupthalmoides* Sbr.), vergiftsmeinnichtblättrige, ? 4. t. k. Neuholland.

serpyllifolium Less. (= *helianthemifolium* Don).

squamosum Thbg. (= *herbaceum* Swt. = *splendens* Sims = *Xeranthemum herbaceum* Andr. = *X. squamosum* Thbg.), schuppige, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

striatum Thbg. (= *rigidum* Ait., D. Don = *Xeranthemum rigidum* Andr.).

virginicum DC. (= *Gnaphalium virgin.* Sibth., Sm. = *G. olympicum* Sieb.), jungfräuliche, 4. ⚥. k. Orient, Griechenland.

arborescens Don, v. *Anaxeton arborescens*, p. 53,

candidissimum Don, v. *Cladochaeta candidissima*, p.

148, II., *cephalotes* Don, v. *Metalasia cephalotes*,

diosmaefolium Don, v. *Ozothamnus diosmaefolius*,

flaccidum G. Don, v. *Achyrocline flaccida*, p. 7, II.,

spirale W. et *Stachelina* Thbg. etc., v. *Helipterum*

variegatum et speciosissimum etc., p. 388. — Hin-

sichtl. d. übrigen s. *Gnaphalium*, p. 362 et 268, II.

Heliconia L., Heliconie.

acuminata Rich., zugespitzte, 4. w. ?

cannoidea Rich., blumenrohrähnliche, 4. w. ?

farinosa Raddi, mehlig, 4. w. Brasilien.

speciosa H. Cels. et H. belg., prächtige, 4. w. ?

Helicteres L., Schraubenbaum.

brasiliensis Mikan (= *ovata* St. Hil.), brasilianischer, ⚥. w. Brasilien.

cordifolia Hffg., herzblättriger, ⚥. w. Brasilien.

Roxburghii G. Don (= *Ixora* Roxb., non L.), Roxburgh's, ⚥. w. Ostindien.

tiliaefolia Fisch., lindenblättriger, ⚥. w. Brasilien.

Heliophila L., Sonnenkraut.

amplexicaulis L. (= *integrifolia* H. Monspel.).

latisiliqua Fisch. et Mey., breitschotiges, ☉. m. f. Cap der guten Hoffn.

longifolia DC. (= *Leptormus longifolius* Eckl., Zeyh.), langblättriges, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

pendula W. (= *coronopifolia* β Lam. = *pinnata* Vent., Ait. = *Leptormus pendulus* Eckl., Zeyh. = *Trentepohlia pinnata* Roth = *Ormiscus pendulus* Spach).

pilosa Lam. (= *integrifolia* L. = *stricta* Sims = *Cheiranthus africanus* L. = *Orthoselis pilosa* Spach), β) arabioides Sims.

pinnata Thbg., L. fil. (= *trifida* DC., non Thbg., L. fil.), gefiedertes, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

tenuisiliqua DC. (= *Arabis capensis* Burm. = *Ormis-*

Heliophila

cus tenuisiliquis Eckl., Zeyh.), dünnschotiges, ☉. m. f.
Cap der guten Hoffnung.

Heliophytum DC., Sonnenkraut, V. 1., Asperifoliaeae (Borragineae).

anchusaefolium DC., ochsenzungenblättriges, ☿. w. Buenos Ayres, Brasilien.

α) *latifolium* DC., β *angustifolium* DC.

erosum DC. (= *Heliotropium erosum* Lehm.), ausgehissenes, ☿. t. Azoren, canarische Inseln, Senegambien.

β) *prostratum* DC. (= *Heliotropium plebejum* Banks, Mass.).

indicum DC. (= *anisophyllum* P. B. = *Heliotropium indicum* L. = *cordifolium* Mch. = *horminifolium* Mill. = *Tiaridium anisophyllum* G. Don = *T. indicum* Lehm., p. 810), indisches, ☉. m. f. Ostindien, Mascarenas, Mittelfrika, Nord- und Südamerika, Westindien.

monostachyum DC. (= *Heliotropium monostachyum* Chamiss. = *Tiaridium monostachyum* G. Don), einähriges, ☿. w. Brasilien.

parviflorum DC. (= *Heliotropium parviflorum* L. mant., p. 387 = *angiospermum* Murr.), Südamerika, Westindien.

velutinum DC. (= *Tiaridium velutinum* Lehm., p. 810).

Heliopsis P., Sonnengesicht.

mollis Wender., weiches, 4. f. ?

patula Wender., ausgebreitetes, 4. f. ?

stricta Wender., steifes, 4. f. ?

dubia Dun., v. *Spilanthes Mutisii*, *platyglossa* Cass., v. *Guizotia oleifera*, p. 370.

Heliosperma alpestris et *quadrifida* Rchb., v. *Silene alpestris* etc., p. 755.

Heliotropium T., Sonnenwende.

arbainense Fresen. (= *maroccanum* Raddi = *amboinense* G. Don), arbainisches, ☿. t. w. Arabien, Syrien, Aegypten.

Bocconi Gussone (= *villosum* Presl, non Dsf. = *aethnicum* Presl = *europaeum* β R. et S.), Boccone's, ☉. f. Sicilien, Griechenland.

brevifolium Wall. (= *compactum* Don).

curassavicum L. (= *chenopodioides* W. = *glaucophyllum* Mch. = *chilense* Bertero), Westindien, Südamerika, Cap d. g. Hoffn., Mauritanien.

dasycarpum Ledeb., rauchfrüchtige, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.

Eichwaldii Steud. (= *ellipticum* Ledeb., non RBr.), Eichwald's, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.

fruticosum L. (= *demissum* R. et S. = *humile* RBr. = *Tournefortia humilis* L.), strauchige, ☿. w. Westindien.

Kunzii Lehm. (= *villosum* Sieb., non Dsf. = *Syenites* Sngl. = *Brocchianum* Visian. = *cinereum* RBr.), Kunze's, ☿. t. Nordafrika, Abyssinien.

oblongifolium Hornem. (= *europaeum* Buch.), länglichblättrige, ☉. f. Canarische Inseln.

suaveolens MB. (= *europaeum* β MB. = *intermedium* Andrzy. = *commutatum* R. et S. = *humile* Schult. non Lam.).

tenuiflorum Gussone, dünnblumige, ☉. f. Spanien, Sicilien, Podolien, Griechenland, Aegypten.

Heliotropium

villosum W. (= *hirsutissimum* Webb.), zottige, ☉. f. Griechenland, Türkei.

Nicht hinlänglich bekannt: *H. Burmanni* R. et S. (= *tomentosum* Burm.), Burmann's, ☿. t. Cap d. g. H.

Hinsichtl. der übrigen s. *Heliophytum*.

Helipterum DC., Sonnenflügel (Immortelle).

albicans DC. (= *Helichrysum albicans* Cunn., non Sbr.), weißlicher, ☿. t. Neuholland.

heterophyllum DC. (= *Aphelaxis heterophylla* Don = *Edmondia bracteata* Cass. = *Helichrysum fasciculatum* var. Less. = *Xeranthemum fasciculatum* var. Andr. = *X. heterophyllum* a Lam. = *X. sesamoides* var. L.), verschiedenblättriger, ☿. t. Cap d. g. Hoffu.

humile DC. (= *Helichrysum humile* Less. = *pumilum* Hort. = *longibracteatum* Schrk. = *Xeranth. humile* Andr.), β) *pinifolium* (Schrk.).

polygalaeifolium Cunn. (= *Helichrysum polygalaeifolium* Cunn.), kreuzblumenblättriger, ☉. f. Neucambria.

punctatum DC., punctirter, 4. ☿. t. Van Diemens Land.

virgatum DC. (= *Helichrysum virgatum* W. = *Pteronia pauciflora* Sims = *Xeranthemum Stachelina* Don ? = *X. virgatum* Berg.), ruthenförmiger, ☿. t. Cap d. g. H. *Helleborine americana* Mill., v. *Bletia verecunda*, p. 125, *cordigera* L., *Lingua* L., *longipetala* Tenor., v. *Serapias cordigera* etc., p. 746.

Helleborus T. Adans., Nieswurz.

argutifolius Vivian. (= *heterophyllus* Wender.), spitzzahnige, 4. k. Corsica.

atrorubens W. K. (= *atropurpureus* Schult. = *odorus* β K.).

dumetorum W. K. (= *pallidus* Host.), Hecken-N., 4. f. Croatien, Illyrien.

intermedius Host. (non Gussone?), (= *latifolius* Mill. ? = *vernalis* D. Don), mittlere, 4. f. Croatien, Krain.

olympicus Lindl., olympische, 4. k. Griechenland.

Hellenia W., Hellenie.

alba W. (= *Alpinia alba* Rosc. = ? *Amomum medium* Lour. = *Heritiera alba* Retz = *Languas vulgare* Koen. = *Maranta Galanga* a Lam. = ? *Zingiber sylvestre* G.), weiße, 4. w. Ostindien.

aquatica W. (= *Alpinia aquatica* Rosc. = *Heritiera aquatica* Retz).

Helminthia Juss., G., Wurmsalat.

aculeata DC. (= *Picris aculeata* Vahl), stacheliger, 4. k. Sicilien, Nordafrika.

asplenioides DC. (= *Apargia scabra* Nocca = *Crepis sinuata* Lam. = *Deckera asplenioides* Schultz = *Hieracium asplenioides* Hort. Breit. = *Leontodon muricatus* L'Her. = *Virea scabra* Scop.), milzfarnnählicher, 4. k. Nordafrika.

echioides G. (= *tuberculata* Mch. = *Picris echioides* L.), β) *pratensis* Chev.

spinosa DC. (= *echioides* G. var. Spgl. = *rigida* Schult. *Picris spinosa* Poir.).

Helonias L., Schwindblume.

bullata L. (= *latifolia* Mchx. = *lanceolata* Bot. mag.).

japonica Schult. (= *Melanthium japonicum* W. = *luteum* Thbg.), japanische, 4. k. Japan.

angustifolia Mchx. (= *gracilis* Ell., nec Bot. mag. =

Helonias

laeta β *minor* K.), *erythrosperma* Mchx. (= *laeta* Ker), v. *Amiantanthus angustifolius* etc. Nachlese., *asphodeloides* L., v. *Xerophyllum asphodeloides*, *graminea* Ker, v. *Stenanthium angustifolium* et *gramineum*, *officinalis* G. Don, v. *Schoenocaulon officinale*, *lutea* Ker (= *pumila* Jacq. = *dioica* Pursh), v. *Chamaelirion carolinianum*, p. 186, *glaberrima* Sims, v. *Anticlea glauca*, p. 40, II.

Hinsichtlich der übrigen s. *Zygadenus*.

Helopus Trin., Haarspindelgras, III. II., Gramineae.

barbatus Trin. (= *Panicum ischaemoides* Koenig = *Paspalum barbatum* Schult. = *obtusifolium* Raddi), bärtiges, 4. w. Mascarenas.

punctatus N. E. (= *pilosus* Trin. = *Agrostis punctata* Lam. = *Eriochloa punctata* Hamilt. = *Milium punctatum* L. = *Oedipachne punctata* Lk., p. 553 = *Paspalum punctatum* Flügge = *Piptatherum annulatum* Raddi = *P. flavescens* Sieb. = *P. punctatum* P. B.).

Helosciadium K. DC., Sumpf-(Haar-)dolde.

bulbosum K. (= *intermedium* DC. = *Sison verticillatoinundatum* Thore = *Sium bulbosum* Thore = *S. intermedium* DC.).

crassipes K. (= *Sium crassipes* Spgl. = *S. limosum* Moris).

inundatum K. (= *Hydrocotyle inundata* Sm. = *Meum inundatum* Spgl. = *Sison inundatum* L. = *Sium inundatum* Roth).

laciniatum DC. (= *Sison laciniatum* L'Her.), p. 879.

leptophyllum DC. (= *lateriflorum* K., p. 879 = *Aethusa Ammi* et *leptophylla* Spgl. = *Pimpinella capillacea* Poit. = *P. dichotoma* Hort. = *P. dioica* Hort. = *P. lateriflora* Lk., p. 624 excl. Syn. = *P. leptophylla* P. = *P. ramosissima* Hort. = *Seseli ammoides* Hort. = *Sison Ammi* L. spec. Jacq. = *Sison capillaceus* Spgl. = *S. fasciculat.* Pohl = *S. Haenkei* Presl), schlankblättrige, ☉. f. Nord- u. Südamerika.

nodiflorum K. (= *Seseli nodiflorum* Scop. = *Sium nodiflorum* L.).

repens K. (= *Sium repens* L. fil.). Hiernach p. 389 etc. zu ergänzen und zu berichtigen.

*Ammi** v. *Ptychotes ammoides*, p. 666.

Heloseris palustris Rchb., v. *Senecio palustris*, p. 743.

Hemerocallis L., Taglilie.

rutilans van Houtte, rothgelbe, 4. f. ?

speciosa Herbert, prächtige, 4. w. Jamaica.

Hemiandra RBr., Halbbeutel.

emarginata Lindl., ausgerandeter, 4. $\frac{1}{2}$. k. t. Nenholland.

Hemicarpurus fornicatus N. E., v. *Atherurus ternatus*, p. 54, II.

Hemigenia RBr., Labiatae, purpurea RBr., sericea Benth., $\frac{1}{2}$. Neuholland. Ob kultivirt?**Hemilepis** Kunze, Halbschuppe, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

Ehrenbergii Kunze, Ehrenberg's, ☉. f. Aegypten.

Hemimeris L. fil., Halbblume.

montana Thbg., L. fil. (= *alsinoides* Lam. = *Diasia montana* Spgl.), Berg-H., ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

sabulosa Thbg., L. fil., sandliebende, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

acutifolia P., *caulialata* P., *coccinea* W. (= *linearis* P.), *incisifolia* P., *parviflora* H. B. K., *urticaefolia* W., v. *Alonsoa acutifolia* etc., p. 37 et 26, II. *Hemisandra aurantiaca* Scheidw., v. *Aphelandra aurantiaca*, p. 40, II.

Hemistephia lyrata Bunge, v. *Haplotaxis Bungei*, p. 284, II.

Hemistoma ovatum Ehb., v. *Leucas ovata*.

Hemitomus fruticosus L'Her., *urticaefolius* L'Her., v. *Alonsoa linearis* et *urticaefolia*, p. 37 et 26, II.

Henckelia grandiflora Dietr. (= *urticaefolia* Dietr.), v. *Chirita grandiflora*, p. 138, II. — *H. Rexii** v. *Streptocarpus Rexii*. — *H. Roxburghiana* Dietr., v. *Bonnaya reptans*, p. 127.

Henningia Karel. et Kiril. (Henning, Botaniker in Moskau), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

anisoptera Karel. et Kiril., ungleichflügelige, 4. Zw. f. Soongaria.

Heracantha cretica Lk., *lanata* Lk., *taurica* Lk., v. *Kentrophyllon leucocaulon*, p. 881, *lanatum* et *tauricum*, p. 437.

Heracleum L., Bärenklau.

amplissimum Wender. (= *Carmeli* Hort.), grofser, 4. f. ? Asiat. Rufsländ.

auritum Lehm., geöhrt, 4. f. Nordamerika.

barbatum Ledeb., bärtiger, ♂. f. Altai.

basvicum Hort., Lam., Swt., sibirischer, 4. f. Sibirien.

cordatum Presl (= *Panaces Ucria* = *Sphondylium Ucria*), herzförmiger, 4. f. Sicilien.

cyclocarpum C. Koch, kreisfrüchtiger, ♂. 4. f. Asiat. Rufsländ.

Douglasii DC., Douglas's, 4. f. Nordwestl. Amerika.

dulce Fisch. (= *dissectum* H. Petropol., nec Ledeb. = *Sphondylium* Cham. et Schldl.), süfser, 4. f. Kamtschatka.

flavescens Baumg., Bess., gelblicher, 4. f. Osteuropa, Sibirien.

a) *latifolium* DC. (= *austriacum* Pall. = *angustifolium* Jacq. = *sibiricum* L. mant.), β) *angustifolium* DC. (L. mant.).

grandiflorum Steven, grofsblumiger, 4. f. Caucasus.

hypoleucum Visian., weiflicher, 4. f. Nepal.

longifolium Jacq., langblättriger, 4. f. Oestreich.

minimum Lam. (= *bipinnatum* Gussone = *pumilum* Vill. = *Peucedanum Vocontiorum* Spgl., p. 611), kleinster, 4. f. Dauphiné.

obtusifolium Wall., stumpfblättriger, 4. f. b. Nepal.

palmatifidum Fisch., Mey. et Lalle., handfiedriger, 4. f. Iberien.

Panaces L. (= *flavescens* W. Enum. = *montanum* Schleich., Gaud).

pastinacifolium C. Koch, pastinakblättriger, ♂. 4. f. b. Armenien.

pubescens MB. (= *speciosum* Ledeb. H. Dorpat. = ? *gummiferum* W.).

Sphondylium L., β) *elegans* Jacq., γ) *caspicum* Hortul., δ) *laciniatum* Dsf.

subvillosum Fisch., wenigzottiger, 4. f. Sibirien.

trachyloma Fisch. et Mey., rauhsaumiger, ♂. f. Armenien.

Heracleum

villosum Fisch. (= *decipiens* Fisch. = *giganteum* Fisch., Hornem. = *marginatum* Hoffm. = *pyrenaicum* MB.), *tomentosum* Sibth., Sm., v. *Zozimia absinthifolia*, p. 865.

Herbertia Sweet, Herbertie.

pusilla Steud. (= *Ferraria pusilla* Lk., Otto), niedrige, 4. Zw. t. Brasilien.

Heritiera Ait., L'Heritiera.

grandis Fisch. (= *macrophylla* H. Belg.), große, ♀. w. ?

Hermannia L., Hermannie.

arabica Steud. et Hochst. (= *Kurria arabica* Steud. = *Trichanthera modesta* Ehb.), arabische, ☉. m. f. Arabien.

bipinnata Burch. (= *abrotanoides* Schrad. = *multifida* DC.).

borraginiflora Hook., borretschblumige, ♀. k. t. Südafrika.

candidissima Spr. fil., weißeste, ♀. k. t. Cap d. g. H. *cluytiaefolia* Otto et Dietr., cluytiablätterige, ♀. k. t. ? Cap der guten Hoffnung.

discolor Otto et Dietr., verschiedenfarbige, ♀. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

disticha Schrad. (= *rigida* Nocca = *rotundifolia* Jacq.).

glauca Hort., Herrenh., blaugrüne, ♀. k. t. Cap d. g. H.

incana Cavan. (= *althaeoides* Lk. = *ferruginea* Hort.), weißgraue, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

incisa W., schlitzbliättrige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

latifolia Jacq., breitblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

leucanthemifolia Otto et Dietr., wucherblumenblättrige, ♀. k. t. ? Cap d. g. Hoffn.

pulverulenta Andr. (= *argentea* Sm.).

venosa Bartl., aderige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Herbststaedtiaglauca Rehb., v. *Celosia glauca*, p. 174.

Herminium cordatum Lindl., v. *Peristylus cordatus*.

Hermodactylus tuberosus Salisb., v. *Iris tuberosa*, p. 423.

Herniaria T., Bruchkraut.

Besseri Fisch. (= *hirsuta* d'Urvill. = ? *incana* MB. = ? *microcarpa* Presl = *Millegrana* Pall.), Besser's, 4. f. Taurien, Podolien.

cinerea DC. (= *annua* Lagasc. = ? *latifolia* Lapeyr.).

diandra Bunge, zweimänniges, ☉. f. Samarkand.

incana Lam. (= *alpina* Loisel. = *lenticulata* L. spec. = *maritima* Lk.), weißgraues, 4. f. Italien, Frankr.

pyrenaica Gay, pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

Herpestes G., Wassermaske.

chrysantha Chamiss., Schldl., goldblumige, ☉. f. Mexico.

Monnieria H. B. K. (= *Brownei* Steud. = *cuneifolia* Lk. Enum., non Pursh, = *Capraria Monnieria* Roxb.

= *Gratiola Monnieria* L. = *G. portulacacea* Weinm. = *Monnieria Brownei* P.).

stricta Lk., steife, 4. w. Brasilien.

Herschelia Lindl., (Herschel, berühmter Astronom).

coelestis Lindl. (= *graminifolia* Sweet = *Disa graminifolia* Ker), himmelblaue, 4. w. Cap d. g. H.

Hertia Less., non Neck., Hertie, XIX., IV., Compositae-Corymbiferae.

crassifolia Less. (= *Othonna crassifolia* L., p. 547.)

- Hesiodia bicolor* Mch. (= *montana* Dumort.), v. *Sideritis montana*, p. 754).
- Hesperantha** Ker, Abendschwertel.
virginica Ker (= *Ixia virginica* Banks), jungfräulicher, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.
- Hesperis** T., Nachtviole.
laciniata All. (= *glutinosa* Visian. = *hieracifolia* Vill. = *Cheiranthus laciniatus* Poir.), β) *suaveolens* Bess., γ) *villosa* DC.
lyrata Lam, leierförmige, \odot . f. Sibirien.
matronalis L., γ) *grandiflora* fl. pleno, β) *sylvestris* Crantz (= *inodora* L. = *sibirica* Vill.), γ) *sibirica* L. (= *obtusata* Mch.).
nivea Baumg. (= *candicans* Hort.).
runcinata W. K. (= *elata* Hornem. = *excelsa* Hort.), β) *bituminosa* Savi (= ?*unguinosa* Schrank = *Deilosma suaveolens* Andrzy.).
speciosa Swt., v. *Neuroloma speciosum*.
- Hessea** Berg. (P. Hesse, botanisirte am Vorgebirge der guten Hoffn.), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
spiralis Berg. (= *Amaryllis spiralis* L'Her. = *Carpolyza spiralis* Salisb. = *Crinum spirale* Andr. = *C. tenellum* Jacq. = *Haemanthus spiralis* Ait., W. = *Strumaria spiralis* Ker, p. 791), spiralförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.
stellaris Herb. (= *Strumaria stellaris* Ker, p. 791).
Heteracantha lanata Lk., v. *Kentrophyllum lanatum*, p. 437.
- Heteranthera** R. et P., Ungleichbeutel.
graminea Vahl (= *Commelyna dubia* Jacq. = *Leptanthus gramineus* Mchx., p. 455 = *Schollera graminifolia* W. = *S. graminea* Bartr.), gräsähnlicher, 4. Wa. f. k. Pensylvanien, Virginien.
Heteranthemis Schott, v. *Chrys. visc.*, p. 193 et 142, II.
- Heterocaryum** A. DC., Verschiedennüßchen, V. 1., Asperifoliaceae.
laevigatum A. DC., glattes, \odot . f. Soongaria.
minimum A. DC. (= *Echinosperrum minimum* Lehm., p. 281 = *Myosotis echinophora* Pall.).
rigidum A. DC., starres, \odot . f. Altaisch. Sibirien.
Szovitsianum A. DC. (= *Echinosperrum Szovitsianum* Fisch. et Mey., p. 281).
Heterodon fragarioides Meisn., v. *Berardia fragarioides*, p. 65, II. — *H. superbus* Meisn., v. *Berzelia superba*, p. 66, II.
Heteroloma onobrychioides Desv., v. *Adesmia papposa*, p. 19.
Heterolophus sibiricus Cassin., v. *Centaurea sibirica*, p. 179.
Heteromeris canadensis Spach, *cymosa* Spach, *mexicana* Spach, *polifolia* Spach, v. *Helianthemum canadense*, *corymbosum* etc., p. 391 et 288, II.
- Heteromorpha** Chamiss., Schldtl., Wechseldolde, V. II., Umbelliferae.
arborescens Chamiss., Schldtl. (= *Bupleurum arborescens* Thbg., p. 139, non Jacq. = *Tenoria arborescens* Sngl.).
trifoliata Eckl., Zeyh., (= *Bupleurum trifoliatum* Bartl., Wendl.), dreiblättrige, β . k. t. Cap d. g. Hoffn.
Heteromorpha decipiens Cass., v. *Heterolepis decipiens*, p. 393.

Heteronema DC., Wechselweidrich, X. 1., Lythraeae-Melastomeae.

diversifolium DC. (= *Rhexia diversifolia* Domb., p. 683).

subtriplinervium DC. (= *Melastoma mexicana* Hort. = *M. subtriplinervia* Lk., Otto), fastdreinervige, ♂. w. Mexico.

Heterophyllum ramosum Bojer, v. *Buettneria heterophylla*, p. 80, 11.

Heteropteris H. B. K., Flügelkapsel.

argentea H. B. K. (= *Banisteria argentea* Spgl.), silberfarbige, ♂. Sch. w. Neugranada.

nitida H. B. K. (= *Banisteria nitida* Lam.), β) fulgens Lindl.

? *ovata* van Houtte (= *Echites heterophylla* Hort.), eiförmige, ♂. Sch. w. Südamerika.

paniculata van Houtte, rispige, ♂. Sch. w. Südamerika.

Heterotaxis crassifolia Lindl., *Dicrypta Baueri*, p. 201.

Heterotrichum DC., Verschiedenhaar, X. 1., Lythraeae-Melastomeae.

patens DC. (= *Melastoma grandiflora* Spgl. = *M. lappacea* Desr. = *M. patens* Sw. = *M. umbellata* Mill.), abstehendes, ♂. w. Domingo.

Heterotrichum leptophyllum MB., *pulchellum* Fisch., *salsum* MB., *squalidum* MB., *Stelleri* MB., v. *Saussurea salicifolia*, *pulchella*, *crassifolia*, *alata et elongata*, p. 723.

Heuchera L., Heuchera.

acerifolia Rafin., ahornblättrige, 4. f. Nordamerika.

bracteata DC. (= ? *Tiarella bracteata* Torrey), deckblättrige, 4. f. Nordamerika.

glabra W. (= *divaricata* Fisch. = *Tiarella colorans* Grah.).

hispidula Pursh (= *reniformis* Rafin.).

Menziesii Hook., Menzies's, 4. f. Nordamerika.

micrantha Dougl. (= *Barbarossa* Presl).

pubescens Pursh (= *grandiflora* et *pulverulenta* Rafin.).

ribifolia Fisch. et Lallemand., johannisbeerblättrige, 4. ♂. f. ? Nordamerika.

villosa Mchx. (= *squamosa* Rafin. = *parviflora* Bartl.).

Zu ergänzen p. 394.

Heurnia Spgl., v. *Huernia*.

Hewittia bicolor W. A., Steud., v. *Shutteria bicolor*.

Hexacentris N. E., Sechsspitze, XIV. 11., Acanthaceae.

coccinea N. E. (= *Thunbergia coccinea* Hook., p. 808), scharlachfarbige, ♂. Sch. w. Ostindien.

Hexaglottis flexuosa Sweet (= *longifolia* Vent.), v. *Sisyrinchium flexuosum*, p. 763, *virgata* Sweet, v. *Moraea virgata*.

Hexanthus umbellatus Lour., v. *Tetranthera ferruginea*, p. 802.

Hexastemon lanatus Kl., v. *Erica* (Sect. V. *Eremia*) *lanata*, p. 307.

Hexisea Lindl., Hexisea, XX. 1., Orchideae.

bidentata Lindl., zweizählige, 4. w. Panama, Columbia.

Hexorina dichotoma Rafin., v. *Streptopus roseus*, p. 790.

Heymassoli inermis Aubl. et *spinosa* Aubl., v. *Ximonia inermis* et *americana*, p. 860.

Heymia rigida Dennst., v. *Dentella repens*, p. 256.

Hibbertia Salisb., Andr., Hibbertie.

oblongata RBr., längliche, ♀. t. Neuholland.

perfoliata Hügel, Lindl., durchwachsene, ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

procumbens DC., (= *angustifolia* Salisb. = *Dillenia procumbens* LaBill.), niederliegende, ♀. t. Neuholland.

serpyllifolia RBr., quendelblättrige, ♀. t. Neuholland.

stellaris Endl., sternförmige, ♀. t. Neuholland.

Cunninghami Hook., v. *Candollea Cunninghami*, p.

115, II., *lanceolata* Hort. = ?

Hibiscus L., Eibisch.

amoenus Lk. et Otto, lieblicher, ♀. w. Montevideo.

armeniacus Bouché, armenischer, ☉. f. Armenien.

bahamensis Mill., bahamischer, ♀. w. Bahama.

calycinus W. (= *calyphyllus* Cavan.), großkelchiger, ♀. w. Bourbon.

Cameronii Knowl. et Westc. (= *insignis* Hort.).

β) *Cameroni-fulgens* Rollisson (Hybride mit *H. Rosa sinensis* erzogen).

cruentatus Schrk., schmutzgrother, ♀. w. ?

digitiformis DC. (= *digitatus* Poir., H. Par., non Cav.), fingerblättriger, ♀. w. ?

eriospermus Hochst., wollsaamiger, ☉. ♀. w. Abyssinien.

flabellatus Dsf. (= *heterophyllus* Vent. var. Spgl.), fächerförmiger, ♀. ♀. t. w. Neuholland.

hakeaefolius Giordano (= ? *Pimelea decussata* Hort., non RBr.), hakeablättriger, ♀. t. Neuholland.

Hamabo Sieb. et Zucc., Hamabo-E., ♀. t. Japan. (Ob kultiv.?)

Harrisii H. angl. et belg., Harris's, ♀. w. ?

heterophyllus Vent. (= *aculeatus* Dietr. = *Hügelii* Hort.).

Humboldtii Colla, Mart., Humboldt's, ♂. ♀. w. ? Südamer.

β) *virens* Hort.

Hügelii Endl., Hügel's, ♀. ♀. t. w. Neuholland.

immutabilis Delnh., unveränderlicher, ♀. w. ?

Jacquini Colla (= *pruriens* Jacq., non Roxb.), Jacquin's, ♀. ♀. w. Ostindien.

javanicus Weinm., javanischer, ♀. w. Java.

Jerroidianus Paxt., Jerrold's, ♀. ♀. w. Brasilien.

katguhriensis Hffg., katgührischer, ♀. w. Ostindien.

laevigatus Targ., Colla, glatter, ♀. w. ?

Lambertianus H. B. K., Lambert's, ☉. m. w. Südamer.

liliiiflorus Cav. (= *puniceus* Hort.).

militaris Cavan. (= *hastatus* Mchx. = *laevis* Scop. = *riparius* P. = *virginicus* Walt.).

Moorii H. Makoy., Moor's, ♀. w. ?

panduraeformis Burm. (= *pilosus* Roxb. = *setosus* Wall. = ? *velutinus* DC.), geigenförmiger, ☉. ♀. w. Ostindien.

Rainerianus Visian., Rainer's, ♂. ♀. k. Nordafrika.

regius v. Houtte, königlicher, ♀. w. ?

Sabdariffa L., (= *gossypifolius* Mill.).

scaber Mchx. (= *rugosus* Hort.).

sphaerocarpus Bouché, kugelfrüchtiger, ☉. m. f. ?

strictus Hornem., steifer, ☉. m. f. Nepal.

tridactylites Lindl., dreitheiliger, ☉. m. f. Neuholland.

Trionum L., δ) *hispidus* Mill., H. Petropol. (= *Humboldtii* Hort. = *Marschallianus* Hort.).

venustus Blume, lieblicher, ♀. w. Java.

Vrieseanus Hassk. (= *vitifolius* H. Bogoriensis, non L.), Vriese's, ♀. w. Java.

H. Abelsonschus L. *divaricatus* G. Don, Grah., *esculentus* L., *ficulneus* L., *ficulnoides* Lindl., *longifolius* W., *maculatus* Bartl., non Desr.), *Manihot* L., *Pseudo-Manihot* DC., p. 396 ¹⁾, *splendens* Lodd., Fras., gehören zur Gattung *Abelsonschus*, vergl. p. 1, II. Hinsichtl. der übrigen siehe die Gattungen *Kosteletzkya*, *Lagunaea*, *Pavonia*, *Paritium* und *Thespesia*.

Hicorius amarus Rafin., *integrifolius* Rafin., v. *Carya amara* et *integrifolia*, p. 168.

Hieracium T. Vaill., Habichtskraut.

I. *Pilosella* T. Vaill.

aurantiacum L., β) *flavum* Schlchr., Gaud. (= *repens* W.).
Bauhini Schult. (= *Auricula* W. = *filiferum* Tausch, ? = *melachaetum* Tausch.).

collinum Gochn. (= *asperum* Tausch, non Gaud., Schlchr. = *attenuatum* Tausch. = *calodon* Tausch.).

glomeratum Fröl. (= *cymosum* Flor. Dan. = *pratense* Tausch var. ?), knaulförmiges, 4. f. Dänemark, Preussen.

pratense Tausch. (= *ambiguum* Ehrh. = *cichoriifolium* Hort.).

stoloniflorum W. K., β) *Vogelianum* *

II. *Hieracium* T. Vaill. (= *Aurella* Tausch).

alpinum L. (= *apiculatum* Tausch = *Csercianum* Baumg. = *intermedium* Hoppe = *melanocephalum* Tausch = *piliferum* Hoppe = *polyanthemum* Vill. = *polytrichum* Ledeb. = *rupicapra* Schrk. = *subnudum* Schlchr. etc.).

bracteolatum Sibth., Sm., deckblättriges, 4. f. Griechenland, Sicilien.

brevifolium Tausch. (= *sabandum* L. var. ?), kurzblättriges, 4. f. Südeuropa.

canadense Mchx. (= ? *Kalmii* Spgl. = *virgatum* Pursh, non Hort.).

crassifolium Bernh., non Schult. (= *latifolium* var. ? Spgl.), dickblättriges, 4. f. ?

diffusum Froel. (= *ambiguum* Hort. Lands), weit-schweifiges, 4. f. ?

foliosum W. K. (= *viosum* Pall.).

globosum Dsf. (= *villosum* var. ? DC.), kugelköpfiges, 4. f. ?

graveolens Fröl. (= *calyculatum* Hornem.), starkkriechendes, 4. f. ?

helianthemifolium Fröl. (= *angustifolium* H. Landsh., non Hoppe), sonnenröschenblättriges, 4. f. Armenien.

hirsutum Bernh., rauhhaariges, 4. f. Nordamerika.

jacobaeaefolium Fröl. (= *nemosum* Lapeyr. = *sonchifolium* Fisch., non MB.), Jacobskrautblättriges, 4. f. Pyrenäen, Caucasus.

Lachenalii C. C. Gmel., γ) *diaphanum* Fr.

lycopsifolium Fröl. (= *sylvaticum* Spenn.), krummhalsblättriges, 4. f. Westl. Deutschland.

Milleri Lk. (= ? *carpathicum* Bess.), Miller's, 4. f. ?

prasinum Dumort. (= *glaucum* Lejeun.), lauchgrünes, 4. f. Belgien.

preanthoides Vill. (= *hirsutum* Tausch = *inuloides* Tausch. = *striatum* Tausch.).

1) p. 1, II. einzurangiren.

Hieracium

- repandum Schrk., ausgeschweiftes, 4. f. ?
 rubricaulum Dumort. (= *prenanthoides* Lejeun.), rothstengeliges, 4. f. Belgien.
 rupestre All., β) *Schmidtii* Tausch (= *candicans* Tausch = *Halleri* Hook., non Vill. = *ovatum* Hort. Vindob. = *villosum* Sm. = ? *murorum pilosissimum* L.).
 sabaudum L. (= *crassicaule* Tausch = *canadense* Hort.).
 saxatile Jacq., β) *graminifolium* Gaud. (= *lineariaefolium* Fröl. = *porrifolium* Hort. = *Willdenowii* Monn.).
 scabrum Mchx. (= *fasciculatum* Torrey = *virgatum* Poepp.), scharfes, 4. f. Nordamerika.
 Sternbergii Fröl. (non Schrad., Hornem.), Sternberg's, 4. f. Böhmen.
 ? *thyrsoideum* Fisch., straußförmiges, 4. f. Sibirien.
 umbellatum L. (= *serotinum* Host.), β) *coronopifolium* Bernh. (= *ceratophyllum* Dsf.
verruculatum Lk. (= *scabrum* Mchx. var. ? Spgl.), warziges, 4. f. Nordamerika.
villosum L. (= *pilosum* Schlchr. = *acutifolium* Hall. fil. = *aurimontanum* Schrk. = *valdepilosum* Vill.).
 Unbestimmtere: *edentulum* Hort., *sanguineum* H. Florent.
 Hinsichtl. der übrigen s. die Gattungen *Crepis*, p. 229 et 230, p. 167, II., *Tolpis* p. 812 et *Willemetia* p. 857.

Higginsia P. DC. (= *O. Higginsia* R. et P.), Higgen-sie, V. I., Rubiaceae.

mexicana Lk., Kl., Otto (= ? *Psychotria excelsa* H. B. K.), mexicanische, \S . t. Mexico.

Himantoglossum Spgl., Riemenzunge.

secundiflorum Rchb. (= *parviflorum* Spgl. = *Aceras secundifl.* Lindl. = *Ophrys densiflora* Dsf. = *O. secundiflora* Steud. = *Orchis parvifl.* W. = *O. secundifl.* Bertol. = *Satyrium maculatum* Dsf. = *S. parviflorum* P.), einseitsblunige, 4. Kn. f. b. k. Oberitalien, Corsica.

viride Rchb., v. *Peristylus viridis*.

Himeranthus Endl., Freudenblume, V. I., Solanaceae.

runcinatus Endl. (= *Linkii* Steud. = *Jaborosa runcinata* Lk. et Otto, ? non Lam.), schrotsägenförmige, 4. t. Bonaria, Montevideo.

Hinsia Benth., Hindsie, V. I., Rubiaceae.

longiflora Benth. (= *Rondeletia longiflora* Cham., Schldl.), langblumige, \S . \S . w. Brasilien.

β) *alba odorata* van Houtte.

violacea Benth., violette, \S . \S . w. Südl. Brasilien.

Hinterhubera Schultz Bipont. (G. Hinterhuber, Apotheker u. Botaniker in Salzburg), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Kotschyi Schultz Bipont., Kotschy's, ©. f. m. Abyssinien.

Hiorthia alexandrina Neck., v. *Cyrtolepis alexandrina*, p. 247, *aurea* Less., v. *Anthemis aurea*, p. 62, *orientalis* Less. et *valentina* Less., v. *Anacyclus orientalis et valentinus*, p. 50.

Hippeastrum Herb., Sternnarcisse.

ambiguum Herb., Hook., β) *longiflorum* Hook. — *H. advenum* Herb., *aulicum* Herb., *calyptratum* Herb., *crocatum* Herb., *equestre* Herb. (et *equestri-vittatum* Herb.), *fulgido-rutilum* Herb., *fulgidum* Herb., *miniatum* Herb. (et *subbarbatum* Herb. = *proliferum* Herb.),

Hippeastrum

psittacinum Herb., *pulverulentum* Herb., *Reginae* Herb., *reticulatum* Herb., *rutilum* Herb., (et *rutilo-equestrivittatum* Herb. et *rutilo-Reginae-vittatum* Herb. et *spathaceo-hybridum* Herb. et *splendens* Herb.), *striatifolium* Herb., *stylosum* Herb., *vittatum* Herb., v. *Amaryllis advena* etc. etc., p. 44 et 45, et p. 30 et 31, II.

Hippia stolonifera Brot., v. *Gymnostyles lusitanica* (= *Soliva stolonifera* RBr., Loud., p. 771 et 278 II.).

Hippion viscosum Spgl., v. *Ixanthus viscosus*, *Amarella* Schmidt, *campestre* Schmidt etc., v. *Gentiana Amarella*, *campestris*, etc., p. 350.

Hippobroma breviflora G. Don, *longiflora* G. Don, v. *Isotoma breviflora* et *longiflora*, p. 426.

Hippobromus

Eckl., Zeyh., Rossumach, XXII. v., (V. III.), Amyrideae-Terebinthaceae.

alatus Eckl., Zeyh. (= *Rhus alata* Thbg., p. 686 = *Weinmannia dioica* Spgl.), geflügelter, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Hippocastanum Adans., *vulgare* G., v. *Aesculus Hippocastanum*, p. 21.

Hippocentaurea Centaurium Schult. etc., v. *Erythraea Centaurium* etc., p. 314 et p. 232, II.

Hippocrepis

L., Hufschote.

constricta Kunze (= ? *biflora* Schimp., non Jacq.), verengte, ☉. f. Arabien.

Hippoglossum Hartm., *maritimum* Hartm., *virginicum* Lilja (= *Platynema maritimum** et *pulchrum** p. 634), v. *Mertensia maritima* et *virginica*.

Hippomarathrum Lk., *crispum* K., *Libanotis* K., *siculum* Lk., v. *Cachrys crispa*, *Libanotis*, *sicula*, p. 142 et 84, II., — *H. pelviforme* G. M. S. (= *vulgare* Roch.), v. *Seseli Hippomarathrum*, p. 749.

Hippophaë

L., Sanddorn.

fasciculata Wall., büschelförmiger, ♀. f. b. Nepal.

rhamnoides L., α) *taurica*, β) *sibirica* (= *angustifolia* Lodd.).

salicifolia D. Don (= *conferta* Wall. = *nepalensis* Hort.).

Hiptage

G., Hiptage.

javanica Blume, javanische, ♀. Sch. w. Java.

Madablota G. (= *Banisteria benghalensis* L. = *B. tetraptera* Sonner. = *B. unicapsularis* Lam. = *Gärtnera racemosa* Roxb. = *Molina racemosa* Cavan.).

Hiraea Houlettiana H. Cels., v. *Poivrea* (= *Combreum*) Afzelii, p. 640.

Hirculus flagellaris Haw., *ranunculoides* Haw., v. *Saxifraga flagellaris*, *Hirculus*, p. 724, 725.

Hirschfeldia adpressa Mch., v. *Erucastrum incanum*, p. 312.

Mladnickia golacensis K., v. *Malabaila golacensis*. — *H. pastinacifolia* Rchb., v. *Falcaria latifolia*, p. 329.

Hoarea atra Swt., *bubonifolia* Swt. etc., v. *Pelargonium atrum* etc., Sect. VII., p. 599. — *H. bicolor* Swt. (= *blanda* Swt. = *pilosa* Swt.) = *Pelarg. pilosum*. — *H. carinata* Swt. = *Pelarg. nutans*. — *H. elegans* Swt. = *Pelarg. Sweetianum*.

Als Hybriden gehören zu dieser Section:

H. atrosanguinea Swt., *coccinea* Swt., *Colvilli* Swt., *fuscata* Colvill., *galegifolia* Swt., *hedysarifolia* Swt.,

Hiptage

Jenkinsonii Colvill., intertexta Swt., labyrinthica Swt., lilacina Swt., literata Swt., magica Colv., Swt., marginata Swt., nigricans Colv., orobifolia Swt., patens Swt., pulchella Swt., recurviflora Swt., replicata Swt., retusa Swt., selinifolia Swt., sisymbriifolia Swt., superba Swt., tenuifolia Swt., unguiculata Swt., varia Swt., venosa Swt., villosa Swt.

Hocquartia macrophylla Dumort., *tomentosa* Dumort., v. *Aristolochia Siphon* et *tomentosa*, p. 78.

Hoffmannseggia Cav., Hoffmannseggie.

Drummondii Torr. et Gr. Drummond's, 4. ♂. t. Texas. *gracilis* Hook., Arn. (= *Larrea gracilis* R. et P.), schlanke, ♂. t. w. Chili.

Hohenbergia Schult. fil., Hohenbergie, VI. 1., Bromeliaceae.

fasciata Schult. fil. (= *Billbergia fasciata* Lindl., p. 123), bandförmige, 4. w. Brasilien.

Ob *H. billbergioides* Schult. fil., *capitata* Schult. fil., *stellata* Schult. fil., sämmtlich 4. und in Brasilien heimisch, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt. — *H. strobilacea* Schult. fil., v. *Acanthostachys strobilacea*, p. 5, II.

Hohenwarthia David Pacher, (Baron v. Hohenwarth, Bischoff, bereiste die Tyroler etc. Alpen in botan. Hinsicht), X. III., Caryophyllaceae-Sileneae.

Pumilio D. Pacher (= *Silene Pumilio* Wulf. = *Saponaria Pumilio* Fenzl), niedrige, 4. f. b. Carnische, norische und rhätische Alpen.

Hoitzia Juss., Hoitzia.

Cervantesii H. B. K. (= *spicata* W. herb.), Cervantes's, ♂. t. Mexico.

coccinea Cav. (= *mexicana* Lam. = *Cantua coccinea* Poir. = *C. Hoitzia* W. = *Loeselia coccinea* G. Don.).

coerulea Cav. (= *Cantua coerulea* Poir. = *Loeselia coerulea* G. Don.).

glandulosa Cav. (= *Cantua glandulosa* Poir. = *Loeselia glandulosa* G. Don.). Vergl. p. 402.

Holarrhena RBr., Röhrenbeutel.

antidysenterica Wall. (= *Chonemorpha antidysenterica* G. Don. = *Echites antidysent.* Roxb., p. 281), ruhrvertreibender, ♂. Sch. w. Ostindien, Nepal.

Holboellia angustifolia Wall., *latifolia* Wall., v. *Stauntonia angustifolia* et *latifolia*.

Holcus L., Honiggras.

annuus Salz. (= *ventricosus* Hort. Gorenk.), jähriges, ☉. f. Nordafrika.

setiger N. E., borstentragendes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Hollia * (D. F. Holl, Lehrer d. Pharmacie zu Dresden, bereiste als Botaniker Portugal und Madeira), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

comosa * (= *Anthericum comosum* Stbg. = *A. Sternbergianum* R. et S. = *Cordyline vivipara* Hort. = *Chlorophytum Sternbergianum* Steud. = *Hartwegia comosa* N. E. = *Phalangium viviparum* Reinw.), schopfige, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.

Hollia africana * v. *Noltea africana*.

Holmskioldia Retz, Holmskioldie.

sanguinea Retz (= *rubra* P. = *Hastingia coccinea* Sm. = *Platanium rubrum* Juss.).

scandens Roxb. (= *Hastingia scandens* Swt.).

Hologymne californica Bartl., *Douglasii* Hort. Petropol., *glabrata* Bartl., v. *Monolopia californica*, major et glabra.

Hololachne Ehb., v. *Halolachne*.

Hololepis pedunculata DC., v. *Vernonia pedunculata*, p. 841.

Holoregmia viscida N. E., v. *Craniolaria unibracteata*, p. 164, II.

Holoschoenus Lk., *atrovirens* Lk. etc., v. *Isolepis*, Sect. II.

Holosteum L., Spurre.

glutinosa Fisch. et Mey., (non Fr.), klebrige, ☉. f. Taurien, Gegend d. caspischen Meeres.

liniflorum Stev. (= *Arenaria glutinosa* MB. = *Lepigonum glutinosum* Swt. = *Spergularia glutinosa* G. Don, p. 38), leinblumige, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.

sperguloides Lehm., sparkähnliche, ☉. f. Aegypten.

Holostigma cheiranthifolium, *heterophyllum* Spach, *micranthum* Spach, *minutiflorum* Spach, v. *Sphaerostigma cheiranthifolium*, *hirtum*, *micranthum* et *minutiflorum*, p. 777.

Homalantes A. Juss., (= *Omalanthus* Grah., p. 557), Flachblume.

Leschenaultianus Juss., *Leschenault's*, ♂. ♀. w. Java. *populifolius* Grah., p. 557.

Homalonema Schott, Natterkraut, VII. I. (XXI. VI.), Aroideae.

aromaticum Schott (= *Calla aromatica* Roxb. = *C. occulta* Lodd., non Lour. = *Zantedeschia aromatica* Speg.), gewürzhaftes, 4. ♀. Wa. w. Ostindien.

Homeria Vent., *collina* Swt. (= *ochroleuca* Salisb.), β) *aurantiaca* Swt.

Homogyne Cass. (= *Tussilago* T., Sect. II., p. 828), Alpenlattig, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

alpina Cass. (= *Tussilago alpina* L.), gemeiner, 4. f. Mitteleuropa, Alpen und Voralpen.

discolor Cass. (= *Tuss. discolor* Jacq.), verschiedenfarbiger, 4. f. Oesterreichische etc. Alpen.

sylvestris Cass. (= *Tuss. sylvestris* Scop.), Wald-L., 4. f. Kärnthen, Krain etc.

Homostylium N. E., *cabulicum* N. E., v. *Aster*, Sect. X^b., p. 51, II.

Honckenia *peplodes* Ehrh., v. *Alsine*, Sect. II., p. 38.

Hoodia Swt. (= *Monothylaceum* G. Don = *Scytanthus* Hook.), Hoodie, V. II., Asclepiadeae.

Curreri Decaisne (= *Scytanthus Curreri* Hook.), *Curreri's*, 4. ♀. w. Cap d. g. Hoffn.

Gordoni Swt. (= *Stapelia Gordoni* Mass., p. 782 = *Scytanthus Gordoni* Hook.), *Gordon's*, 4. ♀. w. Cap der guten Hoffnung.

Hopkirkia Eupatoria Speg., *hirsuta* Speg., *scandens* Speg., v. *Salmea Eupatoria* etc., p. 715.

Hoplotheca floridana Nutt. etc., v. *Froelichia floridana* etc., p. 248, II.

Hoppea sibirica Rehb., *speciosa* Rehb., v. *Ligularia sibirica* et *Reichenbachii*, p. 462.

Hordeum T., Gerste.

coeleste Viborg, P. B., a) *barbatum* Sering., b) *trifurcatum* Sering.

Hordeum

distichum L., a) laxum H. Petr., b) sublaxum H. Petr.
c) densum Sering., d) nigricans Sering. (seminibus
nigris), e) ramosum Sering.

hexastichon L., a) abbreviatum H. Petrop., b) elongatum H. Petrop., c) laxum Sering., d) densum Sering.,
e) tetrastachyum Sering.

murinum L., γ) leporinum Lk.

nepalense Swt., nepalsche, ☉. f. Nepal.

nodosum L., β) sibiricum Lk.

nudum Arduin, Schüb. (= *imberbe* R. et S. = *distichum* β W. = *coelestoides* Sering.), nackte, ☉. f. ?
 β) chinense H. Petrop.

vulgare L. (= *sativum* P.), a) pallidum Sering., b) coerulescens Sering., c) nigrum W., d) tortile Sering.,
e) hibernum, f) spica abbreviata H. Petrop., g) spica elongata H. Petrop., aa) seminibus majoribus, bb) seminibus minoribus, h) sanguineum Hort., i) multicaule Hort. etc. Ob arachnoideum Hort., distans Hort., intermedium Hornem., auch als Varietäten zu letzterer Art gehören, ist mir nicht bekannt.

Horkelia Chamiss., Schltdl., Horkelie.

californica Schltdl. (= *Sibbaldia californica* Sngl.), californische, 4. f. b. Californien.

capitata Lindl., kopfförmige, 4. f. b. Nordamerika.

congesta Dougl., Hook. (= *hirsuta* Lindl. = *pilosa* Nutt.).

cuneata Lindl. (= *Douglasiana* Nutt.), keilblättrige, 4. f. b. Californien.

Horninum virginicum L., v. *Salvia lyrata*, p. 717.

Hornemannia ovata Lk. et Otto, *viscosa* W., v. *Vandellia crustacea* et *hirsuta*.

Hornungia Rchb., (Hornung, Apotheker u. Botaniker in Aschersleben), XV. II., Cruciferae.

petraea Rchb. (= *Hutschinsia petraea* RBr., p. 406).

Hornungia Bernh., v. *Gagea reticulata*, p. 251, II.

Horta spinosa Vellozo, v. *Clavija ornata*, p. 202.

Hosackia Dougl., Hosackie.

parviflora Benth., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.

subpinnata Torr. et A. Gr., G. Don (= *Anisolotus anthylloides* Bernh., p. 869 = *Anthyllis chilensis* DC. = *Lotus subpinnatus* Lag.), fastfiederige, ☉. ♂. f. Chili, Californien.

Wrangeliana Torr. et A. Gr. (= *Anisolotus Wrangelianus* Bernh., p. 869 = *Lotus Wrangelianus* Fisch. et Mey., p. 478).

Hosta pyramidata Dietr., v. *Cornutia pyramidata*, p. 220. — *H. foetida* Mch., *rubra* Cass., v. *Barkhausia foetida* et *rubra*, p. 113.

Hoteia Sieb., Morr. et Decne. (Von H. v. Siebold nach einem japanischen Botaniker Namens Hotei, benannt), X. II., Saxifrageae.

bitermata Morr. et Decne. (= *Astilbe decandra* Don = *Tiarella bitermata* Vent.), doppeldreizählige, 4. f. Nordamerika.

japonica Morr. et Decne. (= *Spiraea japonica* Thbg. et Hort. belg., p. 778), japanische, 4. ♀. f. b. Japan.

Houlletia Lindl., Houlletie, XX. I., Orchideae.

Brocklehurstiana Lindl., Hook. (= *stapeliaeflora* H. belg. = *Maxillaria Brocklehursti* H. belg.), Brocklehurst's, 4. w. Brasilien.

Houletia

vittata H. Makoy., verschleierte, 4. w. ? Brasilien.

Houstonia L., Houstonie.

ciliolata Torr. et A. Gr. (= *ciliata* Loud.), feinwimperige, 4. k. f. b. Nordamerika.

coerulea L. (= *grandiflora* Rafin. = *Linnaei* Mchx. = *Hedyotis coerulea* Torr. et A. Gr.).

crocea H. Cels., safranfarbige, 4. f. k. ?

tenuifolia Nutt. (= *divaricata* H. Angl.), dünnblättrige, 4. k. f. b. Nordamerika.

Houttea * *tubiflora* * v. *Gloxinia*, Sect. III.**Hovea** RBr., Hovea.

acutifolia A. Cunn., G. Don, spitzblättrige, f. t. Neuh.

ferruginea v. Houtte, rostfarbige, f. t. Neuholland.

hirsuta H. Angl., rauhhaarige, f. t. Neuholland.

ilicifolia A. Cunn.¹⁾, stechhülsenblättrige, f. t. Neuh.

β) *glauca* v. Houtte (= *cordata* Hort.), γ) *rundifolia* v. Houtte.

lanigera Lodd. (= *pannosa* A. Cunningh.).

longipes Benth., langstielige, f. t. Neuholland.

multiflora Makoy, vielblumige, f. t. Neuholland.

pungens Benth., β) *major* Paxt.

racemulosa Lindl., traubige, f. t. Neuholland.

ramulosa A. Cunningh., ästige, f. t. Neuholland.

spicata Makoy, ährige, f. t. Neuholland.

splendens v. Houtte, schimmernde, f. t. Neuholland.

trifoliata Hort. (= *Mirbelia triternata*, p. 526).

Hovenia Thbg., Hovenie.

acerba Lindl., saure, f. t. Ostindien, China.

Hoya RBr., Hoya.

angustifolia Lindl., schmalblättrige, f. Sch. w. China.

chinensis Lindl., (= *Schollia chinensis* Jacq.), chinesische, f. Sch. w. China.

coriacea Blume (non Lindl.), lederartige, f. Sch. w. Java.

crassifolia Haw., dickblättrige, f. Sch. w. (Zweifelhaft).

pallida Lindl. (= *lanceolata* Lindl. non Wall. = *acuta* Haw. = *albans* Mill.).

Pottsii Traill., Lodd.

coriacea Lindl., non Bl. (= *Centrostemma Lindleyanum* Decsne.), *multiflora* Blume, *reflexa* Hort., v. *Cyrtoceras coriaceum* etc., p. 183, 11.

Huberia DC., (Huber, berühmt. Naturforsch. in Genf), X. 1., Lythriariae-Melastomeae.

annulata DC. (= *Majeta annulata* Vent. = *Melastoma annulata* Poir.), geringelte, f. w. Java.

argentea DC. (= *Majeta argentea* Vent. = *Melastoma argentea* Poir.), silberfarbige, f. w. Brasilien.

laurina DC. (= *laurifolia* H. belg. = *Melastoma laurina* Sering.), lorbeerähnliche, f. w. Brasilien.

semiserrata DC. (= *Rhexia semiserrata* Schrk., Mart.), halbsägezahnige, f. w. Brasilien.

Hubertia Juss., Bory, Hubertie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

pinifolia Juss., Sbr. (= *Conyza pinifolia* Bory = *Faujasia pinifolia* Cass. = *Senecio pinifolius* P. = *S. Commersonii* Speg.), kieferblättrige, f. t. Mauritius.

Hügelia Benth., v. *Gilia*, Sect. I., p. 262.

1) Soll mit *Plagiolobium ilicifolium* Swt. nicht = sein.

Huernia RBr., Huernie.

clavigera Haw. (= *Stapelia campanulata* Sims excl. syn.).
tubata RBr., β) duodecimfida Haw, (= *Stapelia duodecimfida* Jacq.).

Hufelandia N. E., (Hufeland, k. pr. geh. Medicinalrath etc., bekannter u. berühmter Arzt in Berlin), IX. 1., Laurineae.

latifolia N. E., breitblättrige, \mathfrak{h} . w. Peru.

pendula N. E. (= *Laurus pendula* Sw., p. 449).

thyrsiflora N. E. (= *Laurus thyrsiflora* Poir., p. 449).

Hugueninia Rchb., (A. Huguenin, Botaniker zu Chambery in Savoyen), XV. III, Cruciferae.

tanacetifolia Rchb. (= *Sisymbrium tanacetifolium* L.),
rainfarnblättrige, 4. f. Schweiz, Italien, Frankreich.

Hulthemia berberidifolia Dumort., v. *Lowea berberifolia*.

Humboldtia R. et P. (non Vahl), *emarginata* R. et P., v. *Physosiphon emarginatus*, p. 621, *parviflora* R. et P., v. *Stelis micrantha*, p. 786.

Huntleya Batem., Huntleya.

sessiliflora Batem., stiellosblumige, 4. w. Guiana.

Hutchinsia RBr., Hutchinsie.

alba Bunge H. Dorpat. (= *Sisymbrium album* Pall. = *Nasturtium album* Sogl. = *Smelowskia cinerea* C. A. Mey.), weisse, 4. f. Sibirien.

bifurcata Bunge (= *Smelowskia bifurcata* Turcz.), zweigabelige, 4. f. Dahurien (Baical).

petraea RBr. = *Hornungia petraea*.

Hyacinthus T., Hyacinthe.

griseus Brouss. H. Monspel., graue, 4. Zw. f. ?

nanus R. et S. (= *Puschkinia scilloides* Sbr., non Adams., = *Scilla bifolia* Sbr., non L.), zwergige, 4. Zw. k. f. b. Creta.

orientalis L., β) foliis recumbentibus Redouté, γ) monstrosus Kunth.

Pouzolzii Gay. (= *Scilla fastigiata* Vivian = *S. verna* Moris = *S. verna* γ R. et S.), Pouzolz's, 4. Zw. k. f. b. Corsica.

Zweifelhafte: convallarioides Thbg., L. Suppl., Jacq. Schönbr., maiblumenähnliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

bifolius Boutelou, v. *Polyxena pygmaea*, *corymbosus* L. mant., v. *Periboea corymbosa*.

Hinsichtl. d. übrigen s. d. Gattungen *Agraphis*, p. 14, II. (*Scilla*, Sect. II., p. 732), *Bellevalia*, p. 117 et 64, II., *Botryanthus*, p. 75, II., *Muscari*, p. 534 et *Uropetalum*, p. 831.

Hyaenanche Lam.

capensis P. (= *globosa* Lamb. = *Jatropha globosa* G. = *Toxicodendron capense* Thbg.).

Hyalis Salisb. (non DC.), *aulica* Salisb., *gracilis* Salisb., v. *Ixia aulica*, *capillaris*, p. 426, *longiflora* Salisb., v. *Montbretia* (= *Tritonia* = *Waitzia*) *longiflora*, p. 854.

Hybanthera Endl., Höckerbeutel, V. II., Asclepiadeae. *biglandulosa* Endl., doppeldrüsig, 4. \mathfrak{h} . Sch. t. Norfolkinsel.

cordifolia H. belg., v. *Tylophora lutescens*.

Hybanthus concolor Sogl., v. *Solea concolor*, p. 769.

Hybridella globosa Cass., v. *Chiliophyllum globosum*, p. 190.

Hydrangea L., Wasserstrauch.

arborescens L., β) *cordata* Torr. et A. Gray (= *cordata* Pursh).

cordifolia Sieb. et Zucc., herzblättrige, \S . k. f. b. Japan.

Hortensia DC. (= *globulifera* Sering. = *hortensis* Sm.

= *opuloides* Hort. = *mutabilis* Hort. = *Hortensia*

opuloides Lam. ¹⁾ = *Hort. rosea* Dsf. = *H. speciosa*

P. = *Peautia* Commers.), b. fl. coeruleo.

japonica Siebold et DC. prodr. (= *normalis* Sering.),

japanische, \S . k. f. b. Japan.

β) *hortensioides* * ²⁾.

involutrata Sieb., eingehüllte, \S . k. f. b. Japan.

macrophylla DC. (= *Viburnum macrophyllum* Thbg.),

großblättrige, \S . k. f. b. Japan.

Otaksa Sieb. et Zuccar., Otaksa-W., \S . k. f. b. Japan.

pubescens Courtois (= *radiata* var. ? W. Enum. =

Neesiana Steud. = *glauca* Hort.), weichhaarige, \S . f. ?

quercifolia Bartr., β) *angulata* Tausch.

stellata Sieb. et Zuccar. (= *Sitsitan* Sieb.), sternför-

mige, \S . k. f. b. Japan.

Thunbergii Sieb. (= *serrata* DC. = *Viburnum serra-*

tum Thbg.), Thunberg's, \S . k. f. b. Japan.

Unbestimmt: *laevigata* H. Cels.

(Aufserdem wachsen in Japan noch folgende wild, die

bis jetzt noch nicht eingeführt zu sein scheinen, als:

acuminata Sieb. et Zuccar., *Azizai* Sieb., *Belzoni*

Sieb. et Zuccar., *bracteata* Sieb. et Zuccar. (= *cor-*

difolia var. Sieb. et Zuccar.), *hirta* Sieb. et Zuccar.,

paniculata Sieb. et Zuccar., *petiolaris* Sieb. et Zuccar.,

virens Sieb. (= *scandens* DC. = *Viburnum virens*

Thbg.); — in Nepal: *altissima* Wall., *anomala* Wall.,

aspera D. Don, *vestita* Wall. etc. — *H. alternifolia*

Sieb. = *Cardiandra alternifolia*).

Hydrastylis californicus Salisb., v. *Sisyrinchium californicum*, p. 762.

Hydrocera Blume, Wasserhorn, V. r., Balsamineae (Hydrocereae Blume).

triflora Wight et Arn. (= *natans* Blume = *Impatiens*

baccifera Roxb. = *I. natans* W. = *I. triflora* L.,

p. 415 = *Tytonia natans* G. Don), dreiblunige, ☉.

Wa. m. w. Ostindien.

Hydrochloa Hartm., *airoides* Hartm., *apuatica* Hartm.,

arundinacea Swt., *distans* Hartm., v. *Glyceria aqua-*

tica etc., p. 360 et 361 et p. 266 et 267, II. —

H. carolinensis P. B., v. *Hydropyrum fluitans*,

p. 407.

Hydrocleis L. C. Rich., Wasserlöffel, XIII. vi. Alismaceae-Butomeae.

Humboldtii Endl. (= *Limnocharis Humboldtii* L. C.

Rich., p. 464 = *Stratiotes nymphoides* W.), Hum-

boldt's, 4. Wa. w. Südamerika.

Hydrocotyle T., Wassernabel.

bonariensis Lam., a) *multiflora* R. et P., β) *tribotrys*

R. et P. (= *polystachya a* Rich.).

1) Von Commerson zu Ehren der Hortense Lepaut, der Frau eines berühmten Uhrmachers zu Paris so benannt, und von Lamarck in der Encyclop. botan. aufgenommen.

2) Bastard von *H. Hortensia* und *japonica*, von Herrn René Rovellis, Obergärtner auf den borromäischen Inseln, gezogen.

Hydrocotyle

brasiliensis Scheidw., brasilianischer, 4. Wa. w. Brasilien.
nepalensis Hook., (= *capitata* Moon = *hispida* D. Don).
ranunculoides Don, L. fil. (= *cymbalariaefolia* Mühl-
berg, Ell.).

repanda P. (= *cordata* Walt. = *erecta* L. fil. =
ficarioides Mchx. = *reniformis* Walt.).

sibthorpioides Lam. (= *ranunculoides* β R. et S. =
Chondrocarpus sibthorpioides Swt.).

Solandra L. fil. (= *tomentosa* Thbg. = *Solandra ca-*
pensis L.), filziger, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

β) *longifolia* DC.

tenella D. Don (= *asiatica* Wight herb. = *sibthor-*
pioides Auct., ? Lam. = *Wightiana* Wall.), zarter,
4. w. t. Nepal.

Hydropeltis purpurea Mchx., p. 407 (= *pulla* Salisb.,
Brasenia peltata Pursh = *B. Schreberi* Gmel. =
Ixodia natans Soland., Banks.).

Hydrophyllum L., Rinnenblume (Wasserblatt).

capitatum Dougl., kopfförmiges, 4. f. Nordamerika
(Oregon, Californien).

Hygrophila RBr., Feuchtfreund.

longifolia N. E. (= *Ruellia longifolia* Roth, p. 705).

obovata N. E. (= *Ruellia obovata* Roxb.), verkehrtei-
förmiger, \odot w. m. Ostindien.

salicifolia N. E. (= *Ruellia salicifolia* Vahl, p. 705).

undulata Blume (= *Ruellia undulata* Vahl, p. 706).

Hymenidium Brunonis Lindl., v. *Hymenolaena*
Brunonis.

Hymenocallis adnata Herb. (= *disticha* Herb. =
litoralis Salisb.), *amoenum* Herb. (= *sessilis* Salisb.),
angusta Herb. (= *tenuiflora* Herb.), *caymanensis*
Herb., *crassifolia* Herb., *expansa* Herb., *fragrans*
Salisb. (= *caribaea* Herb.), *guianensis* Herb., *la-*
cera Herb. (= *mexicana* Herb. = *paludosa* Salisb.
= *rotata* Herb.), *odorata* Herb., *patens* Herb.,
pedalis Herb., *quitensis* Herb., *repanda* F. Otto,
speciosa Herb., *spiralis* Lee, *Staplesii* Herb., *tubi-*
flora Herb., *undulata* Herb., v. *Pancratium adna-*
tum, *amoenum* etc., p. 582 etc.

Hymenocharis obliqua Salisb., v. *Maranta obliqua*,
p. 496.

Hymenolaena DC., Hautdolde, V. II., Umbelliferae.

Brunonis DC. (= *Ligusticum Brunonis* Wall.), Bru-
non's, 4. k. Nepal.

Hymenolepis Kaulf., Hautschuppenfarn, XXIV. I.,
Pterioideae-(Polypodiaceae).

revoluta Blume, zurückgerollter, 4. w. Java.

Hymenolepis Cass., DC., *parviflora* DC. (= *Atha-*
nasia crithmifolia Hort. = *A. parviflora* Jacq.),
v. *Metagnanthus parviflorus*.

Hymenonema Cass., Hautscorzonere, XIX. I., Com-
positae-Cichoriaceae.

Fontanesii Cass. (= *asperum* DC. = *Scorzonera aspera*
Dsf. = *S. stylosa* P.), Desfontaines, 4. f. b. k. Orient.

Hymenopappus L'Her., Hautfederchen.

artemisiaefolius DC., beifußblätteriges, ♂ k. Texas.

pedatus Lagasc., v. *Florestina pedata*, p. 245.

*Hymenospron molle** *rubrum* Spgl., *sericeum* Spgl.,
v. *Dioclea mollis*, *Jacquiniana*, *sericea*, p. 203, II.

Hymenotheca laxiflora Lagas., v. *Damasonium indicum*, p. 251.

Hymenoxis Cass., DC., Spitzfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

californica Hook. (= *Ptilomeris c.* Nutt.), californisches, ☉. f. Californien.

β) *hirta* Hook. (= *Shortia californica* Booth et Hort., non Grah.).

Hyophorbe G., Eberpalme, XXI. VI., Palmae.

indica G. (= *Commersoniana* Mart. = *Areca lutescens* Bory), indische, ♀. w. Ostindien, Mascarenas ¹⁾.

Hyoscyamus T., Bilsenkraut.

I. Genuinus.

albus L. (= *major* Mill.).

auriculatus Tenor., Swt., geöhrt, ☉. ♂. f. k. Neapel.

Clusii G. Don (= *albus* β *minor* R. et S.), Clusius's,

☉. f. Südeuropa.

minor Mill., kleines, ♂. k. Syrien.

muticus L. (= *betaefolius* Lam.).

niger L., β) *agrestis* W. K. (= *bohemicus* Schm. = *pictus* Roth = *verviensis* Lejeun.).

Unbestimmtere: *ceratophyllus* Fisch., *chloranthus* Wend., *pictus* Bernh.

II. *Physochlaina* G. Don.

orientalis MB.

physaloides L.

?Hybrid.: *pseudophysaloides* Roth.

Hyoseris arenaria Schousb., v. *Hedypnois arenaria*, p. 379, *biflora* Walt. (= *amplexicaulis* Mchx. = *prenanthoides* W.), *major* Walt. (= *angustifolia* Mchx.), v. *Cynthia virginica*, p. 245 et *C. Dandelion*, p. 876 et 440, *minima* L., v. *Arnoseris pusilla*, p. 80, *taraxacoides* Lam. (= *cichorioides* Vill.), v. *Thrinchia hirta*, p. 808.

Hypercium T., Lappenblume.

grandiflorum H. Genev., großblumige, ☉. f. ?

Hyperanthera aptera Steud., v. *Moringa aptera*.

Hypericum T., Johanniskraut.

adenocarpum Montbret (= *H. Montbretii* Spach), drüsenfrüchtiges, ♀. f. b. k. Orient.

albans Schrad., Hffg., weißliches, ♀. k. Teneriffa.

amoenum Pursh (= *aureum* Bartr., non Lour. = *frondosum* Mchx.).

asperum Ledeb., rauhes, ♀. f. Sibirien.

australe Tenore (= *dubium* Mauri = *humifusum* Tenore, non L.), südliches, ♀. f. Süditalien.

biflorum Lam. (= *carneum* Wall. = *chinense* Retz = *cochinchinense* Lindl., non Lour. = *petiolatum* Lour., non L.), zweiblumiges, ♀. t. k. China.

canariense L. (= *floribundum* Rchb., non Ait. = *Webbia canariensis* P. Webb et Berth. = *W. heterophylla* Spach).

cistifolium Lam. (= *opacum* Torr. et A. Gr. = *nudiflorum* Hook. = *Brathydium hyssopifolium* Spach), ciströschenblättriges, ♀. f. Nordamerika.

commutatum Nolte, verwechseltes, ♀. f. Lauenburg.

1) Makoy führt eine „Species de Cayenne“ auf. Vergl. dessen *Extrait du Catalogue des plantes etc.*

Hypericum

corymbosum Mühlbg. (= *punctatum* Beck., Rchb. = *micranthum* Hook. = *virginicum* Walt. = *maculatum* Mchx.).

dentatum Loisel. (= *ciliatum* Desv.).

fasciculatum Lam. (= *nitidum* Lam. = *Myriandra nitida* Spach), β) *aspalathoides* W. (= *tenuifolium* Pursh = *Myriandra brachyphylla* Spach).

formosum H. B. K. (= *Humboldtii* Schldl. pat. = *maculatum* W. herb.), schönes, 4. k. Mexico.

galioides Lam. (= *fasciculatum* Mchx. = *axillare* Lam. = *Michauxii* Desr. = *Myriandra galioides* et *Michauxii* Desr.).

inodorum Mill., W. (= *hircinum* Sbr., non L. = *Androsaemum xylosteifolium* Spach), geruchloses, $\frac{1}{2}$ f. b. Griechenland, Orient.

Kalmianum Lam. (= *Bartramicum* Mill.).

linarioides Bosse, leinkrautähnliches, $\frac{1}{2}$ f. b. k. ? Armenien.

lanuginosum Lam., wolliges, 4. k. Orient.

Michauxii Lam., Poir. (= *axillare* Lam. = *fasciculatum* Mchx. = *rosmarinifol.* Ell. = *Myriandra Michauxii* Spach), Michaux's, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

myrtifolium Lam. (= *glaucum* Mchx. = *rosmarinifolium* Choisy = *Myriandra glauca* Spach).

nepaulense Choisy (= *pallens* D. Don = *setosum* Wall.).

organifolium W., F. M. et Lallemand., dostenblättriges, $\frac{1}{2}$ f. b. Orient.

a) Willdenowianum Fisch., Mey. et Lallemand. (= *organifolium* W.), β) Candolleum Fisch., Mey. et Lallemand., (= *organifolium* DC.).

platysepalum Walp. (= *Webbia platysepala* Spach), großkelchiges, 4. k. Canarische Inseln.

prolificum L. (= *densiflorum* Spach = *cryptopetalum* Lam. = *foliosum* Jacq. = *Kalmianum* du Roi et Hort. = *Myriandra prolifica* et *spathulata* Spach).

scabrum L. (= *Drosanthe scabra* Spach), scharfes, 4. $\frac{1}{2}$ k. Arabien, Nordafrika.

soongaricum Ledeb., soongarisches, 4. f. Soongaria.

sphaerocarpum Mchx. (= *Brathydium sphaerocarpum* Spach), kugelfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.

Webbii Steud. (= *Triadenia Webbii* Spach), Webb's, $\frac{1}{2}$ k. Malta, Orient.

Unbestimmtere: *nigricans* Zuccar., *paniculatum* Lam., *pendulum* Hort., *praecaltum* Brot.

Hinsichtl. der übrigen s. die Gattungen *Androsaemum*, p. 57, *Elodea*, p. 219, II. et *Vismia*, p. 852.

Hypertelis E. Meyer, Fenzl, Hörnelkraut, V. III., Portulacaceae-Paronychieae.

verrucosum E. Mey. (= *Pharnaceum verrucosum* Eckl., Zeyh.), warziges, $\frac{1}{2}$ k. Cap d. g. Hoffn.

Hypochaeris G., Wabenpalme, XXII. VI. (VI. III.), Palmae.

coriacea G., lederartige, $\frac{1}{2}$ w. Aegypten.

thebaica Martius (= *crinita* G. = *Cucifera* P. = *guineensis* Schum., Thonn. = *Corypha thebaica* L. = *Cucifera thebaica* Delile = *Douma thebaica* Poir.), thebensische, $\frac{1}{2}$ w. Arabien, Oberaegypten, Nubien, Abyssinien ¹⁾).

1) „Palma caudice apice dichotomo singularis, in hortis europaeis rarissima, e seminibus a Theodoro Kotschy missis, nobis

Hypocalyptus capensis Thbg., v. *Virgilia capensis*, p. 852, *calypratus* Thbg., *glaucus* Thbg., *pedunculatus* Thbg., *sericeus* Thbg., v. *Podalyria styraefolia*, *glauca*, *biflora*, et *sericea*, p. 638.

Hypocalymma Endl., Kappenmyrte, XII. 1., Myrtaceae.

Cunninghamii Schauer (= *Baeckia speciosa* A. Cunn.),
Cunningham's, f. t. Neuholland.

cordifolium Lehm., J. C. Schauer, herzbliätterige, f. t. Neuholland.

robustum Endl., Lindl. bot. reg., starke, f. t. Neuholl.

H. angustifolium Endl., *asperum* J. C. Schauer, *scariosum* J. C. Schauer, *strictum* J. C. Schauer, scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Hypochaeris Vaill., Ferkelkraut.

arachnoidea Poir. (non Bivon.), spinnewebiges, ☉. f. Mauritanien.

Balbisii NoCCA (= *minima* Balb.), β) *foliosa* H. Berol.
Candollei Regel, Candolle's, ☉. f. Südeuropa.

glabra L. (= *adscendens* Broter. = *dimorpha* Broter.),
 β) *simplex* DC., γ) *pusilla* Poir., δ) *minima* Cyrill,
Dsf. (= *arachnoidea* Bivon. = *capensis* Less.).

neapolitana Tenor. (= *dimorpha* Guss., Tenor.), neapolitanisches, 4. f. Neapel.

Unbestimmtere: *dubia* Mart., *hirta* Ucria.

Hinsichtl. d. übrigen s. *Achyrophorus*, p. 7, II.

Hypocyrtia Mart., Bogenmaske, XIV. 11., Personatae-Gesnerieae.

hirsuta Mart., rauhhaarige, f. w. Brasilien.

strigillosa Mart., striegelige, f. w. Brasilien.

Hypodaeurus Hochst., Schweiffennich, III. 11., Gramineae.

cenchroides Hochst., stachelgrasähnlicher, ☉. ♂. m. f. w. Abyssinien.

Hypoestes Soland., RBr., Hüllklau.

cephalotes Lk. (= *Erinus bilabiatatus* Roxb. = *Justicia cephalotes* W. herb.), großköpfiger, f. w. Ostindien.

Hypolepis Bernh., Presl, Lk. (non P. nec P. B.), v. Cheilanthes, Sect. II., p. 137.

Hypopitys Dill., Scop., Hall., Ohnblatt, Fichtenspargel, X. 1., Ericaceae-Monotropeae.

glabra DC., (= *hypophegea* Don = *Monotropa Hypophegea* Wallr. = *M. Hypoxa* Speg., p. 529 = *M. Hypopitys a glabra* Roth, K.), glatter, 4. f. Europa.

multiflora Scop. (= *lutea* Gray. = *Monotropa Hypopitys* L., p. 529, β *hirsuta* Roth, K.), vielblumiger, 4. f. Europa.

Hypoxis L., Härtling.

elegans Andr. (= *tridentata* DC. = *stellata* Jacq. β Ker).

gracilis Lehm., schlanker, 4. Zw. t. Brasilien.

hemerocallidea C. A. Mey., taglilienähnlicher, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

mexicana Schult., mexicanischer, 4. Zw. t. k. Mexico.

nata est. Aegyptii e trunco rates et varia utensilia fabricant. Fructus crudi Dongolae incolis aliisque Aethiopicis cibo sunt, e coctis sorbilli speciem in Aegypto parant." Endlicher Catalogus horti academici Vindobonensis. I. p. 204. Vergl. auch Kunth Enumeratio plantar. III. p. 227.

Hyptis Jacq., Linksblume.

barbata Schrk., bärtige, ♀. w. Brasilien.

fasciculata Benth. (= *undulata* Schrk. = ? *Hypothronia undulata* Schrk.), büschelförmige, ♀. w. Brasilien.

glomerata Schrk., Mart. (= *oppositiflora* Schrk.), knaulförmige, ♀. w. Brasilien.

pectinata Poit. (= *nepetoides* Fisch. = *persica* Poit. = *racemosa* Zuccagn. = *Ballota disticha et suaveolens* Rodsch. = *Brotera persica* Sggl. = *Bystropogon coarctatum* Thom. et Schum. = *B. pectinatum* L'Her. = *Mentha perilloides* L., non Auct. = *Nepeta aristata* Rich. = *N. pectinata* L.), kammförmige, ♀. ♀. t. w. Südamerika, wärmeres Asien und Afrika.

pubescens Benth., weichhaarige, ♀. ♀. k. t. Mexico.

suaveolens Poit. (= *ebracteata* RBr. = *Plumieri* Poit. = *Ballota suaveolens* L., Jacq. = *Bystropogon suaveolens* L'Her.), feinriechende, ⊙. w. Südamerika.

verticillata Jacq. (= *Stachys patens* Sw.), wirtelförmige, ♀. w. Westindien.

Unbestimmtere: *glechomoides* Weinm. ♀. Brasil., *marathroma* Sggl. (= *Perilla marathr.* Sggl. in Cat. hort.), *menthadora* Schrk., *nepalensis* Lehmann, *paniculata* Brotero. — *Chamaedrys* W. Poit. (= *inflata* Sggl. = *lurida* Sggl. = *pseudo-chamaedrys* Poit., v. *Marsipanthus hyptoides*, *stachyoides* Lk., v. *Elsholtzia incisa*, p. 219, II.

Hysopus T., Ysop.

angustifolia MB. (= ? *altissimus* Mill. = *caucasicus* Sggl. = *officinalis* Habl., Pall., L. var. β Benth. = *orientalis* Adam., W. E.).

officinalis L., α) *latifolius* Benth. (= *alopecuroides* Fisch. = *Fischeri* Hortul.), β) *myrtifolius* Dsf. (= *ruber* Mill., Bernh.), γ) *Schleicheri* G. Don, δ) *vulgaris* Benth., b) fl. albo, c) *variegatus*.

septemrenatus Ehbg., siebenkerbiger, ♀. k. f. b. Aegypten.

septemfidus Ehbg., siebentheiliger, ♀. k. f. b. Aegypten.

H. anisatus Nutt. (= *discolor* Dsf. = *Foeniculum* Sggl.), *Lophanthus* L. (= *resupinatus* Mch.), *nepetoides* L., *scrophulariaefolius* W. (= *catariaefolius* H. Par.), v. *Lophanthus anisatus*, *chinensis*, *nepetoides* et *scrophulariaefolius* p. 477, — *cristatus* Lam., *nepetoides* Heyn. herb., v. *Pogostemon paniculatus* et *plectranthoides*, *ocymifolius* Lam. (= *bracteatus* Gmel.), v. *Elsholtzia cristata*, p. 285.

Hystrix patula Mch., v. *Gymnostichum Hystrix*, p. 371.

Ibatia Decsne. (Ibati, arabischer Name), V. II., Asclepiadeae.

maritima Decne. (= *Cynanchum maritimum* L. mant. = *Gonolobus maritimus* RBr., p. 365), Seestrand's, ♀. Sch. w. Neugranada.

Iberis Rupp., Dill., Schleifenblume.

amara L. (= *bicolor* Rehb. = *linifolia* Schk. = *parviflora* Hort.), b) *lusitanica* Hort.

ciliata All. (= *Molinieri* Balb.), gewimperte, ⊙. f. Oberitalien, Frankreich.

intermedia Guers. (= *divaricata* Tausch = *amara* Scop. = *umbellata* Flor. German., non L. = *Durandii*

Iberis

Lorey et Duret = *linifolia* Durand = *Loreyi* Gay.),
mittlere, ☉. f. Westl. Deutschland, Frankreich.
neglecta Tenore, übersehene, ☉. f. Süditalien.
Tenoreana DC. (= *Tenorei* Presl = *cepeuefol.* Tenore
= *pilosa* Desv.).

Unbestimmt: *verticillata* Hort.

Icacorea bahamensis Lam., v. *Heberdenia excelsa*,
p. 285. — *I. zeylanica* Lam., v. *Ardisia humilis*,
p. 74 et p. 43, II.

Ichnanthus P. B., *Sohlenfennich*, III. II., Gramineae.
glaber H. Berol., kakler, 4. f. Nordamerika.

Icica Aubl. (*Icica*, guianischer Name).

Icicariba DC. (= *Amyris* ? *ambrosiaca* L. fil.), *Icica-*
riba-T., 5. w. Brasilien.

Tacamahaca H. B. K. (= *Amyris ambrosiaca* W.),
Tacamahaca-I., 5. w. Südamerika.

Icotorus montanus Rafin., v. *Spiraea monogyna*, p. 778.

Idothea Kunth, (Tochter d. Proteus), VI. I., *Corona-*
riae-Asphodeleae.

ciliaris Kunth (= *Drimia ciliaris* Jacq., p. 275).

elata Kunth (= *Drimia elata* Jacq., p. 275).

humilis Kunth (= *Drimia Eckloniana* R. et S., p. 211,
II. = *D. humilis* Berg.), niedrige, 4. Zw. t. k.
Cap der guten Hoffnung.

purpurascens Kunth (= *Drimia purpurascens* Jacq. fil.
p. 575 = *D. undulata* Hort.).

pusilla Kunth (= *Drimia pusilla* Jacq., 275).

villosa Kunth (= *Drimia villosa* Lindl., p. 275).

Zweifelhaftere Arten:

? *drimioides* Kunth (= *Anthericum pusillum* Jacq. =
Caesia pusilla Spgl.).

? *marginata* Kunth (= *Anthericum marginatum* Thbg.).

? *physodes* Kunth (= *Anthericum physodes* Jacq. = *Albuca*
physodes Ker, p. 27 = *Caesia physodes* Spgl.).

Ilex L., Stechhülse.

Aquifolium L., *δ*) *latifolium* Hort. (= *macrophylla* Hort.),
w) *fructu luteo* Hort. (= ? *chrysocharpa* Wender.).

arbutiformis Brotero, erdbeerbaumförmige, 5. 5. k. ?

castaneifolia van Houtte, kastanienblättrige, 5. 5. k. t. ?

crenata Thbg., gekerbte, 5. 5. k. Japan.

Doniana DC. (= *elliptica* D. Don, non H. B. K. =
nepalensis D. Dietr.), Don's, 5. 5. k. Nepal.

latifolia Thbg., breitblättrige, 5. 5. k. Japan.

macrophylla Blume, großblättrige, 5. 5. k. Japan.

maderensis Lam. (= *crassifolia* Meerb. = *Perado* Auct.),
maderaische, 5. 5. k. Madeira.

mexicana v. Houtte, mexicanische, 5. 5. k. t. Mexico.

platyphylla Webb et Berthelot (= *I. Perado* Ait., Kew.
ed. I.), canarische, 5. 5. k. Canarische Inseln.

pubescens Hook., Arn., weichhaarige, 5. 5. k. China.

recurva Lk. (= *Aquifolium γ serratum* DC. = *ciliata*
Booth = *serrata* Hort., non Thbg.), zurückge-
krümmte, 5. 5. k. ?

Schottii Endl. (= ? *australis* H. belg.), Schott's, 5. 5.
k. t. Neuholland.

serrata Thbg., sägezahnige, 5. 5. k. t. Japan.

Watsoniana Spach (= *angustifolia* Wats., non W.),
Watson's, 5. 5. k. f. b. Nordamerika.

crocea Thbg., v. *Elaeodendrum croceum* Nachlese,

Ilex

Dodonaea L., v. *Comocladia ilicifolia*, p. 214, *prionitis* W. Enum. suppl., v. *Prinos deciduus*, p. 657. *Illecebrum Achyrantha* W. (= *sinense* Hort. = *ramosum* Hort.), *canescens* Spgl. (= *Humboldtianum* R. et S.), *diffusum* W., *ficoides* W., *frutescens* L'Her. (= *alsinefolium* Scop. non L. = *limense* Jacq.), *gomphrenoides* W., *polygonoides* Mill., *sericeum* Spgl., *sessile* Pall., *spinosum* Spgl. (= *axillare* Hort.), *tenellum* Hort., v. *Alternanthera Achyrantha* etc., p. 40 et p. 28, II., *javanicum* L., *lanatum* L., *Monsoniae* L. fil., v. *Aerva javanica* etc., p. 21 et p. 11, II., *sanguinolentum* L., v. *Achyranthes sanguinolenta*, p. 6, II.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Paronychia*, *Philoxerus*, *Polycarpaea*, *Telejanthera* (et *Mogiphanes*).

Illicium L., Anisbaum.

parviflorum Mchx. (= *anisatum* Bartr.).

religiosum Sieb. et Zuccar. (= *anisatum* L. spec., Duham. non Lour.), verehrter, f. k. Japan, China¹⁾.

Imbricaria Commers., Juss., Lam., *Imbricarie*, VI. (V.) I., Sapotaceae.

coriacea A. DC. (= *Mimusops Imbricaria* Wall., non W. = *Mimusops hexandra* Bouton et Boyer, non Roxb. = *M. Elengi* Sieb., non L.), lederartige, f. w. Madagascar, Mauritius.

Imhofia crispa Herb., *filifolia* Herb., *gemmata* Herb., v. *Strumaria crispa* etc., p. 790. — *I. marginata* Herb., v. *Brunsvigia marginata*, p. 134.

Impatiens Riv., L., Springsaame (Wolfskraut).

candida Lindl., candirtweißser, ☉. f. Ostindien.

glandulifera Arn. (non Roxb.), drüsiger, ☉. m. f. Zeylon.

labiata Lindl. (= ? *Balsamina labiata* Lk., Kl., Otto, p. 58, II.), lippenförmiger, ☉. m. f. Ostindien.

longicornu Wall., langsporniger, ☉. f. Ostindien.

macrocheila Lindl., großlippiger, ☉. m. f. Ostindien.

picta Knowl. et Westc., bemalter, ☉. m. f. Ostindien.

rosea Lindl., rosafarbiger, ☉. m. f. Ostindien.

Roylei Walp. (= *glandulifera* Royle, nec Arn.), Royle's, ☉. m. f. Ostindien.

scabrida Wall., schärflicher, ☉. f. Nepal.

tricornis Lindl., dreihörniger, ☉. f. Nordindien.

triflora L., v. *Hydrocera triflora*, p. 308, II.

Hinsichtl. d. übrigen s. *Balsamina*, p. 110 et p. 58, II.

Imperata ovata Tratt., v. *Lagurus ovatus*, p. 443.

Imperatoria T., Meisterwurz.

caucasica Spgl. (= *Oreoselinum caucasicum* MB. = *Selinum caucasicum* MB., p. 740), caucasische, 4. f. Caucasus.

glauca Bartl., v. *Peucedanum Schottii*, p. 610,

Razoulii Hort. v. *Angelica Razoulii*, p. 60.

Imperialis Andans., *comosa* Mch. (= *coronata* Dum.

Cours. = *superba* Mirb.), v. *Fritillaria*, Sect. II.

Imperialis, p. 339.

1) „Illicii religiosi, arboris vigintiquinquepedalis ante hominum memoriam in Japoniam introductae rami floridi ornandis indolorum altaribus et decorandis bustis inserviunt. Corticis liber modice adstringens, aromaticus, capsulae saporis vapidi. Illicium anisatum Lour. mater Anisi stellati, stirps botanicis ignota.“ Endlicher Catalogus horti acad. Vindob. II. p. 204.

Impia germanica Bluff et Fing. (= *pyramidata* Bluff et Fingerh.), v. *Filago germanica*, p. 334.

Incarvillea arguta Royle, *Emodii* Wall., v. *Amphicomme arguta*, p. 49 et *Emodii*, p. 33, II., *grandiflora* Hort., v. *Aeschynanthus grandiflorus*, p. 868 et p. 11, II., *tomentosa* Spgl., v. *Pawlonia imperialis*.

Indigofera L., Indigo.

amoena Ait. (= *stipularis* Lk.).

Anil L. (= *suffruticosa* Mill.).

Bertolonii Steud. (= *lateritia* Bertol., non W.), Bertolone's, f. t. k. Cap d. g. Hoffn.

coerulea Roxb. (= *brachycarpa* Grah. = *Guatemala Lunan*. = *retusa* Grah. = *tinctoria* β *brachycarpa* DC.), blauer, f. w. Ostindien.

coriacea Ait. (= *mauritanica* Thbg.).

decora Lindl., gezierter, f. f. t. China.

dendroides Jacq., baumartiger, \odot . σ . w. Guinea.

Dojua Hamilt. (= *Dosua* Bot. reg.), *Dojua*-I., 4. f. t. Nepal.

gracilis Spgl. schlanker, f. t. k. Cap d. g. Hoffn.

juncea DC. (= *spoliata* Hffg. = *Lebeckia contaminata* Ait., non L. = *Spartium contaminatum* Ait., non L.).

Lindleyana Spgl. (= *angulata* RBr., Lindl., non Rottl. *speciosa* Hortul. = *sylvatica* Sieb.), Lindley's, f. f. t. k. Neuholland.

macrostachya Vent., grofsähriger, f. t. China.

madagascariensis Schrk., Colla (= ? *Anil* γ *orthocarpa* DC.), madagascarischer, f. f. w. Madagascar.

miniata Ort. (= *coccinea* Hort.), mennigrother, \odot . w. Cuba.

nivea W. (= *argyrea* Eckl., Zeyh. = *argyroides* E. Mey.), schneeweifser f. t. Cap d. g. Hoffn.

paucifolia Delille (= *colorata* et *heterophylla* Roxb. = *macrophylla* Schum. = *Bremontiera ammoxyylon* β *Burmanni* DC.), wenigblättriger, f. f. t. Aegypten.

pentaphylla L. (= ? *glabra* L. = *fragrans* Retz = *heterophylla* Roxb.), fünfblättriger, σ . f. w. Ostindien.

pulchra W., schöner, f. w. Guinea.

purpurascens Roxb. (= *pulchella* Roxb. = *cassioides* Rottl. = *glaucescens* Grah. = *verrucosa* Grah., non Eckl., Zeyh.), purpurfarbiger, f. w. Ostindien.

Roxburghii Tausch (= *linifolia* Roxb., non Retz), Roxburgh's, f. w. Ostindien.

sessilifolia DC. (= *falcata* E. Mey. = *patens* Eckl., Zeyh. = *Lotus australis* Andrz.), stiellosblättriger, f. t. k. Cap d. g. Hoffn.

setulosa Bertol., feinborstiger, f. t. k. Cap d. g. Hoffn.

stachyoides Lindl., ziestähnlicher, 4. f. t. Nordöstl. Indien.

trifoliata L. (= *adenophylla* Grah. = *canescens* Grah., Spgl., non Lam. = *congesta* Grah. = *multicaulis* DC. = *orixensis* Roxb. = *prostrata* W.).

trita L. fil. (= *arcuata* W. = *armata* Wall. = *canescens* Lam. = *cinerea* W. = *hedysaroides* Lam. = *ternata* Roxb.).

nuda G. Don, v. *Lebeckia nuda*, *stricta* Thbg., v. *Tephrosia stricta*, p. 800.

Inga Marcgr., W. (Südamerikanischer Name).

albicans Walp., weifslliche, f. w. Brasilien.

cyclocarpa W. (= *Mimosa cyclocarpa* Jacq.), kreis-hülsige, f. w. Caracas.

Inga

- forficata Hffg. (= *Bauhinia divaricata* Hort., non L.),
 scheerenförmige, h. w. Brasilien.
 fulgens H. B. K., funkelnde, h. w. Neugranada.
 grandiflora Wall., großblumige, h. w. Ostindien.
 Harrisii Lindl., Harris's, h. Sch. w, Mexico.
 ligustrina W. (= *Mimosa ligustrina* Jacq.), ligusterähn-
 liche, h. w. Caracas.
 mertensioides N. E., Mart. (= *Acacia mertensioides*
 N. E.), Mertensiaähnliche, h. w. Brasilien.
 nobilis Hffg. (= ? *Humboldtiana* Kunth), edle, h. w.
 Brasilien.
 pulcherrima Cervant., schönste, h. w. Mexico.
 Saman W. (= ? *salutaris* H. B. K. = *Mimosa Saman*
 Jacq.), Saman-I., h. w. Caracas.
 umbrosa Wall., Schattenliebende, h. w. Ostindien.
 Unbestimmtere: Acus Hflg., coccinea minor Hort. =
 ? *Mimosa kermesina*, *lignosa* Grah. (= *dolabriformis*
 Grah.), v. *Xylia dolabriformis*.
Ingenhousia ericaefolia E. Mey., v. *Amphithalea*
ericaefolia, p. 33.

Inula L. G., Alant.

- bifrons L. (= *glabra* Bess. = *glomeriflora* Lam. =
Conyza alata Baumg.).
 Britanica L.¹⁾ (= *britannica* Auct. = *hirsuta* Vitm. =
Aster britannicus All.).
 campestris Bess. (= *helenioides* DC. = *Oculus Christi*
 MB., non L.).
 candida Cassin. (= *Conyza candida* L., p. 216 = *C.*
verbascifolia W., non Poir.), β) *limonifolia* DC. (= *C.*
candida W. = *C. limonifolia* Sibth., Sm.).
 caspica Bunge, Ledeb., β) Bongardi Hort.
Conyza DC. (= *squarrosa* Bernh., non L. = *Conyza*
squarrosa L., p. 217).
 crithmoides L. (= *crithmifolia* Wither. = *Senecio crith-*
mifolia Scopol. = *Limbardia tricuspis* Cass.), ? β)
 canariensis Mill.
 ensifolia L., β) *angustifolia* Wender.
 grandiflora W. (= *alpina* Adam = *glandulosa* β Sims).
 grandis Schrenk (= *macrophylla* Karel. et Kiril.), groß-
 blätteriger, 4. f. Asiat. Rußland.
 graveolens Dsf. (= *Conyza graveolens* Auct. = *Erigeron*
graveolens L., p. 308 = *Solidago graveolens* Lam.).
 hetrusca Moretti, hetrurischer, 4. f. Mittelitalien.
 linifolia Wender., gleichbreitblätteriger, 4. f. ?
 orientalis W. (= *germanica* MB., non L. = *micranthos*
 Poir.), morgenländischer, 4. f. Caucasus.
 salicina L., β) *latifolia* Endl., DC. (= *aspera* Poir. =
spathulata H. Par. = *Aster spathulatus* H. Cels.),
 γ) ? *lancifolia* Wender., δ) *caucasica* Endl.
 rhizocephala Schrenk, kopfwurzeliger, 4. f. Asiat. Rußl.
 spiraeifolia L. (= *Bubonium* Jacq., Murray), spierstau-
 denblätteriger, 4. f. Persien, Podolien, Taurien,
 Siebenbürgen, Krain, Piemont.
 β) *hybrida* Baumg.
 stricta Tausch (= *Bubonium* Hort.), steifer, 4. f. ?

1) „E Britannia exul. nec „britannica“ sed „Britanica“
 (*Botanicarum*) Diosc. IV. 2.) dicenda.“ Endlicher Catalogus hort.
 academ. Vindobonensis I. p. 332.

Inula

thapsoides DC., α) Sprengelii DC. (= *I. thapsoides* Spgl.), β) Poirerii DC. (= *I. thapsoides* Rchb. = *verbascifolia* Poir.), γ) Biebersteinii DC. (= *Conyza thapsoides* MB.).

viscosa Dsf., Ait. (= *Conyza viscosa* Hort. = *Erigeron viscosum* L. = *Solidago viscosa* Lam.), schmieriger, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

conyzoides Dsf., v. *Jasonia tuberosa*, p. 430, *calycina* Spgl., v. *Pulicaria calycina*, *foetida* L., v. *Nidorella foetida*, *gossypina* Mchx., *graminifolia* Mchx., *Mariana* L., *villosa* Spgl., v. *Chrysopsis gossypina* etc., p. 195 et 142 II., *saturejoides* Mill. (= *Saturejue* Spgl.), v. *Lorentea saturejoides* Mill.

Ipecachuanha officinalis et *preta* Arruda, v. *Cephaelis Ipecachuanha*, p. 132, II.

Iphigenia Kunth (Tochter der Agamemnon), VI. III., Melanthaceae.

indica Kunth (= *Anguillaria indica* RBr., p. 869 = *Melanthium indicum* L. mant.), indische, 4. w. t. Nepal, Ostindien, tropisches Neuholland.

Ipomoea L., Choisy, Trichterwinde.

Aitoni Lindl., Aiton's, ☉. 4. Sch. f. w. Cap d. g. H. arborescens G. Don (= *Convolvulus arborescens* W., H. B. K., p. 215).

atropurpurea Choisy (= *sphaerocephala* D. Don, non Swt., *Convolvulus atropurpureus* Wall. = *Batatas Choisyana* Wight), schwarzpurpurfarbige, ? 4. Sch. w. Nepal.

batatoides Choisy (non Benth.), batatenähnliche, 4. Sch. w. Brasilien.

β) angulata.

commutata R. et S. (= *I. carolina* Parsh, non L. = *trichocarpa* Ell. = *Convolvulus hederaceus* Mill. = *C. trichocarpus* Spgl.).

coptica Roth (= *Brunetti* Perot. = *dissecta* Heyne = *verrucosa* Ortega = *Convolvul. copticus* L. = *C. dissectus* Herb. Madr. = ? *C. stipulatus* Desr.), cop-tische, ☉. Sch. f. Aegypten, Ostindien.

cymosa R. et S. (non Mey., nec Lindl.), (= *I. bifida* Roth = *blanda* Swt. = *Heynei* R. et S. = *C. cymosus* Desr., non R. et P. = *C. bifidus* β Vahl = *C. blandus* Roxb.), afterdoldige, 4. $\frac{1}{2}$. Sch. w. Ostindien.

β) pilosa Choisy. (= *Convolv. bifidus* Vahl = *C. Rothii* Spgl. = *C. pentagonus* Roxb. = *I. bifida* R. et S.), γ) sagittata Choisy (= ? *radicans* Blume), δ) culta Choisy, Wall.

fastigiata Swt. (= *cymosa* Meyer = *platanifolia* R. et S. = *Convolv. essequebensis* Spgl. = *C. fastigiatus* Roxb. = *C. platanifolius* Vahl = *C. roseus* Mill.), gipfelständige 4. Sch. w. Westindien, Südamerika, Bengalen.

ficifolia Lindl. (= ? *I. bonariensis* Hook. = *Convolv. Hookerianus* Dietr.), feigenbaumblättrige, 4. Sch. Kn. w. ? Buenos Ayres.

filicaulis Blum. (= *angustifolia* Jacq., non Choisy = *denticulata* RBr., non Choisy = *Blumii* Steud. = *bidentata* Don = *Convolv. filicaulis* Vahl = *C. hastatus* Desr., non Sieb. nec Thbg. = *C. simplex* P., non Spgl. = *C. medium* Lour., Ait., Wall., non L. =

Ipomoea

- C. filiformis* Thbg. = *C. denticulatus* Thbg. = *C. angustifolius* Desr. = ? *C. japonicus* Thbg.), fadenstengelige, ☉. m. f. Asien, Australien, Afrika, Südamerika.
- fimbriosepala* Choisy, franzenkelchige, 4. Sch. w. Madagascar.
- gemella* Roth (= *Convolvulus gemellus* Burm.), gepaarte, ☉. Sch. w. Ostindien.
- hastaeifolia* Bernh., spontanblättrige, 4. ♀. Sch. w. Havana.
- havanensis* Choisy (= *Convolv. havanensis* Jacq.), havanensische, ☉. Sch. w. Havana.
- heterophylla* RBr., non Ortega (= *polymorpha* R. et S. = *Convolvulus Brownii* Spgl. = *C. Robertianus* Spgl.), verschiedenblättrige, ☉. f. m. Tropisches Neuholland.
- macrorrhizos* R. et S. (= *Convolv. macrorrhizus* L. = *C. coccineus* Burm. = *Batatas macrorrhizos* G. Don).
- monosperma* Spgl. mss. (= *Eustachyana* H. Turin.), einsamige, 4. ♀. Sch. w. St. Martha.
- murucoides* R. et S. (= *macrantha* G. Don = *Convolvulus macranthus* H. B. K.), murucujaähnliche, ♀. w. Mexico.
- nyctaginea* Choisy, wunderblumenähnliche, 4. Sch. w. Brasilien.
- β) *cordifolia* Mart.
- obscura* Bot. reg. (= *solanifolia* Burm. = *insuavis* Blume = *ocularis* Bartl. = *ochroleuca* Spanh. = *Convolvulus obscurus* L. = *C. gemellus* Vahl = *C. insuavis* Dietr. = *C. gonatodes* Steud.), dunkle, ☉. Sch. w. m. Ostindien, Abyssinien.
- ochracea* G. Don (= *Convolvulus ochraceus* Bot. reg. = *C. trichocalyx* Schum.), ocherfarbige, ☉. Sch. w. Guinea.
- pandurata* Mey. Esseq. (= *Convolv. panduratus* L. = *C. megalorrhizos* etc. Dill.).
- β) *candicans* Sweet.
- peltata* Choisy (= *nymphaeifolia* Blume = *Convolvulus peltatus* L. = *Spiranthera peltata* Bojer), schildblättrige, ♀. Sch. w. Amboina, Java, Societätsinseln, Mascarenas.
- pendula* RBr. (= *Horsfalliae* Hook. bot. mag. = *Convolvulus mucronatus* Forst. = *C. pendulus* Spgl.).
- pulchella* Roth (= ? *capillata* Spanh. = ? *Batatas pulchella* Bojer = *Convolvul. bellus* Spgl. = *C. heptaphyllus* Rottl. = ? *C. villatus* Zp.), schöne, 4. Sch. Ostindien.
- quinqueloba* Dsf. (= *cairica* Swt. = *palmata* Forsk. = *senegalensis* Lam. = *Batatas senegalensis* G. Don = *Convolvulus cairicus* L. = *C. quinquelobus* Vahl), fünfklappige, 4. Kn. Sch. w. Guinea, Nubien, Aegypten, Syrien, St. Croix.
- reniformis* Choisy (= *Convolvulus excisus* Zp. = *C. gangeticus* L. = *C. reniformis* Roxb. = *Evolvulus emarginatus* Burm. = *E. gangeticus* L.), nierenförmige, ♀. w. Ostindien.
- reptans* Poir. (= *aquatica* Forsk. = *repens* Roth = *Convolv. reptans* L. = *C. repens* W. = *C. Adansonii* Desr.).
- rugosa* Choisy (= *I. Beladamboe* R. et S. = *I. repens* Lam., non Roth = *Convolvulus rugosus* Rottl. =

Ipomoea

- C. flagelliformis* Roxb. = *C. Beladamba* Speg., runzelige, 4. w. Ostindien, Molucken.
- sagittata Dsf., Cav., Poir. (= *sagittifolia* Ker bot. reg. = *Convolv. sagittifolius* Mchx. = *C. speciosus* Walt. = *C. formosus* Gmel. = *C. Wheleri* Vahl.), pfeilförmige, 4. Sch. f. b. k. Sicilien, Spanien, Nordafrika, Nordamerika.
- Schiedeana Ham., non Zuccar. (= *Convolv. Schiedeana* Dietr.), Schiede's, 4. ♀. Sch. w. Mexico.
- scrobiculata G. Don (= *Convolv. scrobiculatus* Bot. reg.), raspelartige, ☉. Sch. m. f. Südamerika.
- sepiaria Koen. in Roxb. et Wall. fl. ind. (= ? *striata* Roth = *Convolv. maximus* Vahl = *C. marginatus* Desr. = *C. striatus* Vahl), β) sagittata Choisy (= *sphaerica* H. b. Calcutt.).
- sessiliflora Roth (= ? *conferta* Don = *hispida* R. et S. = *ligulata* Boj. = *sphaerocephala* Sw., non Don = *trematosperma* Hochst. = *Convolv. hispidus* Vahl = *C. sessiliflorus* Speg. = *C. sphaerocephalus* Roxb. et Wall. = *C. tannifolius* Klein, non Mey.), stiellosblumige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
- sidaefolia Choisy, non Schrad. (= *corymbosa* Roth = *cymosa* Lindl., non R. et S. (= *Convolv. laevicaulis* et *proliferus* W. = *C. multiflorus* H. B. K. = *C. sidaefolius* H. B. K.), sammetmalvenblättrige, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika, Ostindien.
- simplex Bot. mag., einfache, 4. Sch. Kn. Südafrika.
- sinensis Choisy (et Cat. h. Gorenk?), (= *Convolvulus sinensis* Desr. = *C. Ser* Speg.), chinesische, ☉. Sch. f. China.
- sinuata Orteg. (= *dissecta* Pursh, non W. = *nigricans* Gardn. = *Convolvulus dissectus* L. mant. Jacq. H. vindob.).
- superba G. Don (= *Convolv. superbus* H. B. K.), stolze, 4. Sch. w. Neuspanien.
- tiliacea Choisy (= *Convolv. tiliaceus* W. Enum.), lindenähnliche, 4. Sch. w. Brasilien.
- tricolor Cav. (= *Convolv. venustus* Speg.), dreifarbige, ☉. Sch. f. ? Südamerika.
- trifida G. Don (= *Convolv. trifidus* H. B. K. = *C. hepaticaeifolius* W., non Speg.), dreispaltige, 4. Sch. w. Südamerika.
- triloba L. (= *parviflora* Vahl, non P. = ? *clausa* Red. = *Convolv. trilobus* Desr. = *C. Sloanei* Speg. = *C. Ipomoea* Velloz. ? = *Quamoclit triloba* Don).
- triquetra R. et S. (= *Hamiltonii* G. Don = *Convolv. triqueter* Vahl).
- tuberculata R. et S. (= *frutescens* H. Par. = *stipulacea* Jacq. = *tuberculosa* Dsf. = *tuberosa* Lour., non L. = *Batatas Loureirii* G. Don = *Convolvulus digitatus* Roxb. = *C. tuberculatus* Desr.), Ostindien, Polynesien, mittägl. Amerika, ? China.
- tuberosa L. (= *Batatas tuberosa* Boj. = *Convolv. tuberosus* Speg. = *C. kentrocaulos* Steud. = *C. paniculatus* Blanco, non RBr.). Mittägl. Amerika, Westindien, Abyssinien, Mascarenas, Ostindien.
- β) uniflora Choisy (= *Convolvulus gosypifolius* H. B. K. = *C. macrocarpus* Speg.).
- Tweediei Hook., Tweedie's, ♀. Sch. w. Parana.

Ipomoea

- tyrianthina Lindl. (= *Convolvulus densiflorus* Hook. = *Pharbitis tyrianthina* Hook.).
 umbellata Mey. Esseq. (= *polyanthes* R. et S. = *sagittifera* Don = *Convolv. umbellatus* L. = *C. flavus* Sal., non W. = *C. sagittifer* H. B. K. = *C. caracasanus* W. = *C. ? aristolochiaefolius* Mill., non H. B. K. = *C. Millerianus* R. et S.), doldige, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.
 venosa R. et S. (= *Batatas venosa* Boj. = *Convolv. venosus* Vahl).
 ventricosa Choisy. (= *Convolv. ventricosus* Bert. in Colla h. Ripul.), bauchige, ♂. Sch. w. Westindien.
 verrucipes Choisy, C. A. Mey. (= *Convolv. verrucipes* Tenore), warzigstielige, ☉. Sch. f. ?
 verruculosa Mart., wenigwarzige, ?☉. Sch. f. Mexico.
 verticillata Forsk., Vahl (= *Convolv. Forskohlei* Speg.), wirtelförmige, 4. k. t. Arabien.
 vespertina Colla, Abend-T., ?☉. Sch. f. ?

Nicht hinlängl. bekannte Arten (nach Choisy):

- bahiensis W. Brasil., compressa Guss. Indien, Ledebourii Choisy (= *Calystegia rugosa* Ledeb.), ♂. w. Brasilien.
 ?Mestitlanica Choisy. (= *batatoides* Benth., non Choisy.), 4. Sch. w. Mexico.

Nur dem Namen nach bekannte Arten:

- cordifolia Tenore, hispidula H. Dorpat., katgurhiensis Hffg. ☉. Ostind., lilacina Schrk. (= *Schrankii* Steud.), Newmannii Lodd. Catal. 1826, Martiusiana Steud. (= *hirsuta* Schrk.) Brasil., rosea Hort., Sellowii Penny, soldanellaefolia Schrk. Brasil., superba H. Dorpat., Schlechtendalii Visian. (= *lilacina* Kunze = *Pharbitis lilacina* Schltdl.), Mexico.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch erwähnt: *I. bryoniaefolia*, *Broadleaziana*, *Hardingii*, *Haylockia*, *hybrida* (Lee's), *mexicana*, *physianthifolia*, *Rollissonii*, *smilacifolia* etc.

acetosaefolia Vahl, R. et S. (= *longifolia* Benth.), *Batatas* Poir., *insignis* Ait. Ker etc., v. *Batatas acetosaefolia* etc., p. 61, II., *Bona nox* L., *grandiflora* Lam., *longiflora* RBr., W, *latiflora* Bot. reg., *muricata* Jacq. (= ? *Krusensternii* Ledeb.) etc., v. *Calonyction speciosum* etc., p. 109, II., *I. capitata* R. et S., *speciosa* P., *splendens* Bot. mag., v. *Argyreia capitata* etc., p. 44, II., *crassipes* Hook. etc., v. *Aniseja calisteg.* etc., p. 37, II., *filiformis* Jacq. etc., v. *Exogonium filiforme* etc., p. 241, II., *Quamoclit* L., *coccinea* L. etc., v. *Quamoclit vulgare*, *coccineum* etc., *purpurea* Lam., *Learii* Paxt., *violacea* L. etc., v. *Pharbitis hispida* etc., *Schultesii* Weinm. (= *bicolor* Sw., non Lam. = *Weinmanni* R. et S.) etc., v. *Shuteria bicolor*, *spectabilis* Boj. et *semidigyna* Swt., v. *Breweria spectabilis* et *Roxburghii*, p. 78, II., *tiliaefolia* R. et S. (= *benghalensis* Roth = *gangetica* Swt.) etc., v. *Rivea tiliaefolia* etc.

Hinsichtl. der übrigen s. *Convolvulus*, p. 157—158, II.

Ipomopsis Mchx., Benth. (= *Ipomeria* Nutt. = *elegans* Mchx. = *picta* Hort.), v. *Gilia*, Sect. IV., p. 262, II.

Iresine L. W., Straußfeder.

- ? herbacea Dsf., krautartige, 4. w. ?
 nervosa H. Vindob., nervige, ? ⊙. m. w. ? Südamerika.
 polymorpha Mart. (= *verticillata* Spgl.), vielgestaltige,
 4. w. Brasilien.

Iris T., Schwertel.

- acutifolia C. A. Mey., spitzblättriger, 4. Kn. f. Caucasus.
 alata Lam. (= *scorpioides* Dsf. = *verna* H. Panorm.
 = *Juno scorpioides* Tratt. = *Thelysia grandiflora*
 Salisb. = *Xiphium planifolium* Mill.).
 autumnalis Tausch, Herbst-S., 4. Kn. f. ?
 biflora L. (= *Fieberi* Seidel = *bohemica* Wimm.).
 carolina Radius, carolinischer, 4. Kn. f. b. Carolina.
 cuprea Pursh (= *fusca* Hort.).
 fragrans Lindl. (non Salisb.), wohlriechender, 4. Kn. k.
 Nordindien.
 germanica L., b) alba Savi (= *florentina* Auct., non L.),
 c) diluta, d) saturata (= *violacea* Savi).
 Güldenstaedtia Lepech., MB. (= *desertorum* Güldenst.).
 α) *livescens* MB. (= *spuria* MB.), β) *ochroleuca*
 MB. (= *spuria halophila* Bot. mag.).
 humilis MB. (= *alpina* Pall. herb. = *ruthenica* Ait.
 var. Ker.).
 hungarica W. K. (= *biflora* Rchb. = *bisflorens* Host.).
 imbricata Lindl., ziegeldachförmiger, 4. Kn. f. ?
 japonica Thbg., β) *repanda* v. Berg. (hybrida).
 laciniata H. Hamb., geschlitzter, 4. Kn. f. ?
 longispatha Fisch., langscheidiger, 4. Kn. f. Rußland.
 maritima Mill., Meerstrands-S., 4. Kn. f. Südeuropa.
 missouriensis Martens, missourischer, 4. Kn. f. Nord-
 amerika.
 mongolica Fisch., mongolischer, 4. Kn. f. Mongolei.
 notha MB., β) *pallida* Endl.
 nertschinskia Fisch., nertschinskischer, 4. Kn. f. Sibirien.
 nudicaulis Lam. (= *aphylla* Vahl = *biflora* Lk., MB.,
 non L. = *bohemica* Schm. = *furcata* MB. = *extra-
 foliacea* Mikan).
 orientalis Thbg. (= *sibirica* Thbg.), morgenländischer,
 4. Kn. k. f. b. Japan.
 oxypetala Bunge, spitzkroniger, 4. Kn. f. b. Nordchina.
 pallida Lam. (= *glauca* Salisb. = *pallide-coerulea* P.).
 β) *fulgida* v. Berg.
 pumila L., e) *gracilis* v. Berg, f) *purpurascens* v. Berg,
 g) *pseudo-pulcherrima* v. Berg, h) *Clusiana* Tausch.
 ruthenica Ker, Ait. (= *verna* Hortul.).
 soongarica Schrenk, soongarischer, 4. Kn. f. Soongaria.
 spuria L. (= *halophila* Curt. = *maritima* Lam.).
 squalens L., β) *saturata* Endl., γ) *superba* v. Berg, δ)
tardiflora v. Berg (hybrida).
 Susiana L., β) *livida* Tratt.
 tenuifolia Pall. (= *Xiphium tenuifolium* Schrk.), dünn-
 blättriger, 4. Kn. f. Dahurien, Soongaria.
 venusta H. Angl., lieblicher, 4. Kn. f. ?
 versicolor L., β) *saturata* Endl.

Unbestimmtere: *brachycarpa* Lodd., *caesia* Berg, *cana-
 densis* Fisch., *constantinopolitana* H. Cremn., *hybrida*
 Retz, *longiflora* Vest, R. et S., *Matthioli* Tausch,
minima Vest, *nigra* Hort., *picta* Mill., *praecox* H.
 anglor., *torta* Tausch.

Isachne RBr., Gleichspelze.

australis RBr. (= *Panicum antipodum* Spgl. = *P. violaceum* Klein).

dubia Kunth (= *panicca* Trin. = *Panicum dispernum* Lam. = *arundinaceum* Sw., p. 583), zweifelhafte, 4. w. Westindien.

muricata N. E. (= *Panicum muricatum* Retz, p. 584).

rigens Trin. (= *Panicum rigens* Sw. = ?*P. divaricatum* L.), starre, ☉. 4. w. Westindien, Südamerika.

Isatis T., Waid.

aleppica Scopol. (= *aegyptiaca* L.).

brachycarpa C. A. Mey., kurzfrüchtiger, ♂. f. Caucasus.

campestris Stev., Feld-W., ♂. f. Südpodolien.

canescens DC., graulicher, ♂. f. Südl. Frankreich.

cappadocica Desv. (= *latisiliqua* Stev. = *armena* MB., non L.), cappadocischer, ♂. f. Cappadocien.

iberica Stev. (= *canescens* β DC.), iberischer, ♂. f. Iberien.

intermedia Turcz., C. A. Mey., mittlerer, ♂. f. Asiat. Rußland.

laevigata Trautv., glatter, ♂. f. Sibirien.

microcarpa Gay, kleinfrüchtiger, ♂. k. f. Arabien.

minima Bunge, kleinsten, ☉. ♂. f. Mittelasien.

platycarpa Bunge, breitfrüchtiger, ☉. ♂. f. Mittelasien.

taurica Stev. (= *tinctoria* L. var., Spgl., Spach), taurischer, ♂. f. Taurien.

tinctoria L., β) microcarpa DC. (= *dalmatica* Mill.), γ) praecox Kit., δ) heterocarpa Andrz., ε) bannatica Ker.

Villarsii Gaud. (= *alpina* Vill. = *bannatica* Rchb. = *dalmatica* Hort.), Villars's, ♂. f. Südeuropa.

Isika alpigena Borckh. (= *lucida* Mch.), *coerulea* Borckh., v. *Lonicera alpigena*, *coerulea*, p. 475.

Ismelia madeirensis Don, *nodosa* Don, *versicolor* Cass., v. *Chrysanthemum pinnatifidum*, *nodosum*, *carinatum*, p. 193 et p. 141, II. etc.

Ismene Salish., Herb. (Ismene, Tochter des Oedip und der Jocaste).

pedunculata Herb., gestielte, 4. Zw. w. t. Peru.

virescens Lindl., grünliche, 4. Zw. w. Peru.

Isnardia L., Isnardie.

alternifolia DC. (= *Ludwigia alternifolia* L., p. 479 = *L. macrocarpa* Mch. = *microcarpa* Lk. = *L. ramosissima* Walt. = *Rhexia linearifolia* Poir.), wechselblättrige, 4. f. Virgin. Carolina.

β) *salicifolia* DC. (= *Ludwigia salicifolia* Poir.).

hirsuta R. et S. (= *Ludwigia hirsuta* Lam., Pursh = *pilosa* W., p. 479).

Isocarpha RBr., Gleichbodler.

atriplicifolia RBr. (= *alternifolia* Cassin. = *Bidens atriplicifolia* L. = *Calydermos atriplicifolius* Spgl. = *Spilanthes atriplicifolia* L.), meldenblättriger, ☉. ♂. f. w. Südamerika.

oppositifolia RBr., p. 425 (= *tricephala* Cassin. = *Calea oppositifolia* L. = *Calydermos jamaicensis* Spgl. = *Santolina oppositifolia* L.).

Isochilus RBr., Gleichstendel.

dubius van Houtte, zweifelhafter, 4. w. ? Südamerika.

fusiformis Lindl., spindelförmiger, 4. w. Trinidad.

lividus Lindl., schlagblauer, 4. w. Mexico.

- Isodon plectranthoides* Schrad., v. *Plectranthus rugosus*.
- Isoëtes** L., Brachsenkraut.
setacea Bosc, borstenförmiges, 4. Wa. f. k. Südfranzreich.
- Isolepis** RBr., Zartriet.
I. Genuina.
articulata N. E. (= *fistulosa* Delil. = *Scirpus articulatus* L. = *S. fistulosus* Forsk.), gegliedertes, 4. w. Ostindien, Aegypten.
Bergiana Schult. (= *plebeja* Schrad. = *chrysocarpa* N. E. = *Scirpus Bergianus* Spgl. = *S. minimus* Sieb. herb. cap. = *S. setaceus* Thbg.), Bergius's, ♂. f. Cap der guten Hoffnung.
bicolor Carmich. (= *Scirpus bicolor* Spgl.), zweifarbiges, ♂. 4. f. k. Insel Tristan d'Acunha.
capillaris R. et S. (= *brachyphylla* Lk., Schult. = *I. Mühlenbergii* A. Dietr. = *trichodes* var. *minima* Schrad. = *Cyperus minimus* L. = *Scirpus brevifolius* Bernh. = *S. capillaris* L. = *S. ciliatifolius* Darlingt., non Ell. = *S. minimus* Vahl = *S. Mühlenbergii* Spgl.), haarförmiges, ♂. f. Nordamerika.
Ehrenbergii Otto, Ehrenberg's, 4. k. Aegypten.
glaucescens Schrad., blaugrünes, ♂. w. Brasilien.
Hystrix Kunth (= *Scirpus Hystrix* Thbg.), stacheliges, ♂. 4. f. k. Cap d. g. Hoffn.
junciformis H. B. K. (= *Scirpus Humboldtii* Spgl. = *S. juncooides* W. herb.), simsensförmiges, ♂. w. Südamerika.
prolifera RBr. (= *Cyperus prolifer* H. Berol., non Thbg. = *C. punctatus* Lam. = *Scirpus prolifer* Rottb.).
pygmaea Kunth (= *acicularis* Salzm. = *brevis* Brongn. = *brachyphylla* Presl = *brevifolia* Presl = *leptalea* Schult. mant. = *Meyeniana* N. E. = *pumila* H. Berol. = *Saviana* Hort. Berol. = *Fimbristylis pygmaea* Vahl = *Scirpus brevis* Urv. = *S. leptaleus* Koch), zwergiges, ♂. f. Mittel- u. Südeuropa, Südamerika.
tenerrima Fisch. et Mey. (= *pygmaea* var. Kunth), feinstes, ♂. f. Südl. Rußland.
venustula Kunth (= *bicolor* N. E.), liebliches, ♂. f. m. Cap d. g. Hoffn.
II. **Holoschoenus** Lk.
atrovirens Lk. (= *Scirpus atrovirens* W. = *S. ? polyphyllus* Vahl).
brunneus Steud. (= *Scirpus brunneus* Mhlbg. = *S. exaltatus* Pursh = *S. polyphyllus* Vahl), braunes, 4. f. Nordamerika.
Holoschoenus RBr. et var., p. 425.
nodosus RBr., A. Dietr. (= *I. gracilis* Sweet, non N. E. = *Scirpus globosus* Spgl. = *S. gracilis* Rudge = *S. nodosus* Rottb.), knotiges, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn., Neuholland.
Thunbergianus Schrad., A. Dietr. (= *Cyperus marginatus* Thbg. = *C. prolifer* Thbg. = *Scirpus Holoschoenus* Thbg.), Thunberg's, 4. k. t. Cap d. g. H.
antarctica R. et S. (= *diabolica* Schrad.), *marginata* A. Dietr. *scariosa* N. E., v. *Ficinia antarctica*, *filiformis*, *scariosa*, p. 243, II., *hamulosa* Kunth, v. *Dichostylis hamulosa* Nachl.

- Isolobus** A. DC. (= *Pratia* G. Don), campanuloides A. DC., concolor A. DC., corymbosus A. DC., Kerii A. DC., Roxburghianus A. DC., v. *Lobelia*, Sect. IV. p. 471.
- Isomeris** Nutt., Gleichkapper, VI. I., Capparideae.
 arborea Nutt., baumartige, ⚥. ⚥. k. Californien.
Isonema ovata Cass., v. *Scheuchleria patula*, p. 729.
Isopetalum Cotyledonis Sweet, v. *Pelargonium* (Sect. VIII.) *Cotyledonis*, p. 601, *alchemilloides* Eckl., Zeyh., v. *Pelargon. alchemilloides*, p. 594.
Isophyllum baldense Hoffm., *falcatum* Hoffm., *Gerardi* Hoffm., *junceum* Hoffm., *petraeum* Hoffm., *tenuissimum* Presl, v. *Bupleurum baldense* etc.
- Isopappus** Torr. et A. Gr., Gleichfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 divaricatus Torr. et A. Gr. (= *Chrysopsis divaricata* Ell., Nutt. = *C. Lamarckii* Nutt. = *Diplopappus divaricatus* Hook. = *Heterotheca Lamarckii* Cass., DC. = *Inula divaricata* Nutt. = *I. subaxillaris* Lam.), ausgesperartes, 4. k. f. b. Südl. Nordamerika, Texas.
- Isopogon** RBr., Gleichbart.
 asper RBr., rauher, ⚥. t. Neuholland.
 argenteus v. Houtte, silberfarbiger, ⚥. t. Neuholland.
 fastigiatus H. belg., gipfelständiger, ⚥. t. Neuholland.
 grandiflorus v. Houtte, großblumiger, ⚥. t. Neuholland.
 grandis v. Houtte, großer, ⚥. t. Neuholland.
 latifolius RBr., breitblättriger, ⚥. t. Neuholland.
 pedunculatus RBr., gestielter, ⚥. t. Neuholland.
 petiolaris Cunningh., stielblättriger, ⚥. t. Neuholland.
 petrophiloides RBr., petrophilaähnlicher, ⚥. t. Neuh.
 pulchellus v. Houtte, schöner, ⚥. t. Neuholland.
 rigidus v. Houtte, starrer, ⚥. t. Neuholland.
 scaber Lindl., scharfer, ⚥. t. Neuholland.
 sphaerocephalus Lindl., kugelköpfiger, ⚥. t. Neuholland.
 tripartitus RBr., dreitheiliger, ⚥. t. Neuholland.
 uncinatus RBr., hackenförmiger, ⚥. t. Neuholland.
- Isotoma** RBr., Gleichsäumler, p. 426.
 axillaris RBr., Lindl. (= *senecioides* A. DC. = *Lobelia aspleniifolia* Hort. = *L. senecioides* Sims = *L. senecionis* Cunn.)
 breviflora Steud. (= *Hippobroma brevifl.* G. Don), kurzblumiger, 4. w. Südamerika.
 Brownii G. Don (= *Lobelia hypocrateriformis* RBr.), Brown's, ♂. m. f. Neuholland.
 longiflora Presl (= *Hippobroma longifl.* G. Don = *Lobelia longifl.* L. = *Rapuntium longifl.* Mill.).
- Isotropis** Benth., Leguminosae-Sophoreae.
 I. biloba Benth., cuneifolia Benth. (= *Callistachya cuneifolia* Sm.), striata Benth. ⚥. Neuholland, scheinen bis jetzt noch nicht kultivirt zu werden.
- Itea** L., Itea.
 chinensis Hook., Arn., chinesische, ⚥. k. China.
caroliniana Lam. (= *racemiflora* Hort.), v. *Cyrilla caroliniana*, p. 247, *japonica* Hort., v. *Adenobasiun salicifolium* Nachl., *spinosa* Andr., v. *Bursaria spinosa*, p. 140.
- Iva** L., Iva.
 angustifolia Nutt., schmalblättrige, ♂. f. Nordamerika.
 imbricata Walt. (= *integrifolia* Bank's = *Bailliera caroliniana* Speg.), ziegeldachförmige, ⚥ f. b. k. Nordam.

Ixanthus Griseb., Hüllenzian, V. 1., Gentianeae.

viscosus Griseb. (= *Exacum viscosum* Sm. = *Gentiana viscosa* Ait. = *Hippion viscosum* Spgl., p. 491), klebriger, 4. k. t. Canarische Inseln (Teneriffa).

Ixia L., Ixia.

bicolor Thbg., zweifarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
capillaris Thbg. (= *gracilis* Salisb. = *lancea* Jacq.).

conica Salisb. (= *capitata* var. Andr. = *dubia* Vent.
flava Mill. = *fuscocitrina* Dsf. = *maculata* Burm.

Milleri Berg., *nervosa* Vent.).

crateroides Ker, b) *hybrida* Hort.

erecta Berg. (= *nervosa* var. Vent. = *polystachya* L. = *serotina* Salisb.).

flavescens Eckl., gelbliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

flavovirens Eckl., gelbgrüne, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

flexuosa L., β) *hybrida* Ker.

geminiflora Schrank, paarblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

hexandra Schrk., sechsmännige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

laurea Jacq. (= *Hyalis marginiflora* Salisb.), randblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lilacina Eckl., lilafarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
b) *maculata*.

lutea Eckl., gelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

maculata L. (= *abbreviata* Houtt. = *amoena* Salisb. = *capitata* var. *ovata* Andr. = *pulchra et spectabilis* Salisb. = *spicala* var. *viridi-nigra* Andr. = *viridis* Thbg.). δ) *bimaculata* Schrk.

patens Ait. (= *aristata* Schneev. = *concolor* Salisb. = *flaccida* Salisb. = *kermesina* Hort. = *pallens* Steud. = *Sprengeliana* Schult.).

pulcherrima Eckl., schönste, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

scariosa Thbg. (= *maculata* L. var. Spgl.), trockenhäutige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

striata Vahl (= *capillaris* L. var. Spgl.), gestreifte, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

tenuifolia Vahl, dünnblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

Thunbergii R. et S. (= *squalida* Thbg., non Ait.), Thunberg's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

vitellina Eckl., dottergelbe, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

Hybriden von H. O. Carre gezogen: *Bright orange*, *canariensis*, *capitata bicolor*, *cuprea capitata*, *elegans*, *elegans minor*, *lilacea sarniensis*, *maculata suprema*, *purpurea*, *purpurea campanulata*, *rosea maculata*, *rosea rubra*, *rosea rurida*, *sanguinea*.

Unbestimmtere: *antholyzaeformis* Lam., *emarginata* Lam., *laeta* Hort., *lobata* Hort., *pinifolia* Hort., *propinqua* Hort., *socialis* Hort., *tardiflora* Hort., *tumida* Hort., *venusta* Hort., *versicolor* Hort.

africana L., v. *Aristea cyanea*, *africana* Hornem. (= *cyanea* P. = *rubrocyanea* Jacq.), v. *Babiana rubro-cyanea*, *chinensis* L., v. *Pardanthus chinensis*, p. 586, *coerulescens* P. (= *flabelliformis* Salisb. = *punicea* Ait. = *villosa* Ait.), v. *Babiana villosa*, *columnaris* Andr., Salisb., *monadelphina* Dela Roche etc., v. *Galaxia ixiaeflora* etc., p. 252, II., *crocata* L., *deusta* Ait. ec., v. *Montbretia crocata*, *deusta* etc., *stellata tricolor* Hort., v. *Sparaxis tricolor* etc.

Ixiolirion Fisch., MB., Ixiellilie (Narcissenixie), VI. 1.,
Amaryllideae-Narcisseae.

Ledebourii Bong. et C. A. Mey, Ledebour's, 4. Zw. f.
Altai.

montanum Herb. (= *Amaryllis montana* LaBill., Redouté
= *Alstroemeria montana* Ker), Bergliebende, 4. Zw.
f. b. Syrien, Persien.

Pallasii Fisch. (= *tataricum* Herb. = *Amaryllis tatarica* Pall.), Pallas's, 4. Zw. f. Sibirien, Taurien.
β) *scythica* Herb.

Ixodia natans Soland., Bank's, v. *Hydropeltis purpurea*, p. 407.

Ixora L., Ixora.

acuminata Roxb., zugespitzte, ♀. w. Silhet.

alba L., weisse, ♀. w. Ostindien.

amoena Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

coccinea L. (= *grandiflora* DC. = *obovata* Heyne =
propinqua RBr.), scharlachfarbige, ♀. w. Ostindien.
b) fol. variegat.

coriacea Wall. (= *Webera coriacea* Wall.), lederartige,
♀. w. Ostindien.

erubescens Wall. (= *affinis* Wall.), röthliche, ♀. w.
Ostindien.

Finlaysoniana Wall., Finlayson's, ♀. w. Ostindien.

fulgens Roxb. (= ? *Breonii* Hort. belg.).

laxiflora Sm., lockerblumige, ♀. w. Sierra Leone.

spectabilis Wall., ansehnliche, ♀. w. Ostindien.

stricta Roxb. (= *coccinea* Curt., Ait. = *flammea* Salisb.
= *obtusiflora* Hamilt. = *speciosa* W. Enum. =
= *Pavetta stricta* Blume.).

subsessilis Wall., weniggestielte, ♀. w. Ostindien.

jamaicensis Hort. = ?, *ovata* Hort. (= *parviflora* Lam.,
non Vahl), v. *Myonima multiflora*, *ternifolia* Cav.
(= *americana* Jacq.), v. *Bouvardia* Jacquini, p. 129.

Jaborosa Juss.

integrifolia Lam. (= *bonariensis* Gmel.).

Jacaranda Juss., (brasilianischer Name).

coerulea Juss. (= *bahamensis* RBr. = *caroliniana* P.
= *Bignonia coerulea* L.), blaue, ♀. t. Bahamische
Inseln, Carolina.

Clausseniana Casar., Claussen's, ♀. w. Brasilien.

pubescens Chamiss., weichhaarige, ♀. w. Brasilien.

racemosa Chamiss., traubige, ♀. w. Brasilien.

Jacea pratensis Cass. etc., v. *Centaurea Jacea*.

Jacksonia RBr., Jacksonie.

alata Benth., geflügelte, ♀. t. Neuholland.

capitata Benth., kopfförmige, ♀. t. Neuholland.

dilatata Benth., verbreiterte, ♀. t. Neuholland.

floribunda Endl., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

grandiflora Booth, großblumige, ♀. t. Neuholland.

reticulata DC. (= *Daviesia reticulata* Sm.), netzförmige,
♀. t. Neuholland.

sericea Benth., seidenhaarige, ♀. t. Neuholland.

Jackia Wall., (Will. Jack, Chirurg im Dienste der ost-
indischen Compagnie, †), V. 1., Rubiaceae.

ornata Wall. (= *Zuccarinia ornata* Sngl.), zierliche, ♀.
♀. w. Ostindien.

Jacquemontia Choisy, (Victor Jacquemont, franz. Botaniker u. Reisender), V. 1.

azurea Chois. (= *Convolvulus azureus* Rich. = *C. aureus* Dietr.), azurfarbige, 4. Sch. w. Südamerika.

β) *parviflora* Chois. (= *Convolv. verticill.* L. = ? *Ipomoea verticillata* L.).

violacea Chois. (= *Convolv. violaceus* Vahl), violette. 4. ♂. Sch. w. Carbiäen, Südamerika.

β) *canescens* Chois. (= *Convolv. canescens* H. B. K.), γ) *abbreviata* Chois. (= *Convolv. pentanthus* Jacq.).

Jacquinia L., Jacquinie.

aurantiaca Ait., Sims (= *macrocarpa* Spgl. ex parte), orangefarbige, ♂. w. ? Sandwichtinsel.

macrocarpa Cavan. (= *Bonellia Cavanillesii* Hort. ripul.).

ruscifolia Jacq., β) *velutina* A. DC. Havana, ? γ) *frutescens* A. DC. (= *Ruscus frutescens* Mill. = *J. ruscifol.* var. Sm.).

umbellata A. DC. (= *aurantiaca* Berter., non Ait.), doldige, ♂. w. Porto-Rico.

ruscifolia H. Ticin. v. *Bontia daphnoides*, p. 127.

Jalapa Adans., *congesta* Mch. etc., v. *Mirabilis Jalapa* etc.

Jaltomata edulis Schldl. v. *Saracha Jaltomata*.

Jambosa Rumph, DC., Jambusenbaum.

acuminatissima Hassk. (= *Myrtus acuminatissima* Blume = *Syzygium acuminatissimum* DC.), zugespitzter, ♂. w. Java.

australis DC. (= *Eugenia australis* Wendl. = *E. myrtifolia* Sims, Ker, Lodd. = *Myrtus australis* Spgl. = ? *Tristania corymbosa* Hort.), neuholländischer, ♂. k. Neuholland.

cerasiformis Hassk. (= *Eugenia cerasiformis* DC. = *Myrtus cerasiformis* Blume), kirschförmiger, ♂. w. Java.

formosa Spach (= *Eugenia formosa* Wall.), schöner, ♂. w. Ostindien.

laurifolia DC. (= *Eugenia javanica* Lam. = *E. laurifolia* Roxb. = *Myrtus javanica* Spgl.), lorbeerblättriger, ♂. w. Ostindien.

macrophylla DC. (excl. Syn.), (= *alba* Wight, Arn. = *Eugenia alba* Roxb.).

malaccensis DC. (= *domestica* DC. = *Eugenia macrophylla* Lam. = *E. malaccensis* L. = *Myrtus macrophylla et malaccensis* Spgl.).

purpurascens DC. (= *Eugenia pseudomalaccensis* Hort. Par.), purpurfarbiger, ♂. w. Ostindien.

Jania Breyniana Jacq. fil., v. *Kolbea Breyniana*, p. 439.

Janipha aesculifolia H. B. K. etc., v. *Manihot aesculifolia* etc., *urens* Poir., v. *Cnidoscolus quinquelobus*, p. 150, II.

Jasione L., *montana* L., β) *maritima* Dufour, γ) *adscendens* Hort.

Jasminum T., Jasmin.

adenophyllum Wall. (non Brot.), drüsenblättriger, ♂. ♂. w. Ostindien.

affine Royle, ähnelnder, ♂. ♂. Sch. k. Nordindien¹⁾.

1) Prof. Lindley hält ihn für die wildwachsende Form von *J. officinale*.

Jasminum

angulare Vahl (= *capense* Thbg., E. Mey.), kantiger,
 ♀. ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

?β) *campanulatum* Lk.

aureum D. Don, goldfarbiger, ♀. k. t. Nepal.

auriculatum Vahl (= *trifoliatum* P. = *Mogorium trifoliatum* Lam.).

caudatum Wall., geschweiffter, ♀. t. Sch. t. w. Silhet, Bengal.

erectiflorum A. DC., aufrechtblumiger, ♀. Sch. w. Ostind.

Finlaysonianum Wall., Finlayson's, ♀. Sch. w. Ostindien.

glaucum Ait., α) *rivulare* Salisb. (= *ligustrifolium*

Salisb.), β) *lanceolatum* E. Mey. (= *glaucum* Vent.

h. Cels.), γ) *latifolium* E. Mey., δ) *parvifolium* E. Mey.

grandiflorum L. (= *hispanicum* Hortul.).

guineense G. Don, guineischer, ♀. ♀. w. Guinea.

humile L. (= *italicum* Hort.).

laurifolium Roxb., β) *lanceolatum* H. Berol. (= *angustifolium* Andr.).

mauritianum Bojer (= *flexile* Dsf. hort. Par.), mauritius'scher, ♀. ♀. Sch. w. Mauritius.

molle RBr. (= *hirsutum* Hffg.), weicher, ♀. t. w. Neuh.

nepalense Spgl. (= *dichotomum* D. Don), nepalscher, ♀. t. k. Nepal.

pubigerum D. Don, β) *glabrum* A. DC. (= *Wallichianum* Lindl. = *pubescens* Loud.).

revolutum Sims (= *humile* Heyne, non L. = *praecox* et *sinense* Hortul.).

Sambac L. (= *Mogorium Sambac* Lam. = *Nyctanthes Sambac* L.), α) *verum* A. DC., β) *Gimea* (flore-pleno),

γ) *goaense*, δ) *trifoliatum* Vahl, ε) *undulatum* Hort.

solenanthum A. DC. (= *aborescens* Boj. Cat. h. Maur., non Roxb. = *tubiflorum* Roxb.), röhrenblumiger, ♀. w. Ostindien.

stenopetalum Lindl. (= *trinerve* Roxb., non Vahl).

subulatum Lindl., pfriemenförmiger, ♀. ♀. Sch. t. China.

syringaefolium Wall., syringablätteriger, ♀. ♀. w. Ostind.

tortuosum W. E. (= *flexile* Jacq.), β) *latifolium* Visian, ?γ) *campanulatum* Lk.

trinerve Vahl (= *acuminatum* P., non RBr.).

volubile Jacq., windender, ♀. Sch. t. Cap d. g. Hoffn.

Unbestimmtere: *adenophyllum* Brot. (nec Wall.), *Loudonianum* Hffg.

Jasonia Cass., DC.

dichotoma DC. (= *Allagopappus dichotomus* Cass. = *Chrysocoma dichotoma* Jacq. = *Conyza canariensis* W. = *C. dichotoma* L. fil. = *C. inuloides* Ait.), zweizinkige, ♀. k. Canarische Inseln.

glutinosa Less., DC. (= *Chiliadenus camphoratus* Cass. = *Chrysocoma camphorata* Rob. et Cast. = *C. verticalis* Lag. = *Erigeron glutinosus* L. = *Inula saxatilis* Lam. = *Orsinia camphorata* Bertol.).

laevigata DC. (= *Bupthalmum coriaceum* Hort. = *B. laevigatum* Brouss. = *Donia canariensis* Less.), glatte, ♀. k. Teneriffa.

Jatropha L., Kunth, Brechnufs.

quinquelobata Mill., fünfflappige, ♀. w. Havana.

Curcas L., v. *Curcas Adansonii*, p. 176, II.

Hinsichtl. d. übrigen s. d. Gattungen *Cnidocolus*, *Hyaeanche* et *Manihot*.

Jeaumea linearis P., v. *Kuhnia linearifolia*.

Jeffersonia Barton, Spgl., Jeffersonie.

diphylla P. (= *Bartonis* Mchx. = *Podophyllum* dipl. L.).

lobata Rafin., gelappte, 4. f. Nordamerika.

Jenkinsonia coriandrifolia Swt., *longicaulis* Hffg., *quinata* Swt., *Synnoti* Swt., *tetragona* Swt., v. *Pelargonium coriandrifol.*, *longicaule*, *quinatum* etc., p. 601 et 594.

Joachimia phalaroides Tenore, v. *Beckmannia erucaeformis*.

Jochroma Benth., Jochroma, V. 1., Solanaceae.

tubulosa Benth. (= *Habrothamnus cyaneus* Lindl.), röh-
rige, 5. 5. w. Südamerika.

Johnia coromandeliana Roxb. et *salacioides* Roxb., v. *Salaxia prinoides* et Roxburghii.

Johnsonia RBr., Coronariae-Asphodeleae.

hirta Lindl., lupulina RBr., pubescens Lindl. Sämmt-
lich 4. und in Neuholland heimisch, scheinen nicht
kultivirt zu werden.

Jonopsidium DC., acaule Rchb., v. Cochlearia, Sect. II.

Josephia augusta Arrabida, v. *Buginvillea specta-*
bilis. — *J. armata* Poir. etc., v. *Dryandra armata*
etc., *falcata* Poir., v. *Hemiclidia Baxteri*, p. 389.

Jovellana Cav., *punctata* R. et Pav., *scapiflora* R.
et P., v. *Calceolaria punctata* et *plantaginea*, p. 146.

Joxylon Rafin., v. *Maclura aurantiaca*.

Juannulloa R. et P. (= *Ulloa* P., G. J. Ulloa, spa-
nischer Naturforscher), V. 1., Solanaceae.

parasitica R. et P. (= *aurantiaca* Otto et Dietr. =
Brugmansia aurantiaca Hort. = *floribunda* Paxt. =
parviflora Hort. = *Swanolloja aurantiaca* Hort. =
Ulloa parasitica P., p. 829), schmarozende, 5.
t. Peru.

Jubaea H. B. K. (= *Molinaea* Berter., non Lam.),
Jubaeapalme, XXI. IX. (XIII. III.), Palmae.

elegans v. Houtte, zierliche, 5. w. ? Südamerika.

spectabilis H. B. K. (= *Cocos chilensis* Molina), an-
sehnliche, 5. w. Chili.

Juglans L., Wallnufs.

?mexicana H. Cels, mexicanische, 5. k. Mexico.

regia L., e) sphaerocarpa, f) spicata H. Makoy., g) fer-
tilis Hort. (= *praeparturiensis* Hort.), h) filicifolia
Lodd. (= *heterophylla* Hort.).

Juncus T., DC., Simse.

cephalotes Thbg. (= *capensis* Spgl. = *cymosus* Lam.
= *multiflorus* Lam.), grofsköpfige, 4. k. Cap d. g. H.
effusus L. (= *communis* β E. Mey.).

fusco-ater Schreb. (= *acutiflorus* α Gaud. = *alpinus*
Rchb. = *articulatus* W. β Fr. = *dubius* Wolff =
erectus Bess. = *intermedius* Poir. = *micranthus* Desv.
= *microcarpus* Nolte = *mucroniflorus* Clairv. = *no-*
dulosus Wahlbg. = *subnodulosus* Hoppe), schwarz-
braune, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *alpestris* Hartm. (= *alpinus* Vill. Suter =
geniculatus Schrk. = *ustulatus* Hoppe).

multiflorus Dsf. (= *subulatus* Forsk.), vielblumige, 4. k.
Nordafrika, Griech. Archipel.

pallescens Lam. (= *acuminatus* Mchx. = *sylvaticus*
Mühlbg.), bleichende, 4. f. Nordamerika.

pallidus RBr., bleiche, 4. k. Neuholland.

polycephalus Mchx. (= *echinatus* Mühlbg.).

Juncus

pygmaeus Thuill. (= *mutabilis* α Lam. = *nanus* Duby = *pallens* P. = *triandrus* Gouan).

soranthus H. Petropol, häufchenblumige, 4. f. Soongaria.

subunifolius Brotero, fasteinblättrige, 4. f. Portugal.

tricephalus Gay (= *macrocephalus* Vivian. = *trichocephalus* Auct.), dreiköpfige, 4. f. b. k. Corsica, Calabr.

valvatus Lk. (= *echinuloides* Brotero).

Jungia imbricata G., *tenella* G., v. *Schidiomyrtus*

crenulata et tenella.

Juniperus T., Wachholder.

Bedfordiana H. Anglor., Bedford's, 5. f. ?

Biasoletti Lk., Biasoletto's, 5. f. b. k. Istrien.

canadensis Fisch., canadischer, 5. f. Canada.

communis L., g) cracovia Lodd., h) hibernica Lodd.

Deppeana Steud. (= *mexicana* Chamiss., Schldtl., non Spgl.), Deppe's, 5. k. Mexico.

davurica Pall., davurischer, 5. f. Davuria, Altai.

flaccida Schldtl., Lindl., schlaffer, 5. k. Mexico.

glauca H. Cels, blaugrüner, 5. f. ?

Hermanni H. Par. (= *virginiana* L. var. P.), Hermann's, 5. f. ?

Pseudo-Sabina C. A. Mey. (= *Sabina* Leheb.), nächster Seven-W., 5. f. Altai.

rufescens Lk. (= *Oxycedrus* Auct.), röthlicher, 5. f. b. k. Südeuropa.

squamosa Wall. (= *squamata* Don).

In Makoy Extrait du Catalogue des plantes werden noch aufgeführt: *J. gossainthanea*, *neoboriensis*, *pendula*.

Unbestimmtere: *ericoides* Nois., Dsf., *horizontalis* Mch., *rigida* Dsf., *Thuja* Fisch.

Jurinea Cass., *Jurinea*.

adenocarpa Schrenk, drüsenfrüchtige, 4. f. Soongaria.

ambigua DC. (= *polyclonos* DC. var. = *Serratula ambigua* DC.), zweifelhafte, 4. f. Süd. Rußland.

chaetocarpa Ledeb. (= *Serratula chaetocarpa* Ledeb.), borstigfrüchtige, 4. f. Altai.

cyanoides DC. (? = *tomentosa* Cass.).

depressa C. A. Mey. (= *Centaurea Moschus* Habl. = *Serratula depressa* Stev.), niedergedrückte, 4. f. Caucasus.

humilis DC. (= *Bocconi* Gay).

moschata DC. (= *Carduus moschatus* Guss. = *Serratula simplex* β Tenore), moschusduftende, 4. f. Neapel.

pulchella DC., schöne, 4. f. b. k. Persien.

rhizantha Fisch. et Mey., wurzelblumige, 4. f. Caucasus, Armenien.

stoechadifolia DC. (= *Serratula stoechadifolia* MB. = *S. tomentosa* Hoffm.), Stoechasblättrige, 4. f. Taurien.

linearifolia Hort. (non DC.), v. *Chamaepeuce mutica*, p. 187.

Jussieua Houst. L., *Jussieua*.

acuminata Sw., zugespitzte, ☉. w. m. f. Westindien, Brasilien.

angustifolia Lam. (= *erecta* L. var. Spgl. = *exaltata* Andr. = *suffruticosa* G.), schmalblättrige, ♂. 5. w. Java, Molucken.

decurrens DC. (= *erecta* Abb. = *Ludwigia decurrens* Walt. = *L. jussiaeoides* Mchx), herablaufende, 4. f. Nordamerika.

Jussieua

frutescens Jacq., strauchige, ♀. w. ?

longifolia DC., langblättrige, ☉. 4. ♀. w. Brasilien.

octonervia Lam. (= *octofila* DC. = *octovalvis* Sw.).

ramosa Jacq. fil. (= *erecta* L. var. DC.).

Justicia L., Justiceie.

IV. *Cryptophragmium* N. E.

canescens N. E., grauliche, ♀. w. Ostindien.

VIII. *Justicia genuina* N. E.

callistachya Cham., Schltdl., schönährige, ♀. t.ⁿ Mexico.

carnea Lindl., b) *superba* Hort.

longiflora Visian., langblumige, 4. ♀. w. ?

pseudo-coccinea Brotero, unächte, ♀. w. Brasilien.

quadrifida Vahl (= *ligularis* Salisb. = *superba* Hort.

angl. = *virgularis* Salisb.).

spatulata N. E. Mart., spatelförmige, ♀. w. Brasilien.

variegata Aubl., bunte, ♀. w. Guiana.

violacea Vahl (= *Dianthera violacea* Vahl), violette, ♀. w. Arabien.

VIII^b. *Odontonema* N. E.

lucida Andr.

IX. *Peristrophe* N. E.

speciosa Roxb. (= *tinctoria* Hort.), β) *riviniaefolia*,

Visian. (= *violacea elegans* Hort.).

XIII. *Schaueria* N. E.

calycotricha Lk. et Otto (= ? *chrysostachys* Hort.).

Kadsura Juss., (japanischer Name), XIII. vi., Magnoliaceae.

japonica Dunal (= *Uvaria japonica* L.), japanische, ♀. t. Japan, Ostindien.

propinqua Wall., v. *Sphaerostemma propinquum*.

Kaempferia L., Kaempferie.

angustifolia Rosc. (= *undulata* Lk. = *purpurea* Hort. = *Roxburghiana* Schult.).

Galanga L. (= *plantaginea* Salisb.).

lanceolata Lodd., lanzettblättrige, 4. w. Ostindien.

latifolia Don H. Cantabr., Hornem. (= *Galanga* W. E., non L.).

rotunda L. (= *longa* Jacq. = *rotundifolia* Hort. = *versicolor* Salisb.).

elegans Wall., *secunda* Wall., v. *Monolophus elegans*, *secunda*.

Kageneckia R. et P., Kageneckie.

crataegoides D. Don, weifsdornähnliche, ♀. k. t. Chili.

oblonga R. et P. (= *crataegifolia* Lindl.), längliche, ♀. k. t. Chili.

ovata Colla, eiförmige, ♀. k. t. Chili.

Kalanchoë Adans., (chinesischer Name).

floribunda W. A. (= *Cotyledon corymbosa* et *paniculata* Rottl.), blüthenreiche, 4. ♀. w. t. Ostindien.

lanceolata P. (= *Cotyledon lanceolata* Forsk. = *Verea lanceolata* Spgl.), lanzettblättrige, ♀. t. Arabien.

pinnata P. (= *floripendula* Lam.), v. *Bryophyllum calycinum*, p. 135.

Kalbfussia Schultz Bip., (C. Kalbfufs, Freund des Herrn Schultz), XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.

Milleri Schultz Bip. (= *Apargia verna* Hochst. et Steud. herb. Sard. = *Hemilepis hispida* Kunze = *Hete-*

Kalbfussia

rochaeta hispida Ehrhg. = *Thrinicia laevigata* Lk.),
Miller's, ☉. f. Sardinien, Nordafrika.

Salzmanni Schultz Bip. (= *Apargia verna* Salzm.),
Salzmann's, ☉. f. Nordafrika.

Kallstroemia Scopol. Wight, Arn., Kallströmie, X. 1.,
Zygophylleae.

cistoides Endl. (= *Tribulus cistoides* L., Jacq., p. 816
= ? *littoralis* Ait.), ciströschennähnliche, 4. w. Süd-
amerika, Sandwichinseln.

maxima W. A. (= *K. Tribulus* Meisn. = *Tribulus*
maximus L., p. 816).

tribuloides W. A. (= *Ehrenbergia tribuloides* Mart. =
Tribulus brasiliensis Speg.), brasilianische, ☉. w. m.
Brasilien.

Kalmia L., Kalmie.

latifolia L., b) *myrtifolia* Hort. belg.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der
belgischen Gärten noch *K. glauca superba*, *lucida*,
oleifolia und *salicifolia* erwähnt.

Kamptzia albens N. E., v. *Syncarpia laurifolia*.

Karelinia Less., (Gr. Karelin, bereiste mit Kirilow
Soongarien), XIX. 1. (11.), Compositae-Corymbiferae.

caspia Less. (= *Serratula caspia* Pall.), caspische, 4. f.
Gegend des caspischen Meeres.

Karwinskia Zucc., (Baron v. Karwinsky in München,
bereiste Mexico), V. 1., Rhamneae.

glandulosa Zucc., drüsige, 5. k. t. Mexico.

umbellata Endl. (= *Rhamnus umbellatus* Cav. = *Zizy-
phus umbellata* Poir.), doldige, 5. k. t. Mexico.

Kaulfussia amelloides N. E., v. Charieis hetero-
phylla γ Neesii, p. 136, II., *ciliata* Speg. fil., v.
Aster Sect. II. tenellus, p. 51, II., *strigosa* Speg.
fil., v. *Agathaea strigosa*, p. 13, II.

Kennedyia Vent., Kennedye.

I. Genuina.

arenaria Benth., Hügel, Sandliebende, 5. 5. Sch. t. Neuh.

bracteata Gaudich., deckblättrige, 5. t. Westl. Neuholl.
Marryattiana Lindl.

monosperma Gaudich., einsamige, 5. 5. Sch. t. Neuholl.
nigricans Lindl.

parviflora Meisn., kleinblumige, 5. 5. Sch. t. Neuholland.

prostrata RBr. (= *coccinea* W., non Vent.).

stipularis Desv. (= *prostrata* β major DC. = ? *bracteata*
Gaudich.), zwischenblättrige, 5. t. Neuholland.

II. *Hardenbergia* Benth.

Comptoniana Benth. (Lk.), (= *Glycine Comptoniana* Ker).

cordata Benth. (Lindl.), herzblättrige, 5. 5. Sch. t. Neuh.

Hügelii Benth., Hügel's, 5. 5. Sch. t. Neuholland.

Lindleyi Meisn., Lindley's, 5. 5. Sch. t. Neuholland.

α) *trifoliata* Meisn., β) *digitata* Meisn. (Lindl.).

lucida Hügel, spiegelnde, 5. 5. Sch. t. Neuholland.

macrophylla Benth. (Lindl.).

monophylla Benth. (Vent.). α) *bimaculata* (Hort.) (=

Glycine virens Soland. = *G. bimaculata* Curt.). β)

longeracemosa (Lindl.).

ovata Benth. (Sims), (= *latifolia* Lindl.).

Varietäten oder Hybriden: *praegnans* Harris., pur-
purea Hort.

Kennedyia

III. Zichya Hügel, Benth.

angustifolia Lindl., schmalblättrige, ♀. Sch. t. Neuholl.
coccinea Benth. (Vent.).dilatata (Cunningh.), (= *sericea* Benth.).

glabrata Benth. (Lindl.).

heterophylla Sweet (Makoy).

inophylla Benth. (Lindl.).

Molly Hügel.

pannosa Hort. belg., faserlappige, ♀. Sch. t. Neuholland.

? rotundifolia Hort. belg., rundblättrige, ♀. Sch. t.
Neuholland.

tricolor Lindl., dreifarbig, ♀. Sch. t. Neuholland.

villosa Lindl., zottige, ♀. Sch. t. Neuholland.

? Hybriden: Baumannii Hort. (= *oblongata* Hort.), flori-
bunda Hort., Towardi H. belg. (= *inophylla* Hort.).Unbestimmtere: apetala Lindl., audomarensis Hort.,
inconspicua Hort., phaseolifolia Hffg., sericea Cunn.,
undulata Hort.*gracilis* Hort., *Stirlingii* Lindl., v. *Physolobium*
gracile etc., *splendens* Hort., v. *Dioclea glycinoides*,
p. 203, II., *microphylla* Sieb. (= *Sieberiana* Hort.
= *Kennedynella microphylla* Steudel etc.), v. *Lepto-*
cyamus microphyllus etc. — *Kennedynella* Steud.,
v. *Leptocyamus*.*Ketmia* Scop., Mch., *arborea* Mch. (= *syriaca*
Scop.), *glandulosa* Mch., *mutabilis* Mch., *Trionum*
Scop., v. *Hibiscus syriacus*, *cannabinus* etc. p. 395
et 397.**Kielmeyera** Mart., (C. F. v. Kielmeyer, k. würtemb.
Staatsrath, Arzt u. Naturforscher, †), XIII. I., Tern-
stroemiaceae.*alba* Makoy, weifse, ♀. w. Brasilien.*coriacea* Mart. (= *Bonnetia coriacea* Spgl.), lederartige,
♀. w. Brasilien.*Kirschlegeria Lindleyi* Spach, *lycioides* Spach, v.
Fuchsia parviflora, *lycioides*, p. 340 et p. 249, II.**Kirganelia** Juss., *elegans* Juss. (= *mauritiana* Hort.
= *phyllanthoides* Dsf. = *virginica* Usteri = *Phyllan-*
thus fascicularis Poir. = *P. Kirganelia* W. = *P.*
virginicus P., p. 437).**Kirilowia** Bunge, (J. Kirilow, russischer Botaniker u.
Reisender, †), V. II. (I.), Aizoideae-Atripliceae (Che-
nopodeae).*eriantha* Bunge (= *Londesia eriantha* Karel. et Kiril.,
non Fisch. et Mey.), wollblumige, ☉. f. Ural.*pilosa* Bunge = *Panderia pilosa*, p. 583.**Kixia** Blume, Kixie, V. I., Apocyneae.*arborea* Blume, baumartige, ♀. w. Java.*Klasea heterophylla* Cass., *pinnatifida* Webb, *quin-*
quefolia Cass., v. *Serratula heterophylla* etc.**Kleinia** L., Haw., non Jacq., (J. H. Klein, deutscher
Botaniker), XIX. I., Compositae-Corymbiferae.*acaulis* DC. (= *Cacalia acaulis* L. fil.), stengellose,
4. t. Cap d. g. Hoffn.*aizoides* DC., zaserlingähnliche, 4. ♀. t. Cap d. g. H.*Antheuphorbium* DC. (= *Cacalia Antheuphorbium* L.,
p. 141).*articulata* Haw. (= *Cacalia articulata* L. fil., p. 141,
= *C. lacinata* Jacq. = *C. runcinata* Lam.).

Kleinia

breviscapa DC. (= *C. carnos*a Ait.), kurzschafelige, 4.

♂. t. Cap der guten Hoffnung.

cana DC., graue, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

carnosa Endl. (= ?*breviscapa* DC. = *Cacalia carnos*a Ait., p. 141).

crassulaefolia DC., dickblättrige, ♂. t. Cap d. g. H.

cuneifolia DC. (= *Cacalia cuneifolia* L. fil.), keilblättrige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

ficoides Haw. (= *Cacalia ficoides* L., p. 141).

gonoclada DC., sprossenästige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

Haworthii DC. (= *tomentosa* Haw. = *Cacalia canescens* W. Enum. spl. = *C. Haworthii* Swt. = *C. tomentosa* Haw., non L. et Jacq.), Haworth's, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

neriifolia Haw. (= *Cacalia Kleinia* L.), oleanderblättrige, ♂. t. k. Canarische Inseln.

papillaris Haw. (= *Cacalia papillaris* L.), weichwarzige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

pinguifolia DC., fettblättrige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

pugioniformis DC. (= *Cacalia longifolia* Haw. = *C. pugioniformis* Salm), dolchförmige, ♂. t. Cap d. g. H.

radicans Haw. (= *Cacalia radicans* L., p. 141).

repens Haw. (= *C. repens* L., p. 141).

rigida DC. (= *Cacalia rigida* Thbg.), starre, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

semperviva DC. (= *Cacalia sempervirens* Vahl = *C. semperviva* Forsk.), immergrüne, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

talinoides DC., talinumähnliche, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

colorata H. B. K., *linearis* Dsf. H. Par. (= *suffruticosa* Lodd.), *Porophyllum* W., *ruderalis* W., *suffruticosa* W., *tagetoides* H. B. K., *viridiflora* H. B. K., v. *Porophyllum coloratum*, *decumbens*, *ellipticum*, *ruderales*, *linifolium*, *tagetoides* et *viridifl.*

Knautia L. Coult., Knautie.

sylvatica DC. (= *arvensis* γ Coult. = *Scabiosa ovatifolia* Lagasca = *S. pannonica* Jacq. = *S. sylvatica* L. = *Trichera sylvatica* Schrad.), Wald-K, 4. f. Deutschland, Ungarn.

Kneiffia angustifolia Spach, *chrysantha* Spach, *floribunda* Spach, *Fraseri* Spach, *glauca* Spach, *gracilis* H. Götting, *linearifolia* Spach, *maculata* Spach (= *serotina* Spach), *pumila* Spach, *suffruticosa* Spach, v. *Oenothera linearis*, *chrysantha*, *hybrida*, *Fraseri*, *glauca*, *gracilis*, *linifolia*, *serotina*, *pumila*, *fruticosa*, p. 555.

Kniphofia Mch., (Kniphof, deutscher Botaniker, †).

VI. 1., Coronariae-Aloineae.

aloides Mch. (= *Aletris Uvaria* L. = *Aloe longifolia* Lam. = *A. Uvaria* L. = *Tritoma Uvaria* Ker = *Tritomanthe Uvaria* Lk., p. 825 = *Veltheimia speciosa* Roth = *V. Uvaria* W., Jacq.), Aloëähnliche, 4. k. f. b. Cap der guten Hoffn.

Burchellii Kunth (= *Tritoma Burchellii* Sweet = *Tritomanthe Burchellii* Herb., p. 825).

odorata * (= *Tritomanthe odorata* Lodd.), wohlriechende, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

pumila Kunth (= *Aletris pumila* Ait. = *Tritoma pumila* Ker = *Tritomanthe pumila* Lk., 825 = *Veltheimia abyssinica* Redout. = *V. pumila* W.).

Kniphofia

sarmentosa Kunth (= *Aletris sarmentosa* Andr. = *Tritoma media* Ker = *Tritomanthe media* Lk., p. 825 = *Vellheimia media* Donn = *V. repens* Andr. = *V. sarmentosa* W.), wurzelrankige, 4. k. f. b. Cap der guten Hoffnung.

Knoxia L., Knoxie.

corymbosa W., p. 438 (= *exserta* DC. = *sumatrensis* Wall. = *teres* DC. = *umbellata* Banks = *Spermacoce exserta* Roxb. = *S. sumatrensis* Retz = *S. teres* Roxb.).

Kochia Roth, Kochie.

latifolia Fresen, breitblättrige, ☉. f. Arabien.

Sieversiana C. A. Mey. (= *Salsola scoparia* var. M. B. = *S. songarica* Sievers = *Suaeda Sieversiana* Pall.), Sievers's, ☉. f. Sibirien.

atriplicifolia Roth (= *dentata* W.), v. *Cycloloma platyphylla*, p. 179, II., *eriophora* Schrad., *hysso-pifolia* Roth, *muricata* Schrad., *sedoides* Schrad., v. *Echinopsilon eriophorum* etc., p. 214, II.

Koerberlinia Zuccar., (C. L. Köberlin, deutscher Botaniker), V. 1., Evonymeae-Pittosporeae.

spinosa Zuccar., dornige, ♀. k. Mexico.

Koechlea Endl., (? Köchle, deutscher Gelehrter), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

mitis Endl., unbewehrte, 4. f. b. Berg Taurus (Asien).

Koeleria P., Koelerie.

brachystachya DC. (= *avenacea* P. B. = *Avena panicata* Lk. Hort. = *Bromus cristatus* Speg. = *B. phleoides* Hort. = *Dactylis caudata* Brotero = *D. pungens* Hort. = *Festuca cristata* Hort. = *F. phalaroides* Lam. = *F. phleoides* Hort. = *Panicum astracanicum* Hort. = *Trisetum phleoides* var. *pumila* Trin.).
dactyloides Rchb. (= *Aira dactyloides* Roch.), knaulgrasähnliche, 4. f. Banat.

phleoides P. (= *aegyptiaca* Hort. Berol. = *Aira elongata* Salzm. = *Bromus trivialis* Savi = *Festuca cristata* L.). β) dactyloides Speg. (non Rchb.), (= *Bromus dactyloides* Roth = *Dactylis pungens* Hornem. = *Rostraria pubescens* Trin.).

macilenta DC. (= *tenuiflora* Salzm. = *Avena macilenta* Guss. = *Bromus Michellii* Savi = *Festuca Michellii* Kunth = *F. sicula* Presl = *Trisetum macilentum* Trin. = *Vulpia Michellii* Rchb.), v. *Avellinia Michellii*, p. 55, II.

Koelreuteria Laxm., paniculata Laxm. (= *paullinioides* L'Her. = *Sapindus chinensis* L. fil.).

Kohlrauschia prolifera Kunth, v. *Dianthus prolifer*, p. 260. — *K. Sibthorpii* Steud., v. *Tunica dianthoides*, p. 827.

Koniga RBr., Koniga.

libyca RBr. (= *Farsetia libyca* Speg. = *Lobularia libyca* Meisn. = *Lunaria libyca* Vivian. = *Octadenia libyca* RBr.), libysche, ♂. ♀. k. Nordafrika.

Hinsichtl. der übrigen s. *Ptilotrichum*.

Kopsia Blume, (Kops, niederländ. Oekonom u. Botan.), V. II., Apocynaeae.

arborea Blume, baumartige, ♀. w. Java.

fruticosa Blume (= *Cerbera fruticosa* Roxb., Ker, p. 182 = *Calpicarpum Roxburghii* G. Don).

Kopsia coerulea Dumort., *ramosa* Dumort., v. *Orobanchaceae coerulea, ramosa*.

Kosteletzky Presl, (Dr. V. F. Kosteletzky, Professor u. Director des bot. Gartens zu Prag), XVI. VIII., *Malvaceae*.

pentacarpa Ledeb. (= *Hibiscus pentacarpus* L. = *Pavonia pentacarpa* Rchb., p. 592 = *P. veneta* Spgl.), fünffrüchtige, 4. f. b. k. Friaul, Venedig, Südrufsl.

Krameria Löffl., L., *Kramerie*.

cistoidea Hook., ciströschennähnliche, ♀. t. Chili.

Krascheninikovia lutens Güldenst., v. *Diotis ceratoides*, p. 267.

Kreysigia Rchb., Endl., Kunth, (Kreysig, ehemal. k. sächs. geheim. Medicinalrath u. Leibarzt, sowie Besitzer einer reichen lebenden Pflanzensammlung, †), VI. I., *Melanthaceae (Coronariae-Asphodeleae)*.

multiflora Rchb. (= *Schelhammeria multiflora* Hort., non RBr. = *Tripladenia Cunnighamii* G. Don), vielblumige, 4. k. t. Neuholland.

Krigia Schreb., *Krigie*.

dichotoma Nutt. (= *oppositifolia* Rafin. = *tenella* Rchb. = *Hyoseris ramosissima* Bart. = *Serinia caespitosa* Rafin.), zweizinkige, ☉. f. Nordamerika.

virginica W. (= *Cynthia virginica* Beck. = *Hyoseris virginica* L.), virginische, ☉. f. Virginien.

Krockeria oligoceratos Mch., v. *Lotus edulis*, p. 478.

Kruberia leptophylla Hoff., v. *Ulospermum dichotomum*, p. 830.

Kuhnia L., *Kuhnie*.

Critonia W. (= *paniculata* Cass. = *Critonia Kuhnia* G., Mchx.), β) *corymbulosa* Walp. (= *eupatorioides* Ell. = ? *glutinosa* Ell. = *suaveolens* Fresen.).

fruticosa Vent. (= *frutescens* Hornem. = *rosmarinifolia* Balb. = *Eupatorium canescens* Ortega = *E. cubense* P. = *E. ? fruticosum* Dsf.), strauchige, ♀. w. Cuba.

linearifolia Spgl. (= *Jaumea linearis* P. = *Kleinia linearifolia* Juss.) gleichbreitblättrige, ♀. w. Süd- u. Nordam. Maximiliani Trevir., Maximilian's, 4. f. b. k. Missouri. *pyrifolia* Mart., birnblättrige, 4. k. ?

Kuhnia pinnata Walt. (= *Kunistera carolinensis* Lam.), v. *Petalostemon corymbosum*. — *Kunistera violacea* Ait., v. *Petalostemon violaceum*, p. 609.

Kumara disticha Medic., v. *Aloe plicatilis*, p. 36.

Kundmannia Scopol., *Kundmannie*, V. II., *Umbelliferae*.

sicula DC. (= *Athamanta sicula* Ucria, non L. = *Brignolia pastinacaefolia* Bertol., p. 131 = *Campderia sicula* Lagas. = *Ligusticum balearicum* L. = *Sium graecum* L. Hort. Cliff. = *S. siculum* L.), siciliani-sche, 4. f. b. k. Mittel- und Unteritalien, Corsica, Spanien, Balearen, Mauritanien.

Kunthia Deppei Hortul., *elatior* H. Berol., *xalapensis* Otto et Dietr., v. *Chamaedorea elegans*, *elatior* et *Schiedeana*, p. 186 et p. 135, II.

Kunthia cochinchinensis Dennst., v. *Garuga pinnata*, p. 346.

Kunzea Rchb., (Dr. G. Kunze, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Leipzig), XII. I., *Myrtaceae*.

capitata Rchb. (= *Metrosideros capitata* Sm. = *Melaleuca eriocephala* Sbr. = *Stenosperm. capit.* Swt.).

Kunzea

- corifolia Rchb. (= *Metrosideros corifolia* Vent. = *M. abietina* Hffg. = *Leptospermum ambiguum* Sm. = *L. punctatum* Hort. = *Stenosperm. corifolium* Swt.).
 ericaefolia Rchb. (= *Metrosideros ericaefolia* Sm. = *Stenospermum ericaefolium* * p. 787).

Schaueri Lehm., Schauer's, ⚭. ⚭. t. Neuholland.

Kunzia tridentata Spgl., v. *Purshia tridentata*, p. 668.

Kyllingia Rottb. L. fil., Kyllingie.

polyphylla W. herb. (= *monocephala* C. Smith), vielblättrige, 4. w. Westl. Afrika, Mauritius.

pulchella Kunth, hübsche, ☉. k. f. Cap d. g. Hoffn.

pumila Mchx. (= *uncinata* Sbr. herb. Trin. = *Hedychloa fragrans* Rafin.), niedrige, 4. k. Nordamerika, Westindien.

pungens Lk. (= *vaginata* Rchb. in Weigelt herb.), stechende, 4. w. Südamerika.

uncinata Lk., v. *Dichostylis pygmaea*, p. 200, II.

Kyrtanthus longiflorus Gmel. syst., v. *Posoqueria longiflora*.

Labichea Gaudich., Labichea.

cassioides Gaudich., cassienähnliche, ⚭. t. Neuholland. (Ob eingeführt?)

punctata Lindl., punktirte, ⚭. t. Neuholland (Schwanenfl.).

Labisia Lindl., Labisie, V. 1., Myrsineae.

pothoina Lindl., indische, 4. w. Penang.

Lablab Adans., (arabischer Name).

sanguineum Lem., blutfarbiger, ☉. Sch. w. Ostindien.
 b) roseum Lem.

Labourdonnaisia Boj., (Labourdonnais, ehem. Gouverneur der Insel Mauritius), XI. 1., Sapotaceae.

revoluta Boj., zurückgerollte, ⚭. w. Mauritius. (Ob kultivirt?)

Außerdem wachsen auf Mauritius noch *calophylloides* Boj. u. *glauca* Boj.

Laburnum alpinum Griseb., *vulgare* Griseb., v. *Cytisus alpinus* et *Laburnum*, p. 248.

Lacaena Lindl., Lacaena, XX. 1., Orchideae.

bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Guatemala.

Lacepedea H. B. K., (Gr. Lacepede, berühmt. franz. Naturforscher), V. 1., Hippocrateaceae.

insignis H. B. K. (= *Triceratia tinifolia* H. B. K. = *Triceros xalapensis* Spgl.), ausgezeichnete, ⚭. w. Mexico.

pinnata Schiede, gefiederte, ⚭. w. Mexico.

Lachenalia Jacq., Lachenalie.

albida Trattin. (= *angustifolia* Red., β *minor* Schult. fil.), weißliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

bicolor Lodd., zweifarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

erocaea Brot., safranfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

hyacinthoides Jacq., β) *contaminata* Ait.

lucida Ker (= *fragrans* Andr., non Jacq. = *latifolia* Tratt.).

orthopetala Jacq. (= *hyacinthoides* var. Spgl. = *ustulata* Bank's herbar.), geradkronige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

pallida Ait. (= *mediana* Jacq.).

pulchella Kunth (= *orchioides* β Lichtenst. = *pustulata* Berg. = *unicolor* Eckl., non Jacq.), hübsche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Lachenalia

purpureo-coerulea Jacq., β) foliis laevibus Ker, γ) botryoides Trattin.

pusilla Jacq. (= *reflexa* Thbg.).

pustulata Jacq. (= *reclinata* Dietr.).

β) densiflora Tratt.

tenella Schneev., zarte, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

lanceaefolia Jacq. (= *maculata* Tratt.), v. *Drimia lanceaefol.*, p. 275, *reflexa* Andr., v. *Drimia lanceolata*, p. 211, II., *serotina* W., ? *speciosa* Dietr., *viridis* W., v. *Uropetalum serotinum*, glaucum, viride, p. 831.

Lachnanthes tinctoria Ell., p. 442, (= *Anonymus tinctoria* Walt. = *Dilatris caroliniana* Lam. = *D. Heritiera* P. = *D. tinctoria* Pursh = *Gynotheca tinctoria* Swt. = *Heritiera Gmelini* Mchx. = *H. tinctoria* Bosc = *Pyrotheca tinctoria* Salisb.).

Lachnoloma Bunge, Wollsaum, XV. I., Cruciferae-Isatideae.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ☉. f. Asiatisch. Rufsland (Kisilkum).

Lachnopus Blume, Wollfufs, X. I., Lythraeae-Melastomeae.

rubro-limbatus Blume (= *Melastoma rubro-limbata* Lk. et Otto), rothsäumiger, ♀. ♀. w. Ostindien.

Lachnostoma H. B. K., Wollschlund, V. II., Asclepiadeae.

Balbisii Decsne. (= *Asclepias villosa* Balb. = *Cynanchum villosum* R. et S. = *Pherotrichis villosa* Meisn.), Balbis's, 4. t. ? Südamerika.

prostratum Decsne. (= *Gonolobus prostratus* RBr., p. 365 = *Cynanchum foetidum* L'Her. = *C. prostratum* Cav. W. = *Pherotrichis prostr.* Decsne.).

Lactuca T. L., Salat.

cracoviensis Swzky., krakauischer, ☉. f. Polen.

elongata Mühlbg. (= *procera* Schrad.), α) *longifolia* Mchx. (= *caroliniana* Walt.), β) *integrifolia* Bigel. (= *sagittifolia* Ell.), γ) *sanguinea* Bigel. (= *hirsuta* Bigel. = *Galathenium floridanum* et *sanguineum* Nutt.).

erysimifolia DC. (= *Prenanthes erysimifol.* W. = *P. muralis* L. var. Spr. Stev.), hederichblättriger, ☉. f. Iberien, Taurien.

Fischeriana DC. (= *Prenanthes graminea* Fisch.), Fischer's, 4. f. Sibirien.

hastata DC. (= *Chondrilla hastata* Wall.), spontonblättriger, ☉. f. Nepal.

Heyneana DC. (= *runcinata* DC. = *Chondrilla indica* Steud. = *C. racemosa* Poir. = *Prenanthes racemosa* Roxb. = *P. sonchifolia* W. = *Sonchus calyculatus* Roxb.), Heyne's, ☉. ♂. f. m. Ostindien.

murorum C. Bauh. (= *muralis* Mey., DC. = *Chondrilla muralis* Lam. = *Cicerbita muralis* Wallr. = *Mycelis muralis* Rchb. (*angulosa* Cass.) = *Prenanthes muralis* L.).

petraea Fisch. et Mey., Felsen-L., 4. f. Caucasus.

pulchella DC. (= *integrifolia* Nutt., non Bigel. = *oblongifolia* Nutt. = *Agathyrsus pulchellus* Don = *Mulgedium pulchellum* G. Don = *Sonchus pulchellus* Pursh), schöner, 4. f. Nordamerika.

sativa L., ϵ) *constantinopolitana* Hort., ζ) *romana* Hort.

Lactuca

undulata Ledeb., wellenförmiger, ☉. f. Alt. Sibirien.
 virosa L., β) maculata Hornem., γ) ambigua Schrad.

Wilhelmsiana Fisch. et Mey., Wilhelm's, 4. f. b. Persien ¹⁾).

acuminata Spgl., floridana G., tatarica Mey., v.
 Mulgedium acuminatum, floridanum et tataricum,
 p. 532, intybacea Jacq., v. Brachyramphus intyba-
 ceus, p. 76, II., prenanthoides Scopol. (= chon-
 drilloides Auct.), v. Chondrilla prenanthoides.

Ladanium cyprium Spach, laurifolium Spach, offi-
 cinarum Spach, v. Cistus cyprius, laurifolius, la-
 daniferus.

Laelia Adans., Desv., Laelie, XV. 1., Cruciferae.

orientalis Desv. (= *Bunias orientalis* L., p. 138 =

B. berennis Mch. = *B. Winterli* Schult. = *Mya-
 grum taraxacifolium* Lam. = *Rapistrum glandulosum*

Berger), morgenländische, 4. f. Osteuropa, Sibirien.
 cochlearioides P., vergl. Calepina Corvini, p. 147
 und *Bunias cochlearioides*, p. 82, II.

Laelia Lindl., acuminata H. belg., albida Lindl. etc.,
 v. *Amalia acuminata* etc., p. 29, II.

Lafoensia Vandel., (Lafoens, portugiesisch. Gelehrter),
 XII. 1., Lythriariae.

speciosa DC. (= *Calypsectus speciosus* H. B. K.),
 prächtige, ♀. w. Neugranada.

Vandelliana DC. (= ? *aromatica* Hort. belg. = *illu-
 stris* Arrab.), Vandelli's, ♀. w. Brasilien.

Lagenaria Sering., Flaschenkürbis.

hispida Sering. (= *Cucurbita hispida* Spgl.), steifhaariger,
 ☉. Sch, m. f. ? Japan.

vulgaris Sering. Var., latior Hort., longa Hort., pyro-
 techta Hort.

Lagenophora Cass., Flaschenträger.

Billardieri Cass. (= *Bellis stipitata* Spgl. = *Calen-
 dula stipitata* LaBill.), Billardiere's, 4. t. Neuholl.

Forsteri DC. (= *Calendula pumila* Forst. = *Micro-
 calia australis* Rich.).

Lagerstroemia L., Lagerstroemie.

indica L. (= *chinensis* Lam.), b) rosea Lodd. (= ? *ele-
 gans* Hort.).

Münchhausia W. (= *speciosa* P. = *major* Retz =
Münchhausia speciosa L.).

venusta Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

Lagochilus Bunge, Fadenlippe, XIV. 1., Labiatae.

Bungei Benth. (= *diacanthophyllus* Bunge), Bunge's,
 4. ♀. f. Sibirien

diacanthophyllus Schrenk et C. A. Mey. (= *Moluccella
 diacanthophylla* Pall.), zweistacheligblättrige, 4. f.
 Bucharei.

platycalyx Fisch. et Mey., breitkelchige, 4. f. Soongaria.

pungens Fisch., Mey. et Lalle. (= *Bungei* β *minor*
 Schrenk), stechende, 4. f. Asiat. Rußland.

Lagoseris MB., Less., Flügel(Feder)pippau.

bifida K. (= *Pterotheca bifida* F. et Mey. = *P. ne-
 mausensis* Rehb., non Cass. = *Trichocrepis bifida*
 Visian.).

1) D. C. H. Schultz Bipont, zieht als Unterabtheilungen zu
Lactuca noch die Gattungen *Microrhynchus* Less. u. *Phoenixopus*
 Cass. s. diese.

Lagoseris

Rüppelii C. H. Schultz Bipont. (= *Plerotheca Rüppelii* Steud. = *Trichocrepis Rüppelii* Sch. Bipont.),
Rüppel's, ☉. f. Arabien.

Lagunaria DC., G. Don, Lagunarie, XV. VIII., Malvaceae.

cuneiformis G. Don (= *Hibiscus cuneiformis* DC., p. 395).

lilacinus G. Don (= *H. lilacinus* Lindl., p. 396).

Patersonii G. Don (= *H. Patersonius* Ait., p. 396).

Lalage Lindl. (eine von Horaz besungene Dame).

grandiflora v. Houtte, großblumige, ♀. t. Neuholland.

hoveaefolia Benth., hoveablätterige, ♀. t. Neuholland.

In den Verzeichnissen der belgischen Gärten wird auch eine *L. tenuifolia* u. *thymifolia* aufgeführt.

Lambertia Sm., Lambertie.

Hügelii Hook., Hügel's, ♀. t. Neuholland.

ilicifolia Hook., stechhülsenblätterige, ♀. t. Neuholland.

multiflora Lindl., vielblumige, ♀. t. Neuholland.

ovalifolia Camer. (= ? *oleaefolia* H. belg.).

Lamium T., Bienensaug (Taubnessel).

bifidum Cyrill., β) cryptanthum Guss. (= *clandestinum* Auct.).

flexuosum Tenore (= *Petitinum* Gay.).

garganicum L. (= ? *Michelianum* Tausch).

hirsutum Lam. (= *grandiflorum* Pourr. = *stonoliferum* Lapeyr.).

hirtum Poir., rauher, 4. f. ?

incisum W. (= *Coesfeldiae* Boenningh. = *urticaefolium* Weihe = *purpureum* β Lam., Sm.).

intermedium Fr. (= *molucaellaefolium* Fr.).

longiflorum Tenor. (= *laevigatum* DC. = *pedemontanum* Rchb.).

maculatum L. (= ? *melissaefolium* Mill. = *mutabile* Dumort. = *vulgatum* Benth.), b) albiflorum (= *niveum* Schrad.).

micranthum Weinm., kleinblumiger, ☉. f. Brasilien.

parietariaefolium Benth. (= *molle* Hort.), glaskrautblätteriger, 4. f. ?

tomentosum W. (= *Columnae* Tenore).

Galeobdolon Crtz., Hoffm., v. *Galeobdolon luteum*.

Lamyra lobata Cass., *stipulacea* Cass., *triacantha*

Cass. etc., v. *Chamaepeuce afra*, *stellata*, *Casabonae* etc., p. 186 et 187.

Lancasteria Lindl., Lancasterie, XIV. II., Acanthaceae.

parviflora Lindl., kleinblumige, ♀. w. ? Ostindien.

Lancisia bipinnata P., v. *Lasiospermum radiatum*, p. 447, *L. lobata* Lam., *pectinata* Thbg., v. *Lidbeckia lobata* et *pectinata*, p. 461, *L. anthemoides*

Mch., v. *Cotula anthemoides*.

Landia Commers., Domb., *astrographa* Commers. (= *stelligera* Commers.) et *lappacea* Dombey, v. *Mussaenda arcuata* et *Landia*, p. 535.

Lanipila capensis Burch., v. *Lasiospermum radiatum*, p. 447.

Lansium domesticum Correa (non Blume), v. *Cookia punctata*, p. 217.

Lantana L., Lantane.

albo-purpurea Dsf., weißspurpurfarbige, ♀. t. w. ?

amethystina Otto et Dietr. (= *nivea* var. *mutabilis* Hook.), amethystfarbige, ♀. w. ?

Lantana

- cinerea Lam., aschfarbige, f. w. ?
 crenulata Otto et Dietr. (= ? *coccinea* Lodd.), gekerbte,
 f. w. ? Südamerika.
 Geroldiana Otto et Dietr., Gerold's, f. m. t. w. Mexico.
 inconspicua Tausch, unansehnliche, f. w. t. ?
 inermis Mill., unbewehrte, f. w. Jamaika.
 involucrata L. (= *lanuginosa* Mill.).
 lamiifolia Otto et Dietr. (= ? *hirta* Grah.), bienensaug-
 blätterige, f. t. w. Mexico.
 latifolia Tausch, breitblätterige, f. w. ?
 lilacina Dsf., lilafarbige, f. w. Brasilien.
 Moritziana Otto et Dietr., Moritz's, f. w. Caracas.
 multiflora Otto et Dietr., vielblumige, f. w. ? Westindien.
 nivea Vent. (= *leucantha* Hort. = *lactea* Hort.), β)
 niveo-Camara Hort.
 odorata L. (= *suaveolens* Dsf.).
 parvifolia Dsf., kleinblätterige, f. w. ?
 salyiaefolia Jacq. (= *violacea* Dsf.)
 scabrida Ait. (= *crocea* Jacq.).
 Sellowiana Lk. et Otto (= *longifolia* Hook.).
 stricta Sw. (= *angustifolia* Mill. = *suaveolens* Poir.).
 teucrifolia Otto et Dietr., gamanderblätterige, f. t. w.
 Mexico.
 undulata Schrank, wellenblätterige, f. w. Brasilien.
 urticaefolia Mill., nesselblätterige, f. w. Vera Cruz.
 variegata Otto et Dietr., bunte, f. w. ?
 ? Gartenhybriden: *aurantiaca*, *superba*, (= *Youngii* Hort.).
abyssinica A. Dietr., *achyranthifolia* Dsf., v. *Lippia*
Schimperi et *purpurea*.

Lapeyrousia Pourr., Ker, Lapeyrousie.

- juncea Ker (= *Ixia Gawleri* Schrad. = *Gladiolus*
amabilis Salisb. = *Meristostigma junceum* Steud.),
 sinnsenförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
juncea Pourr. (= *marmorata* Pourr.), *speciosa* Hort.,
 v. *Anomatheca juncea* et *cruenta*, p. 61.
Laplacea inaequilatera Schott. (= *semiserrata* St.
 Hil. = ? *lanceolata* Hort.), v. *Gordonia semiser-*
rata, p. 272¹⁾.

Lappa T., Klette.

- macrosperma Wallr., grosssamige, 4. f. Deutschland.
 tenella Fisch. et Mey., zarte, ♂. f. Persien.

Lar breia St. Hil., (Delarbre, franz. Botaniker), X. III.,
Caryophyllaceae-Alsineae.

- aquatica St. Hil. (= *uliginosa* Rchb. = *Stellaria Al-*
sine Reich., Hoffm. = *St. Dilleniana* Leers = *St.*
fontana Wulf. = *St. hypericifolia* Wigg. = *St. la-*
teriflora Krock. = *St. graminea* γ L. = *St. uligi-*
nosa Murr.), Wasserliebende, 4. f. Europa.
 β) *bracteata* Rchb. (= *Stellaria bracteata* Richt.).
crassifolia Rchb. (= *Stellaria crassifolia* Ehr. = *di-*
chotoma Web.), β) *helodes* (M. B.).
glaucua Godr. (= *Stellaria glaucua* Wither. = *St. gra-*
minea β L. = *St. palustris* Retz), β) *Dilleniana*
 Mch., Roth, Rch.
graminea Godr. (= *Stellaria graminea* L. = *arven-*
sis Hoffm.).

1) In L. J. Makoy Extrait du Catalogue des plantes wird
 eine L. Makoyi erwähnt, deren Vaterland etc. mir unbekannt ist.

Larbrea

media Godr. (= *Stellaria media* Vill. = *Alsine media* L. etc.), β) latifolia (DC.) (= *St. neglecta* Weihe), γ) brachypetala (Opitz), mittlere, ☉. f. Europa etc.
Vergl. p. 786.

aquatica Sering., v. *Stellaria pentagyna*.

Laserpitium T., Laserkraut.

aquilegifolium Murray (non Jacq.), (= *alpinum* W. K. = *carniolicum* Bernh. = *trilobum* Crantz, non L. = *Angelica triloba* Dsf. = *Siler alpinum* Baumg. = *S. trilobum* Scop., non Crantz), ackeleiblätteriges, 4. f. Oestreich, Ungarn, Frankreich.

gallicum T., L. (= *angustifolium* L. = *angustissimum* W. = *cuneatum* Mch. = *formosum* W. = *trifurcatum* Lam.).

gummiferum Dsf. (= *polygamum* Lam. = *thapsiaeforme* Brotero = *Thapsia gummifera* Spgl.), Gummigebendes, 4. f. b. k. Portugal, Spanien.

hispidum MB. (= *Archangelica* Hortul., non Jacq. = *pilosum* W. = *nitidum* DC. H. Genev. = *Caucalis hispida* Dsf. H. Par.), steifhaariges, 4. f. Taurien, Caucasus.

laxiflorum Fisch., lockerblumiges, 4. f. Sibirien.

nitidum Zanted. (= *hirtellum* Gaud. = *pilosum* Comollo), glänzendes, ♂. 4. f. Tyrol, Schweiz, Oberital.

peucedanoides L. (= *angustifolium* Scopol.), β) uliginosum (= *Selinum uliginosum* Lk.).

pratense Ledeb., Wiesen-L., 4. f. Sibirien.

Siler L. (= *montanum* Lam. = *trifoliatum* Sieb. = *Siler lancifolium* Mch. = *S. montanum* Crantz). β) ? *lineatum* Tausch.

Stevani Fisch. et Mey., Steven's, 4. f. Caucasus.

caucasicum MB., v. *Cnidium carvifolium*, p. 150, II. *Chironium* L., v. *Opopanax Chironium*, p. 562, *dahuricum* Jacq., v. *Cnidium dahuricum*, *daucoides* Dsf., v. *Daucus laserpitiioides*, *ferulaceum* et *thapsioides* Dsf., v. *Prangos ferulacea* et *thapsioides*, *meifolium* Vent., v. *Lophosciadium meifolium*, *meoides* Dsf., v. *Elaeoselinum meoides*, p. 218, II., *siliaifolium* Jacq., v. *Cnidium apioides*, *simplex* L. (= *lucidum* Ait.), v. *Gaya simplex*, *trilobum* L. (= *aquilegifoliua* Jacq.), v. *Siler trilobum*.

Lasia Lour., Lasie, XXI. ix., Aroideae.

heterophylla Schott (= ? *Dracontium spinosum* L. = *Pothos heterophylla* Roxb.), verschiedenblättrige, 4. f. w. Bengalen, ? Ceylon.

Loureirii Schott (= *aculeata* Lour. = *Pothos Lasia* Roxb.), Lourreiro's, 4. w. Ostindien.

Lasiagrostis Lk., Haargras, III. II, Gramineae.

Calamagrostis Lk. (= *Achnatherum argenteum* P. B. = *Agrostis Calamagrostis* L. = *A. stipata* Koel. = *A. speciosa* Auct. = *Arundo speciosa* Schrad. = *Calamagrostis argentea* DC. = *C. speciosa* Host = *Stipa Calamagrostis* Wahlbg. = *Streptachne Calamagrostis* Dumort.), rohrähnliches, 4. f. Südeuropäische Alpen.

Lasiandra DC., Haarfaden, X. I., Lythriariae - Melastomeae.

adenostemon DC. (= *Meriania adenostemon* Schrank), drüsiger, f. w. Brasilien.

argentea DC. (= *Melastoma argentea* Desv. = *M. cla-*

Lasiandra

vata P. = *Pleroma holosericeum* Don = *Rhexia holosericea* Bonpl.), silberfarbiger, ⚥. ⚥. w. Brasilien.
coerulea Rehb. (= *Melastoma coerulea* Hort. = *Pleroma vimineum* Don, p. 635 = *Rhexia viminea* Speg., Bot. reg.), blauer, ⚥. ⚥. w. Brasilien.

Fothergillae Chamiss. (= *Rhexia Fothergillae* Schrk., Mart.), Fothergill's, ⚥. ⚥. w. Brasilien.

macrochiton DC. (= *Rhexia macrochiton* DC.), großkelchiger, ⚥. ⚥. w. Brasilien.

oxypetala DC. (= *Pleroma oxypetala* Don), schmalkroniger, ⚥. ⚥. w. Peru.

petiolata Grah., gestielter, ⚥. ⚥. w. Brasilien.

quadrangularis Makoy, vierkantiger, ⚥. ⚥. w. Südamerika.

Benthamiana H. Angl., *Fontanesiana* DC., v. *Pleroma Benthamianum* et *Fontesianum*.

Lasiopetalum Sm., Haarblume.

cordifolium Endl., herzblättrige, ⚥. t. Neuholland.

corylifolium H. Kew., haselnußblättrige, ⚥. t. Neuholl.

dasyphyllum Sieber, haarblättrige, ⚥. t. Neuholland.

discolor Hook., verschiedenfarbige, ⚥. t. Neuholland.

Van Houtte erwähnt noch *argenteum*, *pulchellum*, *uniflorum*, vergl. dessen Etablissement horticole.

dumosum Hort., *macrocarpum* Hort., v. *Thomasia dumosa* et *macrocarpa*.

Lasiopogon Cass., DC., Wollbart, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

muscoides DC. (= *lanatum* Cass. = *Gnaphalium muscoides* Dsf.), moosähnlicher, ☉. f. Nordafrika.

Lasiopus sonchoides D. Don, v. *Dubyaea sonchoides*, p. 212.

Lasiorrhiza cinerea Don, Less., *rosea* Poepp. etc., v. *Chabraea cinerea* etc., p. 134.

Lasiospermum Lagasca, Haarsame.

chrithmifolium G. Don (= *Santolina chrithmifolia* Hornem.), meerfenchelblättriger, 4. f. b. k. Macedonien.

pedunculare Lagasca (= *alpinum* Rehb. = *eriospermum* G. Don = *Eriocarpa peduncularis* Lagasca).

Lasthenia Bridgesii Steud. et *obtusifolia* Cass., v. *Rancagua Bridgesii* et Feuillei.

Latania Commers., Bourbonpalme.

Commersonii L., Mart. (= *rubra* Jacq. = *Cleophora lontaroides* G.), Commerson's, ⚥. ⚥. w. Mascarenas.

Loddigesii Mart. (= *Cleophora dendriformis* Lodd.), Loddiges's, ⚥. w. Westafrika, Madagascar.

Lathyrus T., L., Platterbse.

alatus Sib., Sm., geflügelte, ☉. Sch. f. Kleinasien.

americanus Mill., amerikanische, ☉. Sch. f. Vera Crux.

articulatus L. (= *hispanicus* Mill. = *speciosus* Hort.).

azureus Hort., azurblaue, ☉. Sch. f. ?

chilensis Steud. (= *sessilifolius* Hook., non Tenore), chilesische, 4 Sch. k. Chili.

crassipes Gill., Hook., dickstielige, ☉. Sch. f. Bonaria.

diversifolius Presl, verschiedenblättrige, ☉. Sch. f. Sicilien.

dubius Tenore, zweifelhafte, ☉. Sch. f. Neapel.

Engelmanni Bisch., Engelmann's, ☉. Sch. f. Nordamerika (Arkansas).

Gorgoni Parlat., Gorgoni's, ☉. Sch. f. Süditalien.

grandiflorus Sibth., Sm. (= *brutius* Tenore = *Pisum biflorum* Rafin.).

Lathyrus

- Hallersteinii Baumg., Hallerstein's, 4. Sch. f. Siebenbürgeu, Banat.
 inconspicuus L. (= *axillaris* Lam. = *micranthus* Loisel. = *stans* Vivian.).
 lusitanicus Mart., portugiesische, ☉. Sch. f. Spanien.
 maritimus Bigel. (= *californicus* Dougl. = *pisiformis* Hook. = *venosus* Swt. = *Pisum maritimum* L.), Meerstrand's-P., Europa, Sibirien, Nordamerika.
 mexicanus Wender., mexicanische, ☉. Sch. f. Mexico.
 nervosus Lam., Bot. mag., nervige, 4. Sch. t. Südamer.
 odoratus L., c) *purpureus* [Sicilia], d) *roseus* [Ceylon].
 parisiensis Mill., parisische, ☉. Sch. f. Frankreich.
 pubescens Hook. Arn. (= ? *acutifolius* Vogel), weichhaarige, 4. Sch. k. f. b. Buenos Ayres.
 quadrimarginatus Bory et Chaub. (= *sativus* Sibth., Sm.), vierränderige, ☉. Sch. f. Griechenland.
 sativus L., β) *semimaculatus* Hort., γ) *semipunctatus* Hort.
 sessilifolius Tenor. (non Hook.), (= *attenuatus* Tenore), stiellosblättrige, 4. Kn. Sch. f. Neapel.
 sículus Steud. (= *purpureus* Presl, non Dsf.), siciianische, ☉. Sch. f. Sicilien.
 Unbestimmtere: Langii H. Prag., *lutescens* Hort., *sinensis* Mart. ☉.

canescens E. Mey., *oroboides* E. Mey. etc., v. *Orobis canescens*, *lathyroides* etc., *bithynicus* Lam. (= *tumidus* W. = *turgidus* Lam.), = *Vicia bithynica*.

Laugeria hirsuta R. et P. etc., v. *Guettarda hirsuta* etc., *L. tomentosa* Sw., v. *Stenostomum tomentosum*.

Laurentia Neck., DC., *Michelii* DC., *micrantha* DC., *minuta* DC., *tenella* DC., v. *Lobelia*, Sect. V., p. 471.

Laurus T., N. E., Lorbeer.

Canella Arrab., *Canella-L.*, ꝑ. w. Brasilien.

rotundifolia Wall., rundblättriger, ꝑ. t. w. China, Ostindien.

aestivalis Wangenh. (= *Benzoin* W. et Hort.), *Benzoin* L. (= *Pseudo-Benzoin* Mchx.), *Diospyros* Pursh, v. *Benzoin aestivale* etc., p. 65, II., *albiflora* Wall, *Borbonia* L., *indica* L. etc, v. *Persea carolinensis* etc., *Camphora* L., *chinensis* H. Berol., *gracilis* H. Berol., v. *Camphora officinarum*, *chinensis* etc., p. 114, II., *Cassia* Auct., *Cinnamomum* L. etc., v. *Cinnamomum aromaticum*, *zeylanicum* etc., p. 144 et 145, II., *Catesbyana* Mch., v. *Gymnobalanus Catesbyanus*, p. 277, II., *Chloroxylon* L., v. *Ceanothus Chloroxylon* Nachl., *cinnamomoides* H. Berol. (= *Burmanni* N. E. = *dubia* Roxb.), v. *Cinnamomum dulce* Nachl., *coriacea* Sw., *foetens* Ait. etc., v. *Oreodaphne coriacea foetens* etc., *crassifolia* Rich. Poir., v. *Ocotea puberula*, *geniculata* Walt., Mchx. etc., v. *Tetranthera geniculata* etc., *glauca* Thbg., v. *Litsaea glauca*, *glauca* H. Wircb. (= *gracilis* H. Dresd.) etc., v. *Daphnidium gracile* etc., p. 191, II., *glandulifera* Wall.; v. *Camphora glandulifera* Nachl., *gracilis* Hort., v. *Camphora officin.* β, p. 114, II., *macrophylla* Wall. (= *Taveira* H. Makoy.), v. *Cinnamomum obtusifolium*, p. 144, II., *nutans* Hornem., v. *Oreodaphne*

Laurus

cernua, *pendula* Sw., *thyrsiflora* Poir., v. *Hufelandia pendula et thyrsiflora*, p. 207, II., *papyrifera* Hort. = ?, *salicifolia* Sw., v. *Aydendron salicifolium*, p. 55, II., *Sassafras* L. etc., v. *Sassafras officinale* etc., *Tinus* Hort., v. *Viburnum Tinus*. — L. Tawai Hort. Makoy. Ob zur Gattung *Cinnamomum* gehörig?

Lavandula L., Lavendel.

abrotanoides L. (= *canariensis* Mill. = *elegans* Dsf.).
dentata L. (= ? *serratifolia* Hort.).

hybrida W. (ex L. *Spica* L. et *pinnata* L.), (= *heterophylla* Poir., H. Par., non Viv.), Bastard-L., ♀. k. ?

ovata Steud. (= *latifolia* Dsf. h. Par., non Ehrh.), eiförmiger, ♀. f. ?

pedunculata Cavan. (= *Stoechas* β Lam. W. = *Stoechas pedunculata* Mill.), gestielter, ♀. k. Spanien, Portugal, Madeira.

pinnata L., β) *formosa* Dietr. (= β *pubescens* Benth.).

pubescens Decaisn., weichhaariger, 4. ♀. k. Berg Sinai.

Stoechas L., β) *macrostachya* Ging. (= *Pseudostoechas* Rchb.).

stricta Delil. (= *coronopifolia* Poir. = *multiflida* Burm.), steifer, ♀. k. Aegypten.

Lavatera T., Lavatere.

crispa H. Berol., krause, ☉. f. Peru.

maritima Gouan (= *hispanica* Mill.).

mollis Ehrbg., weiche, ☉. f. Aegypten.

phoenicea Vent. (= *coccinea* Dietr.).

septemloba Hffg. (= *lusitanica* Hort., ? non L.), siebenlappige, ♀. k. ? Portugal.

subovata DC., fasteiförmige, ♀. k. Mauritanien.

unguiculata Dsf. (= *tomentosa* Dum.Cours.).

Lavauxia centaurifolia Spach, *cuspidata* Spach, *mutica* Spach, *Nuttalliana* Spach (= *triloba* Spach),

v. *Oenothera centaurifolia*, *cuspidata*, *acaulis*, *triloba*.

Lavoisiera DC., (Lavoisier, berühmter franz. Chemiker, †), X. 1., Lythrarie-Melastomeae.

alba DC. (= *Rhexia alba* Schrk., Mart.), weißse, ♀. w. Brasilien.

imbricata DC. (= *Rhexia imbricata* Thbg. = *R. blepharocentra*, *ciliata* et *floribunda* Mart. herb.), ziegeldachförmige, ♀. w. Brasilien.

β) *cataphracta* DC. (= *Rhexia cataphracta* Schrk., Mart.).

pulcherrima DC. (= *Rhexia pulcherrima* Schrk., Mart.), schönste, ♀. w. Brasilien.

Lavrada Velloz., Lavradie.

elegantissima St. Hil. (= *Sauvagesia elegantissima* St. Hil.), zierlichste, ♀. w. Brasilien.

montana Mart. (= *glandulosa* St. Hil., p. 450).

Lawrencella Lindl., Laurencelle, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

rosea Lindl., rosafarbige, ☉. t. m. f. Neuholland.

Lawsonia L., Lawsonie.

alba Lam. (= *Alcanna spinosa* G.), weißse, ♀. w. Ostindien, Arabien, Aegypten.

α) *inermis* L., β) *spinosa* L.

purpurea Lam., v. *Wendlandia Lawsoniae*.

Laxmannia RBr., Laxmannie.

grandiflora Lindl., grofsblumige, 4. k. t. Neuholland.
minor RBr., *ramosa* Lindl., *sessilis* Lindl., *squarrosa*
 Lindl., scheinen noch nicht eingeführt.

Laxmannia potentilloides Fisch., v. *Coluria potentilloides*, *L. fasciculata* S. G. Gmel., v. *Crucianella stylosa*.

Lazarolus Aria Borckh. etc., v. *Sorbus Aria* etc., *oxyacanthoides* Borckh., v. *Crataegus Azarolus*, *pollivilleriana* Borckh. v. *Pyrus Bollwylleria*.

Leachia crassifolia Cass., *trifoliata* Cass., v. *Coreopsis auriculata et lanceolata*.

Leandra Raddi, DC., Leandra, X. 1., Lythrarie-Melastomaceae.

sericea DC. (= *Raddii* Mart. = *Osbeckia brasiliensis* Schrk.), seidenhaarige, ♀. w. Brasilien.

Lebeckia Thbg., Lebeckie.

nuda Ker (= ? *aphylla* Thbg. = ? *subnuda* DC. = *Indigofera nuda* G. Don), nackte, ♀. k. t. Cap d. g. H.
pungens Thbg. (= ? *subnuda* DC. = *Acanthobotrya pungens* Eckl., Zeyh. = *Genista cuspidata* DC. = *Stiza erioloba* E. Mey.), stechende, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

subternata Lk., v. *Cyclopia latifolia*.

Lebretonia Schrk., N. E. et Mart., Lebretonia.

semiserrata DC. (= *Pavonia semiserrata* Steud. = *Schouwia semiserrata* Schrad.), halbsägezähnlige, ♀. w. Brasilien.

Lecanocarpus cauliflorus N. E. (= *nepalensis* D. Don, Fisch.) v. *Acroglochin chenopodioides*, p. 16.

Lechea L., Lechea.

Drummondii Spach, Drummond's, ♀. k. Texas, Florida.
verticillata W., v. *Bergia trimera*, p. 65, II.

Lechenaultia RBr., Lechenaultie.

biloba Lindl. (= *coelestis* Hort.), zweilippige, ♀. t. Neuholland (Schwanenfl.).

β) *major* Hort.

Drummondii Lindl. (= *violacea* H. Cels.), Drummond's, ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

grandiflora Lindl., DC., grofsblumige, ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

Aufserdem wachsen in Neuholland noch folgende: *expansa* RBr., *filiformis* RBr., *glauca* Lindl., *laricina* Lindl., *linarioides* DC., *tubiflora* RBr., sämmtlich ♀. Ob von diesen welche in den Gärten eingeführt worden, ist mir nicht bekannt.

Lecythis Löffl., Deckelmyrte.

Ollaria L., topfförmige (Topfbaum), ♀. w. Cumana, Brasil.
bracteata W., v. *Couroupita guianensis*, p. 164, II.

Ledocarpum Dsf., Juss., Cistfrucht.

chilense Dsf., Juss. (= *argenteum* Presl = *Balbisia verticillata* Cav. = *Oenothera scoparia* R. et P.), chilesische, ♀. t. Chili.

pedunculare Lindl. (= *cistiflorum* Meyen = *Balbisia peduncularis* D. Don, p. 110 = *Cruikshanksia cistiflora* Hook.).

Ledonia heterophylla Spach, *hirsuta* Spach, *peduncularis* Spach, *populifolia* Spach, v. *Cistus heterophyllus*, *hirsutus*, *salvifolius et populifolius*, p. 200 et 201.

- Ledum** L., canadense Lodd. (= *rosmarinifolium* Hffg.).
- Lehmannia** Spgl., (Dr. J. G. C. Lehmann, Professor der Botanik etc. zu Hamburg), V. 1., Solanaceae.
 tomentosa Spgl. (= *Nicotiana tomentosa* R. et P.), filzige, f. t. Peru.
Lehmannia ocymoides Jacq., v. *Moschosina ocymoides*, p. 532.
- Leianthus** Griseb., Glattblume, V. 1., Gentianeae.
 cordifolius Griseb. (= *Lisianthus cordifolius* L., p. 469 = *Tachia cordifolia* Mart., G. Don).
 exsertus Griseb. (= *Lisianthus exsertus* Sw., p. 469).
 longifolius Griseb. (= *Lisianthus longifolius* L., p. 466 = *L. erectus* Hort. = *Tachia longifolia* Mart., G. Don).
 exaltatus Lam. (= *glaucifolius* Jacq.), *glaucifolius* Nutt., non Jacq. (= *Russelianus* Hook.), v. *Eustoma exaltatum* et *Russelianum*, p. 239, II., *nigrescens* Griseb. et *saponarioides* Griseb., v. *Petasostylis nigrescens* et *saponarioides*.
Leimanthium hybridum R. et S., *virginicum* W., v. *Zygadenus hybridus* et *virginicus*, *sibiricum* L., v. *Anticlea sibirica*, p. 40, II., — *laetum* W. (= *pallidum* W.), v. *Amiantanthus Muscaetoxicum* Nachl.
- Leiophyllum** P., Quendelblatt, p. 452.
 Lyonii Swt. (= *prostratum* Loud. = *Ammyrsine Lyonii* Swt.).
 serpyllifolium DC. (= *Ledum serpyllifolium* L'Her.), ächtes, f. f. Nordamerika.
 thymifolium P. (= *buxifolium* Ell. = *Ammyrsine buxifolia* Pursh).
Leiospermum parviflorum D. Don, *racemosum* D. Don, *speciosum* Hort., v. *Weinmannia parviflora* etc.
Lembotropis nigricans Griseb., v. *Cytisus nigricans*.
Lemna gibba L., v. *Telmatophace gibba*, *polyrrhiza* L., v. *Spirodella polyrrhiza*.
- Lemonia** Lindl. (non Pourr.), Lemonie, V. 1, Tricoccae-Rutaceae-Diosmeae.
 rosea Lindl., rosafarbige, f. w. Antillen.
 spectabilis Lindl., ansehnliche, f. w. Antillen.
- Lennéa** Lk., Kl, Otto, (Lenné, k. preuss. Gartendirector), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 robinoides Lk., Kl., Otto, (= *Calomorphe Ehrenbergiana* Kunze), robinienähnliche, f. t. Mexico.
 ? *superba* v. Houtte, stolze, f. w. ?
Lens esculenta Mch. (= *sativa* Hell.), v. *Ervum Lens*.
- Leochilus** Knwl. et Westc. ¹⁾, Löwenlippe, XX. 1., Orchideae.
 oncidoides Knwl et Westc. (= *Oncidium macrantherum* Hook.), oncidiumähnliche, 4. w. Mexico.
- Leonotis** RBr., Löwenohr.
 Raineriana Visian., Rainer's, 4. k. Nordafrika.
Leontice altaica Pall. (= *Olivieri* Steud.), *Chryso-gonum* L., v. *Bongardia Olivieri* et *Rauwolfii*, p. 73, II. et p. 127.
- Leontodon** Juss., Löwenzahn.
 annuum DC. (= *asperum* Forsk., non Rehb.), jähriger, ©. f. Aegypten.
 Berinii Rehb. (= *Apargia arenaria* Moretti = *A. Berinii* Jan, Bartl, = *A. canescens* Sieb.).

1) Richtiger *Leontochilus*.

Leontodon

biscutellaefolium DC. (= *Andryala lanata* Habl. = *Apargia crispa* var. *macrorrhiza* Tenore = *A. hispanica* MB., non W.), brillenschotenblättriger, 4. f. Italien, Taurien.

crispum Vill., β) saxatile Rchb. (= *Apargia saxatilis* Tenore = *A. tergestina* Hoppe).

hispidum L. (= *Apargia hispida* Hoffm. = *Hedypnois hispida* Sm.), β) sudeticum (Lk.), γ) ericetorum (Klett et Richt.).

squamosum Lam. (= *Apargia alpina* W. = *A. pyrenaica* Suter = *Hedypnois pyrenaica* Vill. = *Picris saxatilis* All.), β) crepidiformis Lam. (= *Gouani* Schlchr.).

asperrimum Endl., v. *Asterothrix asperrima* p. 100.

Leontonix Cass., Löwenschüppchen.

spathulatus Less. (= *Gnaphalium spadicum* Lam. = *G. spathulatum* Thbg.), spatelförmiges, $\frac{1}{2}$. k. t. Cap der guten Hoffn.

declinatus * *modestus* * v. *Helichrysum declinatum* et *Helipterum gnaphalodes*.

Leontopodium P., RBr., Löwenpfötchen (Edelweifs).

sibiricum Cass. (= *Filago leontopodioides* W. = *Gnaphalium leontopodioides* W.), sibirisches, 4. f. Daurien, Mongolei.

Leonurus L., Löwenschwanz (Wolfstrapp).

canescens Steud. (= *Panzeria canescens* Bunge), grauliche, $\frac{1}{2}$. f. Altaisches Sibirien.

Cardiaca L. (= *campestris* Andrzy. = *illyricus* Hornem. = *Cardiaca vulgaris* Mch.).

β) villosus Dsf. (= *canescens* Dumort. = *condensatus* Hornem. = *lacerus* Lindl. = *neglectus* Schrk.), γ) capitatus Wender., δ) crispus Murray (= *Cardiaca crispa* Mch.).

glaucescens Bunge, Ledeb., blaugrünlicher, 4. f. Altaisches Sibirien.

lanatus Spgl. (= *Ballota lanata* L. = *Panzeria lanata* P., p. 585 = *P. tomentosa* Mch.).

Marrubiastrum L. (= *Chaiturus leonuroides* W. = *C. Marrub.* Ehrh. = *Cardiaca Marrub.* Schreb.).

sibiricus L. (= *altissimus* Bunge = *heterophyllus* Swt. = *nepalensis* Fresen. = *occidentalis* Colla = *Panzeria multifida* Mch. = *P. sibirica* Hort.).

tataricus L. (= *altaicus* Spgl. = *Panzeria tatarica* Hort. = *P. tripartita* Mch.).

Leopoldia reticulata Herb., *striatifolia* Herb., v. *Amaryllis reticulata* et *principis*.

Lepachis pinnatifida Rafin., v. *Rudbeckia pinnata*.

Lepanthes Sw., Rindenstendel.

sanguinea Hook., blutfarbiger, 4. w. Jamaica.

Lepechinia clinopodifolia W., v. *Mentha dahurica*.

Leperiza latifolia Herb., v. *Crinum latifolium*.

Lepia Bonanniana Presl, *campestris* Desv., *glastifolia* Desv., *hirta* Desv., *sativa* Desv., v. *Lepidium Bonannianum*, *campestre* etc., *oppositifolia* Desv., v. *Eunomia oppositifolia*.

Lepicaune albida Lap., *balsamea* Lap., v. *Hieracium intybaceum* et *amplexicaule*, *tomentosa* Lapeyr., v. *Senecio Doronicum*, *grandiflora* Lapeyr., v. *Crepis grandiflora* etc.

Lepidium T., RBr., Kresse.

affine Ledeb. (= *latifolium* L. var. = *sibiricum* Schweig., Hort., non Pall.).

Armoracia Fisch. et Mey., Meerrettig-K., 4. w. Abyssin. Bonannianum Guss., Tenore, Bonanni's ♂. ♂. f. Süditalien. chilense Dsf., chilesische, ♂. f. Chili.

crassifolium W. K. (= *Candollei* Desv. = *salinum* Pall. = *verrucosum* DC., P. = *Cardaria crassifolia* Spach).

desertorum Ledeb., Wüsten-K., ♂. f. Sibirien.

diffusum DC. (= *Dileptium diffusum* Rafin.), weit-schweifige, ♂. f. Louisiana.

Iberis L. (= *diandrum* Medic. = *exiguiflorum* Clairv. = *gramineum* Lam. = *graminifolium* L. = *miscellaneorum* Schult.), β) *arcuatum* DC., γ) *Pollichii* Roth.

incisum Roth (= *obovatum* Kit. = *virginicum* Auct., non L.), β) *apetalum* W.

intermixtum Tenore, untermengte, 4. f. Süditalien.

lacerum C. A. Mey., schlitzblättrige, 4. f. Altaisch. Sibirien.

micranthum Ledeb. (= *decumbens* Desv. = *divaricatum* Hort. = *incisum* MB., non Roth).

propinquum Fisch. et Mey., verwandte, ♂. 4. f. Caucasus.

ruderales L. (= *ibericum* Schrad.).

vesicarium L., blasige, ♂. f. Mittelasien.

Menziesii DC., *virginicum* L., v. *Cynocardamum*

Menziesii et *virginicum*, p. 180, II.

Lepidosperma LaBill., Schuppennüschen.

Rottboellii Schrad. (= *involutatum* Schrad. = *Schoenus bromoides* Lam. = *S. dactyloides* N. E. = *S. thermalis* Rottb. = *Sclerochaetium Rottboellii* N. E.),

Rottboell's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Lepidostephanus Bartl., Schuppenkrönchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

madioides Bartl., madiaähnliches, ♂. f. Californien.

Lepigonum Fries, *canadense* Fisch. et Mey., *capense* Fisch. et Mey., *glandulosum* Fisch. et Mey., *macrothecum* Fisch. et Mey., *marinum* Fr., *medium* Wahlbg., *mollugineum* Bartl., *rubrum* Fr., *salinum* Swt., *salugineum* Fisch. et Mey. et var. *leiospermum* Fisch. et Mey., *segetale* Fisch. et Mey., *sperguloides* Fisch. et Mey., *villosum* Fisch. et Mey., v. *Spergularia canadensis* etc. — *glutinosum* Swt., v. *Holosteum liniflorum*, p. 304, II.

Lepismium Pfeiff., p. 455, v. Cacteeae, p. 874 et p. 99, II.

Lepistemon muricatum Spanh., v. *Ipomoea chryseides*, p. 419.

Leptadenia RBr., Leptadenie, V. 1., Contortae-Apocynae.

lancifolia Decsne. (= *Cynanchum lanceolatum* Poir. = *hastatum* P.), lanzettblättrige, ♂. w. Abyssinien.

Leptandra angustifolia Lehm. (= *Meyeri* G. Don = *tubiflora* Walp.), v. *Veronica tubiflora*.

Leptanthus gramineus Mchx., v. *Heteranthera graminea*, p. 297, II.

Leptarrhena crassifolia Lilja, v. *Saxifraga crassifol.*

Leptasea aizoides Haw., v. *Saxifraga aizoides*.

Lepteranthus hygrometricus Cass. et *linifolius* Webb, v. *Centaurea phrygia* et *linifolia*, p. 178.

Leptinella Cass., Leptinelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

perpusilla Fisch. et Mey., niedrige, ♂. f. Persien.

Leptocallis armata G. Don, v. *Ipomoea armata*,
p. 418.

Leptocaulis Nutt., DC., Schlankstengel, V. II., Um-
belliferae.

divaricatus DC. (= *Aethusa divaricata* Nutt. = *Ammi
divaricatum* Mchx. = *Daucus divaricatus* Walt. =
Ligusticum pusillum Mchx. = *Sison divaricatus* Spr.
(ex parte) = *Sison pusillus* Mchx. = *Spermolepis
divaricata* Rafin.), ausgespreitzter, ☉. f. Carolina.

Leptochloa P. B., Schlankspelze.

dubia N. E. (= *obtusiflora* Trin. = *Chloris dubia* H.
B. K. = *Festuca obtusiflora* W. herb. = *Leptosta-
chys dubia* Mey.), zweifelhafte, ☉. m. f. Mexico.

gracilis N. E. (= *Chloris gracilis* H. B. K., non Du-
rande, = *Leptostachys gracilis* Mey.), schlanke, 4.
w. Quito, Brasilien.

mucronata Kunth (= *Eleusine mucronata* Mchx. =
Oxydenia attenuata Nutt.), stachelspitzige, ☉. f. Nord-
amerika.

tenerrima R. et S. (= *capillacea* P. B. = *Agrostis
chinensis* Koen. = *A. virgata* W. = *Cynodon virga-
tus* W. E. = *Cynosurus capillacens* P. B. = *C. ca-
pillaris* Hort. = *Eleusine tenerrima* Hornem. =
Poa chinensis Burm. = *P. malabarica* Klein = *P.
sessilis* Lam.).

arabica Kunth, v. *Dineba arabica*, (= *aegyptiaca*),
polystachya Kunth, v. *Diplachne fascicularis*.

Leptocyamus Benth., Schlankbohne, XVII. IV. (VI),
Leguminosae-Papilionaceae.

clandestinus Benth. (= *Leptolobium clandestinum* Benth.
= *Glycine clandestina* Wendl. = *Teramnus clande-
stinus* Spgl.), heimlichblühende, †. Sch. t. Neuholl.

elongatus Benth. (= *Kennedynella elongata* Steud. =
Leptolobium elongatum Benth.), verlängerte, †. Sch.
t. Neuholland.

microphyllus Benth. (= *Kennedynella microphylla* Steud.
= *Kennedyia microphylla* et *minima* Sieber = *K.
Sieberiana* Hort. = *Glycine minima* W. = *Leptolo-
bium microphyllum* Benth.), kleinblättrige, †. Sch. t.
Neuholland.

tomentosus Benth. (= *Kennedynella tomentosa* Steud. =
Kennedyia tomentosa Hort. = *Leptolobium tomentosum*
Benth.), filzige, †. Sch. t. Neuholland.

Leptolobium Benth. (non Vogel), v. *Leptocyamus*.

Leptomeria RBr., Südseethesie.

Lehmanniana Miq., Lehmann's, †. t. k. Neuholland.

Leptopoda brachypoda Torr. et Gr. = ? *Helenium
quadridentatum*.

Leptormus longifolius Eckl., Zeyh., *pendulus* Eckl.,
Zeyh. etc., v. *Heliophila longifolia*, *pendula* etc.

Leptorhabdos Schrenk, Dünnstab, XIV. II., Per-
sonatae.

brevicens Fisch., Mey. et Lallein., kurzzähniger, ☉. f.
Asiat. Rufsland (Berg Alatau).

micrantha Schrenk, kleinblumiger, ☉. f. Soongaria.

Leptorhynchus Less., Schlankrachler.

gracilis Walp., schlanker, ☉. 4. t. Neuholland.

L'hotskyanus Walp., L'hotsky's, ☉. 4. t. Neuholland.

suaveolens Benth., v. *Waitzia corymbosa* Wendl.

Leptosema Benth., Schlankfahne, X. 1., Leguminosae.

bossiaeoides Benth., Bossiaeaähnliche, f. t. Neuholland.

Leptosiphon Benth., p. 455 et *Gilia*, Sect. IX., p. 263, II.

Leptospermum Forst., Südseemyrte.

aciculare S. Schauer, nadelblättrige, f. f. t. k. Neuh.

a) majus S. Schauer, *β) minus* S. Schauer (= *juniperinum* H. Berol., W. E.).

amboinense DC. (= *Myrtus amboinensis* Rumpf), amboinische, f. f. w. Amboina. (Kaum eingeführt.)

angustifolium Endl., schmalblättrige, f. f. t. k. Neuholl.

attenuatum Sm. (= *lucidum* Hort. Belved.).

baccatum Sm. (= *juniperifolium* Cav.), *β) roseum* S. Schauer (= *persiciflorum* Rchb. = ? *grandiflorum* Lodd. = *purpurascens* Hort. = ? *rubriflorum* H. Engl. = *scoparium β roseum* H. Berol.).

Candollei S. Schauer (= *porophyllum* DC., non Cav.), Candolle's, f. f. t. k. Neusüdwallis. (Noch nicht in den Gärten eingeführt.)

Celsianum Tenore (= *Metrosideros pubescens* H. Cels.), Cels's, f. f. t. k. Neuholland.

ciliolatum Otto et Dietr., gewimperte, f. f. t. k. Neuholl.

crassipes Lehm., dickstielige, f. f. t. k. Neuholland.

cuneiforme Otto et Dietr., keilförmige, f. f. t. k. Neuh.

Cunninghami S. Schauer (= *thymifolium* A. Cunn., non Hort. Cels. = *sericophyllum* S. Schauer), Cunningham's, f. f. t. k. Neuholland.

cupressinum Otto et Dietr., cypressenähnliche, f. f. t. k. Neuholland.

emarginatum Wendl. fil. (= *Melaleuca nervosa* Hort.).

ericoides Rich., heideähnliche, f. f. t. k. Neuzeeland. (Ob eingeführt?)

flavescens Sm. (= *Melaleuca* Thea, Wendl. et Schrad. = *porophyllum* Cav. = *polygalifolium* Salisb. = *virgatum* W. herb. ex parte).

glaucescens S. Schauer (= ? *sericeum* H. Berol.), blaugrüne, f. f. t. Van Diemens Land.

gnidiaefolium DC., gnidiablättrige, f. f. t. k. Neuholland. (Noch nicht eingeführt?)

grandiflorum Lodd. (= *buxifolium* Wendl. fil. et ? Dehnh. = *L. obovatum* et *aquaticum* Hort.), großblumige, f. f. t. k. Neuholland.

β) minus S. Schauer.

grandifolium Sm. (= *lanigerum* Cunn.), *a) argyreum* S. Schauer, *β) vestitum* S. Schauer, *γ) angustum* S. Schauer.

juniperinum Sm. (= *baccatum* W. E., Lk., non Sm. = *pungens* Hffg. = *recurvifolium* Salisb. = *tenuifolium* Cav. = *multiflorum* Cav. = *obliquum* Colla = *Melaleuca tenuifolia* Wendl.).

lanigerum Ait. ed. 2. (= *trinerve* White = *pubescens* Speg. ? Sm. = *Philadelphus laniger* Ait. ed. 1. var. *a) canescens*), *a) discolor* S. Schauer, *β) concolor* S. Schauer.

myrtifolium Sieb., myrtenblättrige, f. f. t. k. Neuholland.

obovatum Swt., verkehrteiförmige, f. f. t. k. Neuholl.

Oxycedrus S. Schauer (= *arachnoideum* H. Berol., non Sm.), cederähnliche, f. f. t. k. Neuholland.

parvifolium Sm. (= *eriocalyx* Sieb.), kleinblättrige, f. f. t. k. Neuholland.

Leptospermum

pubescens Lam., W. (= *lanigerum* Sm. = *lanigerum pubescens* Poir. = *Philadelphus laniger* β *piliger* Ait. ed. I. = *tomentosum* H. Carlsr. = *sericeum* Auct. = *canescens* Wendl.).

scoparium Sm., α) Forsteri S. Sch. (= *scoparium* Forst. = *rubricaulis* Lk. = *Melaleuca mucronata* Cels. = *M. scoparia* α *diosmatifolia* Wendl. et Schrad.), β) myrtifolium W., P., DC. (= *macrocarpum* A. Cunn. = *squarrosus* G. = *Melaleuca scoparia* β *myrtifolia* Wendl. et Schrad. = *Philadelphus floribundus* Usteri), γ) microphyllum S. Schauer (= *humifusum* A. Cunn.), δ) grandiflorum Hook., ϵ) confertifolium S. Schauer¹).

spinescens Endl., dornige, f. f. t. k. Neuholland. (Ob eingeführt?)

splendens S. Schauer, schimmernde, f. f. t. k. Neuholl.
stellatum Cav. (= *L. Thea* W. spec. excl. Syn. = *acuminatum* Wendl.).

stypheleoides S. Schauer (= *aquaticum* Hort.), Styphelia-ähnliche, f. f. t. k. Neuholland (Moretonbay).

tonsum S. Schauer (= *pubescens* Hort. = *Fabricia minor* Hort. = ? *F. incana* Dum. Cours. = *F. sericea* W. herb.), geschorene, f. f. t. k. Neuholland.

tortuosum Delnh., gedrehte, f. f. t. k. Neuholland.

villosum Otto et Dietr., zottige, f. f. t. k. Neuholland.

virgatum S. Schauer, non Forst. (= *acutifolium* H. Vratisl. = *paludosum* H. Berol. nec Hort. Vindob.), ruthenförmige, f. f. t. k. Neuholland.

ambiguum Sm. (= *punctatum* Hort.) etc., v. *Kunzea corifolia*, p. 338, II. etc., *dubium* Sngl., v. *Astartea Endlicheriana*, p. 50, II., ? *ellipticum* Endl., *flexuosum* Lk. (= *glomeratum* Wendl. = *resiniferum* Bertol.), *hypericifolium* Otto et Dietr. (= *theaeforme* A. Cunningh.), *linearifolium* DC., *marginatum* LaBill. (= *ovatifolium* Swt.), *salignum* Steud., v. *Billiotia elliptica*, *flexuosa* etc., p. 69 et 70, II., *umbellatum* G. = *Metrosideros umbellata* Cav.

Leptostachys domingensis Meyer, *filiformis* Meyer, *virgata* Meyer etc., v. *Leptochloa domingensis* etc.
Leptostelma maximum D. Don, v. *Erigeron maximum*.

Leptotes Lindl., Schlankstendel.

serrulata ?Lindl., sägezähniger, 4. w. Südamerika.

Leptothrium lineare Kunth, v. *Isochilus linearis*, p. 425.

Leptothis anthemoides Hffg., v. *Sphenogyne anthemoides*.

Lepturus RBr., Dünnschwanz.

III. *Hemarthria* Kunth (= *Lodicularia* P. B.).

fasciculatus Trin. (= *Lodicularia fasciculata* P. B. = *Rottboella altissima* Poir. = *R. articulata* Thbg. = *R. fasciculata* Lam., Dsf. = *R. spathulata* Tenore), büschelförmige, 4. k. Nordafrika, Spanien, ? Süditalien.

1) „Ist die Thea plant der Colonisten auf Neuholland.“ S. Schauer.

Lepyrodiclis Fenzl, Doppelmiere, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

holosteoides Fenzl (= *Gouffea holosteoides* Fisch. et C. A. Mey.).

stellarioides Schrenk et C. A. Mey., Stellarienähnliche, ©. f. Asiat. Rußland.

Lerchea Hall., Medic., *altissima* Medic., v. Schanginia *altissima*, p. 729, *fruticosa* Mch. (= *obtusifolia* Hall.), *salsa* Medic., v. Schoberia *fruticosa*, *salsa*.

Leria nutans DC. (= *lyrata* Cass., p. 457).

Leschenaultia RBr., Benth. = **Lechenaultia**.

Lespedezia fruticosa P. (= *frutescens* DC.), reticulata P. (= *angustifolia* Rafin., non Nutt. Ell. = *sessiliflora* var. Mchx.), p. 457.

Lessertia DC., Lessertie.

virgata Lk., Otto, ruthenförmige, ©. †. m. f. k. Cap der guten Hoffnung.

Lettsomia Roxb. (non R. et P.), *argentea* Roxb., *cuneata* Roxb., *hispida* Hook., *nervosa* Roxb., *pomacea* Roxb., *setosa* Roxb., *splendens* Roxb., *strigosa* Roxb., v. *Argyrea argentea* etc., p. 43 et 44, II., — *bona nox* Roxb., *ornata* Roxb., *uniflora* Roxb., v. *Rivea bona nox*, *ornata* et *hypocrateriformis*.

Leucadendron Herm., Boerh., RBr., Silberbaum.

callosum Hffg. (= *Protea callosa* Wendl.), schwieliger, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

flavescens Lk. (= *Protea flavescens* W. E.), gelblicher, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

Levisanus Berg. (= *hirsutum* Hffg.).

lineare RBr. (= *Protea linearis* Houtt.), gleichbreitblättriger, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

marginatum Lk. (= *Protea ciliaris* Wendl. = *P. ciliata* H. angl. = *P. marginata* W. E.).

odoratum RBr. (= *Protea odorata* Thbg.), wohlriechender, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

pyramidale Steud. (= *Protea pallens* γ Thbg.), pyramidenförmiger, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

salignum RBr. (= *inflexum* L. = *Euryspermum sericeum* Salisb.).

sessile RBr., ungestielter, †. †. t. Cap d. g. Hoffn.

Leucaena Benth., Weisfadend, XVI. VIII. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

diversifolia Benth. (= *Acacia diversifolia* Schldtl. = *A. trichandra* Zuccar., p. 4, II.), verschiedenblättriger, †. †. t. Mexico.

glauca Benth. (= *Acacia glauca* W., p. 3 = *A. biceps* W. = *A. frondosa* W. = *A. leucocephala* Lk. var.).

pulverulenta Benth. (= *Acacia pulverulenta* Schldtl.), bestaubte, †. †. t. Mexico.

trichodes Benth. (= *Acacia trichodes* W., p. 6, = *A. pseudo-trichodes* DC.).

Leucas RBr., Weisflippe.

decemdentata Sm. (= *stachyoides* Spgl. = *Ballota pilosa* Lour. = *Phlomis decemdentata* W. = *Stachys decemdentata* Forst.), zehnzählige, ©. m. f. Südasien, Gesellschaftsinseln.

flaccida RBr. (= *melissaefolia* Benth. = *parviflora* Benth.).

helianthemifolia Dsf. (= *rufescens* Benth.), sonnenrosenblättriger, †. w. Ostindien.

Leucas

hirta Spgl. (= *helianthemifolia* Benth., non Dsf.), rauhe, ☉. 4. m. f. w. Ostindien.

linifolia Spgl. (= *lavandulaefolia* Sm. = *Leonurus indicus* Burm.).

ovata Benth. (= ?*Hemistoma ovatum* Ehrenb.), eiförmige, ♂. 4. ♀. w. Ostindien.

Schimperi Hochst., Schimper's, ☉. m. f. Abyssinien.

urticaefolia RBr. (= *affinis* RBr. = *membranacea* Benth. = *Hemistoma ovatum* Ehbg. = *Phlomis urticaefolia* Vahl), nesselblättrige, ☉. m. f. Ostindien, Arabien.

Leuchaeria Lagasca (= *Leucaeria* et *Leuceria* Auct.), Leuchaerie, XIX. iv., Compositae-Eupatorineae (Nassauviaceae).

senecioides Hook. Arn. (= *Chabraea elongata* Bertero = *Trixis senecioides* Hook.), kruzkrautähnliche, ☉. f. Chili.

Bridgesii Hook., Arn., *cinerea* Don, *Cunningii* Hook. Arn., *runcinata* Gill. et Don, v. *Chabraea tomentosa*, *cinerea* etc., p. 134, II.

Leucocoryne Lindl., Weifsknöpfchen.

ixioides Lindl. (= *Brodiaea ixioides* Sims = *Anthocerosodorum* Bertero), p. 459.

Leucolaena rotundifolia Benth., v. *Xanthosia rotundifolia*.

Leucophyllum H. B. K., Weifsblatt, XIV. II., Personatae.

ambiguum H. B. K., zweifelhaftes, ♀. t. Mexico.

Leucopogon RBr., Weifsbart.

acuminatus RBr. (= *Styphelia acuminata* Spgl.), zugespitzter, ♀. t. Neuholland.

affinis RBr., ähnelnder, ♀. t. Neuholland.

angustatus Benth., verschmälerter, ♀. t. Neuholland.

attenuatus Cunn., verdünnter, ♀. t. Neuholland.

australis RBr., südlicher, ♀. t. Neuholland.

ciliatus Cunn., gewimperter, ♀. t. Neuholland.

Cunninghamii RBr., Cunningham's, ♀. t. Neuholland.

cuspidatus RBr. (= *Styphelia cuspidata* Spgl.), feinspitziger, ♀. t. Neuholland.

daphnoides H. angl. et belg., kellerhalsähnlicher, ♀. t. Neuholland.

Drummondii DC., Drummond's, ♀. t. Neuholland.

floribundus Hort. angl. et belg., blüthenreicher, ♀. t. Neuholland.

Fraseri A. Cunn., Fraser's, ♀. t. Neuholl., Neuzeeland.

imbricatus RBr. (= *Styphelia imbricata* Spgl.), ziegeldachförmiger, ♀. t. Neuholland.

lanigerus Cunn., wolliger, ♀. t. Neuholland.

multiflorus RBr. (= *Styphelia multiflora* Spgl.), vielblumiger, ♀. t. Neuholland.

parviflorus Lindl. (= *lanceolatus* Sieb. = *polystachyus* Lodd., non RBr. = ?*Richei* RBr. = *Styphelia Gnidium* Vent. = *St. parviflora* Andr.), kleinblumiger, ♀. t. Neuholland.

polystachyus RBr. (= *Styphelia polystachya* Spgl.), vielähriger, ♀. t. Neuholland.

ramulosus Cunn., ästiger, ♀. t. Neuholland.

reflexus RBr. (= *Styphelia reflexa* Spgl. = *S. Brownii* Spgl.), zurückgebogener, ♀. t. Neuholland.

Leucopogon

- revolutus RBr. (= *Styphelia revoluta* Spgl.), zurückgerollter, ⚔. t. Neuholland.
 rigidus Cunn., starrer, ⚔. t. Neuholland.
 squarrosus Benth., sparriger, ⚔. t. Neuholland.
 tamariscinus RBr. (= *Styphelia tamariscina* Spgl.), tamariskenähnlicher, ⚔. t. Neuholland.

laurinus Hort., v. *Trochocarpa laurina*.

Leucorchis E. Mey., Weislorche, XX. 1., Orchideae.

- albida E. Mey. (= *Gymnadenia albida* Rich., p. 363
 = *Peristylus albidus* Lindl. = *Habenaria albida* RBr.
 = *Orchis albida* Sw. = *Platanthera albida* Lindl. =
Satyrium albidum L.).

Leucospermum RBr., Weifssaame.

- buxifolium RBr. (= *Protea buxifolia* Poir. = *P. villosa* W. herb.), buchsbaumblättriger, ⚔. t. Cap d. g. Hoffn.
 diffusum RBr. (= *Protea heterophylla* Thbg.), weit-schweifiger, ⚔. t. Cap d. g. Hoffn.
 oleaefolium RBr. (= *Protea criniflora* L. = *P. crinita* Jacq. = *Leucadendron oleaefol.* Berg.), oelbaumblättriger, ⚔. t. Cap d. g. Hoffn.

Leucothamnus Lindl., Weifsstrauch, V. 1., Buettneriaceae.

- montanus Lindl., Berg-W., ⚔. t. Neuholland. (Ob kult.?)

Leucea DC. (= *Leucea* Auct.), Leucea.

- carthamoides DC. (= *Cirsium carthamoideum* Lk. = *Cnicus cartham.* W. = *Halocharis carthamoides* MB.),
 β) altaica DC.

- pinnatifida DC. (= *Malacocephalus pinnatifidus* Tausch), fiederspaltige, 4. f. ?

Leyssera ciliata Thbg., v. *Mairia taxifolia*, *polifolia* Thbg., v. *Printzia* Bergii.

Liatris Schreb., G., Prachtscharte.

- aspera Mchx. (= *Anonymus ramosus* Walt.), rauhe, 4. f. b. Carolina.

- cylindracea Mchx. (= *monocephala* Cass. = *stricta* Macnab).

- elegans W. (= *Eupatorium speciosum* Vent. = *Serratula speciosa* Ait. = *Stachelina elegans* Walt.).

- graminifolia W., β) pilosa Pursh, γ) turbinata Swt.

- macrocarpa Hort. belg, grofsfrüchtige, 4. f. b. Nordam.

- marginata Cass. (= *cylindracea* var. *glabra* Mchx.), be-randete, 4. f. b. Nordamerika.

- pilosa W. (= *hirsutissima* Poir. = ? *monocephala* Cass.).

- propinqua Hook., verwandte, 4. f. b. ?

- pynostachya Mchx., b) fl. roseo.

- secunda Ell., einseitige, 4. f. b. Carolina.

- sphaeroidea Mchx. (= *scariosa* Bot. mag., non W. = *Suprago sphaerocephala* Cass.).

- spicata W. (= *gracilis* Lodd., non Mchx. = ? *Linaria* Rafin. = *picta* Bartr. = *Suprago spicata* G.).

- tomentosa Mchx., filzige, 4. f. b. Virginien, Carolina.

Libanotis Crtz., Hoffm., Weihrauchwurz.

- athamanthoides DC. (= *Athamantia caucasica* Hort. = *Ligusticum athamanthoides* Spgl.), Vaterland unbekannt.

- buchtormensis DC. (= *Athamantia cervariaefolia* Schrad. = *A. rigida* Fisch., Hornem. = *Bubon buchtormensis* Fisch. = *Seseli buchtormense* K., p. 749).

- gracilis Rchb., schlanke, 4. f. Tyrol.

Libanotis

Patriniana DC. (= *graveolens* Don = *Seseli graveolens* Ledeb.), Patrin's, 4. f. Alt. Sibirien.

Stephaniana DC. (= *Athamantha compacta* Ledeb. = *A. monstrosa* Steph., W. = *Ligusticum athamanthicum* Adams), Stephani's, ♂. 4. f. Alt. Sibirien.

tenuifolia DC. (= *Athamantha tenuifolia* Pall. = *Peucedanum salinum* Spgl.), dünnblättrige, 4. f. Alt. Sibirien.

vulgaris DC. (= *athamanthica* G. M. S. = *daucoides* Scopol. = *montana* All. = *Riviniana* Scopol. = *Athamantha Libanotis* L. = *A. Riviniana* Host, = *Seseli Libanotis* K.), β) pubescens DC. (= *Athamantha pubescens* Retz), γ) daucifolia DC. (Rchb.), (= *Ammi daucifolium* Scopol. = *Athamantha crithmoides* Lapeyr. = *A. daucifolia* Host, = *A. Libanotis γ exaltata* Gaud. = *A. pyrenaica* Jacq. = *Crithmum pyrenaicum* L.), δ) condensata DC. (Fisch. et Mey.), (= *Athamantha condensata* L.), ε) sibirica K. (C. A. Mey.), (= *Athamantha sibirica* L. = ? *Seseli athamanthoides* Ledeb.).

verticillata DC. (= *Athamantha verticillata* Sibth., Sm.), wirtelförmige, 4. f. b. Griechenland (Parnassus).

cachroides DC., v. *Phlojodicarpus dahuricus*, *rupes-tris* Scopol., v. *Turbith* Matthioli.

Lichtensteinia Cham., Schtdl. (Lichtenstein, Prof. zu Berlin, berühmt als Reisender u. Zoolog), V. 11., Umbelliferae.

inebrians Eckl., Zeyh. (= *Oenanthe inebrians* Thbg., p. 554).

lacera Cham., Schtdl. (= *Hermas rudissima* Rchb. = *Oenanthe exaltata* Thbg.), schlitzblättrige, 4. k. Cap der guten Hoffn.

Lichtensteinia laevigata W. et *undulata* W., v. *Ornithoglossum glaucum* et *Lichtensteinii*. — *Lichtensteinia oleaeifolia* Wendl., v. *Loranthus oleaeifolius*.

Lidbeckia lobata Thbg. (= *quinceloba* Cass.), pectinata Berg. (= *capensis* Gmel.). Vergl. p. 461.

Lightfootia L'Her., Lightfootie.

subulata L'Her. (= *sessiliflora* Spgl. = ? *Campanula fruticosa* L.).

tenella A. DC. (= *fasciculata* Eckl., non Spgl. = *Campanula tenella* L. fil. = *Roella filiformis* Poir., non Lam. = *R. glabra* Poir. = *R. recurva* Bank's herb.), zarte, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Ligularia Cass., Bandblume.

geifolia DC. (= *Cineraria geifolia* C. A. Mey.), Nelkenwurzblättrige, 4. f. Caucasus.

β) renifolia DC. (= *Cineraria renifolia* C. A. Mey.).

gigantea Sieb. et Zuccar. (= *Tussilago japonica* Hort., non L.), riesenhafte, 4. k. Japan.

Kämpferi Sieb. et Zuccar. (= *Senecio Kaempferi* DC. = *Arnica tussilaginea* Burm. = *Tussilago japonica* L.), Kämpfer's, 4. k. Japan.

Reichenbachii Steud. (non sibirica nec speciosa sec. Fisch. et Mey. = *Hoppea speciosa* Rchb.), Reichenbach's, 4. f. ?

robusta DC. (= *Cineraria robusta* Ledeb.), starke, 4. f. Alt. Sibirien.

Ligularia

speciosa Fisch. et Mey. (= *sibirica* δ *speciosa* DC. = *Cineraria Fischeri* Ledeb. = *C. speciosa* Fisch., Schrad.), prächtige, 4. f. Sibirien.

thyrsoides DC. (= *Cineraria thyrsoides* Ledeb. = *Senecio sibiricus* Lepech.), straussförmige, 4. f. Alt. Sibir.

Ligularia canescens Swt., *hirta* Eckl., Zeyh., *trifida* Eckl., Zeyh., v. *Pelargonium incisum*, *hirtum*, *tripartitum*, p. 596 et 598. — *Ligularia sarmen-tosa* Duval, v. *Diptera sarmentosa*, p. 207 II. et 724.

Ligusticum T., K., Möhrenwurz.

discolor Ledeb. (= ? *peloponnesiacum* Pall.), verschiedenfarbige, ♂. f. Alt. Sibirien.

multifidum Sm., vieltheilige, 4. f. Sibirien.

pyrenaicum Gouan, K. (= *lucidum* Mill. = *Cnidium pyrenaicum* Spgl. = *Seseli aristatum* Ait. = *S. ferulaefolium* Poir. = *Thysselinum nigrum* Mch.).

tripartitum Dumort., dreitheilige, 4. f. Belgien.

actaeifolium Mchx. (= *barbinode* Mchx.), v. *Thapsium barbinode*, *alpinum* Spgl., v. *Bunium alpinum*, p. 82, II., *alsaticum* Lk., v. *Peucedanum alsaticum*, p. 610, *apiifolium* Dsf. (= *apioides* Lam. = *cicutaeifolium* Vill. = *Lobelii* Vill. = *silaeifolium* Gaud.), *dauricum* Jacq., v. *Cnidium apioides* et *dahuricum*, p. 208, *aquilegifolium* W., v. *Physospermum aquilegifolium*, *austriacum* L., v. *Pleurospermum austriacum*, *balearicum* L., v. *Kundmannia sicula*, p. 337, II., *Brunonis* Wall., v. *Hymenolaena Brunonis*, p. 309, II., *Bunius* Lk., v. *Ptychotis heterophylla*, *carniolicum* Host, v. *Malabaila Hacquetii*, *cicutarium* Lam., v. *Molopospermum cicutarium*, p. 528, *condensatum* Spgl., v. *Libanotis vulgaris* δ , *decussatum* Mch., v. *Palimbia Chabraei*, *divaricatum* Ledeb., *Fischeri* Lk. (= *longifolium* W.), v. *Coenolophium Fischeri*, p. 876, *Foeniculum* Roth, v. *Foeniculum vulgare*, *Meum* Lam., v. *Meum athamanticum*, p. 522, *minus* Lam., v. *Cnidium Monnieri*, p. 208, *Phellandrium* Crtz, v. *Oenanthe Phellandrium*, s. *Phellandrium aquaticum*, p. 614, *pusillum* Mchx., v. *Leptocaulis divaricatus*, p. 351, II., *sibiricum* Spgl., v. *Libanotis vulgaris* ϵ , *Silaus* Duby, Lk., *arenarium* Lk., v. *Silaus pratensis* et *tenuifolius*, *splendens* Lapeyr. (= *tenuifolium* Ram.), v. *Wallrothia tenuifolia*. Hiernach p. 462 zu ergänzen und zu berichtigen.

Ligustrum T., Rheinweide (Liguster).

bracteolatum D. Don, deckblättriger, \ddot{h} . \ddot{h} . k. Nepal. *Perrottetii* A. DC., Perrottet's, \ddot{h} . t. Ostindien. (Wohl noch nicht eingeführt.)

Unbestimmt: *coriaceum* Nois. Hortul.

Lilac persica Lam. (= *minor* Mch.), *vulgaris* G., v. *Syringa persica* et *vulgaris*.

Liliacum rothomagense Reyn., v. *Syringa chinensis*.

Liliastrum album Lk., v. *Czackia Liliastrum*.

Lilium T., L., Lilie.

Brownii v. Houtte, Lemaire, Scheidw. (= *japonicum* Auct.), Brown's, 4. Zw. f. b. Japan.

bulbiferum L., α) *umbellatum* Parkins., β) *latifolium* Fisch. et Mey. (= β *umbellatum* Ker = *latifolium* Lk. Enum.), γ) *racemosum* Besl. H, Eyst.

Lilium

- callosum Zuccar. (= *pomponium* Thbg., non L.), schwielige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- canadense L. (= *coccineum* Curt. = *flavum* Curt.), β) *penduliflorum* Red. (= *pendulum* Hort.).
- candidum L., f) foliis marmoratis, g) foliis variegato argenteis, h) fol. varieg. aureis, i) flore sanguineo.
- concolor Salisb., β) *uniflorum* Kunth.
- croceum Chaix (= *aurantiacum* Don, H. Angl.), safranfarbige, 4. Zw. f. Schweiz, Norditalien, Frankreich. b) foliis variegatis. β) *serotinum* Fisch., Mey., Lallemand. (= *bulbiferum* Vill.), γ) *humile* Fisch., Mey. et Lallemand. (Mill.), (= *pumilum* Hort.).
- dauricum Ker (= *Catesbaei*, *pensylvanicum* et *philadelphicum* Hort.).
- eximium Courtois (= *speciosum* Siebold, non Thbg. = *longiflorum*, *macranthum* et *speciosissimum* Hort.).
- isabellinum Kunze (= *peregrinum* Hort., non Mill.), isabellfarbige, 4. Zw. f. ? Orient.
- Loddigesianum R. et S. (= *monadelphum* Ker, Lodd., non MB.), Loddiges's, 4. Zw. f. Caucasus.
- Martagon L., e) fol. aureo variegatis, f) *superbum* Hort.
- pomponium* L. (= *rubrum* Lam.), β) *angustifolium* Mill.
- pulchellum* Fisch., schöne, 4. Zw. f. Dahurien.
- pumilum* Redout. (= *linifolium* Hornem. = *uniflorum* H. Angl.), kleine, 4. Zw. f. Davuria.
- pyrenaicum Gouan (= *flavum* Lam.), α) *brevifolium* Fisch., Mey. et Lallemand., β) *longifolium* Fisch., Mey. et Lallemand.
- sibiricum W. (= *Buschianum* Lodd.).
- speciosum* Thbg. (= *versicolor* Kämpf.), α) *albiflorum* Hook. (= *Broussartii* Hort.), β) *punctatum* Hort. (= ? *a Kaempferi* Kunth), γ) *roseum* Paxt., δ) *rubrum* Hort.
- spectabile* Fisch., Lk. (= *pensylvanicum* Ker = *bulbiferum* γ Ait.), ansehnliche, 4. Zw. f. Ostsibirien, Kamtschatka.
- superbum* Lam., β) *pyramidale* van Houtte.
- Szovitsianum* Fisch. et Lallemand., Szovits's, 4. Zw. f. Colchis.
- testaceum* Lindl. (= *excelsum* v. Houtte), scherbengelbe, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- Thomsonianum* Lindl. (= *roseum* Wall. = *Fritillaria Thomsoniana* Royle), Thomson's, 4. Zw. k. Nordindien.
- tigrinum* Ker (= *pomponium* Lour., non L. = *speciosum* Andr. = *sinense* Hort.).
- venustum* H. Berol., liebliche, 4. Zw. f. b. ? Japan.
- Wallichianum* R. et S. (= *longiflorum* Wall., Don), Wallich's, 4. Zw. k. Nepal. β) *suaveolens* Kunth (= *uniflorum* Bot. reg.)
- Gartenhybriden: *hybridum* Claudianum, *coccineo-rubrum* v. Houtte, *croceo-rubrum* v. Houtte, Don Juan, Duc de Devonshire, Duc de Wellington, *fulgidum* v. Houtte, *grandiflorum* v. Houtte, *immaculatum* v. Houtte, Louis Philipp, *multiflorum*, Napoleon, Prince Albert, *pubescens* Bernh., *punctatum* v. Houtte, *punctatum superbum* v. Houtte, Rubens, Talisman, Titien, Vulcain, Voltaire.
- Noch nicht eingeführte: *cordifolium* Thbg. (= *Hemerocallis cordata* Thbg.), 4. Zw. Japan, *elegans* Thbg.,

Lilium

4. Zw. Japan, giganteum Wall. (= cordifolium Don),
4. Zw. Nepal.

Unbestimmtere: persicum Fisch.; praecox Lodd., recur-
vum H. Belved.

affine Schult., camtschatcense L. (= quadrifoliatum
E. Mey.), pudicum Pursh, v. Fritillaria lanceolata,
camtschatcensis, pudica, p. 338 et p. 248, II.

Limbarda Adans., tricuspis Cass., v. Inula crith-
moides L., p. 417 et p. 317, II.

Limnanthemum Gmel., Griseb., Schlammbäumchen, V. I.,
Contortae-Gentianeae.

geminatum Griseb. (= ? Villarsia geminata RBr., p. 848
= V. sarmentosa Sims).

Humboldtianum Griseb. (= Menyanthes brasiliica Arrab.
= M. indica Aubl. = M. meridionalis W. herb. =
Villarsia Humboldtiana H. B. K., p. 848. = V.
platyphylla St. Hil. = ? β V. cordata Ell.).

indicum Griseb. (= Menyanthes ceramica Hamilt. =
macrophylla Roth = M. indica L. = sinaria Hamilt.
= Villarsia indica Vent., p. 848 = V. macro-
phylla R. et S.).

lacunosum Griseb. (= Menyanthes punctata Mühlbg.
= M. trachysperma Mchx. = Villarsia lacunosa
Vent., p. 848).

nymphoides Lk. (= peltatum Gmel. = Menyanthes
nymphaeoides L. = Nymphoides europaea Fisch. =
Villarsia nymphoides Vent., p. 848 = Waldschmidtia
nymphaeoides Wigg.).

Thunbergianum Griseb. (= Menyanthes indica Thbg.
= Villarsia indica Ait.), Thunberg's, 4. Wa. w.
Cap d. g. Hoffn.

Limnanthes RBr., Douglasii RBr. (= anemonefolius
Hort.), p. 464.

Limnia alsinoides Haw., perfoliata Haw., sibirica
Haw., v. Claytonia alsinoides etc. p. 148, II. et 202.

Limnocharis H. B. K., Plumieri, L. C. Rich. (=
emarginata H. B. K. = Alisma flava L. = Dama-
sonium maximum Burm.), p. 464.

Humboldtii L. C. Rich., v. Hydrocleis Humboldtii,
p. 308, II.

Limodorum T., Dingel.

falcatum Sw. (= Orchis falcata Thbg.), sichelförmiger,
4. t. w. Japan.

barbatum Lam. (= pulchellum Salisb. = tubero-
sum L.), v. Calopogon pulchellus, p. 149, barba-
tum Sw., longicornu Sw., pulchrum Pet. Thrs.,
triste Sw., v. Eulophia barbata etc., p. 319 et p.
236, II., eburneum W., luridum Sw., v. Aërides
eburneum, luridum, p. 869, ensatum Thbg., v. Cym-
bidium ensifolium, p. 242, Epipogium W., v. Epi-
pogium Gmelini, p. 291, falcatum Bot. Mag., v.
Oeceoclades falcata, p. 553, flos-aeris Sw., v. Aëri-
des arachnites, p. 21, giganteum Thbg., v. Cyrtop-
era gigantea, p. 184, II., hyacinthinum Don (=
striatum Thbg.), v. Bletia hyacinthina, p. 125, In-
carvillei Sw. (= Tankervilleae Ait.), v. Phajus
grandiflorus, nutans Roxb., v. Geodorum purpureum,
p. 352, purpureum Red. v. Bletia florida, p. 125
retusum Sw., v. Saccolobium retusum, tuberosum

Limodorum

Jacq. (= *verecundum* Sw.), v. *Bletia verecunda*, p. 125, *veratrifolium* W. (= *ventricosum* Steud.), v. *Calanthe veratrifolia*, p. 145.

Limonanthe Lk., v. *Agraphis*, p. 14, II.

Limonia L., Limonie.

acidissima L. (= *crenulata* Roxb.).

laureola DC., lorbeerähnliche, §. t. Nepal.

citrifolia Roxb. (= *parviflora* Sims = *parvifolia* Auct. = ? *microphylla* Voigt.), v. *Glycosmis citrifolia*, p. 267, II.

Limonium africanum Mill., *cordatum* Mill., *echioides* Mill., *fruticosum* Mill., *oleaefolium* Mill., *reticulatum* Mill., *siculum* Mill., *sinuatum* Mill., *tataricum* Mill. (= *latifolium* Mch.), *vulgare* Mch. (= *humile* et *narbornense* Mill.), v. *Statice* Thouini, *cordata*, *echioides*, *cylindrifolia*, *oleaefolia*, *reticulata*, *monopetala*, *sinuata*, *tatarica*, *Limonium*, p. 785.

Linanthus *dichotomus* Benth., v. *Gilia*, Sect. VI., p. 263, II.

Linaria T., Frauenflachs (Leinkraut).

acutangula Tenore, spitzwinkliger, 4. f. Nepal, Griechenland.

aegyptiaca Dum. Cours. (= *spinescens* Spgl. = *Antirrhinum aegyptiacum* L. = *A. spinescens* Vivian.), aegyptischer, 4. §. k. Nordafrika.

albifrons Spgl. (= *Antirrhinum albifrons* Sibth., Sm.), weiflicher, ①. f. Griechenland.

alsinaefolia Spgl. (= *Antirrhinum alsinaefolium* Viv.), mierenblättriger, ①. f. Sardinien, Arabien, Kleinasien.

amethystea Hffg. et Lk. (= *multipunctata* Hffg. et Lk. = *Antirrhinum amethysteum* Lam. = *A. subalpinum* Brot. = *A. elegans* P. = *A. bipunctatum* Cavan., non L. = *A. multipunctatum* Brotero).

aparinoides Chav. (= *reticulata* Rchb., non Dsf. = *stricta* Gussone = *heterophylla* Dsf. = *Antirrhinum aparinoides* W. = *A. strictum* Sm. et Sibth. = *A. multicaule* Tenore, non L.), klebkrautähnlicher, ①. f. Griechenland, Sicilien, Nordafrika.

armeniaca Chav. (= *calcarata* Scheele = *segetalis* C. Koch), armenischer, ①. f. Armenien, Georgien, Caucasus.

Boissieri Walp. (= *ramosissima* Boiss.), Boissier's, ①. f. Spanien.

caesia DC. (= *Antirrhinum caesium* Lag., DC. = *A. aerugineum* Gouan), hechtfarbiger, ①. ♂. f. Spanien.

capensis Dsf., capischer, ①. f. Cap d. g. Hoffn.

concolor Griseb. (= *Antirrhinum supinum* Sibth. et Sm.), einfarbiger, 4. k. Macedonien, Thracien.

corifolia Dsf., corisblättriger, 4. f. Orient.

Cymbalaria Mill., b) *foliis variegatis*.

dalmatica Buchsb., Mill. (= *grandiflora* Dsf.).

delphinioides Gay, ritterspornähnlicher, ①. f. Spanien.

elegans Dsf. (= *Antirrhinum elegans* P.), zierlicher, ①. f. Spanien.

fasciculata Otto, büschelförmiger, ①. f. ?

fruticosa Dsf. (= *Antirrhinum fruticosum* W.), strauchiger, §. k. Nordafrika.

genistifolia Mill., β) *procera* Curt. (= *chloraefolia* Rchb.), γ) *silenifolia* Fisch., Rchb. (= *hians* Fenzl).

Linaria

- glandulifera Tenore, drüsentragender, ☉. f. ?
- glauca Spgl. (= *bipunctata* Dum. Cours. = *Antirrhinum glaucum* L. = *A. bipunctatum* L., non Cavan. = *A. capitellatum* Lam.), blaugrüner, ☉. f. Portugal, Spanien.
- graeca Chav. (= *Antirrhinum graecum* Bory et Chaub.), griechischer, ☉. f. Griechenland, Süditalien, Istrien, Nordafrika.
- hepaticaefolia Duby (= *Antirrhinum hepaticaefolium* Poir.), leberkrautblättriger, 4. f. Corsica.
- haelava Chav. (= *Antirrhinum Haelava* Forsk.), Haelava-F., ☉. f. Aegypten.
- hirta Mch. (= *villosa* Mill., non DC. = *Antirrhinum hirtum* L. = *A. viscosum* Bot. mag., non L.).
- laxiflora Dsf. (= *Antirrhinum laxiflorum* W.), lockerblumiger, ☉. f. Nordafrika.
- linogrisea Hffg. et Lk. (= *incarnata* Spgl. = *Antirrhinum incarnatum* Lam. = *A. sapphirinum* β P.), leingrauer, ☉. f. Spanien, Portugal.
- macroura MB. (= *Antirrhinum linifolium* Pall. = *A. macrourum* MB.), β) Besseriana Chav., Rchb., γ) hepatica Bunge.
- minutiflora C. A. Mey., kleinblumiger, ☉. f. Caucasus.
- odora Fisch. (= *juncea* Rchb. = *Loeseli* Schweig. = *maritima* Rchb. = *Antirrhinum junceum* Pall., non L. = *A. odorum* MB.), wohlriechender, 4. f. West-, Ost- u. Südeuropa, Altai.
β) minor Bunge (= *praecox* Bunge), γ) brachyceras Bunge.
- pallida Tenor. (= *apennina* Tausch = *Antirrhinum pubescens* Tenor.), bleicher, 4. f. Süditalien.
- pauciflora Bonpl., wenigblumiger, ☉. f. Spanien, Portugal.
- pedunculata Spgl. (= *transtagana* Spgl. = *Antirrhinum pedunculatum* L.), gestielter, 4. k. Südspanien.
- persica Chavan. (= *rytidosperra* Boiss. = *Antirrhinum rytidospermum* Fisch. et Mey., p. 40, II. = *A. rytidocarpum* G. Don), persischer, ☉. f. Sibirien, Caucasus, Syrien, Persien.
- pilosa DC. (= *pubescens* Presl = *Antirrhinum pilosum* L.), β) pauciloba A. DC. (= *aequitriloba* Bot. mag. excl. synonym. Vis.).
- praecox Bunge, Ledeb., früher, 4. f. Alt. Sibirien.
- purpurea Mill. (= *purpurascens* Hornem.).
- ramosissima Wall., ästigster, †. t. Ostindien.
- rubrifolia Rob. et Cast., rothblättriger, ☉. f. Südfrankreich, Sardinien, Sicilien.
- sapphirina Hffg. et Lk., sapphirfarbiger, ☉. f. Portugal.
- saxatilis DC., Hffg. et Lk. (= *glutinosa* Hffg. et Lk. = *Perezii* Gay = *Antirrhinum saxatile* L. = *A. Tournefortii* Poir. = *A. lagopodioides* L. fil.).
- semiglabra Salzm., halbkahler, ☉. f. Malaga.
- spartea Hffg., Lk., β) ramosissima Benth. (= *juncea* Chav. = *meonantha* Hffg., Lk. = *Antirrhinum virgatulum* Brotero).
- striata DC. (= *Cyparissias* Tausch = *decumbens* Mch. = *monspessulana* Dum. Cours. = *repens* Steud. = *stricta* Hornem. = *Antirrhinum monspessulanum* L. = *A. galioides* Lam. = *A. striatum* Lam. = *A.*

Linaria

- repens* L.), β) *conferta* Benth. (= *procera* DC. Cat. hort. monspel. (= *Antirrhinum confertum* Jan).
supina Dsf. (= *filiformis* Mch. = *glaucophylla* Hffg. et Lk.), β) *pyrenaica* DC., Duby (= *Antirrhinum dubium* Vill. = *A. pyrenaicum* Roem.), γ) *maritima* DC., Duby (= *Antirrh. maritimum* Poir.).
triquetra H. Hafn., dreiseitiger, \odot . f. ?
tristis Mill., c) *unicolor* Hort.
venosa Lindl., aderiger, 4. f. Gegend des caspischen Meeres, Cabul.
vulgaris Mill. (= *speciosa* Tenore = *acutiloba* Fisch., Rchb. = *elongata* Dumort. = *pensylvanica* Scheele = *Antirrhinum Linaria* L. = *A. glandulosum* Lej.), γ) *Biebersteinii* Bess.

Lindenbergia Lindenbergie.

- sinaica* Bové, Benth. (= *Bovea sinaica* Dcsne. = *Stemodia ruderalis* Vahl), sinaische, 4. k. t. Arabien.

Lindleya H. B. K., (J. Lindley, Prof. d. Botanik, zu London), XI. v., Rosaceae.

- mespiloides* H. B. K., mispelähnliche, \natural . t. Mexico.

Lindleya fruticosa N. E., v. *Gordonia semiserrata*, p. 272, II.

Linosyris Lobel., Cass. (= Chrysocoma L., Sect. III., p. 194), Leinkraut, XIX. II. (1.), Compositae-Corymbiferae.

- divaricata* DC. (= *Chrysocoma divaricata* Fisch.).
glabrata Lindl.
mexicana Schltld., mexicanisches, 4. k. Mexico.
villosa DC. (= *Chrysocoma villosa* L. = *Conyza oleae-folia* Lam.).
vulgaris Cassin., DC. (= *foliosa* Cass. = *Chrysocoma Linosyris* L. = *Aster Linosyris* Bernh. = *Crinitaria Linosyris* Less.).
punctata Cass., DC., v. *Aster*, Sect. IX., p. 99 et p. 51, II.

Linum T., Lein (Flachs).

- acuminatum* Tenore, zugespitzter, 4. f. Südtalien.
aethiopicum Thbg., aethiopischer, \natural . t. Cap d. g. H.
austriacum L. (= *angustifolium* Lodd.).
arborescens L. (= *glandulosum* α Sering.).
Bartlingii Eckl., Zeyh. (= *aethiopicum* Spgl. = *africanum* β *latifolium* Bartl.), Bartling's, 4. \natural . t. Cap der guten Hoffnung.
bavaricum F. W. Schultz, baierischer, 4. f. Süddeutchl.
hispanicum Mill., spanischer, 4. f. Spanien.
hologynum Rchb. (= *monogynum* Hort., non Forst.), eingriffeliger, \mathfrak{J} . 4. f. Bannat.
juniperifolium Eckl., Zeyh., wachholderblättriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
Leonii F. W. Schultz (= *montanum* Holand, non Schleich.), Leon's, 4. f. Lothringen.
marginatum Poir. (= *affine* Panzer = *angustifolium* W. En. = *austriacum* Bot. mag. = *barbulatum* Lang = *perenne* Nutt.).
mexicanum H. B. K., mexicanischer, 4. t. k. Mexico.
Mülleri Moris (= *sardoum* Müll.), Müller's, 4. \natural . f. b. k. Sardinien.
Teneriffae Hffmsg., Teneriffa's, \odot . f. Teneriffa.

Linum

- tenue Dsf. (= *melianthum* Brotero = *virgatum* Schousb.),
dünner, ☉. Nordafrika, Spanien.
Thunbergii Eckl., Zeyh. (= *quadrifolium* Thbg., non L.),
Thunberg's, ☿. t. k. Cap d. g. Hoffn.
trigynum Roxb., Sm. (= *boerhaviaefolium* Hortul.).
violascens Bunge, Ledeb., violetter, ♀. f. Alt. Sibirien.
viscosum L. (= *sylvestre* Scopol.), β) hypericifolium
Salisb. (= *venustum* Andr.).
Unbestimmtere: Biebersteinii Spgl., Hortul., depressum
Hort., fasciculare Hort., flexuosum Hort., gracile Hort.,
monadelphum Mart., Hortul.

Liparia L., Liparie.

- parva Vogel, kleine, ☿. t. Cap d. g. Hoffn.
β) angustifolia Bot. mag.

Lipostoma D. Don, campanulaeflora D. Don (= *capitata* D. Don, = *Aeginetia capitata* Graham = *Coccypselum campanuliflorum* Chamiss., Schtdl. = *C. violaceum* Dsf. = *Hedyotis campanuliflora* Hook.).**Lippia** L., Lippie.

- asperifolia Rich. (= *Verbena globiflora* L'Her. = *V. globulifera* Auct. = *V. odorata* Dsf. = *Zapania lantanoides* Lam. = *Z. odorata* P. = *Z. odoratissima* Scopol.), rauhblättrige, ☿. w. Südamerika.

- dulcis Trevir. (= *asperifolia* Rehb., non Rich. = ? *Verbena globiflora* L'Her.).

- filiformis Schrad., fadenförmige, ♀. w. t. Chili.

- nodiflora Rich. (= *Blairia nodiflora* G. = *Verbena capitata* Forsk. = *V. nodiflora* L. = *Zappania nodiflora* Juss., P., p. 863), β) repens Spgl. (= *Verbena rrpens* Savi = *Zappania repens* Bertol.).

- purpurea Jacq. (= *Lantana achyranthifolia* Dsf. Cat. hort. Par.).

- Schimperi Hochst. (= *Lantana abyssinica* A. Dietr.), Schimper's, ♀. w. t. Abyssinien.

- stoechadifolia H. B. K. (= *Verbena stoechadifolia* L. = *V. suffruticosa* Aubl. = *Zappania reclinata* Lam. = *Z. stoechadifolia* Juss., P., p. 468).

- chamaedryfolia* Steud., *citriodora* Kunth, v. *Aloysia chamaedryfolia et citriodora*, p. 27, II. et p. 37.

- Liquidambar Altingiana* Blume, v. *Altingia excelsa*, p. 41.

- Liriodendron liliifera* L., v. *Talauma pumila et Rumphii*.

- Liriope spicata* Lour., v. *Sansevieria spicata*, p. 720.

- Lisianthus exaltatus* Lam. (= *glaucifolius* Jacq.), *Russelianus* Hook. = *glaucifolius* Nutt.), v. *Eustoma exaltatum et Russelianum*, p. 239, II, *cordifolius*

- L. mant., *exsertus* Sw., *latifolius* Sw., *longifolius* L., *umbellatus* Sw., v. *Leianthus cordifolius* etc.,

- p. 348, II.

Lissanthe RBr., Glattblume.

- Cunninghamii DC., Cunningham's, ☿. t. Neuholland.

- stellata Knwls. et Westc., sternförmige, ☿. t. Neuholl.

- verticillata Lindl., wirtelförmige, ☿. t. Neuholland.

Lissochilus RBr., Glattstendel.

- roseus Lindl. (= *Dendrobium roseum* Sw.), rosafarbig, ♀. w. Sierra Leone.

- streptopetalus Lindl. (= *Eulophia streptopetata* Lindl., p. 319).

Listera nidus avis Hook., v. *Neottia nidus avis*, p. 544.

Lita rosea W., v. *Vohiria rosea*, p. 853.

Lithachne axillaris P. B. (= *pauciflora* Poir.), v. *Olyra pauciflora*, p. 557.

Lithagrostis Lacryma Jobi G., v. *Coix Lacryma*, p. 210.

Lithocarpus cocciformis Targ., Tozz., v. *Attalea funifera*, p. 106.

Lithospermum T., Steinsaame.

arvense L., ? β *caerulescens* DC.

calabrum Tenor., kalabrischer, \S . k. Calabrien.

callosum Vahl (= *angustifolium* Forsk. = *niveum* Poir.), schwieliger, \S . k. Aegypten.

β) *latifolium* DC.

discolor Martens et Galeotti, verschiedenfarbiger, \S . k. t. Mexico.

Gasparinii v. Heldr., Gasparini's, \odot . f. Sicilien.

incrassatum Guss. (= *arvense* β Tenore), verdickter, \odot . f. Sicilien, Nordafrika, Dalmatien, Syrien, Cap der guten Hoffn.

oleaefolium Lapeyr., oelbaumblättriger, \S . k. Pyrenäen.

petraeum A. DC. (= *rosmarinifolium* Rchb., non Tenore = *Echium petraeum* Portenschl.), Felsen-St., \S . 4. k. f. b. Dalmatien.

prostratum Loisel. (= *diffusum* Lag. = *ericetorum* Salzmann. = *purpureo-coeruleum* Thore).

rosmarinifolium Tenor. (= *fruticosum* Sibth. et Sm. = *graminifolium* β R. et S.).

ruderales Dougl., Schutt-St., \odot . f. Columbia.

sericeum Lehm. (= *Anchusa virginica* L. spec. = *Batschia sericea* R. et S.), seidenhaariger, 4. \S . f. Virginien.

spathulatum Martens et Galeotti, spatelförmiger, \odot . f. Mexico.

strictum Lehm., steifer, \odot . f. Mexico.

tenuiflorum L. fil. (= *aegyptiacum* Hortul. = ? *Myosotis tenuiflora* Viv.), β) *albiflorum* DC. (= *tenuiflorum* Jacq. = *Buglossoides ramosissima* Mch.).

Torreyi Nutt. (= *decumbens* Torr., non Nutt., nec Vent. = *Batschia Torreyi* G. Don), Torrey's, 4. f. Nordamerika.

calycinum Moris (= *apulum* Bertero = *chilense* Colla), v. *Amsinckia angustifolia*, p. 50, *clandestinum* Trev. etc., v. *Myosotis*, Sect. II. *Eritrichium clandestinum* etc., *cornutum* Ledeb. (= *decumbens* Vent.), v. *Arnebia cornuta*, p. 85, II., *dahuricum* Lehm. etc., v. *Mertensia dahurica* etc., *divaricatum* Sieb., v. *Echiochilon fruticosum*, p. 215, II., *longiflorum* Speg. (= *incisum* Lehm.), v. *Pentalophus longiflorus*, *longifolium* W. herb., *molle* Mühlbg., *virginianum* L., v. *Onosmodium strigosum*, *molle* (carolinianum) et *virginianum*, *orientale* L. etc., v. *Alkanna orientalis* etc. Nachlese.

Lithoxylon Endl., Steinholz, XXI. v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

Lindleyi Steud. (= *Securinega nitida* Lindl., non W.), Lindley's, \S . w. Taiti.

Litobrochia Presl, v. *Pteris* Sect.

Litsaea Juss., Lam., Litsaea, IX. 1., Laurineae.

dealbata Steud., N. E. (= *Tetranthera dealbata* RBr., p. 802).

glauca N. E. (= *Cinnamomum glaucum* G. Don = *Camphora glauca* G. Don = *Laurus glauca* Thbg.), blaugrüne, f. k. Japan.

obovata N. E. (= *Laurus obovata* Hamilt. herb. = *Tetradenia obovata* N. E. = *Tetranthera Cuipala* Don = *T. obovata* Hamilt., Wall.), verkehrteiförmige, f. w. Ostindien.

Pseudo-culitlawan N. E. (= *Laurus Culitlawan* H. Berol. et Bonn.), unächte Culitlawan-L., f. w. ?

rufa N. E., fuchsrothe, f. t. Neuholland.

zeylanica N. E. (= *trinervis* Dict. de sc. natur., non Juss. = *Dais trinervis* Hrbr. madrit. = *Laurus involucrata* Lam. = *Tetradenia zeylanica* N. E. = *Tetranthera pulcherrima* C. Wall. = *Tomex trinervis* Hrbr. madrit.), zeylanische, f. w. Zeylon.

apetala P. (= *citrifolia* Juss. = *sebifera* P.), v. *Tetranthera Roxburghii*, *Myrrha* Mirb., v. *Daphnidium Myrrha*, p. 191, II.

Littaea Brignol., *geminiflora* Brign., v. Agave, Sect. II., p. 24 et p. 14, II.**Livistonia** RBr., Livistonie.

australis Mart. = *Corypha australis*, p. 222.

chinensis RBr. (= *Latania borbonica* Lam. = *L. chinensis* Jacq., p. 447).

rotundifolia Mart. = *Corypha rotundifolia* Lam., p. 161, II.

Llagunoa R. et P., Llagunoa.

glandulosa Don (= *Amirola glandulosa* Hook.), drüsige, f. t. Chili.

Lloydia Salisb., Lloydia.

graeca Endl. (= *Anthericum graecum* L. = ? *A. trinervium* Visian. = *Phalangium graecum* Poir.), griechische, 4. k. Griechenland.

serotina Salisb., Rchb. (= *alpina* Salisb. = *striata* Swt. = *Nectarobothrium striatum* Ledeb. = *Anthericum serotinum* L. = *Bulbocodium alpinum* Mill. = *Phalangium serotinum* Lam. et DC. = *Gagea striata* Swt. = *Ornithogalum striatum* W. = *O. serotinum* L.).

Loasa Adans., Loasa.

ambrosiaefolia Juss., ambrosiablätterige, ☉. m. f. Peru.

β) *hispida* L. (= *urens* Jacq.).

bryonaefolia Schrad. (= *palmata* Spgl.), zaunrübenblättrige, ☉. m. f. Chili.

lucida Lindl., glänzende, ☉. m. f. Südamerika.

Pentlandii Paxt., Pentland's, ☉. Sch. m. f. Peru.

xanthiifolia Juss., spitzklettenblättrige, ☉. m. f. ? Peru.

Hybride: *Herberti* H. angl.

lateritia Gill., Hook. (= *aurantiaca* Hort.), v. *Cajophora lateritia*, p. 103, II., *volubilis* Hort., v. *Grammatocarpus volubilis* β, p. 273, II.

Lobadium aromaticum Rafin., *suaveolens* Rafin., v. *Rhus aromatica* et *suaveolens*, p. 686 et 687.

Lobaria cernua Haw., *rivularis* Haw., *sibirica* Haw., v. *Saxifraga cernua*, *rivularis*, *sibirica*, p. 724 et 725.

Lobelia L., Lobelie.

I. Centropogon Presl, DC., Spitzbart.

Andropogon DC. (Cav.), (= *L. surinamensis* var. Cham. = *Siphocampylus Andropogon* G. Don), männlicher, ♀. w. Quito.

fastuosus Scheidw., prächtiger, ♀. w. Mexico.

grandis Presl (L. fil.), großer, ♀. w. Neugranada.

hirtus Presl (Cav.), (= *Siphocampylus hirtus* G. Don), rauher, ♀. w. Quito.

surinamensis Presl (L.), (= *L. spectabilis* H. B. K. = *L. sphaerocarpa* Jacq. herb. = *Siphocampylus macranthus* Pohl = *S. spectabilis* G. Don = *S. surinamensis* G. Don).

II. Dobrowskya Presl, DC.

aspera DC. (Spgl.), (= *Eckloniana* Presl = *Zeyheriana* Presl = *Cyphia simplex* Spgl. = *Lobelia Chamae-pithys* Spgl. = *L. scabra* Spgl.), rauhe, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

V. Laurentia Michel.

canariensis DC. (= *Solenopsis canariensis* Presl), canarische, ☉. f. Teneriffa.

VI. Lobelia genuina (= *Rapuntium* T., Presl).

anceps L. (= *alata* LaBill. = ?*procumbens* Otto = *Schrankii* Swt. = *secunda* Schrk. = *Dobrowskia anceps* Presl).

Claytoniana Mehx. (= *goodenioides* W. herb. = *pallida* Mühlbg. = *spicata* Lam.), Clayton's, ♀. f. Nordam.

depressa L. (= *Mezleria depressa* Presl ex parte), niedergedrückte, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

discolor Kl. (= *picta* Hort.), verschiedenfarbige, ♀. k. Mexico.

Dortmannia L., (= *Dortmannia palustris* G. Don).

Erinus L. (= *procumbens* Hort. = *Rapuntium Erinus* Mill.) var. grandiflora Paxt.

fulgens W., β) propinqua H. angl., γ) multiflora van Houtte, δ) pyramidalis v. Houtte.

heteromalla Schrad., verschiedenwendige, ☉. m. Cap der guten Hoffn.

Heyneana Wall., Heyne's, ☉. m. f. Ostindien.

ignea Arrabida feuerfarbige, ♀. t. w. Brasilien.

minutiflora Kunze, kleinblumige, ☉. m. f. Mexico.

pusilla DC. (= *Rapuntium pusillum* Presl), niedrige, ☉. m. f. Mexico.

rugulosa Grah. (= *maculata* Penny = *Pratia rugulosa* Don = *Rapuntium rugulosum* Presl).

splendens W., β) atrosanguinea Hort., γ) princeps Otto et Dietr.

texensis Rafin. (= *punicea* Otto et Dietr. = *Schiedeana**, *ignea* Hort. etc.).

thapsoidea Schott (= *Geniostoma brasiliense* Spgl. = *Rapuntium thapsoideum* Presl), königskerzenähnliche, ♀. w. Brasilien.

Hybriden: altontoweriensis, aurantiaca, azurea, belgica, dracocephaloides, eximia, formosa, grandiflora, Jupiter, limburgensis, Makoyi, phoenicea, Richardsonii, sanguinea, topaz, Vulcain etc.

VII. Monopsis Salisb.

litigiosa Fisch. et Mey. (= ?*scintillaris* Hort. = *Lobelia conspicua*, *inconspicua*, *debilis* Hort.). bestrittene, ☉. ♂. m. f. ?

Lobelia

- XI. *Siphocampylus* Pohl, A. DC., G. Don.
barbatus G. Don (= *Lobelia barbata* Cav.), bärtige, ♀. Peru, Neugranada.
betulaefolius Hook., G. Don (= *Lobelia betulaefolia* Cham., Presl), birkenblättrige, ♀. t. Brasilien.
bicolor G. Don (= *Lobelia laxiflora* H. B. K. = *Cavanillesiana* R. et S. = *persicaefolia* Cav.), zweifarbige, 4. ♀. k. t. Mexico.
 β) *angustifolia* (A. DC.), (= *Cavanillesii* Hort. = *Lobelia Cavanillesii* Mart., Grah.).
biserratus DC. (= *Cavanillesianus* G. Don = *Lobelia biserrata* Cav.).
coccineus Hook., scharlachfarbige, ♀. t. Brasilien.
cordatus H. belg., herzförmige, ♀. t. ? Südamerika.
crenatifolius Pohl (= *Lobelia crenata* Presl), kerbblättrige, ♀. t. Brasilien.
duploserratus Pohl (= *Lobelia triphylla* Presl), doppel-sägezähnlige, 4. ♀. t. Brasilien.
giganteus G. Don (Cav.), (= *Lobelia Tupa* Donn = *L. Tupa coccinea* Hort.).
lantaniifolius A. DC., lantänenblättrige, ♀. t. Caracas.
 β) *glabriusculus* Bot. mag.
longepedunculatus Pohl (= *L. pedicellaris* Presl), langstielige, ♀. t. Brasilien.
Parthoni H. angl. et belg., Parthon's, ♀. t. Südamerika.
 b) *major*.
revolutus Grah. (= *spicatus* Hort.), zurückgerollte, ♀. t. Caledonia.
rugosus A. DC. (Presl), runzelige, ♀. t. Peru.
umbellatus G. Don (H. B. K.).
verbascifolius A. DC. (Presl).

XII. *Tupa* Swt., A. DC., G. Don.

- Feuillei* G. Don (= *L. Tupa* L. = *Rapuntium Tupa* Presl).
mucronata A. DC. (Cav.), (= *T. Cavanillesiana* G. Don).
salicifolia Swt. (G. Don), (= *arguta* G. Don = *L. arguta* Lindl. = *L. Brandtii* H. Par. = *L. excelsa* Bonpl. Malm. = *L. gigantea* Sims, non Cav. = *L. neriifolia* Moris = *L. Tupa* Ait., non L.).
 Ob *L. amplexifolia* Makoy Catal. zu dieser Abtheilung gehört, ist mir unbekannt.
Lobostemon Lehm., Buek, Schuppenfaden, V. 1., Asperlfoliaceae.
argenteus Buek, (= *Echium argenteum* a Lehm. = ? *E. fruticosum* Jacq. hort. Schönbr.), silberfarbiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
capitatus Buek, (= *Echium capitatum* Thbg., L. mant. = *E. hispidum* Burm.), kopfförmiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
ferocissimus A. DC. (= *Echium ferocissimum* Andr. = *E. ferox* P. = *E. argenteum* Roth), stachelborstiger, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.
fruticosus Buek, (= *Echium fruticosum* L. = *E. africanum* P.), strauchiger, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.
 β) *Bergianus* A. DC. (= *Echium Bergianum* E. Mey. = *E. fruticosum* Berg. = *E. scabrum* Lehm.).
glaber Buek, (= *Echium falcatum* Lam. = *E. glabrum* Vahl, non Thbg. = *E. Vahlia* R. et S.), kahler, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Lobostemon

- glaucophyllus Buek, (= *Echium glaucophyllum* P. = *E. glabrum* Thbg., non Vahl = *E. laevigatum* Lam., non L.), blaugrünblättriger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. H.
- hispidus A. DC. (= *Echium hispidum* Thbg.), steifhaariger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- laevigatum Buek, (= *Echium laevigatum* L. = *E. Schwartzii* Drege, non alior.), glattlicher, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- lasiophyllus A. DC. (= *Echium lasiophyllum* Lk. Enum. = *E. longifolium* Hortul., non Delil.), haarblättriger, $\frac{1}{2}$. t. k. ?
- lucidus Buek, (= *Echium lucidum* Lehm.), spiegelnder, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- paniculatus Buek, (= *Echium paniculatum* Thbg., non Drege), rispiger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- rosmarinifolius A. DC. (= *Echium rosmarinifolium* Vahl), rosmarinblättriger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- sphaerocephalus Buek, (= *Echium sphaerocephalum* Vahl, = *E. capitatum* β Lam.), kugelköpfiger, 4. $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- strigosus Buek, (= *Echium strigosum* Sw.), striegeliger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- Swartzii Buek, (= *Echium Swartzii* Lehm. = *E. angustifolium* Sw., non Lam., nec Mill. = *E. papillosum* Thbg. ? non Lehm.), Swartz's, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. H.
- trichotomus A. DC. (= *Echium trichotomum* Thbg. = *E. canaliculatum* Drege), dreizinkiger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- verrucosus Buek, (= *Echium verrucosum* Sw.), warziger, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. Hoffn.
- formosus* Buek, *spicatus* Buek, v. *Echium formosum et spicatum*.
- Lobularia halimifolia* Steud., *libyca* Meisn., *maritima* Desv., *nummularia* Steud., *pyrenaica* Steud., *rupestris* Steud., *spinosa* Steud., v. *Koniga halimifolia* etc., p. 439 et p. 336, II., *canescens* Steud. etc., v. *Ptilotrichum canescens* etc.
- Lochnera rosea* Rchb. (= *Cataranthus roseus* G. Don), v. *Vinca rosea*, p. 849.
- Lodoicea** Commers., Sechellarum LaBill. (= *maldivica* P.).
- Loeselia Cervantesii* G. Don, *coerulea* G. Don, *coccinea* G. Don, *glandulosa* G. Don, v. *Hoitzia Cervantesii* etc., p. 402 et p. 303, II.
- Loethainia** * (R. B. v. Römer auf Löthain u. Neumark in Sachsen), vergl. p. 883.
- floribunda* * (= *Crotalaria floribunda* Lodd. = *Wiborgia floribunda* E. Mey. = *W. obcordata* Eckl., Zeyh., non Thbg.), blüthenreiche, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap d. g. H.
- Logania** RBr., Loganie.
- odoratissima* Hort. belg., wohlriechendste, $\frac{1}{2}$. t. ? Neuholl.
- Patersoniana* v. Houtte, Paterson's, $\frac{1}{2}$. t. ? Neuholland.
- ligustrina* Cunningh., v. *Geniostoma ligustrifolium*, p. 257, II.
- Lolium** L., Lolch.
- arvense* Wither. (= *annuum* Bernh. = *tenue* MB.).
- Bouchéanum* Kunth (= *italicum* A. Braun).
- brasilianum* N. E., brasilianischer, 4. k. Montevideo.
- maximum* W. (= *giganteum* Hort.), größter, \odot . f. Jamaika.
- perenne* L., c) *compositum* Thuill. (= *cristatum* P., Hort.).

Lomandra angustifolia H. Cels. (= *longifolia* LaBill.),
v. *Xerotes longifolia*, p. 860.

Lomaria W., Saumfarn.

australis Lk. (= *minor* Lk. Hort. berol. excl. syn. Br.
= *pumila* Kaulf. = *Blechnum australe* L., p. 124
= *B. auriculatum* W. = *B. rigidum* W.).

campylothis Kunze, krummöhrriger, 4. w. Caracas.

capensis W., capischer, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Gilliesii Hook. et Grev., Gillies's, 4. w. Chili.

hastata Kunze (= *Blechnum hastatum* Kaulf., p. 125).

Meyeriana Kunze, Meyer's, 4. w. ? Cap d. g. Hoffn.

punctulata Kunze, (= *auriculata* Desv. = *densa* Kaulf.
= *Blechnum auriculatum* Endl. = *B. punctulatum*
Sw.), feinpunktirter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Lomatia RBr., Lomatie.

cordata v. Houtte, herzblättrige, 5. t. Neuholland.

ferruginea RBr. (= *Embothrium ferrugineum* Cav. =
? *Rupala diversifolia* RBr. = *Trycondylus ferrugineus*
Knght. et Salisb.), rostfarbige, 5. t. China.

ilicifolia RBr. (= *coccinea* Hort.), β) pinnatifida Bot. mag.

Lomatium Rafin., Saumdoldler, V. II., Umbelliferae.

villosum Rafin. (= *Cogswellia villosa* Schult. = *Ferula*
foeniculacea Nutt. = *Pastinaca foeniculacea* Sgl.),
zottiger, 4. f. Nordamerika.

Lomatogonium carinthiacum v. Braune, v. Pleuro-
gyne carinthiaca.

Lonchitis repens L., v. *Cheilanthes repens*, p. 137, II.

Lonicera L., Dsf., Lonicere.

I. *Caprifolium* T.

albiflora Torr. et Grey, weifsblumige, 5. Sch. f. Nord-
amerika (Arkansas).

Caprifolium L. (= *C. hortense* Lam. = *C. italicum* R.
et S.), β) *glauca* Meerb. (= *italica* Schm.).

dimorpha Tausch (= *etrusca* Hort., non Savi), zwei-
förmige, 5. Sch. f. ?

hispidula Dougl. (Lindl.), (= *microphylla* Hook.), steif-
haarige, 5. Sch. f. b. Nordwestl. Amerika.

oblongifolia Hook. (Sw.), (= *sempervirens* β Bot. mag.),
länglichblättrige, 5. Sch. f. Nordamerika.

parviflora Lam. (= *marylandica* Hort.).

pubescens Swt. (Hook.), (= *villosa* Mühlbg. = *Goldii*
Sgl. = *hirsuta* Eaton).

II. *Isika* Adans.

discolor Lindl., verschiedenfarbige, 5. k. Nordindien.

diversifolia Wall., verschiedenblättrige, 5. f. b. Himalaya.

Ledebourii Eschsch., Fisch., Ledebour's, 5. f. Californien.

Sieversiana Bunge, (= *alpigena* Sievers, = *microphylla*
a robustior Ledeb.), Sievers's, 5. f. Alt. Sibirien.

villosa Mühlbg. (= *coerulea canadensis* Lam. = *Xylos-*
teum canadense Duham. = *X. oblongifolium* Goldie
X. Solonis Eaton = *X. villosum* Mchx.).

III. *Nintoa* Swt., Webb.

canescens Schousb., Webb (= *biflora* Dsf.).

japonica Thbg., Swt. (= *chinensis* Wats. = *flexuosa*
Lodd. ? = *glabrata* Wall.).

confusa DC., Swt. (= *japonica* Andr., Ker).

longiflora DC., Swt. (= *Caprif. japonicum* D. Don =
C. longiflorum Lindl. = *C. nepalense* G. Don).

IV. *Xylosteum* T.

nigra L., β) *campaniflora* Loud.

Lonicera

- tatarica L., δ) lutea Lodd. (= *xanthocarpa* Hort.), ε)
 angustata Wender., ζ) caucasica Hort.
xylosteooides Tausch, heckenkirschähnliche, ♀. f. (?Hybride).
 Unbestimmtere: *bonariensis* Nois., *rotundifolia* Hort.,
speciosa Wender. — Hybriden oder Variet. ? *epsomensis* Hort., *Youngii* Hort.

Lopezia Cav., Lopezie.

- haematodes* Kunze, blutfarbige, ♂. t. k. Mexico.
integrifolia DC., ganzblättrige, ⊙. m. f. Mexico.
lineata Zuccar., linirte, ♀. t. k. Mexico.
oppositifolia Lagasca (= *mexicana* Jacq. var. ? Spgl.),
 gegenblättrige, ⊙. m. f. Neuspanien.
pumila Bonpl., niedrige, ⊙. m. f. Mexico.
trichotoma Schtdl., dreizinkige, ⊙. m. f. Mexico.

Lophanthus Benth., Büschelblume.

- chinensis* Benth. (= *obtusifolius* * p. 477 = *Hyssopus*
Lophanthus L. = *H. resupinatus* Mch. = *Nepeta*
lophantha Fisch.), chinesische, 4. f. Nordchina, Sibirien.
multifidus Benth., v. *Nepeta lavandulacea*, p. 545.
Lophia phoenicea Desv., v. *Alloplectus cristatus*,
 p. 22, II.
Lophiolepis araneosa Cass., *calocephala* Cass., *du-*
bia Cass., *nutans* Cass., v. *Cirsium fimbriatum*,
ciliatum, *lanceolatum*, *cernuum*, p. 198.

Lophira africana Banks, Loud. (= *alata* G. fil.).

- Lophochloa phleoides* Rchb., v. *Koeleria phleoides*,
 p. 439 et 336, II.

Lophoclinium Endl., Büschelköpfchen, XIX. II.,
Compositae-Corymbiferae (Senecioideae).

- album* Endl., weißes, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland.
citrinum Endl., citronfarbiges, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholl.
hirtum Endl., rauhhaariges, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland.
Manglesii Endl., Mangles's, ⊙. m. f. Südwestl. Neuholland.

Lophopetalum Wight, Schopfkronenblatt, V. I., Ce-
lastrineae.

- grandiflorum* Wght. (= *Evonymus grandiflorus* Wall.),
 grofsblumiges, ♀. w. t. Ostindien.
lucidum Wght. (= *Evonymus lucidus* Don), spiegelndes,
 ♀. w. t. Ostindien.

Lophosciadium DC., Schopfdolde, V. II., Umbelliferae.

- millefolium* DC. (= *Ferula meoides* L. = *Laserpitium*
millefolium Vent), garbenblättrige, 4. f. b. Orient,
 Taurien.

Lophospermum D. Don, Schopf-(Büschel-)saame.

- erubescens* D. Don (= *scandens* Bot. mag. et Bot. reg.).
scandens D. Don (= *mexicanum* Hort. = *Besleria*
scandens Moç., Sess.).

Variet. oder Hybriden: *grandiflorum* Hort., *Hendersonii*
 Paxt., *spectabile* Paxt.

- atrosanguineum* Zuccar. (= *Rhodochiton* D. Don),
 v. *Rhodochiton volubile*, *physaloides* D. Don, v.
Melasma hispidum.

Lophostemon Schott, Büschelfaden, XVIII. II., Myr-
taceae.

- arborescens* Schott (= *Tristania arborescens* H. angl.,
 p. 823).
depressa Schott (= *Tristania depressa* Lodd., Lk. Enum.,
 p. 823).
robustum Schott, starker, ♀. t. k. Oestl. Neuholland.

Loranthus L., Riemenblume.

oleaeifolius Cham., Schldtl. (= *Lichtensteinii* W. herb. = *speciosus* Dietr., non Pohl = *Lichtensteinia oleaeifolia* Wendl.), oelbaumblättrige, ⚥. t. Cap d. g. H.

Lorentea Less., DC., non Ortega (= *Lorentia* Swt.), (Lorente, spanischer Gelehrter etc.), XIX. II.

canescens L. (= *Pectis canescens* H. B. K., p. 592 = *Stammarium hyssopifolium* W. herb.).

humifusa Less. (= *Chthonia humifusa* Cass. = *Pectis humifusa* Swt., p. 592).

saturejoides Less. (= *Aster saturejaefolius* Houst. = *Inula saturejae* Speg. = *I. saturejoides* Mill.), satureiähnliche, 4. k. Mexico.

Loroglossum antropophorum Rich., v. *Aceras antropophora*, p. 9, *hircinum* Rich., v. *Himantoglossum hircinum*, p. 880.

Lotus T., L., Schotenklee.

albidus Loud. (= *albicans* Hort.), weißlicher, ⚥. k. Neuholland.

americanus Bischoff, (= ? *Trigonella americana* Nutt., DC.), amerikanischer, ☉. f. Nordamerika (Arkansas).

Candolleanus Swt. (= *australis* β *angustifolius* DC.), Candolle's, ⚥. k. t. Neuholland.

corniculatus L., β) *arvensis* Schkr. (= *tauricus* Hort.), γ) *ciliatus* Tenore, δ) *villosus* Thuill., ε) *alpinus* Schleich., ζ) *crassifolius* P.

creticus L. (= *sericeus* Mch.).

cytisoides L. (= *diffusus* Schkr. = *glaucus* Mch.).

edulis L. (= *oligoceros* Dsf., Scop. = *Krockeria oligoceros* Mch.).

Gebelia Vent. (= *varians* Desv.).

glinoides Delil., vergl. p. 883.

obovatus Swt., verkehrteiförmiger, 4, k. t. Neuholland.

odoratus Schousb., wohlriechender, 4. ⚥. k. Marocco.

peregrinus L. (= *Dioscoridis* All. = *oligoceros* Lam. = *villosus* Forsk.).

suaveolens P. (= *odoratus* Curt., Sims, non Schousb.), feinriechender, 4. f. Südfrankreich.

tenuifolius Pall., non Presl, (= *decumbens* Forst. = *depressus* W. = *Forsteri* Swt. = *humifusus* W. = *tenuis* Kit. = *corniculatus* L. var. Auct.).

Außerdem werden in den Verzeichnissen der botanischen Gärten noch erwähnt: *adnatus* H. Berol., *fruticulosus* Dsf., *rotundifolius* H. Lowan., *strigosus* H. Berol.

argenteus Brot., v. *Argyrolobium Linnaeanum*, p. 44, II., *microphyllus* Hook., v. *Bonjeania microphylla*, *medicaginoides* Retz, v. *Trigonella Calliceras*, p. 821, *ononoides* Lam. (= *persicus* Hort. = ? *odoratus persicus* Burm.), v. *Ononis aspalathoides*, *subpinnatus* Lag., *Wrangelianus* Fisch. et Mey., v. *Hosackia subpinnata* et *Wrangeliana*, p. 305, II.

Loudonia anthylloides Bertero, v. *Adesmia Loudonia*, p. 10, II.¹⁾

Loureira Cav., Loureira.

peltata Dsf. Hort. Par. (= *Mozinna peltata* Steud.), schildblättrige, ⚥. t. w. ?

1) *Loudonia aurea* Lindl. Halorageae. Neuholl., scheint bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Lowea berberifolia Lindl., p. 479, (= *Rosa monophylla* Hort. = *R. persica* Mchx. = *R. simplicifolia* Salisb. = *Hultheimia berberifolia* Dumort.), β) Hardyi (= *R. Hardyi* H. Par.), Hybride mit *Rosa involucrata* erzeugt, Hardy.

Loxidium galegifolium Vent., v. *Swainsonia galegifolia*, p. 793.

Lubinia atropurpurea Lk. et Otto, (= *purpurea* Swt.), v. *Lysimachia nutans*.

Luculia Swt., *Luculia*.

cuneifolia Don (= *Mussaenda cuneifolia* Don), keilblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Nepal.

Pinciana Hook., Pincis, $\frac{1}{2}$. t. Nepal.

Lucuma Molin., Juss., *Lucuma*.

Cainito R. et S. (= *Achras Cainito* R. et S. = *Lobatia Cainito* Mart.), Cainito-L., $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.

mammosa G., Juss. (= *Achras mammosa* L. = *A. Lucuma* Blanco), zitzenförmige, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika, Westindien, Philippinen.

Rivicoa G. fil. (= *Achras glaucescens* W. herb. = *Bumelia nervosa* Vahl, p. 138, = *Chrysophyllum Cainito* Aubl. = *C. macrophyllum* Lam., nec alior.), Rivicoa-L., $\frac{1}{2}$. w. Guiana, Para.

Ludwigia L., *Ludwigie*, p. 479.

erigata L. (= *alternifolia* Burm. = *subtriflora* Desr. = *triflora* Spgl.), dreiblumige, \odot . m. f. Ostindien.

parviflora Roxb. (= *diffusa* Hamilt. = *jussiaeoides* Hrb. Madr. = *oppositifolia* L. = *perennis* L., non Burm. = *zeylanica* P. = *Jussiaea caryophyllea* Lam.).

alternifolia L. etc., *hirsuta* L., v. *Isnardia alternifolia et hirsuta*, p. 323, II., *decurrens* Walt., v. *Jussiaea decurrens*, p. 331, II.

Luetkea Bongard, (= *Luitkea* Auct. = *Lutkea* Auct.), Luetkea, X. II., Rosaceae-Spiraeaceae Bong. (Saxifrageae Meisn.).

sibbaldioides Bong. (= *Eriogynia pectinata* Hook. = *Saxifraga pectinata* Pursh), kammförmige, 4. f. Nordamerika. (Ob eingeführt?)

Luehea W., *Lühea*.

rosea v. Houtte, rosafarbige, $\frac{1}{2}$. w. ?Brasilien.

speciosa W. (= *Rhexia brasiliensis* Hffg.), prächtige, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.

Luffa T., Cavan., *Luffa*.

aegyptiaca DC. (= *arabum* Mill. = *Momordica Luffa* L.).

Jacquini Schrad. (= *foetida* Jacq. H. Vindob., non Cav. = *striata* Schrad.), Jacquin's, \odot . m. f. Ostindien.

pentandra Roxb. (= *L. Cattu-picinna* Sering. = *Petola* Sering.), fünfmännige, \odot . m. f. Ostindien.

Pluckenetiana Sering. (= *amara* Roxb. = *Cucumis acutangulus* β Lam. = *C. operculatus* Roxb.), Pluckenet's, \odot . m. f. Ostindien.

Lumnitzera densiflora Spgl., v. *Plectranthus rugosus*, *prostrata* Spgl., v. *Geniosporum prostratum*, p. 257, II., *tenuiflora* Spgl., v. *Ocymum sanctum*, p. 553. Hinsichtl. d. übrig. s. *Moschosma*.

Lunaria halimifolia All., *libyca* Viv., v. *Koniga halimifolia et libyca*, p. 439 et p. 336, II., *Ricotia* Desv. (= *aegyptiaca* Mill.), v. *Ricotia Lunaria*, p. 691.

Lundia DC., non Thonn., Schum., (Lund, dänischer Botaniker und Entomolog, welcher Brasilien bereiste), XIV. II., Bignoniaceae.

cordata DC. (= *Alsocydia lasianthera* Mart. = *Bignonia cordata* fl. flum. = *Tecoma lasianthera* Mart.), herztörmige, ♀. Sch. w. Brasilien.

Lupinaster albens Bess. etc., v. *Trifolium albens* etc., p. 818 etc.

Lupinus T., Wolfsbohne.

albescens Hook., Arn., weifslische, 4. k. f. b. Chili.

albicaulis Dougl., weifsstengelige, ☉. 4. f. b. Columbia.

alopecuroides Desr., fuchsschwanzähnliche, 4. ♀. k. Quito (Peru).

andicola Gill., Hook., Anden-W., ☉. f. Chili.

argyraeus DC., silberige, 4. f. b. k. ?

arvensis Benth., Acker-W., ☉. ♂. f. k. Peru.

aureo-nitens Gill., Hook., goldschimmernde, ☉. f. Chili.

Barkeriae Knw. et Westc., Lindl., Barker's, ☉. f. Mexico.

bilineatus Benth., doppeltlinirte, 4. f. b. k. Mexico.

Bivonii Presl (= *prolifer* Desr., nec Lam.), Bivone's, ☉. f. Sicilien.

caespitosus Nutt., rasenartige, ? 4. f. Nordamerika, (Rocky mountains).

Chamissonis Eschsch. (= *sericeus* Hook.), Chamisso's, 4. f. Neucalifornien.

Consentinii Guss. (= *hirsutus* Bory, Sieb., non L.), Consentini's, Sicilien, Griechenland.

coriaceus Benth., lederartige, 4. ♀. k. Brasilien.

cytisoides Ag., geißkleeähnliche, ? 4. f. Californien.

decumbens Torr., niederliegende, 4. ♀. f. Nordamerika (Arkansas).

diffusus Nutt., weitschweifige, 4. f. b. Carolina.

elegans H. B. K., zierliche, ☉. f. Mexico.

exaltatus Zuccar., hohe, ♀. ♀. k. Mexico.

flabellatus Bertol., fächerförmige, ? ♀. k. Guatimala.

glabratus Ag., kahle, 4. ♀. f. b. k. ?

gracilis Ag., non H. B. K., schlanke, ? 4. f. Californien.

graecus Boiss. et Sprun., griechische, ☉. f. Griechenland (Sparta).

Gussoneanus Ag. (= *micranthus* Guss., non Dougl.), Gussone's, ☉. f. Sicilien.

Hartwegii Lindl., Hartweg's, ☉. 4. ♀. f. b. k. Mexico.

holosericeus Nutt., Torr. et Gr., sammethaarige, 4. ♀. f. b. Nordamerika.

integrifolius L., ganzblättrige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Kunthii Ag. (= *microphyllus* H. B. K.), Kunth's, ♀. k. Quito.

laxiflorus Dougl., β) *foliosus* Torr. et Gr. (= *arbustus* Dougl.), γ) *tenellus* Torr. et Gr.

leptocarpus Benth., schlankfrüchtige, ♀. k. Mexico.

leucophyllus Lindl. (= *densiflorus* Nutt.).

leucopsis Ag., weißschauende, 4. f. Nordwestl. Nordamer.

luteus L. (= *odoratus* Hort.).

macrocarpus Hook., Arn., großfrüchtige, 4. ♀. f. b. Californien.

macrophyllus Benth., großblättrige, 4. f. ?

microcarpus Sims, kleinfrüchtige, ☉. f. Chili.

minus Dougl., kleinste, ☉. 4. f. Nordamerika.

montanus H. B. K., bergliebende, ♀. k. Neuspanien.

ramosissimus Benth., ästigste, ☉. ♀. f. k. Chimborazo.

reticulatus Desv., netzförmige, ☉. f. Frankreich.

Lupinus

sarmentosus Desr. (= *gracilis* H. B. K.), starkwurzelnende, 4. ⚥. k. Peru.

Schiedeanus Steud. (= *leptophyllus* Cham., Schltldl., non Benth.), Schiede's, ⚥. k. Mexico.

Smithianus H. B. K., Smith's, ⚥. k. Quito.

subsessilis Benth., weniggestielte, 4. k. Brasilien.

succulentus Dougl., saftige, ? 4. f. Nordwestl. Amerika.

sulphureus Dougl. schwefelgelbe, ? 4. f. Nordamerika.

texensis Hook. (= *subsarnosus* Hook.).

trochophyllus Hffg., radblättrige, 4. f. ? (?Hybride.)

truncatus Nutt., abgestulzte, ? 4. f. Californien.

variegatus Fisch., non Poir., bunte, 4. f. Insel Sitka.

velutinus Benth., sammetartige, 4. k. Brasilien.

guadeloupensis Hort. (= *guatimalensis* Hort.), v. *Dolichos fabaeformis*.

Luthera virginica Schultz, v. *Cynthia virginica*.

Luxenburgia St. Hil., Luxemburgie, XVI. VIII. Violaceae.

ciliosa Gardener, (= *Plectanthera ciliosa* Mart.), gewinnperte, ⚥. w. Brasilien.

Luzula DC., Aftersimse.

hyperborea RBr., nördlichste, 4. f. Lappland, Norwegen.

β) *angustifolia* Hook., γ) *latifolia* Hook.

maxima DC. (= *sylvatica* Bichen.), β) *Sieberi* Tausch.

multiflora Lej. (= *nemorosa* Presl = *pallescens* Weihe = *campestris* L. var. Auct.).

nivea DC., β) *rubella* M. et K., Fisch. et Mey. (= β) *livida* Desv.).

Lycaste Lindl., Lycaste, XX. 1., Orchideae.

gigantea Lindl. (= *Maxillaria Heynderickii* Morren), riesenförmige, 4. w. Guajaquil.

macrophylla Lindl., großblättrige, 4. w. ? Brasilien.

plana Lindl., flache, 4. w. Brasilien (Bolivia).

Skinneri Lindl., Skinner's, 4. w. Guatemala.

Lychnanthus volubilis S. G. Gmel. (= *scandens* Gmel.), v. *Cucubalus bacciferus*.

Lychnidea tomentosa Burm., v. *Manulea tomentosa*, p. 495.

Lychnis L., Lichtnelke.

I *Eudianthe* Rchb., Fenzl.

aspera Poir. (= *oculata* J. Backh. = *Viscaria oculata* Lindl.), rauhe, ☉. f. Nordafrika.

Coeli rosa Desr., Fenzl, (= *clavata* Mch. = *Agrostemma coeli Rosa* L. = *Coronaria Coelirosa* Fr.),

β) *pusilla* Poir. (= *Agrostemma pusilla* Dsf.).

II. *Eulychnis* DC. (= *Genuina*), (= *Agrostemma* W., G. Don, Swt.).

Bungeana Fisch. et Mey. (= *Agrostemma Bungeana* D. Don, Hook.), Bunge's, 4. k. China.

coronaria Desr., Lam. (= *coriacea* Mch. = *Agrostemma coronaria* L. = *Silene coronaria* Clairv.), β) *mutabilis* Rolliss. (?Hybride.)

diclinis Lagasc. (= ?*laeta* Ait. var. Spgl. = *Agrostemma diclinis* G. Don, Swt. = *A. dioica* Dufour), zweihäusige, ☉. ♂. f. k. Spanien.

grandiflora Jacq. (= *coccinea* Hort. = *coronata* Thbg. = *Agrostemma Banksia* Meerb. = *Hedona sinensis* Lour.).

chalcedonica L., f) *lateritia* Hort., g) *mutabilis* Hort., h) *nana* fl. pleno Hort., *corsica* Lois. (= *laeta* Ait.

Lychnis

var. Spgl. = *Agrostemma corsica* G. Don, Swt), decumbens Steud. (= *Agrostemma decumbens* Denson), Densoni Steud. (= *Agrost. perennans* Dens.), flos Jovis Desr. (= *Agrost. fl. j.* L.), fulgens Fisch., laeta Ait. (= *palustris* Brot. = *Agrost. laeta* G. Don, Swt. = *A. parviflora* Hort.), ?media Hort., F. et Mey., nivalis Kit., pyrenaica Berger (= *Nummularia* Lapeyr. = *Agrost. pyren.* G. Don), saxatilis Turcz. (= *Agrost. saxat.* G. Don, Swt.), sibirica L. (= *Agrost. sibirica* G. Don, Swt.), gehören auch zu dieser Section. Vergl. p. 482 u. 883.

II^b. Flos cuculi s. Coccyganthe Rehb.

Cyrilli Richt., Cyrillo's ¹⁾, 4. f. ? Neapel

Flos cuculi L. (= *laciniata* Lam. = *Agrostemma flos cuculi* G. Don, Swt. = *Coronaria flos cuculi* A. Braun = *Melandrium flos cuculi* Röhl.).

III. *Melandrium* Clus., Röhl., Fenzl, (= *Gasterolychnis* Fenzl, Fr.).

soongarica Fisch., Mey., Lall., soongarische, 4. f. Soongaria. tristis Bunge, Fenzl, traurige, 4. f. b. Altai.

apetala L., β) brachypetala Fisch., Fenzl, γ) pauciflora DC. (= *L. uniflora* et *pauciflora* Fisch. = *inclusa* Lehm.), divaricata Rehb., nemoralis Heuff., pratensis Spgl. (= *L. dioica* β L. = *alba* Mill. = *arvensis* Schk. = *vespertina* Sibth. = *Saponaria dioica* Mch.), sylvestris Hoppe (= *dioica* α L. = *diurna* Sibth.), p. 482 u. 883 gehören zu dieser Section.

M. noctiflorum Fr. et *M. Pumilio* Fr., v. *Silene noctiflora*, p. 758 et *Hohenwarthia Pumilio*, p. 303, II.

IV. *Viscaria* Riv., Röhl.

alpina L., α) lapponica et β) helvetica G. Don.

Viscaria L. (= *vulgaris* Röhl.).

Außerdem werden in den Gärten unter folgenden Namen noch kultivirt: amoena fl. pleno, atropurpurea Roem., Fortunei, laciniata v. Houtte, lusitanica Mill., suecica Steud. (= *Agrostemma suecica* Maund), deren Stellung unter die Sectionen mir unbekannt ist.

Lyciopsis thymifolia Spach, v. *Fuchsia thymifolia*,

Lycioserissa capensis R. et S., v. *Plectronia ventosa* β.

Lycium L., Bocksdorn.

auriculatum Brotero, geöhrt, ♀. ? ? ?

barbarum L. (= *halimifolium* Mill.).

chilense Miers, (= *nutans* Poepp.), chilesischer, ♀. k. f. b. Chili.

fuchsoides H. B. K., fuchsiaähnlicher, ♀. k. Südamer.

inerme Mill., ? Wender., unbewehrter, ♀. Sch. f. ?

lanceolatum Poir., β) turbinatum Duham. (= *barbarum* DC. = ? *halimifolium* Mill.).

aggregatum R. et P. (= *arborescens* Spgl.), v. *Acnistus arborescens*, p. 7, II., *barbatum* Thbg., v. *Plectronia ventosa*, *foetidum* L. (= *japonicum* Thbg.), v. *Serissa foetida*, p. 747.

Lycopersicum T., Mill., Liebesapfel.

dentatum Dun., gezahnter, ☉. f. m. ?

hirsutum Dun., raubhaariger, ☉. f. m. Südamerika.

peruvianum Mill., α) parvifolium, β) commutatum Spgl.

pimpinellifolium Dun. (= ? *inodorum* Juss.).

1) Zwischen *L. alpina* u. *flos cuculi* in der Mitte stehend.

Lycopodium T., L., Bärlapp.

apodum L. (= *brasiliense* Raddi, = *Selaginella Apus* Spring.).

complanatum L., β) *Chamaecyparissus* A. Braun, (= *anceps* Wallr.).

cuspidatum Lk., Hort. (= *circinale* Kunze, = *Selaginella cuspidata* Lk.), zugespitzter, 4. w. Mexico.

b) *cordifolium* Hort.

laxum Presl, Spring. (= *dichotomum* Hort.), lockerer, 4. w. Südamerika.

pumilum Schldtl., niedriger, \odot . 4. w. Cap d. g. Hoffn.

stellatum Lk. (= *stoloniferum* Raddi et *sulcatum* Hort. = *Selaginella stellata* Spring.), sternförmiger, 4. w. Brasilien.

Lycopsis L., Krummhals.

erecta d'Urv., aufrechter, \odot . f. Theodosia, Georgien, Armenien.

variegata L. (= *bullata* Cyril. = *Anchusa perlata* Lam. = *A. cretica* Mill. = *A. variegata* Lehmn. = *A. Milleri* Biasol).

obtusifolia W., v. *Nonnea obtusifolia*.

Lycopus T., Wolfsfuß.

arkansanus Fresen., arkansanischer, 4. Nordamerika.

europaeus L. (= *aquaticus* Mch. = *palustris* Lam. = *vulgaris* P.), β) *laciniatus* Vahl, (= *exaltatus* Schrad.), γ) *intermedius* Schrad., G. Don.

exaltatus L. fil. (= *laciniatus* Mart. = *pinnatifidus* Pall.).

macrophyllus Benth. (= ? *virginicus* L. β *quercifolius* Pursh), großblättriger, 4. f. Nordwestl. Amerika.

rubellus Mch., Wender., rötlicher, 4. f. Nordamerika.

sinuatus Ell. (= *americanus* Mhlg. = *angustifolius* Ell. = *bracteatus* Mhlg. = *europaeus* Pursh = *vulgaris* Nutt.), buchtiger, 4. f. Nordamerika.

β) *angustifolius* Nutt. (= *longifolius* Rafin. = *pensylvanicus* Mühlbg.), γ) *heterophyllus* Rafin. (= *exaltatus* Ell.).

Lycoris hyacinthina Herb., v. *Griffinia hyacinthina*.

Lycotis leucanthemoides Hffg., v. *Arctotis leucanthemoides*, p. 73.

Lygistum axillare Lam., v. *Manettia Lygistum*, p. 495.

Lygodium Sw., Schlingfarn.

cuneatum Lk., keilförmiger, 4. Sch. w. ?

hastatum Mart., non W., spontonförmiger, 4. Sch. w. Brasilien.

microphyllum RBr. (= *scandens* Sw. = *Ugena microphylla* Cav. = *Hydroglossum scandens* W. = *Ophioglossum scandens* L.), kleinblättriger, 4. Sch. w. Inseln des indischen Oceans.

polymorphum H. B. K. (= *hirsutum* W. = *pubescens* Kaulf.), β) *glabrescens* Lk. (= *mexicanum* H. Berol. = ? *varium* Hort.).

volubile Sw. (= ? *semihastatum* Anglor.).

Lygodysodea R. et P., Geruchröthe, V. r., Rubiaceae.

ciliata Bartl. (= *mexicana* DC. mpt.), gewinperter, $\frac{1}{2}$. t. Mexico.

foetida R. et P. (= *Disodea foetida* P., non *Paederia foetida* L.), stinkende, $\frac{1}{2}$. t. Peru.

Lyonnetia DC., Lyonnetie, p. 485.

abrotanifolia Less. (= *Anacyclus anthemoides* Lagasc. = *Cotula abrotanifolia* W. = *Lasiospermum anthe-*

Lyonnetia

moides G. Don = *Santolina anthemoides* L.), stabwurzblättrige, ☉. f. Südeuropa.

muricata DC. (= *Santolina muricata* Guss.), weichstachelige, ☉. f. Sicilien.

rigida DC. (= *Anacyclus creticus* L. var. Urv. = *Lasiochloa rigidum* G. Don = ? *Santolina rigida* Sibth., Sm., p. 883).

Lyperia Benth., Lyperie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrophularineae).

argentea Benth. (= *Manulea argentea* Thbg., p. 495).

fragrans Benth. (= *Erinus fragrans* Soland, Ait. = *E. lychnideus* Thbg., non W. = *Nycterinia fragrans* D. Don, p. 551).

incisa Benth. (= *Erinus incisus* Thbg.), eingeschnittene, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

microphylla Benth. (= *Manulea microphylla* Thbg.), kleinblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

simplex Benth. (= *Erinus simplex* Thbg.), einfache, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tristis Benth. (= *Erinus tristis* Thbg. = *Nycterinia tristis* D. Don, p. 551).

violacea Benth. (= *Manulea crystallina* Weinm. = *Manulea violacea* Lk., p. 496), violette, 4. 4. k. t. Cap d. guten Hoffn.

Lyraea Lindl., Lyraea, XX. I., Orchideae.

prismatica Lindl. (= *Bolbophyllum prismaticum* Pet. Th.), prismatische, 4. w. Mascarenas.

Lysimachia T., Mch., Lysimachie (Gelbweiderich).

anagalloides Sibth., Sm., Gauchheilähnliche, 4. k. Creta.

brachystachys Bunge, kurzährige, 4. f. Nordchina.

ciliata L. (= *quadrifolia* β *ciliata* L. = *decipiens* Bertol.).

debilis Wall., schwache, 4. k. Nepal.

dubia Ait. (= *atropurpurea* Murr., non L. = *orientalis* Lam.).

lobelioides Wall. (= *secunda* Hamilt.), lobelienähnliche, 4. k. Nepal, Cachemyre.

nutans N. E. (= *purpurea* Hook. = *Lubinina atropurpurea* Lk. et Otto = *L. purpurea* Swt.), nickende, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Ungewifs: *Vulneraria* Nois.

adoensis Hochst. et Steud., v. *Anagallis arvensis*, p. 52, *thyrsiflora* L. (et *capitata* Pursh), v. *Naumburgia thyrsiflora*.

Lysinema RBr., Lysinema.

curvatum Lindl., gekrümmte, 4. t. Neuholland.

spicatum Lindl., ährenförmige, 4. t. Neuholland.

Lyssanthe Knight. et Salisb., *cana* Salisb., *cytisifolia* Salisb. (= *sericea* Salisb.), *linearifolia* Salisb., *speciosa* Salisb., v. *Grevillea arenaria*, *sericea*, *linearis* et *purpurea*.

Lythrum L. (= *Salicaria* T.), Weiderich.

alatum Pursh (= *acinifolium* Moç. Sess. = *Kennedyanum* H. B. K. = *virginicum* Kennedy, = *Vulneraria* Schrank.).

carthagenense Jacq., carthagenischer, ☉. m. f. Carthagen.

divaricatum Colla, ausgespreizter, 4. k. t. Chili.

Gräfferi Tenore (= *acutangulum* Lag. = *alatum* Presl = *flexuosum* Lagasca, = *hyssopifolium* d'Urv. =

Lythrum

nummulariaefolium P. = *punicifolium* Chamiss. = *thymifolium* Sieb.).

Gussoni Presl (= *Gräfferi* Tenor. var. DC.), Gussone's, ©. f. Sicilien.

Hyssopifolia L. (= *parviflorum* Bast. = *Salicaria Gräfferi* H. Berol.).

lanceolatum Ell. (= *saturrejaefolium* Moç. Sess. = *virgatum* Walt., ? Pursh), lanzettblättriger, 4. f. Nordamerika.

Purshianum Steud. (= *diffusum* Swt., non Arrabida, = *virgatum* Pursh), Pursh's, 4. f. Nordamerika.

Salicaria L., β) gracile DC. (= *racemosum* Hort.).

virgatum L. (= *austriacum* Jacq.).

Gartenvarietäten: *brachypetalum* Hort., *roseum superbum* Hort.

ciliatum Sw., *cistifolium* L'Her., *Cuphea* L. (= *petiolatum* L.) etc., v. *Cuphea decandra*, *ciliata*, *viscosissima* etc., *flavum* Sggl., v. *Heimia salicifolia*.

Macbridea Ell., *Macbridea*, XIV. i., Labiatae.

pulchella Ell. (= *pulchra* Auct. = *Melittis caroliniana* Sggl. = *Prasium incarnatum* Walt. = *Thymbra caroliniana* Walt.), schöne, 4. f. b. k. Nordamerika.

Machaerium P., *Machaerium*, XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.

aculeatum Raddi, (= ? *angustifolium* β Vogel, = *Nissolia aculeata* DC., Sggl., p. 549).

arboreum Benth. (= *Nissolia arborea* L. = *N. glabrata* Lk.), baumartiges, f. w. Südamerika.

micropterum Benth. (= *Nissolia microptera* Poir., p. 549).

robiniaefolium Vogel, (= *Nissolia robiniaefolia* DC., p. 549).

Macfadyena A. DC. (Dr. J. Macfadyen, Verfasser einer Flora von Jamaica), XIV. ii., Personatae-Bignoniaceae.

uncinata A. DC. (= *Bignonia uncinata* G. F. W. Mey. = ? *Spathodea uncinata* Sggl.), hackiggekrümmte, f. Sch. w. Guiana.

Macleania Hook., *Macleania*, VIII. i., Vaccinieae.

angulata Hook., kantige, f. t. k. Peru.

coccinea ? Hook., scharlachfarbige, f. t. k. Südamerika.

floribunda Hook., blüthenreiche, f. t. k. Peru.

insignis Makoy, ausgezeichnete, f. t. k. ? Südamerika.

longiflora Lindl., langblumige, f. t. k. Cordilleren (Loxa).

Macreightia DC. (Dr. Macreight, hat ein Manual of british botany herausgegeben), XXII. x., Sapotaceae.

acapulcensis DC. (= *Diospyros acapulcensis* H. B. K. = ? *D. salicifolia* W.), acapulcische, f. t. Mexico.

Macroceratides Pseudostizolobium Raddi, v. *Mucuna macroceratides*, p. 533.

Macrochilus Fryanus Knowl. et Westc., v. *Miltonia spectabilis*.

Macrochloa arenaria Kunth, *tenacissima* Kunth, v. Stipa, Sect. III., p. 789.

Macrocnemum speciosum Jacq., v. *Mussaeda speciosa*, p. 535, *strictum* W., v. *Randia stricta*, *tinctorium* H. B. K., v. *Condaminea tinctoria* Nachl.

Macrolepisma A. Rich., Schuppenstendel, XX. i., Orchideae.

longiscapa A. Rich., langschäftiger, 4. w. Guiana.

Macrolinum paucifolium Kl., v. *Syndesmanthus paucifolius*.

Macrolobium bifolium P. (= *hymenaeoides* Vahl, W. = *Vouapa* Gmel.), v. *Vouapa bifolia*.

Macrostylis Bartl. et Wendl., Langgriffel.

cordata G. Don, herzförmiger, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

obtusa Bartl. et Wendl., stumpfblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

Macrozamia Miq., Zapfenpalme, XXII. XII., Cycadeaceae. *Preissii* Lehm., Preiss's, ♂. w. t. Neuholland.

spiralis Miq. (= *Encephalartos spiralis* Lehm. = *Zamia spiralis* Salisb., p. 862).

Zweifelhafte Art: *Fraseri* Miq. Neuholland.

Madaroglossa DC., Glattzüngelchen.

carnosa Nutt., fleischiges, ⊙. f. Californien.

Douglasii Walp., Douglas's, ⊙. f. Nordamerika.

elegans Nutt., zierliches, ⊙. f. Californien.

Madia Molin., Madie.

I. Genuina.

angustifolia H. Bonn. (= *viscosa* Hort.), schmalblättrige, ⊙. f. m. ? Chili.

glomerata Hook., knaulförmige, ⊙. f. m. Nordamerika.

quinqueradiata Fisch. et Mey., fünfstralige, ⊙. f. m. Chili, ? Westl. Nordamerika.

II. *Madaria* DC.

corymbosa DC. (= *racemosa* Nutt.).

elegans DC. (= *floribunda* Hort.).

Maelenia Dumort., Maelenie, XX. I., Orchideae.

paradoxa Dumort., wunderbare, 4. w. Brasilien.

Maesa Forsk., *argentea* DC., *indica* DC., *macrophylla* Don, Loud., *pubescens* Lodd., *tomentosa* Don, v. *Baeobotrys argentea* etc., p. 110.

Magnolia L., Magnolie.

acuminata L. (= *pensylvanica* Hort. = *rustica* Hort. = *virginiana* ε L.), d) *longifolia* Hort.

auriculata L. (= *auricularis* Salisb. = *Fraseri* Walt.).

dealbata Zuccar., weißliche, ♂. t. Mexico.

fuscata Andr. (= *fasciata* Vent. = *meleagrioides* Hort. = *versicolor* Salisb. = *Michelia fuscata* Wight), β)

parviflora Blum., γ) *annonaefolia* Salisb.

glauca L. (= *fragrans* Salisb. = *virginiana* L.), β)

Gordoniana Hort. (= *longifolia* Hort.), γ) *Burchelliana* Hort., δ) *Thomsoniana* Hort.

insignis Wall., ausgezeichnete, ♂. t. w. Ostindien.

mexicana DC. (= *glauca* Moç. Sess. = *grandiflora* Moç. Sess.), mexicanische, ♂. t. Mexico.

obovata Thbg. (= *glauca* β Thbg.), β) *discolor* Vent. (= *atropurpurea* Hort. = *purpurea* Curt.), b) *longifolia* Hort., c) *pallida* Hort.

tripetala L. (= *umbellata* Hort. = *virginiana* δ L.).
? Hybride: *Harwicus* Hort, Makoy.

odoratissima Reinw. (= *pumila* Spgl., non Andr.),

Plumierii Sw. (= *faticens* Rich.), *pumila* Andr., v. *Talauma Candollei* etc., p. 797.

Magydaris K. (= *Eriocachrys* DC. msp.), Wolldolde, V. II., Umbelliferae.

panacina DC. (= *Athamantha panacifolia* Spgl., p. 104 = *Cachrys hungarica* Mill. = ? *C. panacifolia* Vahl, = *C. pastinacea* Lam.).

Magydaris

tomentosa K. (= *Athamantha panacifolia* var. Spgl. = *Cachrys panacifolia* Vahl, = *C. Panax Siculum* Ucria, = *C. tomentosa* Dsf.), filzige, 4. k. Sicilien, Nordafrika.

Mahernia L., Mahernie.

biserrata Cavan. (= *Hermannia biserrata* L.), doppelt-sägezahnige, 5. k. t. Cap d. g. Hoffn.

diffusa Jacq. (= *odorata* Andr. = *Hermannia diffusa* L. fil.).

sessilifolia DC. (= *seselifolia* Auct.), stiellosblättrige, 5. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Mahonia Nutt., Mahonie.

Aquifolium Nutt. (= *Berberis pinnata* Banks, = *B. Aquifolium* Pursh), β) repens G. Don, (= *Berberis repens* Lindl.), γ) nutkana DC.

Ehrenbergii ? Kl., Ehrenberg's, 5. 5. k. t. Mexico.

fascicularis DC. (= *Berberis fascicularis* Schult. fil. = *B. fasciculata* Sims, = *B. pinnata* Lagasca), β) moranensis * (= *Berberis moranensis* Schult. fil. = *B. pinnata* H. B. K.).

glumacea DC. (= *Berberis nervosa* Pursh).

intermedia H. belg., mittlere, 5. 5. k. ? Westl. Nordamerika, ? Mexico.

pallida H. belg., bleiche, 5. 5. k. t. ? Mexico.

trifoliata Cham., Schltl., (= *ilicifolia* Schltl. = *Berberis trifolia* Schult. fil.), dreiblättrige, 5. 5. t. k. Mexico.

Unbestimmt: triangularis Hort.

Mahurea Aubl., DC. (? guianischer Name), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

palustris Aubl. (= *Bonnetia meridionalis* Sw. = *B. palustris* Vahl), Sumpfliebende, 5. w. Guiana, Brasilien.

speciosa Chois., DC. (= *Bonnetia racemosa* Sw. = *Marila racemosa* Sw., DC.), prächtige, 5. w. Caribäen.

Maillea Parlatore, (Alphons Maille, botanischer Freund Parlatore's), III. 11., Gramineae.

Urvillei Parlat. (= *Phalaris crypsoides* Urv. = *Crypsis alopecuroides* ? Auct., non Schrad.), Urville's, ☉. f. Griechenland.

Mairia N. E., DC. (Lemaire, Professor etc. zu Gent).

crenata N. E. (= *Arnica crenata* Thbg. = *Aster crenatus* Less. = *Gerbera crenata* Ker, p. 489).

taxifolia DC. (= *Aster ciliaris* Thbg. = *A. filiformis* Eckl. = *A. taxifolius* L. = *Elphegea ciliata* Less. = *Leyssera ciliata* Thbg. = *Zyrrhelia amoena* Cass. = *Z. taxifolia* Cass.), taxusblättrige, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Majorana Mch., Majoran, XIV. 1., Labiatae.

crassifolia Benth. (= *Origanum aegyptiacum* Auct., non L. = *O. Maru* L. spec., non Auct.), dickblättriger, 4. 5. k. Creta, Palästina.

hortensis Mch. (= *Origanum Majorana* L., p. 567 = *O. heracleoticum* Hort., non L. = *O. Onites* Lam., non L.), β) majoranoides (W.), γ) ? crassa Mch.

microphylla Benth. (= *Origanum Maru* Sibth., Sm., Auct., non L. = *O. microphyllum* Sieber), kleinblättriger, 4. 5. k. Creta.

neglecta Vogel, (= *Origanum Onites* W.), übersehener, 4. k. Creta.

Majorana

nervosa Benth. (= ? *Origanum syriacum* L.), nerviger,
4. ♀. k. Aegypten, Arabien.

Onites Benth. (= *Origanum Onites* L., p. 567 = *O. pallidum* Dsf. Catal. h. Par., P. = *O. smyrnaeum* L., p. 567).

Orega Vogel, *Orega-M.*, 4. ♀. k. ?

turbinata Vogel, aufgetriebener, 4. k. ?

Malabaila Tausch, non Hoffm., (Graf Malabaila von Canal, Präsident der k. k. ökonom. Gesellschaft zu Prag), V. II., Umbelliferae.

Hacquetii Tausch. (= *Athamantha Galatta* Gmel. = *A. Golaka* Hacq. = *Hladnickia golacensis* K., p. 880 = *Ligusticum carniolicum* Host, = *L. Sprengelii* Sieb. = *Pleurospermum Golaka* Rehb.), Hacquet's,
4. f. Krain.

M. graveolens Hoffm. et *pimpinellifolia* Hoffm., v. *Pastinaca graveolens* et *pimpinellifolia*, p. 390 et 391.

Malachium aquaticum Fr., v. *Stellaria pentagyna, manticum* Rehb., v. *Mönchia mantica*.

Malachra L., Weichmalve.

mexicana Schrad., mexicanische, ☉. f. m. Mexico.

palmata Mch., handförmige, ☉. f. m. ?

plumosa Desr. (= *Sida plumosa* Cav.), federige, ? ☉. w. Brasilien.

rosea Hffg., rosafarbige, ♀. w. ?

triloba Dsf., dreilappige, ☉. f. m. Südamerika.

Urena DC. (= *Urena Loureirii* Meisn. = *U. polyflora* Lour.), Urenaähnliche, ♀. w. China.

urens Poit., Ledeb., brennende, ? ♀. w. Domingo. (Ob kult.?)

Malacocarpus Fisch. et Mey., Weichfrucht, XI. I., Tricoccae-Rutaceae.

crithmifolius Fisch. et Mey. (= *Peganum crithmifolium* Eichw.), meerfenchelblättrige, 4. f. Oestl. Ufer des caspischen Meeres.

Malacocephalus altaicus Tausch et *pinnatifidus* Tausch v. *Leuzea salina*, p. 460 et *pinnatifida*, p. 356, II.

Malacochaete litoralis N. E., v. *Scirpus litoralis*, p. 733.

Malacothrix DC., Weichhaar, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

californica DC., californisches, ☉. f. Californien.

Malaxis caudata W., v. *Brassia caudata, monophylla* Sw., *ophioglossoides* Mühlbg., v. *Microstylis monophylla, ophioglossoides*.

Malcolmia RBr., Malcolmie.

erosa DC. (= *triloba* var. Spgl. = *Hesperis erosa* Lag.), ausgebissene, ☉. f. Baetien.

graeca Boiss., griechische, ☉. f. Griechenland.

incrassata DC., verdickte, ☉. f. Griechenland.

runcinata C. A. Mey., schrotsägenförmige, ☉. f. Caucasus.

triloba Spr. (= *Broussonetii* DC. = *lacera* DC. ex parte = *Cheiranthus trilobus* L. = *Hesperis pinnatifida* Dsf.), dreilappige, ☉. f. Südeuropa.

turgida Hort., aufgetriebene, ☉. f. ?

Malesherbia R. et P., Malesherbie.

tenuifolia G. Don, dünnblättrige, ☉. f. m. Peru.

Mallea Adr. Juss., Mallea, XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.

Rothii Adr. Juss. (= *Ekebergia indica* Roxb. = *Melia*

Mallea

baccifera Roth, = *M. baccata* Heyne herb.), Roth's,
 ꝥ. w. Ostindien.

Malouetia A. DC. (Malouet hat statistische Notizen
 über die französischen Colonien herausgegeben), V. 1.,
 Contortae-Apocynae.

odorata A. DC. (= *Tabernaemontana odorata* Vahl, p. 796).

Tamaquarina A. DC. (= *Cameraria Tamaquarina* Aubl.
 = *lutea* Lam.), gelbe, ꝥ. w. Guiana.

Malope L., Malope.

malacoides L., β) *sinuata* Cav.

multiflora Triguier., vielblumige, ☉. f. Spanien.

stipulacea Cavan., afterblättrige, ☉. f. Mauritanien.

trifida Cavan., β) *grandiflora* Hort., b) fl. albo.

Unbestimmtere: *ciliata* Dietr., *rotundifolia* Gmel.

Malpighia Plum., Malpighie.

aquifolia L. (= *ilicifolia* Mill.).

coccifera L. (= *microphylla* Hort.).

grandiflora Jacq., großblumige, ꝥ. w. Martinique.

incana Mill. (= *campechiensis* Poir.), weißgraue, ꝥ. w.
 Westindien.

malifolia N. E., Mart., äpfelblättrige, ꝥ. w. Brasilien.

myrtifolia Dsf., myrtenblättrige, ꝥ. w. Antillen.

nitida Mill., glänzende, ꝥ. w. Carthagen.

Unbestimmt: *ferruginea* Hort.

Malva T., Malve.

abyssinica A. Braun, abyssinische, ☉. f. m. Abyssinien.

Alcea L., γ) *tenuifolia* Rehb. (= *excisa* Rehb.).

alceoides Tenor. (= *Morenii* Hook., non Poll.), Alcea-
 ähnliche, 4. f. Italien.

althaeoides Cav., β) *hirsuta* Tenore.

americana L. (= *africana* Mill. = *curassavica* Desr. =
hispida Mch.).

anomala Lk. et Otto, abweichende, ?☉. f. ?

arborea v. Houtte, baumartige, ꝥ. w. ? Südamerika.

Biasoletiana Kunze, Biasoletto's, ☉. f. ? Südeuropa.

bryonifolia L. (= *reflexa* Wendl. = *stellata* Thbg.).

commutata Rehb., verwechselte, ?☉. f. ?

cordifolia H. Berol., herzblättrige, ☉. f. ?

Creeana Hook., b) alba.

flexuosa Hornem. (= *verticillata* L. var.), gebogene,
 ☉. f. Südeuropa.

fragrans Jacq. (= *capensis* γ L. = *glutinosa* Desr. =
scabrosa L.).

lucida Lindl., spiegelnde, ☉. f. Himalaya.

mauritanica Spgl. (= *mauritiana* L. = *obtusa* Mch.),

β) *glabra* Desr. (= *sinensis* Cav.), γ) *acutiloba* H.
 Berol. (= *chinensis* Hort.),

miniata Cav. (= ? *lateritia* Hort. = *Sphaeralcea mi-
 niata* Spach), ? β) *Creeana* Hook, Hort.

Morenii Poll. (= ? *albulensis* Cav. = *Alcea* L. var.,
 DC.), Moren's, 4. f. Süddeutschland, Italien.

orientalis Mill., morgenländische, ☉. f. Orient.

oxyacanthoides Hornem. (= *divaricata* Hort. = *prae-
 morsa* Hffg. = *Toxicodendron* Hort.).

polystachya Cav. (= *betulina* Desr.).

pulchella Bernh. (= *hybrida* Hort. = *nepalensis* Hort.),
 hübsche, ☉. f. China.

rugosa Desr. (= *virgata* Murr. var.), runzelige, ꝥ. k.
 Cap d. g. Hoffn.

Malva

- scabra Cav. (= *Lagascae* Hort. Taur.).
 Schiedeana Steud. (= *ribifolia* Schldtl., non Vivian.),
 Schiede's, 4. k. Mexico.
 stenophylla Hffg., schmalblättrige, ♀. k. ?
 stricta Jacq. (= ? *grossulariaefolia* Cav.), steife, ♀. k.
 Cap der guten Hoffnung.
 subtriflora Lagasca, fastdreiblumige, ♀. ♀. k. t. Neuspanien.
 sylvestris L., β) albiflora Presl, (= *veneta* Hort.).
 tenella Cav., zarte, ☉. f. Chili.
 Towardi v. Houtte, Toward's, ♀. k. t. ?
 Tournefortiana Ait. (= *maritima* Lam. = *tenuifolia* Dsf.).
 tricuspidata Ait. (= *jamaicensis* Hort. = *Sida betulae-*
folia Hort. = *S. carpinifolia* Hort. = *S. carpinoides*
 DC. = *S. coromandelina* Hort.), β) antillarum Zucc.
 verticillata L. (= *chinensis* Mill.).
 Unbestimmtere: *anglica* Roem. hort. Turic., *Columnae*
Tenore, *glabrifolia* Tenore, *leptophylla* Hort., *lutea*
 Roem. hort. Turic., *pumila* Retz, *Rodigii* Presl, *tuber-*
culata Lk.
abutiloides L., *angustifolia* Cav., *elegans* Cav., *lactea*
 Ait., *Munroana* Dougl., *obtusiloba* Hook., *rosea*
 Moc. Sess., *umbellata* Cav., v. *Sphaeralcea abuti-*
loides, *angustifolia* etc., *caroliniana* L., *decumbens*
 W., *prostrata* Cav., v. *Modiola caroliniana* etc. —
M. Papaver Cav. (= *nuttallioides* Croom.), v. *Nut-*
tallia digitata et Papaver, p. 557.

Malvaviscus Dill., Adans., G., Cav., DC. (= *Achania*
 Sw., p. 9), Schampappel, XVI. VIII., Malvaceae.

- arborescens Cav. (= *Achania Malvaviscus* Sw. = *Hibis-*
cus Malvaviscus L.).
 Balbisii DC. (= *cordatus* Balb. = *Achania ? cordata*
 Mart.), Balbis's, ♀. w. Brasilien.
 cordatus DC. (= *Achania cordata* N. E., Mart.).
 grandiflorus H. B. K. (= *Achania ? pilosa* Sw.), groß-
 blumige, ♀. w. Mexico.
 mollis DC. (= *Achania mollis* Ait.).
 pilosus DC. (= *Achania pilosa* Sw.).

Malvinda angustifolia Medik. Mch., *carpinifolia*
 Mch., *palmata* Mch., *spinosa* Mch., *umbellata* Mch.,
 v. *Sida angustifolia*, *carpinifolia*, *ricinoides*, *spinosa*,
umbellata, p. 752 et 753.

Mammea L., Mammea.

africana Sabine, africanische, ♀. w. Sierra Leone.

Mammillaria Haw., DC., p. 492, v. Cacteeae p. 872
 et p. 84, II.

Mandevillea suaveolens Lindl., v. *Echites suaveo-*
lens, p. 215, II.

Mandragora T., Alraunwurz.

microcarpa Bertol. (= *autumnalis* Spgl. = *officinalis*
 Moris), kleinfrüchtige, 4. f. b. k. Sardinien.

officinarum Bertol. (= *autumnalis* Spgl. = *Atropa Man-*
dragora L.), gebräuchliche, 4. f. b. k. Griechen-
 land, Sicilien.

Manettia Mutis, L., Manettie.

bicolor Lindl., zweifarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.

cordifolia Mart. (= *glabra* Cham. et Schldtl. sec. Hook.).

Gärtneri DC. (= *glabra* Steud. = *Lygystum* Bank's,
 = *Nacibaea glabra* G. fil.), Gärtner's, ♀. w. ?

splendens Makoy, schimmernde, ♀. w. ? Brasilien.

Mangifera L., Mangobaum.

indica L. (= *Amba* Forsk. = *domestica* G. = *montana* Heyne, = *sativa* Hort. par.), ? β) elliptica Hort.
laxiflora Desr., lockerblumiger, $\frac{1}{2}$ w. Mauritius.

Manglesia Endl., (Mangles, englischer Naturforscher),
IV. 1., Proteaceae.

cuneata Endl. (= *glabrata* Lindl. = *Anadenia Manglesii* Grah. = *Grevillea Manglesii* Hort.), keilblättrige, $\frac{1}{2}$ t. Südwestl. Neuholland.

Lawrenceana H. angl. (= *Grevillea Lawrenceana* Hort. angl., p. 274, II.).

tridentifera Endl. (= *trifurcata* Hort. belg.), dreizählige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

M. vestita Endl., $\frac{1}{2}$. Neuholland, scheint noch nicht eingeführt.

Manglilla canariensis R. et S., v. *Pleiomeris canariensis*, *Milleriana* P. v. *Sideroxylon mite*.

Hinschtl. d. übrigen s. *Myrsine*.

Manihot Adans., Pohl, (= *Janipha* H. B. K. p. 428),
Cassavabaum, XXI. 1., Tricoccae-Euphorbiaceae.

aesculifolia Pohl, (= *Janipha aesculifolia* H. B. K.).

angustifolia Pohl, (= *Janipha angustifolia* * = *Jatropha angustifolia* Steud.).

cajaniformis Pohl, (= *Janipha Löfflingii* H. B. K. var. Sogl. = *J. Yuguilla* H. B. K. = *Jatropha cajani-formis* Steud.), taubenkleeähnlicher, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

digitata Swt. (= *Croton digitatum* Fisch. = *Jatropha Fischeri* Steud.), fingerförmiger, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

foetida Pohl, (= *Janipha foetida* H. B. K. = *Jatropha foetida* Steud.).

Janipha Pohl, (= *Janipha Löfflingii* H. B. K. = *Jatropha carthagenensis* Jacq. = *J. frutescens* Auct. = *J. Janipha* L.), *Janipha*-C., $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

peltata Pohl, (= *Jatropha peltata* Steud., non H. B. K.) schildförmiger, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

utilissima Pohl, (= *Janipha Manihot* H. B. K., p. 429 = *Jatropha Manihot* L.), nutzbarster, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

Manisuris L., *granularis* Sw. (= *polystachya* P. B. = *Cenchrus granularis* L.).

Manna caspica Don, *hebraica* Don, v. *Alliagi camelorum et maurorum*, p. 28 et p. 18, II.

Mansoa DC., (P. da Silva Manso, brasilian. Botaniker, hat über die *Materia medica Brasiliensis* geschrieben),
XIV. 11., Bignoniaceae.

hirsuta DC., rauhhaarige, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Sch. w. Brasilien. (Ob eingeführt?)

Mantiscalca elegans Cass., v. *Microlonchus salmanticus*, *Centaurea* Sect. III., p. 179 et p. 131, II.

Manulea L., Handblume.

Cheiranthus L. (= *rhynchantha* Lk. Enum. = *Lobelia Cheiranthus* L. = *Nemia Cheiranthus* Berg.).

incana Thbg., weißgraue, $\frac{1}{2}$ k. t. Cap d. g. Hoffn.
parviflora Benth. (= *natalensis* Bernh.), kleinblumige, 4. $\frac{1}{2}$ k. t. Cap d. g. Hoffn.

rubra L., Thbg. (= *angustifolia* Lk. = *hirta* Desr. = *Nemia rubra* Berg.).

thyrsiflora L., Thbg., straußblumige, 4. $\frac{1}{2}$ k. t. Cap der guten Hoffnung.

Manulea

aethiopica Thbg., *capensis* Thbg., v. *Polycarena aurea et capensis*, *capitata* Thbg., v. *Phyllopodium capitatum*, *cordata* Thbg., *foetida* Andr. (= *alternifolia* P.), *hispida* Thbg. (= *oppositifolia* Vent.), v. *Chaenostoma cordatum* etc. Nachl. et p. 134, II., *crystallina* Weinm. (= *violacea* Lk.), *lychnidea* Desr., *microphylla* Thbg., *pedunculata* Andr., v. *Lyperia violacea* etc., p. 378, II., *viscosa* W., v. *Sphenandra viscosa*.

Mappa Adr. Juss., Mappa, XXI. x., Tricoccae.-Euphorbiaceae.

jamaicensis Sogl. (= *Croton globosum* Sw. = *Ricinus globosus* W., p. 691), jamaicanischer, ♂. ♀. w. Jamaica.
moluccana Sogl. (= *Acalypha Mappa* W. = *Ricinus Mappa* L. = *Trewia hernandifolia* Roth), moluckischer, ♂. ♀. w. Molucken.
tanaria Sogl. (= *glabra* Juss. = *Ricinus tanarius* L., p. 691).

Maranta Plum, Maranta.

Allouya Aubl. (= *semperflorens* Hort. = *Calathea Allouya* Loud., p. 145, = *Curcuma americana* Lam. = *Phrynium Allouya* Rosc.), *Allouya-M.*, 4. w. Mittägl. Amerika.
Arouma Aubl. (= *juncea* Lam. = *petiolata* Rudge, = *Calathea juncea* Sogl.), *Arouma-M.*, 4. w. Guiana.
humilis Aubl., niedrige, 4. w. Cayenne.
racemosa Lk. (= *Thalia racemosa* Willd. herb.), traubige, 4. w. Mittägl. Amerika.
Tonchat Aubl. (= *angustifolia* Sims, = *graminifolia* R. et P.).
trifasciata v. Houtte, dreibänderige, 4. w. ? Südamerika.
variegata Lodd., bunte, 4. w. Südamerika.
dealbata Dietr., *geniculata* Dietr., v. *Thalia dealbata et geniculata*, p. 804, *discolor* Hort. (= *picta* Hort. = ?) *Galanga* L., non Lam., *malaccensis* Burm., v. *Alpinia Galanga et malaccensis*, p. 37 et 38, *setosa* A. Dietr. (= *secunda* Grah.), v. *Phrynium setosum*, p. 618.

Marattia Sm., Marattie.

cicutaeifolia Kaulf. (= *fraxinea* Raddi), Wasserschieblingblättrige, 4. w. Brasilien (Corcovado).
Kaulfussii J. Sm. sub *Eupodio* (= *laevis* Lk. an Sm. ? = *macrophylla* Makoy, = ? *alata* H. Berol.), Kaulfufs's, 4. w. Westindien.

Marcetia DC., (A. Marcet, Prof. d. Chemie zu Genf, † u. dessen Wittwe Jeanne Marcet), VIII., 1., Lythraeae-Melastomaceae.

excorticata DC. (= *Rhexia excorticata* Mart.), rindenlose, ♂. w. Brasilien.
glandulosa DC. (= *excorticata* DC. var. Cham. = *Rhexia quadrivalvis* Mart. herb.), drüsige, ♂. w. Brasilien.

Marginaria Lk., dimorpha Lk., meniscifolia Presl, v. Polypodium Sect.

Margyricarpus R. et P., Perlfrucht.

alatus Gill. in Hook. (= *linearis* Steud.), geflügelte, ♂. t. k. Chili.

- Marialva** Vandell., Marialva, XIII. VI., Guttiferae.
fructipendula Chois. (= *Beauharnoisia fructipendula* R. et P. = *Euthales peruviana* J. G. Dietr. = *Tavomita fructipendula* Poir.), fruchthängende, ♂. ♀. w. Guiana, Brasilien.
- Marianthus** Hügel, Klebblume, V. I. Pittosporeae.
candidus Hügel, weißglänzende, ♂. t. Neuholland.
coelestis Putterl. (= *Billardiera variifolia* DC.), himmelische, ♂. Sch. t. Neuholland.
coeruleo-punctatus Lk., Kl., blaupunktirte, ♂. t. Neuholland (Van Diemens Land).
erubescens Putterl., *floribundus* Putterl., *venustus* Putterl. Sämmtl. ♂. Neuholland, scheinen noch nicht kultivirt zu werden.
Marica grandis v. Houtte, *Tigridia* Lehm., v. *Cipura grandis* et *Tigridia* Nachlese.
Marila racemosa Sw., v. *Mahurea speciosa*, p. 381, II.
- Mariscus** Vahl, Bollsimse.
alternifolius Vahl, wechselblättrige, 4. w. Guiana.
- Marrubium** L., Andorn.
candidissimum L. (= *catariaefolium* Rchb., non Desr. = *flexuosum* Mch. = *peregrinum* Rchb. = *setaceum* Desr. = *uncinatum* Hornem.).
cinerascens Fisch., aschfarbiger, 4. f. ? Asiat. Rußland.
circinnatum Desr. (= *velutinum* Sibth., Sm.), kreisförmiger, 4. f. Griechenland.
coerulescens Dsf., blaulicher, 4. f. Persien.
eristachyum Benth. (= *Lagopus viridis* Bunge, = *Leonurus eristachys* Turcz.), wollähriger, 4. f. Sibir.
incisum Benth. (= *Leonurus supinus* W.), eingeschnittener, 4. f. Sibirien, Nordchina.
lanatum Benth. (= *Lagopsis incana* Bunge, = *Moluccella laniflora* W. herb. = *M. Marrubiastrum* Stephan., Ledeb.), wolliger, 4. f. Altaisches Sibirien.
leonuroides Desr. (= *affine* Hornem. = *astracanicum* W. E., non Jacq.).
panonicum Clus. (= *paniculatum* Desr., Rchb. = *peregrinum* Sggl., non L. = *remotum* Kit.).
peregrinum L. (= *creticum* Mill., Rchb. = *affine* Host, = *flexuosum* Mönch, = *pauciflorum* Wallr.).
plumosum C. A. Mey., federiger, 4. f. Caucasus.
Hinsichtl. d. übrigen s. *Beringeria*, p. 119 et p. 66, II.
- Marsilea** L., Marsilea.
Fabrii Dun. (= ? *pubescens* Tenore), *Fabri's*, 4. Wa. f. Süd- und Westeuropa.
- Marsypianthus** Mart.; Gamanderblümchen, XIV. I., Labiatae.
hyptoides Mart. (= *Clinopodium Chamaedrys* Vahl, = *Hyptis Chamaedrys* W., Poit. = *H. inflata* Sggl. = *H. lurida* Sggl. = *H. Pseudo-chamaedrys* Poit.), amerikanisches, ☉. w. Brasilien, Cayenne.
- Martia** Leand., Zuccar. (= *Martusia* Schult.), (v. *Martius*, k. baier. Hofrath, Prof. u. Director d. botan. Gartens zu München, berühmt als Botaniker, Reisender etc.), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
brasiliensis Zuccar. (= ? *physodes* Leand., sec. Sggl. = *Martusia physaloides* Schult., DC. = *Clitoria rubiginosa* P. = *C. tetragona* Poir. = *Crotalaria elliptica* Poir. = *Neurocarpum ellipticum* Desv.), brasilianische, ♂. w. Westindien, Brasilien.

Martia

mexicana Zuccar. (= *Neurocarpum mexicanum* Steud.),
mexicanische, 4. h. t. Mexico.

M. campanulata Spgl., *petiolata* Spgl., *polyandra*
Spgl., v. *Elodea virginica*, *axillaris*, *aegyptiaca*,
p. 219, II.

Martinezia R. et P. (Martinez de la Rosa, spanischer
Staatsminister), XXI. VI. (VI. I.), Palmae.

caryotaefolia H. B. K., brennpalmenblättrige, h. w.
Südamerika.

lanceolata R. et P. etc., v. *Chamaedorea gracilis*,
p. 186 et p. 135, II.

Martynia L., Martynie.

diandra Glox. (= *angulosa* Lam. = ? *louisiana* Mill.).

fragrans Lindl., wohlriechende, ☉. m. f. Mexico.

montevidensis Chamiss., Schlttl., montevideische, ☉. m.
w. Brasilien.

triloba Chamiss., Schlttl., dreilappige, ☉. m. w. Vera Cruz.

fallax Kunze, (= *Craniolaria* et *proboscidea* Hort.),

integrifolia Steud., *spathacea* Spgl., v. *Craniolaria*

fallax, *integrifolia* et *unibracteata*, p. 164, II.

Marumia Blum., non Reinw., Marumie, X. I., Ly-
thriariae-Melastomeae.

stellulata Blume, (= *Melastoma stellulata* Jack.), stern-
förmige, h. h. w. Sumatra.

Maruta Cass., Stinkchamille, p. 498.

Cotula DC. (= *foetida* Cass. = *ramosa* Less. = *vul-*

garis Bluff et Fingerh. = *Anthemis Cotula* L. =

A. cotuloides Rafin. = *A. psorosperma* Tenore, =

A. ramosa Lk.), β) *lithuanica* DC. (= *Anthemis*
lithuanica Bess.).

fuscata DC. (= *Anthemis fallax* W. = *A. fuscata*

Brot. = *A. praecox* Lk. = *Perideraea fuscata* Webb).

Masdevallia R. et P., Masdevallie.

caudata Lindl., geschwänzte, 4. w. Neugranada.

fenestrata Lindl., durchscheinende, 4. w. Westindien.

Massonia L., Massonie.

coronata Jacq., gekrönte, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

hirsuta Lk. et Otto, rauhhaarige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

longifolia Jacq., β) *candida* Burch.

nervosa Hornem., nervige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

obovata Jacq. (= ? *ovalifolia* Hort.).

sanguinea Jacq. (= *latifolia* Ker, non Jacq.).

Zeyheri Kunth, (= *lanceolata* Zeyh.), Zeyher's, 4. Zw.

t. Cap d. g. Hoffn.

corymbosa Sims, (= *linearis* Drege), v. *Periboea*

corymbosa, *ensifolia* Ker, (= *violacea* Andr. =

ovalis Drege), v. *Polyxena pygmaea*.

Mastacanthus Endl., Eisenklau, XIV. II., Verbenaceae.

sinensis Endl. (= *Barbula* Steud. = *Barbula sinensis*

Lour.), chinesischer, h. k. t. China.

Mastrucium pinnatifidum Cass., v. *Serratula coro-*
nata, p. 747.

Mataxa capensis Spgl., v. *Lasiospermum radiatum*,
p. 447.

Mathewsia Hook. (Mathews, Botaniker u. Reisender
in Peru etc. † 1841), XV. II., Cruciferae.

foliosa Hook., blattreiche, 4. k. Chili.

Matricaria T., DC., Mutterkraut.

disciformis DC., scheibenähnliches, 4. f. Caucasus.

Matricaria

glabrata DC. (= *Chrysanthemum glabratum* Thbg. = *Pyrethrum glabratum* Less.), kahles, ☉. f. Cap d. g. H. nigellaefolia DC., schwarzkümmelblättriges, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

tanacetoides Fisch. et Mey. (= *Artemisia matricarioides* Less. = *Cotula matricarioides* Bong. = *Tanacetum pauciflorum* Richards.), rainfarnähnliches, ☉. f. Nordamerika.

Chamomilla L. etc., v. *Chamomilla officinalis* etc., p. 136, II., wozu auch *M. suaveolens* L. zu stellen ist, *indica* Mill., Desr. etc., v. *Pyrethrum indicum* etc., p. 669, *pinnatifida* Desr., v. *Chrysanthemum grandiflorum*, *pinnatifidum*, p. 193.

Matthiola RBr., Matthiola.

bicornis DC. (= *Cheiranthus bicornis* Sibth., Sm. = *Notoceras Sibthorpii* Speg.), zweihörnige, ☉. f. Griechenland.

coronopifolia DC. (= *Cheiranthus coronopifolius* Sibth., Sm.), krähensfußblättrige, ♂. 4. k. Griechenland, Sicilien, Spanien.

deflexa Bunge, (= ? *odoratissima* RBr. var.), herabgehogene, ☉. ♂. f. Altaisch. Sibirien.

fenestralis RBr. (= *vulgaris* β Spach, = *Cheiranthus fenestralis* L.), zwergige, ♂. Canar. Inseln, ? Creta.

graeca Swt. (= *viridis* Rehb. = *Cheiranthus graecus* Juss., P.).

humilis DC. (= *Cheiranthus humilis* Clark.), niedrige, ☉. f. Aegypten.

livida DC. (= *Cheiranthus lividus* Delil, = *C. tristis* Forsk.), braunblaue, ☉. f. Aegypten.

patens Presl, (= *sicula* Hort.), abstehende, ☉. ♂. f. Sicilien.

saxatilis Bernh. (= *rupestris* Bernh. = *sicula* Hort. = *vulgaris* γ Spach).

incrassata Hort., v. *Malcolmia incrassata*, p. 382, II.

Mattia Schult. (Baronesse v. Matt, Beförderin der Botanik u. Gartenkunst in Oestreich), V. 1, Asperifoliaceae.

angustifolia G. Don, (= *Cynoglossum angustifolium* W. = *C. emarginatum* Lam. = *C. racemosum* Schreb. = ? *Rindera emarginata* R. et S.), schmalblättrige, 4. f. b. Armenien.

cristata G. Don, (= *Cynoglossum cristatum* Lam. = *Omphalodes cristata* Schrk. = *Rindera cristata* R. et S.), kammförmige, ♂. 4. f. b. Armenien.

glastifolia G. Don, (= *Cynoglossum glastifolium* W. = *Rindera glastifolia* R. et S.), weidblättrige, 4. f. b. Armenien.

lanata Schult. (= *Cynoglossum lanatum* Lam.), wollige, 4. f. b. Armenien.

umbellata Schult. (= *Cynoglossum umbellatum* W. K. = *Symphytum regium* Gmel.), doldige, ♂. f. Banat, Sibirien.

laevigata Schult., v. *Rindera laevigata*.

Mattuschkea aquatica Gmel., v. *Saururus cernuus*, p. 723.

Mauhliia africana Dahl, v. *Agapanthus umbellatus*, p. 22. — *M. ensifolia* Thbg., v. *Polyxena pygmaea*.

Maurandia Ortega, Maurandie.

antirrhiniflora W. (= *personata* Lag. = *Usteria antirrhiniflora* Poir.).

Barclayana Lindl. b) alba Hort. (? = *albiflora* Hort.),
c) coccinea Hort.

juncea Benth., simsensförmige, 4. Sch. k. Californien.
semperflorens Ortega, Jacq. (= *scandens* P. = *Reichardia scandens* Roth, = *Usteria scandens* Cav.).

stricta Hook., steife, ☉. f. Neucalifornien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *albiflora*, *Laceyana* J. Booth, *pulchella* Hort.

Mauria H. B. K. (J. Mauri, Prof. d. Naturgeschichte in Mailand), ? V. III., Amyrideae-Terebinthaceae.

simplicifolia H. B. K. (= *Laurus caustica* Molina, = *Lithraea caustica* Hook., Arn. = *L. venenosa* Miers, = *Litria caustica* Hook. = *Mangifera axillaris* Desr. = *Persica caustica* Spgl. = *Rhus caustica* Hook. = *Spondias simplifolia* Auct.), einfachblättrige, ♀. t. Chili.

Mauritia L. fil., Mauritie.

aculeata H. B. K., stachelige, ♀. w. Südamerika.

Maurocena Frangularia Mill., *Phillyraea* Mill., v. Cassine *Maurocena et capensis*, p. 171.

Maxillaria R. et P., Kerfstendel.

acicularis Lindl., nadelförmiger, 4. w. Brasilien.

acutipetala Lindl., spitzkroniger, 4. w. Mittelamerika.

alata R. et P. (= *Dendrobium alatum* Sw., P.), geflügelter, 4. w. Peru.

alba Lindl. (= *Broughtonia alba* Spgl. = *Dendrobium album* Hook.), weißer, 4. w. Südamerika.

aromatica Grah., Hook. (= *Colax aromaticus* Spgl.),
b) *cruenta* Hort., c) *lutea* Hort., d) *punctata* Hort.

Batemanni Poep., Endl., Batemann's, 4. w. Peru.

chlorantha Lindl., grünblumiger, 4. w. Demerara.

ciliata R. et P. (= *Barringtoniae* Lodd. β Steud. = *Dendrobium ciliatum* Sw.).

costata Lindl., gerippter, 4. w. Mexico.

cyanocheile Hffg., kornblumenblaulippiger, 4. w. Brasilien.

Deppei Lodd., b) *major* Hort., c) *pallida* Hort., d) *punctata* Hort.

furfuracea Scheidw., kleiiger, 4. w. Brasilien.

grandiflora Lindl. (= ? *Skinneri* Batem. = *Broughtonia grandiflora* Spgl. = *Dendrobium grandiflorum* H. B. K.), großblumiger, 4. w. Peru.

guttata ? Lindl., getüpfelter, 4. w. Südamerika.

Harrisoniae Lindl. (= *Colax Harrisoniae* Lindl. = *Dendrobium Harrisoniae* Hook.), b) *alba* Lodd.

imbricata ? Lindl., ziegeldachförmiger, 4. w. Südamerika.

latifolia Lindl. (= *Cymbidium latifolium* Spgl. = *Dendrobium latifolium* H. B. K.), breitblättriger, 4. w. Peru.

lentiginosa Lindl., linsenförmiger, 4. w. Brasilien.

leucocheile Hffg., weißlippiger, 4. w. Brasilien.

liliacea La Llav., lilienähnlicher, 4. w. Mexico.

longipetala R. et P. (= *Dendrobium longipetalum* Sw., P.), langkroniger, 4. w. Peru.

maculata Lindl. (= *Broughtonia maculata* Spgl. = *Dendrobium maculatum* H. B. K.), gefleckter, 4. w. Südamerika (Amazonenflufs).

ornithoglossa Kl., vogelzungenähnlicher, 4. w. Mexico.

palmifolia Lindl. (= *Colax palmifolius* Lindl. = *Dendrobium palmifolium* Sw. = *Epidendron palmifolium* Sw.), palmenblättriger, 4. w. Jamaica.

Maxillaria

- paniculata R. et P. (= *Dendrobium paniculatum* P. =
D. plicatum Dietr.), rispiger, 4. w. Peru.
 pantherina Hffg., pantherfleckiger, 4. w. Brasilien.
 phyllomega Steud. (= *macrophylla* Lindl., non ? Poepp.
 Endl.), langblättriger, 4. w. Mexico.
 picta Hook., b) pallida Booth.
 Poeppigiana Steud. (= *crocea* Poepp., Endl., non Lindl.),
 Poeppig's, 4. w. Peru.
 punctata Lodd., b) lutea.
 Rollissonii Lindl., b) unicolor Makoy.
 rugosa Scheidweiler, runzeliger, 4. w. Brasilien.
 scabrilinguis Hartw., Hook., scharfzungiger, 4. w. Mexico.
 spathacea Lindl., scheidiger, 4. w. Brasilien.
 Steelii Hook. (= *flagellifera* Hort.).
 stenopetala Lodd., schnalkroniger, 4. w. Südamerika.
 subulata Lindl., pfriemiger, 4. w. Brasilien.
 sulphurea Hort. belg., schwefelgelber, 4. w. Südamerika.
 tricolor R. et P. (= *Dendrobium tricolor* Sw., P.),
 dreifarbiger, 4. w. Peru.

- tyrianthina ? Lindl., buntblumiger, 4. w. Südamerika.
 uncinata Lindl., widerhackiger, 4. w. Demerara.
 variabilis Batem. (= *Henchmanni* Hook.).
 virginalis Scheidw., jungfräulicher, 4. w. Mexico.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der
 Handelsgärten noch folgende aufgeführt: atrorubens,
 cucullata, fulva, Kleei, marginata, nana, pedunculata,
 Pinellii, punctulata, Skinneri, xanthina.

- atropurpurea* Lodd., v. *Bifrenaria atropurpurea*, p.
 68, II., *longifolia* Lindl. et *squalens* Hook., v. *Xylo-*
bium longifolium et *squalens*, p. 861, *Heynderickii*
 Morren, v. *Lycaste gigantea*, p. 375, II.

Mayna Aubl., (? guianischer Name), XIII. I., Bixaceae,
(Flacourtiaceae Zuccar.).

- brasiliensis Raddi, brasilianische, 5. w. Brasilien.
Mazeutoxeron reflexum LaBill., *rufum* LaBill., v.
Correa virens et *rufa*.
Meadea Adans., *Dodecatheon* Mill., v. *Dodecatheon*
Meadea.
Medeola angustifolia Hort., v. *Eustrephus latifolius*,
M. angustifolia L. et *asparagoides* L., v. *Myrsi-*
phyllum angustifol. et *asparag.*, p. 538.

Medicago T., L., Schneckenklee.

- aculeata W. (= *crassispira* Vivian. = *ovata* Carmig.
 = *spinulosa* DC. = *strumaria* Hornem.):
 apiculata W. (= *ciliaris* Balb., non W. = *coronata*
 G., non L. = *echinata* Bouché, = *muricata* γ Desr.
 = *polycarpa* W. E. suppl. = *polycephala* Hortul.).
 arenaria Tenore, Sandliebender, ⊙. f. Südeuropa.
 Berteroana Moris, Bertero's, ⊙. f. ? Chili.
 bimuricata Retz, zweifachweichstacheliger, ⊙. f. ?
 brachycarpa Fisch. (= *brachyloba* Fisch.).
 carstiensis Jacq. (= *Noccae* Balb. = *umbellata* Hortul.).
 ciliaris W. (= *hirsuta* Schrk.).
 cretacea MB. (= *M. Nummularia Steveni* Bess.).
 cuspidata Tausch, langspitziger, ⊙. f. ?
 diffusa Poir. (= *nigra* W. var. Sgpl.), weitschweifiger,
 ⊙. f. Teneriffa.
 distans Poir., abstehender, ⊙. f. Südeuropa.
 falcata L., Fr. (= *intermedia* Schult. = *procumbens* Schult.).

Medicago

- glabella Presl, kahler, ☉. f. Sicilien.
 globosa Presl, kugelfrüchtiger, ☉. f. Sicilien.
 Hornemanniana DC. (= *pubescens* Hornem., non DC.),
 Hornemann's, ☉. f. Marocco.
 lappacea Desr. (= *hispida* G. = *Histrix* Tenore).
 litoralis Rohde, β) breviseta DC. (= *polymorpha rigi-*
dula Bertol.).
 lupulina L., ε) corymbosa Ser.
 media P. (= *falcata* Lam. = f. β *versicolor* Wallr.),
 mittlerer, 4. f. Europa.
 mexicana Swt., mexicanischer, 4. h. k. Mexico.
 microdon Ehb., kleinzähner, ☉. f. Aegypten.
 minima L., β) mollissima Roth (= *hirsutissima* Cyril.).
 Murèx W. (= *olivaeformis* Tenore).
 obscura Retz, (= *lenticularis* Desr.).
 paradoxa Spgl., wunderbarer, ☉. f. ?
 pedunculata Ehb., gestielter, ☉. f. Aegypten.
 pennata Schwägr., federiger, ☉. f. ?
 rigidula Lam., All., starrer, ☉. f. Südamerika.
 sardoa Moris, (= ? *microdon* Ehrbg.), sardinischer, ☉. f.
 Sardinien.
 sylvestris Fr. (= *falcata* Sm. et reliq. Auct.), Wald-S.,
 4. f. Europa.

Terebellum W. (= *aculeata* G., non W. = *conica* Schkr.).
 tortuosa Schwägr., gedrehter, ☉. f. ?

Außerdem stellt Herr Prof. v. Trautvetter noch folgende
 früher zu *Trigonella* L. gerechnete Arten hierher, als:
 arcuata Trautv. (= *Trigonella arcuata* C. A. Mey.),
 astroides Trautv. (= *Trigon. astroides* Fisch. et Mey.,
 Turcz.), connivens Trautv. (= *Trigon. cancellata* Dsf.
 = *T. striata* L. suppl.), corniculata Trautv. (= *T. cor-*
niculata L. = *T. esculenta* W.), Fischeriana Trautv.
 (= *Trigon. Fischeriana* Sering.), fissa Trautv. (= *Trigon.*
pinnatifida Cav.), hybrida Trautv. (= *Trigon.*
hybrida Pourr.), monantha Trautv. (= *Trigon. monan-*
tha C. A. Mey.), monspeliaca Trautv. (= *Trigon.*
monspeliaca L. = *T. elatior* Sibth. et Sm.), platy-
 carpa Trautv. (= *Trigon. platycarpa* L.), polycerata
 Trautv. (= *Trigon. polycerata* L.), psilocarpa Trautv.
 nov. spec., pugionata Trautv. (= *Trigon. spinosa* L.),
 pungens Trautv. (= *Trigon. litoralis* Guss.), ruthen-
 nica Trautv. (= *Trigon. ruthenica* L.), stellata Trautv.
 (= *Trigon. aegyptiaca* et *elongata* Hort. = *T. mi-*
crocarpa Fresen. = *T. stellata* Forsk.), ☉. f. Aegypten,
 tenuis Trautv. (= *Trigon. tenuis* Fisch.). Vergl. p.
 821 et 822.

cretica Mill., v. *Pocockia cretica*.

Medicusia Mch., Rchb. (C. Medicus, churpfälz. Rath,
 Botanicus u. Gartendirector †), XIX. 1., Compositae-
 Cichoriaceae.

lappacea Rchb. (= *Crepis lappacea* W. = C. ? *Spreng-*
eriana All. = *Picris pauciflora* W. = *P. pyrenaica*
 G., non L. = *P. Sprengeriana* Pourr. = *P. strigosa*
 Hort.), klettenähnliche, ☉. f. Frankreich, Pyrenäen.

Sprengeriana Rchb. (= *aspera* Mch. = *Crepis rhaga-*
dioloides L. = *C. Sprengeriana* All. = *Helminthia*
Sprengeriana G. = *Hieracium Sprengerianum* L. =
Picris altissima Ledeb. = *P. Sprengeriana* Lam., P.,
 p. 623), Sprenger's, ☉. f. Südeuropa.

Zu berichtigen p. 883.

Medinilla Gaudich., DC., Medinille.

eximia Blume, (= *Melastoma eximia* Jack.), ausgezeichnete, f. f. w. Java.

Medium saxifragum Fisch., et *sayanense* Fisch., v. Campanula Saxifraga et altaica, p. 155 et 152.

Medusea fructus pini Haw., *major* Haw., *procumbens* Haw., *tessellata* Haw., v. Euphorbia fructus pini, caput medusae etc.

Meerburgia glomerata Mch., v. Pollichia campestris, p. 640.

Megapterium missouriense Spach. (= *Nuttallianum* Spach), v. Oenothera macrocarpa, p. 555.

Megasea ciliata Haw., *cordifolia* Haw., *crassifolia* Haw., *ligulata speciosa* Hort., *media* Haw., v. Saxifraga Sect. I. ligulata, cordifolia etc., p. 724.

Megastegia speciosa Don, v. Astragalus Ammodytes, p. 104.

Melaleuca L., J. C. et S. Schauer, Kajeputbaum.

abietina Sm., tannenähnlicher, f. t. k. Neuholland.

brachyphylla Schauer, (= *tenuissima* Tausch), kurzblättriger, f. k. t. Südwestl. Neuholland.

Cajuputi Roxb. (= *minor* Sm. = *M. Leucadendron* Lam., non L. = *Myrtus saligna* Gmel. system).

Cunninghamii Schauer, f. k. t. Neuholl. (Ob eingeführt?)

cuticularis LaBill. (= *imbricata* Lk.).

decussata RBr. (= *pumila* Otto).

diosmaefolia Andr. (= *foliosa* Dum. Cours.).

divaricata Don, ausgespreitzter, f. f. k. t. Neuholland.

Drummondii H. angl., Drummond's, f. f. k. t. Neuholland.

epacridea H. angl., felsenbuschähnlicher, f. f. k. t. Neuh.

ericaefolia Sm. (= *axillaris* Hort. = *nodosa* Rchb. in Sieb. Herb., non Sm.).

erubescens Otto (= *diosmatifolia* Dum. Cours.).

incana RBr. (= *hypochondriaca* Dehnh. = *lanata* Nois. = ? *lanigera* Wendl.).

juniperoides DC. (= *Metrosideros juniperoides* Rchb., Sogl.), wachholderähnlicher, f. f. k. t. Neuholland.

lanceolata Otto (= *polygonoides* Hffg. = *lucidula* Hffg.).

lateritia Lk. et Otto (= *callistemonea* Lindl.).

microphylla Sm., kleinblättriger, f. f. k. t. Neuholland.

Ottonis Schauer, Otto's, f. k. t. Neuholland.

parviceps Lindl., kleinköpfiger, f. f. k. t. Neuholland.

parviflora Lindl., kleinblumiger, f. f. k. t. Neuholland.

propinqua Schauer, verwandter, f. f. k. t. Westl. Neuholland. (Ob eingeführt?)

pulchella RBr. (= *serpyllifolia* Dum. Cours. = *densa* Colla, non RBr.).

radula Lindl., raspelförmiger, f. f. k. t. Neuholland.

scabra RBr. (= ? *muricata* Hort.).

striata LaBill. (= *Fraseri* Hook. = *hispida* et *ulicina* Hort.).

spinosa Lindl., dorniger, f. f. k. t. Neuholland.

stricta Sm., Hort. Cels., steifer, f. f. k. t. Neuholland.

tenuifolia DC., dünnblättriger, f. f. k. t. Neuholland.

tetragona Lodd., vierkantiger, f. f. k. t. Neuholland.

thymifolia Sm. (= *calycina* Hort.), β) *discolor* Rchb. (= *elegans* Hornsch.).

thymoides LaBill. (= ? *lucidula* Hort.).

trichophylla Lindl., haarblättriger, f. f. k. t. Neuholland.

vininea Lindl., ruthenförmiger, f. f. k. t. Neuholland.

Melaleuca

violacea Schauer, violetter, ꞥ. ꞥ. k. t. Neuholland.
viridiflora Sm. (= *angustifolia* G. = *M. Leucadendron* β L. fil.).

Noch werden in den Verzeichnissen der Handelsgärtner folgende aufgeführt: *flavescens*, *pinifolia* Hort. (= ? *Lechii* Colla), *robusta*, *rubra*, *triformis*.

M. conferta Steud., *laurina* Sm. (= *suaveolens* G.), *nerifolia* Sims, (= *salicifolia* Andr.), v. *Tristania conferta* etc., p. 823, *empetrifolia* Rehb., v. *Beaufortia empetrifolia*, p. 62, II., *sprengelioides* DC., v. *Regelia ciliata*, *teretifolia* Endl., v. *Gymnagathis teretifolia*, p. 277, II. Hinsichtl. der übrigen s. *Leptospermum*, p. 456 et p. 352—353, II.

Melampodium australe L., *humile* Sw., v. *Acanthospermum xanthioides* et *humile*, p. 5, II.

Melampyrum T., Wachtelweizen.

saxosum Baumg., Gesteins-W., \odot . f. Siebenbürgen.

Melanthera Michx., Rich.

deltoidea Mchx. (= *urticaefolia* Cass. = *Calea aspera* Jacq.).

hastata Mchx. (= *Linnaei* Kunth, = *Bidens nivea* L.), p. 505.

Melanchrysum Pavonium Cass., *rigens* Cass., *spinulosum* Cass., v. *Gazania Pavonia*, *rigens*, *speciosa*, p. 256, II.

Melandrium Clus., Röhl., Rehb., Fenzl, Fr., v. Lych-nis, Sect. III., p. 482 et p. 376, II.

Melanoloma humilis Cass. (= *pullata* Cass.), v. *Centaurea pullata*, p. 178.

Melanopsidium Cels, Schwarzröthe, V. 1., Rubiaceae.

M. nigrum Cels, (= *Billiottia psychotrioides* DC. = *Viviania psychotrioides* Colla), psychotriaähnliche, ꞥ. ꞥ. w. ? (Zu berichtigen p. 565).

Melanopsidium nigrum Colla, v. *Amajoua corymbosa* Nachlese.

Melanosinapis abyssinica A. Braun, *communis* Spenn. et Schimp., v. *Brassica carinata* et *nigra*, p. 77, II.

Melanthesa rhamnoides Blume, v. *Phyllanthus rhamnoides*, p. 620.

Melanthium L., Kunth, Braunblümchen.

marginatum Schldtl. (= *capense* Lichtenst. herb. = *Schlechtendalianum* Schult.), berandetes; 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

α) minor, β) major.

capense L. (= *aethiopicum* Desv.), *eucomoides* Jacq., v. *Androcymbium leucanthum* et *eucomoides*, p. 54, *densum* Lam., v. *Chamaelirium carolinianum*, p. 186, *gramineum* Cav. (= *angustifolium* W.), *punctatum* Cav., v. *Erythrostictus gramineus* et *punctatus*, p. 233, II., *indicum* L. mant., v. *Iphigenia indica*, p. 318, II., *Muscaetoxicum* Walt., v. *Amiantanthus Muscaetoxicum* Nachlese, *polygamum* Desr. (= *virginicum* L.), v. *Zygadenus virginicus*, *sibiricum* L., v. *Anticlea sibirica*, p. 40, II., *uniflorum* Jacq. (= *ciliatum* Jacq. = *aethiopicum* Thbg. = *flavum* Sm.), v. *Kolbea Breyniana*, p. 439, *Sabadilla* Thbg., v. *Xerophyllum Sabadilla*, p. 860.

Melasma hispidum Benth. (= *Lyncea hispida* Cham., Schldtl.), v. *Gastromeria physaloides*, p. 255, II.

Melastoma Burm., L., Schwarzschlund.

- Banksii* Cunningh., Banks's, f. f. w. Neuholland.
erectum Jacq. (= *malabathr.* L. var. DC.), aufrechter,
 f. w. Sumatra, Java.
fragile L., zerbrechlicher, f. w. Mexico, Brasilien, Surinam.
hispidum Sw., steifhaariger, f. w. Jamaica.
Linkii R. Schomb., Link's, f. f. w. Guiana. (Ob eingef.?)
madagascariense Don, madagascarischer, f. f. w. Madagascar.
normale Don, (= *nepalense* Lodd.).
radulum Hffg., raspelförmiger, f. f. w. Brasilien.
robustum Hort., starker, f. w. ?
splendens Sw. (= *plantaginifolium* Mill.), schimmern-
 der, f. f. w. Jamaica.

asperum L., *octandrum* L., v. *Osbeckia aspera*,
octandra, *canescens* H. Cels, *cardinalis* Spgl., *vil-*
losa Aubl., v. *Chaetogastra canescens*, *cardinalis*,
hypericoides, p. 135, II., *coerulea* Hort., *argenteum*
 Desv. (= *clavatum* P.), v. *Lasiandra coerulea*, *ar-*
gentea, 343 u. 344, II., *discolor* L., v. *Tetrazygia*
discolor, *grandifolium* Hort., v. *Miconia grandifolia*,
 p. 522, *granulosum* Desr., *heteromallum* Don, Sims,
 etc., v. *Pleroma Fontanesianum*, *heteromallum* etc.,
rubro-limbatum Lk. et Otto, v. *Lachnopus rubro-*
limbatus, p. 339, II., *stellatum* Vahl, v. *Calyco-*
gonium stellatum Nachlese, *superbum* Bonpl. etc.,
 v. *Conostegia superba* etc., p. 156 et 157, II., *va-*
cillans Blume, v. *Dissochaeta vacillans* Nachlese.
Melaxis (*Malaxis*) *lancifolia* Sm., Steud., v. *Em-*
pusaria paradoxa, p. 220, II.

Melia L., Juss., Zedrach.

- Candollei* Juss. (= *composita* DC., non W.), Candolle's,
 f. w. Timor.
composita W. (= ? *dubia* Cav. = *robusta* Roxb. =
superba Roxb.).
Azadirachta L., v. *Azadirachta indica*, p. 55, II.,
baccifera Roth, (= *baccata* Heyne), v. *Mallea*
 Rothii, p. 382, II.

Melica L., Perlgras.

- caffrorum* Schrad., Kaffern-P., 4. k. Cap d. g. Hoffn.
exasperata R. et S. (= *asperrima* Hort. = *exasper-*
rima Hort.), rauhes, 4. f. ?
minuta L. (= *aspera* Vivian. = *nutans* Cav., non L.
 = *ramosa* Lois. = *saxatilis* Sib., Sm.), kleines, 4.
 f. Italien, Griechenland.

Melichrus RBr., Honigstrauch.

- adpressus* Cunningh., angedrückter, f. t. Neuholland.
erubescens Cunningh., röthlicher, f. t. Neuholland.

Melicocca L., bijuga L. (= *carpoodea* Juss. = *Mel-*
licoccus bijugatus Jacq.).**Melicope** Forst., Honigraute.

- simplex* A. Cunningh. (= *Astorganthus Hügelii* Endl.),
 einfache, f. t. k. Neuzeeland.

Melidora pellucida Noronh., v. *Encyanthus quin-*
queflorus.

Melilotus T., Steinklee.

- arvensis* Wallr. (= *Petitpierreana* Hayne, = *expansa*
 Hort. = *Kochiana* DC. = *diffusa* K. = *pallida* Bess.
 = *flava* Auct.), Acker-St., ☉. f. Europa.
dentata W. (= *Kochiana* Hayne, = *procumbens* Hort.
 = *olympica* Hort.).

Melilotus

- elegans Salzm., zierlicher, ☉. f. Corsica.
glomerata Fisch. (= *brachyloba* Fisch. = *Medicago brachycarpa* Fisch., p. 501, = *Trigonella glomerata* Hort. Par.), knaulförmiger, ☉. f. Tiflis.
gracilis DC. (= *neapolitana* Tenore, = *globulosa* Stev. = *parviflora* Stev. = *glaucescens* God.).
graveolens Bunge, starkriechender, ☉. f. Nordchina.
lupulina Trautv. (= *Medicago lupulina* L., p. 502 = *M. Willdenowii* Merat).
microcarpa Balb. (= ? *anomala* Ledeb. = *Trifolium micranthum* Viv., p. 819).
officinalis W. (= *macrorrhiza* P. = *palustris* Kit.).
parviflora Dsf. (= *Bonplandii* Hort. = *Baumerti* Hort. = *diffusa* Trevir. = *Fleischeri* Hort.).
ruthenica MB. (= *integerrima* Stev. = *laxa* Stev.).
sulcata Dsf. (= *longifolia* Tenore, = *mauritanica* W.).
taurica Sering., MB. (= *Besseriana* Sering. = *imbri-cata* Bess. = *plicata* Stev.).
vulgaris W. (= *alba* Thuill. = *leucantha* K. = *mela-nosperma* Bess. = *stricta* Hort. = *gigantea* Hort. = *angulata* Hort. = *rugulosa* Hort.).
coerulea Desv., *uncinata* Poir. (= *hamosa* Lk.),
v. *Trigonella coerulea* et *spicata*.
Hiernach p. 507 u. 508 zu berichtigen.

Melinum palustre Lk., v. *Hydropyrum esculentum*.

- Meliphlea** Zuccar., Honigmalve, XVI. VIII., Malvaceae.
vitifolia Zuccar., weinblättrige, ♀. w. Mexico. (Ob kult.?)
Melissa Sibth., Sm., Melisse.

- altissima* Sibth., Sm. (= *cordifolia* P. = *hirsuta* Balb. = *romana* Mill. = *taurica* Hortul. = *officinalis* L. β *villosa* Benth.).
officinalis L. (= *corsica* Hortul. = *occidentalis* Rafin.).
Unbestimmt: *arborescens* Dsf., ♀. ? ?

M. Acinos Benth., *alpina* Benth., *Calamintha* L. (= *intermedia* Baumg. = *umbrosa* Auct.), *caroliniana* Benth., *cretica* L., *grandiflora* L., *graveolens* Benth., *Nepeta* L. (= *aetheos* Hortul.), *patavina* Benth., *purpurascens* Benth., *thymifolia* Benth., *umbrosa* MB., v. *Calamintha Acynos* etc., p. 144 et p. 104, II., *alba* W. K., v. *Satureja rupestris*.
M. Clinopodium Benth., *organifolia* Benth., v. *Clinopodium aegyptiacum* et *vulgare*, *organifolium*, p. 206, *microphylla* Benth., v. *Thymus corsicus*, p. 809, *pyrenaica* Jacq., v. *Horminum pyrenaicum*.

Melissitus dentata Mch., v. *Pocockia cretica*, p. 638.

- Melittis** L., *Melissophyllum* L., β) *album*, p. 508, (*M. albida* Gussone).

- Melocactus** C. Bauh., T., p. 508, v. Cacteeae, p. 89, II.

- Melochia** L., Melochie.

- macrophylla* H. B. K. (= *tomentosa* L. var. Spgl.), großblättrige, ♀. w. Neuandalusien.
mollissima Dsf., P., weichblättrige, ♀. w. Südamerika.
pyramidata L. (= *domingensis* Jacq.).
arenosa Benth., *fasciculata* Benth., *lanceolata* Benth., *melissaefolia* Benth., *oblonga* Benth., *ulmifolia* Benth., *vestita* Benth. Sämtlich ♀. und in dem englischen Guiana heimisch, scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

- Unbestimmt: *varroniaefolia* Dsf., ♀. ? ?

- Melodinus** Forst., Beerendreher.
monogynus Carrey, β) *macranthus* DC. (= *monogynus* Lindl., Sims).
parvifolius Lodd., Swt., kleinblättriger, \S . Sch. w. Ostindien.
undulatus Lodd., Swt., wellenförmiger, \S . Sch. w. Ostindien.
- Melolobium** Eckl., Zeyh., Lappenklee, XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.
cernuum Eckl., Zeyh. (= *Cytisus aethiopicus* L. = *Lotus cernuus* L. = *Ononis aethiopica* Burm. = *O. cernua* L., p. 559, = *Sphingium viscidulum* E. Mey.), gebogenhülsiger, \S . k. t. Cap d. g. Hoffn.
Melongena incurva Mill., *ovata* Mill., *spinosa* Mill., *teres* Mill., v. *Solanum esculentum* et *ovigerum*, p. 766 et 768.
- Melothria** L., Kümmerling.
monoica Schrad., einhäusiger, \odot . Sch. f. m. Indien.
- Memecylon** L., Beerenbaum.
ramiflorum Lam. (= *tinctorium* W. = *umbellatum* Blume, = *Melaleuca bicolor* Poir.), astblühender, \S . w. Mauritius, Zeylon.
Meneghinia asperrima s. *hispidissima* Endl., v. *Arnebia hispidissima* Nachlese.
- Meniscium** Schreb., Mondfarn.
dentatum Presl, (= *palustre* Raddi, Lk. Hort.), gezahnter, 4. w. Brasilien.
- Menkea** Lehm. (C. Th. Menke, berühmt. deutscher Naturforscher), XV. ii., Cruciferae-Camelineae.
australis Kunze, neuholländische, \odot . f. Westl. Neuhollad.
- Menochilus** p. 510, v. *Monochilus*.
- Mentha** T., Münze.
aquatica L. (= *acute-serrata* Opiz, = *aurita* Weihe, = *brachiata* Weihe, = *bugulaefolia* Weihe, = *glabra* N. E. = *nigrescens* Weihe, = *organoides* Lej., non Tenor. = *palustris* Mill. = *pedunculata* P.) α) *memorosa* Fr. (= *capitata* Opiz, = *intermedia* Host, = *purpurea* Host), β) *hirsuta* L. (= *dubia* Vill. = ? *dumetorum* Schult. = *riparia* Schreb. = *stricta* Beck.), γ) *ballotaefolia* Opiz, (= *paludosa* Sole, = *palustris* Sole, = *rivalis* Sole).
arvensis L., α) *Benth.* (= *acutifolia* Sm., Rchb. = *badensis* N. E., Gmel. = *carinthiaca* Host, = *dalmatica* Tausch, = *diffusa* Lej. = *divaricata* Host, = *Ehrhardtiana* Lej. = *exigua* All. = *gentilis* Mill. = *intermedia* N. E. = *laxa* Host, = *melissaefolia* Host, = *montana* Host, = *mosana* Lejeun. = *multiflora* Host, = *Neesiana* Opiz, (= *nitida* Host), = *nummularia* Schreb. = *paludosa* N. E. = *parietariaefolia* Beck. = *parviflora* Host, = *parvifolia* Opiz, = *pilosa* Wallr. = *polymorpha* Host, = *procumbens* Thuill. = *rotundata* Opiz, = *rubro-hirta* Lej. = *scrophulariaefolia* Lej. = *stachyoides* Host, = *suaveolens* Host, = *tenuifolia* Host, = *varians* Host, *villosa* Beck.), β) *gentilis* Sm., γ) *agrestis* Sole, (= *lamiiifolia* Host, = *ocimoides* Host, = *pumila* Host), δ) *glabra* Sole, (= *gentilis* Host, = *praecox* Sole).
breviscapa Lehm. (= *viridis* L. sec. Benth.), kurzschafte, 4. f. Alt. Sibirien.
citrata Ehrh. (= *nigricans* Mill. = *odorata* Sm.).
crispata Schrad. (= *cordifolia* Opiz, = *hortensis* Opiz).

Mentha

dahurica Fisch., Benth. (= *Horminum clinopodiifolium* P. = *Lepechinia clinopodiifolia* W., p. 453), dahurische, 4. f. Sibirien.

gentilis L. (= *arvensis* var. Benth. = *austriaca* Host, *atrovirens* Host, = *elegans* Lejeun. = *gracilis* Sole, *grata* Host, = *pulchella* Host, = *resinosa* Opiz, = *rubra* Sole, = *sativa* Sole, = *variegata* Sole, = *virgata* Salisb.).

incaua W. (= *cretica* Hort. = *persica* Hort. = *spicata* Forsk.).

piperita L., b) fol. variegatis.

Pulegium L. (= *exigua* L. = *simplex* Host, = *Pulegium erectum* Mill. = *P. vulgare* Mill.), β) gibraltarica W. (= *pulegioides* Rchb. = *tomentella* Lk. = *tomentosa* Sm. = *Puleg. tomentella* Presl).

reversa Rchb. (= *elata* Host, = *hirsuta* Auct. var. = *longifolia* Host, = *maculata* Host, = *nitida* Host, = *purpurascens* Host), zurückgekrümmte, 4. f. Europa.

rotundifolia L. (= *oblongata* Tenore, = *fragrans* Presl, = *Halleri* Dierb. = *mucronulata* Opiz, = *rugosa* Lam. = *serotina* Tenore, = *suaveolens* Ehrh.).

sativa L. (= *Agardhiana* Fr. = *angustifolia* Schreb. = *aquatica* var. Auct. = *arvensis* var. Benth. = *arguta* Opiz, = *carniolica* Host, = *coerulea* Opiz, = *crenata* Beck. = *dubia* Schreb. = *latifolia* Host, = *melissaefolia* Lej. = *nemorosa* Host, = *nobilis* Weihe, = *obtusata* Opiz, = *origanifolia* Host, = *ovalifolia* Opiz, = *paludosa* Schreb. = *palustris* Mch. = *pilosa* Spgl. = *plicata* Opiz, = *rivalis* Sole, = *Rothii* N. E. = *serotina* Host, = *Speckmoseriana* Opiz, = *tortuosa* Host, = *verticillata* Mill. = *villosa* Beck. = *viridula* Host).

suavis Guss. (= ? *balsamea* W. E. = ? *divaricata* Lag. = ? *emarginata* Rchb. = *glomerulata* Jan, = *Langii* Geiger, = ? *pubescens* W. E.), feinriechende, 4. f. Südeuropa.

sylvestris L., α) *canescens* Roth, β) *candicans* Crantz, (= *pallida* N. E.), γ) *Eisenstadtiana* Opiz, (= *Rosani* Tenore), δ) *mollissima* Borkh. (= *chalepensis* Mill.), ε) *gratissima* Wigg. (= *candicans* Mill. = *alopecuroides* Hull. = *Brittingeri* Opiz, = *Halleri* Gmel. = *hybrida* Schleich. = *Kortearna* Boenningh. = *longifolia* Huds. = *niliaca* W., non Vahl, = *oblonga* Opiz, = *ratisbonensis* Opiz, = *reflexifolia* Opiz, = *spicata* L. = *suavis* Hoffm. = *tomentosa* Borkh. = *villosa* Huds., Sole, Sm. = *Wierzbickiana* Opiz), ζ) *nemorosa* W. (= *niliaca* Jacq. = *sapida* Tausch).

tomentosa Urvill. (= *canescens* Sieb. = *cretica* Hort.), filizige, 4. f. Süd- und Osteuropa.

undulata W. (= ? *crispa* Tenore, = *dulcissima* Dumort. = *Lamarckii* Tenore, = *tomentosa* Hoppe, = *foliosa* Opiz, = *velutina* Lej. = ? *hybrida* Schleich.).

viridis L. (= ? *balsamea* Rchb. = ? *glabra* Mill. = *sylvestris* L. var. K.), β) *Michelii* Rchb. (= *Lejeunii* Opiz, = *tenuifolia* Opiz).

Auricularia L. mant., *pumila* Grah. etc., v. *Dysophylla Auricularia* etc., p. 213, II., *australis* RBr., v. *Micromeria australis*, *blanda* Wall., *incisa* Wall. etc., v. *Elsholtzia blanda*, *incisa* etc., p. 219, II.

Mentzelia Lindleyi Torr. et Gr. (= *M. Bartonica* Steud.), et *ornata* Torr. et Gr., v. *Bartonia aurea* et *ornata*, p. 114.

Menyanthes T., trifoliata L., β) *paradoxa* Fr.

M. brasiliica Arrabida, (= *indica* Aubl.), *ceramica* Hamilt., *nymphaeoides* L. etc., v. *Limnanthemum Humboldtianum*, *indicum* etc., p. 360, II., *exaltata* Sims, (= *excelsa* Hort.), *ovata* L., v. *Villarsia parnassifolia*, *ovata*, p. 848.

Meschium aristatum P. B., *australe* P. B., v. *Ischaemum aristatum*, *australe*, p. 424.

Meratia fragrans N. E., v. *Chimonanthus fragrans*, p. 190.

Meratia Sprengelii Cass., v. *Elvira biflora*, p. 210, II.

Merciera A. DC. (Phil. Mercier, aus Martinique gebürtig, in Genf).

tenuifolia A. DC., p. 511, (= *Roella compacta* Thbg. = *R. pinifolia* Thbg. = *R. tenuifolia* Thbg. = *Trachelium tenuifolium* L. fil., Thbg.).

Merckia Fisch. (= *Wilhelmsia* Rchb.), *Merckia*, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

physodes Fisch. (= *peploides* G. Don, = *Arenaria physodes* Fisch.), blasige, 4. f. Nordasien, Nordamer.

Mercurialis T., Bingelkraut.

capensis Spgl. (= *tricocca* E. Mey.), *capisches*, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Merendera Ram., v. *Bulbocodium*, Sect. I., p. 81, II.

Meriandra Wall., Benth., Theilbeutler, II. I., Labiatae.

benghalensis Benth. (= *Salvia abyssinica* RBr., non L. nec Jacq. = *S. benghalensis* Roxb. = *S. dianthera* Roth, = *S. indica* Heyne, = *S. stachydea* W. herb. = *S. stellata* Hamilt. hrb. = *S. viscosa* Wight hrb.), bengalischer, \S . k. t. Ostindien¹).

Meriania Swt., Merianie.

rosea Juss. (= *leucantha* var. Spgl. = *Wrightia rosea* Hort. angl.), rosafarbige, \S . w. Jamaica.

Meristostigma aculeatum Steud., *anceps* Dietr., *corymbosum* Dietr., *Fabricii* Dietr., *falcatum* Dietr., *fissifolium* Dietr., *heterophyllum* Dietr., *junceum* Steud., *silenoides* Dietr., v. *Lapeyrouisia aculeata*, *anceps*, *corymbosa*, *Fabricii*, *falcata*, *fissifolia*, *fasciculata* etc., p. 445 et p. 342, II.

Meristotropis Fisch. et Mey., Theilkiel, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

triphylla Fisch. et Mey. (= *Glycyrrhiza triphylla* Fisch. et Mey.), dreiblättriger, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

Mertensia Roth, Mch. suppl., G. Don, DC., non W., nec Thbg., nec H. B. K., (Mertens, ehem. Director der Handelsschule zu Bremen, ausgezeichnete Botaniker, V. I., Asperifoliaceae.

dahurica G. Don, (= *Casselia dahurica* et *gracilis* Dumort. = *Lithospermum davuricum* Lehm. = *Platynema dahuricum* * p. 634, = *Pulmonaria amoena* Stev. = *P. dahurica* Fisch. = *P. gracilis* W. = *Steenhammera dahurica* Turcz.).

1) Wird in den indischen Gärten häufig gebaut und wie unsere *Salvia officinalis* verwendet.

Mertensia

- denticulata G. Don, (= *Lithospermum denticulatum* Lehm. = *L. sibiricum* Ledeb. = *Platynema denticulatum* * p. 634, = *Pulmonaria denticulata* R. et S. = *P. sibirica* Pursh), Nordam., Sibirien, Kamtschatka.
- Drummondii G. Don, (= *Lithospermum Drummondii* Lehm.), Drummond's, 4. f. Nordamerika.
- lanceolata DC. (= *Casselia lanceolata* Dumort. = *Lithospermum marginatum* Spgl. = *Pulmonaria lanceolata* Pursh, = *P. marginata* Nutt. = *Platynema marginatum* * p. 634), lanzettliche, 4. f. Nordamerika.
- maritima Roth, Gray, Lk., G. Don, (= *parviflora* G. Don, = *Casselia maritima* et *parviflora* Dumort. = *Cerithe maritima* Dill. = *Hippoglossum maritimum* Hartm. = *Lithospermum maritimum* Lehm. = *Platynema maritimum* * p. 634, = *Pulmonaria maritima* L. = *P. parviflora* Mchx. = *P. procumbens* Stok. = *Steenhammera maritima* Rehb.).
- paniculata G. Don, (= *Casselia paniculata* Dumort. = *Lithospermum paniculatum* Lehm. = *Platynema paniculatum* Schrad., p. 634, = *Pulmonaria paniculata* Ait.).
- pilosa DC., ? G. Don, (= *corymbosa* G. Don, = *Lithospermum corymbosum* L. = *L. denticulatum* Hook. et Arn. = *Pulmonaria pilosa* Chamiss. = *Steenhammera pilosa* Turcz.), behaarte, 4. f. Nordamerika. (Ob kultivirt?)
- sibirica G. Don, DC. (= *Pallasii* G. Don, = *Lithospermum sibiricum* Lehm. = *L. Pallasii* Ledeb. = *Platynema sibiricum* * p. 634, = *Pulmonaria bracteata* W. herb. = *P. sibirica* L. = *Steenhammera Pallasii* Kar. et Kiril.).
- stylosa DC. (= *Pulmonaria stylosa* Fisch. = *Steenhammera stylosa* Turcz.), langgriffelige, 4. f. Sibirien.
- villosula G. Don, (= *Casselia villosula* Dumort. = *Lithospermum villosulum* Lehm. = *Pulmonaria villosula* R. et S.), zottige, 4. f. Carpathen.
- virginica DC. (= *pulmonarioides* Roth, Mch. suppl. = *Casselia virginica* Dumort. = *Hippoglossum virginicum* Lilja, = *Lithospermum pulchrum* Lehm. = *Platynema pulchrum* * = *Pulmonaria virginica* L.), virginische, 4. f. Nordamerika.
- Noch nicht kultivirte: kamczatica A. DC. (= *Lithospermum kamczaticum* Turcz. = *L. Schreberianum* Spgl.), Kamczatka, pubescens DC. (= *Pulmonaria pubescens* W.), kurilische Inseln, rivularis DC. (= *Lithosperm. rivulare* Turcz.), Sibirien, simplicissima G. Don, (= *Casselia simplicissima* Dumort. = *Pulmonaria simplicissima* Ledeb.), Ostsibirien, serrulata DC. (= *Lithospermum serrulatum* Turcz. = *Steenhammera serrulata* Turcz.), Sibirien.

Mertensia Iguanea R. et S., *laevigata* H. B. K., v. *Bieneria Iguanea* et *laevigata* Nachlese.

Mesembryanthemum Dill., L., Zaserblume.

- acutangulum Haw., spitzwinkelige, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.
- agninum Haw. var. denticulatum, integrum Salm Dyck.
- amoenum Salm Dyck, angenehme, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.
- aurantiacum Haw. (= *aurantium* W. = *glaucoides* Haw.).
- Boerhavia Eckl., Zeyh., Boerhav's, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.
- brevifolium Ait. (= *erigerifolium* Jacq.).

Mesembryanthemum

- Burmanni Haw., Burmann's, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 Candollei Haw. (= *helianthoides* DC., non Ait.), Candolle's, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.
 caulescens Mill., Haw. (= *deltoides* γ W. β *simplex* DC.).
 clavatum Jacq. (= *defoliatum* Haw.).
 claviforme DC. (= *clavatum* Haw., non Jacq.), keulförmige, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.
 corallinum Haw., non Thbg.
 coralloides DC. (= *corallinum* Thbg., non Haw.), korallenähnliche, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 crispum Haw. (= *crispatum* Haw.), krause, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.
 crystallinum L., β) glaciale Haw.
 dolabriforme L., β) dolabriformoides Haw.
 felinum Lam., Haw. (= *ringens* L.).
 flaccidum Jacq., schlaffe, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.
 geminiflorum Haw. (= *geminatum* Haw., non Jacq.), paarblumige, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 glaucinum Haw. (= *tricolor* Jacq. hort., non Haw.).
 gramineum Haw., grasartige, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.
 grossum Ait. (= *aggregatum* Haw. = *carneum* Haw.).
 hirtellum Haw. (= ? *hispidifolium* Haw. = *pilifolium* W.).
 humile Haw., niedrige, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 β) Petiverii Haw.
 incurvum Haw. (= *multiradiatum* Jacq.).
 junceum Haw. (= *aphyllum* Hort. ? = *articulatum* Thbg.).
 laevigatum Haw. (= ? *acinaciforme* L. var. Spr. = ? *virescens* Haw.), glattliche, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 lanceolatum Haw. (= ? *filiforme* Thbg. = *Volckameri* Haw.).
 laurifolium Haw., lorbeerblättrige, ⚭. k. Cap d. g. H.
 Lehmanni Eckl., Zeyh., Ecklon's, ⚭. k. Cap d. g. H.
 longistylum DC. (= *pallens* Jacq. = *palescens* Haw. = *reflexum* β Haw.).
 multipunctatum Salm Dyck, vielpunktirte, ⚭. k. Cap d. g. H.
 notabile Lk., bemerkenswerthe, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 obtusum Haw. (= *fissoides* Haw.).
 pallens Ait. (= *canaliculatum* Hort.).
 papuliferum Haw., weichwarzigtragende, ⚭. k. Cap d. g. H.
 papulosum L., weichwarzige, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.
 perfoliatum Mill., Haw., β) monacanthum Bradl. (= ? *edentulum* Haw.).
 procumbens Haw. (= *dubium* Salm).
 protractum Lk., verlängerte, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 purpureo-croceum Haw., purpursafraunfarbige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.
 ramulosum Haw. (= *rostratoides* Haw. = *rostratum* L. var. Page).
 rapaceum Jacq., rübenartige, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 retroflexum Haw. (= *deflexum* Salm, = *elegans* Jacq. *leptaleum* Haw.).
 rostellatum Haw.
 rostratum L., β) tuberculatum Mill.
 Schollii Salm, (= *aduncum* Jacq., W. E. = *recurvum* Haw.).
 serratum L. (= *serratifolium* Hort).
 spathulatum Thbg., W. (= *criniflorum* Thbg.).
 subalatum Haw., weniggeflügelte, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn.
 tetragonum Thbg., ? Mch., vierkantige, ⚭. k. Cap d. g. H.

Mesembryanthemum

Thunbergii Haw. (= *laeve* Thbg., non Ait.), Thunberg's, ꝛ. k. Cap d. g. Hoffn.

tricolorum W. (= *pyropaeum* Haw.).

turbinatum Jacq., aufgetriebene, ꝛ. k. Cap d. g. Hoffn.

validum Haw., starkbewehrte, ꝛ. k. Cap d. g. Hoffn.

violaceum DC. (= *parvifolium* Lam. = *puniceum* Jacq.).

viride Haw. (= *subaduncum* Haw.).

Unbestimmtere: *ampullaceum* Hort. Liverp., *articulatum*

Jacq., *connatum* Hortul., *coralliforme* Vest, *fuscum*

Hort., *purpureum* Fisch., *recurvum* Mch.

Mesodetra alata Rafin., v. *Helenium quadridentatum*.

Mespilus T., Mispel.

odorata Wendl., wohlriechende, f. Nordamerika.

pruinosa Wendl. fil. (= *caroliniana* Wendl. Hort. Herrenh.).

bereifte, ꝛ. Nordamerika.

pubescens Presl, weichhaarige, ꝛ. f. Sicilien.

Wendlandi Opiz, (= *pubescens* Wendl., non Presl),

Wendland's, ꝛ. f. Nordamerika.

M. badiata Bosc, (= *Bosciana* Spach), *corallina*

Dsf., *Fontanesiana* Spach, *stipulacea* Spach etc.,

v. *Crataegus Bosciana*, *cordata*, *Fontanesiana*, *stipu-*

lacea etc., p. 165 et 166, II.

Messerschmidia L., R. et Schult., v. *Tournefortia* Sect.

Mesua L. (= *Naghas* Mirb.), (J. Mesuach oder Mesue, alter arabischer Arzt eines Khalifen zu Kairo), XVI. VIII., Guttiferae.

ferrea L. (= *Calophyllum nagassaricum* Burm.), eisenharte, ꝛ. w. Ostindien, Molucken.

speciosa Choisy, prächtige, ꝛ. w. Ostindien.

Metabasis DC., Nesselblatt, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

aethnensis DC. (= *Seriola aethnensis* L., p. 747, = *S. hispida* Mch. = *S. urens* All.).

cretensis DC. (= *Seriola cretensis* L., p. 747, = *S. rubescens* Tineo, = ? *urens* L.), cretisches, ☉. ♂. f.

Sicilien, Malta, Griechenland.

Metagnanthus Endl., Hautschüppchen, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

parviflorus * (= *Athanasia crithmifolia* Hort., non L.

= *A. parviflora* L. = *Hymenolepis leptoccephala* Cass.

= *H. parviflora* DC. = *H. pinnata* Less. = *Tanacetum crithmifolium* L.), kleinblumiges, ꝛ. k. Cap

der guten Hoffnung.

Metagonia Nutt., *corymbodendron* Nutt., *myrtifolia*

Nutt., v. *Vaccinium ovatum*, *myrtifolium*, p. 834.

Metalasia RBr., Metalasie.

capitata Less. (= *ericoides* Sieb. = *Gnaphalium capitatum* Lam., non Thbg.), kopfförmige, ꝛ. t. k. Cap der guten Hoffnung.

cephalotes Less. (= *Endoleuca pulchella* Cassin. = ? *Gnaphalium carneum* Lam. = *G. cephalotes* Thbg.

Helichrysum cephalotes Don), großköpfige, ꝛ. t. k.

Cap d. g. Hoffn.

distans DC. (= *Gnaphalium distans* Sckrk.), abstehende, ꝛ. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fasciculata Don, (= *Gnaphalium brevifolium* Lam. = *G. densum* Lam. = *G. fasciculatum* Thbg. = *G. muricatum*

β *fasciculatum* Berg.), büschelförmige, ꝛ. t. Cap d. g. H.

Metalsia

glomerata Don, (= *cephalotes* β Less. = *Endoleuca sphaerocephala* Cass. = *Gnaphalium capitatum* Thbg. = *G. densum* Lam.), knaulförmige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
muricata Don, (= *cymosa* Cass. = *fastigiata* RBr., Don, = *polyanthos* Don, = *Gnaphalium fastigiatum* Thbg. = *G. muricatum* L. = *G. polyanthos* Thbg. = *G. umbellatum* Schrk.).

Meteorina crassipes Cass., *gracilipes* Cass. (= *gracilis* Cass. = *lyrata* Less.), v. *Dimorphotheca hybrida et pluvialis*.

Methonica Herm., Prachtlilie, VI. 1., Liliaceae.

Doniana Kunth (= *Gloriosa Doniana* Schult. fil. = *G. nepalensis* Lindl. = *G. simplex* Don), Don's, 4. Zw. Sch. w. Nepal.

superba Lam. (= *Gloriosa superba* L.).

virescens Kunth, (= *Gloriosa virescens* Lindl. = *G. simplex* L. mant. = *G. coerulea* Mill.), grünliche, 4. Zw. Sch. w. Senegambien.

Metrosideros G., RBr., Eisenmafs.

apocynifolia Salisb., Apocynumblättriges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland (Port Jackson).

ciliata Sm. (= *Leptospermum ciliatum* Forst. = *Melaleuca ciliata* Forst. = *Stenospermum ciliatum* * p. 787), gewimpertes, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. t. k. Neucaledonien.

coriacea LaBill. (= *albida* Sieb.), lederartiges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland.

falcata Dehnh., sichelförmiges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland.

procera Salisb., hohes, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholl. (Port Jackson).

robusta Cunningh., riesiges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland.

tomentosa Rich., et ? Hort. angl., filziges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuzeland.

umbellata Cav. (= *Melaleuca umbellata* Räusch.), dolbiges, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuholland.

villosa Sm. (= *spectabilis* G. = *Leptospermum collinum* Forst. = *Melaleuca aestuosa* Forst. = *M. spectabilis* Räusch. = *M. villosa* L. fil.), zottiges, $\frac{1}{2}$. t. Tahiti, scheint noch nicht eingeführt.

Unbestimmtere, zum Theil wohl zu *Callistemon* gehörige: *aspera* Makoy, *buxifolia* Hort., *carinata* Hort., *connata* Dsf., *decurrens* H. angl., *gracilis* Salisb., Dryan., *longifolia* H. Anglor., *nana* Gmel. Hort. Carlsr., *pliniaefolia* Dsf., *scariosa* Wendl., Hornem, *trinervia* H. angl., *tubiflora* Hort. Breit.

capitata Sm., *corifolia* Vent. (= *abietina* Hffg.) etc., v. *Kunzea capitata* etc., p. 337, *calycina* Cav., *hypericifolia* Salisb., *hyssopifolia* Cav., *armillaris* G., *juniperoides* Rchb., *nodosa* Cav. (= *pungens* Rchb.), *quinquenervia* Cav., v. *Melaleuca thymifolia*, *hypericifolia*, *linearifolia*, *armillaris*, *juniperoides*, *nodosa*, *viridiflora*, p. 503 et 504 u. p. 393, II., *aromatica* Salisb., *coriacea* Salisb., non LaBill., *gummifera* G. (= *propinqua* Salisb., non Endl.), v. *Eucalyptus piperita*, *capitellata*, *resinifera*, *australis* RBr. (= *pallida* Bonpl.), *crassifolia* Dum. Cours. (= *glauca* Bonpl. = *speciosa* Sims), *hybrida* Otto, *lanceolata* Sm. (= *citrina* Curt. = *decora* Salisb. = *lophantha* Vent. = *semperflorens* Lodd.), *linearifolia* Sims, Lk. (= *rigidifolia* Hffg.), *linearis* Sm. (*calyculata* Sieb.), *marginata* Cav., *pinifolia* Wendl.,

Metrosideros

rigida Hort. (= *linearis* W. E. = *viminalis* Hort.),
rugulosa W. (= *aspera* Hffg. = *glandulosa* Dsf.
 = *macropunctata* Dum. Cours. = *rigida* Hort.
 = *scabra* Colla), *saligna* Sm., *viminalis* G., *viridiflora* Sm., H. Cels., v. *Callistemon pallidus*, speciosus, hybridus, lanceolatus et var., *linearifolius*, *linearis*, *marginatus*, *pinifolius*, *rigidus*, *rugulosus*, *salignus*, *viminalis*, *viridiflorus*, p. 148, et p. 107 u. 108, II., *flexuosa* W., v. *Billiotia flexuosa*, p. 69, II., *floribunda* Sm. (= *laurifolia* Dsf.), v. *Acmena floribunda*, p. 13, *cordifolia* P. (= *anomala* Vent. = *hirsuta* Andr. = *hispida* Sm.), *costata* G., P. (= *fulgens* G. = *splendens* G.), v. *Angophora cordifolia* et *lanceolata*, p. 869.

Metroxylon Rumphii Mart. (= *M. Sagus* Koen.), v. *Sagus Rumphii*, p. 710.

Metternichia Mikan, (Fürst v. Metternich, k. k. österreichischer Staatskanzler etc., großer Beförderer der Botanik u. Gartenkunst), XIV. II. (V. I.), Solanaceae. principis Mikan, fürstliche, f. w. Brasilien.

Meum T.

athamanticum Jacq. (= *anethifolium* G. M. S.).

Dalechampia Tenore, v. *Trinia vulgaris*, p. 822, *fatuum* P., v. *Carum verticillatum*, p. 168, *nudicaule* Mch., v. *Seseli montanum*, p. 749, *nutans* Mch., v. *Carum rigidum*, p. 122, II., *piperitum* R. et S., v. *Foeniculum piperitum*, p. 245, II., *pyrenaicum* Gay, v. *Endressia pyrenaica*, p. 222, II., *segetum* Gussone, v. *Ridolfia segetum*, *tenuifolium* Duby, v. *Wallrothia tenuifolia*.

Meyenia Schtdl., (Dr. u. Professor Meyen, früher in Bonn, dann in Berlin, Naturforscher u. Reisender †), V. Solanaceae-Cestrineae.

corymbosa Schtdl. (= *Habrothamnus corymbosus* Endl.), doldentraubige, f. t. Mexico.

cyanea * (= *Habrothamnus cyaneus* Lindl.), kornblumenblaue, f. t. Peru (Loxa).

fasciculata Schtdl. (= *Habrothamnus fasciculatus* Endl.), büschelförmige, f. t. Mexico.

purpurea * (= *Habrothamnus elegans* Scheidw. = *H. purpureus* Lindl.), purpurfarbige, f. t. Mexico.

tomentosa * (= *Habrothamnus tomentosus* Benth.), filzige, f. t. Mexico.

Meyenia Hawtayneana N. E., v. *Thunbergia Hawtayneana*, p. 808.

Meyna (= *Meynia* Schult.) *spinosa* Roxb., v. *Vanqueria spinosa*, p. 836.

Mezoneuron DC., *Mezoneuron*, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

enneaphyllum Wight, Arn. (= *Caesalpinia enneaphylla* Roxb.), neunblättriges, f. w. Ostindien.

Mibora Adans., Zwerggras, III. II., Gramineae.

verna Adans., P. B. (= *Agrostis minima* L. = *Chamugrostis minima* Borkh. = *Knappia agrostidea* Sm. = *K. verna* Trin. = *Poa minima* Wither. = *Sturmia minima* Hoppe), Frühlings-Z., ☉. f. Mittel- und Westeuropa.

Micambe Adans., *ornithopodioides* Medic., *violacea* Medic., v. *Cleome Dilleniana* et *violacea*, p. 204.

Michauxia L'Her., *laevigata* Vent. (= *decandra* Fisch. = *dodecandra* Steud.), p. 522.

Michelia L., *Michelie*.

Champaca L. (= *Rheedii* Wight, = *suaveolens* P.).
oblonga Wall., längliche, f. w. Ostindien.

Miconia R. et P., *Miconie*.

albicans Steud. (= *Chitonia albicans* Don, = *Diplochita albicans* * p. 877, = *Melastoma albicans* Sw.).

argentea DC. (= *Melastoma argentea* Sw.), silberfarbige, f. w. Westindien

argyrophylla DC. (= *stenostachya* DC. = *Melastoma argyrophylla* Mart. = *M. stenostachya* Mart.), silberblättrige, f. w. Brasilien.

fulva DC. (= *Melastoma chrysophylla* Rich. = *M. fulva* Rich.), rothgelbe, f. w. Cayenne.

pyramidalis DC. (= *Chitonia pyramidalis* G. Don, = *Diplochita pyramidalis* * p. 877, = *Melastoma* ? *Acinodendron* L. = *M. pyramidalis* Desr.).

staminea DC. (= *Melastoma glabrescens* Mart. = *M. laevigata* L. = *staminea* Desr.), laugfadige, f. w. Brasilien.

Micrantheum Spgl. (= *Micranthea* Dsf.), Asträutel, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

ericoides Dsf., heideähnliches, f. k. t. Neuholland.

Micranthus P., Eckl., Kleinschwertel, III. I., Irideae.

alopeuroideus P. (= *Gladiolus alopeuroides* L. = *G. ? micranthus* Schrk. = *G. plantagineus* P. = *Ixia plantaginea* Ait. = *I. triticea* Burm. = *Phalangium spicatum* Burm. = *Watsonia plantaginea* Ker, p. 856), fuchsschwanzähnlicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

spicatus * (= *Beilia spicata* Eckl. = *Gladiolus alopeuroides* P. = *G. fistulosus* Jacq. = *G. spicatus* L. = *G. tubulosus* Burm. = *Ixia alopeuroidea* L. fil. = *I. cepacea* Redout. = *I. fistulosa* Ait. = *I. spicata* W. = *teretifolia* Banks herb. = *Watsonia spicata* Ker, p. 856).

triticeus * (= *Beilia triticea* Eckl. = *Gladiolus triticeus* Thbg. = *Watsonia triticea* Spgl.), scheint nicht kultivirt zu werden.

Micranthus cochinchinensis Loud., p. 522, v. *Macranthus cochinchinensis* Nachlese.

Micranthus oppositifolius Wendl., v. *Phaylopsis parviflora*, p. 614.

Microcale pusilla * v. *Cicendia Candollei et pusilla*, p. 143, II.

Microcalia australis A. Rich., v. *Lagenophora Forsteri*, p. 443.

Microcarpaea cochlearifolia Sm., v. *Peplidium humifusum*, *M. montevidensis* Spgl., v. *Scoparia flava*.

Microchlaena Wight, Arn. (= *Microlaena* Wall.), *spectabilis* Wall., v. *Wallichia spectabilis*.

Microcodon A. DC., Kleinglöckchen, V. I., Campanulaceae.

Candolleum Buek, (= *glomeratum* DC. = *sparsiflorum* DC. = *Campanula hispida* Ecklon, = *C. Microcodon* Dietr. = *C. sparsiflora* Dietr. = *Wahlenbergia hispidula* Schrad.), Candolle's, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

- Microdon** Choisy, Kleinzahn, XIV. II., Globulariaceae-Selagineae.
 Linkii Walp. (= *Selago spicata* Lk., p. 740), Link's, f. k. Cap d. g. Hoffn.
 lucidum Choisy, (= *Selago lucida* Vent. = ? *rotundifolia* Thbg., L. fil.), glänzender, 4. f. k. Cap d. g. H.
 ovatum Choisy, (= *Dalea Lippiastrum* G. = *Lippia ovata* L. mant. = *Selago capitata* Berg. = *S. ovata* Thbg., p. 740).
- Microgenetes** A. DC., Kleinfädler, V. I., Asperifoliaeae-Hydrophyllaeae.
 Cuningii A. DC. (= *Euloca Cuningii* Benth.), Cuming's, \odot . f. Chili.
- Microglossa** DC., Kleinzüngel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 volubilis DC. (= *Conyza prolifera* Blume, = *C. volubilis* Wall.), windendes, f. Sch. w. Ostindien.
- Microlicia** DC., Kleinweidrich, VIII. I. (X. I.), Lythraeae-Melastomeae.
 cordata Cham. (= ? *variabilis* Mart. = *Rhexia cordata* Sgl. = *R. venusta* Mart. herb.), herzförmiger, f. w. Brasilien.
 variabilis Mart., veränderlicher, f. w. Brasilien.
 variolosa DC. (= β *Rhexia acicularis* Mart. = *R. baccharoides* Mart. = *R. enervia* Mart. = *R. euphobioides* Mart. = *R. exul* Mart. = *R. fasciculata* Mart. = *R. hirsuta* Mart. = *R. thymifolia* Mart. = *R. venusta* Mart.), blatteriger, f. w. Brasilien.
- Microlonchus** Cass. (Centaurea Sect. III., p. 179 et p. 131, II.), Kleinlanzler, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.
 albispinus Bunge, weifsdorniger, \odot . f. Ural.
 salmanticus DC. (= *Centaurea salmantica* L. = *C. tenella* et *tenuiflora* Hort.), b) foliatus.
Microlophus alatus Cass., v. *Centaurea alata*, p. 176.
- Micromeria** Benth. (Satureja Sect. II., p. 722). Kleinquendel (Piperelle), XIV. I., Labiatae.
 approximata Rehb. (= *Satureja approximata* Bivon. = *S. fasciculata* Rafin. = *Thymus fruticosus* Bertol.), genäherter, f. k. Südeuropa, Albanien.
 australis Benth. (= *Mentha australis* RBr.), neuholländischer, 4. k. Neuholland.
 barbata Fisch., Mey. et Lällem., bärtiger, 4. f. Neu-Californien.
 canescens Benth. (= *Satureja canescens* Guss.).
 densiflora Benth., dichtblumiger, f. k. Canarische Inseln.
 Douglasii Benth. (= *Thymus Chamissonis* Benth. = *Th. Douglasii* Benth.), Douglas's, 4. f. Nördl. Californ.
 filiformis Benth. (= *Cunila thymoides* Gouan, = *Piperella filiformis* Presl, = *Thymus filiformis* Ait.).
 graeca Benth. (= *Satureja graeca* L. = *S. micrantha* Hffg. et Lk. = *Thymus micranthus* Brotero, = *T. hirtus* Russ.), β) longiflora Guss. (= *Satureja consentina* Tenore), γ) densiflora Benth. (= *Satureja congesta* Hornem. Hort. Hafn. = *S. hirta* Host, = *S. tenuifolia* Tenore, = *Thymus virgatus* Tenore).
 inodora Benth. (= *Thymus inodorus* Dsf.), geruchloser, 4. f. k. Algier.
 Juliana Benth. (= *Satureja Juliana* L. = *Sabbatia*

Micromeria

- Juliana* Mch.) β) *hirsuta* Benth. (= *S. Juliana* var. *canescens* Guss. = *S. hirsuta* Presl).
- lanata* Benth. (= *Satureja lanata* Lk.), wolliger, \S . k. Canarische Inseln.
- marifolia* Benth. (= *Bystropogon marifolius* Juss. = *Calamintha cretica* Lam. = *C. fruticosa* P., Hort. = *C. marifolia* P., p. 144, = *Melissa cretica* Lam. = *M. fruticosa* L. = *M. marifolia* P. = *M. serpyllifolia* W. herb. = *Nepeta cretica* Dietr. = *N. parvifolia* Hortul. = *N. marifolia* Cav. = *N. serpyllifolia* MB. = *Thymus creticus* DC. = *Th. Barrelieri* Spgl. = *Th. marifolius* W. E.), Süd- u. Westeuropa, Taurien, Syrien.
- microphylla* Benth., α) *glabriuscula* Benth. (= *Satureja microphylla* α Guss. = *S. Teneriffae* Lk., Enum. = *Thymus Teneriffae* Hortul., non P.), β) *villosa* Benth. (= *Satureja microphylla* β . γ . δ . Gussone, = *S. filiformis* Dsf. = *Thymus microphyllus* d'Urv.).
- nervosa* Benth. (= *Satureja filiformis* Tenore, non Dsf. = *S. nervosa* Dsf. = *Thymus filiformis* Sieb., non Ait. = *Th. Mastichina* Sibth., Sm., non L.).
- obovata* Benth. (= *Satureja incana* Spgl. = *S. viminea* L. = *Mentha viminea* Patr. Brown, = *Xenopoma obovatum* W., Colla, p. 859, = *Zygis aromatica* Desv.), verkehrteiförmiger, \S . k. t. Jamaika.
- parviflora* Rehb. (= *Satureja inodora* Host, nec Salzm. = *S. parviflora* Visiani).
- Piperella* Benth. (= *Calamintha croatica* Host. = *Thymus croaticus* P. = *T. marginatus* Sm. = *T. Piperella* All.).
- Pulegium* Benth. (= *Calamintha origanifolia* Host, = ? *C. subnuda* Host, = *Melissa Pulegium* Roch. = *M. subnuda* W. K., p. 144, = *M. nova* Stev., Portenschl. = *Nepeta nova* MB. = *Thymus subnudus* Spgl.), Polei-W., 4. f. Banat, Fiume.
- spicigera* C. Koch, ährentragender, 4. \S . f. Asiat. Rußland (Radscha). Ob kultivirt?
- subcordata* Visiani, Benth. (= *Thymus subcordatus* Vis.).
- Teneriffae* Benth. (= *Thymus Teneriffae* Poir. = *T. terebinthinaceus* W., Enum.).
- tenuis* Benth. (= *Satureja tenuis* Lk.), dünner, \S . k. Canarische Inseln.
- varia* Benth. (= *Satureja thymoides* Lowe, = *S. varia* Benth. et Webb, = *Thymus ericaefolius* Roth, = *T. inodorus* Benth., non Dsf.).
M. montana Rehb., *pygmaea* Rehb., *spicata* Rehb., *variegata* Rehb., v. *Satureja montana* etc.
- Micropus** L., Falzblume (Kleinfüßler).
- erectus* L. (= *conyzaeus* Duboi), β) *multicaulis* Duboi, (= *Filago multicaulis* Lam.).
- minus* DC., kleinster, \odot . f. Mexico.
pygmaeus Dsf., v. *Evax pygmaea*.
- Microrhynchium** Less. (= *Microrhynchus* Less.), (Lactuca Sect. C. H. Schultz Bipont.), Kleinschnäbler, XIX. 1., Corymbiferae-Cichoriaceae.
- nudicaule* Less. (= *Chondrilla nudicaulis* L. = *Lactuca nudicaulis* Murr. = *Rhabdotheca sonchoides* Cass. = *Sonchus divaricatus* Delil., non Dsf.), nacktstenglicher, \S . 4. k. Arabien, Aegypten.

Microorhynchium

β) *dichotomum* Less. (= *Lomatolepis nudicaulis* Cass. = *Lactuca flava* Forsk? = *Scorzonera dichotoma* Vahl, = *Sonchus dichotomus* Savi, non MB.).

= *Microstachys Chamaelea* Juss., v. *Cnemidostachys Chamaelea*, p. 207.

Microsorium Lk., irregulare Lk., v. *Polypodium* Sect.**Microstylis** Nutt., Lindl., Kleingriffel.

histonantha Lk. et Kl., segelblumiger, 4. w. Caracas.
macrostachya Lindl. (= *Ophrys macrostachya* Llav.),
großsähriger, 4. w. Mexico.

monophyllos Lindl. (= *Epipactis monophyllos* Schmidt,
= *Malaxis monophyllos* Sw., p. 489 = *Ophrys monophyllos* L.).

Parthonis Kl. (= *Malaxis Parthoni* Morren), Parthon's,
4. w. ? Südamerika.

Microtrema opulentum Kl., v. *Erica opulenta*.

Microtis RBr., Kleinöhrchen, XX. I., Orchideae.

Banksii Hook. (= *porrifolia* Spgl.), Banks's, 4. w.
Neuzeeland.

porrifolia RBr. (= *Epipactis porrifolia* Sw. = *Ophrys unifolia* Forst. = *Serapias porrifolia* W.), Porree-
blätteriges, 4. w. Neuholland.

Microtropis Wall., non E. Mey., Kleinkiel, V. III., Aquifoliaceae (Illicineae).

discolor Wall. (= *Cassine discolor* Wall. = ? *Evonymus garcinifolius* Roxb.), verschiedenfarbiger, 5. w. Ostind.

Middendorfia Trautv. (A. v. Middendorf, Prof. an d. Universität zu Kiew, bereiste Sibirien), IV. I., Lythrarieae-Salicariae.

borysthenica Trautv. (= *Anmannia borysthenica* DC.,
p. 47 = *Peplis borysthenica* Bess.).

hamulosa Trautv. (= *Peplis australis* Gay, = *biflora*
Salzm.), hackige, ☉. f. Nordafrika.

Miegia P., *macrosperma* P. (= *gigantea* Nutt.), v.
Ludolfia macrosperma, p. 479.

Miersia Lindl. (Miers, ein Engländer bereiste Chili, auch in botanischer Hinsicht).

chilensis Lindl. (= *major* Kunth), p. 524.

Milium L., Milisgras.

confertum Guss., Link., gedrängtes, ☉. f. Sicilien.

effusum L., β) *confertum* Mill. (= *scabrum* Merlet, =
vernale van Hall., non MB.).

phleoides Sweet, lieschgrasähnliches, 4. w. Ostindien.

capillare Mch. etc., v. *Panicum capillare* etc., p.

583, *crus-galli* Mch. etc., v. *Oplismenus Crus-galli*,
p. 563, *gaditanum* Hort. (= *pauciflorum* Hort.),

v. *Piptatherum frutescens et multiflorum*, p. 629,

latifolium Cav., v. *Paspalum stoloniferum*, p. 588,

muticum Hort., v. *Gastridium muticum*, *punctatum*

L., v. *Helopus punctatus*, p. 294, II., *velutinum* DC.

(= *filiforme* Sessé), v. *Paspalum velutinum*.

Millefolium Adans., v. *Achillea*.

Millea s. *Milla uniflora* Graham, v. *Triteleja uni-*
flora.

Millieria L., Millerie.

glandulosa DC., drüsige, ☉. f. Mexico.

biflora L., v. *Elvira biflora*, p. 219, II.

- Millingtonia** L. fil., non Roxb. (T. Millington, Prof. zu Oxford), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.
- hortensis* L. fil. (= *Mallingtonia hortensis* W. = *Bignonia suberosa* Roxb., p. 122), Garten-M., f. Sch. w. Ostindien.
- Millingtonia pinnata* Roxb., *simplicifolia* Roxb., v. *Meliosma pinnata*, *simplicifolia* Nachlese.
- Miltonia** Lindl. (Milton, berühmter englischer Dichter), XX. 1., Orchideae.
- candida* Lindl., schneeweiße, 4. Kn. w. Brasilien.
- β) *flavescens* Lindl.
- Clowesiana* Lindl. (= *Odontoglossum Clowesii* Lindl.), Clowes's, 4. Kn. w. Brasilien.
- β) *grandiflora*.
- cuneata* Lindl., keilförmige, 4. Kn. w. ? Brasilien.
- flavescens* Lindl. (= *Cyrtochilum flavescens* Lindl.), gelbliche, 4. Kn. w. Mexico.
- odorata* Lindl. (= *epidendroides* Hort. belg.), wohlriechende, 4. Kn. w. Südamerika.
- Russeliana* Lindl. (= *Oncidium Russelianum* Lindl., p. 558, = ? *Cyrtochilum Russelianum* H. Angl., p. 184).
- spectabilis* Lindl. (= *Macrochilus Fryanus* Knowl. et Westc., p. 487), ansehnliche, 4. Kn. w. Brasilien.
- stellata* Lindl. (= *Cyrtochilum stellatum* Lindl., p. 184, II.).
- In den Pflanzenverzeichnissen der belgischen Gärten wird noch eine *M. Summidor* aufgeführt.
- Mimetes** Salisb., RBr., Mimenstrauch.
- myrtifolia* RBr. (= *Protea myrtifolia* Thbg.), myrtenblättriger, f. t. Cap d. g. Hoffn.
- spectabilis* R. et S. (= *Protea spectabilis* Lichtenst.), ansehnlicher, f. f. t. Südafrika.
- vaccinifolia* Sweet, (= *Diastella vaccinifolia* Knight).
- Mimosa** T., Sinnpflanze.
- acanthocarpa* Benth. (= *Acacia acanthocarpa* W., p. 1).
- asperata* L. (= *Bellatrix* Hffg. = *canescens* W. = *ciliata* W. = *hispida* W. = *pellita* W. = *polyacantha* W. = ? *procumbens* Schum. = *sicaria* Hffg. var.).
- calocephala* Mart., schönköpfige, f. w. Brasilien.
- Cascabellilo* Colla, DC., *Cascabellilo-S.*, f. w., Südamer.
- kermesina* Otto et Dietr. (= ? *coccinea minor* Hort.), kermesinfarbige, f. w. Brasilien.
- latispinosa* Lam. (= *Acacia latispinosa* Dsf.).
- lutea* Mill., gelbe, f. f. w. Südamerika.
- madagascariensis* Hort., madagascarische, f. w. Madagascar.
- marginata* Lindl., non Lam. (= *mexicana*, *prostrata* et *scandens* Hort.), Vaterland unbekannt, zu berichtigen p. 525.
- nepalensis* Hffg., nepalsche, f. w. Ostindien, Nepal.
- obtusifolia* W. (= *fervidu* Mart.)
- polyacantha* W. (= *Acacia Habbas* Lk. = *Mimosa Habbas* Delile), vielstachelige, f. w. Guinea, Abyssinien, Aegypten.
- rubicaulis* Lam. (= *octandra* Roxb. = *pennata* Russel, = *Rottleri* Speg. = *spinisiliqua* Klein).
- sensitiva* L., b) fl. albo.
- somnians* H. B. K. (= ? *Acacia somnians* Hort.), einschlafende, f. f. w. Neugranada.
- subtriceps* Brotero, fastdreiköpfige, f. w. ? Brasilien.

Mimosa

violacea Bonpl. mss., Tenore, violette, f. w. Bonaria.

In van Houtte's Établissement horticole werden noch aufgeführt: Huisaki, lucida sensibilis, purpurea sensibilis, tenella sensibilis.

abstergens Roxb. (= *concinna* W. = *Saponaria* Roxb. = *tamariscifolia* Russ.), *ferruginea* Rottl., *nilotica* L., *stipulata* Roxb., v. *Acacia concinna*, *ferruginea*, vera et *stipulata*, p. 2 etc., *aquatica* P. (= *lacustris* H. B. K. = *natans* Roxb.), *plena* L., *virgata* L. (= *angustisiliqua* Lam.), v. *Desmanthus natans*, *plenus*, *virgatus*, p. 257 et 196, II., *cyclocarpa* Jacq., *dulcis* Roxb., *fastuosa* Jacq., *ligustrina* Jacq., *purpurea* L. etc., v. *Inga cyclocarpa* etc., p. 316 et 317, II. et p. 416 et 417.

Hinsichtlich der übrigen s. *Acacia*, p. 1 u. s. w. und p. 2 u. s. w. II.

Mimulus L., Gaucklerblume.

alsinoides Dougl., mierenähnliche, ☉. f. Nordamerika, (Oregongebiet).

β) *minus* Benth.

brevipes Benth., kurzstielige, 4. k. f. b. Obercalifornien. *cardinalis* Dougl., β) *roseo-cardinalis* Hensl., Benth. (= *Maclowianus* Bot. mag.), (Hybride).

floribundus Dougl. (= *peduncularis* Dougl. = *Capraria pusilla* Torrey).

glabratus H. B. K. (= *andicola* H. B. K. = *Torenia obtusifolia* Sm.), glattliche, 4. k. Mexico, Chili.

gracilis RBr. (= *strictus* Benth.), schlanke, 4. k. t. Süd- u. Ostafrika, Ostindien, Neuholland.

Jamesii Torr. et Gr. (= *reniformis* Engelm.), James's, 4. f. Nordamerika (Missouriegebiet). (Ob kultiv.?)

β) *Fremontii* Benth. (= *alsinoides* Torr., non Dougl.).

javanicus Blume, javanische, ☉. w. m. Java.

Lewisii Pursh, (= *roseus* Dougl., Lindl.).

luteus L. (= *guttatus* DC. = *aureus* Nutt. = *punctatus* Rchb.), β) *rivularis* Nutt., Lodd. (= *lyratus* Benth.), γ) *variegatus* Lodd., b) *Wilsoni* D. Don, c) *Younganus* Lodd. var. δ) *punctatus* Miers.

microphyllus Benth., kleinblättrige, ☉. f. Nordamerika (Oregongebiet).

moschatus Dougl. in Lindl. bot. reg. Oregongebiet, p. 884.

nepalensis Benth. (= *assamicus* Griffith), nepalsche, ? 4. k. Nepal, Ostindien. (Ob kultivirt?)

parviflorus Lindl., β) *Bridgesii* Benth.

primuloides Benth., Schlüsselblumenähnliche, ? 4. k. f. Nordwestl. Amerika. (Ob kultivirt?)

propinquus Lindl., β) *glandulosus* Lehm. Nordamerika. *Scouleri* Hook., Scouler's, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

Hybriden: *atrosanguineus*, *Frazeri*, *maculatus*, *Parmen-tieri*, *purpureus*, *splendens*, *speciosissimus*, *striatus*, *Thompsoni superbus*, *Watsoni* etc.

aurantiacus Curt. (= *glutinosus* Wendl.), *puniceus* Steud., v. *Diplacus glutinosus*, *puniceus*, p. 205, II., *perfoliatus* Hook., non H. B. K., v. *Leucocarpus alatus*, p. 459.

Mimusops L., Spitzenblume.Bojeri DC. (= *Kauki* Boj.), Bojer's, f. Mauritius.*dissecta* RBr. (= *Achras dissecta* Forst.).*fruticosa* Boj., strauchige, f. w. Ostafrika, Mauritius.*Hookeri* A. DC. (= *dissecta* Hook. bot. mag. excl. syn.),
Hooker's, f. w. St. Vincent.*indica* A. DC. (= *dissecta* herb. Hamilt., non RBr. =*hexandra* H. Madr. Heyne, Wight, non Roxb. =*Kauki* Wall., non L.), indische, f. w. Ostindien.*obtusifolia* Lam. (= *Elengi* Boj. excl. Synon. = *Kauki*

Sieb., non L.), stumpfblättrige, f. w. Mauritius.

B. *Synarrhena* Fisch. et Mey.*floribunda* Mart. (= *Synarrhena floribunda* Fisch. et
Mey.), blüthenreiche, f. w. Brasilien.*subsericea* Mart. (= *S. subsericea* Fisch. et Mey.), sei-
tenhaarige, f. w. Brasilien (Rio de Janeiro).

Zweifelhafte Arten:

Balata G. (= *Achras Balata* Aubl.), Balata-S., f. w.
Guiana, Mauritius, Java (in Gärten).*cyanocarpa* Cunningh., p. 526.*Manilkara* G. Don (= *Metrosideros macassariensis* Rumpf.
= *Imbricaria malabarica* Poir.), Manilkara S. China,
Philippinen, auf Malabar kultivirt, (bei uns noch nicht
eingeführt). β ?) *cuspidata* A. DC. (= *hexandra* Wall.,
non Roxb.).*Elengi* Sieb., non L. (= *hexandra* Bout. et Boj.,
non Roxb. = *Imbricaria* Wall., non W.), v. *Imbri-
caria coriacea*, p. 315, II.**Mina** Lall. et Lex., Minawinde, V. I., Convolvulaceae.*lobata* Lall. et Lex. (= *Quamoclit Mina* G. Don), ge-
lappte, ☉. Sch. m. f. Mexico.*Minuartia tenuifolia* N. E., Mart., v. *Alsine mucro-
nata* L., p. 39.**Miquelia** Blume, (Dr. F. A. W. Miquel, Prof. d. Bo-
tanik in Rotterdam), XIV. II., Gesneriaceae - Cyrtan-
dreae.*coerulea* Blume, (= *Anomorhegmia Miquelii* Meisn.),
blane, ☉. w. Java.**Mirabilis** L. (= *Jalapa* Adans., Medic. = *Nyctago*
Roy., Juss.), Wunderblume.*ambigua* Trautv., zweifelhafte, 4. Kn. f. m. k. ?*cordata* Brouss. (= *hybrida* Lepell., non H. B. K.),
herzförmige, 4. Kn. f. m. k. Südamerika.*dichotoma* L. (= *odorata* L. = *parviflora* Targ. Tozz.
= *Jalapa officinarum* Martin, = *J. undulata* Mch.). β) major, γ) pallida.*divaricata* Lowe, (= *hybrida* Lepel. var. Lowe?), aus-
gesperrte, 4. Kn. f. m. k. Madeira.*hybrida* H. B. K., Bastard-W., 4. Kn. f. m. k. Neu-
granada.*Jalapa* L. (= *Jalapa congesta* Mch. = *Nyctago hor-
tensis* Curt. = *N. Jalapa* DC.).*planiflora* Trautv., flachblumige, 4. Kn. f. m. k. ?*tardiflora* Bernh., spätblumige, 4. Kn. f. m. k. Südamer.**Mirbelia** Sm., Mirbelie.*angustifolia* Grah., schmalblättrige, f. t. Neuholland.*floribunda* Benth., blüthenreiche, f. t. Neuholland.*ilicifolia* Hort. (= *undulata* Hort.), stechhülsenblättrige,
f. t. Neuholland.

Mirbelia

rubiaefolia G. Don, (= *Pultenaea rubiaefolia* Andr.),
rötheblättrige, ⚭. t. Neuholland.

tritermata H. Hügel. (= ? *trifoliata* Hort.).

Baxteri Bot. reg., v. *Podolobium scandens*, p. 639,
grandiflora Cunningh., v. *Chorisema platylobioides*
Nachlese.

Mirobalanus bellirica G., *Chebula* G., *citrina* G.,
fatraea Poir., v. *Terminalia Bellirica*, *Chebula*, *ci-*
trina et *madagascariensis*, p. 801.

Misandra juncea Dietr., v. *Buonapartea juncea*, p. 138.

Mistyllus Presl, *spumosus* Presl, *turgidus* Presl, v.
Trifolium spumosum et *turgidum*, p. 820.

Mitella L., Bischofskapsel.

caroliniana H. angl., carolinische, 4. f. Carolina.

Mitellopsis Meisn., Bischofsmützchen, V. (X.) II.,
Saxifrageae.

pentandra Meisn. (= *Drummondiana* Meisn. = *Drum-*
mondia mitelloides DC. prodr. = *Mitella pentandra*
Hook., p. 527), fünfmänniges, 4. f. Nordamerika
(Rocky mountains).

trifida Meisn. (= *Hookeri* Meisn. = *Mitella trifida*
Grah., p. 527, = *Lithofragma nudicaule* Nutt.).

Mitina Adans., *lanata* Cass., v. *Carlina lanata*,
p. 166.

Mitracarpum Zuccar., Mützenfrüchtchen, IV. I., Ru-
biaceae.

Fischeri Cham., Schltdl. (= *Spermacoce adscendens* Fisch.
= *S. Fischeri* Lk., p. 776).

hirtum DC. (= *Spermacoce hirta* Sw., p. 776).

Schizangium DC. (= *Schizangium durum* Bartl.), har-
tes, ⚭. k. t. Mexico.

senegalense DC. (= ? *scabrum* Zuccar. = *Oldenlandia*
verticillata Bacle), senegalsches, ☉. ⚭. w. Senegal.

stylosum Cham., Schltdl. (= *Spermacoce crassifolia* Hort.
= *S. stylosa* Lk.), langgriffeliges, ☉. w. m. Insel
Manilla.

Torresianum Cham., Schltdl., Torres's, ☉. w. m. f.
Marianen.

villosum Cham., Schltdl. (= *Spermacoce hirta* Jacq. et
?L. = *S. villosa* Sw., p. 776).

Mitraria Commersoniana Gmel., v. *Barringtonia spe-*
ciosa, p. 114.

Mitrospora polyphylla N. E., v. *Rhynchospora poly-*
phylla, p. 688.

Mitscherlichia spectabilis Kunth, v. *Neaea Mitscher-*
lichia.

Mnemion Spach, *calcaratum* Spach, *cornutum* Spach,
elegans Spach, v. *Viola calcarata*, *cornuta*, *grandi-*
flora, p. 849 et 850.

Mocinia mutisioides DC., v. *Stiftia chrysantha*.

Modecca Lam., Jacq., Modecca.

macrophylla Blume, grofsblättrige, ⚭. Sch. w. Java.

Modiola Mch., Kleinpappel, XVI. VIII., Malvaceae.

caroliniana G. Don, (= *multifida* Mch. = *Malva ca-*
roliniana L., p. 491).

decumbens G. Don, (= *Malva decumbens* W., Enum.
= *M. prostrata* Bertero), niederliegende, ♂. 4. k. t.
Südamerika.

prostrata G. Don, (= *Malva prostrata* Cav., p. 492).

Möhringia L., Fenzl, Möhringie.

diversifolia Dolliner, verschiedenblättrige, 4. f. Steyermark.

pendula Fenzl, (= *Arenaria pendula* W. K., p. 75).

pentandra Gay, fünfinnige, ☉. f. Pyrenäen.

polygonoides M. et K. (= *Arenaria polygonoides* Wulf.

= *Cerastium filifolium* Vest, = *Sabulina polygo-*

noides Rchb. = *Stellaria ciliata* Scopol.), knöterich-

ähnliche, 4. f. Oestreich, Schweizer Alpen, Sibirien.

β) *obtusa* (All.).

Ponae Fenzl, (= *Arenaria bavarica* L. = *A. Ponae*

Steud. = *Alsine bavarica* Crantz, = *Sabulina Po-*

nae Rchb.), Pona's, 4. f. Baier. Tyrol. Alpen.

sedifolia W. (= *muscoides sedoides* P.), mauerpfeffer-

blättrige, 4. f. Südl. Tyrol, ital. Alpen.

sphagnoides Rchb., sumpfsmoosähnliche, 4. f. Tyrol. Alpen.

trinervia Clairv. (= *Arenaria trinervia* L., p. 76).

umbrosa Fenzl, (= *Arenaria umbrosa* Bunge, Ledeb.),

schattenliebende, 4. f. Alt. Sibirien. (Ob kultiv.?)

villosa Fenzl, (= *Arenaria villosa* Wulf., non Ledeb.

= *A. Wulffeni* Steud.).

Mönchia Ehrh., Mönchie.

mantica Bartl. (= *Cerastium manticum* L. = *Mal-*

achium manticum Rchb., p. 883, = *Pentaple mantica*

Rchb. = *Stellaria mantica* DC. = *S. glauca* var.

tenuifolia Frivald).

octandra Rchb. (= *Malachium octandrum* Gren. =

Sagina octandra Salzm.), achtnännige, ☉. f. Süd-

frankreich, Nordafrika.

Mogiphanes Mart., v. Teleianthera Sect. III.

Mogorium acuminatum Lam., *hirsutum* Poir. (=

multiflorum Lam.), *myrtifolium* Lam., *Sambac* Lam.

etc., v. Jasminum trinerve, *hirsutum*, *undulatum*,

glaucum, *Sambac* etc., p. 429 et 329, II.

Mohria Sw., thurifraga Sw. (= *Adiantum Caffrorum*

L. suppl. = *Polypodium Caffrorum* L. mant.).

Moldavica Adans., *elata* Mch., v. *Nepeta macrantha*,

punctata Mch., v. *Dracocephalum Moldavica*.

Moldenhaueria floribunda Schrad., v. *Tachigalia*

floribunda.

Molina Cav., *racemosa* Cav., v. *Hiptage Madablota*,

p. 302, II.

Molinaea canescens Roxb., v. *Cupania canescens*.

Molinaea chilensis Berter., v. *Jubaea spectabilis*,

p. 330, II.

Molineria plicata Colla = *Curculigo sumatrana*.

Molinia Scribk., altissima Lk. (= *arundinacea* Schrk. =

sylvatica Lk. = *Enodium litorale* Rchb.).

Mollia W., *alsinefolia* Speg., Schult., *aristata* Ait.,

corymbosa W., *diffusa* W., *fragilis* Speg., *gnapha-*

lodes W., *latifolia* W., *minuartioides* Schult., *Pol-*

lycarpon Speg., *stellata* W., v. *Polycarpaea alsine-*

folia, *aristata*, *indica*, *Teneriffae*, *fragilis*, *gnapha-*

lodes, *latifolia*, *minuartioides*, *peplodes*, *stellata*,

p. 641.

Mollugo L., Weichling, (et *Pharnaceum*, p. 612).

bellidifolia Sering. (= *Pharnaceum sperguloides* Poir.

= *spathulatum* Sw.).

Cerviana Sering. (= *Pharnaceum Cerviana* L. = *P.*

glabrum L.).

cordifolia Sering. (= *Pharnaceum cordifolium* L.).

Mollugo

- dichotoma Sering. (= *Pharnaceum dichotomum* L.),
zweizinkiges, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
glomerata Sering. (= *Pharnaceum glomeratum* Thbg.,
L. fil.).
hirta Thbg. (= *Pharnaceum hirtum* Spgl.).
Hoffmannseggiana Sering. (= ? *diffussa* W. = *Pharna-*
ceum galioides W. = *P. Hoffmannseggianum* R. et S.).
linearis Sering. (= *Pharnaceum lineare* Thbg., L. fil.).
mucronata Sering. (= *Pharnaceum mucronatum* Thbg.),
stachelspitziger, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
oppositifolia L. (= *Pharnaceum oppositifolium* Spgl.).
Schrankii Sering. (= *Berteriana* DC. = *dichotoma*
Schrk. = *verticillata* L. β Spgl.), Schrank's, ☉. w.
Brasilien.
sperguloides Sering. (= *Pharnaceum sperguloides* Poir.).
umbellata Sering. (= *Pharnaceum umbellatum* Forsk.).
verticillata L. (= *Pharnaceum verticillatum* Spgl.).
Molpadia suaveolens Cass., v. *Bupthalmum* (Sect.
Telekia) *cordifolium*, p. 139.

Moltkia Lehm., Moltkie, V. 1., Asperifoliaceae.

- coerulea Lehm. (= *Onosma coerulea* W.), blaue, 4. \S .
f. b. k, Caucasus, Armenien, Syrien.

Molucella L., Trichterkelch.

- acutiloba Ledeb., C. A. Mey., spitzlappiger, ☉. f. Caucasus.
diacanthophylla Pall. (= ? *grandiflora* Stephan., W.),
v. *Lagochilus diacanthophyllus*, p. 340, *Marrubi-*
astrum Stephan., v. *Marrubium lanatum*, p. 387, II.,
frutescens L., v. *Beringeria frutescens*, p. 66, II.,
scariosa RBr., v. *Otostegia scariosa, tuberosa* Pall.,
v. *Eremostachys tuberosa*, p. 227, II.
Moluchia domingensis Medic. (= *fruticosa* Medic.)
et *frutescens* Medic., v. *Melochia pyramidata* et
tomentosa, p. 509.
Moly odorum et *speciosum* Mch., v. *Allium odorum*
et *magicum*, p. 31 et 30.
Momisia denticulata Dietr., Hort., v. *Mertensia den-*
ticulata, p. 400, II.

Momordica T., Balsamkürbis.

- aculeata Poir. (= *acutangula* Steud.), stacheliger, ☉.
Sch. w. m. ?
Charantia L., β) zeylanica.
dioica Roxb. (= *hispida* Dennst. foem. = *Missionis*
Wall. = *tuberosa* Dennst. mas.).
echinata W. (= *Sicyos lobata* Mchx.), igelstacheliger,
☉. Sch. f. Nordamerika.
umbellata Roxb. (= *Bryonia umbellata* Klein).
mixta Roxb., v. *Muricia cochinchinensis, monadel-*
pha Roxb. (= *Cowel* Dennst.), v. *Coccinia indica*,
p. 151, II., *pedata* L., v. *Anguria pedatisecta*,
p. 36, II.

Monanthus Lindl., Mönchs-(Kappen-)stendel.

- atratus Hook. (= *Catachaetum* s. *Catasetum atratum*,
p. 172).
Bushnani Hook., Bushnan's, 4. w. Südamerika.
longifolius Hook. (= *Catachaetum* s. *Catasetum longi-*
folium Hook.), langblättriger, 4. w. Guiana.
roseo-albus Hook., weißlich-rosaer, 4. w. Para.
Monanthes polyphylla Haw. (= *spathulata* Cree),
v. *Sempervivum monanthum* et *micranthes*, p. 741.

- Monadenia** Lindl., Monadenie, XX. 1., Orchideae.
 prasinata Lindl. (= *Disa prasinata* Ker), lauchgrüne,
 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffn.
 rufescens Lindl. (= *Disa rufescens* Thbg. = *Satyrium rufescens* Sw.), fuchsrothe, 4. Kn. w. Cap d. g. H.
- Monarda** L., Monarda.
 amplexicaulis Bisch. stengelumfassende, 4. f. Nordamer.
 aristata Nutt. (= *citriodora* Cervant).
 Beckii Eaton, Beck's, ♀. f. Nordamerika.
 Bradburiana Beck, (= *fistulosa* Hook. Bot. mag. non L.).
 fistulosa L. (= *affinis* Lk. = *allophylla* Mchx. = *altissima* W. = *barbata* Wender. = *coerulea* Hort. = *commutata* Wender. = *cristata* Hort. = *dubia* Hort. = *elongata* Lam. = *glabra* Lam. = *hybrida* Wender. = *involucrata* Wender. = *lilacina* Wender. = *longifolia* Lam. = *media* W. = *oblongata* Ait. = *purpurea* Pursh, = *undulata* Tausch, = *varians* Barton, *violacea* Dsf., gehören nach Bentham hierher, auch *rugosa* Ait.).
 Kalmiana Pursh (= *didyma* β *angustifolia* Torrey).
 mollis L. (= *fistulosa* β Benth. = *menthaefolia* Grah.).
 rugosa Ait. (= *alba* Hort.).
 Russeliana Nutt., Sims, b) fl. albo.
 Weniger gekannte und noch nicht eingeführte:
 oswegoensis Bart. (= *didyma* L. var. Benth.), pratensis Rafin., rigida Rafin., virgata Rafin.
ciliata L., *hirsuta* Pursh, v. *Blephilia ciliata* et *hirsuta*, p. 71, II.
- Monardella** Benth., Monardelle, XIV. 1., Labiatae.
 caroliniana Benth. (= *Pycnanthemum Monardella* Mchx., p. 668).
 montana Benth. (= *Pycnanthemum montanum* Mchx.), Berg-M., 4. f. Carolina.
 odoratissima Benth., wohlriechendste, 4. ♀. f. b. Nordwestl. Amerika.
Monella angustifolia Herb., *carnea* Herb., *glauca* Herb., *lutescens* Herb., *ochroleuca* Herb., *odora* Herb., *pallida* Herb., *spiralis* Herb., *striata* Herb., *ventricosa* Herb., *vittata* Herb., v. *Cyrtanthus angustifolius*, *carneus*, *collinus* etc.
- Moneses** Salisb., grandiflora Salisb., v. *Pyrola*, Sect. II., p. 671.
Monnieria Brownei P., *cuneifolia* Mchx., v. *Herpestes Monnieria* et *cuneifolia*.
- Monnina** R. et P., Monnina.
 obtusifolia H. B. K. (= *Hebeandra phillyraeoides* Bonpl.).
 pubescens H. B. K. (= *Hebeandra pubescens* Bonpl.), weichhaarige, ♀. t. w. Caracas.
- Monocaryum** RBr., Einnüfschen, VI. 1., Colchicaceae.
 fasciculare R. et S. (= *Colchicum fasciculare* RBr. = *Curculigo fascicularis* Spgl. = *Hypoxis fascicularis* W.), büschelförmiges, 4. Zw. k. Syrien.
- Monocera** Jack., non Ell., Einhorn, XI. 1., Tiliaceae-Elaeocarpeae.
 I. Ganitroceras Endl.
 reticulata Endl. (= *Elaeocarpus reticulatus* Sm. = *E. cyaneus* Sims), netzförmige, ♀. ♀. t. Neuholland.
 II. Diceras Endl.
 dentata Endl. (= *Dicera dentata* Forst. = *Elaeocarpus dentatus* Vahl), gezahnte, ♀. ♀. t. k. Neuzeeland.

- Monochilus** Fisch. et Mey., Stahlkraut (Einlippler), XIV. II., Verbenaceae.
gloxinifolius Fisch. et Mey., gloxinienblättriges, 4. w. Brasilien.
- Monochoria** Presl, Einhütler, VI. I., Commelynaceae-Pontederieae.
dilatata Kunth, (= *Pontederia dilatata* Buchanan, Ait. ed. 2., p. 647).
hastata Presl, (= *Pontederia hastata* L.), spontonblättriger, 4. Wa. w. Ostindien.
vaginalis Presl, (= *Pontederia vaginalis* Burm.), scheidiger, 4. Wa. w. Coromandel.
- Monocosmia** Fenzl, Einfranze, I. I., Portulacaceae.
corrigioloides Fenzl, (= *Calandrinia monandra* DC., p. 145, = *Corrigiola deltoidea* Poepp. = *Talinum monandrum* R. et P.), uferlingähnliche, ☉. f. Südamer.
- Monolepis** Schrad.¹⁾, Einschuppe, V. II., Aizoideae-Atripliceae (Chenopodeae).
trifida Schrad. (= *Chenopodium trifidum* Hort. Wratislaw.), dreitheilige, ☉. f. Nordamerika.
- Monolophus** Wall., Einbüschler, I. I., Scitamineae-Amomeae (Zingiberaceae).
elegans Wall. (= *Kämpferia elegans* Wall., p. 435).
secundus Wall. (= *Costus secundus* Spgl. = *Kämpferia secunda* Wall.), einseitiger, 4. w. Ostindien.
- Monolopia** DC., Monopie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
californica Fisch. et Mey. (= *Hologymne californica* Bartl. = *Lasthenia californica* Lindl. Bot. reg., non DC.), californische, ☉. f. Californien.
glabrata Fisch. (= *Hologymne glabrata* Bartl. = *Lasthenia glabrata* Lindl., DC., p. 447).
major DC. (= *Hologymne Douglasii* Hort. Petropol. = *Helenium Douglasii* Hort.), grofse, ☉. f. Californien.
minor DC., kleine, ☉. f. Californien.
- Monomeria** Lindl., Monomerie XX. I., Orchideae.
barbata Lindl., härtige, 4. w. Ostindien.
nitida ? Lindl., glänzende, 4. w. ? Ostindien.
- Monopsis** Salisb., Presl, DC., *debilis* Presl etc., v. Lobelia, Sect. VII., p. 473 et p. 367, II.
- Monotoca** RBr., Monotoca.
ledifolia Cunn., porstblättrige, †. t. Neucambrien.
patens Cunn., abstehende, †. t. Neuholland.
Monotropa Hypopitys L., *Hypophegea* Wallr., v. *Hypopitys multiflora* et *glabra*, p. 312.
- Monsonia** L. fil., Monsonie.
emarginata L'Her. (= *Geranium emarginatum* Thbg., L. fil.), ausgerandete, 4. †. t. Cap d. g. Hoffn.
pilosa W. (= *filia* H. Par. = *speciosa* Swt. = *tenuifolia* Hort. = *Geranium Monsonia* Thbg.).
speciosa L. (= *grandiflora* Burm. = *Geranium speciosum* Thbg.).
tenuifolia W. (= *Geranium grandiflorum* Cav., non Burm.), feinblättrige, 4. †. t. Cap d. g. Hoffn.
Burmanni DC. (= *Geranium speciosum* L., Burm.),
L'Heritierii DC. (= *spinosa* L'Her.) et *Patersonii* DC., v. *Sarcocaulon Burmanni* etc. p. 721.

1) „Genus dubium“ Endl.

- Monstera** Adans., Schott, *Monstera*, XXI, VI., Aroideae.
Adansonii Schott, (= *Calla Dracontium* Mey. = *C. pertusa* Kunth, p. 147, = *Dracontium pertusum* L.), Adanson's, 4. w. Westindien, Südamerika.
cannaefolia Schott, (= *Arum cannaefolium* L. fil. = *Pothos cannaefolia* Sims, p. 653, = *P. cannaeformis* H. B. K. = *P. odorata* Andr.).
lingulata Schott, (= *Arum lingulatum* L., p. 85).
M. caudata Schott, *decursiva* Schott, *gigantea* Schott, *officinalis* Schott, *Peepla* Schott, *pertusa* Schott, *pinnata* Schott, *pinnatifida* Schott, v. *Scindapsus caudatus* etc.
- Montagnea** DC. (= *Eriocarpa* Cass. = *Eriocoma* H. B. K. = *Montanoa* Llav. et Lexarg. = *Priestleya* Moç., Sess.), (Camille Montagne, M. Dr. zu Paris, ehem. Chirurgen-Major), XIX, IV., Compositae-Corymbiferae (Heliantheae).
floribunda DC. (= *Eriocoma floribunda* H. B. K.), blüthenreiche, 4. §. k. t. Mexico.
grandiflora DC. (= *Eriocoma grandiflora* Alam. = *Montanoa grandiflora* Llav. et Lex., p. 530, = *Priestleya longifolia* Moç., Sess.).
tomentosa DC. (= *heterophylla* Schrad. = *Eriocoma fragrans* Sweet, = *E. heterophylla* Schrad. = *Montanoa tomentosa* Llav. et Lex., p. 530).
- Montbretia** DC. (= *Bellendenia* Rafin. = *Tritonia* Ker, = *Waitzia* Rchb., non Wendl., p. 854 et 855), Montbretie.
aequimaculata * (= *Waitzia aequimaculata* Rchb.).
anigozanthaeiflora * (= *Tritonia anigozanthaeiflora* Swt. = *Waitzia anigoz.* Rchb.).
concolor * (= *Tritonia concolor* Swt. = *Waitzia concolor* Rchb.).
crispa * (= *Freesea crispa* Eckl. = *Gladiolus crispus* L. = *Tritonia crispa* Ker, = *W. crispa* Rchb.).
crocata Endl. (= *Gladiolus crocatus* P. = *Ixia crocata* L. = *I. hyalina* W. E. = *I. iridifolia* Delarb. = *I. Milleri* Berg. = *I. planifolia* Mill. = *T. crocata* Ker, = *W. crocata* Rchb.).
 α) *alba* Endl., β) *maculata* Endl., γ) *pallida* Endl., δ) *rosea* Endl.
deusta Endl. (= *Ixia crocata* var. *nigro maculata* Andr. = *I. deusta* Ait. = *I. gibba* Salisb. = *I. miniata* Red. = *T. deusta* Ker, = *W. deusta* Rchb.).
fenestrata Endl. (= *Ixia crocata* β Ait. = *I. fenestrata* Jacq. = *I. hyalina* L. fil., (L. suppl.) = *T. fenestrata* Ker, = *W. fenestrata* Rchb.).
flava * (= *Freesea flava* Eckl. = *Gladiolus flavus* Ait. = *G. securiger* β P. = *T. flava* Ker, = *W. flava* Rchb.).
fucata * (= *Tritonia fucata* Lindl. = *Waitzia fucata* Rchb.),
lancea Endl. (= *Ixia fenestrata* var. Jacq. = *I. hyalina* Red. = *I. lancea* Thbg. = *I. similis* Salisb. = *I. squalida* var. α Ait. = *Tritonia squalida* Ker, = *Waitzia squalida* Rchb.), lanzettliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
lineata * (= *Gladiolus lineatus* Salisb., Red. = *Ixia squalida* β Ait. = *T. lineata* Ker, = *T. crocata* Ker var. Herbert, = *W. lineata* Rchb.).

Montbretia

longiflora * (= *Freesea longiflora* Eckl. = *Gladiolus longiflorus* L. fil. = *Hexaglottis* Vent. = *Hyulis longiflora* Salisb. = *Tritonia longiflora* Ker, = *T. pallida* Ker, = *Waitzia longiflora et pallida* Rchb.).

β) *tenuiflora* * (= *Ixia longiflora* β W. = *I. tenuiflora* Vahl, = *T. tenuifl.* Ker, = *W. tenuifl.* *).

miniata * (= *Freesea miniato-lateritia* Eckl. = *Ixia deusta* β. γ. δ. ε. Vahl, = *I. miniata* Jacq. = *T. crocata* Ker var. Herb. = *T. miniata* Ker, = *W. miniata* Rchb.).

odorata * (= *Tritonia odorata* Lindl. = *W. odorata* *).

pectinata * (= *Ixia pectinata* Vahl, = *T. pectinata* Ker, = *W. pectinata* Rchb.).

purpurea * (= *Ixia crocata* var. c Thbg. = *I. purpurea* Lam. = *T. purpurea* Ker, = *W. fenestrata* b. *purpurea* *), purpurfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

refracta Endl. (= *Gladiolus refractus* Jacq. = *G. resupinatus* P. = *T. refracta* Ker, = *W. refr.* Rchb.).

Rocheana * (= *Gladiolus longiflorus* Thbg. = *G. rochensis* Schult. = *Ixia longiflora* Berg. = *I. paniculata* de la Roche, = *T. rochensis* Ker, = *T. Rocheana* Swt. = *W. rochensis* Rchb.).

rosea * (= *Gladiolus amoenus* Ehrh. = *G. roseus* Jacq. = *G. striatus* Banks, = *Houttynia capensis* Houtt. = *T. rosea* RBr. = *T. capensis* Ker, = *W. rosea* Rchb. = *Watsonia amoena* P.).

sanguinea * (= *Tritonia sanguinea* Eckl.), blutfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

securigera DC. in Red., p. 530, (= *Gladiolus securiger* Soland. in Ait. = *Ixia gladiolaris* Lam. = *T. securigera* Ker).

striata * (= *Gladiolus formosus* P. = *G. striatus* Jacq. = *Hebea formosa* P., Eckl. = *T. striata* Ker, = *W. striata* Rchb.).

viridis * (= *Gladiolus viridis* Ait. = *T. viridis* Ker, = *W. viridis* Rchb.).

xanthospila * (= *Anomatheca xanthospila* Ker, = *Gladiolus xanthospilus* DC. = *T. xanthospila* Spgl. = *W. xanthospila* Rchb.).

Moraea Mill., L., Moraea.

aurantiaca A. Dietr. (= *Bobartia aurantiaca* Swt., p. 126, = *Sisyrinchium aurantiacum* Zuccagni), orangefarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

ciliata Ker, (= *barbigera* Salisb. = *Iris ciliata* Thbg. = *Vieusseuxia ciliata* Eckl.).

crispa Thbg., non Ker, krause, 4. Zw. k. Cap d. g. H. *edulis* Ker, (= *vegeta* Jacq. = *Iris capensis* Burm. = *I. edulis* Thbg. = *I. longifolia* Schneev. = *Vieusseuxia edulis* Lk. = *V. fugax* a R. et S.).

β) *odora* Salisb.

fugax Jacq. (= *edulis* γ Bot. mag. = *Vieusseuxia fugax* de la Roche, p. 848, = *Iris imberbis* Hazen, = *I. longifolia* Andr.).

Gawleri Spgl. (= *crispa* Ker, non Thbg. = *Iris crispa* Thbg. = *Vieusseuxia crispa* Eckl.), Gawler's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

gracilis A. Dietr. (= *spathacea* Ker var. Spgl. = *Iris gracilis* Lichtenst. in R. et S. = *Vieusseuxia gracilis* Eckl.), schlanke, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Moraea

pilosa Wendl., haarige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

plumaria Ker, (= *iriopetala* W., Vahl, = *Iris plumaria* Thbg. = *Vieusseuxia plumaria* Eckl.).

Sisyrinchium Ker, (= *Diaphane edulis* Salisb. = *Iris Sisyrinchium* L.).

β) *Tenoreana* Swt. (= *Iris fugax* Tenore).

spathacea Ker, (= *Bobartia indica* L. = *B. spathacea* Sweet, p. 126, = *Sisyrinchium spathaceum* P. = *Iris spathacea* Thbg.).

tristis Ker, (= *iriopetala* β W. = *sordescens* Jacq. = *tricolor* Andr. = *vegeta* L. = *Iris tristis* Thbg., L. fil. = *Vieusseuxia tristis* Eckl.).

virgata Jacq. (= *Hexaglottis virgata* Swt. = *Ixia virgata* W.), ruthenförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Zeyheri Lehm., Zeyher's, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Candolleana Spgl. etc., v. *Vieusseuxia iridioides*, p. 848, *chinensis* Thbg., v. *Pardanthus chinensis*, p. 586, *Ferrariola* Jacq., v. *Ferraria Ferrariola*, *fimbriata* Hort., v. *Iris chinensis*, p. 422, *gladiata* Thbg., *aphylla* Thbg., *bermudiana* Thbg., *flexuosa* L. (= *longifolia* P.) etc., v. *Sisyrinchium gladiatum*, *aphyllum*, *bermudianum*, *flexuosum* etc., p. 762 et 763, *Melaleuca* Thbg., *Aristea* Lam., *spathacea* Thbg., *spiralis* Thbg., *umbellata* Thbg. etc., v. *Aristea Melaleuca*, *cyanea* etc., p. 77 et 45, II., *palmifolia* Thbg., non Jacq. (= *Pavonia* Thbg., non Ait., Ker), v. *Tigridia Pavonia*, p. 810, *vaginata* DC. (= *Northiana* Schneev.), v. *Cipura Northiana*, p. 197.

Moricandia DC., Moricandie.

sonchifolia Bunge, gänsedistelblättrige, ♂. f. Nordchina.

teretifolia DC. (= *Brassica teretifolia* Dsf.), stielrundblättrige, ♂. f. Nordafrika.

Morina T. (Dr. Morin, franz. Arzt und Botaniker), II. 1., Dipsaceae.

elegans Fisch. et Lallem. (= *longifolia* DC., non Wall.), zierliche, 4. f. b. k. Himalaya.

longifolia Wall. (= *Wallichiana* Royle), langblättrige, 4. f. b. k. Nepal, Cashmire.

persica L. (= *orientalis carlinaefolia* T. = *orientalis* Mill. = *verticillata* Mch.).

nana Wall. (= *nepalensis* Don), parviflora Karel. et Kiril., *polyphylla* Wall., scheinen bis jetzt noch nicht eingeführt zu sein.

Morinda L., Morindastrauch.

macrophylla Dsf., großblättriger, ♀. w. ?

umbellata L. (= *Padavara* Juss. = *scandens* Roxb.), ♀. Sch. Zeylon.

Moringa Burm., Juss. (malabarischer Name), X. 1., Leguminosae-Cassieae-Moringeae.

aptera G. (= *Hyperanthera aptera* Steud.), flügellose, ♀. w. Ostindien.

pterygosperma G. (= *M. Nux eben* Dsf. = *oleifera* Lam. = *zeylanica* Lam., P. = *Hyperanthera Moringa* Vahl, = *Anoma Moringa* Lour. = *Guilandina Moringa* L.).

- Morisia** Gay, non N. E. (J. H. Moris, Prof. der Botanik und Director des botanisch. Gartens zu Turin), XV. 1. (III.), Cruciferae¹⁾.
hypogaea Gay, (= *Rapistrum hypogaeum* Duby, = *Sisymbrium monanthum* Vivian. = *Erucaria hypogaea* Vivian.), unterirdische, ☉. f. Südcorsica.
- Moritzia** DC. (Alex. Moritzi, Prof. in Chur, Verfasser einer Flora d. Schweiz), V. 1., Asperifoliaceae.
ciliata DC. (= *Anchusa ciliata* Chamiss.), gewimperte, 4. w. Brasilien. (Ob kultivirt?)
- Mormodes** Lindl., Larvenstendel.
aromaticum Lindl., gewürzhafter, 4. w. Mexico.
atropurpureum Lindl.
Buccinator Lindl., trompetenförmiger, 4. w. Südamerika.
Cartoni Hook., Carton's, 4. w. Santha Martha.
lineatum Batem., linirter, 4. w. Mexico.
luxatum Lindl., ausgerenkter, 4. w. Mexico.
pardinum Batem. (= *Cyclosia maculata* Kl.), β) unicolor v. Houtte, (= *citrinum* H. belg.).
 In van Houtte Établissement horticole werden noch aufgeführt: *fulvum*, *ochraceum*, *olivaceum*, wahrscheinlich in Mexico heimisch.
Morna nitida Lindl., *nivea* Lindl., v. *Waitzia aurea* et *corymbosa*.
Morocarpus Adans., Scop., *capitatus* Scop., *foliosus* Mch., v. *Blitum capitatum* et *virgatum*, p. 125 et 126.
Morphixia Ker, *aulica* Ker, *capillaris* Ker, *incarnata* Ker, *linearis* Ker, v. *Ixia aulica* etc., p. 425 et 427.
Morrenia odorata Hort., non Lindl., v. *Roulinia versicolor*.
- Morus** T., Maulbeerbaum.
alba L., a) *macrophylla* Morett. (= *Morettiana* Jacq. fil. = *chinensis* Bertol., Lodd., Loud. = *Morone indiana* Ital. = *Murier Dandolo*), b) *latifolia* Poir. (= *multicaulis* Perrot. = *tatarica* Dsf., non L. = *cucullata* Bonaf., non Moretti, = *indica* H. Patav. = *bullata* Balb. = *Murier Perrotetti* = *Murier de Philippines*), c) *italica* Poir., d) *japonica* Nois. (= *cucullata* Moretti, non Bonaf.), e) *constantinopolitana* Poir. (= *byzantina* Sieber), f) *nervosa* Delile, g) *pumila* Nois. (= *nana* Hort.), h) *heterophylla* Moretti, i) *flexuosa* Moretti, (= *tortuosa* Audib.), k) *intermedia* Perrotet, (= *alba sinensis* Bosc, = *Murier de la Chine*), l) *venosa* Delile, m) *hispanica* Hort., n) *flava* Hort., o) *gentilis* Hort., p) *membranacea* Hort., q) *nigra* Hort., r) *rosea* Hort., s) *Columbassa* Lodd., t) *dura* Hort., u) *furcata* Hort., v) *Guzziola* Hort., w) *lucida* Hort., x) *italica rubra* Lodd., y) *romana* Lodd. (= *ovalifolia* Hort.), z) *subalba* Hort., aa) *Venaissaini* Hort.
rubra L., a) *canadensis* Poir., b) *scabra* W., c) *pennsylvanica* Nois., Lodd., d) *missouriensis* Audib.
Morysia Cass., *dentata* DC. (= *diversifolia* Cass.) etc., v. *Saintmorysia dentata* etc.
Moschifera pinnatifida Molin., v. *Moscharia pinnatifida*, p. 532.

1) Nicht mit *Morysia* Cass. p. 532 zu verwechseln.

Moschosma Rchb., *Moschusbasilicum*.

australe Benth. (= *Brownii* * = *Lumnitzera moschata* Sogl. = *Plectranthus moschatus* RBr.), neuholländischer, ☉. m. f. Neuholland.

ocimoides Benth. (= *polycladon* Rchb. = *Lehmannia ocimoides* Jacq. = *Lumnitzera ocimoides* Jacq. = *Ocimum congestum* Sogl. = *O. polycladon* Lk.), vielästiger, ☉. m. w. Ostindien.

polystachyum Benth. (= *tenuiflorum* * = *Lumnitzera polystachya* Jacq. = *Ocimum polystachyum* L. = *O. tenuiflorum* Burm.).

Moschoxylon Juss., Moschusholz, X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

elegans Juss. (= *Trichilia elegans* Juss.), zierliche, h. w. Brasilien.

odoratum Juss. (= *Trichilia moschata* β DC. = *T. odorata* Andr., p. 816).

Mougeotia H. B. K., *caracasana* H. B. K., *corchorifolia* H. B. K., *nodiflora* H. B. K., v. Riedlea caracasana, corchorifolia et nodiflora.

Moulinsia cupanioides Cambess. (= *rubiginosa* Don), v. *Sapindus rubiginosus*, p. 721.

Moutouchia Benth. (= *Moutouchi* Aubl.), (guianischer Name), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Draco Benth. (= *Pterocarpus Draco* L., p. 664, = *P. officinalis* Jacq. = *P. hemipterus* G.).

suberosa Aubl. (= *Griselinia* Scopol. Neck. = *Pterocarpus Moutouchi* Lam. = *P. suberosus* P.), korkige, h. w. Guiana.

Mucuna Marcgr., Adans., p. 532.

bracteata DC. (= *Carpopogon bracteatum* Roxb.).

monosperma DC. (= *Carpopogon monospermum* Roxb. = *Dolichos urens* Roxb.).

nivea DC. (= *Carpopogon niveum* Roxb.).

velutina Hassk., sanmethaarige, ☉. Sch. w. Java.

Mühlenbergia Schreb., Mühlenbergie.

aristata P. (= *Brachyelytrum* Trin. = *erecta* Schreb.).

ciliata Trin. (= *Agrostis ciliata* W. = *Podosaemum ciliatum* H. B. K. = *Polypogon ciliatus* Sogl. = *Trichochloa ciliata* R. et S.), gewimperte, ☉. f. Mexico.

diffusa W. (= *multiflora* P. B. = *Schreberi* Gmel. system. = *Dilepyrum diffusum* P. B. = *D. minutiflorum* Mchx. = *D. multiflorum* P. B.).

glomerata Trin. (= *calycina* Trin. = *Cinna glomerata* Lk. = *Dactylogramma cinnoides* Lk. = *Podosaemum glomeratum* Lk.).

setosa Trin. (= *Agrostis setosa* Sogl. = *Podosaemum setosum* H. B. K. = *Trichochloa setosa* R. et S.), borstige, ☉. f. Mexico.

stipoides Trin. (= *Agrostis aspera* W. herb. = *A. stipoides* Sogl. = *Podosaemum stipoides* H. B. K. = *Stipa patens* W. herb. = *S. rostrata* W. herb. = *Trichochloa stipoides* R. et S.), pfriemengras-ähnliche, ☉. f. Quito, Mexico.

Willdenowii Trin. (= *Achnatherum tenuifolium* P. B. = *Agrostis diffusa* Mühlbg. = *A. sylvatica* Torr. = *A. tenuiflora* W. = *Apera tenuifl.* P. B. = *Cinna tenuiflora* Lk. Enum. = *Podosaemum tenuiflorum* Lk. Hort. = *Trichochloa longiseta* Trin.).

Mulgedium Cass., Alpenlattich.

cyaneum DC. (= *Agathyrsus cyaneus* D. Don).

hirtum Schultz Bipont., kurzhaariger, 4. f. Nordamer.

hispidum DC., steifhaariger, 4. f. Sibirien.

macrorrhizum Royle, großwurzeliger, 4. k. f. b. Cash-
mire, Thibet.

tataricum DC. (= *runcinatum* Cass.).

Mundia Kunth, Mundie.

albiflora Eckl., Zeyh., weisblumige, 5. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

Munychia Cass., Cymbalariae N. E. (= *brachyglossa*
Cass.) et *hirsuta* DC., v. Aster, Sect. XII., p. 99.**Muraltia** Neck, Muraltie.

aspera Lehm., rauhe, 5. t. k. Cap d. g. Hoffn.

DeCandollei Eckl., Zeyh. (= *squarrosa* DC.), DeCan-
dolles, 5. t. k. Cap d. g. H.

macrocarpa Lehm., großfrüchtige, 5. t. k. Cap d. g. H.

squarrosa Eckl., Zeyh., non DC. (= ? *pilosa* DC. =
Polygala squarrosa Thbg., L. fil.).

thymifolia DC. (= *Polygala thymifolia* Thbg.), thymian-
blättrige, 5. 5. k. Cap d. g. Hoffn.

Murraya König, Murraya.

brasiliensis Brotero, brasilianische, 5. w. Brasilien (Mi-
nas Geras).

Murucuja T., Murucuja.

orbiculata P. (= *Passiflora orbiculata* Cav.), kreisfö-
rige, 5. Sch. w. Domingo.

aurantiaca Forst., *Baueri* Lindl., v. *Disemma au-*
rantiaca, *Baueriana*, p. 208, II., *speciosa* Speg., v.
Tacsonia speciosa.

Musa T., Pisang.

acuminata Colla, zugespitzter, 4. w. Amboina.

Balbisiana Colla, (= *seminifera* var. Lour. = *M. Trog-*
lodytarum β L.), Balbis's, 4. 5. w. Amboina.

Berteroniaua Colla, (= *Berterii* Speg.), Bertero's, 4. w.
Molucken.

Cavendishii Hook., Paxt. (= *chinensis* Sweet), Caven-
dish's, 4. 5. w. China.

coccinea Andr. (= *Uranoscopus* Lour.).

Dacca Mak., Dacca-P., 4. 5. w. ? Ostindien.

discolor Hort. Lovan., verschiedenfarbiger, 4. 5. w. ?
paradisica L. (= *Cliffortiana* L. = *mensaria* Mch. =
sapientum Roxb., non L.).

rosacea Jacq. (= *Carolinae* Sterl. = ? *ornata* Roxb.
= *rubra* Hort.).

speciosa Tenore, prächtiger, 4. 5. w. ? Ostindien.

Steelii H. angl., Steel's, 4. 5. w. ?

textilis N. E. (= *seminifera* Lour. var. = *sylvestris*
Colla), webiger, 4. 5. w. Amboina, Molucken, Phi-
lippinen.

Troglodytarum L. (= *Uranoscopus* Colla), Troglody-
ten-P., 4. w. Molucken.

zebrina Hort. belg. (= ? *rosacea* Jacq. var.), scheckiger,
4. w. ? Mascarenas.

Muscari T., moschatum W. (= *ambrosiacum* Mch. =
Muscarimi Medic.).

M. autumnale Guss., *botryoides* L. etc., v. *Botry-*
anthus autumnalis, *vulgaris* etc., p. 75, II., *cilia-*
tum Ker, *comosum* Mill. etc., v. *Bellevalia ciliata*,
comosa etc., p. 64, II.

Muscaria acaulis Haw. (= *caespitosa* Haw. = *muscoides* Haw.), *atropurpurea* Haw., v. *Saxifraga atropurpurea*, *muscoides*, p. 725 et 726.

Mussaenda Herm., L., *Mussaenda*.

Afzelii ? Schum., v. Houtte, Afzelius's, f. w. Guinea.

arcuata Lam. (= *Landia* Bory, = *Landia astrogapha* Commers. = *L. stelligera* Commers.).

elegans Schum. (= *discolor* Thonn.), zierliche, f. w. Guinea.

frondosa L. (= *Belilla* Hamilt. = *Dovinia* Hamilt. = *flavescens* Hamilt. = *formosa* L. mant. = *zeylanica* Burm.).

Isertiana DC. (= *macrophylla* Schum.), Isert's, f. w. Guinea.

Landia Lam. (= *holosericea* Sm. = *latifolia* Poir. = *Landia lappacea* Domb., Vitum. = *Rondeletia Landia* Sogl.).

macrophylla Wall., großblättrige, f. t. Nepal.

cuneifolia Don, *Luculia* Hamilt., v. *Luculia cuneifolia*, p. 373, II. et *gratissima*, p. 479, *spinosa* Jacq. et *tetracantha* Cav., v. *Randia armata* et *tetracantha*.

Mussinia incisa W. (= *pinnata* W., *speciosa* W., *uniflora* W., v. *Gazania pinnata*, *speciosa*, *uniflora*).

Mustelia arundinacea Cav., v. *Chusquea scandens*, p. 143, II., *M. Eupatoria* Sogl., v. *Stevia Eupatoria*, p. 788.

Mutisia L. fil., *Mutisie*.

Berberiana Endl. (= *Berberii* DC.), Bertero's, f. Sch. k. t. f. b. Chili.

Bridgesii Endl., Bridges's, f. Sch. t. k. f. b. Chili.

grandiflora H. B. K., großblumige, f. Sch. t. Neugranada.

Hookeri Meyen, (= *linearifolia* Hook., non Cav.), Hooker's, f. Sch. t. k. f. b. Chili.

ilicifolia Cav. (= *spinosa* Hook., Arn. = *truncata* Don).

linifolia Hook., gleichbreitblättrige, f. Sch. t. k. f. b. Chili.

peduncularis Cavan., stielblumige, f. Sch. t. k. Peru.

speciosa Hook. (= *arachnoidea* D. Don).

spinosa R. et P. (= *auriculata* Poepp. = *hastata* Bert.), dornige, f. Sch. t. k. f. b. Chili.

Myagrimum T., L., *perfoliatum* L. (= *amplexicaule* Mch. = *litorale* Scopol.).

M. alpinum Lapeyr. (= *auriculatum* DC. = *montanum* Berger, = *saxatile* β W.), v. *Kerneria saxatilis* β , p. 437, *arborescens* Jacq., v. *Crambe strigosa*, *austriacum* Jacq., *aquaticum* Lam., *palustre* Lam., *pyrenaicum* Lam. etc., v. *Nasturtium austriacum*, *amphibium*, *palustre*, *pyrenaicum*, p. 543,

Bauhini Gmel. (= *pinnatifidum* Ehrh.) etc., v. *Camelina dentata* etc., p. 151, *biarticulatum* Crantz,

(= *perenne* L.), *orientale* L., *rugosum* L., (= *stolosum* Gochn.), v. *Rapistrum perenne* etc., p. 679,

bursaefolium Thuill. (= *crucifolium* Vill. = *irregulare* Asso, = *iberioides* Brotero), v. *Calepinia*

Corvini, p. 147, *cornutum* Lam., v. *Pugionium cornutum*, *Erucago* Lam. (= *clavatum* Lam. = *asperum* Poir.), v. *Bunias Erucago* et β , p. 138, *prostratum* Poir., v. *Muricaria prostrata*, p. 534, *rostratum* Scopol. (= *rigidum* Pall. = *tataricum*

Poir.), v. *Euclidium syriacum* etc., *sphaerocarpum*

Myagrurn

Jacq., v. *Crambe hispanica*, *spinosum* Lam., v. *Zilla myagroides*, p. 863, *taraxacifolium* Lam., v. *Laelia orientalis*, p. 340, II., *verrucosum* Lam., v. *Ochthodium aegyptiacum*, p. 552.

Myanthus Lindl., Bartorche.

cristatus Lindl., kammförmige, 4. w. Südamerika.

cernuus Lindl. (= *Catasetum trifidum* Hook.).

deltoides Lindl.

spinosus Hook., dornige, 4. w. Brasilien.

Mycaranthes Blum., Lindl., Pilzorche, XX. 1., Orchideae.

stricta Lindl. (= *Eria stricta* Lindl. = *Octomeria secunda* Wall. inpt.), steife, 4. w. Ostindien.

Mycelis Cass., *angulosa* Cass. (= *muralis* Rchb.), v. *Lactuca murorum*, p. 442 et p. 339, II.

Myginda Rhacoma Sw. (= *Crossopetalum* Rausch.).

Mylinum Carvifolia Gaud., v. *Selinum Carvifolia*, p. 740.

Myogalum Lk., Endl., Kunth, (= *Albucea* Rchb.), *Bouchéanum* Kunth, *nutans* Lk. etc., v. *Ornithogalum*, Sect. II.**Myonima** Commers., Mausröthe, IV. 1., Rubiaceae.

multiflora Rich. (= *Faramea corymbosa* Sieb. = *Ixora micrantha* R. et S. = *ovata* Hort. = *parviflora* Lam., non Vahl.), vielblumige, 5. w. Mauritius.

Myoporum Banks et Soland., Porenblatt.

caprarioides Benth., herzblumenähnliches, 5. t. Neuholland (Schwanenflufs).

floribundum A. Cunn., blüthenreiches, 5. t. Neuholland.

insulare RBr. (= *Elaeodendron australe* Hort., non Vent.).

serratum RBr. (= *Pogonia tetrandra* LaBill.), sägezähniges, 5. t. Neuholland.

Myosotis Rupp., Dill., Vergiftsmeinnicht (Mausöhrchen).I. *Genuina*.

azorica H. C. Watson, azorisches, 4. k. Azoren.

caespitosa Schultz, β) *macrocalyx* H. Petropol.

chinensis DC. (= *peduncularis* Bunge, non Trevir.), chinesisches, \odot . δ . f. Nördl. China.

incrassata Guss. (= *pusilla* Guss., non Lois.), verdicktes, \odot . f. Sicilien.

littoralis Stev., Ufer-V., \odot . f. Ufer des caspischen Meeres, Taurien.

multiflora Merat, vielblumiges, \odot . f. Frankreich.

palustris Wither., δ) *laxiflora* Rchb., ε) *caespititia* DC. (= *caespitosa* β) *grandiflora* Gaud.).

sicula Guss. (= *micrantha* Guss., Bertol., non Pall.), kleinblumiges, \odot . f. Sicilien, Sardinien.

sylvatica Ehrh., δ) *variabilis* Angelis.

versicolor P., Rchb., β) *lutea* P. (= *Anchusa lutea* Cav.).

II. *Eritrichium* Schrad.

californicum DC. (Fisch. et Mey.)

clandestinum A. DC. (= *Lithospermum clandestinum* Trev. = *Cryptantha microcarpa* Fisch. et Mey.), heimlichblühendes, \odot . f. Chili.

cryptanthum A. DC. (= *Cryptantha glomerata* Lehm.), verstecktblumiges, \odot . f. Chili.

lineare DC. (= *M. linearis* Colla, = *M. granulosa* R. et P.), gleichbreitblättriges, \odot . f. Chili.

nanum Schrad. (Vill.), α) *odontospermum* K., β) *leio-*

Myosotis

spermum K. (= *Hacquetii* K. = *tergloviense* Putterl. et Endl. = *M. terglovensis* Hacq. = *M. nana* Wulf., non Vill.).

pedunculare DC. (Trevir.), (= *M. clavata* Blume).

rupestre DC. (Pall.), (= *Anchusa rupestris* R. et S.), Felsen-V., 4. f. Altaisch. Sibirien, Dahurien.

villosum Bunge (Ledeb.), (= *M. drabaefolia* Turcz. = *M. villosa* Ledeb. = *Anchusa villosa* R. et S.), zottiges. 4. f. Dahurien.

III. *Strophostoma* Turcz.

propinquum Turcz. (Fisch. et Mey.).

sparsiflorum Turcz. (Mikan), (= *M. sepium* Bess.).

Zu ergänzen p. 536.

Myosoton aquaticum Mch., v. *Stellaria pentagyna*.

Myrcia DC., Gewürzmyrte.

coriacea DC. (= ? *Caryophyllus cotinifolius* Mill. = *Myrtus acris* β Sw. = *M. coriacea* Vahl, p. 538, = *M. cotinifolia* Poir.).

divaricata DC. (= *Eugenia divaricata* Lam. = *Myrtus divaricata* Hamilt. = *M. laurifolia* Hort. Par. = *M. virgultosa* Sw. var. Spgl.), ausgespreizte, β . w. Westindien.

Linkiana DC. (= *Myrtus Linkiana* Mart.), Link's, β . w. Brasilien.

Mini Sweet, (= *splendens* β DC. = *Eugenia microcarpos* Lam. = *E. Mini* Aubl. = *Myrtus Mini* Spgl.), Mini-G., β . w. Guiana, Brasilien.

splendens DC. (= *Eugenia laxiflora* Poir. = *E. microcarpa* α Lam. = *E. periplocifolia* Jacq. = *Myrtus splendens* Sw.), schimmernde, β . w. Westindien.

M. acris DC. (= *pimentoides* DC. excl. syn.), v. *Eugenia acris*, p. 236.

Myriandra brachyphylla Spach, *galioides* Spach, *glauca* Spach, *Michauxii* Spach, *nitida* Spach (= *fasciculata* Spach), *prolifera* Spach (= *spathulata* Spach), v. *Hypericum fasciculatum*, *galioides*, *myrtifolium*, *Michauxii*, *prolificum*, p. 409, 414 et p. 311, II.

Myrica L., Wachsmyrte, Gagelstrauch.

I. Gale T.

laciniata W. (= *incisa* Hort.).

pubescens Ait., weichhaarige, β . t. Neugranada.

II. *Comptonia* Banks.

asplenifolia Blume, (= *C. asplenifolia* Banks in Ait. Kew. ed. I.), p. 214.

Myrobroma fragrans Salisb., v. *Vanilla planifolia*, p. 837.

Myrodia Schreb., Balsammalve.

scabra Mart., scharfe, β . w. Brasilien.

turbinata Sw. (= *ovata* Mocq. Sess. = *Quararibaea turbinata* Poir.).

Myrospermum Jacq., Balsamsaame.

peruiferum DC. (= *pedicellatum* Lam.), peruanischer, β . w. Südamerika.

toluiferum Rich., p. 538.

Myroxylon L. fil., *peruiferum* L. fil. et *toluiferum* H. B. K., v. *Myrospermum peruiferum* et *toluiferum*.

Myrrhidium DC., Eckl., Zeyh., *anemonefolium* Eckl., Zeyh., *betonicum* Eckl., Zeyh. etc., v. *Pelargonium* Sect. X. *anemonefolium*, *myrrhifolium* etc.

Myrrhis angelicaefolia R. et S., *aurea* Spgl., *aromatica* Spgl., *bulbosa* Spgl., *capensis* Spgl., *Cicutaria* Spgl., *colorata* Spgl., *hirsuta* Spgl., *humilis* R. et S., *millefolia* Spgl. (= *tenuifolia* Schrank, non Schult.), *procumbens* Spgl., *rosea* Spgl., *temula* G., *tenuifolia* Schult., v. *Chaerophyllum angelicaefolium* etc., p. 185, 186 et p. 135, II., *australis* All., *Pectenvenenis* All., v. *Scandix australis* etc., p. 729, *chaerophyllea* Lam., *sylvestris* Spgl., *torquata* Spgl., v. *Anthriscus vulgaris*, *sylvestris* et var. *torquata*, p. 65 et p. 38, II., *canadensis* Nutt., v. *Cryptotaenia canadensis*, p. 174, II., *Claytonii* Torr. et *longistylis* Torr., v. *Osmorrhiza brevistylis* et *longistylis*, *gracilis* Spgl., v. *Sphallerocarpus Cyminum*.

Myrsine L.

africana L. (= *glabra* G.), β) *retusa* Ait. (= *rotundifolia* Lam.).

bifaria Wall., Roxb. (= *Potama* D. Don).

capitellata Wall., β) *parvifolia* A. DC. (= *lanceolata* Wall.).

crassifolia RBr., dickblättrige, \mathfrak{h} . t. Tropisches Neuholland, Norfolkinsel.

floridana A. DC. (= *Sideroxylum punctatum* Lam. = ? *Bumelia punctata* R. et S.), floridanische, \mathfrak{h} . k. Florida.

Manglilla R. et S. (= *Bumelia Manglilla* W. = *Chrysophyllum Manglillo* Lam. = *Caballeria oblonga* R. et P. = *Duhamelia Manglilla* Dombey, = *Manglilla Jussieui* P. = *M. peruviana* Gmel. = *M. oblonga* Spr. = *Scleroxylon Manglilla* W. = *Sideroxylon Manglilla* Lam.), *Manglilla-M.*, \mathfrak{h} . w. t. Peru.

melanophleos RBr. (= *venulosa* Spgl. = *Chrysophyllum melanophleum* Lam. = *Heeria melanophleos* Meisn. = *Manglilla melanophleos* P. = *Roemeria melanophlea* Thbg. = *Scleroxylon melanophleum* W. = *S. venulosum* W. = *Sideroxylum laurifolium* Lam. = *S. melanophleum* Lam.), β) *Jacquiniana* A. DC. (= *Sideroxylon melanophleum* Jacq. H. Vindob.).

Rapanea R. et S. (= *Caballeria coriacea* Mey. = *Rapanea guianensis* Aubl. = *Samara floribunda* W. = *S. pentandra* Sw.), *Rapanea-M.*, \mathfrak{h} . w. Südamerika. *canariensis* Spgl., v. *Pleiomeris canariensis*, *excelsa* Lk. (= *Heberdenia* R. et S.), v. *Heberdenia excelsa*, p. 285, II., *insularis* Dietr., v. *Badula insularis*, p. 57, *mitis* Spgl., v. *Sideroxylon mite*.

Myrtus T., Myrte.

communis L., ϵ) *lusitanica* Mill. (= *acuta* Mill.). — *minima* Mill. (= *microphylla* Hort. = *mucronata* P., non Cambess. = *sponsalis* Hort.), *angustifolia* Hort., *latifolia* Hort., *macrophylla* Hort., *media* Hffg. Var. *elegans* DC. (= *Psidium elegans* Mart.), zierliche, \mathfrak{h} . w. Brasilien.

pimentoides Lindl., Pimentaähnliche, \mathfrak{h} . w. Westindien. *acris* Sw. (= *aromatica* Poir. = *caryophyllata* Jacq.), *Berteriana* Spgl., *brasiliiana* L. etc., v. *Eugenia acris*, *Berteriana*, *Michellii* etc., p. 320 et

Myrtus

p. 236, II., *biflora* L., *dumosa* Vahl, *Greggii* Sw., *obscura* Lindl., *riparia* Mart., *trinervia* Sm., *virgultosa* Sw., v. *Eugenia biflora*, *dumosa*, *Greggii*, *obscura*, *riparia*, *trinervia* et *virgultosa* Nachlese, — *acuminatissima* Blume, *australis* Spgl., *cerasiformis* Blume, *Jambos* H. B. K. etc., v. *Jambosa acuminatissima*, *australis*, *cerasiformis*, *vulgaris* etc., p. 328, II. et p. 428, *coriacea* Vahl, *divaricata* Hamilt. (= *laurifolia* H. Par.) etc., v. *Myrcia coriacea*, *divaricata* etc., p. 425, II., *caryophyllata* L., *corticata* Spgl. (= *Cumini* L.), *obovata* Spgl., v. *Syzygium caryophyllatum*, *Jambolanum* et *obovatum*, *Caryophyllus* Spgl., v. *Caryophyllus aromaticus*, p. 168, *Leucadendron* L., *saligna* Burm., Gmel., v. *Melaleuca Leucadendron* et *Cajuputi*, p. 503 u. 504, *orbiculata* Spgl., v. *Jossinia orbiculata*, p. 431, *Smithii* Spgl., v. *Acmena floribunda*, p. 13, *Zuzygium* L., v. *Calyptanthus Syzygium*, p. 150.

Myscolus Cass., *megacephalus* Cass., *microcephalus* Cass., v. *Scolymus*, Sect. II., *grandiflorus* et *hispanicus*, p. 734.

Nabalus Cass., *Natterlattich*, XIX., 1., *Compositae-Cichoriaceae*.

alatus Hook. (= *Mulgedium hastatum* DC. = *Sonchus hastatus* Less.), geflügelter, ♂. f. Nordwestl. Amerika.

altissimus Hook. (= *Chondrilla altissima* Lam. = *Harpalyce altissima* Don, = *Prenanthes altissima* L., p. 654, = *P. parviflora* Riddel).

cordatus Hook. (= *Harpalyce cordata* Don, = *Prenanthes cordata* W., p. 654).

crepidineus DC. (= *Harpalyce crepidinea* Don, = *Hieracium crepidineum* Fröl. mpt. = *Prenanthes crepidinea* Mchx. = *P. gigantea* Rafin.), pippauähnlicher, 4. f. Nordamerika.

deltoides DC. (= *Prenanthes deltoidea* Ell., non MB.), deltaförmiger, 4. f. Nordamerika.

Fraseri DC. (= *trilobatus* Cass. = *Prenanthes rubicunda* Pursh excl. Synon.), Fraser's, 4. f. Carolina.

integrifolius Cass. (= *Prenanthes alba* H. Par.), ganzblättriger, 4. f. Nordamerika.

racemosa Hook. (= *Harpalyce racemosa* Don, = *Prenanthes racemosa* Mch., p. 654).

serpentarius Hook. (= *Harpalyce Serpentaria* Don, = *Prenanthes Serpentaria* Pursh, p. 655).

suavis DC. (= *albus* Hook. = *Chondrilla alba* Lam. = *Harpalyce alba* Don, = *Prenanthes alba* L., p. 654, = *P. suavis* Salisb.).

trifolius Cass. (= *Fraseri* DC. = *Harpalyce rubicunda* Don, = *Prenanthes alba* Ell., non L. = *P. rubicunda* W., p. 655), dreiblättriger, 4. f. Nordam. 1).

virgatus DC. (= *Harpalyce virgata* Don, Beck. = *Prenanthes simplex* Pursh, = *P. virgata* Pursh, p. 655, = *P. autumnalis* Walt. = *Sonchus virgatus* Dsf.).

Nabea Lehm., (*J. Macnab*, engl. Botaniker), VIII. 1., *Ericaceae*.

montana Lehm. (= *Macnabia montana* Benth.), bergliebende, ♂. t. k. Cap d. g. Hoffn.

1) Nach Walpers zu *N. suavis* gehörig.

Nacibaea coccinea Aubl., *glabra* G. fil., v. *Manettia coccinea* et Gärtneri, p. 695 et p. 384, II.

Nageja Putranjiva Roxb., Hamilt., v. *Putranjiva Roxburghii*.

Nahusia coccinea Schneev., v. *Fuchsia coccinea*.

Najas L., major Roth, All. (= *fluviatilis* Lam. = *muricata* Thuill. = *tetrasperma* W.).

Nama L., Namawinde, V. I., Convolvulaceae-Hydroleaceae. *jamaicensis* L. (= *Hydrolea decurrens* Moç. Sess. = *H. jamaicensis* Rausch.), jamaikanische, ©. w. m. Jamaica. *sericea* W., v. *Evolvulus incanus*, p. 241, II.

Napoleona P. B., (Napoleon Buonaparte, ehem. Kaiser der Franzosen etc.), XVI. II., *Belvisieae*.

Heudelotii H. Par. ¹⁾, (= *imperialis* ? *purpurea* DC.), Heudelott's, ꝥ. w. Guinea.

imperialis P. B. (= *Belvisia coerulea* Desv.), kaiserliche, ꝥ. w. Guinea.

Whitfieldii Hook., Whitfield's, ꝥ. w. Guinea.

Napus Medic., *oleifera* Spenn., *oleracea* Spenn., *Rapa* Spenn., v. *Brassica Napus*, *oleracea*, *Rapa*, p. 130.

Narcissus T., L., *Narcisse*.

I. *Ajax* Salisb. Herb.

major Curt. (= *A. luteus* var. *major* Herb. = *grandiflorus* Salisb.), a) propinquus Salisb. (= ? *glaucus* Hornem. = *lacinularis* Salisb.), b) obvallis Salisb., Haw. (= *Sibthorpii* Haw.), c) lobularis Haw. var., d) cambricus Haw., e) rugilobus Haw.

minor L. (= *exiguus* Salisb. var. *princeps* Herb.), a) humilior Herb. (= *minus* Haw.), b) cuneiflorus Salisb., Haw. (= *pumilus* Salisb.), c) erectior Herb. (= *A. minor* Haw.), d) nanus Herb. (= *A. nanus* Haw.), e) pumilus Herb.

moschatus L. (= *albus* Rudb. = *abscissus* Haw. = *candidissimus* Red. = *montanus* Ker, = *poculiformis* Salisb.), a) tortuosus Haw., Herb., b) cernuus Roth, Herb., Haw., c) albidus * (= *albicans* Herb. Haw.).

Pseudonarcissus L. (= *ryticarpos* Herb. = *hispanicus* Gouan), a) festalis Salisb., b) *Pseudo-nobilis* Haw., c) *Telamonius* Haw., d) *Tratus Cantus Batav.*, e) *Van Sion Batav.*, f?) *Spofforthiae* H. Angl. etc.

II. *Assaracus* Haw.

capax Salisb. (= *calathinus* Loisel., Redout. = *Queltia capax* Salisb.).

III. *Chloraster* Haw.

viridiflorus Schousb. (= *Hermione viridiflora* Herb.).

IV. *Corbularia* Haw.

Bulbocodium L., β) *tardiflorus* * (= *serotinus* Haw. = *turgidus* Salisb.).

V. *Diomedes* Haw.

Macleayi Lindl. (= *D. minor* Haw. = *Queltia Macleana* Herb.).

Sabini Lindl. (= *D. major* Haw. = *Ajax Sabinius* Herb.).

Crichtoni H. Angl., Hybride.

VI. *Ganymedes* Haw.

concolor Haw., Herb. (= *homochroos* Schult.).

¹⁾ Heudelot Director d. k. Culturen am Senegal, reiste dasselbst †.

Narcissus

nutans Haw. (= *effusus* Salisb.).

pulchellus Salisb. (= *triandrus* var. *luteus* Bot. mag.).

β) striatulus Haw.

VII. Helena.

gracilis Salisb., Haw., Sabine, (= *laetus* Redouté).

tenuior Curt. (= ? *tenuis* Ag. = *uniflorus* Hort. =

Hermione tegulaeflora Salisb. = *H. tenuior* Haw.).

β) angustifolius W.

VIII. Hermione Haw.

bifrons Ker, Sims, (= *radiata* Red. var. Ker, = *stellaris* Salisb.).

breviflorus Haw. (= *Ajax breviflorus* Haw.). Spanien.

citrinus Haw., G. Don, (= *orientalis* var. Gmel. =

Tazetta bicolor Redout. = *Grand Primo Citroniere*

Batav.), citronfarbige, 4. Zw. f. b. ?

dubius Gouan, (= *pallidus* Lam.).

italicus Ker, (= *papyraceus* β Bot. mag. = *Tazetta*

L. var. Sm. = *H. stylosa* Haw.).

niveus Loisel. (= *papyraceus* α Bot. mag. = *stellatus*

Rchb. = ? *unicolor* Tenore), schneeweiße, 4. Zw. f.

Südfrankreich, Spanien, Süditalien.

papyraceus Ker, (= *uniceps* DC. = *Tazetta alba* Redout.

= *unicolor* Vent., ? Tenor.), β) Cypri Sweet, Haw.,

γ) jasmineus Salisb., Haw.

patulus Lois. (= *orientalis* Bot. mag. = ? *radiatus*

Red.), abstehende, 4. Zw. f. b. Südfrankreich, Italien.

polyanthos Lois. (= *orientalis* Dryand. Ait. = *Tazetta*

Asso = *tereticaulis* Haw.), vielblumige, 4. Zw. f. b.

Südfrankreich, Spanien.

primulinus Haw. (= *bifrons* β Bot. mag. = *calathinus*

γ Bot. mag.).

subalbidus Lois. (= *stellatus* β *subdiscolor* DC.), gelb-

lichweise, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

Tazetta L. Als Varietäten zieht man hierher a) aper-

ticoronus Haw., b) bicolor Red. (= *orientalis* Ker,

= *Ta. sexlobata* Herb.), c) multiflorus Haw., d) gran-

diflorus Haw. (= *orientalis* Ker, = *crenularis* Salisb.

= *Trevianus* Swt.), e) tereticaulis Haw. (= *leucoji-*

folia Salisb., H. = *brevistyla* var. Herb.), f) crenu-

latus Herb. etc.

? β) cupularis Bertol. (= *flavus* Lagasca, =

? *italicus* Tenore), γ) aureus Haw. (= *orientalis*

δ Bot. mag.).

unicolor Tenore, einfarbige, 4. Zw. f. b. Gegend von

Neapel (Vesuv u. Insel Caprea).

IX. Illus Haw.

triandrus L. (= *calathinus* Redout.).

X. Jonquilla Haw.

Jonquilla L. (= *Hermione Jonquilla* Haw. = *junci-*

folius Salisb., non Loisel.).

juncifolius Loisel. (= ? *Assonianus* Dufour, = *Jonquilla*

β Lapeyr. ? = *J. uniflorus* Asso ?) simsenblättrige,

4. Zw. f. b. Südfrankreich, Spanien, Orient.

XI. Narcissus Haw.

biflorus Curt. (= *cothurnalis* Salisb. = *medio-luteus*

Mill. = *orientalis* C. Tenore.)

majalis Curt. (= *longipetalus* Schlchr. = *poeticus* Sm.

E. B.).

Narcissus

XIII. Philogyne Haw.

odorus L. (= *calathinus* Curt. = *conspicuus* Salisb. = *elatior* Haw. = *Infundibulum* Poir. = *lobatus* Poir.), b) flore pleno (Queen Anne's Jonquil).

XIV. Queltia,

incomparabilis Curt. (= *amplus* Salisb. = *Gouani* Roth, = *Nonpareille* Hort. = *Q. foetida* Herb.), a) aurantius G. Don, b) semipartitus Haw., c) concolor Salisb. (= *Haworthii* G. Don), d) albus Haw. (= *griseus* Auct. = *N. Queltia* G. Don), e) subconcolor H. angl.¹⁾.

Nardosmia Cass., fragrans Rchb. etc., v. Petasites, Sect. II., p. 609.

Nardurus Rchb., v. Vulpia, Sect. II., p. 853.

Naron iridioideum Mch., v. Dietes iridioides.

Narthecium Möhr.,

americanum Ker, (= *glutinosum* Ker, non Mchx.).

boreale Wahlbg., *calyculatum* Lam. (= *flavescens* Wahlb. = *iridifolium* Vill.), *glutinosum* Mchx., *pubens* Mchx., v. *Tofieldia alpina*, calyculata etc., p. 812.

Nasturtioides Medic., *inconspicuum* Mch., v. *Lepidium ruderales*, p. 454.

Nasturtiolum castratum Medic. (= *pinnatum* Mch.), v. *Senebiera pinnatifida*, p. 742.

Nasturtium C. Bauh., RBr., Wasserkresse.

armoracioides Tausch, (= ? *austriacum* β *lyratum* Wallr.), Meerrettigähnliche, 4. f. Sachsen, Böhmen.

atrovirens DC. (= *Sisymbrium atrov.* Hornem., p. 761).

bonariense DC. (= *Sisymbrium bonariense* Poir.), bonarische, ☉. f. Bonaria.

brachycarpum C. A. Mey., kurzschotige, ♂. f. Alt. Sibirien.

densiflorum Turcz., dichtblumige, ♂. f. Sibirien.

indicum DC. (= *apetalum* DC. = *Clandestina indica* Spach, = *Sisymbrium apetalum* Dsf. = *S. dubium* P. = *S. indicum* L.).

lippicense DC. (= *Wulfenianum* Host.).

micropetalum Fisch. et Mey. (= *tanacetifolium* Hook. et Arn. = *palustre* δ *tanacetifolium* DC.).

officinale RBr., γ) *siifolium* Rchb.

sylvestre RBr., β) *rivulare* Rchb.

Hybriden:

austriaco-sylvestre (Rchb.), (= *astylon* Rchb.), *brachystylum* Wallr., *dentaculatum* Wallr.

Bursa pastoris Roth, v. *Capsella bursa pastoris*, p. 158, *Draba* Crantz, *Iberis* G. M. S., *sativum* Mch., v. *Lepidium* *Draba*, *Iberis*, *sativum*, p. 454, *Halleri* Andrz., *ovirens* Andrz., *procurrens* Andrz., v. *Arabis Halleri* et var., *A. procurrens*, p. 70, *paniculatum* Crantz, v. *Neslia paniculata*, p. 546, *Thalianum* Andrzy., v. *Sisymbrium Thalianum*, p. 762.

Natrix crispa Mch., *fruticosa* Mch., *pinguis* Mch., *rotundifolia* Mch., v. *Ononis crispa*, *fruticosa*, *Natrix*, *rotundifolia*, p. 559 et 560.

1) Vergl. über diese in zu viele Abtheilungen und angebliche Arten zerspaltene Gattung und die damit verwandten: Ferdinand Neumann, „die Familie der Amaryllideen u. s. w. Weissensee, 1844.“

- Nauclea** L., *cordifolia* Roxb. (= *sterculiaefolia* Rich.).
- Naumburgia** Mch., (J. S. Naumburg, ehem. Prof. d. Botanik zu Erfurt †), V. 1., Primulaceae-Lysimachieae.
- thyrsiflora* Rchb. (= *guttata* Mch. = *Lysimachia thyrsiflora* L. = *Thyrsanthus palustris* Schrank), strauchblumige, 4. Wa. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.
- β) *capitata* Rafin. (= *Lysim. capitata* Pursh), Vergl. p. 486.
- Nauplius aquaticus* Cass., *maritimus* Cass., *sericeus* Cass., = *Asteriscus aquaticus*, *maritimus*, *sericeus*, v. *Bupthalmum*, Sect. I., p. 138.
- Navarretia** R. et P., Navarretie, V. 1., Polemoniaceae.
- heterophylla* Benth. (= *Collomia heterophylla* Hook., p. 211, = *Courtoisia bipinnatifida* et *daucifolia* Rchb.).
- involucrata* R. et P. (= *pusilla* Hort. = *Collomia Navarretia* G. Don, = *C. prolifera* Hort. = *Gilia eryngioides* Lehm. = *G. mucronata* Lehm. = *Aegochloa eryngioides* Benth.), eingehüllte, ☉. f. Chili.
- Nebelia* Neck., *affinis* Sweet, *paleacea* Sweet, *phyllicoides* Sweet, v. *Berardia affinis*, *paleacea* et *phyllicoides*, p. 65, II.
- Neckeria campestris* Gmel., v. *Pollichia campestris*, p. 640.
- Nectandra** Rottb., N. E., Saftlorbeer, IX. 1., Laurineae.
- floribunda* N. E. (= *Laurus floribunda* Sw., p. 449).
- sanguinea* Rottb. (= ? *Borbonia globosa* G. = *Laurus Borbonia* Lam. β = *Laurus globosa* Aubl. = *L. martinicensis* Jacq. = *Ocotea globosa* Schlttdl. = *Persea globosa* Speg. = *P. sanguinea* Speg.), blutfarbiger, ☿. w. Südamerika.
- Nectarobothrium* Lindl., *striatum* Ledeb., v. *Lloydia serotina*, p. 470 et p. 366, II.
- Nectouxia** H. B. K., (Nectoux, begleitete Napoleon Buonaparte als Botaniker nach Aegypten), V. 1., Solanaceae.
- formosa* H. B. K., non DC. (= *Atropa arenaria* W. herb.), schöne, ☉. m. f. Mexico.
- Neaea** R. et S. (= *Neaea* Auct.), (Louis Néé, franz. Botaniker, u. Reisender †), VIII. 1., Nyctagineae.
- glabra* Schott msc., Endl., kahle, ☿. w. Brasilien.
- hirsuta* Schott msc., Endl., rauhhaarige, ☿. w. Brasilien.
- lancifolia* Schott msc., Endl., lanzettblättrige, ☿. w. Brasilien.
- Mitscherlichia* Steud. (= *Mitscherlichia spectabilis* Kunth), Mitscherlich's, ☿. w. Südamerika.
- Neesia Lupinaster* Speg., v. *Trifolium Lupinaster*, p. 819.
- Negretia mitis* R. et P., *sericea* W. herb., v. *Mucuna mitis* et *urens*, p. 533.
- Negundo** fraxinifolium Nutt., d) angustifolium.
- Neja** D. Don, DC., Neja.
- ciliaris* DC., gewimperte, 4. ☿. k. t. Rio grande.
- falcata* N. E. (= *Diplopappus pinifolius glaber* Hort. Berol.), sichelförmige, 4. ☿. k. t. Brasilien.
- filiformis* N. E. (= *Erigeron filiformis* Speg. = *Diplopappus pinifolius* Less.), fadenförmige, 4. ☿. k. t. Südamerika.
- gracilis* D. Don, (= *Diplopappus graminifolius* Less.).
- linearifolia* DC, gleichbreitblättrige, ☿. k. t. Rio Grande.

Nelitris G., Myrtenbeere.

paniculata Lindl. (= *polygama* Spgl. = *Eugenia polygama* Roxb.), rispige, ♀. w. Molucken.

Nelsonia tomentosa Dietr., v. *Rhaphidosperma vestita*.

Nelumbium Juss., Nixblume(rose).

pentapetalum W. (= *Cyamus pentapetalus* Pursh, = *Nymphaea pentapetala* Walt.), fünfkronenblättrige, 4. Wa. w. Carolina.

Nemaconia graminifolia Knowl. et Westc., v. *Ponera juncifolia*, p. 647.

Nematanthus Schrad., Fadenblume, XIV. II., Gesneriaceae.

chloronema Mart. (= ? *Columnnea chloronema* Hort.), grünliche, ♀. w. Brasilien.

jonema Mart. (= *corticola* Schrad. = *longipes* DC. var. ?), veilchenblaue, ♀. Sch. w. Brasilien.

longipes DC., langstielige, ♀. Sch. w. Brasilien.

N. Guilleminianus H. belg., v. *Columnnea splendens*, p. 154.

Nemauchenes Cass., Nackenpippau, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

aspera Endl. (= *aculeata* Cassin. = *Barchhausia aspera* Lk., Rehb., p. 115, = *B. muricata* Spgl. = *Crepis aspera* L. = *Endoptera aspera* DC. = *Seriola urens* Lam., non L.), rauher, ☉. f. Italien, Griechenland, Orient.

β) *ambigua* Cass. (= *inermis* Cass.).

Nemesia Vent., Nemesie.

diffusa Benth., weitschweifige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

floribunda Lehm. (= *affinis* Benth.).

foetens Vent., stinkende, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

linearis Vent., gleichbreite, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

Nemia Cheiranthus Berg., *rubra* Berg., v. *Manulea Cheiranthus et rubra*, p. 495, 496 et 385, II.

Nemopantes Rafin., Hainstrauch.

Andersonii H. Cels., Anderson's, ♀. k. ?

Nemophila Barton, Hainblümchen(freund).

discoidalis Makoy, scheibenförmiges, ? ♂. k. f. Californien.

insignis Dougl., Benth., β) *Menziesii* Hook. et Arn.

liniflora Fisch. et Mey., leinblumiges, ☉. f. Californien.

phacelioides Barton, (= *nemorosa* Auct. = *Nuttallii* Colla).

Neottia L., Rich., Nestorche.

bracteosa Lindl. (= ? *Spiranthes bracteosa* Lindl., p. 779), deckblättrige, 4. w. Brasilien.

micrantha Swt., kleinblumige, 4. w. Westindien.

Neottidium Nidus avis RBr., v. *Neottia Nidus avis*.

Nepeta R., L., Benth., Katzenmünze.

Apulei Ucria, (= *rosea* Salzm. = *tuberosa* Dsf.), apulische, 4. Kn. f. b. k. Nordafrika, Spanien, Sicilien.

azurea RBr., azurblaue, ☉. ? 4. m. f. w. Abyssinien.

betonicaefolia C. A. Mey., betonienblättrige, 4. f. Caucasus.

brevifolia C. A. Mey. (= *longiflora* Fisch.), kurzblättrige, 4. f. Caucasus.

calycina Fenzl, großkelchige, 4. f. b. k. Mesopotamien.

cyanea Stev. (= *acinifolia* Spgl. = *incana* MB., non Ait. = *mollissima* Tausch.), himmelblaue, 4. f. Ost-Caucasus.

fissa C. A. Mey. (= *laxa* Benth. = *teucrifolia* W. herb.).

Nepeta

- granatensis Boiss. (= ? *multibracteata* Lk. et Hffg.), granadaische, 4. f. Südl. Spanien.
- grandiflora MB. (= *argentea* Hortul. = *colorata* W. Enum. = *grandis* Hortul. = *incana* Hortul. = *lamiifolia* Hffm. = *melissaeifolia* P. = *teucriodes* Hortul. = *violacea* Hortul.).
- heliotropifolia Lam., sonnenwendenblättrige, 4. f. b. Syrien.
- italica L. (= *Calamintha* Tausch, = ? *canescens* Räusch. = *imbricata* Lag. = *macrostachya* Jan, = *marruboides* W. Enum. = *orientalis* Mill. = *teucrioides* Lam., W.). Italien, Spanien, Caucasus.
- latifolia DC. (= *coerulea* Ait. = *grandiflora* Lapyr.).
- lavandulacea L. fil. suppl. (= *lobata* Rudolph. = *multifida* L. spec. = *Lophanthus multifidus* Benth. = *Saussurea pinnatifida* Mch.).
- macrantha Fisch. (= *Dracocephalum sibiricum* L. = *Moldavica elata* Mch.), größtblumige, 4. f. Altaisch. Sibirien.
- Meyeri Benth. (= *micrantha* C. A. Mey., non Bunge), Meyer's, 4. f. Caucasus.
- Mussini Henkel, (= *argentea* Hortul. = *cyanotricha* Tausch, = *diffusa* Hortul. = *incana* Hortul. = *lamiifolia* Hortul. = *longiflora* Sims, non Vent. = *lancifolia* Hortul. = *salviaefolia* P. = *teucrioides* Hortul. = *violacea* et *Willdenowiana* Hortul.), Mussin's, 4. f. Iberien, Caucasus.
- Nepetella L., α) major Benth. (= *amethystina* Dsf. = *paniculata* Mill.), β) humilis Benth. (= *angustifolia* Vahl, = *arragonensis* Lam. = *graveolens* Vill. = *humilior* H. Par. = *lanceolata* Lam.), γ) incana Ait.
- nuda L., α) grandiflora Benth. (= *pannonica* Jacq. = *paniculata* Crantz, = *violacea* Vill.), β) parviflora Benth. (= *alba* Dsf. = *nuda* Jacq. = *pannonica* L. = *ucranica* MB.).
- pusilla Benth. (= *Zizyphora pungens* Bunge), niedrigste, 4. f. Altai.
- Reichenbachiana C. A. Mey. (= *racemosa* Rehb., non Lam.), Reichenbach's, 4. f. Ararat.
- Scordotis L., β) viridis Benth. (= *hirsuta* L. = *procumbens* Mill. = *tomentosa* Sieb.).
- septemcrenata Ehb., siebenkerbige, 4. k. f. b. Aegypten, Arabien.
- tuberosa L. (= *foliosa* Moris, = *lanata* Jacq. = *scabra* Tausch, = *violacea* Brotero), β) reticulata Dsf.
- ucranica L., non MB. (= *sibirica* MB.).
- aristata* Rich. (= *pectinata* L.), v. *Hyptis pectinata*, p. 313, II., *croatica* Spgl., v. *Satureja rupestris*, *disticha* Blume, v. *Anisomeles ovata*, p. 61, *Glechoma* Benth., v. *Glechoma hederacea*, *marifolia* Cav. (= *serpyllifolia* MB. = *cretica* Dietr. = *parvifolia* Hortul.), v. *Micromeria marifolia*, *virginica* W., v. *Pycnanthemum lanceolatum* β .

Nephelium L. (= *Euphoria* Juss.), Nephelium, VIII. 1., Sapindaceae.

- lappaceum L. (= *Euphoria Nephelium* DC. = *E. crinita* Steud. = *Dimocarpus crinitus* Lour. = *Scytalia crinita* Räusch.), klettenähnliches, 5. w. China, Java.
- Litschi Cambess., G. Don, (= *Euphoria Litschi* Dsf.

Nepheium

= *E. punicea* Lam. = *Dimocarpus Litschi* Lour.
 = *Laetji* Osbeck, = *Litschi chinensis* Sonner. =
Sapindus edulis Ait. = *Scytalia chinensis* G. =
S. Litschi Rausch.).

Longanum Camb. (= *benghalense* G. Don, = *Euphoria Longana* Lam. = *Dimocarpus Longana* Lour. =
D. longus Dietr. = *D. undulatus* Wight, = *Sapindus benghalensis* Roxb. = *Scytalia Longan* Rausch.),
 wellenförmiges, h. w. China, Cochinchina, Bengalen.
 β) *benghalense* G. Don.

pupillum Wight, (= *Euphoria pupilla* Steud. = *Dimocarpus pupillus* Moon Catal.), kleines, h. w. Ostindien.

verticillatum G. Don, (= *Euphoria verticillata* RBr.), wirtelförmiges, h. w. Ostindien. (Kaum eingeführt).

Nephrandra dubia Sw., v. *Vitex umbrosa*, p. 852.

Nephranthera Blume, Nierenstaubbeutel, XX. 1., Orchideae.

matutina Blume, frühzeitiger, 4. w. Java.

Nephrodium L. C. Rich., Endl., v. *Aspidium*, Sect. III., p. 49, II. et p. 91.

Nephrrolepis Schott, Kunze, (= *Nephrodium* Lk., non L., C. Rich., Endl.), *Aspidium* Sect. IV., p. 49, II.

neglecta Kunze, (= *Aspidium exaltatum* Hort., non Sw.).

pectinata Kunze, = *Nephrodium Schkuhrii* Lk. = *Aspidium pectinatum* W.

trepezoides (Sw.).

tuberosa Presl, = *Nephrodium tuberosum* Lk. = *Aspidium tuberosum* Bory.

Neptunia oleracea Lour. (= *stolonifera* Guillem. et Perott.), *pleua* Benth., v. *Desmanthus natans* et *plenus*.

Neriandra A. DC., Grannenbeutel, V. 1., Apocynae.

suberecta A. DC. (= *Echites suberecta* Andr., Sims, non Jacq.), fastaufrechter, h. w. St. Vincent.

(Wird von A. DeCandolle als eine species dubia zu dieser Gattung, die aus 2 Arten *hancorniaefolia* A. DC. in Bahia und *angustifolia* A. DC. in Chili heimisch, gebildet worden, gestellt).

Nerine Herb. (Töchter des Nereus).

lucida Herb. (= *laticoma* Ker, = *Amaryllis laticoma* Ker, = *Brunswigia laticoma* et *lucida* Herb., p. 135).

Nerium L., RBr. (= *Nerion* T.), Oleander, Lorberrose.

odorum Soland. in Ait. Kew. (= *grandiflorum* Dsf. = *indicum* Mill. = *odoratum* Lam.), β) flore pleno (= *latifolium* Mill.), a) fl. carneo, b) fl. albo, γ) luteum Targ., Tozz. (= *flavescens* Spin.).

Oleander L., β) flore pleno Soland. (= *splendens* Hort.), γ) *Loddigesii* A. DC. (= *fl. variegatis* Lodd.). —

N. cupreum Hort., Duchesse d'Angoulême Hort., du Saulget Hort., Grangeanum Hort., Hacvillei Hort., Henry de France Hort., Jeanne d'Arc Hort., luteum novum Hort., purpureum fl. pleno Hort., Ragonoti Hort., Tangle Paxton, variegatum Hort. etc. var.

mascatenense A. DC. (in der Gegend von Mascate heimisch, scheint noch nicht eingeführt).

caudatum Lam. (= *scandens* Lour.), v. *Strophanthus dichotomus*, p. 790, *coronarium* Ait. (= *divaricatum* L., non Lour.), v. *Tabernaemontana*

Nerium

coronaria, p. 796, *reticulatum* Roxb., v. *Cryptolepis reticulata*, *sibiricum* Medic., v. *Apocynum hypericifolium*, *tinctorium* Roxb., non Hort., *antidysentericum* L., *zeylanicum* L., v. *Wrightia tinctoria* etc., p. 858.

Nesaea speciosa H. B. K., v. *Diplusodon speciosus*, p. 296, II.

Neslia Desv., Neslie.

apiculata C. A. Méy. (= *paniculata* Schimp., non Desv.), kurzspitzige, ☉. f. Sinai.

Neuberia Ecklon, *humilis* Eckl., *pyramidalis* Eckl., *rosea* Eckl., v. *Watsonia humilis*, *iridifolia* et *rosea*, p. 855 et 856.

Neudorffia peruviana Adans., v. *Nolana prostrata*, p. 549.

Neumannia Brogn., (Neumann, Obergärtner am Jardin des plantes zu Paris; Ferdinand Neumann k. preuss. Bataillonsarzt zu Erfurt, thätiger u. talentvoller Bearbeiter der Gartenbotanik und Blumistik), VI. 1., Bromeliaceae.

imbricata Brogn., ziegeldachförmige, 4. w. Mexico.

Neumeyera austriaca Rehb., *Villarsii* Rehb., v.

Alsine austriaca et *Villarsii*, p. 38 et 39.

Neurada L. (= *Neuras* Adans.), Neurada, X. v., Aizoideae.

procumbens L. (= *Figaraea aegyptiaca* Vivian.), niederliegende, ☉. f. Nordafrika.

Neurocarpum Desv., Nervenhülse.

falcatum DC. (= *Olitoria falcata* Lam.), sichelförmige, ♂. Sch. w. St. Domingo, Portorico.

ellipticum Desv., *mexicanum* Steud., Zuccar., v.

Martia brasiliensis et *mexicana*, p. 387 et 388, II.

Neurogramma Presl, Lk., pedata Lk., rufa Lk., tomentosa Lk., v. *Gymnogramme*, Sect. V., p. 278.

Neuroloma Andr., Nervensäumler.

nudicaule DC. (= *Arabis nudicaulis* DC. = *Cardamine nudicaulis* L.), nacktstengeliger, 4. f. Sibirien.

scapigerum DC. (= *arabidiflorum* DC. var. = *Cheiranthus scapiger* Adans. = *Hesperis scapigera* DC.), schafttragender, 4. f. Sibirien.

speciosum Steud. (= *Hesperis speciosa* Sweet, = *Parrya integerrima* G. Don), prächtiger, 4. f. Sibirien.

Neuroplatyceros Pluckn., v. *Platycerium alcorni*.

Neurosperma cuspidata Rafin., v. *Momordica Balsamina*, p. 528.

Nicandra physaloides G. (= *minor* Hort.)

Nicolsonia DC., Nicolsonie.

cayennensis DC. (= *Hedysarum barbatum* L. var. Spgl.

= *H. lagocephalum* Lk. = *H. procumbens* Arrabida),

cayennische, 4. ♂. w. Cayenne.

Nicotiana T., Tabak.

alata Lk. (= *brasiliensis* H. Berol.).

anisoloba Sweet, ungleichlappiger, ☉. m. f. Chili.

auriculata Agardh, (= *maxima* Hffg.), geöhrt, ☉. 4.

♂. m. f. w. ?

Berteriana Hort. Par., Sweet, Bertero's, ☉. m. f. Chili.

chinensis Fisch. (= *fruticosa* Lour. = *lanceifolia* Ag.

= *lurcica* Haberl).

Nicotiana

- commutata Fisch. et Mey., verwechselter, ☉. ♂. m.
 f. w. ?
 dilatata Lk. (= *Tabacum* L. var. Spgl.). Südamerika.
 fastigiata N. E. (= *rotundifolia* Lindl.), gipfelständiger,
 ☉. ♀. m. f. k. Neuholland, Schwanenfl.
 fruticosa L. (= *frutescens* Lagasca, = *Lehmanni* et
petiolata Agardh), β) *angustifolia* Ehrh., γ) *crispula*
 Hort., δ) *albiflora* Schltl. Mexico.
 glutinosa L. (= *militaris* L. = *Sailanthus glutinosus*
 G. Don, = *Tabacus viscidus* Mch.).
 loxensis H. B. K. (= *Tabacum* L. var. Kunth), loxai-
 scher, ☉. m. f. Südamerika.
 macrophylla Spgl. (= *gigantea* Ledeb. = *latissima*
 Mill. = *Tabacum macrophyllum* Schk.), (Tabaco de
 Havana), großblättriger, ☉. m. f. Südamerika.
 β) *sanguinea* H. Petropol.
 marylandica Schübler, maryländischer, ☉. f. Maryland.
 mexicana Schltl., mexicanischer, ♂. ♀. k. Mexico.
 micrantha Haw., Sweet, H. Par.
 paniculata L. (= *viridiflora* Lagasca.).
 rustica L., β) *asiatica* Schult. (= *scabra* Lagasca, =
sibirica Hort. Panorm.), γ) *brasiliensis* Schrk., δ)
hungarica Hort. Petropol., ε) *pumila* Schrk. (= *hu-*
milis Hort.), η) *tatarica* Schult.
 Sellowii Lk., Otto, Sellow's, ☉. m. f. Montevideo.
 sordida Lehm., schmutzigfarbiger, ☉. m. f. Mexico.
 Tabacum L., b) *arborescens* H. Petropol., c) *attenuata*
 Schrk. (= *angustifolia* Mill., non R. et P.), g) Ver-
 don Schrk., R. et S., i) *havanensis* Lagasca, k) Pa-
 raguay H. Petropol., l) *virginica* H. Petropol. Die
 übrigen Var. s. p. 548.
 Unbestimmtere: *fragrans* Bernh. ☉., *grandiflora* H. Crac.,
pseudodecurrens Steud. (= *decurrens* Tausch). ☉.
minima Molin., v. *Nierembergia repens*.
- Nidorella** Cass., *Nidorella*, XIX. II., Compositae-
 Corymbiferae.
foetida DC. (= *foliosa* Cass. = *Chrysocoma foetida*
 Lam. = *Conyza foetida* W. = *Erigeron foetidum*
 L. = *Jasonia foetida* Cass. = *Inula foetida* L. =
Solidago retusa Burm.), stinkende, 4. f. k. Südafrika.
- Niebuhria** DC., (Niebuhr, bereiste mit Forskol Aegypten
 u. Arabien †), XII. I., Capparideae.
oblongifolia DC. (= *Capparis heteroclita* Roxb. =
C. heterogenea Roxb. = *C. oblongifolia* Forsk. =
Crataeva oblongifolia Spgl. = *Streblocarpus oblongi-*
folius Arn.), langblättrige, ♀. w. Arabien, Ostindien.
triphylla Wendl. (= *avicularis* DC. = *caffra* DC. =
Capparis triphylla Thbg. = *Crataeva avicularis* Burch.
 = *Cr. caffra* Burchel), dreiblättrige, ♀. t. w. Cap
 der guten Hoffn.
- Nierembergia** R. et P. *Nierembergie*.
gracilis Hook., schlanke, ☉. 4. ♀. f. k. t. Bonaria.
linariaefolia Grah. (= *filicaulis* Lindl.).
repens R. et P. (= *spathulata* R. et P. = *Nicotiana*
minima Mol.), kriechende, ☉. 4. ♀. f. k. t. Südamerika.
viscidula H. B. K. (= *graveolens* St. Hil. = *pubescens*
 Spgl.), schmierige, ♀. t. Südamerika.
phoenicea G. Don, (= *punicea* Hort.), v. *Petunia*
Mirabilis, p. 610.

Nigella T., Schwarzkümmel.

coarctata Gmel. (= *damascena humilis* Hort. = *saliva* β *pygmaea* P.), β) *pygmaea* Endl.

divaricata Beaupr. in DC. (= *arvensis* L. var. MB. = *laevis* Delile, = *latifolia* Mill.).

segetalis MB. (= *arvensis* Pall., non L. = *cretica* Mill.).

Nintoa Sweet, v. *Lonicera*, Sect. III., p. 370, II. et p. 467.

N. glauca Hort. = *Lonicera japonica*.

Niota Lam., *Commersonii* P. (= *Lamarkiana* Blume, = *tetrapetala* Lam.), v. *Vitmannia elliptica*, p. 853.

Niphaea Lindl., *Niphaea* (Häufchenblume), XIV. II., *Personatae-Gesnerieae*.

oblonga Lindl. (= *alba* Hort. = *Achimenes alba* H. Belg.).
längliche, 4. w. Mexico.

Niphobolus Kaulf., *Lingua*, Spgl. (= *chinensis* Hort. = *Craspedaria chinensis* Lk.).**Nissolia** Jacq., *Nissolie*.

Berteroana Steud. (= *aculeata* Spgl. nec Alior.), Bertero's, \S . Sch. w. Südamerika (am Magdalenenflufs).
aculeata DC., *arborea* L. (= *glabrata* Lk.), *microptera* Poir., *robiniaefolia* DC., v. *Machaerium aculeatum* etc., p. 379, II.

Nissolia Adans., *parviflora* Mch., *uniflora* Mch., v. *Lathyrus inconspicuus* et *Nissolia*, p. 447 et 148.

Nivaria Medic., *aestivalis* Mch. (= *monadelphae* Medic.), *verna* Mch., v. *Leucojum aestivum* et *vernum*, p. 459.

Nivenia RBr., *Nivenie*.

concava RBr. (= *spathulata* RBr. var. Spgl. = *Protea concava* Lam.), hohle, \S . t. Cap d. g. Hoffn.

crithmifolia RBr. (= *Protea crithmifolia* Don, = *P. Lagopus* Andr., non Thbg.).

marginata RBr. (= *Protea marginata* Poir.), berandete, \S . t. Cap d. g. Hoffn.

Nivenia Vent., *stylosa* Salisb., v. *Witsenia corymbosa*, p. 858.

Noccaea Cav., *helianthifolia* Cass. (= *macrophylla* Zucc. = *rigida* Cav.), *latifolia* Cerv., *mollis* Jacq., *rubra* Cass. (= ? *rigida* Cav.), *suaveolens* Cass., v. *Lagasea helianthifolia*, *latifolia* etc., p. 443.

Nolana L., Zymbelblume, V. I., *Convolvulaceae-Nolanaceae*.

atriplicifolia D. Don, (= *grandiflora* Hornem., Lehm.).

coronata R. et P., gekrönte, \odot . m. f. Peru.

inflata R. et P., aufgeblasene, \odot . m. f. Peru.

prostrata L. (= *gallinacea* P. = *Neudorffia peruviana* Adans. = *Teganium procumbens* Schmid.).

revoluta R. et P., zurückgerollte, \odot . m. f. Peru.

spathulata R. et P., spatelförmige, \odot . m. f. Peru.

tenella Lindl. (= *paradoxa* Hook., non Lindl.).

Nolletia Cassin., *Nolletie*, XIX. II., *Compositae-Corymbiferae*.

chrysocomoides Cass. (= *Aster chrysocomoides* Dsf. = ? *A. chrysocomifolius* Hort. = *Conyza chrysocomoides* Dsf. = *C. mauritanica* W. herb. = *Felicia Fontanesii* Cass.), goldschopf(haar)ähnliche, \S . k. Nordafrika (Mauritanien).

Noltea Rchb., (Dr. Nolte, Prof. u. Director des botanischen Gartens in Kiel), V. I., *Rhamneae*.

africana Endl (= *Ceanothus africanus* L. = *Hollia*

Noltea

africana * p. 880, = *Vitmannia africana* Wight et Arn. = *Willemetia africana* Brogn.), afrikanische, ⚭. k. Cap d. g. Hoffn., Ostindien.

Nonnea Medic., Nonnea

alpestris G. Don, (= *Anchusa alpestris* Stev. = *Lycopsis alpestris* Lehm.), Vor-Alpen-N., ♂. 4. f. Ostcaucasus.

caspiaca G. Don, (= *Lycopsis caspiaca* Lehm. = *L. picta* Hohenack. = *Onosma caspiaca* W. excl. syn. Pall.), caspische, ⊙. f. Gegend d. caspisch. Meeres, Caucasus.

Colsmanniana DC. (= *Lycopsis Colsmanniana* Lehm.), Colsmann's, ♂. 4. f. ?

decurrens G. Don, (= *Lycopsis decurrens* C. A. Mey.), herablaufende, ♂. 4. f. Caucasus.

lutea Rehb., non DC. (= *Lycopsis lutea* Lam.), Taurien.
 α) *dubia* DC. (= *Anchusa dubia* Nocca, H. Ticin. = *Asperugo divaricata* Murray), β) *media* DC. (= *lutea* Fisch. et Mey. = *Lycopsis lutea* Schult. = *Oskampia trichotoma* Mch. excl. syn.), γ) *parviflora* DC. (= *Anchusa lutea* β MB. = *Lycopsis lutea* β Lehm.).

micrantha Boiss. et Reut., kleinblumige, ⊙. f. Spanien.
nigricans DC. (= *decumbens* Mch. = *Echioides nigricans* Dsf. = *Lycopsis nigricans* Hffg. et Lk. = *L. ? vesicaria* L. spec.).

obtusifolia R. et S. (= *Lycopsis obtusifolia* W., p. 484).
picta Fisch. et Mey. (= *Anchusa picta* MB. = *Lycopsis picta* Lehm.). Astrachan, Oestl. Iberien.

pulla DC. (= *Anchusa tinctoria* Pall., non L. = *A. pulla* MB. = *Lycopsis pulla* L. = *L. vesicaria* Hornem. non L.), β) *ochroleuca* DC.

rosea Lk., Fisch. et Mey. (= *versicolor* Sweet, = *Anchusa latifolia* Lehm. = *A. versicolor* Stev. = *A. rosea* MB. = *Echioides grandiflora* Dsf., H. Par. = *Lycopsis rosea* Lehm.).

Viviani A. DC. (= *Anchusa ventricosa* Vivian. excl. syn.), Viviani's, ⊙. f. Nordafrika.

violacea DC. (= *Lycopsis vesicaria* L. = *Lithospermum vesicarium* Loisel.)

Zweifelhafte:

alba DC. (= *Echioides alba* Poir.), ⊙. Südfrankreich.
ciliata R. et S. (= *Lycopsis ciliata* W.), Orient.

rubra Steud. (= *Echioides rubra* Dsf.), ⊙. f. Italien.

lutea DC., v. *Alkanna lutea* Nachlese.

Nordmannia orientalis Hort. (= *cordifolia* et *cordata* Hort.), v. *Trachystemon orientale*.

Noronhia Stadtm. msc., Pet. Th. (= *Noronhea* Boj. = *Binia* Noronh.), (Ferdinand de Noronha, spanischer Naturforscher u. Reisender †), II. 1., Sapotaceae-Oleinae (Oleaceae).

emarginata Poir. (= *chartacea* Stadtm. msc. = *N. Binia* Pet. Th., R. et S. = *Olea emarginata* Lam., p. 556, = *Linociera flavicans* Vahl, = *Notelaea flavicans* Dietr. = *Thouinia flavida* Willem.), ausgerandete, ⚭. w. Madagascar¹⁾.

cernua G. Don, v. *Olea cernua*, p. 556.

1) „Arbor madagascariensis, in patria triginta pedalis, in insula Mauritiï ob drupae carnem edulem sub nomine Ponay des

- Noryska chinensis* Spach, v. *Hypericum monogynum*.
- Nothochlaena** RBr., Wolfarn.
- Eckloniana* Kunze, p. 550.
- inaequalis* Kunze, ungleicher, 4. w. Südafrika.
- nivea* Desv. (= *Acrostichum albidulum* Sw. = *Pteris nivea* Lam.).
- pulchella* Kunze, schöner, 4. w. t. Missouri.
- pumila* Lk. H. Berol., niedriger, 4. w. ?
- rufa* Presl, (= *Cheilanthes ferruginea* W., p. 187), braunrother, 4. w. Peru.
- sericea* H. Angl., seidenhaariger, 4. w. ? Südamerika.
- sulcata* Lk., gefurchter, 4. w. Südchina.
- tenera* Hook., Gill.
- cordata* Desv., *siuuata* Kaulf., v. *Ceterach cordatum* s. *Gymnogramme cordata* et *G. sinuata*, p. 277, II.
- Nothoscordum** Kunth, Zartlauch (unächter Lauch), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
- evosmum* Kunth, (= *Allium evosmum* Lk. et Otto, p. 30, = *nudicaule* Lehm.), gutriechender, 4. Zw. k. Südbrasilien.
- flavescens* Kunth, (= *Allium flavescens* Poepp., non Bess.), hellgelblicher, 4. Zw. k. Chili.
- fragrans* Kunth, (= *Allium fragrans* Vent., p. 30), β) *gracile* (Dryandr.), δ) *nepalense* (Bot. reg.). Virginien, Carolina, Mexico, Africa, Nepal.
- ornithogaloides* Kunth, (= *Allium ornithogaloides* Bosc), vogelmilchähnlicher, 4. Zw. f. Nordamerika.
- ? *Poiretii* Kunth, (= *Ornithogalum bonariense* P. = *O. spathaceum* Poir. = ? *Gagea bonariensis* R. et S.), p. 251, II.
- striatellum* Kunth, (= *Allium striatellum* Lindl., p. 31, = *Ornithogalum gramineum* Sims).
- striatum* Kunth, (= *Allium striatum* Jacq., p. 31, = *A. canadense* Mchx.).
- Notoceras** RBr., Hornschote.
- cardaminaefolium* DC. (= *Andrzeiowskya Cardamine* Rehb. = *Lepidium cornutum* Sibth., Sm.), Schaumkrautblättrige, \odot . f. Kleinasien, Griechenland.
- Notylia** Lindl., Schwielenorche.
- guianensis* ? Lindl., Makoy, guianische, 4. w. Guiana.
- laxiflora* Hort., lockerblumige, 4. w. Südamerika.
- incurva* Lindl., β) *angustifolia*.
- sagittifera* Lk., Kl., Otto, pfeilförmige, 4. w. Caracas.
- Nuphar** Sm. (= *Nenuphar* Hayne), Seenixe (Nixen-mohn).
- Advena* Ait. (= *Nymphaea advena* Ait ed. 1. = *N. arifolia* Salisb.).
- japonicum* DC. (= *Nymphaea lutea* Thbg., non L.), japanische, 4. Wa. k. Japan.
- intermedium* Ledeb., mittlere, 4. Wa. f. Altaisch. Sibirien.
- pumilum* DC. (= *minimum* Sm. = *Nymphaea lutea* β *pumila* Timm. (β *minima* W.).
- sagittae-folium* Pursh, (= *longifolium* Sm.).
- Nuttallia** Bart., Hook., Nuttallie.
- grandiflora* Paxton, grofsblumige, 4. f. b. Nordamerika.

Indes culta.“ Endl. Catalogus horti academ. Vindobonensis I. p. 463. Desgl. Bojer Cat. h. maurit. p. 202, Hook. bot. misc. II. p. 167 (t. 88), DeCandolle prodr. s. n. r. v. Vol. VIII. p. 298.

Nuxia Commers., Lam., Nuxie, IV. 1., Personatae-Antirrhineae (Scrophulariaceae).

I. Genuina.

floribunda Benth., blüthenreiche, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.
verticillata Lam. (= *Aegiphila Nuxia* W. = *Psiloxylon mauritianum* Pet. Th.), wirtelblättrige, ♀. ♀. t. Mauritius.

II. Chilianthus Burch., A. DC.

dysophylla A. DC. (Benth.), filzigblättrige, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.
saligna Benth. (= *C. arboreus* A. DC. = *C. oleraceus* Burch. = *Callicarpa paniculata* Lam. = *Buddlea salicifolia* Jacq. = *B. saligna* W. Enum.), weidenähnliche, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Nuytsia floribunda RBr., v. *Loranthus floribundus*, p. 477.

Nyctago Roy., Juss., v. *Mirabilis*, p. 526 et 411, II.
Nyctanthes acuminata Gmel., v. *Tabernaemontana divaricata*, *elongata* L., *glauca* L., *grandiflora* Lour., *hirsuta* L. (= *pubescens* Retz), *Sambac* L. (= *Goa Hort.*), *scandens* Retz, *undulata* L. (= *multiflora* Burm.), v. *Jasminum elongatum*, *glaucum*, *arborescens*, *hirsutum*, *Sambac*, *scandens*, *undulatum*, p. 431 et p. 329, II.

Nycterinia D. Don, Nachtlarvler.

africana Don, (= *Erinus africanus* L. = *Zaluzianskya villosa* Schm.), afrikanischer, ☉. m. f. Cap d. g. H.
capensis Benth. (= *Erinus capensis* L. mant. = *E. aethiopicus* Thbg.), capischer, ☉. ♂. m. f. k. Cap der guten Hoffnung.

divaricata Benth. (= *Manulea divaricata* Thbg.), ausgespreizter, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

lychnidea Dou, (= ? *Erinus lychnidea* L. = *E. gracilis* Lehm.).

maritima Benth. (= *Erinus maritimus* L. fil., Thbg.), meerstrandliebender, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

natalensis Benth., natalischer, ☉. ♀. m. f. k. Cap d. g. H.

selaginoides Benth. (= *Erinus selaginoides* Thbg.), grufskrautähnlicher, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

villosa Benth. (= *Erinus villosus* Thbg.), zottiger, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

fragrans D. Don, *tristis* D. Don, v. *Lyperia fragrans et tristis*, p. 378, II.

Nycterium Vent.

cornutum Lk. (= *cardaminaefolium* Vent. = *Solanum cornutum* Lam. = *S. heterandrum* Juss.).

heterandrum * (= *lobatum* Sweet, = *luteum* Torr. = *Androcera lobata* Nutt. = *Solanum heterandrum* Pursh).

Nymphaea T., L., Sm., Seerose.

biradiata Sommerauer, zweistrahlige, 4. Wa. f. Deutschland (Steyerm.).

blanda Meyer, (= *glandulifera* Rodsch).

edulis DC. (= *Coteka* Roxb. = *esculenta* Roxb. = *Castalia edulis* Salisb.).

pauciradiata Bunge, (= *alba* Patrin), wenigstahlige, 4. Wa. f. Sibirien.

pygmaea Ait. (= *tetragona* Georgi).

Rudgeana Meyer, (= *ampla* β DC.), Rudge's, 4. Wa. w. Surinam.

N. Amazonum Mart., Zuccar., *lasiophylla* Mart., Zuccar,

Nymphaea

speciosa Mart., Zuccar., in Brasilien heimisch, scheinen noch nicht eingeführt. Desgl. *gracilis* Zuccar., *mexicana* Zuccar., in Mexico heimisch, *Bashiniana*, (*Basuiniana*) Turcz. Baical, Dahurien.

Nymphanthus Nuriri Lour., v. *Phyllanthus Nuriri*, p. 620.

Nymphaerodia exaltata, tuberosa Hort., v. *Aspidium* Sect. IV., p. 49, II.

Nymphoides europaea Fisch., v. *Limnanthemum nymphoides*, p. 360, II.

Nymphosanthus vulgaris Rich., v. *Nymphaea lutea*.

Nyssa L., Tupelobaum.

angulosa Poir. (= *denticulata* Ait. var.? Poir.), kantiger, f. f. b. Nordamerika.

aquatica L. (= *biflora* Mchx. = *caroliniana* Poir. = *integrifolia* Ait. = ? *sylvatica* Marsh.).

glauca Dsf. (= *villosa* Mchx. var. P.), blaugrüner, f. f. b. Nordamerika.

montana G. fil., Berg-T., f. b. Nordamerika.

sylvatica Lodd., Wald-T., f. f. b. Nordamerika.

tomentosa Mchx., W. (= *denticulata* Ait. var. Poir. = *grandidentata* Mchx.).

villosa Mchx. (= *canadensis* Poir. = *montana* Hort. = *multiflora* Walt., Wangenh.).

Obaejaca sylvatica Cass., *viscosa* Cass., v. *Senecio sylvaticus et viscosus*, p. 746.

Oberonia Lindl., Oberonie.

brevifolia Lindl. (= *Cymbidium equitans* Sw. = *Epidendrum equitans* Forst. = *Pleurothallis disticha* Rich.), kurzblättrige, 4. w. Gesellschaftsinseln, Mascarenas.

iridifolia Lindl. (= *Cymbidium iridifolium* Roxb. = *Malaxis ensiformis* Sm.), Schwertelblättrige, 4. w. Ostindien.

Myosuros Lindl. (= *Dendrobium Myosuros* Sw. = *Epidendrum Myosuros* Forst.), mäuseschwanzähnliche, 4. w. Gesellschaftsinseln, Ostindien.

Obione portulacoides Moq. Tand., v. *Halimus portulacoides*, *O. sibirica* Auct. (= *muricata* G.), v. *Atriplex sibirica*.

Ochna arborea Burch., *atropurpurea* DC., v. *Diporidium arboreum et atropurpureum*, p. 206, II.

Ochradenus Delile, Beerenresede, XI. III., Resedaceae.

baccatus Delile, aegyptische, ♂. f. k. Aegypten.

Ochranthe Lindl., Hypericaceae Lindl., Saxifrageae Cunoniaceae Meisn.

arguta Lindl., f. f. China. (Ob eingeführt?)

Ochrosia Juss., Bleichholz.

borbonica Juss. (= *Cerbera borbonica* Speg. = *C. parviflora* Forst. = *Diderota amphicarpa* Commers. = *Ophioxylon Ochrosia* P. = *Rauwolfia striata* Poir.).

maculata Jacq. (= *Cerbera maculata* W. = *C. undulata* Andr.), geflecktes, f. w. Mascarenas.

elliptica LaBill., v. *Cerbera Odollam*, p. 182 et p. 133, II.

Ocimum T. (= *Ocimum* Auct.), Basilienkraut.

atrovirens Hort. Kew., immergrünes, f. w. ?

Basilicum L., a) *pilosum* W. Enum., Benth. (= *ciliatum* Hornem, = *hispidum* Lam. = *minimum* Burm.,

Ocimum

non L.), β) anisatum Hortul., γ) glabratum Benth. (= *caryophyllatum* Roxb. = *integerrimum* W. = *lanceolatum* Schum.), δ) majus Hortul., ϵ) album L. (= *americanum* Jacq. = *laxum* Vahl hrb.), ζ) difforme Benth. (= *bullatum* Lam. = *cochleatum* H. Par. = *fimbriatum* Hortul. = *maximum* Hortul. = *pellatum* Hortul. = *scutellarioides crispum* Burm., non L. = *urticaefolium* Hort., non Roth), η) densiflorum Benth. (= *Barrelieri* Roth), θ) purpurascens Benth. (= ? *medium* Mill. = *nigrum* Thouin), ι) thyrsoflorum L. mant., Benth.

Bojeri Benth. (= ? *cordifolium* Bojer), Bojer's, f. w. Madagascar.

canum Sims, (= *album* Roxb. = *americanum* L. = *hispidulum* Schum. = *incanescens* Mart. = *stamineum* Sims), \odot . f. w. China, Ostindien, tropisches Afrika.

carnosum Lk., Otto, (= *Lumnitzera carnosum* Spgl.), fleischiges, f. w. Brasilien, Neuspanien.

citriodorum Visian. H. Patav., citronduftendes, f. w. Nubien.

diffusum Benth., weitschweifiges, f. w. Ostindien.

grandiflorum L'Her. (= *abyssinicum* Dsf. = *filamentosum* Forsk.).

gratissimum L. (= *frutescens* Mill. = *petiolare* Lam. = *zeylanicum* Burm. ex parte).

graveolens Hort., starkriechendes, \odot . m. f. ?

mæcrostachyum Poir., großsähriges, f. w. Ostindien.

micranthum W. Enum. (= *americanum* Auct. = *frutescens* Sieb. herb. = *montanum* Hook. = *pellatum* Hortul. = *pubescens* Mill.), kleinblumiges, \odot . f. w. Südamerika.

sanctum L. (= *frutescens* Burm. = *hirsutum* Benth. = *inodorum* Burm. = *monachorum* L. = *scutellarioides* W. herb. = *tenuiflorum* Auct., ? non L. = *tomentosum* Lam. = *villosum* Roxb. = *zeylanicum* Burm. ex parte. Nach Endlicher auch: = *ciliatum* Hornem. = *hispidum* Lam. = *pilosum* W. E. = *Lumnitzera tenuiflora* Spgl. = *Plectranthus monachorum* Spgl.), \odot . f. w. Ostindien Java.

Selloi Benth., Sellow's, \odot . f. w. Brasilien.

suave W. (= *gratissimum* Lam., non L. = *holosericeum* Hort. Breit. = *urticaefolium* Roth, = *villosum* Weinm., non Roxb. = *zeylanicum* Dsf. Hort. Par.), Madagasc.

viride W. (= *febrifugum* Lindl. = *heptodon* P. Beauv. = *viridiflorum* Roth).

asperum Roth, *scutellarioides* L. (= *pellatum* Schwägr.), v. *Coleus barbatus*, p. 211 et *C. scutellarioides*, p. 153, II., *capitatum* Roth, (= *capitelatum* L. = *cephalotes* Hamilt.), v. *Acrocephalus capitatus*, p. 16, *chinense* Hort., *Coetsa* Spgl., *densiflorum* Roth, *mappurensis* Roth, (= *molle* Ait.), *punctatum* L., non Blume, *ternifolium* Spgl., v. *Plectranthus nudiflorus*, *Coetsa*, *rugosus*, *cordifolius*, *punctatus*, *ternifolius*, p. 634, *congestum* Spgl. (= *polycladon* Lk.), *polystachyum* L. (= *tenuiflorum* Burm.), v. *Moschosma ocimoides* et *polystachyum*, p. 532 et p. 421, II., *menthoides* Burm., L. fil. (= *prostratum* L.), v. *Geniosporum prostratum*, p. 257, II., *frutescens* L., v. *Perilla ocimoides*,

Ocimum

p. 607, *thymiflorum* Roth, v. *Ortosiphon glabratus*.
Hiernach p. 553 zu ergänzen.

Ocotea Aubl., H. B. K. (? guianischer Name), IX. 1., Laurineae.

guianensis Aubl. (= *Laurus Ocotea* Rich. = *L. surinamensis* Sw. = *Nectandra bijuga* Rottb. = *Persea surinamensis* Speg. = *Psychotria nutans* Sieb. martin.), guianische, ⚥. w. Guiana, Martinique.

puberula N. E. (= *O. Maximilanea* Mart. = *Strychnodaphne puberula* N. E., β *Laurus crassifolia* Poir. = *L. puberula* Rich. = *Persea crassifolia* Speg. = *P. Richardiana* Schltdl.), feinhaarige, ⚥. w. Süd-am. *turbacensis* Auct., non H. B. K., v. *Oreodaphne exaltata*. *Octadenia libyca* RBr., v. Koniga libyca, p. 336, II. *Octogonia glabella* Kl., v. *Simocheilus glabellus*, p. 885.

Octomeria RBr., Achttheilorche.

Baueri Lindl., Bauer's, 4. w. Ostindien.

gracilis Lindl.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Brasilien.

lancifolia ? Lindl., lanzettblättrige, 4. w. Südamerika.

Loddigesii ? Lindl., Loddiges's, 4. w. Südamerika.

teretifolia Batem. (= *gracilis* Lodd., non Lindl.).

tridentata Lindl., dreizählige, 4. w. Demerara.

truncata Hffg., abgestutzte, 4. w. Brasilien.

convallarioides Wall. (= *spicata* D. Don), *excavata* Wall., *flava* Wall. (= *pubescens* Speg.), *rosea* Speg., *stellata* Speg., v. *Eria convallarioides*, *excavata*, *pubescens*, *rosea* et *stellata*, p. 293 et p. 228, II.

Octopera Bergiana D. Don, v. *Erica Bergiana*.

Odontadenia Benth., Zahnblume, V. II., Contortae-Apocynae.

speciosa Benth., prächtige, ⚥. w. Guiana, Cayenne.

Odontarrhena C. A. Mey., alpestris Endl., Marschalliana C. A. Mey., microphylla C. A. Mey., muralis Endl., obovata C. A. Mey., obtusifolia C. A. Mey., tortuosa C. A. Mey., v. Alyssum, Sect. III., p. 28, II. et p. 41.**Odontites** Hall., P., Zahntrost.

Bocconi Walp. (= *Euphrasia Bocconi* Gussone, = *E. frutescens* Sieb. = *Lasiopera Bocconi* Presl), Boccone's, ⚥. k. Sicilien, Creta.

glutinosa Benth. (= *Euphrasia glutinosa* MB.), klebriger, ☉. f. Iberien, Caucasus.

Holliana Benth. (= *Euphrasia Holliana* Lowe, = *Bartsia scordifolia* Steud. = *Trixago scordifolia* Rchb.), Holl's, ☉. f. Madeira.

lanceolata Rchb. (= *Euphrasia lanceolata* Gaud.), lanzettlicher, ☉. f. Savoyen, Süd-Ost-Frankreich.

lutea Rchb. (= *linifolia* Rchb., G. Don, = *Euphrasia lutea* L. = *E. linifolia* L. = *E. Coris* Crtz.).

purpurea G. Don, (= *Euphrasia purpurea* Dsf. = *E. squarrosa* Salzm.), purpurfarbiger, ☉. f. Nordafrika, Südspanien.

rubra P. (= *vulgaris* Stev. = *Euphrasia Odontites* L. = *E. serotina* Lam. et *verna* Bell. = *Bartsia Odontites* Huds.), α) *verna* Rchb., β) *serotina* Rchb.

viscosa Rchb. (= *Euphrasia viscosa* L.), schmieriger, ☉. f. Frankreich, Spanien.

Odontites glauca Sogl., *luteola* Sogl., *semicomposita* Sogl. (= *luteola* Hoffm.), *tenuissima* Sogl., v. *Bupleurum glaucum*, *aristatum* et *Odontites*, *semicompositum*, *tenuissimum*, p. 139.

Odontoglossum Humb., Bonpl. K., Zahnstendel.

I. Genuinum.

apterum LaLav., flügelloser, 4. w. Mexico.

bictoniense Lindl. (= *Cyrtochilum bict.* H. belg.), bictonischer, 4. w. Mexico.

caudatum Makoy, geschwänzter, 4. w. ? Mexico.

Cervantesii LaLav., Lindl., Cervantes's, 4. w. Mexico (Oaxaca).

cirrhosum Lindl., wickelrankiger, 4. w. Peru.

Ehrenbergii Kl., Ehrenberg's, 4. w. Mexico.

elatum Makoy, hoher, 4. w. Südamerika.

grande Hort. belg., großer, 4. w. Südamerika.

laeve Lindl., glatter, 4. w. Guatemala.

Lindleyi H. belg., Lindley's, 4. w. Mexico.

maculatum LaLav., Lindl., gefleckter, 4. w. Mexico.

membranaceum ? Lindl., häutiger, 4. w. Südamerika.

Rossii Lindl., Rofs's, 4. w. Mexico.

II. Trymenium Lindl.

brevifolium Lindl., kurzblättriger, 4. w. Mexico.

citrosimum Lindl. (= *Oncidium Galeottianum* Scheidw.), citronenduftender, 4. Kn. w. Mexico.

pulchellum Batem., Lindl., schöner, 4. Kn. w. Guatimal.

Clowesii Lindl., v. *Miltonia Clowesiana*, *Insleayi* H. belg., v. *Oncidium Insleayi*.

Odontolophus cyanooides Cass., v. *Centaurea trinervia*, p. 179.

Odontonema N. E., *lucidum* N. E., v. *Justicia*, Sect. VIII^b., p. 332, II. et p. 434.

Odontotrichum Zuccar., Zahnhaar, Compositae.

cirsiifolium Zuccar., 4. Mexico. (Ob kultivirt?)

Oeceoclades Lindl., Aststendel.

falcata Lindl. = *Angraecum falcatum*, p. 869.

funalis Lindl. (= *Epidendrum funale* Sw. = *Limodorum funale* Sw.), 4. w. Jamaica.

maculata Lindl. (= *Angraecum maculatum* Lindl. = *A. monophyllum* Rich. = *A. parviflorum* Pet. Th.). Mascarenas.

paniculata Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.

Oedera L. fil., Thbg., Oedera.

latifolia Less. (= *imbricata* Lam. = *obtusifolia* Cass. = *Bupthalmum capense* L., ex parte), breitblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

prolifera L. (= ? *lanceolata* Cass. = *Bupth. cap.* L. ex parte).

Oedipachne punctata Lk., v. *Helopus punctatus*, p. 294, II.

Oedmannia lanceolata Thbg., v. *Rafnia lancea*, p. 675.

Oenanthe T., Rebendolde.

Filipendula Dumort., knollige, 4. Kn. f. Belgien.

Jordani Tenorè, Jordani's, 4. f. Neapel.

Lachenalii Gmel., β) involucrata DC.

peucedanifolia Pollich, (= *peucedanoides* Roth, = *patens* Mch.).

Phellandrium Lam. (= *aquatica* Poir.) = *Phellandrium aquaticum*, p. 614.

Oenanthe

pimpinelloides L., β) chaerophylloides Pourr., DC., γ) rapacea K. (= *Karsthia* Hacq. = *australis* Wulf.). silaifolia MB. (= *gymnorrhiza* Brignol. = *glauca* DC. H. Monsp. = *peucedanifolia* Sm., non Pollich. = *prolifera* Host, = *tenuifolia* Fröl. = *virgata* K.). virgata Poir. (= *daucifolia* Lk. herb. = *pimpinelloides* β DC. = *prolifera* Hort. = *stylosa* P.), ruthenförmige, 4. Kn. k. f. b. Nordafrika.

exaltata Thbg., *inebrians* Thbg., v. *Lichtensteinia lacera* et *inebrians*, p. 357, II., *interrupta* Thbg., v. *Annesorrhiza capensis* et *montana*, p. 37, II., *Mutellina* Lam., v. *Meum Mutellina*, p. 522, *nodiflora* Schousb., v. *Sclerosciadium humile*, *rigida* Nutt., v. *Archemora rigida*, p. 42, II.

Oenocarpus Mart., Weinfrucht.

Bacaba Mart., Bacaba, δ . w. Guiana.

regius Spgl., *Sancona* Spgl., v. *Oreodoxa regia* et *Sancona*.

Oenothera L., Nachtkerze.

acaulis Cav. (= *anisoloba* Swt., Don, = *grandiflora* R. et P.), α) cuspidata Endl. (= *O. acaulis* Lindl. = *Lavauxia cuspidata* Spach), β) taraxacifolia Swt., Endl. (= *Lavauxia mutica* Spach).

albicaulis Fras., non Pursh, (= *Nuttallii* Swt. = *Anogra Nuttalliana* Spach, = *Baumannia Nuttalliana* Spach).

biennis L. (= *Onagra biennis* et *chrysantha* Spach), β) muricata Murr., γ) grandiflora Ait. (= *suaveolens* Dsf. = *Lamarchiana* Sering.), δ) parviflora L., ϵ) cruciata Nutt., Torr. et Gray., ζ) canescens Walp., η) gauroides Hornem. (= *hirsuta* Dietr.).

bifrons Sweet, Don, (= *heterophylla* Spach).

Boothii Dougl., Hook., Booth's, δ . f. Nordamerika.

centaureifolia Steud. (= *Lavauxia centaureifolia* Spach), flockenblumenblättrige, δ . k. Montevideo.

cheiranthifolia Lindl., ? non Hornem. (= *Agassizia cheiranthifolia* Spach, = *Oenothera Agassizia* Steud.), lackblättrige, \odot . f. Chili.

chrysantha Mchx. (= *riparia* Lehm. = *Kneiffia chrysantha* Spach), goldblumige, 4. f. Nordamerika.

elata H. B. K. (= *crassipes* H. Berol. = *Onagra Kunthiana* Spach), hohe, δ . 4. k. f. b. Mexico.

β) salicifolia Dsf. (= *Onagra salicifolia* Spach).

erosa Lehm. (= *Onagra erosa* Spach, = *O. Lehmanniana* Spach), ausgebissene, \odot . f. Cap d. g. Hoffn.

fruticosa L. (= *hybrida* Mchx. = *Kneiffia floribunda* et *fruticosa* Spach), β) ambigua Nutt., Spgl. (= *canadensis* Goldie), γ) phyllopus Walp. (= *serotina* Swt., Don, = *Kneiffia maculata* Spach), δ) incana Nutt., ϵ) hirsuta Walp. (= *pilosella* Rafin.).

glauca Mchx. (*Kneiffia glauca* Spach), β) Fraseri Pursh, (= *K. Fraseri* Spach).

macrantha Sellow in hort. Dyck., großblumige, \odot . f. m. ? Südamerika.

media Lk. (= *Onagra Linkiana* Spach).

mexicana Spach, mexicanische, ? \odot . f. Texas.

micrantha Walp., non Presl, nec Hornem. (= *pinnatifida* Hort., nec H. B. K. = *Hartmannia parviflora* Spach), kleinblumige, \odot . f. ? Nordamerika.

missouriensis Sims, (= *macrocarpa* Pursh, Swt. =

Oenothera

- alata* Nutt. = *Megapterium missouriense* et *Nuttallianum* Spach).
- nocturna* Jacq. (= ? *albicans* Lam.).
- odorata* Jacq. (= *mollissima* Hook., Arn., non L. = *undulata* Ait. = *Onagra undulata* Mch.), α) *glaucescens* Ser., β) *virescens* Sering.
- pallida* Dougl., Hook. (= *Anogra Douglassiana* Spach, = *Baumannia Douglassiana* Spach).
- pinnatifida* H. B. K. (= *Hartmannia Kunthiana* Spach), fiederspaltige, \odot . ♂. f. k. Mexico.
- pumila* L. (= *gracilis* Schrad. = *Kneiffia pumila* Spach).
- Purshiana* G. Don, Steud. (= *albicaulis* Pursh, non Fras., Nutt. = *pinnatifida* Nutt., non H. B. K. = *Anogra pinnatifida* Spach, = *Baumannia pinnatifida* Spach), Pursh's, ♂. f. Nordamerika.
- rosea* Ait. (= *purpurea* Lam. = *rubra* Cav. = *Hartmannia gauroides* Spach, = *H. rosea* Sweet).
- serrulata* Nutt. (= *Calylophis Nuttallii* Spach, = *C. Drummondiana* Spach, = *Meriolix serrulata* Rafin., Walpers).
- Simsiana* Sering. (= *corymbosa* Sims, non Lam.), Sims's, ♂. k. Mexico.
 β) *spectabilis* Hort. (= *Onagra spectabilis* Spach).
- Spachiana* Torr. et Gr., Spach's, \odot . f. Texas.
- stricta* Ledeb. (= *mutabilis* Dsf. = *striata* Sering.). Chili.
- tetraptera* Cav. (= *capensis* Hort. = *dubia* Hort. = *mutabilis* P. = *Hartmannia macrantha* Spach).
- triloba* Nutt. (= *rhizocarpa* Spgl. = *Lavauxia Nuttalliana* Spach).
- valida* Kunze, starkbewehrte, ♂. f. b. k. Mexico.
- Unbestimmtere ohne Angabe des Vaterlandes:
- crispa* Schult., *eminens* Tausch, 4., *globularis* Hort., Chels. ♂., *holosericea* Tausch, *maculata* H. angl., *micans* Tausch, *odoratissima* Tausch, 4. ♀., *subincana* Hort.
- Hinsichtl. der übrigen siehe die Gattungen *Boisduvalia*, p. 72, II., *Godetia*, p. 269, II. et p. 363, et *Sphaerostigma*, p. 777.
- Oglifa arvensis* Cass., v. *Filago arvensis*.
- Ohlendorfia procumbens* Lehm., v. *Aptosimum procumbens* Burch., p. 40, II.
- Oileus* Haw., v. *Narcissus*, Sect. XII.
- Okenia (Okea) speciosa* Dietr., v. *Adenandra umbellata*, p. 18.
- Ola x** L., *scandens* Roxb. (= *Bodor* Hamilt. = ? *obtusa* Blume, = *O. Psittacorum* Vahl, = *Roxburghia baccata* Koen.).
- Olbia* Medic., *canescens* Mch., *deflexa* Mch., *hastata* Medic., *heterophylla* Mch. (= *thuringiaca* Medic.), *micans* Mch., *triloba* Medic., v. *Lavatera maritima*, *punctata*, *Olbia*, *thuringiaca*, *micans*, *triloba*, p. 450 et p. 346, II.
- Oldenlandia biflora* Lam., *corymbosa* Lam. etc., v. *Hedyotis Burmanniana*, *corymbosa* etc., p. 286, II.
- Olea** T., Oelbaum.
- capensis* L. (= *buxifolia* Mill.).
- chrysophylla* Lam. (= *ferruginea* Hort.). Mascar., Abyss.

Olea

- cuspidata* Wall. (= *ferruginea* Royle, = *asiatica* Dsf.), feinspitziger, ⚥. t. w. Ostindien.
exasperata Jacq., wenigrauer, ⚥. k. Cap d. g. Hoffn.
europaea L., α) *Oleaster* Lk., Hffg., β) *sativa* Hffg., Lk.
floribunda Benth., blüthenreicher, ⚥. t. k. Neuirland.
glandulifera Wall. (= *glandulosa* Dsf.), drüsiger, ⚥. t. Nepal.
undulata Jacq. (= *capensis* β Jacq. = *laurifolia* Lam.), β ? *intermedia* Tausch.
verrucosa Lk. (= *europaea* Thbg. = *europaea* β *verrucosa* W. = *africana* Mill. = *sativa verrucosa* R. et S.).

Nicht hinlänglich bekannte:

- microcarpa* Vahl, (= *rigida* H. Cels. = *Phillyrea indica* Lour.), kleinfrüchtiger, ⚥. t. Cochinchina.
nigra Lois., *speciosa* Hort. Vaterland unbekannt.
clavata G. Don, v. *Visiania paniculata*, *divaricata* Dsf., v. *Phillyrea divaricata*, *emarginata* Lam., Vahl, v. *Noronhia emarginata*, *excelsa* Ait. (= ? *maderensis* H. Cels.), v. *Picconia excelsa*, *fragrans* Thbg., v. *Osmanthus fragrans*.

- Olearia* Mch., *dentata* Mch. (= *tomentosa* DC.), *phlogopappa* DC., *quercifolia* DC., *rotundifolia* DC., *stellulata* DC., v. Aster, Sect. XIII.

- Olfersia* Radd., (*Olfers*, Consul in Rio Janeiro), XXIV. 1., Pterioideae.

- cervina* Presl, (= *Polybotrya cervina* Kaulf., p. 641).
conformis Presl, (= *Acrostichum conforme* Sw.), eiförmige, 4. w. Cap d. g. H., Ostindien, Java.
corcovadensis Raddi, (= *Polybotrya Raddiana* Kaulf., Lk., p. 641, = *Acrostichum Olfersia* Endl.). Brasilien (Corcovado).

Oligocarpha nereifolia Cass., v. *Brachylaena nereifolia*, p. 129.

Oligolepis indica Cass., v. *Sphaeranthus indicus*, p. 777.

- Oligomeris* Cambess., *Asterresede*, XI. III., Resedaceae.

- glaucescens* Cambess. (= *Ellimia ruderalis* Nutt. = *Reseda dipetala* Ait., p. 680, = *R. subulata* Delile, = *Resedella dipetala* (= *subulata*) Webb et Berthel), blaugrünliche, \odot . f. Aegypten, Canarische Inseln, Californien.

Oligosporus campestris Cass., *condimentarius* Cass., *Marschallianus* Less., *mexicanus* Less., *monospermus* Decaisne, *scoparius* Less., v. *Artemisia campestris*, *Dracunculus*, *inodora*, *mexicana*, *Delileana*, *scoparia*, p. 81—83.

- Olinia* Thbg., *Olinie*.

acuminata Lk., Kl., Otto, zugespitzte, ⚥. k. t. Cap der guten Hoffnung.

capensis Lk., Kl., Otto, capische, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

- Oliveria* decumbens Vent. (= *orientalis* DC.).

Olympia glauca Spach, v. *Hypericum olympicum*.

Olynthia disticha Lindl., v. *Eugenia dist.*, p. 236, II.

Omalanthus Grah., v. *Homalantes*, p. 304, II.

- Ommatodium* Lindl., *Augenstendel*, XX. 1., Orchideae.

Volucris Lindl. (= *Ophrys triphylla* Thbg. = *O. Volucris* L. = *Pterygodium Volucris* Sw., p. 666).

Omphalodes T., Venusnabel.

amplexicaulis Lehm. (= *brassicaefolia* Boiss., G. Don, = *lusitanica* Schrk.).

cappadocica DC. (= *cornifolia* Lehm. = *Cynoglossum cappadocicum* W. = *C. Omphalodes* β Lam. = *Picotia cappadocica* R. et S.), cappadocischer, 4. f. Klein-Asien.

cristata A. DC., non Schrk. (= *Echinosperrnum cristatum* Bunge), kammsaamiger, \odot . ♂. f. Altaisch. Sibirien.

linifolia Mch. (= *Cynoglossum linifolium* L.), β) *obtusata* DC., γ) *coerulescens* (Req.).

litoralis Lehm. (= *Cynoglossum lateriflorum* Aubr. = *C. linifolium* L. var. DC. fl. fr. suppl. excl. synonym. = *C. litorale* Spgl. = *Picotia litoralis* R. et S.).

longiflora A. DC. (= *Cynoglossum longiflorum* Benth., Lindl.), langblumiger, 4. k. Cachemyre, Nordwestl. Indien.

myosotoides Schk., G. Don, (= *Cynoglossum lithospermifolium* Lam. = *C. myosotoides* LaBill. = *Picotia lithospermifolia* R. et S.).

verna Mch. (= *repens* Schrk. = *Cynoglossum Omphalodes* L. = *Picotia verna* R. et S.).

cristata Schrk., v. *Mattia cristata*, p. 389, II., *sempervirens* D. Don, v. *Caryolopha sempervirens*, p. 123, II.

Onagra T., *biennis* Mch., *chrysantha* Spach etc., v. *Oenothera biennis* etc., p. 554 et p. 445, II.

Oncidium Sw., Höckerstendel.

acaule Hffg., stengelloser, 4. w. Brasilien.

altissimum Sm. (= *Cymbidium altissimum* Sw. = *Epidendrum altissimum* Jacq.), β) *Baueri* Lindl.

bicallosum Lindl. (= ? *pachyphyllum* Lindl.), zweischwieliger, 4. w. Guatemala.

bifolium Sims, b) *pallidum* Booth.

bicolor Lindl., zweifarbiger, 4. w. Maynas.

brachyphyllum ? Lindl., kurzblättriger, 4. w. Südamer. *Cavendishianum* Batem. (= *pachyphyllum* Hort.).

Cebolleta Sw. (= *juncifolium* Lindl. = *Cymbidium juncifolium* W. = *Epidendrum Cebolleta* Jacq. = *E. juncifolium* L.).

celsissimum Hffg. (= *altissimum* H. Berol.), allerhöchster, 4. w. Brasilien.

ciliolatum Hffg., feinwimperiger, 4. w. Brasilien.

concolor Lindl., einfärbiger, 4. w. Brasilien.

crispum Lodd., b) *marginatum* van Houtte.

divaricatum Lindl., b) *cupreum* Makoy.

echinatum H. B. K., igelstacheliger, 4. w. Mexico.

fimbriatum Lodd., gefranzter, 4. w. Brasilien.

funereum LaLlav. et Lex., riemenähnlicher, 4. w. Mexico.

Ghiesbreghtii v. Hutte, Ghiesbreght's, 4. w. Südamer.

Henchmanni ? Lindl., Henchmann's 4. w. Südamerika.

Huntianum Hook., Hunt's, 4. w. Brasilien.

hyalinobulbum LaLlav., durchscheinendknolliger, 4. w. Mexico.

incurvum H. belg., einwärtsgekrümmter, 4. w. Südamer.

inophyllum ? Lindl., faserblättriger, 4. w. Südamerika.

intermedium Knowl. et Westc., mittlerer, 4. w. Cuba.

Insleayi Barker, Lindl., Insleay's, 4. w. Mexico.

leucostomum Hffg., weißmundiger, 4. w. Brasilien.

luridum Lindl. (= *cuneatum* Lindl.).

Oncidium

- macranthum* Lindl., großblumiger, 4. w. Quayaquil.
microchilon Baten. (= *Funkii*, = *eriopterum*, = *macrophyllum* Hort.), kleinlippiger, 4. w. Guatemala.
nubigenum Lindl., wolkenähnlicher, 4. w. Peru.
nudum Lindl., nackter, 4. w. Caracas.
obovatum Presl, verkehrteiförmiger, 4. w. Mexico.
onustum Lindl., überladener, 4. w. Südamerika.
pachyphyllum Lindl., dickblättriger, 4. w. Mexico.
panduriferum H. B. K., geigenträger, 4. w. Neugranada.
pantherinum Hffg., pantherfleckiger, 4. w. Brasilien.
Papilio Lindl., a) minus Hort., b) majus Hort., c) pallidum Hort., d) superbum Hort.
pentaspsilum Hffg. (= *Harrisonianum* H. Cels.), fünf-fleckiger, 4. w. ?Südamerika.
phymatochilon Lindl., geschwollenlippiger, 4. w. Südamerika.
pictum H. B. K. (= ? *Baueri* Lindl. = *altissimum* Sw. var.?), bemalter, 4. w. Neugranada.
Pinelianum H. Cels. et H. belg., Pineli's, 4. w. Südamerika.
polychromum Scheidw., vielfarbiger, 4. w. Brasilien.
puberum Sogl. (= *pubes* Lindl. = *bicornutum* Hook.).
reflexum Lindl., zurückgebogener, 4. w. Mexico.
sanguineum Lindl. (= *Huntianum* Hort.), blutfarbiger, 4. w. LaGuyara.
serpens Lindl., schlangenähnlicher, 4. w. Peru.
sphacelatum Lindl., brandfleckiger, 4. w. Südamerika.
spilopterum Lindl., (= *gallopavinum* Morren), fleckflügeliger, 4. w. Mexico.
stramineum Baten. (= *Columbae* H. belg.).
subciliatum Hffg., wenigwimperiger, 4. w. Brasilien.
Suttoni Lindl., Sutton's, 4. w. Südamerika.
tetrapetalum W. (= *quadripetalum* Sw. = *Cymbidium tetrapetalum* Sw. = *Epidendrum tetrapetalum* Jacq.).
tigrinum LaLav., getigelter, 4. w. Mexico.
tricolor Hook., dreifarbiger, 4. w. Jamaika.
trulliferum ?Lindl., topfträger, 4. w. Südamerika.
unicorne Lindl. (= *monoceras* Hort.), einhörniger, 4. w. Brasilien.
uniflorum Lindl., einblumiger, 4. w. Südamerika.
urophyllum Lindl., schweifblättriger, 4. w. Brasilien.
viperinum Lindl., viperscheckiger, 4. w. Paraguay.
volubile ?Lindl., windender, 4. w. Südamerika.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Handelsgärten noch folgende zum Theil wohl von H. Prof. Lindley bestimmte und in verschiedenen Gegenden Südamerikas heimisch, erwähnt:

Bondeanum, *Cepula* Hffg., *excavatum*, *longifolium*, *macropetalum*, *macropterum*, *maxilligerum*, *pergameneum*, *Philipsianum*, *punctatum*, *roseum*, *Scyurus*, *tripartitum*, *Wrayae*.

Galeottianum Scheidw., v. *Odontoglossum citrosinum*, p. 444., II.

Oncosporum Putterl. (= *Oncospermum* Hort.)¹⁾, Höckersaame, V. 1., Pittosporeae.

bicolor Putterl., zweifarbiger, h. Sch. t. k. Südwest-Neuholl.

1) Nicht zu verwechseln mit *Oncosperma* Blume, einer zierlichen Palmengattung des ostindischen Archipelagus.

Oncorrhynchus tenellus Fisch. et Mey. (= *pinna-*
tifidus Lehm.), v. *Orthocarpus australis*.

Onobroma G., Kreuzdistel.

armenium Spgl. (= *Atractylis armena* Poir. = *Car-*
thamus armenus W. = *Heteracantha armena* Don),
armenische, ☉. f. Armenien, Persien.

helenioides Spgl. (= *Carthamus helenioides* Dsf.), alant-
ähnliche, ☉. f. Nordafrika.

persicum DC. (= *armenium* var. Spgl. = *Carthamus*
persicus W.), persische, ☉. f. Persien.

Onobrychis T., Esparsette.

aequidentata D'Urv. (= *Hedysarum aequidentatum* Sibth.
et Sm.), gleichzähnlige, ☉. f. Creta, Melos.

alba Desv. (= *Hedysarum album* W. K.).

Bergeriana DC. (= *Hedysarum Bergerianum* Spgl.),
Berger's, ♀. f. Campanien.

Buxbaumiana Desv. (= *Pallasii* MB.).

conferta Desv. (= *Hedysarum confertum* MB.). Cau-
casus, Iberien, Podolien.

cornuta Desv. (= *orientalis* J. St. Hil., Spgl. = *He-*
dysarum cornutum L.), gehörnte, ♂. f. b. k. Orient
(Armenien).

Echinus DC. (= *Hedysarum Caputgalli* L. var.? DC. =
H. Echinus Poir.), igelstachelige, ☉. f. ?

Fontanesii Boiss. (= *conferta* β DC. = *Hedysarum*
confertum Dsf., non MB.), Desfontaine's, ♀. f. b. k.
Spanien, Numidien.

foveolata DC., grubige, ☉. f. Sicilien.

geminiflora Schrk., Mart., paarblumige, ☉. w. m. f.
Brasilien.

Michauxii DC. (= *circinnata* Desv.), Michaux's, ♀. f.
b. Orient.

ornata Desv. (= *Hedysarum coronatum* Poir. = *H.*
ornatum W.), zierliche, ♀. f. b. k. Galatia.

radiata MB. (= ? *circinnata* Desv. = *Hedysarum ra-*
dium Dsf. = *H. circinnatum* W.), stachelige, ♀.
f. Caucasus.

reticulata Opiz, netzförmige, ♂. f. ?

sativa Lam. (= *spicata* Mch. = *vulgaris* J. St. Hil. =
Hedysarum Onobrychis L.), b. fl. albo, β) *tanaitica*
Fisch. (= *tatarica* Fisch. = *subvillosa* DC.).

saxatilis Lam. (= *tenuifolia* Mch. = *Hedysarum mi-*
crocarpum Dufour, = *H. saxatile* L.).

supina DC. (= *Hedysarum herbaceum* Lapeyr. = *H.*
pallidum Schlchr. = *H. supinum* Vill.).

Tournefortii Desv. (= *Hedysarum Tournefortii* W.),
Tournefort's, ♀. f. b. k. Armenien.

vaginalis C. A. Mey. (= *radiata* β MB.), scheidige,
♀. f. Caucasus.

venosa Desv. (= *Hedysarum venosum* Dsf.), aderige,
♀. k. Numidien, Cypem, Persien.

Onoclea L.

obtusilobata Schk. (= *Rhagiopteris obtusiloba* Presl).

attenuata Sw., v. *Lomaria attenuata*, p. 475, *ob-*
tusilobata Angl. (= *nodulosa* Mchx.), v. *Wood-*
wardia onocleoides, p. 858, *Struthiopteris* Sw., v.
Struthiopteris germanica, p. 791.

Ononis T., Hauhechel.

alba Poir. (= *oligophylla* Tenore var.), weißer, ☉. f.
Nordafrika, Neapel.

Ononis

aspalathoides DC. (= *Anthyllis aspalathoides* Burm. = *Lotus ononoides* Desv., Lam.), Witschenähnlicher, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

β) *Lotus persicus* Desv., Burm., γ) *Cytisus hirtus* Burm.

biflora Dsf. (= *geminiflora* Lag.). Nordafrika, Spanien.

Broteriana DC. (= *lusitanica* Spgl. = *racemosa* Brot.), Brotero's, ☉. f. Estremadura.

cenisia L. (= *cristata* Mill.).

elongata Thbg., verlängerter, 4. ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

fruticosa L. (= *purpurea* Mill.).

laxiflora Dsf., lockerblumiger, 4. f. Algier, Corsica.

Masquiellieri Bertol., Masquiellieri's, ☉. f. An den warmen Porrectanaschen Bädern.

mollis Lagasca, (= ? *Desfontainii* Dufour), weicher, ☉. f. Spanien, Italien.

racemosa Thbg., traubiger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

reclinata L. (= *Cherleri* Dsf. = ? *mollis* Lagasca).

Schouwii DC., Schouw's, ☉. f. Sicilien.

serrata Forsk. (= *diffusa* Tenore, = *baetica* Clement.

= *Dehnhartii* Tenore), sägezähniger, ☉. f. Aegypten, Griechenland, Italien, Spanien.

tridentata L. (= *crassifolia* Dufour).

Onopordon V., Krebsdistel, (Eselsdistel).

Acanthium L., β? *macroacanthum* Schult., γ) *viride* Dsf., δ) *platyphyllum* Endl.

elongatum Lam. (= *ambiguum* Fresen. = *arabicum* Bové, = *illyricum* L. = *tomentosum* Mch.), verlängerte, ♂. f. Südeuropa, Arabien.

heteracanthum C. A. Mey., verschiedenkantige, ♂. f. Caucasus (Talüsch).

orientale Mill., morgenländische, ♂. f. Syrien.

pyrenaicum DC. (= *acaule* DC., ? L. = *uniflorum* Cav. var. ? Poir.), pyrenäische, ♂. f. Pyrenäen.

virens DC. (= *elatum* Sibth., Sm. = *viscosum* Hornem.). β) *tauricum* W.

Unbestimmtere: *intermedium* Schult., *maximum* Schult.

Onoseris W., Eselskraut.

adpressa Less. (= *Centroclinium adpressum* Hook.).

integrifolia Less. (= *Centroclinium albicans* Don), ganzblättriges, ♀. t. Peru.

odorata Hook., Arn. (= *Chaetachlaena odorata* Don, = *Leyssera odorata* R. et P.), wohlriechendes, ☉. f. m. Peru.

reflexa Cass. (= *Centroclinium reflexum* Hook.), zurückgebogenes, 4. t. Peru.

salicifolia H. B. K., ♀. Vergl. p. 561 (mit Ausschluss des Synonyms).

Onosma L., Lotwurz.

calycinum Stev., großkelchige, ♂. 4. f. Taurien.

echinatum Dsf., igelstachelige, ♂. k. Nordafrika, Syrien, Nordpersien.

echioides L. (= *Tournefortii* Griseb. = *Gmelini* Ledeb.), β) Sibthorpi DC. (= *echioides* Sibth.), γ) helveticum DC. (= *echioides* Gaud. = *arenarium* Rchb.), δ)

arenarium W. K. Ost-, Mittel- u. Westeuropa, Caucasus, Sibirien, Syrien, Soongaria, Ostindien.

frutescens Lam., strauchige, ♀. k. Syrien.

microcarpum Steven, kleinfrüchtige, ♂. 4. f. Caucasus.

Onosma

montanum Sibth. et Sm. (= *angustifolium* Lehm. = *erectum* Sibth., Sm. = *canescens* Presl, = *cinereum* Sieb.), bergliebende, ♂. 4. f. b. Schweiz, Wallis, Italien, Dalmatien, Griechenland.

rupestre MB. (= *tenuiflorum* W.).

rostellatum Lehm. (= ? *setigerum* Clarke, Spgl.), geschnäbelte, 4. ♀. k. Kleinasien.

sericeum W., seidenhaarige, 4. ♀. f. b. Caucasus, Kleinasien, Persien.

simplicissimum L. (= *simplex* G. = *sibiricum* Lam.).
β) *suffruticosum* Schrk.

stellulatum W. K. (= *tenuifolium* Tausch).

synantherum Fisch., Sweet, verbundenbeutelige, 4. f. b. Alt. Sibirien.

syriacum LaBill., syrische, 4. ♀. k. Syrien.

tauricum Pall. (= *stellulatum* β MB. = *orientale* Habl., non L.), taurische, ♂. 4. f. b. Taurien.

β) *brevifolium* DC. Syrien.

tinctorium MB., b) *albidum*. Taurien, Caucasus, Gegend des caspischen Meeres, Südpodolien, Ukraine.

Visianii Clementi, (= *echioides flore minore* Bess. in litt.), Visiani's, ♂. 4. f. Südpodolien, Taurien, Ukraine, Dalmatien.

Nicht hinlänglich bekannte Art:

tricrospermum Lagaca.

coeruleum W., v. *Moltkia coerulea*, p. 414, II., *divaricatum* Lehm. (= *orientale* Pall.), v. *Arnebia cornuta*, p. 45, II., *pulla* Schrk., v. *Nonnea pulla*, *saxatile* Lehm., v. *Stenosolenium saxatile*, *strigosum* H. B. K. (= *trinervium* Lehm.), v. *Onosmodium strigosum*.

Onosmodium Mchx., Eselszunge.

carolinianum DC. (= *molle* Mchx, p. 562, = *Lithospermum carolinianum* Lam. = *L. molle* Mühlb. = *Purshia mollis* Lehm.).

strigosum G. Dou, (= *Onosma strigosum* H. B. K. = *O. trinervium* Lehm., p. 563, = *Lithospermum longifolium* W. herb.).

virginianum A. DC. (= *hispidum* Mchx., p. 562, = *scabrum* R. et S. = *Lithospermum virginianum* L. *Purshia hispida* Lehm.).

Onotrophe acaulis Cass., *oleracea* Cass., *palustris* Cass., v. *Cirsium acaule*, *oleraceum*, *palustre*, p. 197 etc.

Onychium Blume, *crumenatum* Blume, *flavescens* Blume, *japonicum* Blume, *mutabile* Blume, v. *Dendrobium crumenatum*, *flavescens*, *japonicum*, *mutabile*, p. 255 et p. 195, II.

Opercularia G., Deckelkelch.

hyssopifolia Juss., ysopblättriger, ♀. k. t. Neuholland.

ligustrifolia Juss. (= *hyssopifolia* Juss. var.), ligusterblättriger, ♀. k. t. Neuholland.

umbellata G. (= *Banksiana* Schult.), v. *Pomax hirta*.

Ophioglossum T., Natterzunge.

pedunculatum Desv. (= *petiolatum* Hort. = *lusitanicum* H. Berol., non L.), langstielige, 4. t. Nord- und Südamerika.

Ophiopogon Curt., Ker, Natterzauke.

pallidus Wall., bleiche, 4. t. Ostindien.

prolifer Journ. of the hort. Soc., sprossende, 4. t. Sincapore.

Ophioscorodon magicum Wallr., *triccocum* Wallr., *ursinum* Wallr., v. *Allium magicum*, *triccocum*, *ursinum*, p. 30, 31.

Ophiostachys virginica Redout., v. *Chamaelirium carolinianum*, p. 186.

Ophioxylon *serpentinum* L. (= *trifoliatum* G.).**Ophrys** L., Ragwurz.

apifera Huds. (= *insectifera* L. var. = *rostrata* Tenore).

arachnites All., Hoffm. (= *arachnoides* Andr. = *bombylifera* Spgl. = *Arachnites fuciflora* Hoffm. = *Orchis arachnites* Scopol. = *O. fuciflora* Schrk.).

ciliata Biv. (= *Speculum* Lk., non Bertol. = *Scolopax* Tenore).

cornuta Stev. (= *bicornis* Sadl.), gehörnte, 4. Kn. f. b. k. Taurien, Dalmatien, Ungarn.

corsica Vivian., corsische, 4. Kn. k. Corsica.

fuciflora Hall. (= *apiculata* Rich. = *arachnites* Schlchr., Thom. = *crabronifera* Sebast., Mauri, = *exaltata* Tenor. = *oestriifera* Rehb., non MB.), hummelblumige, 4. Kn. f. b. k. Mittel- u. Südeuropa.

fusca Lk. (= *insectifera* ζ L. = *lutea* Bivon., Bern., non Cav.). Portugal, Nordafrika.

β) *iricolor* Dsf.

lunulata Parlotore, mondförmige, 4. Kn. f. b. k. Sicilien.

picta Lk., bemalte, 4. Kn. k. Portugal.

Scolopax Cav. (= *bombyliflora* Lk. = *insectifera* δ L. = *muscaria* Lam.).

tabanifera W. (= *bombyliflora* W. = *distoma* Biv., Bern. = *hiulca* Seb., Maur. = *insectifera biflora* Dsf. = *oestriifera* Stev., MB. = *picta* Salzm. = *pulla* Tenore), bremsenblumige, 4. Kn. f. b. k. Südeuropa, Taurien, Nordafrika.

β) *bremifera* Stev.

Tenoreana Lindl. (= *tenthredinifera* Tenore, non W.), Tenore's, 4. Kn. f. b. k. Südtalien.

tenthredinifera W. (= *grandiflora* Tenore, = *insectifera rosea* Dsf.).

vespifera W. (= *glabra* P. = *insectifera glaberrima* Dsf.), wesenblumige, 4. Kn. k. Nordafrika.

alata L. fil., v. *Pterygodium alatum*, p. 666, *cernua* L., *aestivalis* Balb. etc., v. *Spiranthes cernua*, *aestivalis* etc., p. 779, *densiflora* Dsf. (= *secundiflora* Steud.), v. *Himantoglossum secundiflorum*, p. 30, II., *liliifolia* L., *Loeselia* L., v. *Sturmia liliifolia*, *Loeselia*, p. 791, *monophyllos* L., v. *Microstylis monophylla*, p. 408, II., *paludosa* L., v. *Malaxis paludosa*, p. 489, *triphyllos* Thbg. (= *Volucris* L.), v. *Ommatodium Volucris*, p. 447, II.

Oplismenus P., B., Grannenbart (Grannich).

A. *Orthopogon* RBr.

africanus P. B. (= ? *brasiliensis* Raddi, = *sylvaticus* R. et S. = *Panicum africanum* Poir. = *P. compositum* Trin. var. d. e. f. = *P. sylvaticum* Lam.). Mascarenas, Brasilien.

Burmanni P. B. (= *albus* R. et S. = *brasiliensis* Raddi, = *bromoides* P. B. = *Humboldtianus* N. E.

Oplismenus

= *Panicum album* Poir. = *P. bromoides* Lam. = *P. Burmanni* Retz, = *P. hirtellum* Burm. = *P. lappaceum* W. herb. = *Echinochloa hirtella* Schult.).
 compositus RBr., R. et S. (= *remotus* Trin. = *Digitaria composita* W. Enum. = *Panicum compositum* L.).

dubius Kunth, (= *Echinochloa dubia* R. et S. = *Panicum dubium* Steud.), ☉. w. Coromandel.

hirtellus RBr., R. et S. (= *Echinochloa hirtella* Schult. = *Milium undulatifolium* Mch.).

lohiaceus P. B., Sogl. (= *foliaceus* P. B. = *latifolius* Haenke herb. = *Panicum loliaceum* Lam.).

undulatifolius R. et S., Kunth, Sogl. (= *Panicum Burmanni* MB. = *P. hirtellum* All., non L., Wulf. = *P. undulatifolium* Ard.).

B. *Echinochloa* PBr.

colonus H. B. K., β) *P. zonale* Guss.

echinatus Kunth, Sogl. (= *crus pavonis* H. B. K. = *Echinochloa composita* Presl, = *E. crus pavonis* Schult. = *E. echinata* P. B. = *Panicum Crus galli* L. var. ε Steud. = *P. echinatum* W. = *P. muricatum* Hornem.).

hispidulus Kunth, (= *Orth. Retzii* Sogl. = *Echinochloa hispida* Schult. = *Digitaria hispidula* W. Enum. = *Panicum Crus galli* L. var. ζ Steud. = *P. hispidulum* Retz, = *P. hispidum* Forst.).

Zu ergänzen p. 563.

Opoidia Lindl., Opoidie, V. II., Umbelliferae.

galbanifera Lindl., Galbangebende, 4. f. b. k. Persien.

Oporanthus Herb., *Clusianus* Herb., *colchiciflorus* Herb., *exiguus* Herb., *luteus* Herb. et var. *angustifolius* Herb., v. *Sternbergia Clusiana*, *colchiciflora* etc., p. 788.

Oporinia Don, autumnalis Don, DC., pratensis Less., v. Leontodon, Sect. II., p. 453.

Opsianthes gauroides Lilja, v. *Clarkia gauroides*, p. 202.

Opuntia T., v. p. 563 et Cacteeae p. 874 et 99, II.

Orbignya Mart., Endl., (A. d'Orbigny, Reisender in Südamerika), XXI. VI. (VI. I.), Palmae.

Cuci Kunth, brasilianische, 5. w. Brasilien. (Ob kult.?)

Orchidium Sw., *americanum* Steud., *arcticum* Sw., v. *Calypso americana* et *borealis*, p. 150.

Orchidocarpum Mchx., *arietinum* Mchx., *grandiflorum* Mchx., *parviflorum* Mchx., *pygmaeum* Mchx., v. *Asimina triloba*, *grandiflora* etc., p. 88.

Orchis T., L., Knabenkraut (Kukuksblume).

acuminata Dsf. (= *lactea* Poir. = *militaris* var. Poir. = *parviflora* Tenore).

cassidea MB. (= *coriophora* MB., Pall.), haubiges, 4. Kn. f. Taurien.

condensata Dsf. (= *pyramidalis* Lk.), gedrängtähriges, 4. Kn. f. b. k. Nordafrika, Italien.

cordigera Fr. (= *cruenta* Roch.), herzförmiges, 4. Kn. f. Carpathen, Nordeuropa.

foliosa Soland., non Mass., blattreiches, 4. Kn. k. Madeira.

formosa Stev. (= *mutabilis* Stev.), schönes, 4. Kn. f. Ostcaucasus.

Orchis

hybrida Boenningh. (= *fusca plur.* Auct., non Jacq. = *militaris* L. var.), Bastard-K., 4. Kn. f. Deutschl.
incarnata L. (= *latifolia* Rehb.), fleischfarbiges, 4. Kn. f. Mittel- und Nordeuropa.

α) *latifolia* Fr., non L., β) *angustifolia* Fr. (Wimm. et Grab.), c) *alba*.

latifolia L. (= *majalis* Rehb.), β) *atropurpurea* Tausch, γ) *carnea*, δ) *longebracteata* Schm., ε) *conica* Lindl. (= ? *haematodes* Rehb.).

longicornu Poir. (= *picta* Loisel.).

macra Lindl. (= *tephrosanthos* Bicheno), großes, 4. Kn. f. England.

mascula L., γ) *speciosa* Host, (= *signifera* Vest).

pallens L. (= *sulphurea* Curt.).

provincialis Balb., β) *Cyrilli* Tenore, (= *pallens* Savi, = *pauciflora* Tenore).

sambucina L., β) *rubra* Schlechr. (= *Schleicheri* Swt. = *mixta* β Retz, = *incarnata* Auct., non L.).

Simia Lam. (= *cinerea* Schrk., Schlechr. = *militaris* Sm. = *Smithii* Swt. = *tephrosantha* Vill. = *zoo-phora* Thuill.), ?β) *galeata* Lam. (= *mimusops* Thuill.).

taurica Lindl. (= *pyramidalis* MB., non L.), taurisches, 4. Kn. f. b. k. Taurien.

Traunsteinerii Saut. (= *angustifolia* Rehb. = ? *strictifolia* Opiz).

undulatifolia Bivone, (= *Simia* Lam. var. Spgl. = *tephrosanthos* β *undulatifolia* Bot. reg.).

abortiva L., v. *Limodorum abortivum*, p. 464, *albida* Sw., v. *Leucorchis albida*, p. 356, II., *alpina* L., v. *Chamorchis alpina*, p. 187, *dilatata* Pursh, (= *acuta* Banks, = *agastachys* Fisch.), *fuscescens* Pursh, (= *herbiola* RBr.), *orbiculata* Pursh, *virescens* Zollik., Gaud., v. *Platanthera dilatata*, *herbiola*, *orbiculata*, *chlorantha*, p. 633, *foliosa* Sw., v. *Bonatea foliosa*, p. 173, II., *Hostii* Trat. (= *Nicodemi* Cyril.), *odoratissima* L., *pauciflora* Fisch., *tridentata* W. (= *clavellata* Mchx.) etc., v. *Gymnadenia humilis*, *odoratissima*, *pauciflora*, *tridentata* etc., p. 370 et p. 276, II., *flexuosa* Sw. (= *undulata* Poir.), v. *Schizodium flexuosum*, *globosa* L., v. *Traunsteria globosa*, *grandiflora* Heyne, *fili-cornis* Thonn., Schum., ? *foliosa* Sw. etc., v. *Habenaria rotundifolia*, *fili-cornis*, *alata* etc., p. 373 et p. 279 et 280, II., *nigra* Sw. (= *miniata* Crtz.) et *suaveolens* Vill., v. *Nigritella angustifolia* et *suaveolens*, p. 548, *Monorchis* Crtz., Scop., All., v. *Herminium Monorchis*, *parviflora* W. (= *secundiflora* Bertol. = *densiflora* Dsf.), v. *Himantoglossum secundiflorum*, p. 301, II., *pectinata* Thbg., v. *Bartholina pectinata*, p. 114, *viridis* Sw. (= *virens* Scop.), v. *Peristylus viridis*.

Oreodaphne N. E., Felsenlorbeer, IX. 1., Laurineae.

bullata N. E. (= *Laurus bullata* Burch., p. 449, = *Quercus africana* Barrow).

cernua N. E. (= *Laurus nutans* Hornem.), übergebogener, h. w. Martinique.

coriacea N. E. (= *Laurus coriacea* Sw., p. 449).

Oreodaphne

exaltata N. E. (= *Laurus exaltata* Sw., p. 449, = *Persea exaltata* Spgl.)

foetens N. E. (= *Laurus foetens* Ait., p. 449, = *L. maderensis* Lam. = *Persea foetens* Spgl.)

Oreodoxa W., Felsenpalme, XXI. x. (VI. III.), Palmae. acuminata W., zugespitzte, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

oleracea Mart. (= *Areca oleracea* L. = *Euterpe caribaea* Spgl.), kohlgebende, $\frac{1}{2}$ w. Antillen, Caribäen.

regia H. B. K. (= *Oenocarpus regius* Spgl.), königliche, $\frac{1}{2}$ w. Cuba.

Sancona H. B. K. (= *Oenocarpus Sancona* Spgl.), Sancona-F., $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

Oreomyrrhis eriopoda Endl., v. *Caldasia eriopoda*, p. 106, II.

Oreophila apargioides Don, (= *picroides* Don), v. *Achyrophorus apargioides*, p. 7, II.

Oreoselinum Hoffm., *album* Hoffm., v. *Silaus longifolius*, *caucasicum* MB., v. *Imperatoria caucasica*, p. 315, II., *austriacum* Hoffm. (= *montanum* Hoffm. = *nigricans* Hoffm.), *Chabraei* MB. (= *podolicum* Bess.), *dahuricum* Bess., *elaphobosum* Delarb., *humile* Bess., *latifolium* MB., *legitimum* MB. (= *nigrum* Delarb.), *rablense* Hoffm. (= *elegans* Hoffm.), v. *Peucedanum austriacum*, *Chabraei*, *dahuricum*, *Cervaria*, *humile*, *latifolium*, *Oreoselinum*, *rablense*, p. 610, *pyrenaeum* Hoffm., v. *Angelica pyrenaea*, p. 60.

Orfilea Sabadilla Desf., v. *Xerophyllum Sabadilla*, p. 860.

Oribu Adans., *palmata* Auct., *sylvestris* Wender. etc., v. *Anemone palmata*, *sylvestris* etc., p. 59.

Oribasia Schreb., *officinalis* Gmel., *racemosa* Gmel., *violacea* Gmel., v. *Nonatelia officinalis*, *racemosa*, *violacea*, p. 549.

Origanum T., L., Dosten.

compactum Benth. (= *glandulosum* Salzm., non Dsf.), *dichter*, 4. $\frac{1}{2}$. Nordafrika.

heracleoticum L. (= *creticum* Sieb. = *glandulosum* Dsf. = *smyrnaeum* Sm., Sibth., non L.).

β) *parviflorum* d'Urv.

hirtum Lk., α) *genuinum* Vog., β) *prismaticum* Vog. (= *oblongatum* Lk.).

paniculatum K. (= ? *smyrnaeum* Sibth., Sm.). Süd-europa, Griechenland.

sipyleum L. (= *hybridum* Mill.).

virens Lk. et Hoffm. (= *oblongatum* Lk. = *thymiflorum* Rehb. = *viride* W. herb. = *vulgare* var. Benth., Endl.).

vulgare L., α) *vulgatissimum* Endl., β) *bracteis viridibus*, *floribus albidis* Vog., β) *prismaticum* Gaud., Endl. (= *heracleoticum* Endl., Rehb. = *creticum* L. = ? *latifolium* Mill.), β) *bracteis viridibus*, *floribus albidis* Vog. (= *macrostachyum* et *megastachyum* Lk. = *creticum* Hayne), γ) *humile* Poir., δ) *micranthum* Colla, Hortul., *orientale* Mill., *stoloniferum* Bess., *venosum* W. herb. sind ebenfalls = mit der Hauptart oder nur Varietäten.

Unbestimmtere: *punctatum* Poir., *salviaefolium* Roth, *Tragoriganum* Zuccag.

Origanum

benghalense Burm., v. *Pogostemon plectranthoides*, p. 639, *calcaratum* Juss. (= *Tournefortii* Ait.) et *Dictamnus* L., v. *Amaracus Tournefortii* et *Dictamnus*, p. 29, II., *aristatum* Walt., *flexuosum* Walt., *incanum* Walt., v. *Pycnanthemum aristatum*, *linifolium* et *incanum*, p. 668.

Hinsichtl. der übrigen s. *Majorana*, p. 381 et 382, II.

Orithyja D. Don, (= *Orythyja* Auct.), Sterntulpe, VI. 1., Coronariae-Tulipaceae.

biflora Kunth, (= *Tulipa biflora* L. suppl., p. 827).
An der Wolga, Iberien.

β) *byzantina* (Clus.), γ) *uniflora* (Schrk.).

nutans Trautv. (= *Gagea uniflora* Turcz. = *Ornithogalum uniflorum* Bess., non Laxm. = *Tulipa altaica* Bess., nec Gmel.), nickende, 4. Zw. f. Sibirien.

oxypetala D. Don, Kunth, (= *Ornithogalum oxypetalum* Ledeb. = *Tulipa heteropetala* Ledeb.), spitzkronenblättrige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

uniflora D. Don, Sweet, (= *Gagea uniflora* Schult., p. 341, = *Ornithogalum uniflorum* Laxm. = *Tulipa altaica* Gebl.), einblumige, 4. Zw. f. Altaisch. Sibirien.

Orium lanuginosum Desv., v. *Clypeola eriophora*, p. 207.

Ormiscus pendulus Spach, *tenuisiliquis* Eckl., Zeyh., v. *Heliophila pendula* et *tenuisiliqua*, p. 291, II.

Ormocarpum P. B., *senoides* DC. (= ? *cassioides* Desv.).**Ornithidium** Salisb., Vogelstendel.

parviflorum H. angl., kleinblumiger, 4. w. ? Mexico.

album Hook., v. *Camaridium album* et *ochroleucum*, p. 151 et p. 110, II.

Ornithochilus Wall., Vogellippe(orche).

fuscus Wall. (= *Aerides difforme* Wall., Lindl.), braune, 4. w. Ostindien.

Ornithogalum T., Vogelmilch.

I. *Euornithogalum*.

afrum Zucc., africanische, 4. Zw. k. Aegypten.

altissimum L. (= *giganteum* Jacq. = *Drimia altissima* Ker).

arcuatum Stev. (= *narbonense* Stev., non L.), bogenförmige, 4. Zw. f. Caucasus.

caudatum Ait. (= *corniculatum* H. Belved. = *Massoni* Gmel.), β) *foliis variegatis* R. et S.

collinum Gussone, (= *comosum* Sadl.), Hügel-V., 4. Zw. f. Sicilien, Dalmatien.

comosum L. 1)

contortum Tenore, gedrehte, 4. Zw. f. Neapel.

crenulatum Thbg. (= *unifolium* Retz, non Ker).

Ecklonii Fisch. et Mey., p. 884.

exscapum Tenore, (= *minus* Bory et Chaub. = *pauciflorum* Rafin. = ? *siculum* Ucria), schaftlose, 4. Zw. f. Italien, Frankreich, Griechenland.

β) *nanum* H. Neapol.

? *exuviatum* Kunth, (= *Anthericum exuviatum* Jacq. = *Albuca exuviata* Ker), β) *minus* R. et S.

1) Nach Visiani gehören hierher *collinum* Rehb., *garganicum* Tenore, *saxatile* Visiani und *tenuifolium* Gussone.

Ornithogalum

- filifolium Kunth, (= *Anthericum filifolium* Jacq. = *Albuca filifolia* Ker, p. 27).
 filifolium Ledeb., fadenförmige, 4. Zw. f. Altai.
 fragrans Kunth, (= *Anthericum fragrans* Jacq. = *Albuca fragrans* Jacq. = *A. fugax* Ker, p. 27).
 garganicum Tenore, (= *saxatile* Visian.), garganische, 4. Zw. Dalmatien, Apulien, Sicilien.
 Granatelli Parlatore, Granatelli's, 4. Zw. f. Sicilien.
 Gussoni Tenore, (= *tenuifolium* Guss., non Redout.), Gussone's, 4. Zw. f. Neapel, Sicilien.
 lanceolatum LaBill., lanzettliche, 4. Zw. k. Syrien.
 marginatum Lindl., berandete, 4. Zw. Asiat. Turkey (Bosphorus).
 montanum Cyrillo, (= *patulum* Rafin. = *umbellatum* L. var. Sogl.), bergliebende, 4. Zw. f. Neapel, Sicilien.
 nanum Sm. (= *umbellatum* β minus Wahlbg.), zwerge, 4. Zw. f. Griechenland.
 narbonense Dodon., L. (= *pyramidale* Visian., non L. = *lacteam* Vill. = *Scilla montana* Savi), β) caucasicum Endl.
 nervosum Burch., nervige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
 orthophyllum Tenore, geradblättrige, 4. Zw. f. Neapel.
 praetextum Stev., ungewisse, 4. Zw. f. ?
 pyrenaicum L. (= *flavescens* Lam. = *narbonense* Bertol. = *Stellaris erecta* Mch.), β) tauricum Endl.
 refractum Kit. (= *umbellatum* L. var. Visian.).
 ruthenicum P. C. Bouché, russische, 4. Zw. f. Brandenburg, ? Rufsländ.
 stachyoides Ait. (? excl. Synon. p. 569). Griechenland, Kleinasien.
 sulphureum R. et S., Bertol., Rchb. (= ? *pyrenaicum* Lang, = *pyrenaicum* β Lam., DC., Roch. = *pyrenaicum* β *flavescens* Duby, = *stachyoides* Hort. = *Anthericum sulphureum* W. K., p. 64, = *Phalangium sulphureum* Poir. = *Scilla sylvestris* Savi), schwefelgelbe, 4. Zw. f. Ungarn, Illyrien, Italien, Schweiz, Frankreich.
 Thunbergii Kunth, (= *Anthericum filifolium* Thbg. = *A. nematodes* R. et S.), Thunberg's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 ? tuberosum Mill., knollige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 vittatum Kunth, (= *Albuca vittata* Ker, p. 27).
 II. Myogalum Lk. (= *Albuca* Rchb.).
 arabicum (L. spec.), DC. gall. Mittägl. und Westl. Europa, Nordafrika.
 aureum (Curt.), (= *dubium* Houtt. = *thyrsoides a* Ait.), β) flavissimum Jacq.
 Bouchéanum Kunth, (= *O. undulatum* Bouché), Bouché's, 4. Zw. f. ?
 coarctatum Endl. (Jacq.).
 flavescens Endl. (Jacq.), (= *arabicum* Redout. = *aureum* γ W. = *thyrsoides* Jacq. β Kunth), gelbliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
 miniatum Jacq. (= *aureum a* W. = *flavescens* β Poir.), mennigrothe, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
 nutans Lk. (L.), (= *hyalinum* Grenier, = *Albuca nutans* Rchb.).
 thyrsoides Endl. (Jacq.), α) albidum Kunth, (= *arabicum* L. pro parte (excl. syn.) = *Grimaldiae* Nocca,

Ornithogalum

= *thyrsiflorum* Hort.), β) petalis subserratis Hornem. Hafn.

unifolium Ker, (= *nanum* Broter. = *Scilla unifolia* L. spec.), β) concinnum Salisb. (= *roccense* Lk.). virens Lindl.

III. Chlorogalum Kunth.

divaricatum Kunth (Lindl.), ausgespreitzte, 4. Zw. k. f. b. Californien.

pomeridianum Kunth, (= *Anthericum pomeridianum* Ker, p. 64, = *Phalangium pomeridianum* Don, Swt. = *Scilla pomeridiana* DC.).

abyssinicum Hort. (= *albucoides* H. Par.), v. *Albucca abyssinica*, p. 27, *anthericoides* Lk., v. *Urginia anthericoides*, *autumnale* Lam. etc., v. *Scilla autumnalis* etc., p. 731, *capense* L., v. *Eriospermum latifolium*, *carolinianum* Hort. (= *bivalve* L.) et *gramineum* Sims, v. *Nothoscordum striatum* et *striatellum*, p. 439, II., *chinense* Lour. et *japonicum* Thbg., v. *Barnardia scilloides*, p. 113 et *B. japonica*, p. 60, II., *chloroleucum* Lindl. (= *gramineum* Poepp., non Sims), v. *Scilla chloroleuca*, *hirsutum* L., v. *Hypoxis erecta*, *ixioides* Ait., v. *Calliprora lutea*, p. 148, *maritimum* Lam., Brot. (= *Squilla* Ker), v. *Squilla maritima*, *nanum* Thbg., *punctatum* Thbg., *undulatum* Thbg., v. *Eucomis nana*, punctata et undulata, *speciosum* Rafin., *squamosum* Lam., v. *Scilla peruviana* et *Lilio-Hyacinthus*, p. 732, *serotinum* L. (= *altaicum* Laxm. = *striatum* W.), v. *Lloydia serotina*, p. 470 et p. 366, II., *uniflorum* Laxm., *oxypetalum* Ledeb., v. *Orithyja uniflora* et *oxypetala*.

Ornithoglossum Salisb. (= *Lichtensteinia* W., p. 460, non Cham., Schldl.), Vogelzüngel, VI. III., Colchicaceae (Melanthaceae-Veratreae).

glaucum Salisb. (= *viride* Ait. = *Cymation laevigatum* Spgl. = *Lichtensteinia laevigata* W. = *Melanthium viride* L. suppl.), blaugrünes, 4. k. t. Cap d. g. H.

Lichtensteinii Schldl. (= *undulatum* Spgl. = *Cymation undulatum* Spgl. = *Lichtensteinia undulata* W.), *Lichtenstein's*, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Ornithopodium Adans., All., *compressum* Mch., *scorpioides* All. (= *triphyllum* Mch.), v. *Ornithopus compressus*, p. 569 et *Arthrolobium scorpioides*, p. 46, II.

Ornithopus L., perpusillus L., β) intermedius Roth, (= *roseus* Dufour, = *sativus* Broter.). Hinsichtl. d. übrigen (Sect. II. p. 570) s. *Arthrolobium*, p. 46, II.

Ornithorynchium syriacum Röhl., v. *Euclidium syriacum*.

Ornithosperma serotina Rafin., v. *Pharbitis serotina*.

Ornithoxanthum Lk. = *Gagea*.

Ornithrophe Cobbe W. (= *asiatica* Hort.), *Cominia* W. (= *panigera* LaBill.), *occidentalis* W., *Schmidelia* P., *serrata* Roxb. (= *aporetica* Roxb.), v. *Schmidelia* Cobbe, *Cominia*, *occidentalis*, *racemosa*, *serrata*, p. 730.

Ornus Mch., P., Blüthenesche.

europaea P. (= *florifera* Hort. = *Fraxinus florifera* Scopol. = *F. paniculata* Mill. = *F. monspeliensis* Hort. = *F. Theoprasti* Duham.).

Ornus

obliqua (Tausch), (= *americana* Nutt. = *Fraxinus obliqua* Tausch, = *F. Pseudo-Ornus* Steud.), schiefblättrige, ⚥. f. Nordamerika.

rotundifolia Mch., Lk. (= *mannifera* Hort. = *Fraxinus calabrica* Auct. = *F. halepensis* Auct. = *F. mannifera* Hort.).

Orobanche T., Sommerwurz, Hanfwürger.

arenaria Borckh. (= *coerulea* Auct. = *comosa* Wallr. = *laevis* Ehrh. = *purpurascens* Jacq.).

arvensis Dumort., Acker, ☉. f. Belgien.

Avellanae Pfund, Haselnufs-S., 4. f. Böhmen.

caryophyllacea Sm., ♂) *torquata* Rehb.

Cirsii Fr., Distel-S., 4. f. Schweden.

condensata Moris, (= *foetida* Bivon. = *speciosa* Moris), gedrängtblumige, 4. f. Dalmatien, Italien, Nordafrika.

Epithymum DC. (= *paradoxa* K. = *Serpylli* Vauch.).

foetida Dsf. (= *barbata* Brot. = *fusca* Lam. = *major* β Vahl, = ? *pubescens* Urv.), stinkende, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

fragrans K., wohlriechende, 4. f. Oestreich.

gallica Grenier, französische, 4. f. Frankreich.

Hederae Duby, Epheu-S., 4. f. Westdeutschl., Frankr.

labellata Duin. (= *gracilis* Wallr., non Sm.), kleinlippige, 4. f. Deutschland, Belgien.

loricata Rehb. (= *Artemisiae campestris* Gaud. = *elatior* et *gracilis* Schlchr. = *major* Bull.).

lucorum A. Br., Hain-S., 4. f. Baiern.

major L., grofse, 4. f. Schweiz, England, Spanien.

medicaginis Duby, (= *minor* var. *glaberrima* Gaud. = *racemosa* Schlchr.), Schneckenklee-S., 4. f. Schweiz, Frankreich.

nudiflora Wallr. (= *minor* Vahl, = *rigens* Lois.), nacktblumige, 4. f. Nord-, Mittel- und Südeuropa.

ramosa L. (= *Cannabis* Vauch.).

Rapum Thuill. (= *Cytisi scoparia* Vauch. = *foetida* Duby).

Scabiosae K. (= *platystigma* Rehb.).

variegata Wallr., bunte, 4. f. Deutschland, Italien.

Orobella vicioides Presl., v. ? *Orobus atropurpureus* β.

Orobus T., Walderbse.

I. Genuinus.

atropurpureus Dsf., β) *siculus* Rafn. (= *Rafinesquii* Presl).

aureus Stev., goldfarbige, 4. f. Taurien.

canescens L. suppl. (= *angustifolius* Vill. = *ensifolius* Lapeyr. = *filiformis* Lam. = *gracilis* Gaud. = *graminifolius* Becker, = ? *linifolius* Wender. = *setiformis* Schlchr. = *vicioides* Vill. = ? *Lathyrus attenuatus* Vivian.), b. fl. pleno.

coccineus Mill., scharlachfarbige, ⚥. w. Vera Crux. (Kaum kultivirt u. zweifelhaft).

Denhardtii Tenore, Denhardt's, ? ☉. f. Neapel.

flaccidus Kit. (= *pauciflorus* Hort. = *stipulaceus* Hook. = *uninervius* Turczn. = *venosus* W. herb.), schlaffe, 4. f. Croatien, Sibirien.

Gmelini Fisch. (= *luteus* β *orientalis* Fisch. et Mey.).

hirsutus L., b) *glabriusculus* H. Pertopol.

intermedius Ledeb., mittlere, 4. f. Alt. Sibirien.

Orobus

- Jordani Tenore, Jordani's, 4. f. Neapel.
 laevigatus W. K., glatte, 4. f. Ungarn, Krain.
 longifolius Nutt. (= *Psoralea longifolia* Pursh), langblättrige, 4. f. Missouri.
 luteus L. (= *montanus* Scop. = *Tournefortii* Lapeyr.).
 pisiformis Maund et ? Wender. (= *sylvestris* Wender.).
 stenophyllus Steud. (= *Gmelini* Weinm., non Fisch.), dünnblättrige, 4. f. Sibirien.
 subvillosus Ledeb., wenigzottige, 4. f. Alt. Sibirien.
 tuberosus L., γ prostratus Host.
 variegatus Tenor. (= *ruscifolius* W. herb. = *serotinus* Presl, = *vernus* β *ruscifolius* Sering. = *versicolor* MB.).
 vernus L., c) albus, d) fl. pleno, e) azureus, f) Gezellei, g) roseus, h) ruber, i) speciosus Hort.
 versicolor Gmel., b) lutescens, c) virgatus.
 II. *Platystylis* Swt., p. 634.

cyaneus Stev.

digitatus MB. (= *pyrenaicus* Pall. = *sessilifolius* Sibth., Sm.).

Unbestimmtere: *alpinus* Hort., *Mergelynckii* Hort., *purpureus* Hort., *repens* Hort., *semperflorens* Hort. (= ? *canescens* L. suppl.), *Smouthii*, *superbus*.

Orontium P., non L., *arvense* P., *Asarina* P., *calycinum* P., *majus* P. etc., v. *Antirrhinum* *Orontium*, *Asarina* etc., p. 66.

Orostachys Fisch., *chlorantha* Fisch. (= *spinosa* Swt.), *malacophylla* Fisch., *serrata* Swt., *thyrsiflora* Fisch., v. *Umbilicus spinosus*, *Malacophyllum*, *serratus* etc., p. 830.

Orphium E. Mey., *Orphium*, V. 1., *Contortae-Gentianeae*.

frutescens E. Mey. (= *Chironia frutescens* L. = *Roeslinia frutescens* G. Don), strauchiges, $\frac{1}{2}$ t. Cap der guten Hoffnung.

β) *decussatum* Mey. (= *Chironia decussata* Vent. = *Roeslinia decussata* G. Don), γ) *angustifolium* Griseb. (= *Chironia caryophylloides* L. = *C. angustifolia* Curt. = *Roeslinia angustifolia* G., Don, = *C. frutescens glabra* Cham., Schltdl.), δ) *orthostylis* Griseb. (= *Chironia orthostylis* Rehb.). Vergl. p. 191.

Orsina camphorata Bertol., v. *Jasonia glutinosa*, p. 430.

Orthocarpus Nutt., Geradfrucht, XIV. II., *Personatae-Rhinantheae*.

I. *Triphysaria* Benth., Fisch. et Mey.

erianthus Benth. (= *Triphysaria versicolor* Fisch. et Mey.), wollblumige, \odot f. Neucalifornien.

floribundus Benth., blüthenreiche, \odot f. Neucalifornien.

gracilis Benth., schlänke, \odot f. Neucalifornien.

II. *Orthocarpus* (*genuinus*) Benth.

hispidus Benth., steifhaarige, \odot f. Oregongebiet.

luteus Nutt. (= *strictus* Benth.), gelbe, \odot f. Nordam.

III. *Oncorrhynchus* Fisch. et Mey.

australis Benth. (= *Castilleja laciniata* Hook. et Arn. = *Oncorrhynchus pinnatifidus* Lehm. = *O. tenellus* Fisch. et Mey., p. 558), südliche, \odot $\frac{1}{2}$ f. k. Peru, Chili.

Orthocarpus

purpurascens Benth. (= *Physocheilus variegatus* Nutt.),
purpurfarbige, ☉. f. Neucalifornien.

Orthocentron glomeratum Cass., v. *Cirsium polyanthemum*, p. 199.

Orthopogon RBr., v. *Oplismenus* Sect. I.

Orthoselis pilosa Spach, v. *Heliophila pilosa*.

Orthosiphon Benth., Röhrenbasilicum, XIV. 1., Labiatae.

glabratus Benth. (= *Ocimum suffruticosum* Schum. =
O. Thonningii Schum. = *O. thymiflorum* Roth, =
Plectranthus menthoides W. herb. = *Pl. thymiflorus*
Spgl.), kahler, ♂. ? 4. w. Ostindien, Arabien, Ma-
dagascar.

incurvus Benth., einwärtsgekrümmter, 4. w. Ostindien.
rubicundus Benth. (= *Lumnitzera rubicunda* Spgl. =
Plectranthus rubicundus Don), rötlicher, 4. w. Ost-
indien.

Oryza L., Reifs.

perennis Mch., Dsf. (= *sativa* var. Desv.), ausdauernder,
♂. 4. w. ?

sativa L. (= *communissima* Lour.), ε) *pumila* Hort.,
ζ) *rubriarbis* Desv., η) *emarginata* Desv., θ) *elongata*
Desv., ι) *sorghoides* Desv.

Oryzopsis Rich., Mchx., Reifsspelze.

asperifolia Rich. (= *Urachne asperifolia* Trin. = *U.*
leucosperma Lk.).

melanocarpa Mühlbg. (= *asperifolia* Kunth ex parte,
= *Milium racemosum* Sm. = *Piptatherum nigrum*
Torrey, = *Urachne melanosperma* Lk. = *U. racemosa*
Trin.), schwarzfrüchtige, 4. f. Nordamerika.

parviflora Nutt. (= *Milium pungens* Torr. = *Panicum*
firmum Kunth, = *Stipa canadensis* Poir. = *S. juncea*
Mchx. = *Urachne brevicaudata* Trin.), klein-
blumige, 4. f. Nordamerika.

setacea Rich. (= *Stipa bicolor* β N. E. = *St. ovata*
Trin. = *St. panicoides* Lam. = *St. setacea* Rich.
= *Urachne setosa* Trin.), borstige, 4. w. Chili,
Brasilien.

Osbeckia L., Osbeckie.

aspera Blume, (= *glauca* Benth. = *Melastoma asperum*
L., p. 506).

canescens Grah., weißgrauliche, ♀. w. Brasilien.

chinensis L., Spgl. (= ? *Melastoma osbeckioides* Ker).

Simsii DC. (= *Melastoma osbeckioides* Sims), Sims's,
♀. w. Mauritius.

stellata Don, (= *septemnervia* Hamilt.), β) *stenosepala*.
Oscaria chinensis Lilja, v. *Primula praenitens*,
p. 656.

Oskampia trichotoma Mch., v. *Nonnea lutea*, p. 549.

Osmanthus Lour., Duftölbaum, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

fragrans Lour. (= *Olea fragrans* Thbg.), wohlriechender,
♀. t. k. Japan, China, Cochinchina.

Osmithopsis camphorina Less., v. *Osmites camphorina*,
p. 573.

Osmophytum cochleatum Lindl., *lancifolium* Lindl.,
marginatum Lk., Kl., Otto, *radiatum* Lindl., v.
Epidendron cochleatum, *lancifolium* etc., p. 223, II.

- Osmorhiza** Rafin., DC., Duftwurzel, V. II., Umbelliferae.
brevistylis DC. (= *Myrrhis Claytoni* Torr. = *Uraspermum hirsutum* Bigel.), kurzgriffelige, 4. f. Nordam.
longistylis DC. (= *Myrrhis Claytoni* Mchx. = *M. longistylis* Torr. = *Scandix dulcis* Mühlbg. = *Uraspermum Claytoni* Nutt.), langgriffelige, 4. f. Nordamerika.
- Osmunda** T., Traubenfarren.
glaucescens Lk. (= *Claytoniana* H. Berol. excl. syn.), blaugrünlicher, k. f. b. Nordamerika.
gracilis Lk., schlanker, 4. f. b. k. Nordamerika.
palustris Schrad.
Osteomeles ferruginea H. B. K., v. *Eriobotrya cordata*, p. 229, II.
- Osteospermum** L., Beinsame.
coriaceum DC. (= *pisiferum* Burm., non L.), lederartiger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
bipinnatum Thbg., *coeruleum* Jacq. (= *pinnatifidum* L'Her.), v. *Garuleum bipinnatum et viscosum*, p. 255, II., *perfoliatum* L., v. *Venidium perfoliatum*.
- Osyris** L., Osyris.
quadrifida Salzm. (= *lanceolata* Steud. et Hochst.), vierspaltige, 4. k. Nordafrika.
alba Roch., non L., v. *Thesium elegans*, p. 807, *rhamnoides* Scop., v. *Hippophae rhamnoides*, *Schoberi* Pall., v. *Nitraria Schoberi*.
- Otandra** Salisb., Ohrstendel, XX. 1., Orchideae.
cernua Salisb. (= *Cistella cernua* Blume, = *Geodorum dilatatum* RBr. = *Limodorum recurvum* Roxb. = *Malaxis cernua* W.), übergebogener, 4. w. Ostindien.
- Othonna** L., Cass., Othonna.
amplexifolia DC. (= *perfoliata* Jacq. hort., non L.), stengelumfassende, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
carnosa Less. (= *Cineraria cacalioides* Thbg.), fleischige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
cheirifolia L. (= *calthoides* Mill.).
cylindrica DC. (= *tenuissima* Haw., non L. = *Cacalia cylindrica* Lam., p. 151, = *Cineraria filifolia* Thbg. p. 884).
dentata L. (= *bulbosa* β L.), gezahnte, 4. 4. Kn. k. Cap d. g. Hoffn.
digitata Thbg., L. fil. (= *bulbosa* γ L. = *Doria digitata* Less.).
quinquedentata Thbg., fünfzählige, 4. k. Cap d. g. H.
tuberosa Thbg. (= *bulbosa* L., W. α), knollige, 4. 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.
crassifolia L., v. *Hertia crassifolia*, p. 296, *ericoides* L., *Tagetes* L., v. *Gamolepis ericoides* et *Tagetes retrofracta* Jacq., v. *Doria retrofracta* Nachl. *virginica* Thbg. (= *flabellifolia* Lodd.) et *linifolia* Burm. (= *tenuissima* L. = *speciosa* Spgl., Hort.), v. *Euryops virginicus et tenuissimus*, p. 239, II.
Otidia Lindl., Swt., *alternans* Swt., *carnosa* Swt., *ceratophylla* Hffg., *dasycaulon* Eckl., Zeyh., *laxa* Swt., v. *Pelargonium* Sect. XI. *alternans* Wendl. etc., p. 601.
- Otochilus** Lindl., Oehrchenlippe, XX. 1., Orchideae.
alba Lindl. (= *Broughtonia pendula* Wall.), weisse, 4. w. Ostindien.

Otochilus

fusca Lindl. (= *Broughtonia amoena* Wall.), braune,
4. w. Ostindien.

porrecta Lindl., hervorgestreckte, 4. w. Ostindien.
(Ob eingeführt?)

Otostegia Benth., Ohrfaden, XIV. 1., Labiatae.

scariosa Benth. (= *Clinopodium fruticosum* Forsk. =
Moluccella scariosa RBr. = *Phlomis moluccoides* Vahl),
trockenhäutiger, 5. w. Arabien, Abyssinien.

Olotropis sambuensis N. E., v. Dollinera sambuensis,
p. 209, II.

Ottonia Spgl., Jaborandistrauch, (= *Serronia* Gaudich.),
(Fr. Otto, ehem. Inspector d. botan. Gartens etc. zu
Berlin), II. III., Piperaceae.

Anisum Spgl. (= *Jaborandi* Kunth, = *Serronia Jabo-*
randi Gaudich., Guillem.), ächter, 5. w. Brasilien.

eucalyptifolia Kunth, schönmützenblättriger, 5. w.
Brasilien.

laeta Kunth (= *Piper citrifolium* Lk. = *P. Hoffmann-*
seggianum R. et S.), freudiger, 5. w. Brasilien.

b) *Enckea* Kunth.

glaucescens Endl. (= *Enckea glaucescens* Kunth, =
Piper glaucescens Jacq. fil.), blaugrünlicher, 5. w.
Vaterland unbekannt.

plantaginea Endl. (= *Enckea plantaginea* Kunth, =
Piper medium Jacq. = *P. plantagineum* Lam., p. 629),
wegetrittähnlicher, 5. w. Antillen Mexico.

unguiculata * (= *Enckea unguiculata* Kunth, = *Piper*
cellidifolium Dsf., H. Par. ? = *P. discolor* Balbis,
= *P. dubium* A. Dietr. ? = *P. terminale* H. B. K.
= *P. unguiculatum* R. et P., p. 629), nagelförmiger,
5. w. Peru.

Ourisia Commers., Juss., Ourisie, XIV. II., Personatae-
Rhinantheae.

I. *Ourisia* Poepp. et Endl. (genuina).

magellanica Juss., G. fil. (= *Chelone ruelloides* L. fil.
Suppl.), magellanische, 4. k. Magellanische Meerenge.

II. *Dichroma* (Cav.), Endl. et Poepp.

coccinea P. (= *Dichroma coccinea* Cav.), scharlach-
farbige, 4. k. Chili (südl. Anden).

Oustropis microphylla Don, v. *Lotus microphyllus*,
p. 478.

Ovieda L., Burm., *inermis* Burm. (= *mitis* L.),
v. *Clerodendron Siphonanthus*, p. 205.

Ovieda Spgl., *anceps* Spgl., *corymbosa* Spgl., *Fa-*
bricii Spgl., *falcata* Spgl., *fasciculata* Spgl., *fissi-*
folia Spgl., *silenooides* Spgl., v. *Lapeyrousia anceps*
etc., p. 445.

Oxalis L., Sauerklee.

Acetosella L., γ) subpurpurascens DC. (= *lilacina* Hort.).

alata Mart., Zuccar. (= *ciliata* Spgl. = *mandioccana*
 γ *rhomifolia* DC.), geflügelter, 4. 5. w. Brasilien.

Andrieuxii H. Cels., Andrieux's, 4. Kn. k. ? Mexico.

arcuata Jacq. (= *glandulitheca* Salisb.).

articulata Savigny, gegliedert, 4. Kn. k. t. Montevideo.

Barrelieri Jacq. (= *cajanifolia* St. Hil. = *cytisoides*
Zuccar.), ? \odot . Brasilien.

bifolia Page, zweiblättriger, 4. Zw. Cap d. g. Hoffn.

bifurca Lodd. (= ? *fusca* Lodd.), zweigabeliger, 4.
Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

Oxalis

- campestris* Mart., Zuccar. (= *melilotoides* Zuccar.),
 Feld-S, ☉. m. f. Brasilien.
caprina Thbg. (= *erecta* Thbg., Savigny).
conorrhiza Jacq., kegelwurzelliger, 4. Kn. k. Paraguai.
corniculata L. (= *Dillenii* Sieb. = *prostrata* Haw. =
monadelphina Roxb. = *pusilla* Salisb. = *repens* Thbg.,
 Jacq. = *Oxys lutea* Lam.), β) *lupulina* H. B. K.,
 γ) *pilosiuscula* H. B. K. (= *humistrata* W. herb. =
micrantha Boy. = *Lyoni* Pursh), δ) *villosa* M. B.,
 ε) *longepedunculata* H. Berol.
crassicaulis Zuccar. (= *crenata* Dougl. = *Arracacha*
 G. Don, Hortul.), dickstengelliger, 4. Kn. k. f. b.
 Mexico, Peru.
crenata Jacq. (excl. syn. p. 575), ☉. f. Peru.
Deppei Loddig, (= *esculenta* Otto et Dietr. = *tetra-*
phylla Lk. et Otto, non Cav.). Kn.
Dillenii Jacq., β) *florida* Salisb. (= *glauca* Rafin. =
prostrata Haw.).
discolor Kl., verschiedenfarbiger, 4. Kn. Mexico.
divaricata Mart., Zuccar., ausgespreitzter, ☉. m. f.
 Brasilien.
Ehrenbergii Schldl., Zuccar., Ehrenberg's, 4. Kn. k.
 Mexico.
eriorrhiza Zuccar. (= *autumnalis* St. Hil.), wollwurze-
 ligger, 4. Kn. k. t. Montevideo.
exaltata Jacq., hoher, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
fabaeifolia Jacq., α) *alba* Endl., γ) *discolor* Endl.
fontana Bunge, Quellen-S., ☉. f. Nordchina.
grandifolia DC. (= *macrophylla* H. B. K., non Hornem.
 = *umbrosa* W. herb.), größtblättriger, 4. Kn. t.
 Neuandalusien.
Hernandesii Moç. Sess., Hernandez's, 4. Kn. k. Mexico.
heterophylla DC., verschiedenblättriger, 4. Zw. k.
 Cap d. g. Hoffn.
hirta L., β) *hirtella* Jacq. (= *hirsuta* Jacq. = *sessili-*
folia L.).
humilis Thbg. (= *purpurea* Jacq. var. Thbg. = *vari-*
abilis Lindl.), niedriger, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
javanica Blume, javanischer, 4. Zw. w. Java.
lanceaefolia Jacq., β) *alba* Endl.
lasiandra Zuccar., Grah., wollbeuteliger, 4. Kn. k. t.
 Mexico.
lasiopetala Zuccar., wollkrönenblättriger, 4. Kn. t.
 Montevideo.
laxa Hook., lockerer, ? 4. Kn. k. Chili.
lilacina Kl., lilafarbiger, Kn. k. Mexico.
litoralis Eckl., Zeyh. (= *tenella* Lodd.), Uferliebender,
 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
lobata Sims, (= *perdicaria* Bertero, = *tenera* Lindl.
 = *Sassia perdicaria* Molin.).
Loddigesiana Eckl., Zeyh., Loddiges's, 4. Zw. k. Cap
 der guten Hoffnung.
lunulata Zuccar., mondformiger, 4. Kn. k. Mexico.
macrogonia Jacq., großsprossiger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
macrophylla Hornem. (= ? *caprina* Thbg. var. Spgl.),
 4. Zw. Cap d. g. Hoffn.
maculata Dsf., gefleckter, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
macrorrhiza Gill., Hook., starkwurzelliger, 4. Kn. k.
 Chili.

Oxalis

- Martiana Zuccar. (= *bipunctata* Hook. = *brasiliensis* Lodd. = *floribunda* Lk., Otto, = *spectabilis* Hort. = *urbica* St. Hil. = *violacea* Savigny).
- megalorrhiza Jacq. (= *bicolor* Savigny).
- micrantha Bertero, kleinblumiger, ☉. f. Chili.
- Mirbelii Dehnh., Mirbel's, ? 4. Kn. k. ?
- Neuwiedii Zuccar. (= *polymorpha* var. *polyantha* Zucc.), Neuwied's, ♀. k. t. Brasilien, Mexico.
- nudiflora Moç. Sess. (= *violacea* L. var.), nacktblumiger, 4. Kn. k. Mexico.
- papilionacea Hoffg. (= *delta* Arrab. = *truncata* W. herb.), schmetterlingsförmiger, 4. Kn. t. Brasilien.
- pentantha Jacq., fünfblumiger, 4. ♀. w. Südamerika.
- praecox Lehm., früher, ? 4. Zw. k. ?
- quinata Savigny, fünfzähliger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
- quinquepunctata Dsf., fünfpunktiger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
- rubrocincta Lindl., rothgesäumter, 4. Kn. k. Guatemala.
- sarmentosa Zuccar., sprossender, 4. Kn. w. Brasilien.
- Schiedeana Zuccar., Schiede's, 4. Kn. k. Mexico.
- speciosa Jacq., β) sugillata Jacq.
- tetraphylla Cav. (= *esculenta* Hort. = *zonata* Dumort.).
- tortuosa Lindl. (= *glomerata* Hook., Arn.).
- tuberosa Mol., knolliger, 4. Kn. f. b. k. Chili.
- versicolor L., β) sylvestris W., γ) gracilis Jacq.
- Vespertilionis Zuccar., fledermausförmiger, 4. Kn. k. Mexico.
- Unbestimmtere: biflora Hort., ericoides H. Angl., piscularia H. Angl., quadrifida H. Angl. 4. Peru.
- Oxyanthus** DC., Spitzenblume.
- hirsutus DC. (= *speciosus* Sims, non DC.), rauhaarige, ♀. w. Sierra Leone.
- tubiflorus DC. (= *speciosus* Ait., non DC. = *Gardenia tubiflora* Ait.), röhrenkronige, ♀. w. Sierra Leone.
- Oxybaphus** L'Her., p. 578.
- chilensis Steud. (= *Calyxhymenia chilensis* Dsf.).
- Oxybasis** Karel. et Kiril., Spitzmelde, V. 1., Aizoideae-Atripliceae.
- minutiflora Karel. et Kiril., kleinblumige, ☉. f. Soongaria.
- Oxyceros chinensis* Lour., v. *Randia sinensis*, p. 675.
- Oxydenia attenuata* Nutt., *filiformis* Nutt., *virgata* Nutt., v. *Leptochloa mucronata*, *filiformis*, *virgata*, p. 455 et p. 351, H.
- Oxygraphis** Bunge, Spitzranunkel, XIII. VI., Ranunculaceae.
- glacialis Bunge, (= *Caltha glacialis* Speg. = *Ficaria glacialis* Fisch., DC. = ? *Ranunculus camtschaticus* DC.), Gletscher-S., 4. f. Altaisch. Sibirien.
- Oxylobium** Andr., Schmalblatt.
- dilatatum Benth., verbreitetes, ♀. t. k. Neuholland.
- Hügelii ? Benth., Hügel's, ♀. t. k. Neuholland.
- obovatum Benth., verkehrteiförmiges, ♀. t. k. Neuholl. β) angustatum Meisn. (= *cuneatum* Benth.).
- obtusifolium Sweet, (= *angustifolium* Cunn.).
- ovalifolium Meisn., eiförmiges, ♀. t. k. Neuholland.
- parviflorum Benth., kleinblumiges, ♀. t. k. Neuholland (Schwanenflufs).
- purpuratum H. belg., purpurfarbiges, ♀. t. k. Neuholl.
- scandens Benth. (= *Chorozema scandens* Sm. = *Ch. Baxteri* Grah. = *Mirbelia Baxteri* Bot. reg. = *Po-*

Oxylobium

dolobium scandens DC., p. 639), β) *humifusum* Benth.
(= *Podolobium humifusum* Don).

sericeum Benth. (= ? *argenteum* Hort. = *Chorozema sericeum* Sm. = *Podolobium sericeum* DC.), seidenhaariges, \S . t. k. Neuholland.

spectabile Endl., ansehnliches, \S . t. k. Neuholland.

Oxymyrrhine J. C. Schauer, Schmal-(Spitz-)myrte, VIII. 1., Myrtaceae.

gracilis J. C. Schauer, schlanke, \S . t. k. Neuholland.

Oxypetalum RBr., Spitzenkrönchen.

coeruleum Decaisn. (= *Tweedia coerulea* D. Don, = *T. versicolor* Hook., p. 828).

riparium H. B. K. (= *O. Gothofreda* R. et S. = *Gothofreda cordifolia* Vent.), Uferliebendes, \S . Sch. w. Neugranada.

Oxyphaeria Andr., v. Humea.

Oxypogon elegans Rafin., v. *Lathyrus venosus*, p. 449.

Oxypolis rigida Rafin., *tricuspidata* Rafin., v. *Archemora rigida et tricuspidata*, p. 42, II., *triquinata* Mchx. v. *Angelica triquinata*, p. 60.

Oxyspora DC., Spitysame, VIII. 1. (X. 1.), Lythriariae-Melastomaceae.

paniculata DC. (= *Artrostemma paniculatum* D. Don, p. 85, = *Rhexia paniculata* Spgl.).

vagans Wall., zerstreuter, \S . w. Ostindien.

Oxytropis DC., Wirbelkraut, (Kielschote).

aciphylla Ledeb., spitzblättriges, \S . f. b. Alt. Sibirien.

ampullacea P. (= *physodes villosa* DC. = *Astragalus ampullaceus* Pall.), flaschenförmiges, \mathcal{A} . f. Sibirien.

argyrea DC. (= *argyrophylla* Ledeb.).

brevicaulis Ledeb., kurzstengeliges, \mathcal{A} . f. Alt. Sibirien.

caespitosa P. (= *physodes glabra* DC. = *Astragalus caespitosus* Pall. = *A. vesicarius* Pall.), rasenartiges, \mathcal{A} . f. Dahurien.

campestris DC. (= *Astragalus campestris* L. = *Phaca campestris* Whlbg.), ϵ) *sulfurea* Fisch.

coerulea DC. (= *curvirostris* Turcz. = *Astragalus baicalensis* Pall. = *A. coeruleus* Pall.).

deflexa DC. (= *Astragalus deflexus* Pall. = *A. hians* Jacq. = *A. parviflorus* Lam. = *A. retroflexus* Pall.).

floribunda DC. (= *Fischeri* DC. = *longicuspis* Ledeb. = *tenella* DC. = *teres* DC. = *versicolor* Fisch. = *Astragalus floribundus* Pall. = *A. teres* Spgl.), blüthenreiches, \mathcal{A} . f. b. Altaisch. Sibirien, Tatarei.

intermedia Bunge, mittleres, \mathcal{A} . f. Altaisch. Sibirien.

lanata DC. (= *Astragalus dasyphyllus* Pall. = *Phaca lanata* Pall. = *P. sibirica* L. fil.), wolliges, \S . f. b. Sibirien.

leptophylla DC. (= *Astragalus leptophyllus* Pall., non Dsf.).

nigrescens Fisch. (= *Astragalus nigrescens* Pall.), schwärzliches, \mathcal{A} . f. Sibirien.

oligantha Bunge, wenigblumiges, \mathcal{A} . f. Altaisch. Sibirien.

pumila Fisch. (= *inaria* Ledeb., non DC.), kleines, \mathcal{A} . f. Altaisch. Sibirien.

soongarica DC. (= *Astragalus soongaricus* Pall.), β)

caudata DC., Ledeb. (= *Astragalus caudatus* Pall. = *A. spicatus* Pall.).

Oxytropis

- sordida* DC. (= *campestris* β K. = *montana* var. DC. ?
Atragalus sericeus a Lam. = *A. sordidus* W. =
A. tyrolensis Sieb. = *A. uralensis* Vahl), schmutzig-
farbiges, 4. f. b. Norwegen, Schweiz, Tyrol.
squamulosa DC. (= *leucopodia* Ledeb. = *Astragalus*
squamulosus Poir.), kleinschuppiges, 4. f. b. Dahurien.
stenophylla Bunge, (= *pumila* Ledeb.), schmalblätteri-
ges, 4. f. b. Altaisch. Sibirien.
subverticillaris Ledeb., fastwirtelförmiges, 4. f. b.
Altaisches Sibirien.
sulphurea Ledeb., non Fisch., p. 579.
sylvatica DC. (= *Astragalus sylvaticus* W. = *A. syl-*
vicolus Pall. = *Phaca sylvatica* Pall.), Wald-W.,
4. f. Dahurien, Sibirien.
tragacanthoides Fisch., traganthähnliches, $\frac{1}{2}$. f. b. Altai-
sches Sibirien.
triphylla P. (= *Astragalus triphyllus* Pall.), dreiblätteri-
ges, 4. f. Inseln des Baicalsee's, Dahurien.
uralensis DC. (= *Astragalus uralensis* L.), β) *sericea*
DC. (= *Atragalus uralensis* Jacq. = *A. velutinus*
Sbr. = *Phaca uralensis* Whlbg.), γ) *pumila* Ledeb.
vaginata Fisch. (= ? *floribunda* DC.), scheidiges, 4. f.
b. Altaisches Sibirien.

alpina H. Dorpat., v. ? *Phaca alpina*, p. 611.

Oxyura DC., Spitzhülle.

- Douglasii* E. Mey. (= *chrysanthemoides* Hort., non DC.
= *Calliglossa Douglasii* Hook., p. 875).
Ozophyllum foetidum Rausch. (= *trifoliatum* W.),
v. *Ticorea foetida*.

Ozothamnus RBr., Strauchdosten.

- diosmaefolius* DC. (= *ericifolius* Cunn. = *Gnaphalium*
diosmaefolium Vent. = *G. piluliferum* Hort. = *G.*
rosmarinifolium Speg. = *Helichrysum diosmaefolium*
Less., Don, = *Metalasia diosmaefolia* et *rosmarini-*
folia Auct.), göttergeruchblättriger, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.
reticulatus DC. (= *Chrysocoma reticulata* LaBill. =
Faustula reticulata Cass. = *Gnaphalium reticulatum*
Speg. = *Helichrysum reticulatum* Less.), netzförmiger,
 $\frac{1}{2}$. t. Van Diemens Land.

Pachira alba Parlat., *aquatica* Aubl. (= ? *nitida*
H. B. K.), *grandiflora* Tussac, Juss., *insignis* Savign.,
v. *Carolinea tomentosa*, *princeps*, *grandiflora* et
insignis, p. 167 et p. 122, II.

Pachydendron Haw., v. *Aloe*, Sect. V. b. p. 26. II.
et p. 35.

Pachycarpus crispus E. Mey., v. *Gompholobus crispus*.

Pachylepis Less., DC., Dickschüppchen, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

- Kalmii* Less. (= *Hieracium Kalmii* L. non Symons, =
Sclerolepis Kalmii Monn.), Kalm's, \odot . f. Nordamer.
Pachylepis juniperoides Brogn., v. *Taxodium juni-*
peroides, p. 799.
Pachylophia Nuttalliana Spach, v. *Oenothera cae-*
spitosa, p. 554.

Pachyneurum Bunge, Dicknervler, XV. II., Cruciferae.

grandiflorum Bunge, (= *Braya Meyeri* Bunge, Ledeb.
= *Draba grandiflora* C. A. Mey. = *Eutrema piliferum*
Turcz.), großblumiger, $\frac{1}{2}$. f. Altaisch. Sibirien.

- Pachyphyllum** H. B. K., Dickblatt, XX. 1., Orchideae.
distichum H. B. K., zweizeiliges, 4. w. Peru.
- Pachyphytum** Lk., Kl., Otto, Dickkraut, X. 1v.,
 Corniculatae-Crassulaceae.
bracteosum Lk., Kl., Otto, deckblättriges, 4. f. w. t.
 Mexico.
- Pachypleurum** Ledeb., Dickrippler, V. 11., Umbelliferae.
alpinum Ledeb., Alpenbewohnender, 4. f. Alt. Sibirien.
simplex Rchb., v. *Gaya simplex*, p. 878.
- Pachypodium** Lindl. (= *Belonites* E. Mey.), Dick-
 füsler, V. 1., Apocyneae.
bispinosum A. DC. (= *glabrum* G. Don, = *Echites*
bispinosa Thbg. = *Belonites bispinosa* E. Mey.),
 zweistacheliger, f. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.
succulentum Lindl., A. DC. (= *tomentosum* G. Don,
 = *Belonites succulenta* E. Mey. = *Barleria rigida*
 Speg. = *Echites succulenta* Thbg.), saftiger, f. Kn.
 t. Cap d. g. Hoffn.
tuberosum Lindl. (= *Echites tuberosa* Haw.), knolliger,
 f. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.
 β) *Loddigesii* A. DC.
Pachypodium Webb et Berth., *Columnae* Webb et
 Berth., Endl., *erysimoides* Webb et Berth., *panno-*
nicum Endl., v. *Sisymbrium* Sect. *Columnae*, *erysi-*
moides, *pannonicum*, p. 761, 762.
- Pachypterygium** Bunge, (= *Pachypteris* Karel. et
 Kiril.), Dickflügler, XV. 1., Cruciferae-Isatideae.
lamprocarpum Bunge, glanzfrüchtiger, ⊙. f. Soongaria.
multicaule Bunge, Karel. et Kiril., vielstengeliger, ⊙. f.
 Samarkand.
- Pachyrachis** H. Cels, Dickspindel, XX. 1., Orchideae.
Pinelliana H. Cels., Pinelli's, 4. w. Brasilien.
- Pachyrrhizos** Rich., Dickwurzler.
mollis Hassk., weicher, f. Sch. Kn. w. Java.
Pachysa G. et D. Don, *ardens* Don, *baccans* Don,
formosa Don, *glomiflora* Don, *Lambertiana* Don,
physodes Don, *Vernix* Don, (= *aristata* Don),
vesicularis Don, v. *Erica ardens*, *baccans*, *formosa*,
reflexa etc.
Pachysandra coriacea Hook., v. *Sarcococca pruni-*
formis, p. 722.
Paddingtonia Hort., v. *Piddingtonia* Sect. IX. *Lo-*
belia, p. 473.
Padus Mill., Mch., *avium* Mill. (= *germanica* Borckh.
 = *vulgaris* Host), *caroliniana* Mill., *eglandulosa*
 Mch., *Laurocerarus* Mill., *Mahaleb* Borckh., *nana*
 Borckh., *serotina* Borckh. (= *virginiana* Mill.),
virginica Borckh. (= *oblonga* Mch.), v. *Prunus*
Padus, *caroliniana*, *lusitanica* etc., p. 660.
- Paederia** L., Knackbeere.
Lingua Bojer, (= *Lygodysodea Lingua* Bojer), zungen-
 förmige, f. w. Mauritius.
tomentosa Blume, filzige, f. f. w. Java.
Valli-kara Juss. (= *Hondbessen* Adans. = *Reussia to-*
mentosa Dennst.), malabarische, f. f. w. Malabar.
Paederota sibirica, *virginica* Walp., v. *Veronica*
 Sect. *sibirica* et *virginica*, p. 844.
- Paeonia** T., Paeonie, Pfingstrose.
albiflora Pall. (= *edulis* Salisb. = *sinensis* Hort.).
 Varietäten: *alba patens* van Houtte, *alba rubroincta*

Paeonia

van Houtte, *amabilis grandiflora* v. Houtte, *amabilis lilacina* Buyck, *amabilis speciosa* v. Houtte, *anemoneflora striata* Guérin, *bicolor* Buyck, *bicolor triumphans* v. Houtte, *Buyckii* v. Houtte, *centripetala roseo-alba* v. Houtte, *claptoniensis* Hort. belg., *diversiflora* Makoy, Duchesse de Nemours Guérin, *elegans* Guérin, *elegans superbissima* Buyck, *festiva* Hort. belg., *formosa* Lémon, *fragrans* Hort., *globosa amoena* Buyck, *globosa grandiflora alba plena* Buyck, *globosa grandiflora carnea plena* Lémon, *grandiflora* Hort. belg., *grandiflora nivea plena* Lémon, *grandiflora major* Hort. belg., *Heriartiana* Guérin, *Humei et alba et superba* Hort., *latipetala rosea* v. Houtte, *lilacina plenissima* Buyck, *lilacina plena* v. Houtte, *lilacina elegans et superba* v. Houtte, *Lowii* Hort. belg., *lutea variegata* Guérin, *nivalis* Buyck, *odorata* Lémon, *papaveriflora* Lémon, *plenissima rosea superba et variegata* v. Houtte, *Pottsii* Hort., *prolifera tricolor* Lémon, *pulcherrima* Hort. belg., *Queen's perfection et Victoria* Hort. angl., *Reevesii* Sabine, *Reine hortense* Guérin, *Reine des roses* Guérin, *Rosalba* v. Houtte, *rosea alba striata* v. Houtte et *amabilis* Buyck, et *delicatissima* v. Houtte, et *dilecta et lilacina et ligulata elegantissima et luteola elegantissima et pallida pulchra* v. Houtte, *rosea plenissima superba* Buyck et *speciosa et speciosissima et spectabilis et triumphans odorata* v. Houtte, *Rose de Gendbrugge* v. Houtte, *Rose double de Flandre* v. Houtte, *rubicunda albomarginata* v. Houtte, *rubescens amabilis* Hort. belg., *speciosa plena et striata* Hort. belg., *sulphureo-rosea* v. Houtte, *tricolor flavescens* Buyck et *grandiflora* Buyck et *grandissima* v. Houtte, *tricolor roseo-lilacina* Buyck et *extra* Buyck, *triumphans extra* Buyck et *rosea* v. Houtte, *variegata plenissima extra* v. Houtte, *versicolor extra* Buyck et *lutescens* v. Houtte, *Victoire Modeste* Guérin, *Victoire tricolor* van Houtte, *violacea grandiflora* Guérin, *Whitleji* Hort. angl. etc. etc.,

β) *trichocarpa* Bunge.

anomala L. (= *laciniata* Pall. = *lobata* Pall. = *quinquecapsularis* Pall. = *sibirica* Pall.), b) *rosea plena*.

arietina Anders., Andr. (= *cretica* Auct.), α) *Andersonii* DC., β) *carnea* DC.

banatica Rochel, (= *corallina* Pollini, non Retz, = *rosea* Host), *banatische*, 4. Kn. f. Banat, Croatien, Oberitalien.

Broteri Boiss. et Reut. (= *officinalis* Brotero), *Brotero's*, 4. Kn. f. Spanien, Portugal.

Brownii Dougl., Hook. (= *californica* Dougl.), *Brown's*, 4. Kn. f. Northwestl. Amerika.

commutata Wender. (= *officinalis* L. var. Hort.), *verwechselte*, 4. Kn. f. ?

corallina Retz, (= *foemina* Mill. = *integra* Murray, = *mascula* Dsf. et Mill. = *officinalis* β L. = ? *triternata* Pall.).

coriacea Boiss. lederartige, 4. Kn. f. Spanien.

corsica Tausch, (= *paradoxa* β *leiocarpa* DC.), *corsicanische*, 4. Kn. f. Corsica.

Paeonia

- decora* Anders., Andr., β) *elatior* DC. (= *byzantina* Clus., Hort.)
elegans Sabine, zierliche, 4. Kn. f. ?
erecta Sabine, aufrechte, 4. Kn. f. ?
fimbriata H. angl., gewimperte, 4. Kn. f. Kleinasien.
flavescens Presl, (= *cretica* Bot. reg.), gelbliche, 4 Kn. f. Sicilien.
fulgida Sabine, leuchtende, 4. Kn. f. ?
humilis Retz, β) *hirsuta* Mill. (= ? *villosa* Dsf.).
intermedia C. A. Mey. (= *laciniata* Sievers), mittlere, 4. Kn. f. Sibirien.
lanceolata Salm Dyck, (= *foemina* Dsf.), lanzettförmige, 4 Kn. f. ?
lobata Dsf. (= *lusitanica* Mill.), gelappte, 4. Kn. f. Portugal.
macrophylla Sabine, großblättrige, 4. Kn. f. ?
microcarpa Salm Dyck, kleinfrüchtige, 4. Kn. f. ?
 Montau Sims, Variet. u. Hybrid.: *alba simplex sericea* v. Houtte, *carnescens plenissima* v. Houtte, *Delachei* H. belg., *Duchesse d'Orléans* Makoy, *Fürstin Metternich* v. Houtte, *Imperatrice Joséphine* Makoy, *Liliputiana* Hort., *Napoleoniana* Hort. gall., *nivea fl. pleno*, *phoenicea fl. pleno odorato* H. belg., *purpureo-violacea superba* Hort. belg., *regia* Makoy, *rosea* Hort. (*plenissima*) *rosea Elisabethae* Makoy, *rosea plenissima Casoretti*, *rosea purpurea et superba* Makoy, *rosaeolens* H. Gallor., *Rosa gallica et Rosa mundi* Hort. belg. et gall., *rubescens*, *Triumph de Malines* v. Houtte (*pyramidale van Kiel*), *Triumph de Vandermaelen* v. Houtte, *Victoire Mathien*. etc. β) *papaveracea* Andr., Var.: *alba plena* Makoy, *fimbriata carnea plena* Hort., *leodiensis* H. belg., *multiplex* Makoy, *Otonis* Hort., *semiplena* Hort.
multifida Salm Dyck, vieltheilige, 4. Kn. f. ?
officinalis L. spec. α , Retz, W. (= *foemina* Desf. = *mascula* Mill. = *nemoralis* Salisb. = *rubra* Hort.). Var.: *alba pura fl. pl.* Hort., *anemoneflora fl. pl.* Hort., *carnea* Hort., *carnea plena* Hort., *Carolina* Hort., *exaltata* Jacques, *fimbriata rubra* Hort., *humilis latifolia* Hort., *lucida* Hort., *maxima-rosea plena* Jacques, *mutabilis alba* Hort., *nivea plenissima* Hort., *pallida* Hort., *papaveracea* Smouth, *papaveriflora* Hort., *paradoxa fimbriata* Hort., *rosea plena et pallida plena* Jacques, *rotundiflora fl. simpl.* Jacques, *sublineata fl. simpl.* Jacques, *subviolacea fl. simpl.* Jacques., *fol. variegat. et flore roseo pleno* Smouth etc.
paradoxa Andrs., Andr. (= *peregrina a* DC. = *promiscua* Lobel., Rchb.), c) *fimbriata plena* Jacques.
peregrina Mill., DC. γ . (= *officinalis* plur. Auct., non Hort.).
subternata Salm Dyck, fastdreizählige, 4. Kn. f. ?
tenuifolia L., Var. u. Hybrid.: *daucifolia* Hort., *rubra plena* Hort., *Smouthii* v. Houtte, *Van de Wieli* Hort.
triternata Pall. (= *daurica* Andr. = *rotundifolia* Hort.), b) *flore pleno* Hort., c) *staminea simplex* Jacques.
villosa Sweet, b) *fl. albo* Hort. belg.
Wittmanniana J. Booth, Bot. reg., Wittmann's, 4. Kn. f. Caucasus.

Palafoxia Lagasca, Palafoxie.

fastigiata Less. (= *Hymenopappus integrifolius* Speg.
= *Paleolaria fastigiata* Less. = *Polypteris integrifolia* Nutt.), gipfelständige, 4. f. Nordamerika.

Palava scabra H. Bonpl., v. *Saurauvia excelsa*, p. 723.

Palavia Cav, Palavie.

malvaefolia Cav. (= *declinata* Mch. = *Malope parviflora* L'Her.).

moschata Cav. (= *prostrata* Hort.).

Paleolaria carnea Cass, *fastigiata* Less., v. *Palafoxia linearis et fastigiata*.

Paleyia albida Cass., v. *Barkhausia albida*, p. 870.

Palicourea Aubl., Palicourie.

Pavetta DC. (= *Cestrum nervosum* Mill. = *Pavetta pentandra* Sw. = *Psychotria Pavetta* Sw.), Pavetta-ähnliche, 5. 5. w. Jamaica.

pedunculosa DC. (= *cayennensis* Desv. = *Psychotria pedunculosa* Rich.), gestielte, 5. 5. w. Cayenne.

rigida H. B. K. (= ? *strepens* Mart. = *Psychotria rigida* Bredemey., W., p. 663, = *P. byrsophylla* Speg.).

Paliurus T., Stechdorn.

australis G. (= *aculeatus* Lam. = *clypeiformis* Medic. = *petasus* Dum. Cours. = *Spina Christi* Mill. = *P. vulgaris* Don, = *Rhamnus Paliurus* L. = *Zizyphus Paliurus* W.).

virgata Don, (= *Zizyphus incurvus* Bot. mag., non Wall. = *Z. virgata* Dietr.), p. 581.

Palladia atropurpurea Mch., v. *Lysimachia atropurpurea*, p. 485.

Pallasia capensis Houtt., v. *Calodendron capense*, p. 149.

Pallasia comosa Rausch., *caspica* L., v. *Calligonum polygonoides et Pallasia*, p. 147.

Pallenis spinosa Cass., v. *Buphthalmum* Sect. p. 139 et p. 92, II.**Palmaglossum** Kl., Palmenzügel, XX. 1., Orchideae. *crassifolium* Kl., dickblättriges, 4. w. Mexico.

Palmstruckia Retz fil., v. *Chaenostoma*, p. 134, II.

Panax L., Kraftwurz.

chrysophyllus Vahl, (= *Morototoni* Aubl. = *undulatus* P.).

digitatus Sweet, fingerförmige, 5. w. Ostindien.

fragrans Roxb. (= *Aralia fragrans* Don, p. 71, = *Hedera fragrans* Speg.).

Ginseng C. A. Mey. (= *coreense* Sieboldt, = *Schinseng* var. *coraiensis* N. E.), Ginseng-K., 5. t. Corea.

japonicus C. A. Mey. (= *Schinseng* var. 2 *japonicus* N. E. = *Aureliana japonica* Sieboldt.), japanische, 5. t. k. Japan.

Pseudo Ginseng Wall. (= *Schinseng* var. *nepalensis* N. E.), unächte Ginseng-K., 5. t. Nepal.

simplex Forst. (= *simplicifolium* Dietr.), einfache, 5. k. t. Neuzeeland.

speciosus W. (= *spinousus* Poir. = *undulatus* H. B. K.), prächtige, 5. w. Südamerika.

trifolius L. (= *pusillus* Sims, = *Aralia triphylla* Poir.).

Panciatia purpurea Picc, v. *Cadia purpurea*, p. 142.

Pancratio - Crinum disticho - capense Herb., v. *Crinum capense*.

Pancratiun L., Gilgen, (Machtlilie).

I. *Hymenocallis* Salisb. et Herb.

amoenum Salisb. (= *excisum* L. fil. = *fragrans* Redout. = *Hymenocallis sessilis* Salisb.).

caribaeum L. (= *declinatum* Jacq. = *fragrans* W. = *speciosum* Redout. = ? *americanum* Mill.).

carolinianum Catesb. (= *pluriflorum* Ker, = *Hymenocallis rotata quadriflora* Herb. = *Ismene Knighthii* Kn. et West.), carolinische, 4. Zw. Wa. k. f. b. Virginien, Carolina, Florida.

β) *mexicanum* Walt., L. (= *disciforme* Redout. = *rotatum* Ker, = *Hymenocallis lacera* Herb. = *H. mexicana* Herb. = *H. paludosa* Salisb.).

glaucum Zuccar., blaugrüne, 4. Zw. w. Mexico.

litorale Jacq. (= *Hymenocallis adnata* Herb. = *H. litoralis* Salisb.), α) *Dryandri* Ker, (= *P. mexicanum* Hort.), β) *distichum* Bot. mag. (= *Hymenoc. adnata disticha* Herb.), γ) *acutifolium* Sweet, (= *P. mexicanum* Lindl.), δ) *Staplesii* Herb.

ovalifolium (Herb.); eiblätterige, 4. Zw. w. Westindien.

ovatum Mill. (= *amboinense* β L. = *amoenum* Andr. = *Hymenocallis amoena* β *ovata* Herb. = *H. spiralis* Lee).

patens Redout. (= *declinatum* Redout.), β) *Hymenocallis caymanensis* Herb.

pedale Schult. (Herb.), fußhohe, 4. Zw. w. Brasilien.

quitoense Schult. (Herb.), quitoische, 4. Zw. w. Quito.

repandum (F. Otto), ausgeschweifte, 4. Zw. w. Mexico.

speciosum Salisb. (= *caribaeum* Curt. = *formosum*

Hort. = *Crinum speciosum* Hort.), β) *latifolium* Mill.

tenuiflorum Herb., dünnblumige, 4. Zw. w. ? Südamerika.

tubiflorum Schult. (Herb.), röhrenblumige, 4. Zw. w. Guiana.

Außerdem gehören zu dieser Abtheilung noch folgende: *angustum* Ker, *expansum* Sims, *guianense* Ker.

II. *Schizostephanium* Rehb.

aegyptiacum Lodd. (= ? *illyricum* Forsk.), aegyptische, 4. Zw. w. ? Aegyten.

illyricum L. (= *stellare* Salisb. = *Halmyra stellaris* Salisb.).

Hierzu die übrigen p. 582 verzeichneten Arten, welche unter voriger Abtheilung nicht erwähnt worden.

Zu welcher Section nachstehende gehören, ist mir unbekannt, als: *abchasium* Booth, *guadelupense* Hort., *humile* Cav., *ornatum* Bouché, *parviflorum* Dsf., *Tagliabue* Colla, *uniflorum* Don.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Chlidanthus*, *Chrysihiala*, *Eurycles*, *Ismene*, *Liriope* und *Stenomesson*.

Pandanus L. fil., Schraubenbaum.

bromeliaefolius Lodd., Dsf., Bromeliablätteriger, h. w. Bourbon.

conoideus Pet. Th., kegelförmiger, h. w. Madagascar.

humilis Rumph, (= *montanus* Bory, = *polycephalus* Lam.).

maritimus Pet. Th., Meerstrandliebender, h. w. Mascarenas.

pygmaeus Pet. Th., zwergiger, h. w. Mascarenas.

reflexus Lodd., Dsf., zurückgebogener, h. w. Mascarenas (Bourbon), Ostindien.

Pandanus

- sylvestris* Rumph., (= *ceramicus* Rumph., = *conoideus* Lam.), wilder, ♀. w. Molucken.
utilis Bory, (= *odoratissimus* Jacq., non L. = *nudus* Pet. Thouars).
 Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch folgende aufgeführt: *amarylloides* Parment., Dsf., *angustifolius* Hort., *graminifolius* Hort. belg., *mauritanus* Hort. belg., *proliferus* Hort. belg., von welchen mir das Vaterland unbekannt ist. — *P. fuscatus* Hassk., Samak Hassk. auf Java heinnisch, scheinen noch nicht eingeführt.

Panicum L., Hirse, Fennich.

- aglutinans* Kunth, (= *arborescens* Sieber, non L. = *divaricatum* var. Lam. = *glutinosum* Lam. = *orino-cense* W.), anklebendes, 4. ♀. w. Südamerika.
altissimum DC., Hornem., non Mey., höchster, ♂. f. ?
australe Speg. (= *striatulum* Schult. = *striatum* RBr., non Lam. = *Paspalum patulum* Hornem.), neuholländischer, 4. k. Neuholland.
capillare Gronov., L. (= *strigosum* Mühlbg.), β) *philadelphicum* Bernh. (= *porphyrium* Trin.).
cayennense Lam. (= *floribundum* Rich. = *pedunculare* W. herb.), cayennischer, 4. w. Guiana, Brasilien.
denudatum Kunth, (= *Digitaria concinna* Schrad. = *D. denudata* Lk. = *Reimaria purpurascens* Lk., p. 680), nackter, 4. w. ? Südamerika.
eruciforme Sibth. (= *cruciforme* Auct.), raupenförmiger, ♂. 4. k. Griechenland.
Hoffmannseggii R. et S. (= *eriophorum* Lk. = *villosum* Hoffm.), Hoffmannsegg's, 4. w. Brasilien.
jumentorum P., β) *laeve* Lam.
junceum N. E., simsenförmiger, ♀. w. Brasilien.
laxum Sw. (= *agrostidiforme* Raddi, = *diandrum* Kunth, = *tenuiculum* Mey.).
Maximiliani Schrad., Maximilian's, 4. w. Brasilien.
megiston Schult. (= *altissimum* Mey., N. E., non L. = *elatius* Kunth, non L. = *tuberculatum* Presl).
miliaceum L., c) *aureum*.
monostachyum H. B. K. (= *cultratum* Trin. = *Thrasya cultrata* N. E.), einähriger, 4. w. Orinoco.
monostichum H. Berol., einzeiliger, ♂. m. f. Abyssinien.
muricatum Retz, (= *violaceum* Rottl. = *Isachne dispar* Trin. = *I. muricata* N. E.).
Myurus Lam. (= *amplexicaule* Rudge, = *caudatum* W. herb. = *interruptum* W. herb. = ? *Myosurus* Rich. = *Hymenachne amplexicaulis* N. E. = *H. Myosurus* N. E. = *H. Myurus* P. B.), mäuseschwanzähnlicher, 4. w. Südamerika.
nitidum Lam. (= *angustifolium* Trin. = *laceolarium* Trin.).
pallens Sw. (= *agrostideum* Salzm. = *Agrostis nutans* Poir. = *Apluda Zeugites* Aubl. = *Vilfa nutans* P. B.), bleicher, 4. w. Westindien. Südamerika.
palmatifolium Poir. (= *plicatum* W. Enum. = ? Lam.), palmenblätteriger, 4. w. Ostindien.
paspaloides P. (= *affine* N. E. = *beckmanniaeforme* Mikan, = *brizoides* Lam. = *fluitans* Delil., Mey. = *truncatum* Trin. = *Digitaria affinis* R. et S. = *D. appressa* P. = *Paspalum appressum* Rich.), pflan-

Panicum

nengrasähnlicher, ☉. 4. f. w. Nordafrika, Südamerika.

plantagineum Lk. (= *Leundri* Trin.), wegtrittähnlicher, ☉. f. m. w. Brasilien.

prostratum Lam. (= ?*barbatum* Lam. = *caespitosum* Sw. = *grossarium* Auct., non L. = *marginatum* Vahl, = *procumbens* N. E. = *repens* Burm., Roxb. = *segiterum* Retz, = *Sieberi* Lk. = *subcordatum* Roth, = *umbrosum* Retz, = *Digitaria umbrosa* P. = *Echinochloa setigera* R. et S. = *Setaria barbata* Kunth, = *S. geniculata* Sieb. = *S. subcordata* N. E. = *S. umbrosa* P. B.), gestreckter, ♂. 4. w. Ost- und Westindien, Arabien, Aegypten.

pubescens Lam., Mchx. (= *angustifolium* Ell. = ?*consanguineum* Kunth, = *debile* Torr. = *Enslinii* Trin. = *hirsutum* β Lam. = *lanuginosum* Ell. = *laxiflorum* Lam. = *nitidum* Torr. = *pauciflorum* Bosc, = *pumilum* Bosc, = *velutinum* Bosc, = *villosum* Ell. ? Nutt.), weichhaariger, ☉. f. Nordamerika.

pulchrum H. Berol., schöner, ☉. f. Nepaul.

radicans Retz, (= *accrescens* Trin. = *hirsutum* Lam. = *multinode* Lam. = *obliquum* Roth, = *patens* Spgl., non L.), wurzelnder, 4. k. China, Nepal.

rectum R. et S. (= *depauperatum* Mühlbg. = *strictum* Pursh), gerader, ☉. f. Pennsylvania.

Rudgei R. et S. (= *pilosissimum* Roth, = *scoparium* Rudge), Rudge's, 4. w. Südamerika.

scaberrimum Lagasca, (= ?*ligulare* N. E.), schärfster, 4. k. Mexico.

Schraderi Kunth, (= *bifasciculatum* Trin. = *fasciculare* Schrad. = *fasciculatum* Hort. = *Digitaria fascicularis* Lk. = *D. villosa* H. Vindob. = *Reimaria fascicularis* Lk.), Schrader's, ☉. f. ?

stoloniferum Poir. (= *brachyclados* Rehb. = ?*caespitosum* Sw. = *frondescens* Meyer, = *olyraefolium* Raddi), sprossender, 4. w. Südamerika.

uncinatum Raddi (= *glandulosum* N. E. = *heteranthum* Lk. = *Echinolaena polystachya* H. B. K.), hakigekrümmter, 4. w. Südamerika.

vimineum Schrad., ruthenförmiger, 4. w. Brasilien.

crusgalliforme Brotero, xiphostadeum Brotero, gehören wahrscheinlich zur Gattung Oplismenus Sect. Echinochloa, desgl. P. zonale Gussone, arborescens L. (= *glaucescens* Lam.), v. *Ludolfia glaucescens*, p. 479. Die übrigen anlangend siehe die Gattungen Cynodon, Digitaria, Oplismenus, Paspalum, Pennisetum et Setaria, Tricholaena.

Panke acaulis Molina, (= *tinctoria* Auct.), v. *Gunnera scabra*, p. 276, II., *sonchifolia* W., v. *Frankoa sonchifolia*, p. 337.

Panopsis hamelifolia Salisb., v. *Rhopala sessilifolia*, p. 686.

Panzeria canescens Bunge, *lanata* P. (= *tomentosa* Mch.), *multifida* Mch. (= *sibirica* Hort.), *tatarica* Hort. (= *tripartita* Mch.), v. *Leonurus canescens*, *lanatus* etc., p. 453 et p. 349, II.

Papaver T., Mohn.

amoenum Lindl. (= *chinense* Hort.), lieblicher, ☉. f. Nordostindien.

Papaver

- apulium Tenore, apulischer, ☉. f. Süditalien.
 Argemone L. (= *clavigerum* Lam.), β) paucisetum H. Berol., γ) maritimum Wither.
 argemonoides Cesati, argemoneähnlicher, ☉. f. Italien.
 caucasicum MB., α) genuinum, β) floribundum Dsf. (= *virgatum* Rees), γ) fugax Poir. (= *caucasicum* C. A. Mey.), δ) armeniacum Poir. (= *Argemone armeniaca* L.), ε) hispidum Dsf. (= *spectabile* Lk. = *ibericum* Hort.), ζ) persicum Hort. Dijon., η) ramosissimum H. Prag. Persien, Armenien, Caucasus.
 croceum Ledeb. (= ? *alpinum* Sievers, = *alpinum* δ *croceum* Fisch. et Mey.), β) rubro aurantiacum Fisch. γ) microcarpum DC. (= *alpinum* γ Fisch. et Mey. = *miniatum* Rehb.).
 dubium L. (= *parviflorum* Lam. = *segetale* β Spenn.), b) albiflorum.
 garielinum Burch. (= *aculeatum* Thbg.).
 laevigatum MB. (= *glabellum* Stev. = *dubium* β Elkan).
 nudicaule L. (= *alpinum* α Fisch. et Mey. = *radicatum* Rottb.).
 pavoninum Fisch. et Mey. (= *hybridum* Karel. et Kiril.), Pfauen-M., ☉. f. Soongaria.
 somniferum L., A. seminibus nigris, α) setigerum DC., β) nigrum, B. seminibus albis, γ) album (= *officinale* Gmel. = ? *indehiscens* Dumort.), var. aegyptiacum Fisch. et Mey.

Gartenvarietäten: coccineum, Maximiliani H. Jenens., Murselli, tauricum etc. Zu ergänzen p. 585.

Papaya G., *Carica* G. (= *communis* Poir.), *cauliflora* Poir. etc., v. *Carica* *Papaya* etc., p. 166.

Pappophorum Schreb., Federgranne.

alopeuroideum Vahl, (= *Saccharum pappiferum* Lam.), fuchsschwanzähnliche, 4. w. Südamerika.

Papyrius Lam., *japonicus* Lam. (= *polymorphus* Cav.), v. *Broussonetia papyrifera*, p. 133.

Papyrus W. Thouars, H. B. 1).

antiquorum W. (= *domesticus* Poir.).

Paranomus adiantifolius Salisb., *crithnifolius* Salisb., *sceptriformis* Salisb., v. *Nivenia spathulata*, *spicata*, *media*, p. 549.

Parapelalifera odorata Wendl., *serrata* Wendl., v. *Barosma serratifolia* et β, p. 114.

Parastranthus G. Don.

luteus DC. (= *simplex* G. Don).

variifolius G. Don, v. *Lobelia* Sect. VIII., p. 473.

Paratropia DC., Paratropie, V. v., Araliaceae.

terebinthinacea Arnot, (= ? *Hedera terebinthinacea* Vahl, = ? *Heptapleurum stellatum* G.), Terpentin-P., 5. w. Ceylon.

Parietaria T., Glaskraut.

alsinefolia Delil., mierenblättriges, ☉. f. Aegypten.
 cretica L. (= *bracteata* Mch.).

1) Zu dieser Gattung die wesentlich von *Cyperus* nicht verschieden ist, hat man aufer den p. 586 verzeichneten Arten noch folgende *Cyperus* gestellt, als: *P. comosus* H. B. (= *Cyperus affinis* R. et S.), *P. corymbosus* N. E. (Rottb.), *P. elegans* Don (L.), *P. latifolius* W. (= *Cyperus eminens* Klein), *P. madagascariensis* W. (R. et S.), *P. Pangorei* N. E. (Rottb.), *P. venustus* N. E. (RBr.). Einige derselben werden kultivirt, vergl. p. 245 et p. 183, II.

Parietaria

diffusa M. et K. (= *judaica* Schkr. = *ramiflora* Mch.).

filiformis Tenore, fadenförmiges, ☉. f. Insel Caprea.

arborea Ait., v. *Gesnouinia arborea*, p. 261, II., *prostrata* Spgl. (= *serpyllifolia* Poir.), v. *Pilea serpyllifolia*.

Parilium arbor tristis G., v. *Nyctanthes arbor tristis*, p. 551.

Paris L., Einbeere.

incompleta MB. (= *apetala* Hoffm. = *octophylla* Hoffm. = *Demidoria polyphylla* Hoffm.).

obovata Ledeb., verkehrteiförmige, 4. f. Sibirien.

Paritium Adr., Juss., St. Hil. (= *Pariti* Adans.), XVI. VIII., Malvaceae.

abutiloides G. Don, (= *Hibiscus abutiloides* W. = *pernambucensis* Bertol.).

gangeticum G. Don, (= *Hibiscus gangeticus* Roxb. = *Lampas* Cav.).

macrophyllum G. Don, (= *Hibiscus macrophyllus* Roxb., Hornem.).

tiliaceum Adr., Juss. (= *circinnatum* G. Don, = *Hibiscus cicirnnatus* W. = *guineensis* DC.).

β) *elatum* G. Don, (= *Hibiscus elatus* Sw.).

tricuspe G. Don, (= *Hibiscus tricuspis* Cav. = *hastatus* L. fil.).

Wrayae Walp. (= *Hibiscus Wrayae* Lindl.), Wraya's, h. t. w. Neuholland.

Parnassia T., Sumpfleberblume.

caroliniana Mchx. (= *americana* Mühlbg. = *ovata* Ledeb.).

grandiflora DC. (= *speciosa* H. angl.), großblumige, 4. f. b. Nordamerika.

palustris L. (= *europaea* P. = *vulgaris* Cours.).

β) *parviflora* DC., γ) *tenuis* Wahlbg.

Paronychia Adans., Juss., Nagelkraut.

arabica DC. (= *Corrigiola albella* Forsk. = *Illecebrum arabicum* L.), arabisches, ☉. f. Arabien.

argentea Lam. (= *glomerata* Mch. = *hispanica* Lam. = *italica* Poir. = *narbornensis* Poir. = *nitida* G. = *vulgaris* Dsf. = *Illecebrum italicum* P., Vill. = *I. narbornense* Vill. = *I. Paronychia* L.), silberfarbiges, 4. k. Südeuropa.

bonariensis DC. (= *brasiliانا* DC. = *Illecebrum brasilianum* Steud.), bonarisches, 4. k. t. Bonaria, Brasilien.

capitata Lam. (= *rigida* Mch.).

dichotoma Fenzl, non Nutt. (= *Anychia dichotoma* Rich., Mchx., p. 67, = *Queria canadensis* L.), β) *capillacea* Torr. (= *Anychia capillacea* DC., p. 870).

nivea DC. (= ? *aragonica* Schult. = *maritima* Auct. = *Illecebrum cephalotes* MB. = ? *I. maritimum* Vill. = *I. niveum* P.).

polycnemoides Schldtl. (= *ramosissima* Schldtl.), knorpelkrautähnliches, 4. k. Mexico.

Achyrantha Dsf., *ficoidea* Dsf., *frutescens* Dsf., v. *Alternanthera Achyrantha*, *ficoidea* et *frutescens*, p. 40, *pubescens* DC., v. *Herniaria pyrenaica*, p. 296, II., *striata* DC., v. *Polycarpon tetraphyllum*, p. 641, *tenella* Dsf., v. *Alternanthera tenella*, p. 28, II., *verticillata* DC., v. *Illecebrum verticillatum*.

- Parrotia** C. A. Mey. (Parrot, k. russ. Hofrath u. Prof. zu Dorpat), V. (VII.) II., Hamamelideae.
persica C. A. Meyer, (= *Hamamelis persica* DC.), persische, f. f. Nordpersien, Caucasus.
- Parrya** RBr., Parrya.
stenoloma Schrenk et C. A. Mey., schmalsäumige, 4. f. Soongarien (Berg Tarbagatai).
Parsonsia corymbosa RBr. et *floribunda* RBr., v. *Forsteronia corymbosa* et *floribunda*, p. 246, II.
Parthenium luteum Sggl., Lk., v. *Guizotia oleifera*, p. 370.
- Pascalialia** Ortega, Pascalie.
glandulosa Fisch., drüsige, ? 4. k. ?
baccata Sggl., v. *Wulfia stenoglossa*.
- Pasithea** Don, Pasithea, VI. I., Liliaceae, Asphodeleae-Conanthereae Endl.
coerulea Don, (= *Anthericum coeruleum* R. et P. = *Phalangium coeruleum* Poir. = *Stypandra coerulea* RBr.), blaue, 4. k. Chili.
- Paspalum** L., Pfannengras.
barbigerum Kunth, (= *barbatum* N. E. = *Panicum excelsum* Sggl.), härtiges, 4. w. Brasilien.
chrysotrichum Schrad., goldhaariges, 4. w. Brasilien.
commutatum N. E. (= *dissectum* L. syst. nec spec.), verwechseltes, 4. w. Brasilien.
conjugatum Berg. (= *ciliatum* Lam. = *supinum* Bosc, = *Panicum tenue* G.).
corcovadense Raddi, (= *lanceolatum* Mikan, Lk. = *plantagineum* N. E.), corcovadoisches, 4. w. Brasilien.
densum Poir. (= *millegranum* Schrad. = *virginicum Linneanum* Raddi, = *vulnerans* Salzm.), dichtes, 4. w. Brasilien.
dilatatum Poir. (= *ovatum* N. E. = *platense* Sggl. = *Selloi* Sggl. herb.), verbreitertes, 4. w. Montevideo.
 β) *erriophorum* Schult. (= *lanatum* Sggl.).
dissectum L. spec. (= *Panicum dissectum* L.).
dubium DC. (= *pubescens* Hort. = *supinum* H. Hafn.).
elegans Flügge, β) *robustum* Lk.
exasperatum N. E. (= *aureum* H. B. K. = *Cabrera chrysolepharis* Lagasca), rauhes, 4. w. Brasilien.
filiforme Flügge, (= *carolinianum* Poir. = *Agrostis jamaicensis* Poir. = *A. lenta* Ait. = *Axonopus panicus* P. B. = *Digitaria filiformis* Mhlbg. = *D. pilosa* Mchx. = *D. villosa* P. = *Milium panicum* Sw. = *Panicum filiforme* L. = *Syntherisma villosa* Walt.), fadenförmiges, \odot . f. Nordamerika, Westindien.
glabrum Poir. (= *ischnocaulon* Trin.).
inaequale Lk. (= *Digitaria inaequalis* Sggl.), ungleiches, \odot . f. Manilla.
incertum R. et S. (= *leptostachyum* DC. = *pubescens* Hort.), ungewisses, 4. w. ?
Lagascae R. et S. (= *ferrugineum* Trin. = *Meyerianum* Sggl. = *paniculatum* Lam. = *pubescens* Lagasca, = *quadrifarum* H. Berol. = *variegatum* Lk.), Lagasca's, 4. w. Havanna, Montevideo.
membranaceum Lam. (= *Commersonii* Zucc. = *elegans* Hort. = *Ceresia elegans* P. = *C. membranacea* P. B.).
paniculatum L. (= *compressicaule* Raddi, = *hemisphaericum* Poir. = *strictum* P.), rispiges, 4. w. Südamerika.

Paspalum

pulchellum H. B. K. (= *tristachyum* W. herb. = *Reimaria elegans* Flügge), schönes, 4. w. Südamerika.
 scrobiculatum L. (= *Commersonii* Lam. = *coromandelinum* Lam. = *frumentaceum* Rottl. = *longifolium* Hort. = *venustum* Forst.).

undulatum Poir. (= *marginatum* Spgl. = *montevidense* Spgl. = *plicatulum* Mchx. = *plicatum* P. = *virgatum* Lecont.), wellenförmiges, 4. k. Nord- u. Südamerika.

velutinum Kunth, (= *Milium filiforme* Sessé, = *M. velutinum* DC.), samanthaariges, ☉. f. Mexico.

Walterianum Schult. (= *membranaceum* Walt. = *vaginatum* Ell., non Sw.), Walter's, ☉. f. Georgia.

Unbestimmt: polygonatum Brotero.

annulatum Flügge, v. *Helopus annulatus* Nachlese.

Passerina L., Spatzenstrauch.

annua Wickstr. (= *P. Stelleri* Ram. = *Stelleria annua* Salisb. = *St. Passerina* L.).

calycina DC. (= *juniperifolia* a Lapeyr. = *Daphne calycina* Lapeyr.).

dichotoma Steud. (= *Stelleria dichotoma* Fisch., Sweet), zweizinkiger, ☉. f. Dahurien.

grandiflora L. fil. (= *uniflora* β *alba* Berg.).

spicata L. fil. (= *lateriflora* Wendl. = *Struthiola litoralis* Wendl.).

Unbestimmtere: cupressoides Hort., pubescens Wickstr. (= *Daphne pubescens* L. fil.), salsolaefolia Poir.

conglomerata Thbg. (= *glomerata* Auct.), *eriocephala* Thbg., *purpurea* Wickstr., v. *Lachnaea conglomerata*, *eriocephala*, *purpurea*, p. 441, *uniflora* L., v. *Cryptadenia uniflora*, p. 173, II.

Passiflora L., Juss., Passionsblume ¹⁾).

actinia Hook., actinienblumige, \mathfrak{f} . Sch. w. Brasilien.

alata Ait., b) Buonapartii H. gall. et belg., c) alato-coerulea Lindl.

alba Lk. et Otto, weisse, \mathfrak{f} . Sch. w. Brasilien.

bahiensis Kl., Bahia-P., \mathfrak{f} . Sch. w. Bahia.

bicornis Mill., zweihörnige, \mathfrak{f} . Sch. w. Carthagen.

brasiliensis Dsf., brasilianische, \mathfrak{f} . Sch. w. Brasilien.

capsularis L. (= *Granadilla capsularis* Medic.), kapselförmige, \mathfrak{f} . Sch. w. Westindien, Brasilia.

cephaleima Bory, kopfähnliche, \mathfrak{f} . Sch. w. Brasilien.

coerulea L., b) coeruleo-racemosa Sabine, c) angustifolia W. E. (= *stenophylla* Hffg.) etc.

1) Morren (Prof. d. Botanik zu Lüttich) berichtet in den Recherches littéraires sur les fleurs de la passion etc. im Bulletin de l'Académie royale des sciences etc. de Bruxelles: Dafs vor 1609 keine Passifloren in Europa kultivirt wurden, 1609 findet man *P. incarnata* in Bologna, 1625 in Rom, 1629 in England und 1682 in Belgien; 1625 kannte man *P. coerulea*. *P. lutea* (aus Virginien und Jamaika) ist 1640 in Padua, 1714 in England eingeführt worden; 1660 hatten die belgischen und holländischen Gärten schon *P. hirsuta* und *minima*, wovon die erste 1778, die zweite 1690 nach England kam. Im 17. Jahrhundert hatte man 5 Passifloren, im 18. Jahrhundert wurden 24 eingeführt, und im 19. Jahrhundert 46. Die Zeichen des Leidens Christi bemerkte man zuerst an der *P. incarnata* und der Jesuit Ferrari hat im 17. Jahrhundert am meisten dazu gedient diese Idee zu verbreiten. Die erste Abbildung von Passiflora ist von Joh. de Laet in *Historia naturalis Brasiliae*. Lugdun. Batav. 1698 nach der Zeichnung von Marcgrave, der 9 Arten entdeckte.

Passiflora

- discolor Lk. et Otto, (= *Maximiliani* Bory, = *Vespertilio* Ker, non L.).
- exsudans Zuccar., ausschwitzende, ♀. Sch. w. Mexico.
- filamentosa Cav., b) odorata Hort.
- Hermanni DC., Herrmann's, ♀. Sch. w. Curaçao.
- hirsuta L., non Lodd. (= *parviflora* Sw.).
- hispidula Knowl. et Westc., steifhaarige, ♀. Sch. w. ?
- incarnata L. (= *rigidula* Jacq. fil. = *Granadilla incarnata* Med., Mch.).
- kermesina Lk. et Otto, b) Lemicheziana Neum. (kermesino-alata).
- lancifolia Dsf., lanzettliche, ♀. Sch. w. Antillen.
- litoralis Kunth, Seestrands-P., ♀. Sch. w. Peru.
- lunata Sm., non Juss. (= *biflora* Lam. = *Vespertilio* Lawr., non L.).
- minima L., Jacq. (= *glabra* Mill., non Wendl.).
- Mooreana Hook., Moore's, ♀. Sch. w. Bonaria.
- multiformis Jacq. fil. (= *caracasana* W. Enum.), vielgestaltige, ♀. Sch. w. Caracas.
- phoenicea Lindl, hochrothe, ♀. Sch. w. Südamerika.
- pseudo-suberosa Fisch., unächt-korkige, ♀. Sch. w. Brasilien.
- Selloi Dehnh. (= ? *sanguinea* H. Berol. ? Colla), Sellow's, ♀. Sch. w. Brasilien.
- sicyoides Cham., Schldl. (= *odora* Lk., Otto), haargurkenähnliche, ♀. Sch. w. Mexico.
- suberosa L. (= *hederaefolia* a Lam. = *nigra* Jacq. ? Lam. ? = *Cieca nigra* Medic. = *C. suberosa* Mch. = *Granadilla suberosa* G.).
- subpeltata Ortéga, fastschildförmige, ♀. Sch. w. Neuspan.
- theobromaefolia DC. (= *guazumaefolia* Jacq.), Cacao-baumblättrige, ♀. Sch. w. ?
- tuberosa Jacq. (= *picta* Hortul. = *punctata* Lodd., non L.).
- variegata Mill. (= *foetida* L. var. ?), bunte, ☉. ♂. w. Westindien.
- velutina DC., sammthaarige, ♀. Sch. w. Brasilien.
- verruculosa Weinm., kleinwarzige, ♀. Sch. t. Neuholland.
- verrucifera Lindl., warzentragende, ♀. Sch. w. Brasilien.
- Vespertilio L. (= *Granadilla Vespertilio* Mch), fledermausblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.
- violacea Jacq. fil., ? Arrabida, violette, ♀. Sch. w. Brasilien.
- linearis, longiglandulosa, microcarpa, Middletoniana (= *fragrans*), Neillii, Neumanni, nivea Stewardsiana, Wallichiana, sind wohl zum Theil Hybriden.
- pinnatistipula* Cav. (= *pinnipes* Sm.), v. Tacsonia
- pinnatistipula*, p. 796.
- Pastinaca** T., Pastinac.
- dasyantha C. K. (= *Malabeila dasyantha* F. et. Mey.), wollblumiger, ♂. Asiat. Rufsland.
- dissecta Vent. (= *Sekakul* Russel).
- divaricata Dsf. (= *graveolens* Salzm. = *Kochii* a Duby, = *saliva* Thomas, = *velutina* K.), ausgespreizter, 4. f. Corsica.
- intermedia Fisch. et Mey., mittlerer, ♂. 4. f. Asiat. Rufsland.
- involucrata C. Koch, eingehüllter, ♂. 4. f. Armenien. (Ob kultivirt?)

Pastinaca

latifolia DC. (= *Kochii* var. *latifolia* Duby), breitblät-
teriger, 4. f. Corsica.

obtusifolia DC. (= *Ferula obtusifolia* Speg. = *Peuce-
danum obtusifolium* Sib., Sm.), stumpfblättriger, 4.
f. Griechenland, Kleinasien.

panacifolia Fisch., Sweet, kraftwurzblättriger, 4. f.
Taurien.

rectistyla Cesati, (= *Heracleum aureum* β *multiradia-
tum* Cesati), geradegriffeliger, ♂. f. Italien, Griechenl.

selinoides Visiani, (= *Fleischmanni* Rehb., non Hladnik),
silgenähnlicher, ♂. f. Dalmatien.

Patagonium hedysaroides Schrank, v. *Adesmia muri-
cata*. p. 19.

Patrinia Juss., Patrinie.

heterophylla Bunge, verschiedenblättrige, 4. f. Nordchina.

intermedia R. et S. (= *nudiuscula* Fisch. = *Fedia
intermedia* Hornem.).

sibirica Juss. (= *coronata* Fisch. = *Fedia sibirica* G.,
Vahl, = *F. ruthenica* Mirb., Sweet, = *Valeriana
ruthenica* W. = *V. sibirica* L. = *Valerianella lu-
tea* Mch.).

villosa Juss. (= *Fedia villosa* Vahl, = *Valeriana vil-
losa* Thbg.), zottige, 4. f. b. k. Japan.

Patrisia pyrifera Rich., v. *Ryanea speciosa*, p. 709.

Pauletia Cav., *aculeata* Cav., *glaucescens* H. B. K.,

inermis Cav., *multinervia* H. B. K., v. *Bauhinia*

Pauletia, *glaucescens* etc., p. 115.

Paulownia Sieboldt et Zuccar., (zu Ehren d. Königin
von Holland so benannt), XIV. II., Personatae-Scro-
fularineae-Digitaleae.

imperialis Sieb. et Zuccar. (= *tomentosa* Steud. =
Bignonia tomentosa Thbg. = *Incarvillea tomentosa*
Speg.), kaiserliche, ⚭. f. b. Japan.

Pavetta Rheed., L., Pavetta.

angustifolia R. et S. (= *indica* Burm. = *Ixora an-
gustifolia* Lam.), schmalblättrige, ⚭. ⚭. w. Ostindien.

borbonica H. belg. et. gall., bourbonische, ⚭. ⚭. w.
Mascarenas.

b) *picta* van Houtte.

Brunonis Wall. (= *mollis* Wall.), weiche, ⚭. ⚭. w.
Ostindien.

caffra Thbg. (= *corymbosa* Houtt. = *thyrsiflora* Thbg.
herb. = *Crinita capensis* Thbg. = *Ixora alba* Burm.
= *I. caffra* Poir.).

fragrans Roxb., wohlriechende, ⚭. ⚭. w. Ostindien.

gracilis Rich., schlanke, ⚭. ⚭. w. Madagascar.

Griffithii ? Wall., Griffith's, ⚭. ⚭. w. Ostindien.

indica L. (= *alba* Vahl, = *Ixora Nunypapata* Roxb.
= *I. paniculata* Lam. = *I. Pavetta* Roxb.).

odorata Blume, gutriechende, ⚭. ⚭. w. Java.

Opulina DC. (= *Chiococca Opulina* Speg. = *Coffea
Opulina* Forst.), wasserdoldenähnliche, ⚭. ⚭. w. Neu-
Caledonien.

Pavia Boerh., Mill., Lam., Pavia.

macrostachya Lois., DC. (= *alba* Poir. = *edulis* Poir.
= *Aesculus macrostachya* Mchx. = *A. nana* Dsf. =
A. parviflora Walt., Mchx. = *Macrothyrsus discolor*
Pursh).

mutabilis Spach, veränderliche, ⚭. f. ?

Pavia

rubra Lam. (= *atropurpurea* Spach, = *Lindleyana* Spach, = *lucida* Spach, = *macrocarpa* Hort., Swt. *Michauxii* Spach, = *octandra* Mill. = *versicolor* Spach, = *Willdenowiana* Spach var.).

carnea Spach, *pallida* Spach, *Watsoniana* Spach, v. *Aesculus carnea*, *pallida et Watsoniana*, p. 22 et p. 12, II.

Pavinda capensis Retz, v. *Audouinia capitata*, p. 106.

Pavonia Cav., Pavonie.

hastata Cav., spontonförmige, ♀. w. Brasilien.

mollis H. B. K., weiche, ♀. w. Neugranada.

odorata W. (= *sidoides* Hornem. = *Hibiscus Chittle Benda* Roxb. = *H. morifolius* Rottl. = *H. odoratus* Roxb.).

pilosa W. Enum., behaarte, ♀. w. ?

platanifolia W. (= *acerifolia* Lk. = *Hibiscus acerifolius* DC. = *H. collinus* H. angl.).

Spinifex Cav., β) *aristata* Cavan.

pentacarpa Poir., Rchb. (= *veneta* Spgl.), v. *Kostelezkyia pentacarpa*, p. 337, II.

Pechea subcylindrica Pourr., v. *Crypsis schoenoides*.

Pectinatum napifolium Cass., v. *Centaurea napifolia*, p. 178.

Pectis L., Kammfederchen.

angustifolia Torr. (= *Pectidopsis angustifolia* DC.). schmalblättriges, ☉. f. Nordamerika.

prostrata Cav. (= *fasciculata* Poir. = *Chthonia prostrata* P. B.).

canescens H. B. K., *humifusa* Sw., v. *Lorentea canescens et humifusa*, p. 372.

Pedicularis T., Scepterkraut.

abrotanifolia Steven, (= ? *myriophylla* Pall. = *verticillata* W.), stabwurzblättriges, 4. f. b. Sibirien.

atrorubens Schleich. (= *pennina* Gaud.).

elata W. (= *punicea* Pall.), hohes, 4. f. b. Sibirien.

elegans Don, Sweet, zierliches, 4. f. b. Sibirien.

gyroflexa Vill. (= *cenisia* Gaud. = *proboscidea* Gaud.).

lapponica L., lappländisches, 4. f. Nordeuropa.

longiflora Rudolph. (= *tubiflora* Fisch., Stev.), langblumiges, 4. f. b. Ostsibirien.

Portenschlagii Saut. (= *geminiflora* Portenschl.).

rubens Stephani, (= *comosa* γ Stev. = *incarnata* Pall. non Jacq. = *laciniosa* Pall. herb.), rötliches, 4. f. b. Sibirien.

speciosa Ledeb., prächtiges, 4. f. b. Sibirien.

uliginosa Bunge, (= *rubens* Ledeb., non Steph.), Sumpfliebendes, 4. f. b. Altaisches Sibirien.

uncinata Steph. (= *altissima* Pall.).

Pedilanthus Neck., Schuhblume.

angustifolius Poit. (= *cordatus* Spgl.), schmalblättrige, ♀. w. ? Westindien.

carinatus Spgl. (= *Crepidaria carinata* Haw. = *Euphorbia carinata* Don). Westindien.

cordellatus Haw. (= *Crepidaria cordellata* Haw. = *Euphorbia cordellata* Haw.).

Zu berichtigen p. 594.

Pedilonia violacea Presl, v. *Wachendorfia hirsuta*, p. 954.

Pedilonum secundum Blume, v. *Dendrobium secundum*, p. 195, II.

Peganum crithmifolium Eichw., v. *Malacocarpus crithmifolius*, p. 382, II.

Peireskia Lein. = *Pereskia*.

Pekea Aubl., *ternata* Poir., *tuberculosa* Aubl., v. *Caryocar glabrum et tomentosum*, p. 168. *P. Couroupita* Juss., v. *Lecythis bracteata*, p. 451.

Pelargonium L'Her., Kranichschnabel.

I. *Bossea* Rchb. (= *Cynosbata* DC.).

cynosbatifolium W. (= *oxaloides* Ait. = *oxoniense* v. Eeden).

II. *Campylia* Sweet.

carinatum Sweet, (= *Geranium ovatum* Cav. = *G. tricolor ovalifotium* Andr.).

holosericeum Sweet, (= *Ciconium velutinum* Hffg.).

III. *Chorisma* Lindl.

tetragonum L'Her. (= *Geranium tetragonum* L. = *Jenkinsonia tetragona* Sweet), b) *trigonum* (Scopol.).

IV. *Ciconium* Sweet.

adulterinum L'Her., β) *Curtisii* Hort. (= *neapolitanum* v. Eeden).

alnifolium W. (= *betulinum latifolium* Hort.).

ardens Sweet, (= *Geranium ardens* Andr. = ? *lobatofulgidum* Hybrid.), zierlicher, 4. k. t. Cap d. g. H.

balsameum Jacq. (= *cephalicum* Hffg.).

cordatum Ait. (= *cordifolium* Dietr. = *festivum* Hffg.).

crispum Ait., b) *minus* (= *Hospes* Hffg. = *pectinifolium* Sweet).

flavum Ait. (= *carotaefolium* Hffg.).

formosissimum Dsf. (= *acerifolium* L'Her. var. Spgl. = *angulosum formos.* P. = *angulosum speciosum* Hort. = *Boyleae* Sweet, = *formosum* Dsf. = *pulchrum* Hffg.), d) *multiflorum* v. Eeden, (= *fulgens* Hffg.).

glutinosum Ait., β) *denticulatum* Hort., γ) *jatrophaefolium* DC., δ) *laciniatum* Hort.

heterogamum Ait., L'Her. (= *homogamum* Hffg. = *quinquelobatum* Steud.).

incisum W. (= *monsoniaefolium* Fisch.).

laevigatum W., β) *compositum* L'Her.

lavateraefolium (Eckl., Zeyh.), Steud., *Lavaterablätteriger*, \mathfrak{H} . k. t. Cap d. g. Hoffn.

malvaefolium Jacq., β) *lateritium*.

nothum W. (= *lividum* Dietr.).

penicillatum W. (= *Geranium elegans* Dum. Cours.).

pinguifolium Sweet, (= *hepaticaefolium* Hoffg. = *Geranium hederinum fl. albo* Andr.), fettblättriger, \mathfrak{H} . k. t. Cap d. g. Hoffn.

primulinum Sweet, (= *crassicaule* L'Her. Ait. var. Spgl.).

pumilum W. (= *humile* Hort. = *stenopetalum* Ehrh. var. Spgl.).

Radula Ait. b) *revolutum* Jacq., c) *roseum* W. (= *rosodorum* Hffg.), d) *latifolium*, e) *terebinthinaceum*, f) *raduloides* Hort.

rigidum Don, W. (= *strictum* Dietr.).

rubrocinctum Lk. (= *imperiale* Hffg.).

saepiflorens Sweet, (= *Geranium echinatum saepiflorens* Andr. = *P. echinatum rubrum* H. angl. = *erythraeum* Hffg., non DC. = *reniforme-echinatum* ? Hybrid.), ostblumiger, \mathfrak{H} . k. t. Cap d. g. Hoffn.

saniculaefolium W. (= *cortusaefolium* Jacq., non L'Her.

Pelargonium

- = *hippocrepis* L'Her. = *Geranium hederacifolium* Dum. Cours.).
 scandens Ehrh. (= *Geranium acetosum roseum* Dum. Cours.).
 scaposum DC. (= *tomentosum* L'Her. mpt., non Jacq. = *trichostemon* β W. = *Geranium glaucum* Cav.), schaftiger, \S . k. t. Cap d. g. Hoffn.
 sidaefolium W. (= *rigidum* Wendl. = *spectabile* Hort.).
 speciosum W. (= *candidum* Sweet, = *elegans* Wendl., non W. = *formosum* Dietr.).
 splendens W. β) *ignescens* Sweet, (= *Geranium ignescens* Andr.).
 spurium W. (= *Kalmianum* van Eden, = *retusum* Hort.).
 stenopetalum Ehrh. (= *ribifolium* Dum.Cours., non Jacq.).
 tomentosum Jacq. (= *Geranium menthaeodorum* Nocca).
 b) *villosum* Spin. (non Sweet).
 trichostemon Jacq., haarfadiger, \mathcal{A} . \S . k. t. Cap d. g. H.
 trilobatum Schrad. (= *adulterinum* L'Her. var. Spgl. = *clandestinum* Spin.), dreilappiger, \S . k. t. Cap der guten Hoffnung.
 tripartitum W. (= *Jenkinsonia* t. Hffg. = *Ligularia trifida* Eckl., Zeyh.), β) *fragile* W. (= *Geranium fragile* Andr.), ? γ) *fraternum* Schrank.
 triste Ait. (= *tuberosum* Hort. = *Geranium triste* L. = *Polyactium triste* Eckl., Zeyh.), ? β) *villosum* Mill., ? γ) *pastinacaefolium* Mill., ? δ) *moestum* Hffg.
 villosum Sweet, (= *majestum* Hort. = *Royal George* Hort. = *regale* Hffg. = *Ligularia villosa* Eckl., Zeyh.), zottiger, \S . k. t. Cap d. g. Hoffn.
 Watsoni Lk. (= *cucullatum expansum* van Eeden, = *serotinum* Hort.).
 Willdenowii Lk. (= *formosum* Sweet, = *pulchellum* W. = *superbum* Dietr.).
 zonale Ait., b) *album* (= *leucanthum* Hffg.), d) *coccineum* (= *cocciniflorum* Hffg.), l) *clarum* Hffg., m) *crenatum* Hffg., n) *Rosula* Hffg., o) *speciosum* Hort.
 Die übrigen Variet. s. p. 599.

V. *Corthumia* Rchb. (= *Peristera* DC.).

- anceps* Ait.
australe W., Jacq. fil. (= *inodorum* Dsf.).
 ? β) *aemulum* Hffg.
glomeratum Donn, Jacq. fil. (= *australe* Sweet β W. Enum. = *aemulum* Hffg. = *Ger. glomeratum* Andr.).
Rodneyanum Lindl., Rodney's, \mathcal{A} . k. t. Inneres Neuholl.

VI. *Dimacria* Lindl., Sweet.

- affine* Sweet, (= *Geranium affine* Andr.), ähnelnder, \mathcal{A} . Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Andrewsii Sweet, (= *Geranium heterophyllum* Andr.), Andrew's, \mathcal{A} . Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.
apioides Steud. (= *apiifolium* Sweet, = *Geranium apiifolium* Andr., non Jacq.), sellerieähnlicher, \mathcal{A} . Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.
aristatum Sweet, (= *Geranium barbatum* var. *undulatum* Andr.).
astragalifolium P. (= *pinnatum* W. = *Geranium astragalifolium* Cav., Andr. = *G. pinnatum* L. = *Hoarea astragalifolia* Eckl., Zeyh.).

Pelargonium

foliolosum DC. (= *Geranium pinnatum* Andr. = *Hoarea foliolosa* Eckl., Zeyh.).

lanceolatum Sweet, Steud., lanzettblättriger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

recurvatum Sweet, (= *Geranium barbatum* var. *minor* Andr.), zurückgekrümmter, 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

setigerum Sweet, (= *Geranium barbatum* Andr., nec alior.), borstentragender, 4. Kn. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Die übrigen stehen unter Section Hoarea.

VII. *Grenvillea* Sweet.

conspicuum Sweet, (= *Grenvilleanum* Hort. = *Geranium Grenvilleae* Andr.).

VIII. *Hoarea* Sweet.

dioicum RBr. (= *Geranium melananthon* Andr., non Jacq.).

hirsutum Ait. (= *heterophyllum* L'Her., non Jacq.).

nutans DC. (= *flavum* Ait. var. Spgl. = *rapaceum luteum* Sins, = *Sweetianum** p. 600, non DC. = *H. carinata* Sweet, Eckl., Zeyh.).

pilosum P. (= *Geranium pilosum* Andr.), b) *bicolorum* Sweet, c) *blandum* Sweet.

roseum DC. (= *condensatum* P. = *Geranium roseum* Andr.).

Sweetianum DC. (= *H. elegans* Sweet), Sweet's, 4. Kn. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Zu dieser Section gehörige Hybriden sind p. 302, II. verzeichnet.

IX. *Isopetalum* Sweet.

Cotyledonis L'Her. (= *Geranium Cotyledonis* L.).

discipes Haw., Colv., scheibenstielliger, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnug.

X. *Jenkinsonia* Sweet.

Endlicherianum Fenzl, Endlicher's, 4. k. Westl. Taurusgebirge.

quinatum Sims, (= *Geranium praemorsum* Andr.).

XI. *Myrrhidium* DC.

artemisiaefolium DC. (= *fruticosum* W.), beifußblättriger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

athamanthoides L'Her., hirschwurzähnlicher, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

bullatum Jacq. (= *canaliculatum* Zuccag.? = *myrrhifolium* β W. = *Jenkinsonia bullata* Sweet), bauschiger ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

coriandrifolium Jacq. (= *Geranium coriandrifolium* L. = *Jenkinsonia coriandrifolia* Sweet).

longicaule Jacq. (= *lucerum* W. = *Jenkinsonia longicaulis* Sweet, Hffg.). ♂.

myrrhifolium Ait. (= *betonicum* Jacq.).

XII. *Otidia* Lindl.

alternans Wendl. (= *alternatim pinnatum* Wendl.).

crithmifolium Sm. (= *paniculatum* Jacq.).

XIII. *Phymatanthus* Lindl.

elatum Sweet, (= *Histrio* Hffg. = *Campylia elata* Eckl., Zeyh. = *Ger. tricolor arboreum* Andr.).

Serra Hffg. (= *coronopifolium* Hort., non Jacq.), sägezahniger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Hybriden: *grandiflorum* Sweet, *intertinctum* Sweet, *laciniatum* Hort., *latifolium* Colv., *villosum* Sweet.

XIV. *Polyactium* DC.

multiradiatum Wendl. (= *apiifolium* Jacq. fil.).

Pelargonium

XV. Seymouria Sweet.

dipetalum L'Her. (= *S. L'Heritieri* Sweet).

Hybriden und Gartenvarietäten.

A. Aeltere:

Abdalah Hort., abbreviatum Hort., Abron Hort., aciculare Hffg. (= *australe* β H. Berol.), acetosellum Hort., acinatum Hort., aconitifolium Hort., Actinogramma Hort., aculeatum Hort., Admiral Hort., Adonis Hort., adventitium Hort., aequaliflorum Colv., affine Sweet, Ahrenbergianum Hort. belg., aimable Rosette Hort., Albertine Hort., albidum Colv., albi-nense Hort., Alfred Hort., alienatum Hort., Aloysia-num Dehnh., altum Hort., amaranthe Hort., amarylloipes Hort., ambiguum Schult., Anersleyi Hort., angelicum Hort., Anna Botyis Hort., Anna Maria Hort., Anna Paulowna Hort., Annleyanum Hort., anomalum Hort., Apollo Hort., arboreum Hort., arietinum Hort., armatum Sweet, atrolaceum Hort., aurantiodorum Hffg. (= *ribifolium* Baum.), aureum Hort., Azalea Hort., bamburiense Hort., Banisterii Hort., Batscheba Hort., Bayleanum Hort., beau de vert Hort., Beauté supreme Hort., bella Donna Hort., belle Circassienne Hort., belle Henriette Hort., Berterianum Spin, Colla, (= *Nissonianum* Lecchi), Bethalina Hort., Bichonia Hort., Bischof of Salisbury Hort., Blandfordianum Sweet, (= *candidum* Lk. Enum.), Bluntianum Hort., Boila Hort., Boilese Hort., Bolivar Hort., Bristolianum Hort., Brown's Elisabeth Hort., Buls fine Sedling Hort., Burdini Colla, (= ? *elegantissimum* Hort. Burd.), Burnettianum Hort., Caledonia Hort., caleophyllum Hort., calycinum Sweet, (= *craterifolium* Hffg.), calographicum Hort., Camarum Hort., candidissimum Hort., Canedii Hort., Carolinianum Hort., caryophyl-laceum Sweet, castaliaefolium Hort., castilioanum Hort., Catharina Stuart Hort., cephalotes Hffg., ceri-num Sweet, chamaerhodon Hort., Chandleri Hort., clathratum Hort., Claudius Caesar Hort., Cleopatrae Hort., coecatum Hort., coerulescens Hort., Colleyanum Hort., coloratum Hort., conchyllatum Hort., conferti-folium Hort., Constantin Hort., contiguum Hort., con-volutum Hffg., coriaceum Hort., coronatum Hort., Couttsiae Hort., crassifolium Vent., crispolobum Hffg., crispum Sweet, crithmifolium Sweet, cruciforme Hffg., Cumadolianum Sweet, Cupido Hort., curinbetium Hort., cycloides Hffg., Czeonianum Hort., daedaleum Hort., Damsonia Hort., David Hort., Dawson Hort., De-fiance Hort., de galle Hort., degeneratum Hoffg., de-lectabile Hffg. (= *eximium* Hffg. = *spectabile pul-cherrimum* v. Eeden), delicatum Hort., Denisianum Hort., diaphanum Hort., dichotomum Otto et Dietr., dilatilobum Hort., dilutum Hort., Dodonaei Hffmsg. (= *glutinosa* v. Eeden), Don Juan Hort., Don Ni-clas Hort., double Pinks Hort., Drakeae Hort., du-bium Hort., Duc de Glochester Hort., Duc de Rutt-land Hort., Duc de York Hort., Duchesse of Kent Hort., durum Hffg., Eclips Hort., echinum Hort., egre-gium Hort. Belved. (= *divaricatum* Dietr. = *Fel-deri* Wendl.), elatum Sweet, elegans maximum Sweet,

Pelargonium

elegantulum Steud. (= *Dimacria elegans* Sweet), Eleonore Hort., Elisabeth Hort., Emilius Hort., Erdens Hort., eriophorum Hort., eriophyllum Sweet, (= *cordatum* b *tomentosum* Hort.), euryphyllum Hort., exquisitum Hffg. (= *superbum latifolium* Breit.), Facronia Hort., familiare Hoffinsg., Fanny Fawkens Hort., fastuosum Hort., Ferdinandeum Hort., Ferdinandsii Hort., ficifolium Hffg. (= *vitifolium planum* Hort.), flabellatum Dsf., ffammeum Colv., flamosum Hort., fleurs des Dames Hort., Flora Hort., flos jambae Sweet, foliaceum Hort., Formanni Hort., Francisii Sweet, fulminans Hffg. (= *propugnatum* Hffg.), fusciflorum Hort., gangrenosum Hort., geifolium Hort., gemellum Hort., Generalicinum Hort., Generalissimus Hort., George Hort., germanum Hort., glabrum Hffg., glaciale Hort., gloria mundi Hort., gloria of the Wat Hort., grandeur Hort., grand Duc de Toscane Hort., grand Monarque Hort., grand Sultan Hort., grand Usurpateur Hort., grinianum Hort., Harriet Hort., Helas Hort., helenium Hort., heraldicum Hort., Herzog Wellington Hort., Hesilrigeae Hort., heterotrichum Hort., Hogart Hort., holosericeum Hffg. (non Sweet), (= *inquinans* Hort. = *Ciconium velutinum* Hffg.), homonymum Steud. (= *Dimacria fulgens* Sweet), homophyllum Hort., hortensiaeflorum Hort., hortensioides Hort., Huskinsonia Hort., hymaenopterum Hort., Hynsiva Hort., iconicum Hort., Illecebrum Hort., illustrissimum Hort., imbutum Hort. (*Dimacria imbuta* Sweet), impurum Hort., instratum Hffg., interruptum Hort., Iphigenia Hort., Irbyanum Hort., Josephinae Lee, Kents purpureum Hort., Kernhoferianum Hort., King George Hort., King of England Hort., Kingii Sweet, Kingoditsiae Hort., Klierianum Hort., Knipeae Hort., König Salomon Hort., Kolowrator Hort., Krappianum Hort., La Bouretii Hort., laciniatum Sweet, (*Campylia* l. Sweet), lacteum Stoeetneri Hort., Laconiae Hort., Lady Bordin Hort., Lady Brindel Hort., Lady Broughton Hort., Lady Clifford Hort., Lady Clinton Hort., Lady Dawerby Hort., Lady Derby Hort., Lady Roccol Hort., Lady Rowdin Hort., Lady Sophie Hort., l'amitié Hort., Lamptonia Hort., lanceolatum Andr., laniflorum Hort., lanosum Hort., lanuginosum Hffinsg., lappaceum Hffinsg. (= *lobatum* Hort. = *platyphyllum* Hffinsg.), Lapparette Hort., lasiophyllum Hort., Lousadomium Hort., lautum Hort., laxulum Hort., Led sedling Hort., Le grand Hort., l'honneur d'Angleterre Hort., l'honneur d'Ahrenberg Hort., l'honneur de Bern Hort., l'honneur de l'Herme Hort., ligulum Hort., limbatum Hffg. (= *adulterinum* Wendl, non W.), limonium Hort., litigiosum Hort., longipes Hffg., longipetalum Hort., Lord Lee Hort., Lord Lauderdale Hort., Lord Lesalee Hort., Lord Louis Hort., Lord Wellworth Hort., Lord Withworth Hort., lotum Hort., Ludovicianum Hort., luisum Hort., luisante Hort., luridum Hort., lustrinum Hort., macrophyllum Voit., Madame La Valette Hort., Madame Cranthon Hort., magniflorum Hffg. (= *formosum grandiflorum* H. Cels. = *macranthum* Hffg., non Sweet), magnificum H. Cels. (= *magnificiens* v. Eeden),

Pelargonium

magsanthum Hort., Maidenblush Hort., Maid of Orleans Hort., majestuosum Hort., majestum Hort., malachraefolium Sweet, Mariane Hort., Maria David Hort., Marie Louise Hort., Markianum Hort., Medusatum Hort., melaneum Hort., melanophum Hort., micranthum Sweet, (Ciconium micr. Sweet), Miss arbutinor Hort., Miss Maitland Hort., Miss Ramster Hort., mollifolium Hort., mollissimum Hort., Mont Aetna Hort., Moreanum Hort., Morning Star Hort., mucronatum Hort., Mühlenbergii Hort., multifidum Hffg., mundulum Hort., nanum Sweet, (= *ignescens* var. Hoare), neglectum Schult., Nigritea Hort., Nimrod Hort., Niveusa Hort., nitidum Hort., non plus ultra Hort., nummularifolium Andr. (non Salisb.), obcordatum Hort., oblatifolium Hort., obtusidentatum Hort., Octavis Hort., odontophyllum Hort., odoratum Hffg. (= *speciosum odoratum* Wendl.), optimum Hffg. (= *africanum* Hort. Cels. = *odoratissimum africanum* van Eeden), opulifolium Sweet, (= ? *opulinum* Hffg.), pactum Fisch., pallidulum Hort., Pandora Hort., paradoxum Hort., Pavaeantum Hort., Perseverance Hort., phellodes Dietr. (= *quercifolium* H. Cels., non W.), Phyllis Hort., pilipes Hffg., Dietr., planiceum Hort., pleotrophyllum Sweet, politum Hort., polytrichum Hort., Porphyrio Hffg. (= *hybridum coccineum* Hort.), Poturi superbum Hort., praestantissimum Hort., princeps Episcopus Hort., princeps niger Hort., Princesse Auguste Hort., Princesse Charlotte Hort., Princesse de Galle Hort., Princesse Louise Hort., Princesse Mariane Hort., Princesse Sophie Hort., Principissae Hort., Prinz Blücher Hort., Prinz Charles Hort., Prinz de Coburg Hort., Prinz de Galle Hort., Prinz de Leopold Hort., Prinz of Oranien Hort., Prinz Regent Hort., Prinz royal de Würtemberg Hort., pudicum Hort., pullaceum Hort., Quendivii Hort., Quenii Hort., quercinum Hffg. (= *quercifolium* Hort., non Ait.), quinquecuspidatum Hort., quinquemaculatum Hort., Quin Schebas Hort., ranunculifolium Dietr., rarum Hffg. (= *speciosum* v. Eden), reformatum Hort., Reginae Hort., Reine d'Hongarie Hort., Reine de Paysbas Hort., repandum Hffg., rhodanthum Hort., Rhodiola Hort., rhodolentum Hort., ringens Sweet, Robertianum Hffg. Roccole Hort., Rochuter Hort., Roi Adonia Hort., Roi de Babylon Hort., Roi d'Angleterre Hort., Roi de Suabe Hort., Roi des Negres Hort., Roi George Hort., Rollissonii Hort., Rosamunde Hort., Rose brillant Hort., Rowanum Hort., Royanum Hort., rouge et noir Hort., rubrum Hort., rutaceum Hort., Salomon Hort., Scheridedon Hort., schizophyllum Hort., Schreiberianum Hort., Schwarzenbergianum Hort., schwarzer Prinz Hort., scutatatum Hort., sericeum Voit. siccifolium Hffg., Dietr. (= *novum* Hort.), signatum Hort., Smith's Hort., Sophia Hort., Souverain Hort., speciosissimum Andr., speculum Hort., Stadthalter Hort., Sternianum Hort., suberectum Hort., Suprema Hort., Susanna Hort., Sussy Hort., ternatifidum Dietr., transcendens Hort., triflexum Hort., trifoliatum Hort., trilingue Hffg. (= *balsameum speciosum* Hort.), 'Triumphe de Flore Hort., 'Triumphe de Gand Hort.,

Pelargonium

trivulnerum Hort., undulifolium Hffg. (= *floribundum* Breiter), undulopetalum Hort., ursinum Hort., valpium Hort., Vanberghianum Hort., Vandelim Hort., Van de six Hort., variifolium Hort., Veitchianum Hort., Venus Hort., vestitum Hffg. (= *conduplicatum crispum* Hort.), Violette du mond Hort., virginellum Hort., viridifolium Hort., volatiflorum Hort., Vulkan Hort., Wallnery Hort., Washington Hort., Waterloo Hort., Watsonianum Hort., Wellington Hort., Wellsianum Sweet, Wightinton Hort., William Prinz Hort., Youngii Sweet, Your fine scarlet Hort., Ypsilanti Hort., Zenobium Hort. etc.

B. Neuere:

Abbé Berlèze Hort. Par., Abbé Sicard Chauvière, Abderam Hort. Par., Absalon Hort. Par., Achilles Gainé's et Wilson, Achille Tatius Chauvière, Ackbar Hort. Par., Acne Hort., Acoris Hort. Par., Ada Hill et Ada Wilson, Adela Forster, Adèle Chauv., Adèle Banès Hort. Par., Adèle de Lacépede Lapersonne, Admirable Gaines, Admiral Hort., Adonis Chandler, Aeglator H. Par., Aetna Foster, Aglaja Foster, Ajax Chandler, Alarm Rendle, Alba perfecta de Jonghe et Thurtell, albidum Böckm., Alcide Hort. Par., Alexis de Jussieu H. Par., Alexandrinum Böckm., Alice Grey Wilson, Alicia Foster, Alicia superba Foster, Alonzo Gaines, Alpha Sheppard, Altensteinianum Hort., amabile Hort., Amélie Chauvière, Amethyst Garth, Amulet Foster, Anais Chauv., Angèle Hort. Par., Angola Beck, Anna Wilson, Annette Foster, Antiope Garth, Antoine Banès Hort. Par., Antonina Hort. Par., Appien Chauv., Apollo Hort., Arabella Gaines et Garth, Arabian Gaines, Aramis Hort. Par., Archbishop of Canterbury Master, Ariadne H. Par., Armeria Chauv., Armyntor, Ary Scheffer Chauv., Ascanio Hort. Par., Asfussia Wilson, Assasin Wilson, Astraea Hort., Athenais Hort. Par., Augusta Foster, Augustin Hort. Par., Aurèlie Hort. Par., Aurora Chandler et Wilson, Bacchus Beck, Baron de Sermet Chauv., Bathyanum Hort. Vindob., Baucis Hort. Par., Baverini Chauv., Beatrice Foster, Beauté de Paris Chauv., Beauté parfaite Dem., Beauty Foster, Beauty of Essex Hort. angl., Beauty of Ware Gaines, Beauty of Walthamstone Hort. angl., Beauty supreme Gaines, Bébé Chauv., Bélisaire Chauv., Belleperche Hort. Par., belle Adine Chauv., belle Gabriele Chauv., Bellona de Cannaert, Bellone Hort. Par., Bertha Foster, Bijou Garths, Bijou des Dames Böckm., Binocle de Jonghe, Blanche de Castille Hort., Black dwarf Garth, Black Knight Gaines, Black Prince Beck., Blanche Hort. Par., Blood royal Garth, Boileau Hort. Par., Boisjolin, Boissy Chauv., Bon ami Dubuisson Hort. Par., Bouquet tout fait Hort. Par., Bridegroom Foster, Bridesmaid Garth, Brillant Chauv., Britannia Garth, British Hero Henderson, Brutus Puxley, Byron Garth, Caffierii Hort. Par., Calypso Lem., Camilla Wilson, capitatum superbum Böckm., Captivation Gaines, Caroline Edge Chauv., Castiglione Hort. Par., Celestial Chandler et Thurtell, Céleste Hort., Cellini Chauv.,

Pelargonium

Cerrito Lumsden, Champion Chandler, Champion of Devon, Charles Chauv., Charles Poisot, Charles XII. Catleugh, Charlotte Léonard, Circe Garth, Citarius Hort., Clarissa Garth, Claude Lorrain Luscomb, Cleopatra Beck, Climax Garth, Clio Gaines, Clissoldi Smith, Clytie Hort., Colossus Foster, Columbus Garth, Commodore Hodges et Cunningham, comptum album et roseum Hort., Comte d'Alvarès Poisot, Comte de Lambertye Chauv., Comte de Paris Garth, Comte Dutertre Hort., Comus Foster, Condé Hort., Conflagration Foster, Conservative Garth, Consort (Lyne), Constellation Foster et Garth, Constance Gem, Coquette Garth, Coriolan de Jonghe, Cornelius Hort. Par., Cornet (Wightmann), Coronet Chauv., Corona Garth, Coronation Garth, Corticelli Hort., Cossack Gaines, Cotterstone Garth, Count d'Orsey Wilson, Countess Bathyany Hort., Countess Cowper Hort., Countess of Elden Gaines, Countess of Mount-Edgecombe Lyne, Countess of Munster Hort., Countess of Wilton Wilson, Creole Wilson, Cressida Morton's, Cuirassier Hort., Cupidon Hort., Cyclops Garth, Cynthia Hort., Cyrus Eyre, Daniel huet Hort., Daphné Hort., Decora Garth, Defiance Thurtell et Defiance Drury et Gaines, De Rougemont Alfred, Desdemona Beck et Thurtell, Diadematum roseum Böckm., Diadematum superbum novum Foster, Diadem Lyne, Diana Chandler, Dido Foster, Diodorus Hort., Diomède Hort., Discount Garth, diversum Böckm., Dobler Garth, Docteur Lindley Foster, Docteur Marjolin Chauv., Don Quichotte Hort., Douglasii Garth, Druid Hort. Par., Duc de Brabant de Jonghe, Duchesse de Nemours Chauv., Duhamel du Monçeau Hort. Par., Duke of Cornwall Gaines et Foxs etc., Duke of Devonshire Foster, Dumont d'Urville Chauv., Dumoulin Chauv., Duquesnoy Hort. Par., Dutchess of Kent Hort. angl., Dutchess of Leinster Gaines, Dutchess of Portland Hort. angl., Dutchess of Roxboro Hort. angl., Dutchess of Sutherland Gaines et Catleugh, Eclipse Catleugh, Edith Gaines, Edmond Hort., effulgens Böckm., elegans novum Gaines, elegantissimum Hort., Eliza sauvage Cook, Eliza superba Foster, Elizabeth Chandler et Elizabeth Garth, Elize Miellez, Emily Foster, Emma Chandler, Emperor Hodges, Emperor of Russia Gaines, Emperor superb Gaines, Empereur du Maroc Hort. gall., Enchantress Nairn et Wilson, Erasme Hort. gall., Erato Hort. Par., Erebus Garth, erectum Foster, Erington Lyne, Ernest Comte de Talleyrand Chauv., Eucharis de Jonghe, Eurydice Chauv., Euterpe Hort., Eva Chandler, Evelina Foster, excelsum superbum Hort., Exquisite Basket et Exquisite Gaines, Fabris Chauv., Fair maid of Devon Veitch, Fair maid of Leyton Wilson, Fandango Garth, Fascination Russell, Faunus Foster, Favorite Foster, Fearless Gaines, Felicie Desmar., Fingal Hort., Fireball Gaines, Firebrand Foster, Firefly Foster, Flambeau Garth, Flamingo Garth, Flash Garth, Fleury Chauv., Flore Chauv., Florence Garth, Fontana Chereau, formosissimum Gaines, Fosteri roseum et superbum, Free Briton Hort., fulgens Wilson,

Pelargonium

Fürchtegott Hort., Gasparino Hort. Par., Gassendi Hort. Par., Gauntlet Gaines, Gauntlet superbum Dufoy, Gazelle Hort., Gem Foster, Gem of the West Nairn, Général Cathelineau Baudry, Général Foy Dufoy, Général Washington DeCannaert, Georges Hort. Par., Gipse Foster, Girod Hort. Par., Glansryk de Jonghe, Gloire d'Avranches Hort. gall., Gloria atrebatensis Dennis, Gloire de Bruxelles de Jonghe, Gloria mundi Hort., Gloria Parisiensis Chauv., Glory of the West Hort. angl., Glowworm Foster, Goliath Hort., Grace Darling Gaines, Grampion Hort., Grand Duke Gaines, Grand monarch Kinghorn, Grand monarque Lémon, Grenadier DeCannaert, Hamlet Lyne, Hébé Beck, Hector Cook et Hoyle, Helen of Troy Widnall, Henriette Chauv., Hercules Dennis et Eyres et Garth, Hero Wilson, Hesperus Wilson, Homère Hort. gall., Hybla Foster, Hylas Hort., Ibrahim Ch., Idomeneus Hort. Par., Impératrice Joséphine Hort. Par., imperialis Hort. Par., Indian chief Gaines, Inquisite Gaines, invincible Garth, Iphigénia Hort. Par., Irenae Hort., Isaurae Hort. Vindob., Isée Hort. Par., Isoline Hort., Italinski Chauv., Ivanhoe Wilson, Janthe Hort., Jeanne d'Albret Chauv., Jehu élégant Hort., Jehu superbum Hort., Jenny Colon de Jonghe, Jérémie Hort. Par., Jersey maid Blackford, Jessie Foster, Jew Foster, Jewess Foster, Joan of Arc Garth, John Bull Garth, Joséphine Hort. Par., Joséphine Oudin, Joséphine Beauharnois Hort., Josephinum Hort. Vindob., Juba Gaines, Jubilee Garth, Jules César Hort., Juno de Cannaert et Foster, Jupiter Garth, Kalos Hort., King Egbert Gaines, King Horny Gaines, King John Garth, King of Beauties Gaines, King of Geraniums (Gaines's King) Hort. angl., King of Hannover Hort. angl., King of Prussia Whale, King Rufus Hort. angl., King of Saxonii Hort. angl., Labrador Chauv., La Coquette Chauv., Lady Carlisle Foster, Lady Clifford Foster, Lady Cotton Sheppard Bennett, Lady Dillon Gaines, Lady Douro Foster, Lady Elizabeth Bulteel, Lady Essex Hort. angl., Lady Flora Hort., Lady Howich Foster, Lady Mary Hort. angl., Lady Mayoress Hort. angl., Lady Meriot de Jonghe, Lady of the Lake Chandler, Lady Palmer Hort. angl., Lady Sale Gaines, Lady Selkirk Groom, Lady Villiers Foster, Laelia Jones Gaines, Lamarque Chauv., Lanpride Hort. Par., Lancerianum Hort., Lantara Hort. Par., Laura Catleugh, Laure Chauv., Laurens Coster Hort., L'aurore Chauv., Le diamant Ble., Le Floréal Chauv., Léon Hort. Par., Léonora Beck, Leilia Hort., Libéral de Jonghe, Liela Bainbridge's, Lifeguardsman Foster, lineatum superbum Gaines, Little Wonder Gaines, Lord Auckland Gaines, Lord Byron Gaines, Lord Chancellor Foster, Lord Ebrington Rendle, Lord Mayor Foster, Lord of the Isles Hort. angl., Louisa Wilson, Louis Bradford Hort., Louis de Lacépède Lapersonne, Louis XIV., XVI. et XVIII. Hort., Lucas Hort. Par., lucidum roseum Hort. Par. (zonale var.), Lucretia Hort., Luister van Brabant de Jonghe, Lydia Chandler, Lysippe Hort. Par., Mabel Hort., maculatum Dej., Madame la comtesse de Lambertye

Pelargonium

Hort. Par., Madame la comtesse de Ménon Chauv., Madame la comtesse de Rambuteau Chauv., Madame la duchesse Decazes Chauv., Madame la duchesse de Rohan Chauv., Madame La Marquise de Courtarvel Chauv., Madame de Tolozan Chauv., Madame Marjolin Chauv., Madame Sydenham Millet, Madame Trillon T., Madame Matthison Miellez, Madelina Lumsden, Mademoiselle Rachel Fowler, Magician Foster, Magicienne DeCannaert, Magnet Foster, Magnificent Lyne, Magog Foster et Garth, Maid of honour (Cook), Maid of Saragossa Hort. angl., Mammoth Garth, Mamouth Hort Par., Manto Hort., Marceline Hort. Par., Marchioness Garth, Marchioness of Lothian Hort. angl., Marciana Chauv., Marguèrite de Parme de Jonghe, Marguèrite de Valois Hort. Par., Marie Féurier Leseble, Marie Stuart Hort., Marie Thérèse Hort. Par., Mark Anthony Beck, Marmion Hort., Marquis d'Albon Chauv., Marquis de Levis Chauv., Marsellor F., Martha Beck, Martial de Champflour Hort. Par., Mary C., Mary Guy de Jonghe, Master Humphrey Garth, Masterpiece Gaines, Mathilde Foster, Mazepa Gaines, Mazepa superbum, Medora Foster, Meduza Hort. Par., Melpomène Hort. Par., Melone Hort. Par., Menès Chauv., Meteor Chandler, Milo Cook, Mirabeau L., Miss Hawkey Stewart, Miss Herbert Hort. angl., Miss Holford Gaines, Miss Jephson Hort. angl., Miss Peel Foster, Miss Sebright Hort. angl., Mrs. Garth Catleugh et Foster, Mrs. General Andrews Hort. angl., Mrs. Jarrett Hort. angl., Mrs. Standart, Mrs. Stirling, Modesty Foster, Mogul Hort. Par., Mohrenkönig Hort. germ., Molière Hort. Par., Momus Garth, Monarch Chandler, Monarch Widnall, Monsigny Chauv., M. de Boismilon Hort. Par., M. de Saint Pierre Chauv., M. Leseble Chauv., M. Sydenham Millet, Mulatto Hort., Mulberry C., multiflorum Foster, Murillo Chauv., Nabob Foster, Napoléon Garth, Narcissus Hort. Par., Negro boy Hort., Nemésis Hort. Par., Neptune Miellez, Nestor Foster, nigritum Hort. Vindob., Nina de Jonghe, Niobe Foster, nitidum Garth, Nonsuch Garth, Norfolk Hero Hort. angl., Nosegay, Nymphé Foster, Oberon Hodges, Octavie Demay. Oliver Twist, olympicum superbum Hort., Ophelia Garth, Orange Boven Garth, Orange perfection Gaines, Orion Cook et Foster, Oscar Chauv., Ovid L. C., Pandore Chauv., Paragon Dennis, Pauline Demay, Pearl Drury, Pearl of the West (Lyne), pelagineum superbum Hort., Pénélope Garth, Perfection Dennis et Garth, Philippe le bel de Jonghe, Phoeon Foster, Pixey Queen Hort. angl., Plantagenet Garth, Pline Hort. Par., Pluto Thurtell, Polyxène Hort. Par., Pomone Hort. Par., Porthos Desmarattes, Pre-eminent Catleugh, Premier Garth, Président Garth, Priamus Hort., Pride of Surrey Gaines, Prima Donna Garth, Prince Albert Foster, Prince Albert Gaines, Prince Eugène Hort., Prince Henry Gaines, Prince of Wales Gaines, Prince of Wales Wilson, Prince of Waterloo Wightman, Princesse Alice Gaines, Princ. Leopoldine de Jonghe, Princ. royal Rendle, Princ. Sophie d'Orange Déj.,

Pelargonium

Princesse Sophia Mathilda Baskett, Priory King Baskett, Priory Queen Pince, Priory Queen roseum Hort., Procris Chauv., Proserpine Garth, Prospéra Hort., pulchellum Foster, purpureum coeruleum Hort. germ., purpur. grandiflorum Gaines, purpur. perfectum Hort., Pythagore Chauv., Queen Parson, Queen Dowager, Queen of the Beauties Garth et Queen o. t. Beaut. Gaines, Queen of Bourbons Hort., Queen of Fairies Garth, Queen of Gipsy Gaines, Queen of the East Wilson, Queen of the Isles Angl., Queen of Sarum Low, Queen of the West Hort. angl., Queen Philippa Garth, Queen superb Foster, Queen Victoria Eyre et Queen Victoria Sheppard, Quellyn Chauv., Rachel Gaines, Radegonde Chauv., radiatum carmineum de Jonghe, Rainbow Thurtell, Rameau Hort. Par., Reedworth H. angl., refulgens Hort., Regulator Thurtell, Repeal Garth, Rhadamanthe Hort. Par., Rhoda Foster, Rienzi Garth, Rinzianum Hort. Vindob., Rising Sun Gaines, Rival King Hort. angl., robustum Foster, Rodolphe Hort. Par., Roi des blancs Chauv., Roi des lilaces de Jonghe, Roi de Rome Hort., Romulus Hort. Par., Rosabella Gaines, Rosa bicolor Hort. Par., Rosalia de Cannaerts, Rosalia Hoyles, Rose of Oxton Hort. angl., Rosetta Foster, Rosetta superb. Hort. Par., roseum elegans Garth, roseum erectum de Jonghe, roseum perfectum Hort. Par., Rosenkranz de Jonghe, Royal Adélaïde Gaines, Sabilea Hort., Salace Hort. Par., Sálmonium B., Salome H. Par., Salomon Hort. Par., Sapphir Foster, Sarah B., Sarah Lumsden, Satlight Thurtell, Saturne Hort. Par., Scarlet compactum, Emperor of the Scarlets Smith, Frogmore Scarlet, Giant Scarlet (= *Smiths superb. Scarlet*), Shrubland scarlet, Waterloo Scarlet, Scholastique Hort. Par., Scipion Chauv., Selim Hort., Selina Foster, Semiramis Hort. Par., Servilie Hort. Par., Severa Chauv., Shepherdess Hort., Shield of Achilles Foster, Sidonia DeCannaert, Silenus Hort. Par., Simile Garth, Simonis Hort. Par. (= *Simonianum* Hort.), Sirius Eyre, Sir J. Newton Wilson, Sir J. Sedbright Hort. angl., Sir Marnix Dej., Sir Robert Peel Foster, Sir Walter Scott Hort. angl., Sir William Stanley Gaines, Slaeproos de Jonghe, Soulangeanum Hort. gall., South-Western Garth, Souvenir Hort., Souvenir de Dubuisson Hort. gall., Speculum Garth, Speculum mundi Miller, Speculum mundi superbum Gaines, Spleenii Hort., splendidum Foster, splendidissimum Miller, Stadthalter Hort., Stainedwhite Miellez, Stanislas Hort. Par., Steerood Hort., striatum Chandler, striatum formosissimum Hort., Sultan Foster, Sultana or Perpetual Foster, Sunrise Lyne, Sunshine Foster, superbum Wilson, Suprema Walton, surpasse Garth, Suzanne Albert Chauv., Sweetianum germanicum Hort. germ., Sylph Foster, Symétrie Garth, Talisman Demay, Tam O'Shanter Hort. angl., Tancrede Hort. gall., Tasso Foster, Tempe de Jonghe, Thalie Chauv., the dandy Hort. angl., the Cid Foster, the Pet Foster, Theresia Beck, Thetis Hort. Par., Thundere Blackford, Titania Garth, Tom Pouce Poisot, Tom Thumb Hort. Par., (zonale var.), Tournement Garth, Trafalgar Gaines,

Pelargonium

Triumphant Chauv., Triomphe d'Avranches Ble.,
Triumph de Bataille Hort. Par., Triumph supérieur
Hort. Par., Ulysse Hort. Par., Una Garth, Unit Garth,
Unique Hort. gall., Unique Thurtell, Uranie Hort. gall.,
Ursule Hort. gall., Van Amburgh Wilson, Van Dyck
Foster, Vanguard Gaines, Vélie Chauv., Velea Hort.
Par., Venus Böckm., Vesta Foster et Wilson, Victoire
Oudin, Victor Chauv., Victor Sydenham Millet, Victo-
ria Edw., Victory Garth, Victory majus Hort.
gall., Viola Foster, Vivid Foster, Vixen Foster, Volta
Hort. gall., Vulcan Foster, Warrior Gaines, Werner
C., Wildfire Foster, William IV. Rollisson, Witch
Garth, Wizard Garth, Wonder Garth, Wonder of the
West Thurtell, Xerxes Chauv., Yeatmannianum gran-
diflorum Hort., Zamzummin Beck, Zelia Oudin, Ze-
nobia Pince, Zumzimmimum Foster¹⁾.

Hiernach p. 594—604 zu berichtigen u. zu ergänzen.

Pelecynthis E. Mey., Beilkiel, XVII. 14. (XVI. VI.),
Leguminosae-Papilionaceae.

opposita E. Mey. (= *Crotalaria opposita* L. = *Cytisus*
capensis Berg. = *Liparia opposita* Murr. = *Rafnia*
opposita Thbg., p. 675, = *Spartium capense* L.),
gegenblättriger, ⚥. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Pelecyphora C. Ehrenb., aselliformis C. Ehrenb.,
v. Cacteeae Sect. XIV., p. 103, II.**Peletanthus** Endl., Lehmblume, II. 1., Acanthaceae.

ciliaris Endl. (= *Justicia ciliaris* L. suppl. = *J. ci-*
liata Jacq., p. 434, = *Dianthera ciliata* Medic. =
Dicliptera ciliaris W. herb.), gewimperte, ☉. w. m.
Cumana.

Peliosanthes Andr., Schlagblaublume.

altissima Don, höchste, 4. w. Ostindien.

violacea Wall., violette, 4. w. Ostindien.

Pellaea atropurpurea Lk., *Calomelanos* Lk., *flexuosa*
Lk. etc., v. *Allosorus atropurpureus*, *Calomelanos*,
flexuosus etc., p. 22, II.

Peltandra Rafin., Schott, Endl., Schildbeutel, XXI. IX.,
Aroideae.

virginica Rafin. (= *Arum virginicum* L. = *Caladium*
virginicum Hook., p. 143, = *Lecontia virginica*
Torrey, = *Reusselaeria virginica* Beck), virginischer,
4. f. Nordamerika.

sagittaeifolium Rafin., v. *Xanthosoma sagittaeifolium*.

Peltaria glastifolia DC., v. *Texiera glastifolia*.

Peltidium apargioides Zollik., v. *Willemetia apar-*
gioides, p. 857.

Penaea L., Penaea.

fuscata L. (= *furcata* Murr. = *fuscata* Auct. = ?*pu-*
nicea Hort. = ?*Sarcocolla* Berg.), geschmückte, ⚥. t.
Cap d. g. Hoffn.

longiflora Meerb. (= ?*acuta* Thbg.), langlumige, ⚥. t.
Cap d. g. Hoffn.

Sarcocolla Berg. (= *Sarcocolla officinalis* Kunth).

Unbestimmt: punicea Hort.

1) Die Namen der Autoren und Züchter sind den meisten wo
es zu ermitteln war beigelegt, als: Blackford, Chandler, Chau-
vière, DeCannaert, Dennis, Edward, Foster, Garth, Gaines, de
Jonghe, Lumsden, Lucombe, Miellez, Nairn, Oudin, Thurtell,
Wilmer, Wilson u. m. A.

Penicillaria Sw., Pinselgras.

elongata Schrad., verlängertes, ☉. f. m. ?

spicata W. Enum. (= *Cenchrus spicatus* Cav. = *Holcus spicatus* L. = *Panicum americanum* L. = *P. spicatum* Roxb. = *Pennisetum cereale* Trin. = *P. spicatum* Delil.), β) gigantea Endl. (= *Pennisetum giganteum* Tenore), γ) involucrata Schult. (= *Panicum involucreatum* Roxb.).

ciliata W. (= *cylindrica* R. et S.), v. *Pennisetum* Linnaei.

Pennisetum Rich., Federhorstengras, Fennich.**I. Gymnothrix P. Beauv.**

adoensis Hochst. et Steud., abyssinisches, ☉. ♂. w. Abyssinien.

compressum RBr. (= *asperum* Lk. = *japonicum* Trin. = *Cenchrus purpurascens* Thbg. = *G. japonica* Kunth, = *G. purpurascens* Sw. = *Panicum alopecuroides* L. mant. = *P. hordeiforme* γ Thbg. = *Setaria compressa* Kunth), plattes, 4. w. Cap d. g. H., Mascarenas, Ostindien, Japan, Neuholland.

β) hordeiforme Spgl. (= *Alopecurus hordeiformis* L. = *Cenchrus hordeiformis* Thbg. = *Gymn. cenchroides* R. et S. = *Panicum aristoides* W. herb.), γ) *G. Thouarsii* P. Beauv.

II. Pennisetum P. B., p. 605.

aureum Lk. (= *borbonicum* Kunth).

breve N. E. (= *setosum* Raddi), kurzes, ☉. w. Brasilien.

cenchroides Rich. (= *ciliare* Lk. = *distylum* Guss. = *Cenchrus ciliaris* L. = *Panicum vulpinum* W. Enum. = *Setaria cenchroides* P. B.).

dichotomum Delil. (= *phalaroideum* Schult. = *Cenchrus ramosissimus* Poir. = *Panicum dichotomum* Forsk. = *Phalaris setacea* Forsk.).

fasciculatum Trin. (= *sinaicum* Decaisn.), büschelförmiges, ☉. ♂. k. f. Caucasus, Persien, Arabien.

purpurascens H. B. K. (= *hirsutum* N. E. = *Richardi* Kunth, = *setosum* Rich. = *triticoides* R. et S. = *Cenchrus setosus* Sw. = *Panicum Alopecurus* Lam. = *P. triticoides* Poir.).

III. *Setaria* P. Beauv., p. 750, R. et S., Schrad. affine (R. et S.), (= *Panicum purpurascens* Raddi, N. E. = *S. fuscescens* W. herb. = *S. glauca* β *purpurascens* Torrey, = *S. imberbis* R. et S. var. Trin. = *S. purpurascens* H. B. K.), ähnelndes, ☉. f. Brasilien.

alopecurum Jacq. (= *Panicum compositum* N. E. = *P. macrostachyum* N. E. = *P. macrourum* Trin. = *S. Alopecurus* Fisch. = *S. composita* H. B. K. = *S. polystachya* Schrad.), fuchsschwanzähnliches, ☉. ♂. f. m. w. Südamerika.

ambiguum (Schrad.), (= *Panicum holcoides* Hort., non Jacq. = *P. Pseudoholcus* Steud.), zweifelhaftes, ☉. f. ? Südamerika.

cernuum (H. B. K.), (= *Panicum cernuum* W.), übergebogenes, ☉. f. Quito.

corrugatum Nutt. (R. et S.), (= *Panicum corrugatum* Ell.).

geniculatum Jacq. fil. (= *Panicum geniculatum* Lam. = *S. geniculata* R. et S.).

Pennisetum

glaucum RBr. (= *Panicum flavescens* Mch. = *P. glaucum* L. = *Setaria glauca* P. B.).

?β) holcoides (Jacq.).

helvolum RBr. (= *Oplismenus helvulus* P. B. = *Panicum geniculatum* Vahl, = *P. helvolum* L. = *S. helvola* R. et Schult.).

italicum RBr. (= *Panicum italicum* L. = *P. asiaticum* Hort. = *P. attenuatum* Hort. = *P. glomeratum* Mch. = *P. indicum* Hort., non L. = *P. melifrugum* Hort. *P. setarium* Hort. = *P. setosum* Hort. = *S. Melinis* Lk.), β) maritimum Endl. (= *Panicum sibiricum* Hort. = *S. maritima* R. et S.), γ) germanicum Endl. (= *Panicum germanicum* Roth, = *S. germanica* P. B.), δ) erythrospermum (Spgl.), (= *Panicum erythrospermum* Hornem. = *S. ?rubicunda* Dumort.), ε) compactum (Kit.), (= *Panicum serotinum* Hort., non Trin.), ζ) pumilum (Lk., R. et S.).

longifolium (Lk.), (= *Panicum Linkii* Steud.).

macrochaetum Jacq. fil. (= *Panicum macrochaetum* Lk. = *S. macrochaeta* Spgl.).

macrostachyum (H. B. K.), (= *Panicum cylindricum* Lk. = *P. setosum* Sw. = *P. tenax* Rich. = *S. cylindrica* R. et S. = *S. setosa* P. B.).

scandens Jacq. fil. (= *Panicum scandens* Schrad. = *S. Trinii* Kunth).

β) tenacissimum (N. E., Schrad.).

sericeum (R. et S.), (= *Panicum sericeum* Ait.).

verticillatum RBr. (= *Panicum adhaerens* Forsk. = *P. alopecuroideum* Walt. = *P. asperum* Lam. = *P. verticillatum* L. = *S. verticillata* P. Beauv.).

β) nubicum (Lk.).

viride RBr. (= *Panicum viride* L. = *S. viridis* P. B.).

β) purpurascens (Opiz), (= *Weinmanni* R. et S.),

γ) majus Gaud.

Unbestimmt: versicolor Schrad.

Pentagonaster Baxteri Kl., v. *Callistemon microstachyus*, p. 148 et p. 107, II.

Pentagonia Speculum Vent., v. *Specularia Speculum*, p. 776.

Pentalophus A. DC., Fünfschopf, V. 1., Asperifoliaeae (Borragineae).

longiflorus A. DC. (= *Batschia longiflora* Nutt. = *Lithospermum incisum* Lehm. = *L. longiflorum* Spgl.), langbluniger, ♂. f. Nordamerika, Texas.

Pentameris P. Beauv., Spaltgras.

papillosa N. E. (= *Andropogon asper* Kunth, = *Avena capensis* Steud. = *A. muricata* Spgl. = *A. papillosa* Schrad. = *Danthonia papillosa* Schrad. = *Holcus asper* Thbg. = *Sorghum asperum* R. et S.), weichwarziges, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Thouarsii P. Beauv. (= *tortuosa* N. E. = *Avena colorata* Steud. = *A. pallida* Thbg. = *Danthonia tortuosa* Trin. = *Trisetum villosum* Sieb.), Thouars's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Die übrigen p. 884 verzeichneten (mit Ausnahme airoides), scheinen nicht kultivirt zu werden.

Pentamorphia graveolens Scheidw., v. *Erythrochiton brasiliense*, p. 233.

Pentapetes L.

ovata DC. (= *parviflora* Fisch. = *Brotera ovata* Cav. = *Dombeya ovata* Cav. = *Melhania ovata* Spgl. = *Melochia ovata* Dsf. = *Sprengelia modesta* Schult.).

Pentaphyllum norwegicum G., v. *Potentilla norwegica*, p. 652.

Pentaphyllum Lupinaster P. (= *Anmanni* Ledeb.), *macrocephalum* Spgl., v. *Trifolium Lupinaster* et *megacephalum*, p. 819.

Pentaple mantica Rchb., v. *Mönchia mantica*, p. 413, II.

Pentaraphia longiflora Lindl., v. *Conradia ventricosa*, p. 157, II.

Pentas Benth., Fünfröthe, V. 1., Rubiaceae.

carnea Benth. (= *Sipanea carnea* Hort. belg.), fleischfarbige, 4. w. Tropisches Afrika.

Penthea Lindl., Penthea, XX. 1., Orchideae.

filicornis Lindl. (= *Disa filicornis* Thbg. = *D. patens* Sw. = *Orchis filicornis* L.), fadenhörnige, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

patens Lindl. (= *Disa patens* Thbg., non Sw. = *D. tenuifolia* Sw. = *Ophrys patens* L. fil. = *Serapias patens* Thbg.), abstehende, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Pentstemon (Pentastemon) L'Her., Bartfaden.

albidum Nutt. (= *teretiflorum* Fras. = *Chelone albida* Spgl.).

alpinum Torr. (= *Chelone alpina* Spgl.), Alpen-B., 4. f. Nordamerika. (Ob eingeführt?)

ambiguum Torrey, zweifelhafter, 4. f. b. k. Nordamer. β) *foliosus* Benth.

barbatum Nutt., Lindl. (= *Chelone barbata* Cav. = *C. formosa* Wendl. = *ruelloides* Andr., p. 189).

b) *alba* Hort., c) *antwerpensis* Hort., d) *major* Hort. (fol. latioribus).

campanulatum W., Ait. (= *Chelone campanulata* Cav. = *Ch. campanuloides* Andr. = *Ch. elegans* H. B. K.), glockenförmiger, 4. k. Mexico, Guatemala.

a) *purpureum* Trautv., β) *atropurpureum* Lodd., G. Don, (= *Chelone atropurpurea* Swt.), γ)

Kunthii G. Don, (= *Chelone angustifolia* H. B. K.),

δ) *roseum* G. Don, (= *Chelone rosea* Cerv.),

ε) *pulchellum* Lindl., Trautv. (= *elegans* G. Don, = *Chelone elegans* H. B. K.).

centranthifolium Benth. (= *Chelone centranthif.* Benth., p. 189).

cordifolium Benth., herzblättriger, 4. f. Nencalifornien.

crassifolium Lindl. (= *Douglasii* Hook.), dickblättriger, 4. 4. k. Nordwestl. Amerika.

cristatum Fras. (= *eriantherum* Pursh, non Fras.), kammförmiger, 4. f. Nordamerika.

deustum Dougl., brandfarbiger, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

diffusum Dougl., weitschweifiger, 4. f. Nordamerika (Oregongebiet).

dissectum Ell., schlitzblättriger, 4. f. Nordamerika (Georgia).

Pentstemon

- eriantherum Fras. (= *glabrum* Pursh, = *Chelone erianthera* Spgl.)
- frutescens Lamb. (= *Chelone frutescens* Steud. = *Digitalis dasyantha* Pall. herb.). †. Unalaskha, Nordwestliches Amerika¹⁾.
- Gairdneri Hook., Gairdner's, †. f. b. k. Nordw. Amerika.
- gentianoides G. Don, (= *Chelone gentianoides* H. B. K.).
b) album Hook., c) diaphanum Hort. (= *splendens* Hort. = *transparens* Hort. angl.), d) roseum Hort.
- grandiflorum Fras. (= *Bradburii* Pursh, = *Chelone grandiflora* Spgl.), großblumiger, 4. f. Nordamerika (Missourigebiet).
- Hartwegii Benth. (= *Colvillii* Hort. = *gentianoides* Lindl., non G. Don, = *coccineus* Hffg. = *puniceus* Lilja, = *fruticosus* Booth), Hartweg's, 4. k. Mexico.
- imberbe Steud. (= *Humboldtii* G. Don, = *Chelone imberbis* H. B. K.), kahler, 4. k. Mexico.
- Jamesii Benth. (= *albidus* Torr., non Nutt.), James's, 4. f. Nordamerika. (Kaum eingeführt).
- lanceolatum Benth., lanzettblättriger, 4. k. Mexico.
- Menziesii Hook., Menzie's, †. f. b. k. Nootkasund.
- nitidum Dougl., glänzender, 4. f. Nordamerika.
- perfoliatum A. Brogn. (= *connatum* Deppe), verwachsenblättriger, 4. k. Mexico, Nordamerika.
- procerum Dougl. (= *micranthum* Nutt. = *Tolmiei* Hook.).
- Richardsonii Dougl. (= ? *rivularis* Dougl.).
- pubescens Soland. (= *hirsutum* W. = *Chelone Pentstemon* L. = *C. hirsuta* L.), β) laevigatum Ait., γ) glaucum Grah. (= *gracile* Hook., non Nutt.), δ) Mackayanum Kn. et Westc.
- Scouleri Dougl., Scouler's, †. f. b. Nordam. (Oregongeb.).
- venustum Dougl. (= *amoenus* Kunze, = *suffruticosus* Dougl.), lieblicher, 4. f. Nordamerika.
- Außerdem werden in den Verzeichnissen der Handelsgärten noch erwähnt: *decussatum* Dougl., *denticulatum*, *formosum* Thomps., *giganteum elegans* H. angl., *primulinum* v. Houtte, *virginicum* etc.
- Noch nicht eingeführte: *antirrhinoides* Benth. Californ., *corymbosum* Benth. Californ., *laricifolium* Hook. et Arn. (= *filifolium* Nutt.) Nordamerika, *Lewisii* Benth. (= *Gerardia fruticosa* Pursh) Nordwestl. Amerika, *pumilum* Nutt. Nordamerika, *secundiflorum* Benth. Nordamerika, *serrulatum* Menz. Nordwest. Amerika, *strictum* Benth. (= *micranthum* Torr.) Nordamerika, *tenuifolium* Benth. Mexico, *Torreyi* Benth. (= *coeruleum* Torrey, non Nutt. Nordam., *tubiflorum* Nutt. Arkansas. *mexicanum* Hort., v. *Tetranema mexicanum*, *nemorosum* Trautv., v. *Chelone nemorosa*, p. 189.

Peplidium Delile, Zwergfrüchtchen, II. 1., Personatae- (Scrofulariaceae-)Gratiroleae.

- humifusum Delile, (= *Hedyotis maritima* L. fil. = *Microcarpaea cochlearifolia* Sm. = *Oldenlandia maritima* Roth, = *Paederota cochlearifolia* Koen. et Rottl.), niedergestrecktes, ☉. Wa. f. w. Aegypten, Ostindien.

1) „Planta quoad affinitatem dubia, a botanicis hodiernis non visa“ Bentham in DeCandolle prodrom. X. p. 321.

Peplis L., Wasserportulac.

alternifolia MB. (= *wolgensis* Fisch.).

australis Gay, (= *biflora* Salzm.), *borysthenica* Bess., v. *Middendorfia hamulosa* et *borysthenica*, p. 408, *occidentalis* Spgl., v. *Ammannia humilis*, p. 47 et 32, II.

Pepo Mch., Rich., *lagenarius* Mch., v. *Lagenaria vulgaris*, p. 443 et p. 340, II., *macrocarpus* Rich., *Melopepo* Mch., *verrucosus* Mch., *vulgaris* Mch., v. *Cucurbita maxima*, *Melopepo*, *verrucosa*, *Pepo*.

Perdicium roseum Poepp., v. *Chabraea runcinata*, p. 134, II.

Pereskia Plum., p. 607, v. Cacteeae, p. 102, II.

Pereuphora coronata Hffg., v. *Serratula coronata*, p. 747.

Pergularia L., Pergularie.

minor Andr. (= *odoratissima* Wight.).

odoratissima L., RBr. (= *purpurea* Vahl, = *Asclepias odoratissima* Roxb.).

Zweifelhaft: *angustifolia* Fisch. Hort. Gorenk.

divaricata Lour., v. *Strophanthus divergens*, p. 790.

Periandra Mart., *Periandra*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

coccinea Benth. (= *Clitoria coccinea* Schrad., p. 206, = *C. falcata* N. E.), scharlachfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.

dulcis Mart., süfse, ♀. Sch. w. Brasilien.

β) *angustifolia* Mart.

Periboea Kunth, (eine Geliebte Neptuns), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

corymbosa Kunth, (= *Hyacinthus corymbosus* L. mant. = *Massonia corymbosa* Bot. mag. = *M. linearis* Drege, = *Scilla corymbosa* Ker), traubendoldige, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Gawleri Kunth, (= *Scilla brachyphylla* R. et S. = *S. brevifolia* Ker, (Gawl.), p. 732), Gawler's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

? *brevifolia* Kunth, (= *Hyacinthus brevifolius* Thbg. = *Scilla brevifolia* R. et S.). Cap der guten Hoffn. Scheint nicht kultivirt zu werden.

Pericallis Tussilaginis D. Don, v. *Senecio Tussilaginis*.

Pericalymma Endl., Kreifsmütze, XII. I., Myrtaceae.
crassipes Lehm. (= *Leptospermum crassipes* Lehm., p. 352, II.).

Periclymenum americanum Mill., *germanicum* Roel. (= *serotinum* Ait. = *vulgare* Mill.), *italicum* Mill., *sempervirens* Mill., v. *Lonicera grata*, *Periclymenum*, *Caprifolium* et *sempervirens*, p. 475, *racemosum* Mill., v. *Chiococca racemosa*, p. 190.

Perideraea fuscata Webb, v. *Maruta fuscata*. p. 498.

Perilla fruticosa D. Don, *leptostachya* D. Don, v. *Elsholtzia polystachya* et *incisa*, p. 219, II.

Perimenium Schrad., v. *Perymenium*, p. 608.

Periphragmos foetidus R. et P., v. *Vestia lycioides*, p. 845.

Peristera DC., *althaeoides* Eckl., Zeyh., v. *Pelargonium* Sect. XII., p. 601 et Sect. V., p. 484, II.

- Peristeria** Hook., Lindl., Taubenstendel.
 elata Hook., b) alba (= *erecta* Hort.).
 guttata Know. et West. (= *stapelioides* Booth).
 Humboldtii Lindl., Humboldt's, 4. w. Venezuela.
 b) fulva Lindl. (= *Anguloa superba* H. B. K.,
 p. 60 et p. 37, II.).
 longiscapa v. Houtte, langschäftige, 4. w. Südamerika.
- Peristrophe** N. E., bicalyculata N. E., Lanceolaria
 N. E., speciosa N. E., tinctoria N. E., v. Justicia,
 Sect. IX., p. 435 et p. 332, II.
- Peristylus** Blum., Lindl., Cirkelgriffel, XX. I., Or-
 chideae.
 bracteatus Lindl. (= *Gymnadenia bracteata* Presl, =
Habenaria bracteata RBr. = *Orchis bracteata* W.
 = *Satyrium bracteatum* P.), deckblättriger, 4. f.
 b. k. Nordamerika.
 constrictus Lindl. (= *Herminium constrictum* Lindl. =
Platanthera constricta Lindl.), verengerter, 4. w.
 Ostindien.
 cordatus Lindl. (= *Habenaria cordata* RBr. = *Her-*
minium cordatum Lindl. = *Orchis cordata* W. =
Satyrium diphyllum Lk.), herzförmiger, 4. k. Süd-
 europa, Nordafrika.
 goodyeroides Lindl. (= *Habenaria goodyeroides* Don,
 = *Herminium goodyeroides* Lindl.), goodyeraähnlicher,
 4. w. Ostindien.
 plantagineus Lindl. (= *Herminium plantagineum* Lindl.),
 wegrittähnlicher, 4. w. Ostindien.
 virescens Lindl. (= *Habenaria virescens* Spgl. = *Or-*
chis virescens Mühlbg.), grünlicher, 4. k. Pennsylvanien.
 viridis Lindl. (= *Coeloglossum viride* Hartm. = *Habe-*
norina viridis RBr. = *Himantoglossum viride* Rchb.
 = *Orchis batrachytes* Schrk. = *O. virens* Scop. =
O. viridis Sw. = *Platanthera viridis* Lindl.).
 albidus Lindl., v. *Leucorchis albida*, p. 356, II.
Perlebia triquetra DC., v. *Colladonia triquetra*,
 p. 154, II.
- Pernettya** Gaudich., Pernettye.
 elliptica DC., elliptische, ♀. k. f. b. Nordamerika.
 microphylla Gaudich. (= *Cavanillesiana* G. Don, =
 ? *myrsinites* G. Don), β? serpyllifolia DC. (= *Arbu-*
tus microphylla Forst. = *A. serpyllifolia* Lam.).
 Peroioa (= *Peroa* P.) microphylla Cav., v. *Leu-*
copogon microphyllus, p. 459.
Peronia stricta DC., v. *Thalia dealbata*, p. 804.
- Perotis** Ait.
 latifolia Ait. (= *patula* N. E. = *spicaeformis* P. B.
 = *Agrostis spicaeformis* L. fil. = *Anthoxanthum*
spicaeforme Auct. = *Saccharum spicatum* L. =
Xystidium barbatum Presl).
- Perotriche** Cass., Zottenhaar, XIX. II., Compositae-
 Corymbiferae.
 tortilis Cass., gedrehtes, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Perrottetia barbata DC., v. *Nicolsonia barbata*,
 p. 547.
- Persea** Mill., G., Avogatobaum.
 carolinensis N. E. (= *Borbonia* Spgl. = *Laurus Bor-*
bonia L. = *L. carolinensis* Mchx.), carolinischer, ♀.
 k. Carolina.
 gratissima G. fil. (= *americana* Mill.).

Persea

indica Spgl. (= *Laurus americana* Hrb. Berol. = *L. indica* L., p. 449, = *L. Teneriffae* Poir.).

Camphora Spgl., v. *Camphora officinarum*, p. 114, II., *canariensis* Spgl., v. *Laurus canariensis*, p. 449, *Cassia* Spgl., *Cinnamomum* Spgl., *nitida* Spgl., *Tamala* Spgl., v. *Cinnamomum aromaticum*, zeylanicum, eucalyptoides, *Tamala*, p. 144 et 145, II., *caustica* Spgl., v. *Mauria simplicifolia*, p. 390, *exaltata* Spgl., *foetens* Spgl., v. *Oreodaphne exaltata* et *foetens*, p. 456, II., *globosa* Spgl. (= *sanguinea* Spgl.), v. *Nectandra sanguinea*, p. 431, II., *patens* Spgl., v. *Phoebe patens*, *Sassafras* Spgl., v. *Sassafras officinale*, *surinamensis* Spgl., *crassifolia* Spgl. (= *Richardiana* Schltdl.), v. *Ocotea guianensis* et *puberula*, p. 443, II.

Persicaria virginiana G., v. *Polygonum virginianum*, p. 644.

Persica T., v. *Amygdalus* Sect. II. p. 50, *ispahamensis* Thouin. (= *laevis* DC.), v. *A. Nucipersica*, p. 50.

Persoonia Sm., *Persoonie*.

Caleyi RBr., *Caley's*, ♂. t. Neuholland.

cornifolia Cunn., hartriegelblättrige, ♂. t. Neuholland.

Cunninghamii RBr., *Cunningham's*, ♂. t. Neuholland.

daphnoides Cunn. (= ?*revoluta* Sieber), kellerhals-ähnliche, ♂. t. Neuholland.

ferruginea Sm. (= *laurina* P.).

Fraseri RBr., *Fraser's*, ♂. t. Neuholland.

glauca Sm. (= ?*articulata* RBr.), blaugrüne, ♂. t. Neuh.

gnidioides Sieber, (= *Chamaepithys* Cunn.), gnidia-ähnliche, ♂. t. Neuholland.

lanceolata Andr. (= *ligustrina* Knight, Salisb.).

Laureola Lindl., Lorbeer-P., ♂. t. Neuholland.

linearis Andr. (= *angustifolia* Knight et Salisb. = *filifolia* Dietr.).

longifolia RBr. (= *Drummondii* Lindl.).

macrostachya Lindl., großsährige, ♂. t. Neuholland.

marginata Cunn., geränderte, ♂. t. Neuholland.

microcarpa RBr., kleinfrüchtige, ♂. t. Neuholland.

myrtilloides Sieber, (= *oleaefolia* Cunningh.).

quinquenervis Hook., fünfnervige, ♂. t. Neuholland.

rigida RBr., starre, ♂. t. Neuholland.

salicina P. (= *latifolia* Knight et Salisb. = *Linkea laevis* Cav.).

thymifolia Cunn., thymianblättrige, ♂. t. Neuholland.

virgata RBr., ruthenförmige, ♂. t. Neuholland.

Unbestimmtere: *fusca* Hort., *ledifolia* Hort.

Persoonia Mchx., *angustifolia* Mchx., *lanceolata* Mchx., *latifolia* Mchx., v. *Marshallia angustifolia*, *lanceolata*, *latifolia*, p. 497 u. 598.

Persoonia guareoides W., v. *Carapa guianensis*, p. 160.

Peschiera A. DC., (*Peschier*, ein Genfer, hat mehrere chemisch botanische Abhandlungen herausgegeben), V. I., *Apocynae*.

muricata A. DC. (= *Tabernaemontana muricata* Lk., R. et S., p. 796), weichstachelige, ♂. ♀. w. Brasilien.

echinata A. DC. (= *Tabernaemontana echinata* Aubl.),

Guiana; *Hystrix* A. DC. (= *Tabern. Hystrix* Steud.

= *T. echinata* Arrab., Velloz. Flor. Flum.), Brasil,

beide scheinen noch nicht eingeführt.

- Petagnia** Guss., (Petagna, neapolitanischer Botaniker etc. †), V. II., Umbelliferae.
saniculaefolia Guss. (= *Sison Gussonianum* Balb. = *S. Gussonii* Spgl.), Sanikelblättrige, 4. f. b. Sicilien.
- Petalacte** Don, DC., Garbenimmortelle, XIX. II., Compositae-Helichryseae.
coronata Don, (= *Evax involucratus* Schrank, = *Gnaphalium Achilleae* Sieber, = *G. coronatum* L. = *Petulolepis coronata* Less.), gekrönte, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- Petalidium** N. E., Kleinblättler, XIV. II., Acanthaceae.
barlerioides N. E. (= *Ruellia barlerioides* Roth, = *R. bracteata* Roxb.), barleriaähnlicher, ♀. w. Ostindien.
- Petasites** C. Bauh., T., Pestilenzwurz.
 I. Genuinus.
vulgaris Dsf. (= *officinalis* Mch.), b) *hybridus* G. M. Sch. (= *Tussilago hybrida* L.).
 II. Nardosmia Cass., DC.
fragrans (Rchb.), (= *N. denticulata* Cass.).
laevigatus Rchb. (= *N. straminea* Cass.).
- Petasostylis** Grisebach, Hutgriffel, V. I., Contortae-Gentianeae.
nigrescens Griseb. (= *Leianthus nigrescens* Griseb.), schwärzlicher, ☉. ♂. k. Mexico.
saponarioides Griseb. (= *Leianthus saponarioides* Griseb. = *Lisianthus saponarioides* Cham. et Schldtl.), seifenkrautähnlicher, ☉. ♂. k. Mexico.
Petesioides laurifolium Jacq., v. *Wallenia laurifolia*.
- Petilium** T., L., imperiale J. St. Hil., v. Fritillaria, Sect. II.
- Petiveria** Plum., Petiverie.
alliacea L. (= *octandra* Jacq.).
tetrandra Gomez, N. E. (= *alliacea* L. var. Spgl.), viermännige, ♀. w. Brasilien.
- Petrea** L. (= *Petraea* Auct.), Petrea.
arborea H. B. K., baumartige, ♀. w. Neugranada.
oblonga Spgl. (= *racemosa* N. E., Mart.), längliche, ♀. w. Brasilien.
volubilis L. (= ? *Stapplesii* Hort. angl.), windende, ♀. Sch. w. Westindien.
- Petrobium** RBr.
arborescens RBr. (= *P. Forsteri* Cass. = *Bidens arborea* Roxb. = *Drimyphyllum Helenianum* Burch. = *Laxmannia arborea* Forst. = *Spilanthes arborea* Forst. = *S. pseudogummifera* Forst. = *S. tetrandra* Roxb.).
Petrocarya campestris W., *excelsa* Steud., *macrophylla* Steud., v. *Parinarium campestre*, *excelsum*, *macrophyllum*, p. 586.
- Petrocoptis** A. Braun, Felsennelke, X. IV., Caryophyllaceae-Sileneae.
pyrenaica A. Braun, (= *Agrostemma pyrenaica* G. Don, = *Lychnis nummularia* Lapeyr. = *L. pyrenaica* Berg., p. 482).
- Petrogeton** Eckl., Zeyh., Felsendickblatt, V. IV., Corniculatae-Crassulaceae.
dentatum Eckl., Zeyh. (= *Crassula dentata* Thbg.), gezahntes, 4. k. t. Südafrika.
Umbella Eckl., Zeyh. (= *Crassula Umbella* Jacq. = *Septas Umbella* Haw., p. 746).

Petrophila RBr., Felsenprotea(freund).

brevifolia Lindl., kurzblättrige, f. t. k. Neuholland.
 Cunninghamii Meisn., Cunningham's, f. t. k. Neuholl.
 α) major Meisn., β) brachyphylla Meisn., ? γ)
 gracilis A. Cunningh.

glanduligera Lindl., drüsentragende, f. t. k. Neuholl.
 heterophylla Lindl., verschiedenblättrige, f. t. k. Neuh.
 Hügelii ? Lindl. (= *Isopogon Hügelii* Hort), Hügel's,
 f. t. k. Neuholland.

juncifolia Lindl., simsblättrige, f. t. k. Neuholland.
 longifolia RBr., langblättrige, f. t. k. Neuholland.
 phylloides RBr., phylloähnliche, f. t. k. Neuholland.
 pulchella RBr. (= *fucifolia* Knight et Salisb. = *Protea dichotoma* Cav. = *Pr. fucifolia* Salisb. = *Pr. pulchella* Schrad., Wendl.).

seminuda Lindl., halbnackte, f. t. k. Neuholland.
 teretifolia RBr., β) cornigera Meisn. (= *Isopogon cornigerus* Lindl.).

Petroselinum Hoffm., Peter-(Stein-)silge.

peregrinum Lagasca, K. (= ? *romanum* Sweet, = *Ammi petroselinoides* Haenke hrb. = *Apium latifolium* Poir. = ? *A. romanum* Zuccag. = *Bupleurum petroselinoides* Spgl. = *Ligusticum peregrinum* L. = *Sison peregrinus* Spgl.), fremde, ♂. f. k. Peru, Spanien, Portugal.

sativum Hoffm. (= *hortense* Hoffm.), β) crispum (Mill.), γ) latifolium (Mill.), δ) tuberosum (Bernh., Dsf.), ε) longifolium Hort., ζ) romanum Sweet (Zuccag.).

selinoides DC. (= *Selinum peregrinum* W.), Selinum-ähnliche, 4. f. ?

fractophyllum Lagasc. = ? *Apium fractophyllum*, p. 68.

Petteria graminifolia Rchb., v. *Eremogone graminifolia*, p. 878 et p. 227, II.

Petunia Juss., Petunie.

intermedia G. Don, (= *linearis* Paxton, = *Nierembergia intermedia* Grah., Sweet, = *Salpiglossis linearis* Hook.), 4. f. Bonaria.

viscosa Miers, schmierige, 4. k. t. Chili.

Hybriden und Varietäten, aufser den p. 610 verzeichneten noch eine große Anzahl, die zum Theil wieder jährlich durch neuerzeugte und schönere verdrängt werden: z. B. *Adamsii*, *Alice Gray*, *Atkinsoniana* D. Don, (= *Nierembergia Atkinsonia* Sweet), *Baron de Pronay*, *Beauté de Gaud*, *Comte de Paris*, *Conservative*, *Couronne bicolore*, *Cupris*, *decora*, *Diégo Léon*, *Duc de Brabant*, *Dr. Lindley*, *Dumont d'Urville*, *Enchantress*, *formosa*, *Frédéric II.*, *Goethe*, *Grand Mogul*, *Hildida*, *Lady Peel*, *Lord Byron*, *Magician*, *magnum bonum*, *Medora*, *ornatissima*, *Othello*, *Panaché de Gendbrugge*, *Prince de Joinville*, *Prince Ferdinand*, *Princesse Palffy*, *Prinz Carl August v. Sachsen-Weimar*, *punctata*, *Redouté*, *rosea delicatissima*, *Schiller*, *Sir Henry Pottinger*, *triumphans*, *versicolor*, *Vésuve*, *Victoire panachée*, *Volney*, *Warscewitz*, *Walter Scott*, *Willmoreana* u. v. a., deren Stammältern *P. Mirabilis* Rchb. (= *phoenicea* D. Don) und *P. nyctaginiflora* Juss. sind.

acuminata Grah., v. *Nicotiana acuminata*, p. 547.

Peucedanum T., Haarstrang.

- alpestre L. (= *album* Dsf. = *minus* Poir. = *Silaus alpestris* Bess.).
- alsaticum L. (= *pyrenaicum* Colla).
- angelicaefolium Turcz., angelicablätteriger, 4. f. Sibirien.
- baicalense K. (= *terebinthaceum* Fisch. = *Pterose-
lium sibiricum* Rchb. = *Selinum baicalense* Redowsky,
= *S. collinum* W. K. = *S. terebinthaceum* Trevir.).
- Besserianum DC. (= *Ferula Besseri* Szgl.), Besser's,
4. f. Odessa.
- canescens Ledeb., grauliche, 4. f. Alt. Sibirien.
- Cervaria Cusson, Lapeyr. (= *glaucum* Dum. Cours.
= *Cervaria glauca* Gaud. etc.).
β) *laeve* (Gaud.).
- Chabraei Gaud. (= *Carvifolia* Vill. = *minus* All. =
Imperatoria Chabraei Szgl. = *Palimbia Carvifolia* K.
= *P. Chabraei* DC. etc.).
β) *podolicum* (Bess.), DC. (= *Oreoselinum po-
dolicum* Hoffm. = *Selinum podolicum* Bess. =
Seseli pimpinelloides Wall.).
- dahuricum Turcz. (= *Oreoselinum dahuricum* Bess.).
- elatum Ledeb., hoher, 4. f. Alt. Sibirien.
- ferulaeoides Steud. (= *paniculatum* Ledeb., non Loisel.),
steckenkrautähnlicher, 4. f. Alt. Sibirien.
- gallicum T., P. (= *Latourettii* Cuss. = *pariense*
DC. = *refractum* Vill.).
- humile Turcz. (= *Oreoselinum humile* Bess.), niedriger,
4. f. Baical. Sibirien.
- Hystrix Bunge, igelstacheliger, 4. f. Alt. Sibirien.
- involutratum K. (= *Oreoselinum peucedanoides* Hoffm.
= *Pteroselinum peucedanoides* Rchb. = *Selinum
argenteum* All. = *S. peucedanoides* Dsf.), eingehüll-
ter, 4. f. Piemontesische Alpen.
- italicum Mill., Rchb. (= *gallicum* β) *luteum* Szgl. =
officinale β) *italicum* DC.).
- laciniatum * (= *Ledebourii* Steud. = *dissectum* Ledeb.,
non DC.), schlitzblätteriger, 4. f. Alt. Sibirien.
- latifolium DC. (= *Angelica laevigata* Fisch.), breit-
blätteriger, 4. f. Caucasus.
- lativittatum Fisch., Mey. et Lallein., breitschleieriger, 4.
f. Soongaria.
- Ledebourii G. Don, (= *P. officinale* Ledeb., non L.),
Ledebour's, 4. f. Altai.
- longifolium W. K., β) *majus*.
- montanum K. (= *Selinum palustre* L. spec.), Berg-
liebender, 4. f. Schweiz, Frankreich.
- Morisoni Bess. (= ? *Ligusticum longifolium* W. spec.),
Morison's, 4. f. Sibirien.
- officinale L. (= *altissimum* Dsf.).
- Petteri Visian. (= *coriaceum* Rchb. = *Pastinaca Pet-
teri* Visian.), Petter's, 4. f. b. Dalmatien.
- salsum Steud. (= *redivivum* Pall. = *Agasyllis salsa*
Szgl. = *Ferula salsa* Ledeb. = *Palimbia salsa*
Bess. = *Siler salsum* Szgl. = *Sison salsum* L. fil.
S. verticillatum Pall. = *Sium nudicaule* Lam.),
Salinen-H., 4. f. Süd- und Ostrufsland.
- Schottii Besser. (= *glaucum* Auct., non DC. = *Im-
peratoria Chabraei* Bess. = *I. glauca* Bartl. = *Pas-
tinaca glauca* Scop. = *Pteroselinum glaucum* Rchb.).
- selinoides DC. (= *Selinum sibiricum* Retz, p. 740, =

Peucedanum

- Thysselinum involucratum* Mönch.), silgenähnlicher, ♂. 4. f. Sibirien.
- sibiricum* W. (= *Ferula sibirica* Spgl. = *F. tatarica* Fisch., MB.), sibirischer, 4. f. Sibirien, Caucasus, Bessarabien, Croatien.
- sylvestre* DC. (= *palustre* Mch. = *Athamantha flexuosa* Jacq. = *A. pisana* Savi, = *Selinum palustre* L. = *S. sylvestre* Jacq., non L. = *S. Thysselinum* Crtz. = *Th. angustifolium* Rchb. = *Th. palustre* Hoffm., p. 810, = *Th. Plinii* Spgl. = *Th. sylvestre* Rchb.), Wald- und Sumpfliebender, ♂. 4. f. Nord- und Osteuropa.
- β) *intermedium* Bess. (= *Callisace Schiwereckii* Hoffm. = *Selinum Schiwereckii* Bess.), γ) *cantabrigiense* Fisch. (= *Callisace cantabrigensis* Hoffm.).
- tenuifolium* Thbg. (non Dsf.), dünnblättriger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
- vaginatum* Ledeb., scheidiger, 4. f. Alt. Sibirien.
- varium* Fisch., Mey. et Lallen., bunter, 4. f. Soongaria.
- venetum* K. (= *alsaticum* β *palustre* Sieber, = *Selinum austriacum* Bertol. = *S. venetum* Spgl.).
- album* Hort., v. *Coenolophium Fischeri*, p. 876, *alpestre* Steven, non L. (= *tauricum* H. Par.), *Carvifolia* MB., non Vill., v. *Bunium peucedanoides et virescens*, p. 82, II., *arenarium* Hort. (= *Matthioli* Spgl. = *serotinum* P. = *tenuifolium* Dsf.), v. *Silaus tenuifolius*, *Bellardi* Lagasca, (= *imperatoriioides* Lk.), *caucasicum* Endl., *Ostruthium* K., v. *Imperatoria angustifolia*, *caucasica*, *Ostruthium*, p. 415 et p. 315, II., *caspicum* Lk. (= *dubium* Ledeb. = *gracile* α Ledeb.), v. *Ferula caspica*, p. 243, II., *Petroselinum* Dsf., v. *Cnidium Petroselinum*, p. 150, II., *pratense* Lam. (= *Silaus* L.), v. *Silaus pratensis*, p. 755, *verticillare* K., v. *Tommasinia verticillaris*, *vocontiorum* Spgl., v. *Heracleum minimum*, p. 295, II.
- Peumus fragrans* P. (= *Boldus* Molin.), v. *Boldoa fragrans*, p. 72, II.
- ## Phaca L., Berglinse.
- alpina* Jacq, β) *dahurica* Fisch. (= *membranacea* Fisch.), γ) *sibirica* Hort. Petropol.
- astragalina* DC. (= *minima* Vill. = *Astragalus alpinus* L.).
- brachytropis* Steven, (= *Astragalus brachytropis* C. A. Mey.), kurzkielige, 4. f. b. Ostcaucasus.
- lapponica* Wahlbg. (= *montana* Wahlbg. = *Astragalus Cervini* Thomas, = *A. valesiacus* Thom. = *Oxytropis cyanea* Rchb. = *O. lapponica* Gaud., p. 579).
- subverticillaris* Fisch. et Mey. (= *Astragalus subverticillaris* Grah.), fastwirtelförmige, 4. f. Sibirien.
- trigonocarpa* Turcz., dreikantigfrüchtige, 4. f. b. Sibirien (Baical).
- triflora* DC. (= *Candolleana* H. B. K. = *pauciflora* P.), dreiblumige, ⊙. f. Peru.
- villosa* Nutt. (= *Astragalus villosus* Mchx.)! zottige, 4. f. Nordamerika.
- ## Phacelia Juss., Mchx., Phacelie.
- ciliata* Benth., gewinperte, ? ⊙. f. Californien.

Phacelia

circinnata Jacq. fil. (= *californica* Cham. = *hastata* Dougl. = *heterophylla* Pursh, = *rudis* Dougl. = *Aldea circinnata* W. Enum. = *Hydrophyllum magellanicum* Lam. = *Heliotropium pinnatum* Vahl). Northwestl. Amerika, Mexico, Peru, Chili und Magellanische Meerenge.

β) obtusiloba A. DC., γ) acutiloba A. DC., δ) paniculata A. DC. (= *peruviana* Spgl. = *Aldea peruviana* R. et P. = *Heliotropium pinnatum* W. herb. = *Hydrophyllum paniculatum* Poepp.).

congesta Hook. (= *conferta* G. Don).

ramosissima Benth., ästigste, ? ⊙. f. Nordam. (Oregongeb.).

fimbriata Richard, Mex., *parviflora* Pursh, v. *Cosmanthus fimbriatus*, p. 222 et *parviflorus*, p. 163, II.

Phacosperma peruviana Haw. = *Calandrinia Phacosperma*, p. 105, II.

Phaecasium Cass., lampsanoides Cass., v. *Crepis*, Sect. III. p. 167, II.

Phaedranassa Herb., Glanzkönigin, VI. 1., Amaryllideae. chloraea Herb., grünliche, 4. Zw. w. Peru.

Phaenocoma D. Don.

prolifera D. Don, (= *Phoenocoma prolifera* Auct., p. 617).

Phaenopus DC. (= *Phoenixopus* Cass.), Ruthensalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

acanthifolius Cass. (= *Chondrilla acanthifolia* Poir. = *Prenanthes acanthifolia* W.), bärenklaublätteriger, ♂. 4. k. Creta.

triqueter DC. (= *Lygodesmia triquetra* Don, = *Prenanthes triquetra* LaBill.), dreiseitiger, ♂. f. b. k. Syrien.

vimineus Rchb. (= *decurrens* Cass.), β) ramosissimus Rchb. (= *Chondrilla ramosissima* Zeyh. = *Prenanthes ramosissimus* All.), p. 884.

Phaeostoma Spach, *elegans* Lilja, (= *Douglasii* Spach), *unguiculata* Lilja, v. *Clarkia elegans* et *unguiculata*, p. 202 et p. 148, II.

Phagnalon Cass., Filzstrauch.

calycinum DC. (= *Bennetti* Lowe, = *Conyza calycina* Cav.), kelchiger, †. k. Madeira.

pumilum DC. (= *Conyza pumila* Sibth., Sm. = *C. pygmaea* Sieber), kleiner, †. k. Creta.

rupestre DC. (= *spathulatum* Cass. = *Tenorii* Presl, = *Conyza geminiflora* Tenore, = *C. rupestris* L. = *C. tomentosa* Forsk.).

saxatile Cass. (= *subdentatum* Cass. = *Conyza saxatilis* L.).

sordidum DC. (= *tricephalum* Cass. = *Conyza sordida* L. = *Gnaphalium conyzoides* Lam. = *G. sordidum* L.).

Phajus Lour., Lindl., Prachtstendel.

albus Lindl., weißer, 4. w. Ostindien.

bicolor Lindl., zweifarbig, 4. w. Ceylon.

Blumei Lindl. (= *Limodorum Incarvillei* Blume), Blume's, 4. w. Java.

flavus Lindl. (= *Limodorum flavum* Blume), hellgelber, 4. w. Java.

grandifolius Lour. (= *grandiflorus* Auct. = *Bletia Tankervilleae* RBr., p. 125, = *Limodorum Tankervilleae* Ait. = *L. Incarvillei* P. = *Pachyne spectabilis* Salisb.), großblättriger, 4. w. China.

Phajus

indigoferus Hassk., Indigo-P., 4. w. Java.
 maculatus Lindl. (= *Bletia flava* Wall. = *B. Woodfordii* Hook.), geflecker, 4. w. Ostindien.
 niveus v. Houtte, schneeweißer, 4. w. Ostindien.
 veratrifolius Lindl. (= *Cymbidium veratrifolium* Roxb. = *Dendrobium veratrifolium* Roxb.), germerblätteri-
 ger, 4. w. Ostindien.

Wallichii Lindl. (= *intermedius* Hort. = *grandifolius* Lindl. in Wall. Catal.), Wallich's, 4. w. Ostindien.

Phalacrodiscus arvensis Fisch. et Mey., v. *Pyrethrum arvense*, *ceratophylloides* Less., *corsicus* Less., *graminifolius* Less., *lanceolatus* Less., *maximus* Less., *montanus* Less., v. *Leucanthemum cebennense*, *corsicum*, *graminifolium*, *lanceolatum*, *maximum*, *montanum*, p. 183.

Phalacroloma Cass., Kahlsaum, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Beyrichii Fisch. et Mey. (= *Erigeron Beyrichii* H. Berol. = *E. strigosum* Beyr. = *Stenactis Beyrichii* Fisch. et Mey.), Beyrich's, ☉. ♂. f. Carolina.

obtusifolium Cass. (= *Erigeron carolinianum* L. = *E. hyssopifolium* Mchx.), stumpfblättriger, 4. f. Nordam.
angustifolium Cass., v. *Stenactis annua*, p. 786.
Phalangium bicolor Redout., DC. (= *planifolium* P.), v. *Simethis bicolor*, *coeruleum* Poir., v. *Pasithea coerulea*, p. 478, II., *esculentum* Nutt. (= *Quamash Pursh*), v. *Canassia esculenta*, p. 151, *elatum* Poir. (= *fastigiatum* Poir.), v. *Chlorophytum elatum*, p. 192, *Liliastrum* Poir., v. *Czackia Liliastrum*, *paniculatum* Redout. (= *milleflorum* Hort.), *pendulum* Redout., v. *Arthropodium paniculatum et pendulum*, p. 85, *pomeridianum* Don, Sweet, v. *Chlorogalum pomeridianum*, *Ornithogal. Sect. III.*, p. 459, II., *reflexum* Poir., v. *Echeandia terniflora*, p. 213, II., *serotinum* Lam., v. *Lloydia serotina*, p. 470 et p. 366, II., *sulphureum* Poir., v. *Ornithogalum sulphureum*, p. 458, II., *virgatum* Poir., v. *Nolina georgiana*, p. 549.

Hinsichtlich der übrigen s. überhaupt *Anthericum*, p. 63 und p. 38, II.

Phalaris L., Glanzgras.

I. Genuina.

angusta N. E. (= *laxa* Spgl. herb.), schmales, ☉. f. Brasilien.

brachystachya Lk. (= *canariensis* Brotero, non L. = *nitida* Presl, = *quadrivalvis* Lagasca).

dentata L. fil. (= *minor* var. *monstrosa* N. E. = *Chilochloa dentata* Trin. = *Phleum dentatum* P.), gezahntes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

gracilis Parlat., schlankes, ☉. f. Malta.

nodosa L. (= *aquatica* Brot., Sibth. = *bulbosa* Cav. = *tuberosa* L.).

paradoxa L. (= *praemorsa* Lam.).

truncata Gussone, abgestutztes, ☉. f. Sicilien.

II. Baldingera G. M. S. (= *Digraphis* Trin.).

americana Ell. (= *arundinacea* Mchx. = *Ludoviciana* Torr. = *Calamagrostis colorata* Nutt.).

arundinacea L. (= *colorata* P. Beauv. = *Arundo colorata* Ait. = *Baldingera arundinacea* Dumort. =

Phalaris

B. colorata Flor. Wetter. = *Culamagrostis colorata* Sibth. = *C. variegata* Wither. = *Digraphis arundinacea* Trin. = *Typhoides arundinacea* Mch.).

b) *variegata* (= *picta* Hort.).

alpina Hänke, (= *ciliata* Lagasca, = *Michelii* Savi, = *mucronata* Dsf. = *phleoides* Savi), *arenaria* W., *aspera* Retz, (= *paniculata* Ait. = *tenuifolia* Host), *Bellardi* W. (= *tenuis* Host, = *cylindria* DC. = *sativa* P. = *subulata* Savi), *cuspidata* Hort. (= *trigyna* Host, = *mucronata* Dsf.), *phleoides* L., v. *Phleum Michelii*, *arenarium*, *asperum*, *tenuis*, *cuspidatum* et *Böhmeri*, *Ammophila* Lk. (= *maritima* Nutt.), v. *Psamma arenaria*, p. 661, *aristata* Gouan, (= *crinata* Forsk.), v. *Polypogon monspeliensis*, p. 646, *aristata* Schousb., v. *Alopecurus lasiostachyus*, p. 37, *Barrelieri* Tenore, (= *pubescens* Lam.), v. *Koeleria villosa*, p. 439, *disticha* Forsk., v. *Sporobolus pungens*, p. 780, *erucaeformis* L., v. *Beckmannia erucaeformis*, p. 116, *explicita* Lk., *geniculata* Sibth., Sm., v. *Crypsis alopecuroides* et *geniculata*, *muricata* Forsk., v. *Lappago racemosa*, p. 445, *oryzoides* L., v. *Leersia oryzoides*, p. 351, *semineutra* R. et S., v. *Poa semineutra*, *setacea* Forsk., v. *Pennisetum dichotomum*, p. 605.

Phalerocarpus G. Don, Glanzbeere.

serpyllifolius G. Don, (= *hispidulus* * p. 612, = *Arbutus filiformis* Lam. = *A. thymifolius* Ait. = *Chiogenes serpyllifolia* Salisb. = *Glyciphylla hispidula* Rafin. = *Gaultheria serpyllifolia* Pursh, = *Schollera hispidula* Roth, = *Vaccinium hispidulum* L.).

Phalocallis Hook., *plumbea* Lindl. = *Cypella plumbea*.

Phaloe nodosa Dumort., *saginoides* Dumort. (= *subulata* Dumort.), v. *Spergula nodosa*, *saginoides*, *subulata*, p. 776.

Pharbitis Choisy, Buntwinde.

acuminata Choisy, (= *Convolvulus acuminatus* Vahl, *C. mutabilis* Spgl. = *C. tomentosus* Velloz. = *Ipomoea mutabilis* Ker), zugespitzte, 4. Sch. w. Südamer.

β) *congesta* Choisy.

bogotensis Choisy, (= *Convolvulus bogotensis* H. B. K. = *Ipomoea bogotensis* G. Don), bogotaische, 4. ⚔. Sch. w. Südamerika.

cathartica Choisy, (= *Convolvulus africanus* Nick. = *C. portoricensis* Spgl. = *C. pudibundus* Lindl. = *Ipomoea cathartica* Poir. = *I. pudibunda* G. Don), purgirende, 4. Sch. w. St. Domingo, Portorico, Mexico.

cuspidata G. Don, (= *mutabilis* Boj. = *Convolvulus peruvianus* Spgl. = *Ipomoea cuspidata* R. et P.), feinspitzige, 4. Sch. w. Mittägl. Amerika.

ericalyx Mart., wollkelchige, ☉. Sch. w. n. f. Brasilien.

fragrans Boj. (= *Ipomoea fragrans* Boj. = ? *I. Lindleyi* Choisy), wohlriechende, 4. Sch. w. Madagascar.

hederacea Choisy, (= *barbata* et = *Forskohlei* G. Don, *Convolvulus hederaceifolius* Spgl. = *C. hirsutus* Roem. non Stev. = *Ipomoea avicularis* Raf. = *I. barbata* Roth, non Choisy, = *I. hederacea* L. = *I. ? phymatodes* Spgl. = *I. scabra* Forsk., non Gmel.), epheu-

Pharbitis

ähnliche, ☉. Sch. f. Nordamerika, Brasilien. China, Himalaya, Neuholland.

β) *scabrida* G. Don, (= *Ipomoea scabrida* R. et S.).
heterophylla Choisy, (= *Batatas heterophylla* et *Willdenowii* G. Don, = *Convolvulus heterophyllus* Spgl. = *Ipomoea bulbocastana* Moç. et Sess. = *I. heterophylla* Ortega), verschiedenblättrige, 4. Kn. Sch. w. Mexico, Cuba.

hispidula Choisy, (= *githaginea* Hochst. = *Convolvulus mutabilis* Sal., non Spgl. = *C. glandulifer* Spgl. = *C. purpureus* L. = *Convolvuloides leucospermos* et *purpurea* Mch. = *Ipomoea discolor* Spgl. = *I. glandulifera* R. et P. = *I. intermedia* Schult. = *I. hispidula* Zuccag. = *I. purpurea* Lam. = *I. Zuccagni* R. et S.), steifhaarige, ☉. f. Mittägl. Amerika.

b) *incarnata*, c) *leucantha*, (= *Ipomoea philadelphica* Hort.), d) *varia*.

insularis Choisy, (= *Ipomoea insularis* Steud.), Insel-B., ☉. Sch. m. f. Neuholland, Marianen, Norfolkinsel.

Learii Hook. (= *Ipomoea Learii* Paxt.), Lear's, 4. Sch. w. Mexico, Vera Cruz, Buenos Ayres, Ceylon.

medians Choisy, (= *villosa* G. Don, = *Convolvulus Ruizii* Spgl. = *Ipomoea villosa* R. et P. = *I. ? involucrata* Dietr.), mittlere, ☉. Sch. w. m. f. Mascarenas, Peru.

mollis Choisy, (= *Convolvulus mollis* H. B. K. = *C. cynanchifolius* W. nsp. = *Ipomoea mollis* G. Don), weiche, 4. Sch. w. Neuandalusien.

Nil Choisy, (= *punctata*, *Purshii* et *scabra* G. Don, = *Convolvuloides triloba* Mch. = *Convolvulus coeruleus* Spgl. = *C. hederaceus* L. = *C. Nil* L. = *Ipomoea coerulea* Koen. = *I. Nil* Roth, = *I. punctata* P. = *I. scabra* Gmel.), himmelblaue, ☉. Sch. w. m. f. Nord- u. Südamerika, Ostindien, Südafrika etc.

β) *abbreviata* Choisy, (= *Dillenii* G. Don, = *Convolvulus Dillenii* Desr. = ? *Ipomoea bicolor* R. et S.), γ) *integrifolia* Choisy, (= *Convolvulus coelestis* Forst. = ? *Ipomoea coerulescens* Roxb. et Wall.), δ) *diversifolia* Lindl. (= ? *variifolia* Decaisne = *Convolvulus Lindleyi* et ? *variifolius* Steud.).

pubescens Choisy, (= *varia* G. Don, = *Batatas Papiirin* et *subtriloba* G. Don, = *Convolvulus pubescens* W. Enum. = *C. Papiiria* Spgl. = *Convolvuloides pilosa* Mch. = *Ipomoea pubescens* Lam. = *I. Papiirin* R. et P. = *I. Papiiru* Poir. = *I. subtriloba* R. et P. = *I. varia* Roth), weichhaarige, 4. Sch. w. Peru, Brasilien.

rosea Choisy, rosafarbige, ☉. Sch. w. m. f. Brasilien.

serotina Choisy, (= *Convolvulus serotinus* DC. h. nsp. = *Ornithosperma serotina* Rafin. = *Quamoclit serotina* G. Don); spätblühende, 4. Sch. w. Mexico.

speciosa Choisy, prächtige, ☉. Sch. w. m. f. Mexico.

tomentosa Choisy, (= *Convolvulus tomentosus* L., non Lour. = *C. jamaicensis* Pluk.), filzige, 4. Sch. w. Jamaica.

Weniger gekannte oder zweifelhafte Arten:

ostrina Lindl., purpurfarbige, 4. Kn. Sch. w. Cuba.

violacea Boj. (= *Convolvulus violaceus* Spgl., non Vahl,

Pharbitis

= *C. indicus* Mill. = *Ipomoea violacea* L.), violette,
 ☉. Sch. w. m. f. Mittäg. Amerika.

bracteata Choisy, (= *Ipomoea bracteata* Rud., Ledeb.
 = *I. Rudolphi* R. et S.). St. Domingo.

Preauxii Webb, Canarische Inseln, werden nicht kultiv.
thrianthina Hook., v. *Ipomoea thrianthina*, p. 421
 et p. 321, II.

Pharium elegans Steud. (= *fistulosum* Herb. =
Herberti Steud.), v. *Bessera elegans*, p. 66, II.

Pharnaceum albens Thbg., *incanum* L. mant. (= *lineare* Andr.), *lineare* Ait., *pruinatum* Haw., v. *Ginginsia albens*, *elongata*, *aurantiaca* et *pruinosa*, p. 263, II., *Cerviana* L., *cordifolium* L., *dichotomum* L., etc., v. *Mollugo Cerviana*, *cordifolia* etc., p. 413 et 414, II., *depressum* L., v. *Polycarpha depressa*, *Mollugo* L. spec. (= *glomeratum* Thbg.), v. *Adenogramma galioides* p. 9, II., *Mollugo* L. mant., v. *Glinus Mollugo*, p. 265, II., ? *suffruticosum* Pall., v. *Geblera suffruticosa*.

Pharus L., Cannagras.

brasiliensis Raddi, (= *pubescens* Speg. = *Abildgardia polystachya* Speg.), brasilianisches, 4. w. Brasilien.

scaber H. B. K. (= *lappulaceus* Aubl. = *latifolius* Lam. = *ovalifolius* Hamilt.), scharfes, 4. w. Südamer.

Phaseolus T., Bohne.

abyssinicus Savi, abyssinische, ☉. Sch. f. Abyssinien.

aconitifolius L. fil., Jacq. (= *lobatus* Roxb. = *palmatifolius* Forsk. = *trilobus* Wall. = *Dolichos dissectus* Lam.).

anguineus Bunge, schlangenähnliche, ☉. Sch. f. Nordchina.

angulosus Ortega, (= *vexillatus* Walt., non L. = *Dolichos angulosus* DC. = *Glycine angulosa* W. = *Strophostyles angulosa* Ell.), kantige, ☉. Sch. f.

Nordamerika.

asperrimus Schrank, raueste, ☉. Sch. m. f. Brasilien.

bicolor Arrabida, zweifarbige, ☉. Sch. w. m. f. Brasilien.

chlorospermus Tenore, grünsaamige, ☉. Sch. f. ?

citrinus Savi, citronfarbige, ☉. Sch. f. ?

farinosus L. (= *Phasellus lanatus* Mch.).

ferrugineus Salzw., Mediv. (= *Ervum mastichinum* Pall.), rostfarbige, ☉. Sch. f. ?

ficifolius Schrad., feigenblättrige, ☉. Sch. w. m. f. Ostindien.

formosus H. B. K., schöne, ☉. Sch. m. f. Neuspanien.

glycinaeformis Weinm., glycinenähnliche, ☉. Sch. f. China.

Hernandesii Savi, Hernandez's, ☉. Sch. f. Mexico.

humifusus Savi, (= ? *glycinaeformis* DC.), niedergestreckte, ☉. f. ?

inamoenus L. (= *macrocarpus* Mch. = ? *platyspermus* Haberl).

jonocarpus Fingerh., veilchenblaufrüchtige, ☉. Sch. f. ?

lobatus Hook., gelappte, 4. Sch. w. Brasilien.

lupinoides Fingerh., lupinenähnliche, ☉. Sch. f. ?

β) *pisiformis* Fingerh.

microcarpus Mart., kleinfrüchtige, ☉. Sch. f. Mexico.

multiflorus Lam. (= *vulgaris coccineus* L.).

b) *albiflorus* Lam., c) *variegatus* Hort.

ovalispermus Fingerh., eisaamige, ☉. Sch. f. ?

Phaseolus

- peduncularis H. B. K. (= *pedunculatus* Spgl.), langstielige, ☉. Sch. m. f. Neugranada.
 praecox Fingerh., frühe, ☉. Sch. m. f. ?
 Principessae Savi, Princessin-B., ☉. Sch. m. f. ?
 radiatus L. (= *pisiformis* Schrad.).
 Ricciardianus Tenore, Ricciardi's, ☉. Sch. m. f. ?
 superbus A. DC., stolze, 4. Kn. Sch. w. m. f. ?
 triangularis Fingerh., dreikantige, ☉. Sch. f. ?
 tunkinensis Lour., tunkinische, ☉. Sch. w. m. f.
 Cochinchina.
 violaceus Steud. (= ? *abyssinicus* DuRoi, = *Dolichos abyssinicus* Hort. = *D. violaceus* Hort. = *Phasiolus violaceus* Mch.).
 vulgaris L. (= *lilac* Zucc. = *nigerrimus* Zucc.).

β) nanus L.

Hybriden und Varietäten:

- aureus Hort., bicolor Hort. Vindob., bicornis Hort. Lugd., bipunctatus Jacq., Lam, Bocconi Thouin, carneus Haberle, compressus DC., cruentus Haberle, dominicensis Zucc., Mart., durus Mart., elongatus Haberle, gonospermus Savi, b. pictus Cavan., grandispermus Hort. Lugd. batav., haematocarpus Savi, Hoffmanni Mart., incarnatus Mart., luteolus Balbis, Tenore, maculatus Mart., melaleucus Hort. Lugd. batav., melanospermus Mart., mesomelus Haberle, oblongus Savi, odoratus Hort., ornithopus Mart., Ourta e Caramenia Mart., paraguayensis Tenore, retusus Mch., romanus Savi, rufus Jacq., saccharatus Mch., saponaceus Savi, scriptus Hort., sexpedalis Hort. Lugd. batav., sinensis Hort., sphaericus Savi, subrotundus Hort. monspel., Tenore, tumidus Savi, vitellinus Hort., Willot Mart., Xuarezii Zucc., Zebra Hort., zeylanicus Tenore etc.

Phaylopsis imbricata Sweet, = *Aetheilema imbricatum*, p. 12.

Phebalium Vent., Myrtenraute.

- Billardieri Juss. (= *elaeagnoides* Sieber, = *Eriostemon squameum* LaBill.), Billardiere's, ⚭. t. Neuholland.
 correaefolium Juss. (= *ovatum* Sieber), correablätterige, ⚭. t. Neuholland.
 elaeagnifolium Juss. (= *anceps* Sieber), Oleasterblätterige, ⚭. t. Neuholland.
 phylicoides Sieb. (= *diosmeum* Juss.), phylicaähnliche, ⚭. t. Neuholland.

Phellandrium ciliatum Herbar. et Hort., v. Spananthe paniculata, p. 774.

Philadelphus L., Pfeifenstrauch (wilder Jasmin).

- affinis Schltldl., ähnelnder, ⚭. k. f. b. Mexico.
 coronarius L., e ?aromaticus Hort Par.
 grandiflorus W. (= *inodorus* Hort. = *laxus* Hort.).
 floribundus Schrad., latifolius Schrad. (= *pubescens* Cels), laxus Schrad. (= *humilis* Hort.), verrucosus Schrad. (= *grandiflorus* Lodd.) et Zeyheri Schrad. werden von Walpers als Abarten hierher gezogen.
 intermedius Hort. Dyck., mittlerer, ⚭. f. ?
 mexicanus Schltldl., mexicanischer, ⚭. f. b. k. Mexico.
 pubescens Rafin., feinhaariger, ⚭. f. Nordamerika.
 speciosus Schrad. (= *grandiflorus* Hort., non W.).
 triflorus Wall., dreiblumiger, ⚭. k. f. b. Nepal.

corymbosus Wall., v. *Deutzia corymbosa*, p. 197, 11.

Philadelphus

imbricatus Soland., v. *Schidiomyrtus crenulata*,
laniger Ait., *scoparius* Ait. et *floribundus* Usteri,
v. *Leptospermum lanigerum*, pubescens et scopar-
ium, p. 456 et 352, 353, II.

Philippia Kl., Philippie, VIII. 1., Ericaceae.

abietina Kl. (= *Salaxis abietina* Salisb., W. = *S. im-*
bricata W. herb. = *S. mauritiana* Boj.), tannenähn-
liche, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

arborescens Kl. (= *Salaxis arborescens* Salisb., W.),
baumartige, ♂. ♀. t. Mauritius.

Leeana Kl. (= *Erica absynthoides* E. Mey. nsp. =
E. pedunculata Lee, = *E. pistillaris* H. angl. = *E.*
virgata-nana Wendl.), Lee's, ♂. t. Südafrika.

montana Kl. (= *Salaxis montana* Salisb., W. = ?*S.*
mauritiana Boj.), Bergliebende, ♂. t. Mascarenas.

Philippodendron Poit. (Louis Philipp, König der
Franzosen, Mäcen d. Wissenschaften u. Künste etc.),
Philippsbaum, XXII. x., Büttneriaceae-Philippodendreae.

regium Poit. (= *Betula pulchella* Hort.), königlicher,
♂. t. k. Nepal.

Phillyrea T., Steinlinde.

angustifolia L., *α*) *lanceolata* Ait., Vahl, (= *mucronata*
linearis Tausch), *β*) *rosmarinifolia* Ait., Vahl, (Mill.),
γ) *brachiata* Ait., Vahl.

divaricata Visian. (= *Olea divaricata* Dsf.), ausgesperrte,
♂. ♀. k. ? 1)

latifolia L., *α*) *laevis* Vahl, (W. Enum.), (= *mucronata*
dentata Tausch), *β*) *ilicifolia* W. Enum. (= *latifolia*
serrata Poll. = *latifolia spinosa* Ait. = ?*longifolia*
Lk. = *spinosa* Mill.), *γ*) *obliqua* Ait. (W. Enum.),
(= *mucronata serrata* Tausch, = *coriacea* Lk.),
? *δ*) *stricta* Bertol. (= *latifolia* A. Tenor.). 2)

media L., *α*) *ligustrifolia* Ait. (= *mucronata lanceolata*
Tausch), *β*) *virgata* Ait. (W. Enum.), *γ*) *pendula* Ait,
Vahl, (W. Enum.), *δ*) *oleaefolia* Ait., Vahl, (W. Enum.),
(= *latifolia lanceolata* Tausch), *ε*) *buxifolia* Ait.,
Vahl, (= *latifolia buxifolia* Lk.).

Loweii DC. (= *Olea microcarpa* Lowe), ♂. ♀. auf Ma-
deira heimisch, scheint nicht kultivirt zu werden.

paniculata Roxb., *robusta* Roxb. (= *terminalis*
Roxb.), v. *Visiania paniculata et robusta*.

Philodendron Schott, Endl, Kunth, Zehrwurzstrauch
(Baumfreund), XXI. ix., Aroideae.

arborescens Kunth, (= *Arum arborescens* L. = *Cal-*
adium arborescens Vent., p. 143), baumartiger, ♂. w.
Ostindien, Brasilien, Surinam.

bipinnatifidum Schott, (= *Arum bipinnatifidum* Flor.
Flumin. = *Sphincterostigma bipinnatifidum* Schott),
doppelfiederspaltiger, 4. ♂. w. Brasilien.

cannaefolium Mart. (= *crassipes* Hort. belg. et gall. =
Caladium crassipes Hortul. = *C. macropus* H. Petr.),
blumenrohrblättriger, 4. ♂. w. Brasilien.

corcovadense Kunth, (= *Arum arborescens* Flor. Flum.),
corcovadoischer, 4. ♂. w. Brasilien.

crassinervium Lindl. (= ?*platyneuron* Hort. gall. =
Bauersia s. *Baursea maculata* Rchb. = *B. nervosa*

1) Nach DeCandolle eine „species dubia“.

2) Nach DeCandolle vielleicht eigne Art.

Philodendron

- Hffg. = *Caladium Bauersia* s. *Baursea* Hffg., Rchb.
 = ? *Pothos platyneuron* Dsf. = *Caladium platyneuron*
 Salm Dyck. = *Arum lanceolatum* Flor. Flum.),
 dicknerviger, 4. w. Brasilien.
crinipes Ad. Brogn., mähenstielliger, 4. 5. w. Guiana,
 Mexico.
Fontanesii Kunth, (= *Caladium brasiliense* Dsf.), Des-
 fontaine's, 4. w. Brasilien.
 ? *fragrantissimum* Kunth, Lindl. (= *Caladium fragran-*
tissimum Hook.), wohlriechenster, 4. 5. w. Demerara.
grandifolium Schott, (= *Arum grandifolium* Jacq. =
Caladium grandifolium W., p. 143).
hederaceum Schott, (= *Arum hederaceum* L., p. 85).
Imbé Schott, (= *Caladium Imbé* H. Berol. = *Colo-*
stigma Imbé Schott), Imbé-Z., 4. 5. w. Brasilien.
 ? *inciso-crenatum* Kunth, (= *lacinosum* Schott, =
Caladium lacerum Hort. Berol.), schlitz-kerbiger, 4.
 5. w. Brasilien.
lacerum Schott, (= *Arum lacerum* Jacq. = *Caladium*
lacerum W., p. 143).
 ? *Linnaei* Kunth, (= *Arum cannaefolium* L. suppl.),
 Linne's, 4. w. Surinam.
 ? *luridum* Kunth, (= *Acontias luridum* G. Don, = *Ca-*
ladium luridum Lodd.), bleifarbiger, 4. w. Brasilien.
 ? *pedatum* Kunth, (= *Caladium pedatum* Hook., p. 143,
 = *Dracontium laciniatum* Flor. Fluminens.).
pinnatifidum Schott, (= *Arum pinnatifidum* Jacq. =
Caladium pinnatifidum W., p. 143).
 ? *punctatum* Kunth, (= *Arum punctatum* Dsf.), punk-
 tirtter, 4. 5. w. ?
Simsii Sweet, Kunth, (= *Caladium grandifolium* Sims,
 = *C. Simsii* Hook., p. 143).
speciosum Schott, (= *Meconostigma speciosum* Schott),
 prächtiger, 5. w. Südamerika.
tripartitum Schott, (= *Arum tripartitum* Jacq. = *Ca-*
ladium tripartitum W., p. 143).
exinium Schott, ist H. Prof. Kunth zweifelhaft.
quercifolium Hort. belg. = ?
Philostyzus Fontanesianus Cass., v. *Centaurea fe-*
rox, p. 177.
Philoxerus brasiliensis RBr., v. *Teleianthera brasi-*
liensis, Sect. Mogiplanes.
- Phippsia** RBr., *algida* RBr., v. *Sporobolus* Sect. I.,
 p. 779.
Phleboanthe Laxmanni Tausch, v. *Teucrium Lax-*
manni, p. 803.
- Phleum** L., Lieschgras.
asperum Vill. (= *Lima* Hort. = *odoratum* Schreb. =
paniculatum Huds., Wither. = *sibiricum* Hort. =
ventricosum Mch. = *viride* All. = *Chilochloa aspera*
 P. Beauv. = *C. paniculata* P. Beauv. = *Phalaris*
paniculata Ait. = *Ph. tenuifolia* Hort.).
Bertolonii DC., Guss., Bertoloni's, 4. f. Italien.
cuspidatum W. Enum. (= *ambiguum* Tenore et Guss.
 = *Hostii* Jacq. fil. = *trigynum* Schrad. = *Chilochloa*
cuspidata P. B. = *Phalaris cuspidata* Hort. = *Ph.*
mucronata Dsf. = *Ph. trigyna* Host).
echinatum Host, (= *felinum* Sm. = *graecum* W.
 herb.). ☉.

Phleum

pratense L. (= *arvense* Pourr. = *ciliatum* Gilib.).

β) *nodosum* L. (= *bulbosum* Host, = *tuberosum* Panz.), γ) *stoloniferum* Host.

tenuis Schrad. (= *Bellardi* W. Enum. = *P. Mesopotamiae* Hort. = *Achnodonton Bellardi* et *tenuis* P. B. = *Phalaris Bellardi* W. = *Ph. bulbosa* L. amoen. = *Ph. cylindrica* DC. = *Ph. sativa* P. = *Ph. subulata* Savi, = *Ph. tenuis* Host).

aculeatum Lam. etc., v. *Crypsis aculeata* etc., *Aegylops* Scopol., v. *Aegylops ovata*, *alatum* Hort., v. *Phalaris aquatica*, *crinitum* Schreb. (= *monspe-liense* Koel.), v. *Polypogon monspeliensis*, *Gerardi* All., *vaginatatum* Cyrill. (= *Gerardi* Sibth.), v. *Alopecurus Gerardi* et *angustifolius*, p. 37.

Phlogacanthus N. E., *asperulus* N. E., *curviflorus* N. E., *guttatus* N. E., *thyrsiflorus* N. E. (= *Justicia thyrsiflora* Roxb.), *tubiflorus* N. E. (= *Justicia tubiflora* Hamilt.), v. *Justicia* Sect. X. p. 435.

Phlojodicarpus Turcz., Doppelkorkfrucht, V. II., Umbelliferae.

dahuricus Turcz. (= *Cachrys sibirica* Steph. = *Libanotis cachroides* DC.), dahurische, 4. f. Dahurien.

β) *nudiusculus* Turcz.

villosus Turcz. Sibir. baical., wird kaum kultiviert.

Phlomidopsis tuberosa Lk., v. *Phlomis tuberosa*.

Phlomis T., L., Flammenlippe.

angustifolia DC., schmalblättrige, ⚭. k. Italien.

bicolor Benth. (= *samia* β Vivian.), zweifarbige, ⚭. k. Lybien.

cashmeriana Royle, Lindl., cashmirische, ⚭. k. f. b. Ostindien, Cashmere.

flavescens Mill. (= *angustifolia* Mill.), gelbliche, ⚭. k. Kleinasien.

fruticosa L. (= *ferruginea* Hort., non Tenore).

b) *latifolia* Mill.

italica Sm. (= *purpurea* L. spec. ed. II. = *rotundifolia* Mill.).

lanata W. Enum. Suppl. (= *fruticosa minor* Hort. = *microphylla* Sieber, = *parvifolia* Presl).

purpurea L. spec. ed. I., Sm. (= *ferruginea* Mill. = *salviaefolia* Jacq.).

Russeliana Lagasca, (= *lunariaefolia* β *Russeliana* Hook.), Russel's, 4. k. f. b. Syrien.

tuberosa L. (= *Leonotis tuberosa* Hffg. = *Phlomidopsis tuberosa* Lk. = *Phlomoides tuberosa* Mch.).

viscosa Poir. (= *virens* DC. Catal. Hort. monspel.), schmierige, ⚭. k. Kleinasien.

Unbestimmt: *condensata* Mart. Hort. Erlang.

calycina Roxb., v. *Roylea elegans*, p. 702, *laciniata* L., *lanigera* Sivers, v. *Eremostachys laciniata* et *molucelloides*, p. 227, II., *aspera* W. Enum., *biflora* Vahl, *cephalotes* Roth, *chinensis* Retz, *decemdentata* W., *flaccida* Steud. (= *moluccana* Roxb.), *hirta* Roth, *indica* L., *linifolia* Roth, (= *zeylanica* Murray), *martinicensis* Sw. (= *caribaea* Jacq. = *mollis* Schum.), *Pluknetii* Roth, (= *esculenta* Roxb. = *zeylanica* Heyne herb.), *urticaefolia* Vahl, *zeylanica* L., (non Murr. Roxb.), v. *Leucas aspera*, *biflora*, *cephalotes* etc., p. 458 et p. 354, II., *Leo-*

Phlomis

nurus L., *Leonitis* L., *nepetaefolia* L., v. *Leonotis*
Leonurus, *ovata*, *nepetaefolia*, p. 452, *molucooides*
 Vahl, v. *Otostegia scariosa*, p. 464, II.

Phlox L., Flammenblume.

acuminata Pursh, (= *decussata* Lyon, = *corymbosa*
 Sweet).

caespitosa Nutt., rasenartige, 4. f. Nordamerika (Rocky
 mountains).

carolina L., β) *nitida* Pursh, (= *fruticosa* Hort. =
suffruticosa W. Enum. Suppl.), γ) *puberula* Benth.
 (= *carolina* Bot. mag. = *triflora* Sweet).

divaricata L. (= *canadensis* Sweet).

Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. b. Nordwestl. Amerika.
floridana ? Nutt., Benth. (= ? *carolina* Sweet, non L.),
 floridanische, 4. f. b. Florida.

glaberrima L., b) *carnea* Sims.

Hentzii Nutt., Hentz's, 4. f. b. k. Südl. Nordamerika.
 (Scheint noch nicht eingeführt).

humilis Dougl. (= *speciosa* γ Hook. ?), niedrige, 4. f.
 b. k. Nordwestl. Amerika.

hybrida * (= *paniculato-undulata* *), Bastard, 4. f.
 Nordamerika.

longifolia Nutt., langblättrige, 4. f. Nordamerika
 (Rocky mountains).

muscooides Nutt., moosähnliche, 4. f. b. k. Nordamerika.
 (Kaum eingeführt).

reptans Mchx. (= *obovata* Mühlbg.), β) *crassifolia* Lodd.

Richardsoni Hook., Richardson's, 4. f. b. Nördlichstes
 Amerika.

rigida Benth., starre, 4. k. f. b. Nordwestl. Amerika.

Sabini Dougl. (= *speciosa* Hook.), Sabine's, 4. k. f. b.
 Nordwestl. Amerika.

setacea L., b) *nivalis* Sweet, c) *latifolia* Benth. (= *pro-*
cumbens Lehm.).

sibirica L., sibirische, 4. f. b. Dahurien, Sibirien,
 Nordwestl. Amerika.

suaveolens Ait. (= *alba* Mch. = *candida* P. = *macu-*
lata β *candida* Mchx.).

triflora Mchx. (= *carolina* Auct.), dreiblumige, 4. f.
 Nordamerika (Ober-Carolina).

undulata Ait., b) fol. variegat.

Van Houttei Lindl. (= *caroliniano-suaveolens* v. H.),
 Van Houtte's, 4. f. Hybride.

Hybriden und Varietäten:

acutifolia Sweet, *alba kermesina*, *alba magniflora*,
amabilis striatiflora Rendatler, *Amphitriton* R., *amo-*
nissima, *Arsinoe*, *atrocaulis*, *Baron de Pronay*, *Beauty*,
Beau regard, *Bella* R., *Belle reine* R., *Belgica*, *Be-*
resnia, *bicolor*, *blanc de Neilly*, *berolinensis candida*
 Demmler, *Borboniensis*, *brevifolia* Baum., *Hffmsg.*,
Brownii Hort. Dyck., *Broughtonii*, *Caldriana* Courtois,
Camille R., *Cantorberiensis*, *canescens* Hort. Dyck.,
carnea nova, *Céleste* R., *clarkioides*, *Cleopatra*, *coe-*
rulea rubescens D., *coerulescens*, *compacta alba et*
elegans et rosea, *Comte de Flandre* R., *concinna*
rubra, *congesta*, *corymbosa*, *Cromwell* R., *cruenta*
 Curt., *d'Artevelde* R., *Damon* R., *Decamps* R., *DeCan-*
dollei, *Delachei*, *delecta* R., *delicata*, *densiflora* D.,

Phlox

disticha Sabin., divergens Wender., Dodonaei, Donke-
laarii superba, Duc d'Aumale et de Brabant et d'Or-
léans, dulcis R., Dumont d'Urville, Eclipse R., Egyp-
tienne R., elegans, elata Penny, Emma R., excelsa,
Penny, eximia striata, Feu rougeâtre R., Fidalgo
van Houtte, Fleur de Marie R., floribunda D., for-
mosa, formosissima, fortunata, Galathée R., germanica,
Goethaelsii, graciosa, grandiflora, Hanno R., Helicon
R., Henry II. R., Herma, Herinan Kegel V. H., hor-
tensiaeflora, Humanni, Humei, Ingraniana, incarnata,
insignis R., invincible R., Jason R., Jenkinsonii, Ju-
piter R., Lambertiana, Laura R., laeta Penny, limbur-
gensis, Limprechtii D., Linda V. H., Lobelii, Lowei, lug-
dunensis, Lullingstonii, macrantha, mariantha, Mathilde
R., magniflora, Matthioli, mémorable, miniature Smouth,
missourica Hort. Dyck., multiflora, Murrayana, Musard
(= Musarion R.), omniflora coerulescens, et dark
lavender et lilacina picta et major et pallida et pale
Lavender, et picta et purpurea et rosea, Ondine R.,
perfection, philadelphica, picta Mountjoy, pomponia
D., Praga, Princesse Marianne et Pre. royale Knight,
Prinz Maximilian von Neuwied, pulchella, pulcherrima,
pyramidalis var. alba, Amante, Diane, Junon, Mars,
Ninon, Ninon de Lenclos, Norfolkii, Paris, Princesse
Adélaïde, Pre. Louise, regalis, Reine du jour R.,
Régulus R., repanda R., Richilde R., Robert de Flan-
dre R., Rosette R., Rosalba, rubens, sanguinea fol.
aureo-variegat., sanguinolenta, Shepherdii Penny,
Speculum Knight et Penny, suffruticosa var. Alphon-
sine, Athénais, Columelle, coeur tendre, Duchesse de
Nemours, Grand Sultan, laxiflora major, rosa bella,
tenella rubra D., tenera Emilia R., Thésée R., tigrina
Wender., triflora formosissima, trifoliata, Triompha-
teur R., Triton R., Ulysse R., variegata superba Si-
mon, Vénus, verna coerulescens, versicolor grata R.,
Vestale R., villosa, vincaeflora, Virginie, Vulcanie etc.
biflora R. et P. (= *linearis* Cav. = *unidentata*
Bert.), v. *Collomia coccinea*, p. 211, *Hookeri* Dougl.,
pinnata Pav., v. *Gilia Hookeri* et *glomeriflora*,
p. 263, II.

Hiernach p. 616 und 617 zu ergänzen.

Phoebe N. E., Phoebe, IX. 1., Laurineae.

patens N. E. (= *Laurus elongata* W. herb. = *L. pa-*
tens Sw., p. 449, = *Persea patens* Spgl.), absteheude,
h. w. Jamaïka.

Phoenix L., Dattelpalme.

dactylifera L. (= *excelsa* Cav.).

farinifera Roxb. (= *pusilla* Lour., non G. = *pygmaea*
Räusch., Lodd.).

pusilla G., niedrige, h. w. Ostindien, Ceylon.

spinosa Thonning, (= *leonensis* Lodd. = *Fulchironia*
senegalensis Lestib. in Dsf. Catal.), dornige, h. w.
Cap, Guinea, Senegambien.

sylvestris Roxb. (= *Elate sylvestris* L. spec.).

Von *P. ammonis* Ehrbg. u. *inaequalis* Hort. Berol. ist
mir das Vaterland unbekannt.

Phoenixopus decurrens Cass. (= *vimineus* Rchb.),
ramosissimus Rchb., v. *Phaenopus vimineus* et var. β .

p. 506, II., *intybaceus* Less., v. *Brachyramphus intybaceus*, p. 76, II.

Phoenocoma Lindl. = *Phaenocoma*.

Pholidota Lindl., Schuppenorche.

aculeata Lindl., stachelige, 4. w. Ostindien.

articulata Lindl., gegliederte, 4. w. Ostindien.

conchoidea Hort. Booth., muschelförmige, 4. w. ? Ostind. Gardneriana Wall., Gardner's, 4. w. Ostindien.

imbricata Lindl. (Bot. reg. t. 1777), ziegeldachförmige, 4. w. Ostindien.

pallida Lindl. (= *imbricata* Lindl. (Bot. reg. t. 1213, non 1777) = *Cymbidium imbricatum* Roxb. = *Ptilocnema bracteatum* Don), bleiche, 4. w. Nepal, Ostindien.

recurva Lindl., zurückgekrümmte, 4. w. Ostindien.

undulata Wall., wellenförmige, 4. w. Ostindien.

Phormium aloides L., *bulbiferum* Cyrill., *hyacinthoides* L., *orchioides* Thbg. etc., v. *Lachenalia aloides*, *pendula* etc., p. 441 et p. 338, II., *viride* Thbg., v. *Uropetalum viride*, p. 831.

Photinia Lindl., Photinie.

laevis DC. (= *Crataegus laevis* Thbg.), glatte, 5. k. Japan.

Lindleyana W. A., Lindley's, 5. t. Ostindien.

prunifolia Lindl. (= *serrulata* β Hook. et Arn.), pflaumenblättrige, 5. k. China, Japan.

villosa DC. (= *Crataegus villosa* Thbg.), zottige, 5. k. Japan.

Phragmites Trin., Teichrohr.

communis L., δ) *altissima* (Benth.).

giganteus Gay, riesenhaftes, 4. Wa. f. Südfrankreich.

Phryma leptostachya L. (= *carolinensis* Walt.).

Phrynium W., Wasseringwer.

flavescens Sweet, (= *Calathea flavescens* Lindl., p. 145, = *Maranta fl.* A. Dietr.).

grandifolium Sweet, (= *Calathea grandifolia* Lindl., p. 145, = *Maranta grandifolia* A. Dietr.).

litorale Ledeb., Ufer-W., 4. w. Brasilien.

longibracteatum Sweet, (= *Calathea longibr.* Lindl. = *Maranta longibracteata* Dietr.).

luteum Sweet, (= *Calathea lutea* Meyer, = *Maranta disticha* Buchoz? = *M. Cachibu* Jacq. = *M. lutea* Lam.), gelber, 4. w. Caracas.

macilentum Sweet, (= *Calathea macilenta* Lindl. = *Maranta macilenta* A. Dietr.), magerer, 4. w. Brasilien.

maximum Blume, grüster, 4. w. Java.

orbiculatum Sweet, (= *Calathea orbiculata* Lindl., Lodd., p. 145).

Rossii Sweet, (= *Calathea Rossii* Lindl., p. 145).

Allouya Roscoe et *trifasciatum* van Houtte, v. *Maranta Allouya* et *trifasciata*, p. 386, II.

Phycella Lindl., Rothschartel.

biflora Lindl., zweiblumiger, 4. Zw. w. Chili.

brevitubata Herb., kurzröhriger, 4. Zw. w. Chili.

corusca Lindl., schimmernder, 4. Zw. w. Chili.

Zu berichtigen und zu ergänzen, p. 618.

Phylla L., Heidemyrte.

I. *Genuina*.

capitata Thbg., Commelini Spgl. (= *pubescens* W. = *strigosa* Berg.), *cylindrica* Wendl., *excelsa* Wendl.,

Phyllica

horizontalis Vent. (= *plumosa* Spgl.), papillosa Wendl.
 (= ?*plumosa* L.), plumosa L., pubescens Lam. Ait.,
 rosmarinifolia Lam. (= *secunda* Thbg.), squarrosa
 Vent., villosa Thbg.

II. Beckea Burm., Eckl., Zeyh.

imbricata Thbg. (= *Brunia imbricata* G. Don).

lancifolia Steud. (Eckl., Zeyh.), lanzettblättrige, ⚭. t.
 k. Cap d. g. Hoffn.

pinifolia L. fil. (= *B. africana* Burm. = *Brunia pini-*
folia Brongn.).

racemosa L., Thbg. (Eckl., Zeyh.), (= *B. cordata* Burm.).

III. Petalopogon Reissek.

cuspidata Eckl., Zeyh. (Reissek), feingespitzte, ⚭. t. k.
 Cap d. g. Hoffn.

IV. Soulangia Brongn., Eckl., Zeyh.

arborescens Steud. (Eckl., Zeyh.), baumartige, ⚭. ⚭. t.
 k. Cap d. g. Hoffn.

axillaris Lam. (Brongn.), (= *rosmarinifolia* Thbg.).

buxifolia L. (Brongn.), cordata (Brongn.).

dioica L. (G. Don), zweihäusige, ⚭. t. k. Cap d. g. H.

divaricata Vent. (= ?*ledifolia* Dsf.), ausgespreizte, ⚭.
 t. k. ?

hirsuta Thbg. (Eckl., Zeyh.), rauhhaarige, ⚭. t. k. Cap
 der guten Hoffnung.

ledifolia Dsf. (Eckl., Zeyh.), borstblättrige, ⚭. t. k.
 Cap d. g. Hoffn.

oleaefolia Vent. (Brongn.), (= *oleoides* Dsf. = *spi-*
cata Lodd.).

orientalis W. (Sweet), paniculata W. (Brongn.), (= *an-*
gustifolia Hort. = *longirostrata* Hort. = *myrtifolia*
 Poit. = *oblonga* Hort. = *sessiliflora* Hort.).

pineae Thbg. (Eckl., Zeyh.), kieferähnliche, ⚭. t. k.
 Cap d. g. Hoffn.

rubra W. (Lindl.), (= *Trichocephalus ruber* Eckl., Zeyh.),
 rothe, ⚭. t. k. Cap d. g. Hoffn.

thymifolia Vent. (Brongn.), thymianblättrige, ⚭. t. k.
 Inseln des stillen Meeres.

V. Tylanthus Reissek., Endl.

acerosa W. (Endl.).

australis Lk., neuholländische, ⚭. t. k. Neuholland.

bicolor L. (= *australis* Thbg.), ericoides L. (Endl.).

eriophora Berg. (= *arborescens* Lk. = *nitida* Lam.).

glabrata Thbg., glatte, ⚭. t. k. Cap d. g. Hoffn.

imberbis Thbg. (= *brunioides* Lam. = *Trichocephalus*
imberbis Eckl., Zeyh.).

lanceolata Thbg., lanzettliche, ⚭. t. k. Cap d. g. Hoffn.

parviflora L., pumila Wendl., reclinata Wendl.

secunda Thbg., einseitige, ⚭. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Willdenowiana Eckl., Zeyh. (= *rosmarinifolia* W. Enum.),
 Willdenow's, ⚭. t. k. Cap d. g. Hoffn.

VI. Walpersia Reissek., Endl. (= *Trichoce-*
phalus Brongn., Eckl., Zeyh.).

callosa L. (= *reflexa* Lam. = *Trichocephalus callo-*
sus Eckl., Zeyh.).

spicata L. fil. (Endl.), (= *Trichocephalus spicatus*
 Brongn.).

stipularis L. (Endl.), (= *Trichocephalus stipularis*
 Brongn.).

Phyllica

Unbestimmtere (deren Stellung unter die Sectionen auch nicht genau bezeichnet ist):

acuminata Nois., Loud. Cap d. g. Hoffn., cordifolia Lam., linearis Dsf. Cap d. g. Hoffn., ovata Hort. Cap d. g. Hoffn., superba H. Cels.

Phyllactis Schrad. (non P.).

zinnioides Schrad. (= *Philactis zinnioides* p. 614).

Phyllamphora mirabilis Lour., v. *Nepenthes Phyllamphora*, p. 545.

Phyllanthus L., Sw., Blattblume.

A. Niruri Adans.

acuminatus Vahl, (= *attenuatus* W. hrb. = *averrhoae-folius* Hort. = *cumanensis* W. hrb. = ?*lycioides* H. B. K. = *subglomeratus* Poir.), zugespitzte, ⚥. w. Cayenne.

alatus Blume, geflügelte, ⚥. w. Java.

distichus Hook., zweireihige, ⚥. t. Sandwichinseln.

fraxinifolius Lodd., eschenblättrige, ⚥. ⚥. w. Ostindien.

introducatus Steud. (= *Melanthesa chinensis* Blume), eingeführte, ⚥. ⚥. w. China, Java.

juglandifolius W. (= *grandifolius* Hort., non L.).

lucens Poir. (= *turbinatus* Sims, = ?*Nymphanthus rubra* Lour.).

Niruri L. (= *Nymphanthus Niruri* Lour. = *Urinaria erecta* Medic.).

obtusus Schrank., stumpfe, ⚥. w. ?Guinea.

verrucosus Thbg., warzige, ⚥. t. k. Cap d. g. Hoffn.

villosus Poir. (= *chinensis* Hort. = *Nymphanthus chinensis* Lour.), zottige, ⚥. t. w. China.

B. Xylophylla L., Ait.

Lucena Heyne, (= *lucidus* Hort. = *X. obovata* W.), spiegelnde, ⚥. t. Ostindien.

angustifolius P. (= *X. angustifolia* Sw.), ceramicus P. (= *Xylophylla longifolia* L.), elongatus Lodd. (Jacq. fil.), falcatus Sw. (Ait), (= *Epiphyllanthus* L.), latifolius Sw. (L.), (= *Genesiphylla asplenifolia* L'Her.), linearis P. (Sw.), medius Lodd., montanus P. (Sw.), speciosus Jacq. (= ?*Genesiphylla asplenifolia* L'Her. = *X. Arbuscula* W. = *X. speciosa* Hort.).

Ungewifs: ellipticus Dsf.

ramiflorus P., v. *Geblera suffruticosa*.

Phyllartroum DC. (= *Arthrophyllum* Boj.), Blattgliedler, XIV. II., Bignoniaceae.

Bojeranum DC. (= *Arthrophyllum madagascariense* Bojer), Bojer's, ⚥. w. Madagascar.

β) elongatum DC.

Noronbianum DC. (= *Bignonia articulata* Dsf.), Noronha's, ⚥. w. Madagascar.

comorense Boj., Poivreanum DC., Thouarsianum DC., sämtlich auf den südostafrikanischen Inseln (zumal Madagascar) heimisch, werden nicht kultivirt.

Phyllaurea Codiaeum Lour., v. *Codiaeum chryso-stictum*, p. 876.

Phyllocladus Rich., Blattästler.

rhomboidalis Rich. (= *Brownetera* Rich. = *Podocarpus asplenifolia* LaBill. = *Salisburia* ?*Billardieri* Rich. = *Thalamia asplenifolia* Sgl.).

trichomanoides H. Cels., Haarfarnblättriger, ⚥. t. k. Neuzeeland.

Phylloma Ker, Haw., *aloifolium* Ker, (*borbonicum* Haw.), *Jacquini* G. Don, *macrum* Lk., *rufocinctum* Sweet, v. *Lomatophyllum borbonicum*, *Jacquini*, *macrum*, *rufocinctum*, p. 475.

Phyllopodium Benth., Blattfüßler, XIV. II, Personatae-Scrofularineae (Antirrhineae).

capitatum Benth. (= *Manulea capitata* Thbg., L. suppl. p. 495).

cuneifolium Benth. (= *Manulea cuneifolia* Thbg.), keilblättriger, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

heterophyllum Benth. (= *Manulea heterophylla* Thbg., L. suppl.), verschiedenblättriger, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

Phyllota DC., Benth., Blattöhrchen, X. I., Legumino-sae-Papilionaceae.

aspera Benth. (= *Pultenaea aspera* Sieber, p. 667).

barbata Benth., härtiges, ♀. t. Neuholland.

comosa Benth. (= *Pultenaea comosa* Sbr., p. 667).

grandiflora Benth., großblumiges, ♀. t. Neuholland.

phylicoides Benth. (= *Pultenaea phylic.* Sbr., p. 667).

squarrosa Benth. (= *Pultenaea squarrosa* Sbr., p. 668).

Phymatanthus Lindl., Sweet, *coronopifolius* Sweet, *elatus* Sweet, *Serra* Hffg., *tricolor* Sweet, v. *Pelargonium* Sect. XIII. p. 601 et p. 485, II. *P. grandiflorus* Sweet, *intertinctus* Sweet, *latifolius* Colv., *villosus* Sweet, sind zu dieser Abtheilung gehörige Hybriden.

Phymatidium Lindl., Schwulststendel, XX. I., Orchideae.

denticulatum Lindl., gezahnter, 4. w. Insel St. Catharina.

falcifolium Lindl., sichelblättriger, 4. w. Brasilien.

Phymatodes crassifolia Presl, *irioides* Presl etc., v. *Polypodium crassifolium* etc. Sect.

Phymosia abutiloides Desv., v. *Sphaeralcea abutil.*

Physalis L., Schlutte, (Judenkirsche).

chenopodiifolia Lam. (= *bulbosa* Hedw. in litt. = *incana* Dsf. = *tuberosa* W.).

cordata Mill., herzförmige, ☉. m. f. Vera Crux.

curassavica L. (= *organifolia* Lam.).

indica Lam. (= *angulata* W. (ex parte) = *Alkekengi* Lour. (non Lam.) = *minima* Mill., Roxb. = *parviflora* RBr. = *peruviana* Wall. = *pseudo-angulata* Blume, = *Nicandra indica* R. et S., p. 547).

β) *divaricata* D. Don.

lanceolata Mchx., lanzettförmige, 4. k. Carolina.

lanceifolia N. E. (= *laurifolia* David Dietr. = *angulata* R. et P.), lanzettblättrige, ☉. f. Süd- und Nordamerika.

Linkiana N. E. (= *angulata* Hort. = *arenaria* Hort. = *dubia* Lk.).

maxima Mill., größte, ☉. m. f. Vera Crux.

minima L. (= *abyssinica* Hort. = *angulata* Heyne hrb. = *barbadensis* Wright hrb. = *Lagascae* R. et S. = *micrantha* Lk. = *parviflora* Lagasca, = *peruviana* Wall. = *pubescens* W. hrb. = *Rothiana* R. et S. = *villosa* Roth).

patula Mill. (= *angulata* L. var.? N. E.), ausgebreitete, ☉. m. f. Vera Crux.

pensylvanica L. (= *Jacquini* Lk. = *virginiana* Mill. = *viscosa* Jacq.), pensylvanische, 4. f. Nordamerika.

Physalis

peruviana L., N. E. (= *barbadensis* Lam. = *esculenta* W. = *latifolia* Lam. = *tomentosa* Medic. = *tuberosa* Zuccagn. = *Alkekengi pubescens* Mch.).

β) *edulis* Sims.

prostrata L'Her. (= *limensis* Retz, = *Cacabus prostratus* Bernh. = *Physaloides prostrata* Mch.).

pubescens L. (= *peruviana* Roxb., Wall. = *ramosa* Mill. = *Rothiana* H. Berol. = *staminea* Mühlbg. = *Alkekengi procumbens* Mch.).

β) *barbadensis* Jacq. (= *pruinosa* L. = *obscura* β *pubescens* Pursh, = *Alkekengi villosa* Mch.).

somnifera L., N. E. (= *arborescens* Thbg., non L. = *tomentosa* Sieber, Thbg. = *Physaloides somnifera* Mch.), α) *flexuosa* L., β) *Alpini* Jacq. fil., Südeuropa, Griechenland, Ostindien, Cap d. g. Hoffn. etc.

villosa Mill. (= *indica* ? Lam. sec. N. E.), zottige, ☉. m. f. Vera Cruz.

Unbestimmtere: *adulterina* Fisch., *bullata* Brotero, *lutea* Medic., *mucronata* W. Enum. ♁., *repens* Brotero. *daturaefolia* Lam. (= *peruviana* Mill.), v. *Nican-dra physaloides*, p. 547, *frutescens* DC. (= *suberosa* Cav.), *aristata* Ait., v. *Withania frutescens* et *aristata*, *Schraderiana* Bernh., *allogona* Kunze, v. *Saracha viscosa*, *allogona*.

Physarus Steud., v. *Physurus*.

Physematium Kaulf., Blasenhüllchen.

incisum Presl, (= *Woodsia incisiva* Hook. et Grev.), eingeschnittenes, 4. w. Chili.

molle Kaulf. (= *Woodsia mexicana* RBr.), weiches, 4. w. Mexico.

Perrinianum Presl, Kunze, (= *Cystopteris Perriniana* Lk. Hort. = *Aspidium obtusum* W. spec. = *Polypodium obtusum* Sw. = *Woodsia Perriniana* Hook. et Grev., Torrey., p. 858), Perrin's, 4, k. t. Pennsylvanien, Virginien, Georgien, St. Thomas.

Physianthus albens Mart. et Zuccar. et *albens* Lindl., v. *Arauja sericifera* et *albens*, p. 41, II., *undulatus* Hort. belg., v. *Arauja undulata* Nachlese, *auricomus* Grah. (= *umbellatus* Hort.), v. *Schubertia Grahamii*.

Physochlaeina G. Don, *orientalis* G. Don, *physaloides* G. Don, s. *Hyoscyamus* Sect. II. p. 310.**Physolepidium** Schrenk et C. A. Mey., Blasenkresse, XV. II., Cruciferae.

repens Schrenk et C. A. Mey., kriechende, ♂. 4. f. Soongaria.

Physolobium Benth., Blasenblatt.

carinatum Benth., kielförmiges, ♁. t. Neuholland.

elatum Hügel, Benth., hohes, ♁. Sch. t. Neuholland.

gracile Benth., schlankes, ♁. t. Neuholland.

Stirlingii Benth. (= *Kennedyia Stirlingii* Lindl.), Stirling's, ♁. t. Neuholland.

Physophora sylvatica Hffmsg., Lk., v. *Physospermum aquilegifolium*.

Physosiphon Lindl., Blasenstendel(röhre).

carinatus Lindl. Südamerika.

Loddigesii Lindl. (= *Helis tubata* Lindl. = *Pleurothallis tubata* Lodd.), p. 621.

Physospermum Cusson, Blasensaame.

aquilegifolium K. (= *Danaa aquilegifolia* All. = *Henselera damaecornis* Lagasca, = *Ligusticum aquilegifolium* W. = ? *Smyrnum nudicaule* MB.), akeleiblät-
teriger, 4. f. Taurien, Italien, Spanien, Portugal.

cicutarium Spgl. (= *Ligusticum caucasicum* W. herb. = *Smyrnum cicutarium* MB.), wasserschierlingblät-
teriger, 4. f. Caucasus.

cornubiense DC. (= *commutatum* Spgl. = *Ligusticum cornubiense* L.), cornubischer, 4. f. England.

nudicaule C. A. Mey. (= *Pimpinella Danaa* MB. = *Smyrnum nudicaule* MB.), nacktstengeliger, 4. f. Caucasus.

acteaefolium Presl, 4., *angelicaefolium* Guss., 4. beide in Sicilien heimisch, scheinen nicht kult. zu werden.

Physostegia Benth., Blasenkelch.

truncata Benth., abgestutzter, 4. f. Nordamer., Texas.

virginiana Benth. (= *Dracocephalum lancifolium* Mch. = *D. obovatum* Ell. = *D. virginianum* L. = *Prasium coccineum* Walt.), β) *denticulata* G. Don, (= *Dracoceph. denticulatum* Ait. = *Prasium purpureum* Walt.), γ) *imbricata* G. Don, (= *Dracoceph. imbricatum* Hook.), δ) *speciosa* G. Don, (= *Dracoceph. speciosum* Sweet), ϵ) *variegata* G. Don, (= *Dracocephalum variegatum* Vent. = *Prasium incarnatum* Walt.), b. fl. albo. Nordamerika, Columbia, Texas, p. 621.

Phy surus Lindl., Blasenschweiforche, XX. 1., Orchideae.

Blumei Lindl., Blume's, 4. w. Ostindien.

pictus ? Lindl. (= *Annoectochilus pictus* ? Blum.), be-
malte, 4. w. Ostindien.

Phyteuma L., Rapwurz.

Balbisii A. DC. (= *cordatum* Balbis, non Vill.), Bal-
bis's, 4. f. Ital. Piemont. Alpen.

canescens W. K. (= *lanceolatum* β P. = *Campanula alopecuroides* W. herb. = *C. americana* Hort. = *C. canescens* Hort.).

β) *salicifolium* Kit. (= *salignum* Bess.).

humile Schlchr. (= *armeriaefolium* Tausch, = *Carestiae* Birol. (non Loisel.) = *graminifolium* Sbr. = *hemisphaericum* β Vest).

limonifolium Sibth., Sm. (= *lanceolatum* Dsf. = *strictum* Sims, = *stylosum* Schrk. = *virgatum* Lodd.), Orient, Griechenland, Dalmatien, Süditalien.

β) *collinum* Guss. (= *Campanula virgata* Tenore).

nigrum Schm. (= *atropurpureum* Hoppe, = *ovale* Hoppe, = *ovatum* Hoffm. = *spicatum* L. var. β *coeruleum* Endl.).

orbiculare L. (= *capituliforme* Roch.), δ) *ellipticum* Vill., ϵ) *cordatum* Vill., η) *brevifolium* Schleich. (= *pilosum* Hegetschw.).

Scheuchzeri All. (= *charmelioides* Birol. = *Columnae* Thomas, = *corniculatum* Clairv. = *ovatum* Lam.).

scorzoneraefolium Vill. (= *betonicaefolium* Sims, non Vill. = *Michelii* Bertol. non All. = *Scheuchzeri* β P.).

serratum Vivian. (= *Carestiae* Loisel.), sägezähnlige, k. f. b. Corsica.

Sieberi Spgl. (= *Charmelii* Sieb. = *intermedium* Jan, non Hegetschw.), Sieber's, 4. f. Tyroler-, Kärnthner-, Krainer-Alpen, Schweiz.

Phyteuma

stylosum Bess. (non Schrank), langgriffelige, 4. f. Galicien.

virgatum W. (= *Campanula virgata* LaBill.).

Phyteumopsis Juss., *angustifolia* Poir., *lanceolata* Poir., *latifolia* Poir., v. *Marshallia angustifolia*, *lanceolata et latifolia*, p. 497 et 498.

Phytolacca T., Kermesbeere.

abyssinica Hoffm. (= *dodecandra* L'Her. = *lutea* Marsigl.).

chilensis Miers, chilische, 4. k. Chili.

decandra L. (= *vulgaris* Mill.).

icosandra L. (= *triquetra* Mch.).

octandra L. (= *mexicana* Mill., non Sweet).

Piранanthus RBr., Fett-(Talg-)blume, V. II., Asclepiadeae.

aridus G. Don, Sweet, (= *Stapelia arida* Masson, p. 782).

incarnatus G. Don, (= *Stapelia incarnata* L. suppl., Mass., p. 782).

parviflorus Spgl., G. Don, (= *Stapelia parviflora* Mass., p. 784).

piliferus Sweet, (= *Stapelia pilifera* Mass., p. 783).

pullus RBr. (= ? *fascicularis* R. et S. = *Stapelia fasciculata* Thbg. = *St. pulla* Mass., p. 784).

punctatus RBr. (= *Obesia punctata* Haw. = *Stapelia punctata* Mass., p. 784).

ramosus Sweet, (= *Stapelia ramosa* Mass., p. 783).

Gussoneanus G. Don, v. *Apteranthes Gussoneana*.

Picconia DC. (= *Henslowia* Lowe, non Wall.), (J. B. Picconi hat über Gartenökonomische Gegenstände geschrieben), II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

excelsa DC. (= *Olea excelsa* Ait., Vahl, R. et S. (excl. Synon. Jacq.) = *O. ?maderensis* Hort. Cels.), hohe, 5. k. Canarische Inseln.

Picea D. Don, amabilis D. Don, balsamea D. Don etc., v. *Pinus* Sect. IV.

Picotia brassicaefolia R. et S., *cappadocica* R. et S., *linifolia* R. et S., *scorpioides* R. et S., v. *Omphalodes amplexicaulis*, *cappadocica* etc., p. 557 et 448, II.

Picridium Dsf., Bitterling.

arabicum Hochst. et Steud. (= *tingitanum* Dsf. var. Kunze), arabischer, 6. f. Arabien.

dichotomum Fisch. et Mey. (= *Sonchus dichotomus* MB.), zweizinkiger, 6. ♂. f. Caucasus.

hispanicum Vent., Lk. (= *pinnatifidum* Lagasca, = *Sonchus hispanicus* Jacq.).

orientale DC. (= *Scorzonera orientalis* L.), morgenländischer, 6. f. Orient, Sinai.

Picris L., Bitterkraut.

coronopifolia Dsf. (= *Apargia coronopifolia* W. = *Spitzelia coronopifolia* Schultz), krähenufsblättriges, ♂. 4. k. Nordafrika.

dahurica Fisch. (= *camtschatica* Ledeb., ? Lodd. = *virens* Dsf. = *hieracioides* L. var. Spgl.).

hieracioides L. (= *Crepis hieracioides* Lam.), β) altissima Dsf., γ) ruderalis Schm., δ) humifusa W., ε) crepoides Saut. (= *sonchoides* Vest, = *hieracioides* β *brachypoda* DC.).

integrifolia Dsf. (= *aspera* Poir. = *Crepis aspera* Lam., non L.), ganzblättriger, 6. f. Südeuropa, Orient.

Picris

laciniata Visian. (= *hieracioides* β *sinuata* Ledeb. ? = *hispidissima* K. = ? *scaberrima* Gussone, = *Crepis hispidissima* Bartl. = *C. laciniata* Schchr. = *C. lappacea* Host), schlitzblättriges, ♂. Dalmatien.

laevis C. A. Meyer, (= *Deckera canescens* C. A. Mey. = *Hypochaeris canescens* Stev.), glattes, 4. f. Caucasus.

lappacea Sogl. (= *altissima* Delil.), klettenähnliches, ♂. f. Aegypten.

pilosa Delil. (= *nilotica* Sbr. ? = *Spitzelia aegyptiaca* Schultz Bip.), behaartes, ♂. f. Aegypten.

radicata Less. (= *lyrata* Delil. var. = *Crepis radicata* Forsk. = *Spitzelia Sieberi* Schultz, = *Thrinchia caulescens* Trevir., Sogl.), wurzelndes, ♂. f. Aegypten.

scaberrima Gussone, schärfstes, ♂. f. Sicilien.

taraxaciflora DC. (= *Apargia taraxaciflora* Vivian.), löwenzahnblumiges, ♂. f. Nordafrika.

umbellata N. E. (= *hieracioides angustifolia* Wallr. = *hieracioides* ε *paleacea* DC. = *Apargia rigens* Mart. = *A. umbellata* Schrank, = ? *Hieracium sabaudum* Sm., Hook. = *Leontodon umbellatus* Schrank), dolbiges, ♂. f. Mitteldeutschland, Elsass.

aculeata Vahl, *asplenioides* L., *echioides* L., *spinosa* Poir., v. *Helminthia aculeata*, *asplenioides* etc., p. 293, II., *autumnalis* Vill., v. *Leontodon* (Sect. *Oporinea*) *autumnale*, *danubialis* All., *hirta* All., *hispidula* All., *saxatilis* All., v. *Leontodon hostile*, *Villarsii*, *hispidum*, *squamosum*, p. 452, *pyrenaica* L., v. *Crepis blattarioides*, *rubra* Lam., v. *Barkhausia rubra*, p. 113, *Sprengeriana* Lam. (= *altissima* Ledeb.), *Sprengeriana* Pourr. (= *pauciflora* W. = *pyrenaica* G., non L. etc.), v. *Medicusia Sprengeriana et lappacea*, p. 392, II., *Taraxaci* All., v. *Apargia Taraxaci*, p. 67, *tuberosa* All., v. *Thrinchia tuberosa*, p. 808.

Picrococcus Nutt., *elevatus* Nutt., *stamineus* Nutt., v. *Vaccinium elevatum et stamineum*, p. 833, 834.

Pictetia DC., p. 623.

squamata DC. (= *Caragana spinosa* Rich. = *Rathkea glabra* Schum. = *Robinia squamata* Vahl, = *Rob. squamosa* Poir.).

Piddingtonia A. DC., Nummularia A. DC., v. Lobelia Sect. IX. p. 473.

Pierardia Roxb., Euphorbiaceae-Buxeeae.

racemosa Blume, traubige, ♂. w. Java.

sapida Roxb. (= *dulcis* Jack).

Piercea glabra Mill., *tomentosa* Mill., v. *Rivinia laevis et humilis* β *canescens*, p. 661.

Pieridia Rehb. (= *Pieris* D. et G. Don, p. 623).

phillyreaefolia D. et G. Don, DC. (= *Andromeda phillyreaefolia* Hook.), steinlindenblättrige, ♂. k. f. b. Florida.

sinensis Sweet, (= *Andromeda sinensis* Lodd.), chinesische, ♂. k. China.

Pilea Lindl., Haarnessel.

muscosa Lindl. (= *Parietaria microphylla* L. = *Urtica microphylla* Sw.).

serpyllifolia Lindl. (= *Parietaria prostrata* Sogl. = *P. serpyllifolia* Poir., P. = *Urtica serpyllacea* H. B. K.), quendelblättrige, 4. w. Südamerika.

- Pilitis** Lindl., Haarstrauch, V. 1., Epacrideae.
acerosa Lindl., nadelblättriger, ♀. t. Van Diemens Land.
Pilocereus Lemaire, *Columna Traj.* Lem., *senilis* Lem., v. *Cereus* Sect. I. *Cephalophorus*, p. 93, II.
- Pilogyne** Schrad., Haargriffel.
Ecklonii Schrad., Ecklon's, 4. Sch. k. t. Cap d. g. H.
suavis Schrad. (= *Zehneria suavis* Endl.).
Pilophora testicularis Jacq., v. *Manicaria saccifera*, p. 495.
- Pilumna** Lindl., *Pilumna*, XX. 1., Orchideae.
fragrans Hook., wohlriechende, 4. w. Guatemala.
laxa Hook., lockere, 4. w. Guatemala.
- Pimelea** Banks, Soland. et Forst., Glanzstrauch.
affinis Hort. belg., ähnelnder, ♀. t. Neuholland.
angustifolia RBr., schmalblättriger, ♀. t. Neuholland.
argentea RBr., silberfarbiger, ♀. t. Neuholland.
brachyantha Hort. Berol., kurzblumiger, ♀. t. Neuholl.
decussata RBr. (= *ferruginea* LaBill.).
floribunda Hort. belg., blüthenreicher, ♀. t. Neuholland.
globifera Hügel, kugelförmiger, ♀. t. Neuholland.
grandiflora Don, Hook., großblumiger, ♀. t. Neuholland.
Hendersonii Grah., Henderson's, ♀. t. Neuholland.
hypericina Hook., Cunningh. (= *hypericifolia* Hort.).
imbricata RBr., ziegeldachförmiger, ♀. t. Neuholland.
Lehmanniana Meisn., Lehmann's, ♀. t. Neuholland.
linifolia Sm. (= *filamentosa* Rudge, = *involucrata* Banks, = *Passerina involucrata* Thbg.).
longifolia Banks et Soland. (= *Passerina longifolia* Thbg.), langblättriger, ♀. t. k. Neuzeeland.
Menkeana Lehm., Menke's, ♀. t. Neuholland.
myriantha Meisn., tausendblumiger, ♀. t. Neuholland.
nana Grah., zwergiger, ♀. t. Neuholland (Schwanenfl.).
pilosa W. (= *Banksia pilosa* Forst. = *B. tomentosa* Forst. = *Cookia pilosa* Gmel. syst. = *Passerina pilosa* L. fil.), behaarter, ♀. t. k. Neuzeeland.
Preissii Meisn., Preiss's, ♀. t. Neuholland.
prinifolia Nois., winterbeerblättriger, ♀. t. Neuholland.
prostrata W., Vahl, (= *laevigata* G. = *novae Zeelandiae* Hort. = *Banksia prostrata* Forst. = *Cookia prostrata* Gmel. syst. = *Passerina prostrata* L. fil.), gestreckter, ♀. t. k. Neuzeeland.
punicea RBr. (= *Thecanthes punicea* Wickstr.), granat-rother, ♀. t. Neuholland.
sericea RBr. (= *villosa* Banks, Soland. = *Passerina villosa* Thbg.), seidenhaariger, ♀. t. Van Diemens Land.
spathulata LaBill. (= *linifolia* Sm. var. Spgl.), spatelförmiger, ♀. t. Neuholland.
spectabilis Lindl., ansehnlicher, ♀. t. Neuh. (Schwanenfl.).
suaveolens Meisn., gutriechender, ♀. t. Neuholland.
tinctoria Meisn., färbender, ♀. t. Neuholland.
virgata Vahl, (= *axillaris* Banks, Soland. = *Passerina axillaris* Thbg.), ruthenförmiger, ♀. t. Neuholland.
- Pimpinella** R., L., Bibernell.
 Sect. 1. *Tragoselinum* Mch. (genuina).
dichotoma L., zweizinkige, ☉. f. Spanien.
magna L. (= *major* Gouan, Mill. = *Tragoselinum magnum* Mch.), β) *rubra* Hoppe, (= β) *rubens* DC.), γ) *orientalis* Gouan, (= *austriaca* Mill. = *media* Hoffm. = *laciniata* Wallr.), δ) *dissecta* Retz, (= *laciniata* Thore, = *hircina* Leers, = *peregrina* Lej.

Pimpinella

= *pratensis* Thuill. = *tenuifolia* Schweigger et Körte,
= *Tragoselinum dissectum* Mch.), Europa, Orient.

Saxifraga L. (= *minor* Ehrh.), β) *dissectifolia* Wallr.
(= *genevensis* Vill. = *hircina* Mch.), ε) *nigra* W.
(= *media* Geners.), ζ) *crispa* Hornem.

Sect. II. *Tragium* Spgl. p. 814.

aromatica MB. (= *Tragium aromaticum* Spgl.). ♂.
Iberien, Caucasus.

bubonoides Brotero, (= *anisoides* Guss., non Brignol.
= *Athamantha lasiantha* W. herb. = *Bubon tortuosus*
Lk. et Hffg. = *Tragium anisoides* Brigant. =
Tragium Broteri Spgl. = *Tr. Gussoni* Presl), stein-
eppigähnliche, ♂. 4. k. f. b. Portugal, Italien.

eriocarpus Russ. (= *tenuis* Sbr. = *Tragium eriocar-*
pum Schult. = *Tr. tenue* Lk.), wollfrüchtige, ♂. 4.
k. Aleppo, Creta.

peregrina L. Mant. (= *hispida* Lois. = *taurica* Hort.
= *Ledebouria pimpinelloides* Lk. Enum. = *Tragium*
peregrinum Spgl. = *Tr. tauricum* Ledeb.), fremde,
♂. f. Südeuropa, Taurien.

tenuifolia DC. (= *Tragium tenuifolium* Spgl.), fein-
blättrige, ♂. k. f. b. Persien.

Tragium Vill., Lam. (= *canescens* Loisel. = *Tragium*
canescens Hoffm.), Ziegen-B., ♂. 4. f. Süd- und
Osteuropa, Caucasus.

β) *glaucum* DC. (= *Tragium Columnae* Spgl. =
Tr. glaucum Presl), γ) *laciniata* DC. (= *petraea*
Beaupr.).

villosa Schousb. (= ? *bubonoides* Broter. = *Tragium*
depressum Sbr. = *Tr. Schousboei* Spgl. = *Tr. villo-*
sum Hoffm., Dsf.), zottige, ♂. 4. k. f. b. Marocco.

Sect. III. *Anisum* Adans., G., Mch.

Anisum L. (= *Anisum officinale* Mch. = *A. vulgare*
G. = *Apium Anisum* Targ. Tozzetti, = *Sison*
Anisum Spgl. = *Tragium Anisum* Lk., p. 814).
Griechenland, Aegypten.

apula Bernh. (= *Anisum* L. var. ? Steud. = *Tragium*
apulum * p. 814).

anethifolia D. Don, v. *Ptychotis anethifolia*, *dicho-*
toma Hort. (= *capillacea* Poir. = *dioica* Hort. =
lateriflora Lk. = *leptophylla* P. = *ramosissima*
Hort.), ? *nodiflora* Brotero, v. *Helosciadium lept-*
phyllum et nodiflorum, p. 294, II., *Danaa* MB.,
v. *Physospermum nudicaule*, *dichotoma* Spgl. (= *glaucum*
Hoffm., W. K.), *dioica* L. (= *glaucum* L.
= *multicaulis* Poir. = *pumila* Jacq.), v. *Trinia*
Kitaibelii et vulgaris, p. 822, *segetum* Spgl., v.
Petroselinum segetum, p. 610.

Pimpinella Adans., G., Hall., *agrimonoides* G., *ma-*
ior Lam. (= *Sanguisorba* G.), *spinosum* G., v.
Poterium hybridum, *Sanguisorba et spinosum*, p. 653,
officinalis G., v. *Sanguisorba officinalis*, p. 719.

Pinalia Lindl., *alba* Hamilt., v. *Eria convallarioid-*
es, p. 228, II.

Pinanga Rumph, Blume, *Pinanga-Palme*, XXI. x.
(VI. III.), *Palmae*.

latisecta Blume, breitschlitzige, ♀. w. Java.

Nenga Blume, javanische, ♀. w. Java.

Pinanga

sylvestris Blume, Kunth, (= *cochinchinensis* Blume, = *Seafforthia sylvestris* Mart., Kunth), wilde, ꝑ. w. Cochinchina.

Pinardia Cass., *anisocephala* Cass., *coronaria* Less., *frutescens* Less., *nodosa* Less., *Roxburghii* Less., v. *Chrysanthemum viscosum*, *coronarum*, *carnosulum* etc. p. 193 et p. 141, II.

Pinellia Tenore, *tuberifera* Dehnhardt, v. *Atherurus ternatus*, p. 54, II.

Pinguicula T., Fettkraut.

alpina L. (= *alba* Flörke, = *alpestris* P. = *brachyloba* Rchb. = *flavescens* Flörke, Schrad. = *purpurea* Vahl).

elator Mchx. (= *coerulea* Walt.), hohes, 4. k. Georgien, Carolina.

grandiflora Lam. (= *longifolia* K.), β) *longifolia* DC., (non Gaud. et K.).

gypsophila Wallr., gypsliebendes, 4. f. Harz.

leptoceras Rchb. (= *longifolia* Gaud., non DC. nec K. = *grandiflora* K., Bertol.), schlanksporniges, 4. f. b. k. Süddeutsche Alpen, Schweiz, Piemont, Corsica, Spanien.

lutea Walt. (= *campanulata* Lam.), β) *minor* A. DC., γ) *edentula* Hook.

villosa L. (= *involuta* Skrck., non R. et P.), zottiges, 4. f. b. k. Lappland, nördliches Schweden, Sibirien, Labrador.

vulgaris L. (= *grandiflora* Polli. = *hirtiflora* Tenore). Nord-, Mittel-, Süd- u. Westeuropa, Island, Grönland, Nordamerika, Sibirien, p. 624.

Pinus T., L., Fichte.

I. *Abies* T., D. Don, (= *Picea* Lk.), Pechtanne (Fichte).

Abies L. (= *Picea* DuRoi, = *Abies excelsa* Lam. = *Picea vulgaris* Lk.), b) *nigra pumila*, m) *viminalis* Alstroem.

alba Soland., Ait. (= *canadensis* DuRoi, Mill. = *glauca* Mch. = *laxa* Ehrh. = *tetragona* Mch. = *Abies curvifolia* Salisb.).

coerulea Pinet. Woburn. (= *rubra violacea* Loud. = *Picea coerulea* Lk.), blaue, ꝑ, f. ?

Morinda Lawson, (= *Khutrow* Royle, = *Abies Smithiana* Pinet. Woburn. = *Picea Morinda* Lk.), *Morinda*-F., ꝑ. k. f. b. Himalaya.

nigra Ait. (= *marylandica* Hort.).

obovata Ledeb. (Lk.), verkehrteiförmige, ꝑ. f. Altai.

rubra Lamb. (= *americana* G., Wangenh. = *Peuce rubra* Rich. = *Picea rubra* Lk.), β) *gracilis* Knight.

taxifolia Lamb. (= *Ab. Douglasii taxifolia* A. B., Loud. = *Picea taxifolia* Lk.), eibenblättrige, ꝑ. f. Nordam.

Unbestimmtere: *elegans* Hort., *laxa* Hort.

II. *Cedrus* Barrel. T.

Cedrus L. (= *Abies Cedrus* Rich. = *Larix Cedrus* Mill.).

III. *Larix* T. Lerchenbaum (Lärche).

microcarpa Lamb. (= *Larix nigra* DuRoi, = *Abies americana* Poir.).

sibirica Ledeb. (= *Pseudolarix* Steud. = *L. ? intermedia* Fisch.), sibirische, ꝑ. f. Sibirien.

leptolepis (Sieb. et Zuccar.), (= *Abies leptolepis* Sieb. et Zuccar.), Japan. Scheint noch nicht eingeführt.

Pinus

- IV. *Picea* D. Don, Loud. (= *Abies* Lk.),
Weifs- (= Edeltanne).
Apollinis Lk., Apollo's, ꝥ. f. Griechenland (Parnassas).
balsamea L. (= *Abies balsamea* Miller, = *A. balsamifera* Mchx.), b) *longifolia* A. B., c) *prostrata* Hort. angl.
cephalonica Steud. (= *Abies cephalonica* A. B., Loud. = *A. Luscombeana* Hort. = *A. taxifolia* Hort.).
Nordmanniana Hort. angl., Nordmann's, ꝥ. f. Adshar.
Picea L. (= *Abies DuRoi*, = *pectinata* Lam. = *Abies alba* Mill. = *A. candicans* Fisch. = *A. excelsa* Lk. = *A. pectinata* DC. = *A. Picea* Lindl. = *A. taxifolia* Dsf. = *A. vulgaris* Poir. = *Picea pectinata* Loud.).
Pindrow Royle, (= *Abies Pindrow* Royle, = *Taxus Lambertiana* Wall.).
Pinsapo Boissier, (= *Abies Pinsapo* Sweet), *Pinsapo-T.*, ꝥ. f. Spanien (Sierra de la Nieve).
Webbiana Wall. (= *spectabilis* Lamb. = *tinctoria* Wall. = *Abies Webbiana* Pinet. Woburn).
Unbestimmtere: *Hudsoni* Hort. angl., *monstrosa* Hort. angl.
bifida Siebold et Zuccar., *firma* Sieb. et Zuccar., *homolepis* Sieb. et Zuccar., *jezoënsis* Sieb. et Zuccar., *polita* Sieb. et Zuccar. (= *Pinus Abies* Thbg.), *Tsuga* Sieb. et Zuccar., in Japan heimisch und daselbst Wälder bildend, scheinen noch nicht eingeführt.
- V. *Pinus* T., Kiefer.
apulcensis Lindl., apulcoische, ꝥ. k. f. b. Mexico.
arabica Sieb., Spgl. (= *australis* Hort. Berol., non Mill.), arabische, ꝥ. k. f. b. Orient.
Ayacahuite C. Ehrenb., *Ayacahuite-K.*, ꝥ. k. f. b. Mexico.
Devoniana Lindl., Devon's, ꝥ. k. f. b. Mexico.
filifolia Lindl., fadenblättrige, ꝥ. k. Guatemala.
halepensis Mill., Ait. (= *genuensis* Lodd. = *hierosolymitana* Duham. = *minor* Hort.), β) *maritima* Lam.
Harrisonii Hort. angl., Harrison's, ꝥ. k. f. b. Mexico.
Hartwegii Lindl., Hartweg's, ꝥ. k. f. b. Mexico.
Llaveana Schiede, (= *combroides* Zuccar.).
lutea Walt., gelbe, ꝥ. k. f. b. Carolina.
macrophylla Lindl., großblättrige, ꝥ. k. Mexico.
Massoniana Lamb. (= *sylvestris* Thbg., Lour.), Masson's, ꝥ. k. f. b. Japan, China, Cochinchina.
nigricans Host, (= *austriaca* Höss, Loud. = *nigra* Lk. = *Pinaster* Rochel, Bluff et Fingerh. = *Laricio β austriaca* Ait.), schwarze, ꝥ. f. Mähren, Oestreich, Steyermark, Banat, Croatien, Dalmatien.
ocarpa Schiede, (= *Ocote* Loud.).
ocarpoides Hort. angl., Ocoteähnliche, ꝥ. k. Mexico.
Pallasiana Lamb. (= *taurica* Hort. = *Laricio γ Pallasiana* Antoin.), β) *brevicona* Hort. Vindob.
Pinaster Soland., Ait. Kew., b) *escarena* Risso, (= *scarina* Hort. Cels.), c) *Lemoniana* Benth., d) *chinensis* Hort., e) *nepalensis* Hort., f) *novae Zeelandiae* Ait., Lodd., g) *St. helenica* Hort., h) *Massoniana* Hort. anglor. (non Lamb.).
Pinea L. (= *sativa* Lam. = *domestica* Auct.), e) *chinensis* Hort.
pseudohalepensis Dehnh., unächte, ꝥ. f. b. Neapel.

Pinus

- Pseudostrobus* Lindl., unächte Weymouths-K., \mathfrak{h} . k. f. b. Mexico.
- Pumilio* Clus., Hänke, (= *echinata* Hort. = *montana* Baum. = *Mughus* Scopol., non Jacq.), var. *carpatica*, *gallica*, *pyramidalis* Hort. Vindob.
- pygmaea* Fisch. (= *minima* Hort.), zwergige, \mathfrak{h} . f. Sibirien.
- rubra* Sieb. et Zuccar. (Sjo vulgo Maats Kämpf.), rothe, \mathfrak{h} . f. Japan.¹⁾
- Russeliana* Lindl., Russel's, \mathfrak{h} . k. f. b. Mexico.
- serotina* Mchx. (= *Taeda alopecuroides* Ait.).
- Strobus* L.²⁾, e) *laxa* Hort. angl.
- sylvestris* L., a) *rotundata* Lk. (= *obliqua* Sauter, = *uliginosa* Neum. = *Mughus* Auct.), α) *erecta*, b) *decumbens* Lk. (= *Mughus* Jacq.), β) *brevifolia* Lk., γ) *humilis* Lk. (= *Pumilio* Lamb., et *Pinetum Woburnense*), δ) *sibirica* Ledeb. Aufser denen p. 627 verzeichneten zu dieser Art gehörigen Abarten erwähnen die Pflanzenverzeichnisse noch folgende: *borealis*, *rigensis* (= *Pin de Russie*, *Pin de Matüre*, *Pin de Riga* Dsf.), *hagenoviensis* (= *Pin de Hagenow*), *rubra*, *scotica*, *tyrolensis*, *alba*.
- tatarica* Mill. (= *sylvestris* γ W.), tatarische, \mathfrak{h} . f. Tatarei.
- tenuifolia* Lindl., dünnblättrige, \mathfrak{h} . k. Guatemala.
- Teocote*, Schltdl. et Chamiss. (= *Ocote* Hort.).
- timoriensis* Loud., timorische, \mathfrak{h} . k. t. Insel Timor.
- variabilis* Lamb. (= *echinata* Mill. = *mitis* Mchx. = *Taeda* γ *variabilis* Ait.), veränderliche, \mathfrak{h} . f. Nordam.
- densiflora* Sieb. et Zuccar., *koraiensis* (= *P. Strobus* Thbg.), *parviflora* Sieb. et Zuccar. in Japan heimisch, scheinen noch nicht eingeführt.
- In den Catalogen der Handelsgärten werden noch folgende erwähnt: *altissima*, *Aucklandiae* Hort. Cels., *brevifolia*, *Carica*, *ebennensis*, *eremita*, *indica* H. Cels., *Khytria*, *neglecta*, *nivea* (= *incana*), *lyrata*, *nootkatis*, *novae Hollandiae*, *Pithyusa*, *romana*.
- Pin zona** Mart., Zuccar., *Pinzona*, XIII. VI., *Dilleniaceae*.
- coriacea* Mart., Zuccar., lederartige, \mathfrak{h} . w. Brasilien.

Piper L., Pfeffer.

I. *Peperomia* R. et Pav.

- amplexifolium* Lk. (= *Peperomia talinifolia* Lk.).
- asarifolium* Endl. (Schltdl.), haselwurzblättriger, 4. w. Mexico.
- blandum* Jacq. (= *Micropiper blandum* Miquel).
- circinnatum* R. et S. (= *circulare* Dsf.), kreiselförmiger, 4. w. Brasilien.
- discolor* Sw., verschiedenfarbiger, 4. w. Südamerika.
- Guildingianum* Sogl. (= *Peperomia reniformis* Hook.), Guilding's, 4. w. Insel St. Vincent.
- humile* Vahl, (= *brevicaule* Poir.).
- maculosum* L. (= *variegatum* P. = *Peperomia variegata* R. et P.).

1) Die gemeinste Conifere in ganz Japan, auf den Bergen bis zu 3500 F. Höhe.

2) „Weymouthskiefer“, a Domino Weymouth, qui primus in Comitatu Wiltshire Angliae „circa a. 1705 sylvulam hujus arboris plantavit.“ Endlicher Catalogus horti acad. Vindob. I. p. 245.

Piper

- mauritianum Schult. (= *Peperomia elliptica* Lk.), mauritanischer, 4. w. Mauritius.
- obtusifolium L. (= *magnoliaefolium* Haw., non Jacq.).
 β) *clusiaefolium* Jacq.
- pellucidum L. (= *Micropiper pellucidum* Miq.).
- pubescens (R. et P.), (= *saxicolium* Vahl), weichhaariger, 4. w. Peru.
- Roxburghianum Schult. (= *angustifolium* Roxb.), Roxburgh's, 4. w. Malayischer Archipelagus.
- sarmentosum Roxb. (= *latifolium* Hunt), starkwurzeln-der, 4. w. Malayischer Archipelagus.
- secundum P., Poir. (R. et P.), (= *racemosum* Vahl, non Mill.), einseitiger, 4. w. Peru.
- II. *Heckeria* Kunth.
- peltatum L. (= *pruinosa* H. B. K. = *umbellatum* Sbr. hrb. mart. = *Peperomia peltata* A. Dietr. = *P. pruinosa* Kunth).
- scutatum W. (= *Peperomia scutata* A. Dietr.), wappenschildförmiger, 4. 4. w. Brasilien.
- sidaefolium Lk. et Otto, (= *peltatum* R. et P. = *umbellatum* Jacq. = *Peperomia sidaefolia* A. Dietr. = *Potomorphe sidaefolia* Miquel).
- speciosum H. B. K. (= *Peperomia speciosa* Kunth), prächtiger, 4. 4. w. Venezuela.
- umbellatum L. (= *fasciculatum* R. et P. = *latifolium* Jacq.).
- III. *Piper* R. et P.
- abutiloides Kunth, (= *Schilleria abutiloides* Kunth), sammtmalvenähnlicher, 4. 4. w. Brasilien.
- acutifolium R. et P. (= *velutinum* Opiz, = *Steffensia acutifolia* Kunth).
- aduncum L. (= *scabrum* Lam. = *Artanthe adunca* Miquel, = *Steffensia adunca* Kunth).
- amplum Kunth, (= *nigrum* Beyr. = *sylvestre* Arrabida, *Steffensia ampla* Kunth), voller, 4. 4. w. Brasilien.
- Bredemeyeri Jacq. (= *lacunosum* H. B. K. = *rugosum* Bredem. in W. Enum.), Bredemeyer's, 4. 4. w. Südamerika.
- catalpaefolium H. B. K. (= *Schilleria catalpaefolia* Kunth), Catalpablätteriger, 4. 4. w. Südamer. (Cumana).
- caudatum Vahl, (= *Nhandi* Rich. = *Schilleria caudata* Kunth), geschwänzter, 4. 4. w. Brasilien, Guiana.
- colubrinum Lk. (= ?*heterophyllum* R. et P. = *impunctatum* W. hrb. = *Schilleria colubrina* Kunth).
- decumanum L. (= ?*marginatum* Jacq. = *Steffensia marginata* Kunth).
- Fontanesianum * (= *discolor* Dsf., non Sw. nec alior.).
 Desfontaine's, 4. 4. w. ?
- geniculatum Sw. (= *nitidum* Rehb. = *secundum* Poeppig, = *Steffensia geniculata* Kunth).
- hirsutum Sw. (= *Steffensia hirsuta* Kunth).
- Jacquinianum R. et S. (= *flexuosum* W. Enum., Jacq. fil. = ?*dichotomum* Hort. Par. = ?*nodulosum* Lk.), Jacquin's, 4. 4. w. Caracas.
- laurifolium Mill., lorbeerblätteriger, 4. 4. w. Vera Cruz.
- laurinum R. et S. (= *laurifolium* H. B. K. = *Schilleria laurifolia* Kunth), lorbeerähnlicher, 4. 4. w. Peru.
- macrophyllum Sw. (= *arboreum* Aubl. = *obliquum* R. et P. = *Schilleria macrophylla* Kunth).

Piper

- Malamiri L., Malamiri-P., ꝑ. w. Westindien.
marginatum Jacq. (= *decumanum* Vahl, non L. = *Schilleria marginata* Kunth).
Milleri R. et S. (= *humile* Mill., Poir.), Miller's, 4. w. Jamaika, Barbados.
mollicomum Kunth, (= *acutifolium* Hort. Berol. 1835, = *Steffensia mollis* Kunth), weichschopfiger, ꝑ. w. Brasilien.
nigrescens Blume, schwärzlicher, ꝑ. w. Java.
nigrum L. (= *aromaticum* Poir., non W.).
prunifolium Jacq. (= *cuneifolium* Auct. = ? *Radula* H. B. K.), pflaumenblättriger, ꝑ. w. Caracas.
purpurascens Dsf., purpurfarbiger, ꝑ. w. ?
racemosum Mill., non Vahl, (= *Staphyle* R. et S.), traubiger, ꝑ. w. Vera Crux.
rhomboidale Dum. Cours., Dsf., rautenförmiger, ꝑ. w. ?
spurium Lk. (= *glyphicum* Hffg. = *nigrum* Hort. Berol.), unächter, ꝑ. w. ?
tiliaefolium Hamilt., lindenblättriger, ꝑ. w. Cayenne.
tomentosum Mill. (= *chelseanum* R. et S.), filziger, ꝑ. w. Vera Crux.
tuberculatum Jacq. (= *acutifolium* Poepp. = *macrou-rum* H. B. K. = *nutans* Opiz, = *scabrum* W. hrb. = *verrucosum* Sbr. hrb. Trinit. = *Steffensia tuberculata* Kunth), höckeriger, ꝑ. w. Südamerika.
ꝑ) Linkii A. Dietr. (= *obliquum* Balb., Bertero).
variegatum H. B. K. (= *albo-maculatum* Auct. = *secundum* W. hrb. = *Schilleria variegata* Kunth), bunter, ꝑ. w. Neugranada.
Unbestimmtere: *canescens* Hort., *crassifolium* Hort., *tenuifolium* Hort., *transparentis* Fisch.

Hinsichtlich der übrigen s. *Ottonia*, p. 464, II.

Piptanthus D. Don, Sweet, Fallblume.

- nepalensis D. D., Sweet, (= *Anagyris indica* Wall. = *Baptisia nepalensis* Hook. = *Thermia laburnifolia* Spgl. = *Thermopsis laburnifolia* D. Don, = *Th. nepaulensis* RBr.), p. 629.

Piptatherum P. Beauv., Fallgranne.

- multiflorum P. B. (= *comosum* R. et S. = *Achnatherum miliaceum* P. B. = *Agrostis comosa* Poir. = *A. dispar* Hort. Par. = *A. graeca* Sibth. = *A. monandra* Hornem. = *A. montis aurei* Delarbre, = *A. oseroensis* Seenus, = *A. sepium* Jacq. = *Milium comosum* Poir. = *M. gaditanum* Hort. = *M. multiflorum* Cav. = *M. pauciflorum* Hort. Madrit. = *Urachne comosa* Trin. = *U. multiflora* Lk. = *U. parviflora* Trin.). 1)

ꝑ) *frutescens* Lk. (= *Milium arundinaceum* Sibth., Sm. = *Urachne frutescens* Lk.).

- Thomasii Kunth, (= *Milium Thomasii* Duby), Thomas's, 4. f. b. Corsica.

annulatum Raddi, (= *flavescens* Sieb. = *punctatum* P. Beauv.), v. *Helopus punctatus*, p. 294, II.

Piptoceras Cass., *babylonicum* Cass., *Behen* Cass., v. *Centaurea babylonica* et *Behen*, p. 176.

1) Die hier aufgezählten Synonyme geben nebst manchen anderen einen Beleg zu der oft lästig werdenden und zum Theil widersprechenden Synonymie.

Piptoclainia supina G. Don, v. *Heliotropium supinum*.
Piptopogon decipiens Cass., v. *Seriola laevigata*.
Pirigara Aubl., *hexapetala* Aubl., *superba* H. B. K.,
 v. *Gustavia fastuosa et augusta*.

Piriqueta Aubl., (guianischer Name), V. III., Turne-
 raceae.

cistoides Mey. (= *Turnera cistoides* Hort., non L.),
 ciströschenähnliche, ☉. w. Südamerika.

villosa Aubl. (= *Turnera rugosa* W. = *T. villosa*
 Räusch.), zottige, 4. w. Guiana.

racemosa Sweet, v. *Turnera racemosa*, p. 827.

Pisaura automorpha Bonat., v. *Lopezia mexicana*,
 p. 477.

Pisonia Plum., Pisonie.

Brunoniana Endl., Brunoni's, ⚥. t. Norfolkinsel.

coccinea Sw., scharlachfarbige, ⚥. w. St. Domingo.

fragrans Dsf., Lk. Enum., wohlriechende, ⚥. w. Antillen.

latifolia Dsf., breitblättrige, ⚥. w. Antillen.

nigricans Sw., (= *inermis* Jacq.).

nitida Dsf., glänzende, ⚥. w. Antillen.

Olfersiana Lk., Kl., Otto, Olfers's, ⚥. w. Brasilien.

Pacurero H. B. K. (= *eucalyptifolia* Kunth), schön-
 mützenblättrige, ⚥. w. Neuandalusien, Brasilien.

subcordata Sw. (= *subovata* Poir.).

Pistacia L., Pistazie.

chinensis Bunge, chinesische, ⚥. k. f. b. Nordchina.

mexicana H. B. K., mexicanische, ⚥. k. Mexico.

mutica Fisch. et Mey. (= *Terebinthus* MB.), unbewehrte,
 f. b. k. Caucasus (Talysh).

narbonensis L. (= *reticulata* W. = *Terebinthus he-*
terophylla DC. = *vera* γ *narbonensis* DC.), narbon-
 nische, ⚥. k. Südfrankreich.

trifolia L. (= *macrophylla* P. = *officinarum* Ait. =
vera β *trifolia* DC.), dreiblättrige, ⚥. k. Südeuropa,
 Nordafrika.

Unbestimmtere: *americana* Mill. ⚥. Westindien, Sima-
 rouba Mill. ⚥. Jamaika.

Pistolochia Bernh., *intermedia* Bernh., *solida* Bernh.,
 v. *Corydalis fabacea et Halleri*.

Pisum T., Erbse.

abyssinicum A. Braun., abyssinische, ☉. Sch. f. Abyssinien.

arvense L. (= *sativum* L. ϵ Poir. = *uniflorum* Mch.

= *Lathyrus oleraceus* β Lam.), Var.: purpl, pod or
 Botany Bay Peas, Partridge or Gray.

elatius Stev., M. B., hohe, ☉. Sch. f. Iberien.

sativum L. Var.: *baclium* Hort., *borussicum* Hort., *chlo-*
rospermum Hort., *coerulescens* Hort., *excorticatum*
 Dsf., *fertile* Hort., *humile* Mill., *macrocarpum* Serin.,
macrospermum Hort., *praecox* Hort., *prolificum* Hort.,
quadratum Mill., L., *roseum* Hort., *rugosum* Hort.,
saccharatum Sering., *sibiricum* Hort., *smyrnense* Hort.,
umbellatum Mill., L., *uniflorum* Hort., *variegatum*
 Hort., *viride* Hort., *zeylanicum* Hort.

thebaicum W. (= *sativum* var. Endl.), thebaische, ☉.
 Sch. f. ? Aegypten.

variegatum Presl, bunte, ☉. Sch. f. Sicilien.

americanum Mill., *Aphaca* Brotero, *biflorum* Rafin.,

maritimum L., v. *Lathyrus magellanicus*, *Aphaca*,
grandiflorus, *maritimus*, p. 447, 448 et p. 245, II.

Ochrus L., v. *Ochrus pallida*, p. 552.

Pitcairnia L'Her., Pitcairnie.

albaeifolia Schrad., weißblumenblättrige, 4. w. Westind.

angustifolia Ait. (= *tomentosa* Hort. = *Hepetis angustifolia* Rausch.).

bracteata Ait. (= *latifolia* Red. = *racemosa* Hort.).

caricifolia Mart., seggenblättrige, 4. w. Brasilien.
(Ob kultivirt?)

furfuracea Hook. (= ? *angustifolia* β Hornem. = ? *farinosa* Hort. = *intermedia* Hort.), kleiige, 4. w. Südamerika.

Humboldtii Hort. Berol., Humboldt's, 4. w. Südamerika.

humilis Lodd., niedrige, 4. w. Südamerika.

integrifolia Ker, (= *graminifolia* Hort.).

Karwinskyana Schult., Karwinsky's, 4. w. Mexico.

lanuginosa R. et P., wollige, 4. w. Peru.

leioloma Hort. Petropol., glattsaumige, 4. w. Südamerika.

muscosa Mart., Schult., moosähnliche, 4. w. Brasilien.

Olfersii Otto, Olfers's, 4. w. Brasilien.

paniculata R. et P. (= *Pourretia paniculata* R. et P.), rispige, 4. w. Peru.

platyphylla Schrad. (= *latifolia* Andr., non Ait.), breitblättrige, 4. w. Jamaika.

pulverulenta R. et P., bestaubte, 4. w. Peru.

pungens H. B. K. (= ? *angustifolia* Ait. var.), stechende, 4. w. Südamerika.

punicea Scheidweiler, hochrothe, 4. w. Südamerika.

ramosa Jacq. fil. (= *furfuracea* Jacq. fil.), ästige, 4. w. Südamerika.

Redouteana Schult. (= *angustifolia* Red.), Redouté's, 4. w. Westindien.

ringens Lk., Kl., Otto, rachenförmige, 4. w. Südamer.

sulphurea Andr. (= *bracteata* β Bot. mag.).

undulatifolia Hook., wellenblättrige, 4. w. Brasilien.

Vallisolitana Lexar., vallisolitische, 4. w. Mexico.

Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch folgende: *excelsa* Lodd., *odoratissima* H. Cels., *phoenicea* Hort. belg., *speciosa* Hort., *splendens* H. Cels.

chilensis Lodd. (= *coarctata* P.), *crystallina* P., *furfuracea* W. (= *pyramidata* Lk.), *lanata* Dietr., *pyramidata* P., *recurvata* Hort. belg., v. *Puya chilensis*, *lanuginosa*, *Bonplandiana*, *lanata*, *pyramidata*, *recurvata*.

Pithacarpa Lindl., Pithacarpa, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

corymbulosa Lindl., traubendoldige, \odot . t. m. f. Neuholland (Schwanenflufs).

pulchella Lindl., schöne, \odot . t. m. f. Neuh. (Schwanenfl.).

Pittosporum Soland., Banks, Klebsaame.

bicolor Hook., zweifarbig, \ddagger . k. t. Neuholland.

commutatum Putterl. (= *viridiflorum* Eckl., Zeyh., non Sims), verwechselter, \ddagger . k. t. Cap d. g. Hoffn.

coriaceum Ait. (= *laurifolium* W.).

crassifolium Soland., dickblättriger, \ddagger . k. t. Neuholland.

crenulatum Putterl., gekerbter, \ddagger . k. t. Neuzeeland.

Cunninghamii Hort. angl., Cunningham's, \ddagger . t. k. Neuh.

discolor Hort. angl., verschiedenfarbig, \ddagger . t. k. Neuh.

eriocarpum Royle, wollfrüchtiger, \ddagger . t. Ostindien.

Hügelianum Putterl., Hügel's, \ddagger . t. k. Neuholland.

lanceolatum Putterl. (= *Senecia lanceolata* Lam. =

Pittosporum

- Celastrus lanceolatus* Sogl.), lanzettblättriger, \S . t. w. Mauritius.
- ledifolium* DC. (= *revolutum* DC., non Ait.), porstblättriger, \S . t. k. Neuholland.
- longifolium* Putterl., langblättriger, \S . t. k. Neuholland.
- microcarpum* Putterl. (= *enkianthoides* Rich., Cunningh. = *umbellatum* A. Cunnigh.), kleinfrüchtiger, \S . t. k. Neuzeeland.
- nanum* Hook., zwergiger, \S . t. k. Neuholland.
- oleaefolium* A. Cunningh. (= *phillyraeoides* Cunn.).
- pauciflorum* Hook., Arn., wenigblumiger, \S . t. k. China.
- phillyraeoides* DC., steinlindenblättriger, \S . t. k. Neuh.
- pimeleoides* A. Cunningh., glauzstrauchblättriger, \S . t. k. Neuholland.
- revolutum* Dryand., Ait. (= *fulvum* Rudge, = *hirtum* W. Enum. = *hirsutum* Lk. = *tomentosum* Bonpl.).
- Senacia* Putterl. (= ? *undulatum* β *latifolium* Hügel, = *mauritianum* Lodd. Catal. = *Celastrus undulatus* Lam. = *Senacia undulata* Lam., p. 742, = *Ornithrophe Merularia* Commers.).
- tenuifolium* G. (= *translucens* Hook. = *Trichilia monophylla* Rich.).
- Tobira* Ait. (= *arbutifolium* Hort. = *chinense* Don, = *japonicum* Hort. = *Evonymus Tobira* Thbg.).
- b) foliis variegatis.
- umbellatum* G. (= *eugenioides* A. Cunn. = *Pittosporoides umbellata* Soland.), doldiger, \S . t. k. Neuzeeland.
- viridiflorum* Sims, (= *arbutifolium*, = *capense*, = *odoratissimum* Hort. = *sinense* Dsf.).
- Unbestimmtere: *Coreonopsis* Hort., *crispum* Dsf., *expense* Nois., Loud., *glomeratum compactum* Hort., *tuberculatum* Zeyh., *uniflorum* Putterl.
- hirtum* Hort. Taurin., v. *Syncarpia laurifolia*, *procumbens* Hook., v. *Bursaria procumbens*, p. 83 II.
- Placea** Miers, *Placea*, VI. I., *Narcisseae*.
- chilensis* Miers, chilesische, 4. Zw. w. Chili.
- Plagiolobium glaucum* Makoy, (= *cordatum* Hort.), v. *Hovea ilicifolia*, p. 306, II.
- Plagiophyllum grandifolium* Schldtl., *parvifolium* Schldtl., v. *Centradenia grandifolia et rosea*, p. 132, II.
- Plagiostemon bicolor* Kl., v. *Simocheilus bicolor*, p. 884.
- Plagiüs** L'Her., Balsamkraut, XIX. I., *Compositae-Corymbiferae*.
- ageratifolius* L'Her. (= *Balsamita ageratifolia* Dsf., p. 110, = *B. corymbosa* Salzm. = *B. flosculosa* Hort. = *Chrysanthemum flosculosum* L. = *Matricaria rigida* Desr. = ? *Tanacetum chrysanthemoides* G.), ageratumbblätteriges, \S . k. Sardinien, Corsica, Creta, Nordafrika.
- grandiflorus* Dsf. (= *Balsamita grandiflora* Dsf., p. 110, = *Tanacetum grandiflorum* Poir.).
- virgatus* DC. (= *Allionii* L'Her. = *Balsamita virgata* Dsf., p. 110, = *Chrysanthemum discoideum* All. = *Ch. flosculosum* β Murr. = *Chrysocoma denticulata* Jacq. = *Cotula grandis* L., Jacq. = *Matricaria grandis* Auct. = *M. virgata* Desv. = *Tanacetum virgatum* Loisel.), ruthenförmiges, 4. f. b. Mittägl. Frankreich, westl. Ligurien.

Planera J. F. Gmel., Mchx., Planera.

aquatica Gmel. (= *americana* Hort. = *Gmelini* Mchx. = *ulmifolia* Mchx. = *Anonymus aquatica* Walt.).
 carpinifolia Watson, hainbuchenblättrige, ♀. f. Sibirien.
 Richardi Mchx. (= *crenata* Dsf. = *Rhamnus carpinifolius* Pall. = *R. ulmoides* Güldents. = *Ulmus campestris* Walt. = *U. crenata* Hort. Par. = *U. nemoralis* Ait. = *U. peregrina* Hort. = *U. polygama* Rich.).

Plantaginella aquatica Mch., v. *Limosella aquatica*, p. 464.

Plantago T., L., Wegetritt.

adpersa Bernh., angetüpfelter, ♀. k. f. b. Portugal.
 albicans L. (= *ovata* Forsk.), weißlicher, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.

altissima Jacq. (= *lanceolata* DC. = *sylvatica* Mart.),
 β) dalmatica Schott, (= *Schottii* R. et S.), γ) irrigua Fisch. (= *capitata* Presl, = *Preslii* Tenore).
 arborescens Poir., baumartiger, ♀. k. Canarische Inseln.
 aristata Mchx., granniger, 4. f. Nordamerika (Illinois).
 Bungei Steud. (= *pusilla* Bunge), Bunge's, ⊙. f. Altai-sches Sibirien.

Candollei Rapin, (= *chilensis* Dsf. H. Par. = *d'Urvillei* Delile, = *media* Hook. et Arn., non alior.),
 Candolle's, 4. f. Chili, Californien.

β) californica Fisch. et Mey.

canescens Schrad., graulicher, ⊙. f. Südamerika.
 capitata Tenore (non Hoppe), kopfförmiger, 4. f. Neapel.
 Cornuti Gouan, (= *gracilis* Hort. = *maxima* Ruch.).

β) limosa Kit.

Coronopus L. (= *Columnae* Gouan, = *coronopifolia* Roth, = *integralis* Gaud. = *neglecta* Gussone).

cretica L. (= *Catananche* Clark. = ? *decumbens* Forsk.),
 cretischer, ⊙. f. Griechenland, Kleinasien.

divaricata Zucc. (= *cynopidea* Schult. = *hirsuta* Kit. = *indica* L. var. = *rigida* Hort.), ausgespreizter,
 ⊙. f. ?

eriphora Hffg., Lk. (= *altissima* Brot. = *argentea* Brot. = *lanceolata* Brot. = *Linkii* Schrad. = *variabilis* Lk.), wolltragender, 4. k. f. b. Portugal.

eristachya Tenore, (= ? *aliena* Schrad. = *arvensis* Presl, = *intermedia* Lapeyr. = *Lagopus* L. var. R. et S.).

Eschscholtziana Fisch. et Mey. (= *tomentosa* Cham.).
 firma Kunze, hartblättriger, ⊙. f. Peru.

glauca C. A. Mey., blaugrüner, ⊙. f. Caucasus.

anceolata L., β) abyssinica Hochst., γ) hungarica W. (= *decumbens* Rehb. = *humifusa* Bernh.), δ) lanata Hort. (= *lanuginosa* Bast.), ε) nigricans Lk., ζ) sylvatica P., η) irrigua Bess.

linearis H. B. K. (= *eriorrhiza* W. hrb. = *xorulensis* H. B. K. var. *alpina* Chamiss.), gleichbreitblättriger, 4. k. Quito.

Lofflingii L. (= *carinata* Mch.), β) caspia Fisch. et Mey. (= *minuta* C. A. Mey.).

lusitanica L. (= *lagopodioides* Schrk.), β) pseudolusitanica Schrad., R. et S. (= *fruticosa* Hort. Par.).

micrantha Ledeb., kleinblumiger, 4. f. Sibirien.

microcephala Poir. (= *albicans* Hortul. = *argentea* Sggl. = *declinata* Hort. madrit. = *lanata* W. hrb.

Plantago

- = *monspeliensis* W. Enum. = *villosa* Mch., Roth),
 kleinköpfiger, ☉. f. Persien, Ostindien.
minor Fr., kleiner, 4. f. Nordeuropa.
minuta Pall., M. B., kleinster, ☉. f. Caucasus.
montana Lam. (= *lanceolata* γ P. = *nigricans* Auct.
 = *quinquenervis* Schleichr.).
praecox C. A. Mey., früher, ♂. f. Caucasus.
Psyllium L. (= *Pseudopsyllium* Hort. Par. = *Psyllium*
annuum Mirb. = *P. erectum* St. Hil.).
 β) *nitida* R. et S.
pusilla Nutt. (= *elongata* Pursh, = *hybrida* Bartr. =
linearifolia Mühlbg. = *oliganthos* R. et S. = *pau-*
ciflora Pursh), niedrigster, 4. f. Nordamerika.
recurvata L. (= *incurvata* Murr.).
rigida H. B. K. (= *rigens* Schult. mant. = *rigidius-*
cula Dietr.), starrer, 4. k. Quito.
serpentina Lam. (= *alpina* Sieber, = *aspera* Gaud.
 = *hirsuta* Pour. = *serrata* Hall. fil.).
stricta Schousb. (= *parviflora* Hortul. nec Dsf. = *Ro-*
settana Poir.).
subulata L. (= *brachyphylla* R. et S. = *triquetra* P.).
 β) *pungens* Lapeyr.
tenuiflora W. K. (= *Löfflingii* MB.). Ungarn, Taurien,
 Mittelasien.
teretifolia Sieber, (= *crassifolia* Forsk. = *maritima*
 Delil.).
uliginosa Baumg., sumpfliebender, 4. f. Siebenbürgen.
velutina Poir. (= *albicans* Schousb. = *argentea* Tenor.),
 weißhaariger, 4. k. Calabrien, Nordafrika.
virginica L. (= *connivens* Mch.).
xorulensis H. B. K. (= *graminea* W. hrb. = *mexicana*
 Lk.), xorulischer, 4. k. Neuspanien, Californien.
 b) *micrantha* Hort. Petropol., c) *californica* Hort.
 Petropol.

Unbestimmtere: *canaliculata* Hffg., *diffusa* Presl.

Platanthera Rich., Breitbeutel.

- bifolia* Rich. (= *pervia* Peterm. = *solstitialis* Bönningh.
 = *Wankelii* Rehb. = *Orchis alba* Lam. = *O. bifolia*
 L. = *Habenaria bifolia* RBr. = *Satyrium bifolium*
 Whlbg.). 4. Kn. f. Europa.
 β) *brachyglossa* Rehb. (Wallr.), (= *solstitialis* β
densiflora Drej.).
blephariglottis Lindl. (= *Habenaria blephariglottis* Beck),
 doppelzungiger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
ciliaris Lindl. (= *Habenaria ciliaris* RBr. = *Orchis*
ciliaris L.), gewimperter, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
crispa Lindl., krauser, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
cristata Lindl. (= *Habenaria cristata* RBr. = *Orchis*
cristata Mchx.), kammförmiger, 4. Kn. k. f. b.
 Nordamerika.
dilatata Lindl. (= *Habenaria borealis* Chamiss. = *H.*
dilatata Hook. = *Orchis acuta* Banks, = *O. aga-*
stachys Fisch. = *O. dilatata* Pursh).
fimbriata Lindl. (= *Habenaria fimbriata* RBr. = *Or-*
chis fimbriata Ait), gefranzter, 4. Kn. k. f. b. Nord-
 amerika.
fissa Lindl. (= *Habenaria fissa* RBr. = *Orchis fissa*
 W. = *O. incisa* Nutt., nec Alior.), gespaltener, 4.
 Kn. k. f. b. Nordamerika.

Platanthera

- flava* Lindl. (= *Habenaria flava* RBr. = *Orchis flava* L.), hellgelber, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- grandiflora* Lindl. (= *Habenaria grandiflora* Torr., Beck. = *Orchis grandiflora* Bigel.), großblumiger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- herbiola* Lindl. (= *Habenaria herbiola* RBr. = *Orchis bidentata* Ell. = *O. fuscescens* Pursh, Lodd., non L. = *O. herbiola* Pursh, = ? *O. scutellata* Nutt.), kleiner, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- holopetala* Lindl. (= *Habenaria blephariglottis* Hook., nec alior.), ganzkroniger, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- hyperborea* Lindl. (= *Habenaria hyperborea* RBr. = *Orchis hyperborea* L.), nördlichster, 4. Kn. k. f. b. Nördlichstes Europa und Amerika.
- japonica* Lindl. (= *Orchis japonica* Thbg.), japanischer, 4. Kn. k. Japan.
- incisa* Lindl. (= *Habenaria incisa* Spgl. = *Orchis incisa* Mühlbg., W.), geschlitzter, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- leucostachys* Lindl., weifsähriger, 4. Kn. k. f. b. Nordam.
- obtusata* Lindl. (= *Habenaria obtusata* Richards. = *Orchis obtusata* Pursh), stumpfer, 4. Kn. k. f. b. Nordamerika, Schweden.
- orbiculata* Lindl. (= *Habenaria macrophylla* Hook. = *H. orbiculata* Torr. = *Orchis orbiculata* Pursh), kreisförmiger, 4. Kn. k. f. b. Canada.
- psychodes* Lindl. (= *lacera* Lodd., Sweet, = *Habenaria lacera* RBr. = *H. psychodes* Spgl. = *Orchis lacera* Mchx. = *O. psychodes* L.), 4. Kn. k. f. b. Nordamerika.
- radiata* Lindl. (= *Habenaria radiata* Spgl. = *Orchis radiata* Thbg. = *O. Susannae* Thbg.), strahliger, 4. Kn. k. Japan.
- Susannae* Lindl. (= *gigantea* Lindl. = *Habenaria gigantea* D. Don, = *H. Susannae* RBr. = *Orchis gigantea* Sm. = *O. Susannae* L.), riesenhafter, 4. Kn. w. Ostindien, China.
- viridis* Lindl., v. *Peristylus viridis*, p. 500, II.

Platanus T., Platane, Kleiderbaum.

- acerifolia* W. (= *orientalis* β Ait. = *intermedia* Hort.),
 α) *digitata* Hort., β) *hispanica* Lodd. (= *grandifolia* Hort. Vindob.), γ) *longiloba* Hort. Vindob.
- mexicana* Moric., mexicanischer, β . f. b. Mexico.
- occidentalis* L. (= *lobata* Mch.), β) *macrophylla* Hort. Vindob.
- orientalis* L. (= *or. elongata* Ait. = *palmata* Mch.).

Platurium rubrum Juss., v. *Holmskioldia sanguinea*.

Platynerium Gaudich., Blume, Breitlappenfarn, XXIV. 1., Polypodiaceae (Pterioideae).

- alcicorne* Gaudich., Blume, (= *Acrostichum alcicorne* Sw., p. 16, = *Neuroplatynerus* Plukn.).
- grande* J. Sm. (= *Acrostichum alcicorne* A. Cunningh.), großer, 4. w. Neuholland.
- biforne* Blume, Java, scheint nicht kultiv. zu werden.

Platycodon A. DC., Pracht-(Breit-)glocke.

- grandiflorum* A. DC. (= *Campanula gentianoides* Lam. = *C. grandiflora* L. fil. = *Wahlenbergia grandiflora* Schrad.).

Platycodon

homallanthinum DC. (= *Campanula homallanthina* Ledeb. = *C. Redowskiana* Cham., Schtdl. = *Wahlenbergia homallanthina* A. DC. = *W. Kruhsiana* Fisch.), flachkronige, 4. f. Sibirien.

Platylobium Sm., Breitlappe.

Drummondii Hort. Angl., Drummond's, \S . t. Neuholland.
Fraseri Hort. Angl., Fraser's, \S . t. Neuholland.
obtusangulum Hook., stumpfblättrige, \S . t. Van Diemens Land.

Unbestimmtere: aphyllum Hort., gracile Hort.

lanceolatum Andr., *microphyllum* Sims, (= *obcordatum* Vent.), *ovatum* Andr., Sm., *Scolopendrium* Vent., v. *Bossiaea heterophylla*, *microphylla*, *ovata* et *Scolopendrium*, p. 128 et p. 75, II., *reticulatum* Sieber, v. *Chorisema platylobioides* Nachlese.

Platynema paniculatum Schrad. etc., v. *Mertensia paniculata* etc., p. 399 u. 400, II.

Platypetalum RBr., Breitkrönchen, XV. II., Cruciferae.
involucratum Bunge, hüllblättriges, 4. f. b. Alt. Sibirien.
purpurascens RBr., purpurfarbiges, 4. f. b. Melville-Insel.

Platypteris crocata H. B. K., v. *Verbesina crocata*.

Platyraphium Billardieri Cass., *Jacquini* Cass., v. *Chamaepeuce diacantha* et *afra*, p. 186.

Platysema Benth., Breitfahne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

triquetrum Benth. (= *Vexillaria triquetra* Hffg.), dreiseitige, \S . Sch. w. Brasilien.

Platyspermum litorale K., *muricatum* Hoffm., *pulcherrimum* K. (= *orientale* Hoffm.), v. *Daucus bes-sarabicus*, *muricatus*, *pulcherrimus*, p. 192, II.

Platystemon Benth., Breitfädler.

californicum Benth., β) lineare Walp.

Platystylis Lindl. (non Sweet), Breitgriffel, XX. I., Orchideae.

atropurpurea Lindl. (= *Malaxis atropurpurea* Blume), schwarzpurpurfarbiger, 4. w. Java.

Platystylis Sweet, v. *Orobus* Sect. II. p. 461, II.

Plazia brasiliensis Spgl., v. *Stiftia chrysantha*.

Plectanthera ciliosa Mart., v. *Luxenburgia ciliosa*, p. 375, II.

Plectranthus L'Her., Spornblume.

cordifolius D. Don, (= *divaricatus* Weinm. = *incanus* Lk. Enum. = *maypurensis* Spgl. = *mollis* Spgl. = *secundus* Roxb. = *Ocimum maypureense* Roth, = *O. molle* Ait.).

madagascariensis Benth. (= *Forskohlei* Vahl, (non W.) = *pubescens* W. herb. = *villosus* Sbr. = *Germanea Forskohlei* Poir. = *Ocimum Auricula* Forst. = *O. hadiense* Forsk. = *O. madagascariense* P.), madagascarischer, \S . w. Madagascar, Südafrika, Arabien.

nudiflorus W. (= *Germanea nudiflora* Poir. = *Ocimum chinense* Hort.), nacktblumige, 4. w. China.

parviflorus W. (= *graveolens* RBr. = *paniculatus* Jacq. = *Germanea parviflora* Poir.), kleinblumige, 4. \S . w. Wärmeres Neuholland, Sandwichinseln.

punctatus L'Her. (= *Galeopsis abyssinica* Hort. = *G. maculosa* Lam. = *Germanea maculosa* Lam. = *G. punctata* Poir. = *Ocimum punctatum* L. fil.).

Plectranthus

rugosus Wall. (= *Isodon plectranthoides* Schrad. = *Lumnitzera densiflora* Spgl. = *Ocimum densiflorum* Roth), runzelige, 4. ⚭. w. Ostindien.

tomentosus E. Mey., filzige, 4. ⚭. k. t. Cap d. g. H. *amboinensis* Spgl. (= *aromaticus* Roxb. = *crassifolius* Hortul.), *asper* Spgl. (= *barbatus* Andr. = *comosus* Sims, = *monadelphus* Roxb. = *mysurensis* Heyne), *galeatus* Vahl, *scutellarioides* RBr. (= *ocimoides* Hrb. Madrit.), v. *Coleus aromaticus*, *barbatus*, *galeatus* et *scutellarioides*, p. 211 et p. 153 II. et Nachlese, *Barrelieri* Spgl., *monachorum* Spgl., v. *Ocimum Basilicum* η et *sanctum*, p. 442, II., *carnosus* Sm. (= *crassifolius* Hort. = *strobiliferus* Roxb.), v. *Anisochilus carnosus*, p. 37, II., *rubicundus* Don, *thymiflorus* Spgl. (= *menthoides* W. herb.), v. *Ortosiphon rubicundus* et *glabratus*, p. 462, II.

Plectritis DC., *congesta* DC. (= *capitata* Nutt. = *Valerianella congesta* Lindl. = *V. parviflora* Dougl.), *Plectrogyne variegata* Lk., v. *Aspidistra elatior* β , p. 91 et p. 48, II.

Pleiogyne C. Koch, *anthemoides* C. Koch, *microcephala* C. Koch, *nudicaulis* C. Koch, *villosa* C. Koch, v. *Cenia anthemoides*, *microcephala*, *nudicaulis* et *villosa*, p. 129 et 130, II.

Pleiomeris A. DC., Vieltheiler, V. r. (XXIII. II.), Myrsineaceae.

canariensis A. DC. (= *Manglilla canariensis* R. et S. = *Myrsine canariensis* Spgl. = *Scleroxylon canariense* W.), canarischer, ⚭. k. Teneriffa.

Pleopeltis H. B. K., iteophylla Lk., lycopodioides Presl, macrocarpa Kaulf., Lodd., percussa Hook. et Greville etc., v. *Polypodium* Sect.

Pleroma D. Don, Zellenbeere.

Benthamianum Hook., Lindl. (= *Lasiandra spec.* Cham. Schtdl.), Bentham's, ⚭. w. Brasilien.

Fontanesianum Gardn. (= *granulosum* D. Don, = *Lasiandra Fontanesiana* DC. = *Melastoma granulosa* Sims, Desv. = *M. Fontanesii* Spgl. = *Rhexia alata* Raddi, = *R. dasystaminea* Schrank, = *R. Fontanesii* Bonpl.), Desfontaine's, ⚭. w. Brasilien.

heteromallum D. Don, (= *Melastoma heteromalla* Sims).

Kunthianum Paxton, (= *Lasiandra Kunthiana* DC.), Kunth's, ⚭. w. Brasilien.

mexicanum DC. (= *Melastoma aspera* Pavon), mexicanische, ⚭. w. Mexico.

petiolatum Hort. angl., stielblättrige, ⚭. w. Brasilien.

villosum DC. (= *Melastoma villosa* Sims), zottige, ⚭. w. Südamerika.

holosericeum D. Don, *oxypetalum* D. Don, *vimineum* D. Don, v. *Lasiandra argentea*, *oxypetala* et *coerulea*, p. 344, II.

Pleurachne secunda Schrad. (= *Sieberi* Schrad.), v. *Ficinia secunda*.

Pleurandra LaBill, Rippenbeutel.

acerosa RBr., nadelähnlicher, ⚭. t. Neuholland.

cistiflora Sieber, cistblumiger, ⚭. t. Neuholland.

scabra RBr. (= *ovata* LaBill, var. DC.), scharfer, ⚭. t. Neuholland.

Pleuranthe glastifolia Salisb., v. *Protea humilis*, p. 658.

Pleurogyne Eschscholtz, Griseb. (= *Lomatogonium* v. Braune), Rippen-(Saum-)narbe, V. 1., Contortae-Gentianeae.

carinthiaca Griseb. (= *Gentiana carinthiaca* Fröl. = *Lomatogonium carinthiacum* v. Braune, p. 883, = *Swertia carinithiaca* Wulf.), β) *gracilis* Griseb. (= *rotata* G. Don, = *Gentiana polyantha* Fisch.), γ) *Stelleriana* Griseb., G. Don, (= *Gentiana rotata* MB. = *G. Stelleriana* Cham. et Schltdl.). Sibirien, Caucasus.
rotata Griseb. (= *Gentiana rotata* Fröl. = *G. sulcata* W. = *Swertia rotata* L. = *S. sulcata* Rottb.), radförmige, ♂. f. Nördliches Amerika.

Pleurospermum Hoffm., Rippensaame.

Archangelica Ledeb., engelwurzähnlicher, 4. f. Alt. Sibirien.
uralense Hoffm., uralischer, 4. f. Ural. Sibirien.

cicutarium Auct., v. *Molopospermum cicutarium*, p. 258, *Golaka* Rchb., v. *Malabaila Hacquetii*, p. 382, II.

Pleurothallis RBr., Rippenstendel.

aurea Hort. belg., goldfarbiger, 4. w. Südamerika.

barbata G. Bark., Dickins, bärtiger, 4. w. Para.

caulescens Lindl., stengeliger, 4. w. Peru.

circumplexa Lindl., rundumflechtiger, 4. w. Mexico.

elongata Lindl., verlängerter, 4. w. Südamerika.

lanceolata Lindl. (= *lanceifolia* Hort. = *Stelis lanceolata* W. = *Humboldtia lanceolata* R. et P.), lanzettlicher, 4. w. Peru.

laxa Lindl. (= *Dendrobium laxum* Sw. = *Epidendrum laxum* Sw.), lockerer, 4. w. Jamaika.

macrorrhiza Lindl., grofswurzeliger, 4. w. Peru.

muscoidea Lindl., moosähnlicher, 4. w. Brasilien.

pulchella Lindl. (= *Stelis pulchella* H. B. K.), hübscher, 4. w. Peru.

ruscifolia RBr. (= ?*laurifolia* H. B. K. = *Dendrobium ruscifolium* Sw. = *Epidendrum ruscifolium* Sw.).

sertularioides Spgl. (= *Dendrobium sertularioides* Sw. = *Epidendrum sertularioides* Sw.), sertulariaähnlicher, 4. w. Jamaika.

tribuloides Lindl. (= *Cymbidium tribuloides* Spgl. = *Dendrobium tribuloides* Sw. = *Epidendrum tribuloides* Sw.), bürzeldornähnlicher, 4. w. Jamaika.

triangularis Kl., dreikantiger, 4. w. Caracas.

tricarinata Poepp., Endl., dreikieliger, 4. w. Peru.

tridentata Kl., dreizähniger, 4. w. Südamerika.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der vorzüglichern Handelsgärten noch folgende erwähnt:
lingua, *mexicana*, *pubescens*, *robusta*, *tigrina*.

disticha Rich., v. *Oberonia brevifolia*, p. 441, II.,
foliosa Hook., v. *Rodriguezia suaveolens*, *Lanceola*

Spgl., v. *Specklinia Lanceola*, *punctata* Ker, v. *Notylia punctata*, p. 550, *tubata* Lodd., v. *Physosiphon Loddigesii*, p. 621.

Plinia rubra L. (= *pedunculata* L. fil.), v. *Eugenia Michellii*, *Plinthine aggregata* var. *tetraquetra* Rchb., v. *Arenaria tetraquetra*, p. 76.

Pluchea Cass., *Pluchea*, p. 885.

foetida DC. (= *marylandica* Cass, non DC. = *Baccharis foetida* L. = *Conyza ? camphorata* Pursh, = *C. ? marylandica* Pursh, = *Gynema dentata* Rafin. =

Pluchea

Gynema viscida Rafin.), stinkende, ♂. 4. f. Nordamerika.

marylandica DC. (non Cass.), (= *Baccharis foetida* Walt. non L. = *Conyza marylandica* Mchx. = *Stylinus maritimus* Rafin.), maryländische, ☉. f. Nordam. odorata Cassini, (= *Conyza odorata* L. = *Conyza carolinensis* Jacq.), wohlriechende, ♀. k. Florida, Carolina, Mexico.

subdecurrens Cass. (= *Baccharis adnata* W. = *Conyza adnata* H. B. K. = *C. asteroides* Dsf. Hort. Par., non L.), wenigherablaufende, ♀. k. Mexico.

Plumbago T., Bleiwurz.

coerulea H. B. K. (= *glandulosa* W. herb. = *Humboldtiana* Schult.).

europaea L. (= *lapathifolia* MB. non W. = *undulata* Mch.). Südeuropa, Caucasus.

occidentalis Sweet, (= *scandens* Hort., non L. = *zeylanica* β R. et S.).

rhombifolia Hook. (= *rhomboidea* Sweet).

zeylanica L. (= *flaccida* Mch. = ?*sarmentosa* Lam.).

Plumieria T. (= *Plumeria* Auct.), Plumierie.

acutifolia Poir. (= *acuminata* Dryand., Ait. = *alba* Hort. Par. = *obtusata* Lour. = *retusa* Bout.), spitzblättrige, ♀. w. Ostindien.

β) *Gasparrinii* A. DC. (= *acutifolia* Gasparr.).

alba L., β) *Jacquiana* A. DC. (= *alba* Jacq.).

Berterii A. DC. (= *obtusata* Bert.), Bertero's, ♀. w. St. Domingo.

bicolor R. et P. (= *alba* L. var. *fragrans* H. B. K.).

bracteata A. DC., deckblättrige, ♀. w. Bahia.

carinata R. et P., kielförmige, ♀. w. Peru.

hypoleuca Gasparr. (= *alba* Hort.), unterseitsweißliche, ♀. w. ? Ostindien.

β) *angustifolia* Gasparr., γ) *Wallichiana* A. DC. (= *alba* Hort. Calcutt.).

incarnata R. et P., β) *Milleri* G. Don, (= *incarnata* Mill.). *Lambertiana* Lindl. (= *Gouani* D. et G. Don, = *mexicana* Lodd.).

megaphylla A. DC. (= *alba* ? var. *flava* Andr.), großblättrige, ♀. w. Mexico.

mollis H. B. K., weiche, ♀. w. Mexico, Orinoco.

obtusata L. (= *nivea* Mill.).

Tenorii Gasparr., Tenore's, ♀. w. ?

tuberculata Lodd.

xanthostoma Schltldl., gelbschlundige, ♀. w. Mexico.

Zu den weniger genau gekannten Arten zählt A. DC. folgende ¹⁾: *africana* Mill., ♀. Senegal, *angustifolia* Aubl., ♀. Guiana, ? *arborescens* G. Don, ♀. Jamaika, *articulata* Vahl, ♀. Guiana, *cuneata* Sm. (= *alba* Aubl.), ♀. Guiana, *inodora* Jacq. (= *alba* var. G. Don), ♀. Carthagera, *pudica* Jacq., ♀. Curaçao, *phagedaenica* Mart., ♀. Brasilien (Rio Negro), *xanthostoma* Schltldl., ♀. Mexico.

Ebenso sind ihm folgende unbekannt: *aurantiaca* Lodd., *Blandfordiana* Lodd., Südam., *conspicua* Hort. angl., *jamaicensis* Lodd., *leucantha* Lodd., *longifolia* Bojer, („Culta in Mauritio, forsane e Madagascar“); *macro-*

1) Prodrum syst. nat. reg. veg. VIII. p. 394.

Plumieria

phylla Lodd., Northiana Lodd., tenuifolia Lodd. Die grössere Anzahl derselben wird kultivirt. Vergl. p. 636, und daselbst zu ergänzen u. zu berichtigen.

Pneumonanthe Neck., Schmidt, Delarbre, *acaulis* Schm. (= *angustifolia* Schm.), *algida* Schm., *asclepiadea* Schm. (= *plicata* Schm.), *campanulata* Schm., *campestris* Schm., *frigida* Schm., *ochroleuca* G. Don, (= *villosa* Schm.), *pannonica* Schm., *Pseudo-Pneumonanthe* G. Don, *punctata* Schm., *purpurea* Schm., *Saponaria* Schm. (= *Catesbaei* Schm.), *septemfida* Schm., *vulgaris* Schm. etc., v. *Gentiana acaulis*, *algida*, *asclepiada* etc. etc.

Poa L., Rispengras.

alpina L. (= *Scheuchzeri* Pourr.), δ) *frigida* Gaud. (= *cenisia* Schrad. = *Molinieri* Sering., non Balb.), ε) *flavescens* Thom. (= *variegata* Lam.).

altaica Trin., altaisches, 4. f. Altai, Ostcaucasus.

arundinacea Lk. (= *tatarica* Hort. Gorink. = *Aira arundinacea* L., p. 26, = *Eragrostis collina* Trin.), rohrähnliches, 4. f. Mittelasien, Caucasus.

autumnalis Mühlbg. (= *campyle* Schult. = *cuspidata* Bast. = *Elliotii* Speg. = *flexuosa* Mühlbg. = *pungens* Torrey), herbstliches, 4. f. Nordamerika.

cenisia All. (= *distichophylla* Gaud. = *flexuosa* Host, = *Halleri* Suter, = *stolonifera* Bellardi).

collina Host, (= *alpina* L. var. Auct. = *cenisia* Lk., non All. etc.).

flexuosa Wahlbg. (= *laxa* Whlbg., Lapp., non Hänke), hin- und hergebogenes, 4. f. Europäische Alpen, Nordamerika.

Halleridis R. et S. (= *pallens* Gaud, non Poir.), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen u. Alpen.

laxa Hänke, (= *coarctata* Kit. = *elegans* DC. = *frigida* Schleicher).

leptostachya RBr., schlankähriges, 4. k. Neuholland.

longifolia Trinius, (= *sudetica* a C. A. Mey.), langblättriges, 4. f. Caucasus.

minor Gaud. (= *tenella* Hoppe, = *supina* Panzer).

nemoralis L., β) *firmula* Gaud. (= *Gmelini* Koeler, = *gracilescens* Schrad. = *rhenana* Lej. = *salebrosa* Panz.), δ) *glauca* Sm. (= *glaucaanthos* Schleich. = *glaucescens* Roth), ε) *montana* Gaud. (= *debilis* Thuill. = *glauca* Bast. = *petraea* Bell. = *rariflora* Dsf.), ζ) *schoenosperma* Gaud. (= *juncea* Suter, = *juncoides* Bot. helv. = *tenuis* Vill.), η) *depauperata* Kit. (= *Kitaibellii* Kunth), θ) *variegata* Host, (= ? *Aira helodes* Brignol.).

pellucida RBr., durchschimmerndes, ☉. 4. f. k. Neuholl.

persica Trin., persisches, 4. f. Persien, Caucasus.

saxicola RBr., Felsen-R., 4. k. f. b. Neuholland.

scariosa Lagasca, trockenhäutiges, 4. f. Spanien.

semineutra Trin. (= *Aira semineutra* W. K. = *Phalaris semineutra* R. et S.), halbzwitterähnliches, 4. f. Ungarn.

stolonifera Mühlbg. (= *panicca* W. herb.), sprossendes, 4. f. Nordamerika.

trivialis L. (= *cilianensis* All. = *dubia* Leers, = *Kitaibellii* Schult. = *scabra* Ehrh. = *setacea* Huds.), gemeines, 4. f. Europa, Asien, America.

Hinsichtlich d. übrigen vergl. die Gattungen *Aeluropus*, *Aiopsis*, *Brizopyrum*, *Eragrostis*, *Glyceria*, *Koeleria*, *Leptochloa*, *Oreochloa*, *Sclerochloa*, *Tridens*, *Triodia* etc.

Pocockia radiata Trautv., v. *Hymenocarpus radiatus*.

Podagraria Adans., *Aegopodium* Mch., v. *Aegopodium Podagraria*, p. 21.

Podalyria Lam., Podalyrie.

calyptrata W., α) *villosa* Walp., β) *styracifolia* Sims, (= *myrtillifolia* Eckl., Zeyh., non W. = *Hypocalyptus calyptratus* Thbg. = *Sophora biflora* Houtt. = *S. calyptrata* Retz.).

coruscans Rchb., schimmernde, \mathfrak{h} . k. t. Cap d. g. H.
cuneifolia Vent. (= *albena* E. Mey. = *hirsuta* W. hrb.),
 β) *latifolia* Walp. (= *splendens* Eckl., Zeyh.).

lanceolata Benth. (= *calyptrata* β *lanceolata* E. Mey.),
lanzettblättrige, \mathfrak{h} . k. t. Cap d. g. Hoffn.

myrtillifolia W. (= *buxifolia* Eckl., Zeyh. = *lancifolia* Eckl., Zeyh. = *liparioides* DC. = *parvifolia* Benth. = *virgata* W. hrb. = *Sophora biflora* L. = *S. myrtilloides* Retz., = *S. rotundifolia* Berg.), β) *parvifolia* DC. (= *Crotalaria parvifolia* Thbg.).

Unbestimmt: *mutabilis* Jacq.

genistoides W., v. *Cyclopia genistoides*, *tetraptera* Hort., v. *Edwardsia tetraptera*.

Podocarpus L'Her., Stielfrucht.

chinensis Sweet, (= *Makoyi* Hort. = *Taxus chinensis* Roxb. = ? *T. nucifera* Telfair.).

coreanus Hort. belg., coreaischer, \mathfrak{h} . k. t. Corea.

dacrydioides Rich. (= *Dacrydium excelsum* et *taxifolium* Hort. belg. et anglor., p. 186, II.), gummitanenähnliche, \mathfrak{h} . t. k. Neuzeeland.

elongatus L'Her. (= *Taxus elongata* Thbg.).

Horsfieldii RBr., Horsfield's, \mathfrak{h} . t. Ostinden.

imbricatus Blume, ziegeldachförmige, \mathfrak{h} . t. w. Japan.

latifolius Blume, Wall. (= ? *Taxus verticillata* Thbg.),
breitblättrige, \mathfrak{h} . t. Ostindien.

longifolius Hort. angl. et belg., langblättrige, \mathfrak{h} . k. t. Japan.

macrophyllus Lamb. (= *Taxus macrophylla* Thbg.).

Sprengelii Blume, Sprengel's, \mathfrak{h} . t. w. Java.

taxifolius H. B. K. (= *Yacca* G. Don, = *Taxus montana* W. = *pungens* Hort.).

verticillatus Wall. (= *Taxus verticillata* Thbg.).

zamiaefolius Rich., keulpalmenblättrige, \mathfrak{h} . k. t. Neuzeeland.

Außerdem findet man in den Pflanzencatalogen der Handelsgärten noch nachstehende verzeichnet: *coriaceus*, *Harringtonii*, *mucronatus*, *Purdieanus* (Jamaica), *spicatus* (= *ferrugineus* Hort. = *pungens* Hort.) (Neuzeeland), *Totara* (Neuzeeland).

Podochilus Blume, Lindl., Stiellippe, XX. I., Orchideae.

falcatus Lindl., sichelförmige, \mathfrak{h} . w. Zeylon.

gracilis Lindl. (= *Platysma gracile* Blume), schlanke, \mathfrak{h} . w. Java.

tenuis Lindl. (= *Apista tenuis* Blume), dünne, \mathfrak{h} . w. Java.

Podolepis LaBill., Stielschuppe.

acuminata RBr. (= *Scalia jacaeoides* Sims).

auriculata DC., gehörte, \odot . m. f. Neuholland.

Podolepis

chrysantha Endl. (= *Doratolepis chrys.* Benth.), goldblumige, ☉. m. f. Südwestl. Neuholland.
gracilis Grah. (= *Stylolepis gracilis* Lehm.).
 b) *hybrida* Hort.

longipedata Cunnig., langstielige, 4. ♂. t. Neuholland.

Podolobium RBr., Hülsenfuß.

chorisemaefolium Hort. belg., chorisemablätteriger, ♀. t. Neuholland.

elegans Hort. belg., zierlicher, ♀. t. Neuholland.

aciculare DC., v. *Chorisema Henchmanni*, p. 192,
coriaceum DC., *scandens* DC., *sericeum* DC., v.
Oxylobium retusum, p. 578. *O. scandens* et *sericeum*, p. 466, 467, II., *salicifolium* Hort. = ?

Podosaemum lachnanthum N. E., v. *Agrostis lachnantha*, p. 25 et p. 16, II. Hinsichtl. d. übrigen s. *Mühlenbergia* et *Sporobolus*.

Podospermum DC., Fußsamer.

Columnae DC. (= *Scorzonera Columnae* Guss.), Columna's, 4. f. Unteritalien.

Jacquinianum K. (= *octangulare* Roth, = *Scorzonera laciniata* Jacq., non L.).

molle Fisch. et Mey. (= *villosum* MB., Stev. = *Scorzonera mollis* MB. = ? *S. tomentosa* Pall.), weicher, 4. f. Taurien, Caucasus.

pumilum Loudon, v. *Zollikoferia pumila*, *purpureum* K., v. *Scorzonera purpurea*, p. 735.

Podotheca Cass., Stielbüchsen.

gnaphalioides Hook. (= ? *capitata* Hort.), ruhrkrautähnliches, ☉. f. m. Neuholland (Schwanenflufs).

Poeppigia Kunze, (Poeppig, Prof. d. Naturgeschichte zu Leipzig, berühmt als Reisender durch mehrere Gegenden Amerikas), VI. I., Narcisseae.

chilensis Kunze, chilesische, 4. Zw. t. w. Chili. (Ob eingeführt?)

Poeppigia procera Presl, v. *Caesalpinia procera*, p. 142.

Pogonanthum G. Don, v. *Rhododendron* Sect. p. 686.

Pogonia aspera Hort. (= *scabra* Hort. = *tuberculata* Hort.), *tetrandra* LaBill., v. *Myoporum parvifolium*, p. 536 et *M. serratum*, p. 424.

Pogostemon Dsf., Haarfaden.

paniculatum Benth. (= *Elsholtzia paniculata* W. = *Hyssopus cristatus* Lam.), rispenförmiger, 4. w. Ostindien.

Pogostoma Schrad., Bartmund, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

saxifragaefolium Schrad. (= *Capraria saxifragaefolia* Cham., Schltl.), steinbrechblätteriger, ? ☉. m. f. w. Mexico, Vera Crux.

Poinciana L., Poinciane.

Gilliesii Hook. (= *Erythrostemon Gilliesii* Kl. = *Caesalpinia macrantha* Delile), Gillies's, ♀. w. Mendoza.

pulcherrima L. (= *alata* Burm. = *bijuga* Burm. = *Caesalpinia pulcherrima* Sw.), a) *flava*, b) *rubra*.

Poinsettia Grah., Poinsettie.

pulcherrima Grah. (= *Euphorbia heterophylla* Karw. = *E. Poinsettiana* Buist, = *E. pulcherrima* W. herb.),

β) *albida* Hensl. (= ? *lutescens* s. *lutea* H. belg.).

cyathophora Bartl., v. *Euphorbia cyathophora*.

Poiretia Vent., Poiretie.

psoraleoides DC. (= *Psoralea tetraphylla* Poir. = *Robinia glandulosa* Spgl. = *Turpinia montevidensis* Spgl.), harzkleehähnliche, f. w. Montevideo.

punctata Desv. (= *scandens* Vent. = *Glycine punctata* Lam. = *Turpinia punctata* P.).

Poiretia cucullata Cav., v. *Sprengelia incarnata*, p. 780. *P. erecta* Gmel., v. *Houstonia coerulea*.

Poivreia Commers., Poivreia.

aculeata DC. (= *Combretum aculeatum* Vent. = *C. alternifolium* Spgl. = *C. secundum* Mirb. = *Guira nudiflora* Rchb.), stachelige, f. w. Senegal.

alternifolia DC. (= *Combretum alternifolium* P. = *C. decandrum* Jacq. = *C. Guayca* Humb. = *C. spinosum* H. B. K. = *Gonocarpus Jacquini* Hamilt.), wechselblättrige, f. w. Südamerika.

coccinea DC. (= *Combretum coccineum* Lam. = *C. purpureum* Vahl, = *Cristaria coccinea* Sonner.).

comosa Sweet, (= *Combretum comosum* Don, = *C. paniculatum* Vent.).

eripetala DC., wollkronige, f. w. Domingo.

grandiflora Walpers, (= *Combretum Afzelianum* G. Don, = *C. grandiflorum* G. Don), großblumige, f. w. Sierra Leone.

pilosa Wight, Arn. (= *Combretum pilosum* Roxb.), haarige, f. w. Ostindien.

Roxburghii DC. (= *Combretum decandrum* Roxb. = *C. Roxburghii* Spgl.), Roxburgh's, f. w. Ostindien.

Hiernach p. 640 zu ergänzen und zu berichtigen.

Polanisia Rafin., Polanisie.

Chelidonii DC. (= *Leschenaultii* DC. = *Schraderi* DC. = *Corynandra pulchella* Schrad. = *Cleome Chelidonii* L. = *C. Leschenaultii et Schraderi* Schult.).

icosandra Wight et Arn. (= *viscosa* β DC. = *Cleome epilobioides* Jan, = *C. icosandra* L.), zwanzigfädige, \odot . m. w. Ostindien, China.

Auch die übrig. p. 640 verzeichneten sind \odot . nicht 4.

Polemonium T., Sperrkraut.

capitatum Eschsch. (= *coeruleum* var. Lindl. = *Richardsonii* Grah., Hook. = *speciosum* Fisch.), kopfförmiges, 4. f. Nördlichstes Asien u. Amerika.

grandiflorum Benth., großblumiges, 4. k. f. b. Mexico.

mexicanum Cervant. (= *muricatum* Schrk. et Hortul.).

micranthum Benth., kleinblumiges, 4. f. Nordw. Amerika.

pulchellum Bunge, schönes, 4. f. Altaisches Sibirien.

pulcherrimum Hook. (= *humile* Lindl., non ? Pall., W.).

sibiricum G. Don, Sweet, (= *dissectum* Rchb. = *lacteum* Lehm.), b) *coeruleum*.

villosum Georgi. (= *humile* R. et S. = ? *lanatum* Pall.).

Zweifelhafte Arten: *acutifolium* W., Nordwestl. Amerika,

humile Pall., W., Ostsibirien.

bursifolium W. = *Eutoca bursifolia* Spgl. (wird kaum kultiviert), *ciliatum* W., *dubium* L., *pimpinelloides* W., R. et S. (= *achilleaefolium* W.), v. *Cosmanthus fimbriatus* etc., p. 222, *mexicanus*, *parviflorus*, p. 163, II., *rubrum* L., v. *Gilia coronopifolia*, p. 262, II.

Polianthes Tuberosa.

maculata Mart, gefleckte, 4. Zw. t. Mexico.

mexicana Zuccar., mexicanische, 4. Zw. t. Mexico.

Polianthes

tuberosa L., b) foliis luteo-marginatis.

Polium Mill., *album* Mill., *angustifolium* Mill., *aureum* Mch., *capitatum* Mill. etc., v. *Teucrium Polium*, *flavescens*, *aureum*, *capitatum* etc., p. 903.

Pollichia africana Medic., *indica* Medic., v. *Trichodesma africanum*, *indicum*, p. 817.

Polyactidium DC., Vielstrahlchen.

delphinifolium DC. (= *Diplopappus delphinifolius* Cass. = *Erigeron delphinifolium* W. = *Polyactis delphinifolia* Less. = *Stenactis delphinifolia* Cass.).

Sprengelii DC. (= *Erigeron dubius* Spgl. = *E. resinus* Spgl. = *Polyactis Sprengelii* Schldt.), Sprengel's, ☉. f. m. Brasilien.

Polyactium DC., *multiradiatum* DC., v. *Pelargonium* Sect. p. 601 et p. 485, II., *daucifolium* Eckl., Zeyh., *filipendulifolium* Eckl., Zeyh., *flavum* Eckl., Zeyh., *fulgidum* Eckl., Zeyh., *gibbosum* Eckl., Zeyh., *lobatum* Eckl., Zeyh., *triste* Eckl., Zeyh., v. *Pelargonium daucifolium*, *filipendulifolium*, *flavum* etc. *Polyarrhena reflexa* Cass., v. *Felicia reflexa* DC., *Aster* Sect. VIII. p. 99.

Polybotrya H. B. K., Vieltraubenfarn.

incisa Lk. (= *Acrostichum incisum* Endl.), eingeschnit-
tener, 4. w. Brasilien.

pubens Mart., feinhaariger, 4. w. Südamerika (am
Amazonenflufs).

trapezoides Kunze, trapezenförmiger, 4. w. ? Südamerika.
cervina Kaulf., *Raddiana* Kaulf., L., v. *Olfersia
cervina* et *corcovadensis*, p. 447.

Polycarena Benth., Polycarena, XIV. II., Personatae-
Antirrhineae.

aurea Benth. (= *Manulea aethiopica* Thbg., p. 495,
= *Buchnera aethiopica* L. = *Chaenostoma aethiopi-
cum* Benth., p. 134, II.), goldfarbige, ♂. ♀. t. k.
Cap d. g. Hoffn.

capensis Benth. (= *Buchnera capensis* L. = *Chaeno-
stoma villosum* G. Don, = *Manulea capensis* Thbg.
p. 495, = *M. villosa* P.).

Polycarpaea Lam., Vielsaamler.

aristata Chr. Sm. (= *Illecebrum aristatum* Ait. = *La-
haya aristata* R. et S. = *Mollia aristata* Ait.).

brasiliensis Cambess., brasilianischer, 4. w. Brasilien.

corymbosa Lam. (= *indica* Lam. = *Achyranthes corym-
bosa* L. = *Celosia corymbosa* Roxb. = *Lahaya co-
rymbosa* R. et S.), doldentraubiger, ☉. ♂. w. Ostindien.

depressa DC. (= *Hapalosia Löfflingiae* Wight et Arn.
= *Löfflingia indica* Retz, = *Pharnaceum depressum*
L. = *Polycarpum pusillum* Roxb.), niedergedrückter,
☉. m. f. Ostindien.

gnaphalodes Poir. (= *microphylla* Cav. = *Hagea gna-
phalodes* P. = *Illecebrum gnaphalodes* Schousb. =
Lahaya gnaphalodes Schult. = *Mollia gnaphalodes*
Spgl.), ruhrkrautähnlicher, 4. ♀. k. Nordafrika, Ca-
narische Inseln.

latifolia Poir. (= *Lahaya latifolia* Schult. = *Mollia
latifolia* W.), breitblättriger, ☉. f. Teneriffa.

prostrata Decaisn. (= *Alsine media prostrata* P. = *A.
prostrata* Forsk. = *Arenaria prostrata* Sering. = *Sper-
gula prostrata* Dietr.), gestreckter, 4. k. f. Aegypten.

Polycarpaea

stellata DC. (= *Achyranthes stellata* W. = *Lahaya stellata* Schult. = *Mollia stellata* W.).

Teneriffae Lam. (= *divaricata* Poir. = *Hagea Teneriffae* P. = *Illecebrum divaricatum* Ait. = *Lahaya diffusa* Schult. = *Mollia diffusa* W. Hort. Berol.) ☉.

tenuifolia DC. (= *stellata* DC. var. Spgl. = *Achyranthes tenuifolia* W. = *Lahaya tenuifolia* Schult. = *Mollia tenuifolia* W.), dünnblättriger, ♀. w. Guinea. *alsinefolia* * et *Bivoniana* * v. *Polycarpon alsinefolium* et *peplodes*.

Polycarpon Loeffl., Wirtelkraut.

alsinefolium DC. (= *Hagea alsinefolia* Bivone, = *Holosteum tetraphyllum* Thbg. = ? *Illecebrum alsinefolium* L. = *Lahaya alsinefolia* Schult. = *Mollia alsinefolia* Schult.), mierenblättriges, ☉. f. Südeuropa, Cap d. g. Hoffn., Neuholland.

peplodes DC. (= *Arenaria peplodes* Lapeyr., non L. *Hagea polycarpoides* Bivon. = *Mollia Polycarpon* Spgl.), wasserportulakähnliches, ☉. 4. f. Italien, Frankr.

tetraphyllum L. fil. (= *Alsine Polycarpon* Crantz, = *Mollugo quadrifolia* Mill. = *M. tetraphylla* L.).

β) *diphyllum* Cav., γ) *caspium* C. A. Mey.

Polycenia Choisy, Polycenie, XIV. II., Globulariaceae.

cordata E. Mey. (= *Hebenstreitia cordata* L.), herzförmige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

hebenstreitoides Choisy, (= *Hebenstreitia tenuifolia* plur. auct., non Schrad.), Hebenstreitiaähnliche, ☉. m. f. Südafrika.

Polycephalus suaveolens Forsk., v. *Sphaeranthus indicus*, p. 777.

Polycnemum L., Knorpelkraut.

Heuffelii Lang, Heuffel's, ☉. f. Ungarn.

brachiatum MB., *crassifolium* Pall. (= *alternifolium* Pall. = *oppositifolium* MB.), *glaucum* Pall. etc., v. *Halimocnemis brachiata*, *crassifolia*, *glaucum* etc., p. 282, II.

Polygala T., L., Kreuzblume.

amara L., β) *alpina* Poir., γ) *decipiens* Bess. (= *lithuanica* Gilib.).

amblyptera Rchb. (= *amara* Auct. = *buxifolia* Rchb. = *thuringiaca* Spgl.), thüringische, 4. ♀. f. Mitteldeutschland.

amoena Thbg. (= ? *asbestina* Burch.), liebliche, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

attenuata Nutt. (= *graminifolia* Poir.), verdünnte, 4. f. Carolina, Florida.

bracteolata L. (= *bracteata* Thbg.), β) *pilifera* Hffg.

calcarea Schultz, (= *amblyptera* Schultz, = *vulgaris* ε *buxifolia* Schultz), kalkliebende, 4. ♀. f. Mittel- und Westdeutschland, Lothringen.

comosa Schk., b) fl. *coeruleo*.

cordifolia Thbg. (= *fruticosa* Berg. = *oppositifolia* W.).

Dalmaisiana Hort. belg., Dalmais's, ♀. t. k. ? Hybride.

depressa Wender, (= *badensis* Schimp. = *paludosa* Bönningh. = *serpyllacea* et *serpyllifolia* Weihe).

Eckloniana Lehn., Ecklon's, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.

exilis DC. (= *linearis* Lagasca, = *nova* Boiss. = *parviflora* Loisel.), kleinste, ☉. f. Spanien, Frankreich.

filifolia Mackay, fadenblättrige, ♀. t. k. Cap d. g. H.

Polygala

- ligularis Ker, (= *graminea* Hort. = *Linkiana* Sweet, = *tenuifolia* Lk.).
 microphylla L. (= ? *juniperina* Cav.), kleinblättrige, ♀. k. Portugal.
 mutabilis Dumort., veränderliche, 4. ♀. f. Belgien.
 paucifolia Mühlbg. (= *commutata* Sweet, = *purpurea* Ait., non Nutt. = *Triclisperma grandiflora* Rafin.).
 rosea Dsf. (= *nicacensis* Risso), rosafarbige, 4. ♀. f. b. k. Nordafrika, Italien.
 saxatilis Dsf. (= *rupestris* Pourr.), Gesteins-K., ♀. f. b. k. Frankreich, Spanien, Nordafrika.
 tetragona Burch. (= *attenuata* Nutt. = *oppositifolia* β *major* Lindl.).
 Zeyheri Spgl., Zeyher's, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.
uva ursi Hort., v. *Hallia imbricata*, *villosa* Hort. = ?
 Hinsichtlich der übrigen vergl. *Mundia* et *Muraltia*, p. 533 et p. 422, II.

Polygonastrum Mch., *compressum* Mch., *racemosum* Mch., v. *Ophiopogon japonicus* et *Smilacina racemosa*.

• Polygonatum T., Weifswurz.

- japonicum Morren et Decaisne, (= *Convallaria compressa* Steud. = *C. Polygonatum* Thbg., non L.), japanische, 4. Kn. f. Japan.
 latifolium Dsf. (= *Convallaria latifolia* Jacq.).
 β) *tauricum* H. Vindob.
 macrophyllum Sweet, (= *latifolium* Pursh, non Dsf. = *Convallaria Polygonatum* Mühlbg. = *C. latifolia* Bot. amer. = *C. commutata* Schult.).
 sibiricum Red. (= *Convallaria sibirica* Ker), sibirische, 4. Kn. f. Sibirien.
 Thunbergii Morren et Decais. (= *Convallaria multiflora* Thbg., non L. = *C. Thunbergii* Steud.), Thunberg's, 4. Kn. f. Japan.
 vulgare Dsf. (= *anceps* Mch. = *officinale* All. = *uniflorum* St. Hil. = *Convallaria Polygonatum* L.).
 d) ? *obtusifolium* Weinm.

Polygonum T., Knöterig.

- acidulum W. (= ? *crispum* W. = *divaricatum* β Meisn.).
 acutatum Lehm. (= *cymosum* Trevir., non Dsf.), wenigspitziger, ☉. f. Ostindien.
 alpestre C. A. Mey., Voralpen-K., 4. f. Caucasus, Soongaria.
 β) *rupestre* Karel. et Kiril.
 alpinum All. (= *divaricatum* Vill.), β) *undulatum* Murr. (= *acidum* Pall. = *ciliatum* W. herb.).
 arenarium W. K., β) *giganteum* Fisch.
 argyrocoleon Steud., silberscheidiger, ☉. f. Mosul.
 Bellardi All. (= *centinodium* γ Lam. = *geniculatum* Poir. = *patulum* MB. = *spectabile* Lehm.).
 capitatum D. Don, kopfförmiger, 4. k. Nepal.
 crassifolium Murray, (= *hastatum* Murray, = *rumicifolium* Pall. = *sibiricum* Laxm., non L.), dickblättriger, 4. f. Sibirien.
 cymosum Dsf. (non Trevir.), afterdoldiger, 4. f. ?
 decipiens RBr., täuschender, 4. k. Neuholland.
 dubium A. Braun, (= *Braunii* Bluff et Fingerh. = ? *Hydropiper* L. var.), zweifelhafter, ☉. f. Deutschland, Belgien.

Polygonum

dumetorum L. (= *Bilderdyckia dumetora* Dumort. = *Fagopyrum dumetorum* Schreb. = *F. membranaceum* Mch.), Hecken-K., ☉. Sch. 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) scandens L.

Hamiltonii Spgl. (= *Donii* Meisn., non Spgl. = *hispidum* Don, Hamilt.), Hamilton's, ☉. f. Nepal.

Hydropiper L. (= *acre* Lam. = *glandulosum* Poir. = *hydropiperoides* Pursh, = *punctatum* Ell.). Europa, Asien, Nordamerika.

interruptum Bunge, unterbrochener, ☉. f. Nordchina.

jucundum Meisn., lieblicher, ☉. f. China.

Kitaibelianum Sadler, Kitaibel's, ☉. f. Ungarn.

lapathifolium L. (= *pallens* P. = *pallidum* Wither. = *pensylvanicum* Curt. = *Persicaria* L. γ Meisn. = *scabrum* Mch. = *vernum* Rafin.).

Laxmanni Lepech. (= *davuricum* W. = *ramosum* Fisch., Hornem.).

maritimum L. (= *glaucum* Nutt.), β) flagellare Bertol. (= *litorale* Lk. = *romanum* Jacq., Guss.).

Meyeri Steud. (= *P. Paronychia* C.A. Mey., non Cham., Schltld.), Meyer's, 4. f. Caucasus.

mexicanum Schltld., mexicanischer, ☉. f. Mexico.

muricatum Meisn., weichstacheliger, ☉. f. Nepal.

nepalense Meisn., nepalscher, ☉. f. Nepal, Abyssinien.

nodosum P. (= *turgidum* Thuill.), b) lapathifolio-nodosum Rchb.

ochreatum L. (= *divaricatum* γ Meisn.).

oxyspermum Meyer et Bunge, spitzsaamiger, ☉. f. Sibirien.

Paronychia Cham., Schltld., nagelkrautähnlicher, 4. ♀. f. Neucalifornien.

pulchrum Blume, schöner, ☉. m. f. Java.

Robertii Req. Loisel., Robert's, ?☉. 4. f. Frankreich.

strictum Ledeb. (non All.), steifer, ☉. f. Alt. Sibirien.

tenue Mch. (= *filiforme* Barton, = *linifolium* Mühlbg.), dünner, ☉. f. Nordamerika.

adpressum LaBill., *complexum* A. Cunningh., Endl., v. *Sarcogonum adpressum et complexum*.

Polymnia L., Polymnie.

aspera Mart. (= *scabra* Zuccar.).

glabrata DC., kahle, 4. k. Chili.

maculata Cav. (= *Uvedalia* Hort. Par., non L.).

Uvedalia L. (= *Wedelia* Mill., non L.).

Unbestimmtere: *dentata* Mch., *variabilis* Poir. (= ?*Polymniastrum urticaefolium* Cass.).

carnosa L. fil., *spinosa* L. fil., v. *Didelta carnosum* et *spinosa*, *calendulacea* Poir. (= *benghalensis* Poir.), v. *Wedelia calendulacea*, *perfoliata* Poir. (= *revoluta* Auct.), v. *Melampodium perfoliatum*, p. 505, *Tetragonotheca* P., v. *Tetragonotheca helianthoides*, p. 802.

Polyotus longifolius G. Don, v. *Gomphocarpus longifolius*.

Polypappus Less., Vielsfederchen, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

parviflorus DC., kleinblumiges, ☉. ♀. k. Mexico.

triplinervis Less. (= *Ascaricida triplinervis* G. Don, = *Vernonia triplinervia* Spgl., p. 841).

Polypara cochinchinensis Lour., v. *Houttynia cordata*.

Polypodium T., L., Tüpfelfarn (Engelsüfs).

I. Anaxeton Schott.

crassifolium L. (Schott), (= *Phymatodes crassifolia* Presl).

II. Campyloneuron Presl, Lk.

brevifolium Lk., kurzblättriger, 4. w. ?

caespitosum Lk., rasenartiger, 4. w. ?

decurrens Raddi, (Presl, Lk.), herablaufender, 4. w. Brasilien.

nitidum Kaulf. (= *Phyllitidis* H. Berol.).

Phyllitidis L. (Presl).

III. Chrysopteris Lk. (= *Phlebodium* RBr.).

aureum L. (Lk.), (= *Pleopeltis aurea* Presl).

Billardieri RBr. (Lk.).

longipes Lk. (= *alternifolium* Lk. Hort. (non W.) = *grossum* Langsd. et Fisch.), langstieliger, 4. w. Ostindien.

peltideum Lk., scheibenförmiger, 4. w. ?

Phymatodes L. (Lk.), (= *pleopeltifolium* Hort. Angl.).

pulvinatum Lk. (= *decumanum* H. Berol.), bestaubter, 4. w. Brasilien.

pustulatum Forst.

scandens Forst. (= *lepidopodium* Lk.), klimmender, 4. w. Südseeinseln.

sporodocarpum W. (Lk.), (= *areolatum* W.), gehäufelter, 4. w. Mexico.

terminale Lk., entständiger, 4. w. ?

IV. Craspedaria Lk., Kunze.

Sect. a. Craspedaria Lk.

ciliatum W. (Lk.), (= *cajenense* Desv.), gewimperter, 4. w. Brasilien, Guiana.

squamulosum Kaulf. (= *myrtillifolium* H. Angl.), feinschuppiger, 4. w. Südamerika.

vaccinifolium Langsd. et Fisch. (Lk.).

Sect. b. *Niphobolus* Auct. v. p. 548 et p. 437, II.

V. Drynaria Presl.

quercifolium L.

VI. Dictyopteris Kunze.

attenuatum W.

VII. Goniopteris Presl, Lk.

asplenioides Sw. (Presl), (= *compositum* Lk. Hort.), strichfarnähnlicher, 4. w. Jamaica, Brasilien.

crenatum Sw. (Presl).

fraxinifolium Jacq. (Presl), (= *proliferum* H. Berol.).

β) *polystichum* Lk.

proliferum Kaulf. (= *diversifolium* Sw., non RBr. = *viviparum* Raddi).

VIII. Marginaria Lk.

dimorphum Lk., veränderlicher, 4. w. Mexico, ? Brasil.

β) *angustifolium* Lk. (= *ensifolium* ? W., Presl).

IX. Microsorium Lk.

irioides Lam., Poir. (= *M. irregulare* Lk.).

X. Pleopeltis Presl.

Brownianum Spgl. (= *attenuatum* RBr.).

lycopodioides L. (Presl).

iteophyllum Lk., weidenblättriger, 4. w. ?

macrocarpum Bory, (Kaulf., Lodd.), großfrüchtiger, 4. w. Mascarenas.

percussum Cav. (Hook. et Grev.), langspitziger, 4. w. Brasilien, Surinam.

Polypodium

XI. Eupolypodium Endl. et Goniophlebium Presl et Phegopteris Presl etc.

cambricum Desv., cambrischer, 4. f. k. England.
var. b. crispum, s. inciso-pinnatifidum (= *cambricum* L.).

concinnum W., netter, 4. w. Caracas, Chili.

decursive-pinnatum v. Hall, herablaufend-gefiederter, 4. w. t. China.

divergens W. (= *multifidum* Jacq.), divergirender, 4. w. Caracas.

grandidens Kunze, (= *attenuatum* Hort. Bonn., non Br.), großzähliger, 4. w. ? Ostindien.

harpeodes Lk. (= *Marginaria harpeodes* Presl), sichel-förmiger, 4. w. Brasilien.

inaequale Lk., ungleicher, 4. w. Brasilien.

laetum Raddi, freudiggrüner, 4. w. Brasilien.

loricatum L. (= *loriceum* Hort.), riemenförmiger, 4. w. Westindien.

maenurum Lk., geschweiffter, 4. w. Brasilien.

meniscifolium Langsd. et Fisch. (non Lk.), (= *affine* Hort. Angl. = *albopunctatum* Raddi), mondfarnblät-teriger, 4. w. Brasilien.

molliculum Kunze, weicher, 4. w. ?

Moritzianum Lk., Moritz's, 4. w. Caracas.

Otites L. (= *pectinatum* H. Anglor.).

Preslianum Sphl. (= *meniscifolium* Lk., non Lgsdf. et Fisch. = *longifolium* Presl, = *Marginaria meniscifolia* Presl), Presl's, 4. w. Brasilien (Insel St. Catharina).

pycnosorum Lk. (= *attenuatum* W. excl. Syn. = *juglandifolium* Auct.), ballfrüchtiger, 4. w. Südamerika.

ramosum Hort. Angl., ästiger, 4. w. ?

subtetragonum Lk. (= *tetragonum* Schk.), wenigvier-seitiger, 4. w. Brasilien.

tetragonum Sw. (= *Aspidium cicutarium* H. Angl.).

uliginosum Kunze, (= *paludosum* H. Bonn.), Sumpfliebender, 4. w. ?

vacillans Lk. (= *repandulum* Kaulf.), schwankender, 4. w. Brasilien.

Zu dieser Abtheilung gehören unter andern: P. alpestre Hoppe, calcareum Sm., Catharinae Langsd. et Fisch., Dryopteris L., effusum Sw., hexagonopterum Mchx., Sw., juglandifolium Humb., latipes Langsd. et Fisch., Paradiseae Langsd. et Fisch., pectinatum L., Phegopteris L., virginianum L., vulgare L., welche pag. 614—616 verzeichnet sind. Die übrigen daselbst aufgeführten Arten sind größtentheils hier unter die Sectionen, wohin sie gehören, gestellt und die neuen beigefügt worden, mit Ausnahme einiger, deren genauere systematische Vertheilung unter die Sectionen dem Verfasser unbekannt war; so auch z. B. von P. affine Forst., glaucum H. Angl., grandifolium Hort., LaBillardieri, pennigerum etc., welche ebenfalls in den Verzeichnissen der Handelsgärten vorkommen.

alsophilum Hort. Berol., v. *Alsophila paleolata*, p. 27, II., *Baranetz* Auct. et Hort. Angl., v. *Cibotium glaucescens*, p. 143, II., *falcatum* Thbg. (= *japonicum* Houtt.), v. *Cyrtomium falcatum*, *Aspidium* Sect. VI. p. 50, II.

Polypogon Dsf., Vielborstengras.

interruptus H. B. K., unterbrochenes, ©. f. Südamerika.
litoralis Sm. (= *elongatus* Lagasca, = *Lagascæ* R.
 et S. = *Agrostis litoralis* Wither. = *A. lutosæ* Poir.
 = *Vilfa lutosæ* P. B.).

maritimus W. (= *pumilus* Clarke, = *spathaceus* Req.
 = *tataricus* Fisch. = *Alopecurus paniceus* L. =
A. maritimus Poir. = *Phleum crinitum* Roxb.).

mexicanus Lk., mexicanisches, ©. f. Mexico.

monspeliensis L. (= *crinitus* Nutt. = *paniceus* La-
 gasca, = *Agrostis alopecuroides* Lam. = *A. crinita*
 Auct. = *A. panicea* Ait. = *A. triaristata* Knapp,
 = *Alopecurus aristatus* Huds. = *A. monspeliensis*
 L. = *A. paludosus* Crtz. = *Cynosurus paniceus* L.
 = *Panicum vagum* Scop. = *Phalaris aristata* Gouan,
 = *Ph. aristata* Forsk. = *Phleum crinitum* Schreb.
 = *Phl. monspeliense* Koel. = *Santia plumosa* Savi,
 = *Vilfa alopecuroides* P. B.).

glomeratus W. (= *setosus* Speg.), *sericeus* Speg.,
 v. *Mühlenbergia glomerata et capillaris*, p. 533,
vaginatus W., v. *Alopecurus angustifolius*, p. 37.

Polypteris integrifolia Nutt., v. *Palafoxia fastigiata*,
 p. 472, II.

Polyspora axillaris Sweet, *nepalensis* Hort., v. *Gor-
 donia axillaris et nepalensis*, p. 272, II.

Polystachya Hook., Vielährenstendel.

affinis Lindl, ähnelnder, 4. w. Sierra Leone.

bracteosa Lindl., deckblättriger, 4. w. Sierra Leone.

fusiformis Lindl. (= *Dendrobium fusiforme* Pet. Th.),
 spindelförmiger, 4. w. Mascarenas.

luteola Hook. (= *mauritianæ* Speg. = *Cranichis lu-
 teola* Sw. = *Dendrobium polystachyum* Sw. = *Epi-
 dendrum minutum* Aubl.), β) *zeylanica* Lindl. (= *Dendrobium polystachyum* Pet. Th.).

In van Houttes Etablissement horticole wird noch eine
P. cerea aufgeführt, vielleicht auch in Sierra Leone
 heimisch.

Polystichum Lk., Schott, *acrostichoides* Lk., *aculea-
 tum* Schott, *angulare* Presl, *lobatum* Presl, *Lonchi-
 tes* Schott, *pungens* Presl etc., v. *Aspidium* Sect. V.
 p. 49, *gymnogrammoides* Gaudich., v. *Gymnogramme*
polypodioides, p. 278, II.

Polytaxis Bunge, *Polytaxis*, XIX. III., *Compositae-
 Cynarocephalæ*.

Lehmanni Bunge, Lehmann's, ©. f. Asiatisch. Rußland
 (Kisilkum).

Polyxena Kunth, (Tochter der Hecuba), VI. I, *Coro-
 nariæ-Asphodeleæ*.

pygmaea Kunth, (= *Mauhlia ensifolia* Thbg. = *Ag-
 panthus ensifolius* W. spec. = *Massonia violacea*
 Andr. = *M. ensifolia* Ker, p. 498, = *M. ovalis*
 Drege, = *Hyacinthus bifolius* Boutelow), zwergige,
 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

Pomaderris LaBill. (= *Pomatoderris* Hffing.), Wer-
 senstrauch, V. I., *Rhamneæ*.

apetala LaBill., β) *aspera* Sieber, (= *scabra* Hort.).

discolor Vent. (= *acuminata* Lk. = *andromedaefolia*
 Cunningh.).

elliptica LaBill. (= *Kumeraho* Cunningh.).

β) *phillyraeoides* Sieber, γ) *intermedia* Sieber.

Pomaderris

ericifolia Hook., heideblättriger, ꝛ. t. k. Neuholland.
ferruginea Sieber, (= *lanigera* β DC. = *viridirufa* Sieb.), rostfarbiger, ꝛ. t. k. Neuholland.

Hügelii Hort. Vindob. ? Fenzl, Hügel's, ꝛ. t. k. Neuholl.

lanigera Auct. (non Sims), (= *obscura* Sieber, = *Ceanothus laniger* Andr.).

ligustrina Sieber, ligusterähnlicher, ꝛ. t. k. Neuholland.

malifolia Sieber, (= *discolor* Sieber, = *elliptica* Sims, = *multiflora* Fenzl), apfelblättriger, ꝛ. t. k. Neuh.

myrtilloides Fenzl, heidelbeerähnlicher, ꝛ. t. k. Neuholl.

obcordata Fenzl, verkehrtherzförmiger, ꝛ. t. k. Neuholl.

obovata Hook., verkehrteiförmiger, ꝛ. t. k. Neuholland.

parvifolia Hook., kleinblättriger, ꝛ. t. k. Neuholland.

phillyraefolia Fenzl, steinlindenblättriger, ꝛ. t. k. Neuh.

prunifolia Cunn., pflaumenblättriger, ꝛ. t. k. Neuholl.

racemosa Hook., traubiger, ꝛ. t. k. Neuholland.

Simsii Sweet, (= *lanigera* Sims), Sims's, ꝛ. t. k. Neuh.

villosa Hort. belg., zottiger, ꝛ. t. Neuholland.

Wendlandiana Sweet, (= *Ceanothus microphyllus* Wendl. = *C. Wendlandianus* R. et S. = *Trymalium Wendlandianum* G. Don).

capsularis G. Don, v. *Colubrina asiatica*, *globulosa* Brogn., Don, *spathulata* G. Don, v. *Trymalium globulosum* et *Billardieri*.

Pomax Soland., Pomax, IV. 1., Rubiaceae.

umbellata Soland. (= *hirta* DC. = *Opercularia Banksiana* Schult. = *O. umbellata* G., p. 562), doldige, ꝛ. k. t. Neuholland.

Pometia pinnata Forst., *ternata* Forst., v. *Schmiedelia pinnata* et S. Cobbe.

Pongamia Lam., Vent., Pongamie.

chinensis DC. (= *Robinia mitis* Lour.), chinesische, ꝛ. w. China.

rosea Gralh, rosafarbige, ꝛ. w. Ostindien.

triphylla Wight, (= *Galedupa uliginosa* Roxb. = *Dalbergia heterophylla* W.), dreiblättrige, ꝛ. w. Ostindien.
uliginosa DC. (= *religiosa* Wight).

Pontania Lemaire, (Jerome Pontanus, lebte im 15ten Jahrhundert u. war Lehrer König Alphons von Neapel, hat ein latein. Gedicht über die Pflanzen verfasst), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

Celsiana Lemaire, (= *Brachysema platypterum* Hort. anglor. et belg.), Cels's, ꝛ. Sch. t. Neuholland.

Pontederia L., Pontederie.

paradoxa Mart., wunderbare, 4. w. Brasilien.

rotundifolia L., rundblättrige, 4. w. Surinam.

azurea Sw., *crassipes* Mart. (= *azurea* Hook.), v. *Eichhornia azurea* et *speciosa*, p. 217, II., *dilatata* Buchan., *hastata* L., *vaginalis* Burm., v. *Monochoria dilatata*, *hastataefolia* et *vaginalis*, p. 415, II.

Populago Scop., *palustris* Mch., v. *Caltha palustris*.

Populus T., Pappel.

alba L., β) *major* Mill. (= *anglica* Hort.), γ) *nivea* Lodd.

angulata Ait., c) *Boothii* Hort. (= ? *Medusae* Booth).

australis Tenore, (= ? *tremula major* Duham.), südliche, ꝛ. f. Süditalien.

benzoifera Tausch, (= *gracca* W., non Ait. = ? *tremuloides* Mchx. = ? *villosa* Lang), benzointragende, ꝛ. fr. ?

β) *pendula* Hort. (= *sibirica* Hort.).

Populus

- dilatata Ait., β) *pannonica* Jacq. fl.
diversifolia Schrenk, verschiedenblättrige, \mathfrak{h} . f. Asiatisches Rußland.
euphratica Decaisne, euphratische, \mathfrak{h} . f. Syrien.
graeca Ait. (= *atheniensis* Hort.).
laurifolia Ledeb. (= *balsamifera* Pall.), lorbeerblättrige, \mathfrak{h} . f. Altaisches Sibirien.
longifolia Fisch. (= *salicifolia* Hort. = *viminalis* Lodd. = *balsamifera* var. Auct.), langblättrige, \mathfrak{h} . f. ?
lobata Fisch., gelappte, \mathfrak{h} . f. ?
monilifera Ait. (= *acledesca* Lindl. = *canadensis* Burghard, = *carolinensis* Mch. = *glandulosa* Mch. = *marylandica* Bosc, = *virginiana* Dsf.).
nigra L., d) *serotina* Endl.
pseudo-balsamifera Fischer, unächte Balsam-P., \mathfrak{h} . f. ?
rubra Poir. (= *dilatata* Ait. var.?), rothe, \mathfrak{h} . f. Südeuropa.
suaveolens Fisch. (= *balsamifera* Pall. pro parte, = *balsamifera intermedia et suaveolens* Laud.), gutriechende, \mathfrak{h} . f. Oestl. transbaical. Sibirien.
tristis Fisch. (= *candicans* Hort.), traurige, \mathfrak{h} . f. Sitcha.
viminea Dsf. (= *canadensis* Fouger.), ruthenförmige, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

Porana Burm., Porana ¹⁾.

- paniculata* Roxb. (= *tomentosa* Leschen. = *Dinetus paniculatus* Sweet), rispige, \mathfrak{h} . Sch. w. Ostindien.
racemosa Roxb. (= *cordifolia* Ledeb. = *dichotoma* Hamilt. = *Dinetus racemosus* Sweet), traubige, \odot . Sch. w. f. Ostindien, Nepal.
volubilis Burm., p. 648.

Porcellites apargioides Less., *cretensis* Cass., *maculata* Cass., v. *Achyrophorus apargioides*, *oxydontus et maculatus*, p. 7, II. *P. radicata* Cass., v. *Hypochaeris radicata*, p. 411.

Porophyllum Vaill., Porenblatt.

- coloratum* DC. (= *Kleinia colorata* H. B. K. = *K. ruderalis* Jacq. var. Sogl.), farbiges, \odot . f. Mexico.
decumbens DC. (= *Kleinia linearis* Dsf. Hort. Par. = *K. suffruticosa* Lodd., non W.), niederliegendes, 4. \mathfrak{h} . k. Mexico.
ellipticum Cass. (= *Cacalia Porophyllum* L. = *Kleinia Porophyllum* W.), elliptisches, \odot . m. f. Peru, Brasilien.
linifolium DC. (= *suffruticosum* Cass. = *Cacalia Linaria* β *pumila* Poir. = *C. linifolia* L. = *Kleinia suffruticosa* W.), gleichbreitblättriges, \mathfrak{h} . t. Süd-am.
ruderales Cass. (= *Cacalia ruderalis* Sw. = *Kleinia ruderalis* Jacq.), schuttliebendes, \odot . m. f. Westindien.
tagetoides DC. (= *Kleinia ruderalis* Jacq. var. Sogl. = *K. tagetoides* H. B. K.), sammetblumenähnliches, \odot . f. Mexico.
viridiflorum DC. (= *Kleinia viridiflora* H. B. K.), grünblumiges, \mathfrak{h} . k. Mexico.

Porphyra dichotoma Lour., v. *Callicarpa purpurea*, p. 147.

1) Da *Dinetus* Sweet von *Porana* Burm. nicht verschieden ist, so wurden die zu letzterer Gattung gehörigen früher davon getrennten Arten hier noch einmal aufgenommen.

Porrum Mill., *amethystinum* Tausch, *Ampeloprasum* Mill., *arenarium* Rchb., *ascalonicum* Rchb., *comune* Rchb. (= *sativum* Mill.), *crinitum* Rchb., *descendens* Rchb., *oleraceum* Mch., *Ophioscorodon* Rchb., *paniculatum* Mch., *rotundum* Rchb., *Scorodoprasum* Rchb., *sphaerocephalum* Rchb., *strictum* Rchb., v. *Allium amethystinum*, *Ampeloprasum*, *arenarium*, *ascalonicum*, *Porrum* etc., p. 29 etc. et p. 19 II. *Portlandia grandiflora* H. Batav. (non L.), v. *Solandra nitida*, p. 765.

Portula diffusa Mch., v. *Peplis Portula*.

Portulaca T., Portulak.

grandiflora Hook. (non Cambess.), (= *megalantha* Steud.).

marginata H. B. K., *berandeter*, ☉. m. f. Caracas.

oleracea L., β) *sativa* Haw. (= *latifolia* Hornem.).

pilosa L., β) *setacea* Haw.

pilosissima Hook., *behaartester*, ☉. m. f. Lima.

quadrifida L. (= *linifolia* Forsk. = *repens* Roxb. = *Illecebrum verticillatum* Burm. = *Meridiana quadrifida* Poir.).

rostellata Brignol., *geschnäbelter*, ☉. m. f. Brasilien.

Thellussonii Lindl. (= *grandiflora* Hook. var. *rutila* Lindl.), *Thellusson's*, ☉. 4. f. w. (Hybride von *P. Gilliesii* Hook. u. *grandiflora* Hook.).

b) *splendens* Lindl.

Unbestimmt: *carminea* Hortul.

Anacampteros L., *arachnoides* Haw., *filamentosa* Haw., *lanceolata* Haw., *rubens* Haw., v. *Anacampteros rotundifolia*, *arachnoides*, *filamentosa* etc., p. 51 et p. 34, II., *fruticosa* Thbg., v. *Portularia afra*, p. 649.

Posoqueria Aubl., Posoquerie.

revoluta N. E. (= *insignis* N. E. = *Solena revoluta* Dietr.), *zurückgerollte*, †. w. Brasilien.

fragrans Roxb., v. *Griffithia fragrans*, p. 275, II., *longispina* Roxb., *nutans* Roxb., v. *Randia longispina et nutans*.

Possira arborescens Aubl. (= *triphylla* Gmel.), *grandiflora* Poir., *pinnata* Poir., v. *Schwartzia triphylla*, *grandiflora et pinnata*, p. 794.

Potentilla L., Fingerkraut.

adpressa H. B. K., *angedrücktes*, 4. k. Südamerika.

agrimonoides MB. (= *Biebersteiniana* Tratt.).

altaica Bunge, *altaisches*, 4. f. Altai.

apennina Tenore, (= *Bocconi* Nestl.).

approximata Bunge, *Ledeb.*, *genähertes*, 4. f. Altai-sches Sibirien.

arguta Pursh, (= *confertiflora* Torrey, = *Geum agrimonoides* Pursh, = *Bootia sylvestris* Bigelow.).

astracantha Jacq. (= *alterniflora* Mchx. = *corymbosa* Mch. = *divaricata* DC. = *taurica* Auct.).

astragalifolia Bunge, *Ledeb.*, *tragantblättriges*, 4. f. Altai-sches Sibirien.

bifurca L. (= *bifida* Pall. = *bifurcata* Poir.).

Bigelowiana Wender. (= *confertiflora* Torrey var. ? = *Bootia Bigelowii* Hort.), *Bigelow's*, 4. f. Nordamer.

bithynica Hornem. (= *obscura* W. var. Rchb. = *viminea* Rchb.).

chinensis Sering., *chinesisches*, 4. f. b. China.

concinna Richards., *nettes*, 4. f. Nördlichst. Amerika.

Potentilla

- dealbata Bunge, weifsblätteres, 4. f. Altaisch. Sibirien.
 desertorum Bunge, Wüsten-F., 4. f. Sibirien.
 diversifolia Lehm. (= *glaucophylla* Lehm. = *campestris* Nutt. = *dissecta* Nutt.), verschiedenblätteres, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).
 Drummondii Lehm., Drummond's, 4. f. Nordamerika (Rocky mountains).
 Ehrenbergiana Schldl. Ehrenberg's, 4. k. Mexico.
 exaltata Bunge, hohes, 4. f. Nordchina.
 formosa D. Don, (= *nepalensis* Hook. = *colorata* Lehm.),
 b) Gardneriana Hort., c) Mayana Hort. (= *nemoraliformosa* Loud. = *tormentillo-formosa* Tongue),
 d) Tonguei Hort., e) Russeliana Hort. anglor.
 fusca Schldl., braunes, 4. k. Mexico.
 gariensis Eckl., garepinisches, 4. k. Cap d. g. Hffn.
 gelida C. A. Mey., eisiges, 4. f. Caucasus.
 glabra Lodd. (= *fruticosa alba* Burch.), glattes, 5. f. Dahurien.
 glauca Moris, blaugrünes, 4. f. Sardinien.
 gracilis Dougl., β) flabelliformis Lehm.
 Güntheri Pohl, (= *argentea* L. var. Auct. = *canescens* Hartm. = *intermedia* L. sec. K. = *Lindackeri* Tausch, = *sordida* Fr. = *subargentea* Krock. = *Wiemanni* Bot. Cabin. = *Wiemanniana* Günth. et Schum.).
 hirta L. (= *pilosa* Vill.), β) rubens All. (= *pedata* W. Enum.), γ) angustifolia DC.
 hybrida Wallr. (= *Fragariaastro-alba* Schiede).
 inamoena Fisch. et Mey., unliebliches, 4. f. Asiat. Rufsländ.
 inclinata Vill. (= *adscendens* W. K. = *intermedia* Schult., Whlbg. = *recta* Jacq.), β) canescens Bess. (= *assurgens* Vill. = *hirta* Hänke, = *hungarica* W. herb. = *ornithopoda* Tausch, = ? *parviflora* Gaud.).
 insignis Royle, Lindl., ausgezeichnetes, 4. f. Himalaja, chinesische Tatarei.
 intermedia L. (= *Bauhini* Hort. = *geranioides* Schlchr. = *heptaphylla* Mill. = *Nestleriana* Tratt. = *varians* Mch. = *villosa* Hall. fil.).
 laciniosa W. K. (= *cardiopetala* Bess. = *hirta* L. η *laciniosa* Nestl. = *recta* γ *laciniosa* K.).
 laeta Rchb. (= *hirta* Visian.), freudiges, 4. f. Dalmatien.
 Lagascana Sering. (= *incisa* Lagasca), Lagasca's, 4. f. ?
 lanuginosa Fisch., wolliges, 4. f. Caucasus.
 leptopetala Lehm. (= *frigida* Schiede et Deppe, = *hyemalis* Cham., Schldl.), schlankkroniges, 4. k. Mexico.
 leucophylla Pall. (= *angustifolia* W. herb., Lehm. = *betonicaefolia* Poir. = *nivea macrophylla* Sering. = *nivea pallidior* Sw. = *nivea prostrata* Retz).
 megalontodon Lehm. (= *collina* Hort.), dickzähniges, 4. f. ?
 minima Hall. fil. (= *Brauneana* Hoppe, = *frigida* β P. = *verna* γ DC.).
 Millegrana Dougl., tausendkörniges, 4. f. Nordamerika.
 mixta Nolte, gemischtes, 4. f. Nord- u. Mitteldeutschland.
 nemoralis Nestl. (= *procumbens* Sibth. = *sylvestris* Renault, = *Tormentilla reptans* L., p. 813), Hain-F., 4. f. Europa.
 β) Neumayeriana Tratt., γ) ? tormentilloides Mayer, (= *galiciana* Schult.).

Potentilla

- Neumanniana Rchb. (= *Neumanni* Opitz), Neumann's, 4. f. Mitteleuropa.
- nivalis Torr., schneeliebendes, 4. f. Nordamerika.
- norwegica L., β) monspeliensis L. (= *hirsuta* Mchx. = *Morisoni* DC.), γ) ruthenica W. (= *diffusa* W. E. = *visurgina* Weihe).
- obscura W. (= *crassa* Tausch etc.).
- peduncularis Don, langstieliges, 4. f. Nepal.
- pennsylvanica L., α) communis Torr. et Gr. (= *missourica* Hornem., Schrad.), β) strigosa Pursh, (= *pectinata* Fisch. = *absynthifolia* Dougl.), γ) arguta Lehm. (non Pursh), δ) pulcherrima Lehm. (= *bipinnatifida* Dougl.), ϵ) Hippiana Lehm. (= *dealbata* Dougl. = *leucophylla* Torr.).
- petiolulata Gaud. (= *caulescens* β Sering.).
- rubricaulis Lehm., rothstengeliges, 4. f. Nordw. Amerika.
- Sadleri Rchb., Sadler's, 4. f. Ungarn.
- sibirica Patrin, sibirisches, 4. f. Sibirien.
- soongarica Bunge, soongarisches, 4. f. Soongaria.
- splendens Ram. (= *alba* β var. Ser. = *emarginata* Dsf. = *semidentata* Juss.).
- strigosa Pall., Ledeb. (= *conferta* Bunge), striegliches, 4. f. Sibirien.
- subpedata C. Koch, wenigfußförmiges, 4. f. Mingrelien.
- supina L. (= *prostrata* Hook.).
- tanacetifolia W., Schltdl., rainfarnblättriges, 4. f. Sibirien.
- Tormentilla Schrk. (= *sylvestris* Neck. = *tetrapetala* Hall. fil. = *Tormentilla erecta* L., p. 813, = *T. officinalis* Crantz, = *T. tuberosa* Renault).
- b) fl. pleno, β) T. alpina Vill.
- ucranica Lodd., ukrainisches, 4. f. Ukraine.
- Vahliaana Lehm. (= *hirsuta* Vahl), Vahl's, 4. f. Grönland.
- viscosa Donn, (= *dentata* Forsk. = *hispida* Nestl. = *longifolia* et *nudicaulis* W. herb. = *pennsylvanica* Hornem. = *pubescens* Mch.).
- Wrangeliana Fisch. et Lallemand., Wrangel's, 4. f. Neu-californien.
- Hybriden und Varietäten:
- atrebatensis, atrosanguinea Cravenii, atros. lutea, atros. marginata, atros. Oliveriana, atros. pedata Maund., audomarensis, aurantiaca, bicolor, Brisnii, Demayana, ferruginea Paxt., Fintelmanni, heptaphylla, Hoodii, Hopwoodiana, hybrida formosa, iberica, leucochroa, Mackayana Sweet, MacNabiana H. angl., nigra, ornithopodioides Sweet, Oswaldiana, picta, quinquevulnera, Russeliana Sweet, sulphurea, Tormentillo-formosa Tong. (= *Tonguei* Hort. = *nemoralis-formosa* Hort.), Traveni, trifurcata Hffg. etc.
- Poterium L., Becherblume.
- hybridum L. (= *agrimonifolium* β DC. = *agrimonoides* L. Hort. Upsal. = *Pimpinella agrimonoides* G.).
- mauritanicum Boiss., mauritanische, 4. f. Nordafrika, Südspanien.
- Sanguisorba L. (= *Sanguisorba minor* Scopol), β) glaucescens Rchb. (= *guestphalicum* Bönningh. = *polygamum* Lejeun., non W. K.).
- verrucosum Lk., Ehrbg. (= *polygamum* Hort. Par., non W. K.), warzige, 4. f. b. Steiniges Arabien.

Poterium

villosum Sibth., Sm. (= ?*spinosum* L. var. DC.), zottige, ♀. k. Byzanz.

Pothos L. ex parte, Kunth, Kraftstaude.

scandens L. (= *Tapenawa Rhedii* Hassk.), p. 654.

Nur zweifelhaft, (hierher gehörige) Arten nach Kunth:

Cuscuaria Gmel. (= *Cuscuaria latifolia* Rumpf.), Cuscuaria-K., 4. w. Amboina, ?Guinea.

gracilis Roxb. (non Rudge), (= *tenera* Wall.), schlanke. 4. w. Amboina.

remotiflorus Hook., entferntblumige, 4. ♀. Sch. w. Ceylon.

Rumphii Schott, Rumph's, 4. ♀. w. Molucken.

Wahrscheinlich werden außer *P. scandens* noch *P. gracilis* und *remotiflorus* kultivirt.

acaulis Jacq. (= *Scolopendrium* Spgl. = *longifolius* H. Berol.), *cartilagineus* Dsf., *caudatas* Hort., *cordatus* W., *coriaceus* Grah., *crassinervius* Jacq., *digitatus* Jacq., *glaucus* Schott, (= *reflexus* Hffg.) etc., v. *Anthurium acaule*, *cartilagineum*, *caudatum*, *cordifolium*, *coriaceum*, *crassinervium*, *digitatum*, *glaucescens* etc., p. 39, II., *cannaefolia* Sims, (= *cannaeformis* H. B. K. = *odorata* Andr.), v. *Monstera cannaefolia*, p. 417, II., *caudatus* Roxb., *decursivus* Roxb., *giganteus* Roxb., *glaucus* Wall., *officinalis* Roxb., *pertusus* Roxb., *pinnatus* Roxb., *pinnatifidus* Roxb., v. *Scindapsus caudatus*, *decursivus*, *giganteus*, *glaucus*, *officinalis*, *pertusus*, *pinnatus*, *pinnatifidus*, *camtschaticus* Spgl., *foetidus* Sims, v. *Symplocarpus camtschaticus* et *foetidus*, *heterophyllus* Roxb., *Lasia* Roxb., v. *Lasia heterophylla* et *Loureirii*, p. 343, II., *platyneuron* Dsf., v. *Philodendron crassinervium*, p. 512, II., *sagittifolius* Rudge, v. *Spatiphyllum sagittaefolium*.

Pourretia W., Pourretie.

arborea W. (= *Cavanillesia cordata* Spgl. = *umbellata* R. et P.), baumartige, ♀. w. Peru.

paraguianensis H. Cels, paraguaische, 4. ♀. w. Paraguay.

aeranthos Loisel., v. *Tillandsia dianthoides*, *coarctata*

R. et P., *coerulea* Miers, *lanata* H. B. K., *lanuginosa*

R. et P., *pyramidata* H. B. K., *pyramidata*

R. et P., *rubricaulis* Miers, v. *Puya chilensis*, *coerulea*,

lanata, *lanuginosa*, *Bonplandiana*, *pyramidata*,

rubricaulis, *magnispatha* Colla, v. *Billbergia amoena*,

p. 123, *sympaganthera* R. et P., v. *Guzmania*

tricolor.

Prangos Lindl., Flügeldolde, V. II., Umbelliferae.

ferulacea Lindl. (= *alata* H. Petropol. = *Cachrys*

alata Hoffm., MB. = *C. Libanotis* Guss. = *Laserpitium*

ferulaceum L. = *Thapsia Laserpitii* Spgl.),

steckenkrautähnliche, 4. f. Persien, Caucasus, Italien.

foeniculacea C. A. Mey., fenchelähnliche, 4. Caucasus.

thapsioides DC. (= *Laserpitium atlanticum* Poir. =

L. thapsioides Dsf.), thapsienähnliche, 4. k. f. b.

Nordafrika.

Prasium coccineum Walt., *purpureum* Walt., v. *Phy-*

sostegia virginiana var., p. 621 et p. 621, II.

Pratia Gaudich., serpyllacea Presl, (= *hederacea* Cham.),

v. *Lobelia* Sect. X. p. 473.

Premna L. Stammeiserich.

integrifolia L. (= *corymbosa* Rottl. = *Cornutia corymbosa* Burm.).

tomentosa W. (= *Callicarpa lanata* Lam. = *Cornutia corymbosa* Lam.), filziger, 5. w. Ostindien.

Prenanthes Vaill., Hasenlattich.

juncea Pursh, (= *Lygodesmia juncea* Don), simsenförmiger, 4. f. Louisiana.

alba L., *altissima* L. (= *parviflora* Riddel), *cordata* W., *crepidinea* Mchx. (= *gigantea* Rafin.), *deltoidea* Ell. etc., v. *Nabalus suavis*, *altissimus* etc., p. 427, II., *deltoidea* MB., v. *Lactuca deltoidea* Nachlese, *triquetra* LaBill., *acanthifolia* W. etc., v. *Phaenopus triqueter*, *acanthifolius*, p. 506, II., *sonchoides* DC., v. *Mulgedium acuminatum*, p. 533.

Prepusa Mart., *Prepusa* V. 1., Contortae-Gentianeae.

Hookeriana Grah., Hooker's, 4. w. Brasilien.

Prescotia Lindl., Prescotie.

plantaginea Kl. (non Lindl.), wegetrittähnliche, 4. w. Brasilien.

Preslia cervina Fresen., Benth. (= *glabriflora* et *villiflora* Opitz), v. *Mentha cervina*, p. 510.

Prestonia glabrata H. B. K., v. *Haemadictyon glabratum* Nachlese.

Priestleya DC., Priestleya.

Thunbergii Hook. (= *Borbonia laevigata* L. mant. =

Liparia laevigata Thbg. = *L. villosa* Sieber herb.),

Thunberg's, 5. t. Cap d. g. Hoffn.

ericifolia DC., v. *Amphithalea ericaefolia*, p. 33, II.

Primula T., L., Primel (Schlüsselblume).

acaulis Jacq. (= *breviscapa* Murr. = *variabilis* Bast.

α = *elatior* β *acaulis* W. = *veris* γ *acaulis* L. = *grandiflora* Lam.).

altaica Lehm. (= *auriculata* Ledeb. = *undulata* Fisch.

= *nivalis* Turczsch.), β) *exaltata* Lehm. (= *longiscapa* Ledeb.).

Auricula L., e) *hortensis*.

Gartenvarietäten: Alexandria Sweet, albiflora Sweet, albiflora Hort., calycantha Hort., dilecta Sweet, gloriosa Sweet, Grimesii Sweet, Hedgeana Sweet, Hilliana Sweet, independens Sweet, Lawrenceana Sweet, melanocytha Sweet, Mooreana Sweet, obscura Sweet, Oldenburghii Sweet, Pollitiana Sweet, Quirogiana Sweet, Redmani Sweet, Smithii Sweet, undulata Sweet, violacea Sweet, Warrisonia Sweet. — Archagathus Burch's, Blücher Warris, british crown Lea's, Conqueror of Europe, Defiance Clough's, Dutchess of Oldenburg Catleugh, Général Bolivar Smith, George Canning Watt's, Lord Lascelles Wood, Lovely Ann Oliver's, Pss. Charlotte Sm. etc. etc.

auriculata Lam. (non Ledeb.), (= *longifolia* Curt.), gehörte, 4. k. f. b. Caucasus, Sibirien, Cappadocien, Taurus etc.

Balbisii Lehm. (= *ciliata* Moretti, non Schrk.).

Boveana Decaisn. (= *involucrata* Swt. = *verticillata* Bot. mag., Lk. et Otto, non Forsk.), Bové's, 4. k. Sinai.

carniolica Jacq., β) *multiceps* Freyer, (= *Freyeri* Hoppe, = *venusta* Host).

davurica Spgl. (= *intermedia* Curt.).

Primula

elatior Jacq., β) Columnae Tenore, γ) variabilis aurea Tratt.

Gartenvarietäten: Barnardiana Sweet, Fletcheri Sweet, Shadiana Sweet, tricolor Hort. (= *multicolor*), plena etc.

farinosa L. (= *scotica* Hook.), var. lilacina Sweet, nivea Sweet, violacea Sweet.

floribunda Wall. (= *obovata* Wall. = *Androsace obovata* Wall.), blüthenreiche, 4. t. Ostindien.

Flörkeana Schrad. (= *intermedia* Tratt. = *minima hybrida* Rchb.).

inflata Lehm. (= *veris* β Rchb.), β) macrocalyx Bunge, Ungarn, Caucasus, Sibirien.

mistassinica Mchx. (= *pusilla* Goldie, non Wall. = *farinosa* Nutt.).

Polliniana Moretti, (= ? *venusta* Hort.), Pollini's, 4. f. b. Oberitalien.

praenitens Ker, (= *sinensis* Lindl., Hort. = *sertulosa* Kicks. = *Auganthus sinensis* Lk. = *Oscaria chinensis* Lilja).

b) albiflora Sweet, c) fl. albo pleno, d) dentiflora Lindl., e) rosea Bot. mag., f) fimbriata alba, g) fimbriata rosea, h) fl. rubro pleno.

purpurea Royle, (= *atroviolacea* Jack.), purpurfarbige, 4. k. Nepal.

sibirica Jacq. (= *intrusa* Rchb. = *rotundifolia* Pall.), β) minor Hook. (= *finnmarchica* Jacq. = *norwegica* Retz, = *egallicensis* Lehm.).

villosa Jacq. (= *viscosa* All. = *hirsuta* Vill. = *pubescens* Jacq. = *latifolia* Lapeyr. = *ciliata* Schrk., Lehm. (non Moretti) = *decora* Curt. = *pedemontana* Thom. = *graveolens* Hegetschw. = *rhaetica* Gaud. = *alpina* Schlchr. = *helvetica* Don, = *alba* Hffg. = *nivalis* Hort., non Pall.).¹⁾

a) purpurea, b) rosea, c) carnea, d) alba.

β) glandulosa Duby.

Unbestimmtere: bicolor Rafin., exscapa Hort., maxima Hort., minuta Banks, ornata Banks.

Prinos L., Winterbeere.

atomarius Nutt. (= ? *coriaceus* Pursh).

canadensis Lodd., canadische, \mathfrak{f} . f. Canada.

integrifolius Ell. (= *ambiguus* Nutt., non Lam.), ganzblättrige, \mathfrak{f} . f. Nordamerika.

longifolius Dsf., langblättrige, \mathfrak{f} . f. Nordamerika.

prunifolius Dsf., pflaumenblättrige, \mathfrak{f} . f. Nordamerika.

Ungewifs: cassinoides Hort.

Printzia Cass., Printzie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Bergii Cass. (= *Aster chamaedryfolius* Lam. = *A. papposus* W. herb. = *A. polifolius* L. = *A. tomentosus* E. Mey. = *Conyza verrucosa* Houtt. = *Inula cernua* Berg. = *I. coerulea* L. = *Leyssera polifolia* Thbg., p. 460), Bergius's, \mathfrak{f} . k. t. Cap d. g. Hoffn.

Prionitis Adans., *Falcaria* Dumort., v. *Falcaria* Rivini.

1) Werden von Duby in DeCandolle prodr. syst. nat. reg. veget. VIII. p. 38 als Synonyme von *P. villosa*, nicht einmal als Abarten derselben angesehen.

- Prionium** E. Mey., Palmensimse, VI. 1., Juncaceae.
Palmita E. Mey. (= *Acorus Palmita* Lichtst. = *Juncus serratus* Thbg.), capische, k. t. k. Cap d. g. H. (Ob kultivirt?)
- Prionotes** RBr., Sägestrauch, V. 1., Epacrideae.
cerinthoides RBr. (= *Epacris cerinthoides* LaBill.), wachsblumenähnlicher, f. t. Van Diemens Land.
secunda Spgl., v. *Dracophyllum secundum*.
- Prismatocarpus** L'Her., Prismakapsel.
crispus L'Her. (= *Campanula crispata* Banks, = *C. longirostris* Banks, = *C. plicata* P.), krausblättrige, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
- Pritzelia** Walpers, (Dr. G. Pritzel, Verfasser einer Monographie der Gattung Anemone), V. 11., Umbelliferae.
didiscoides Walpers, didiscusähnliche, ☉. ♂. m. f. k. Neuholland (Schwanenflufs).
Pritzelia Schauer (non Walp.), v. Scholtzia.
- Priva** Adans., Priva.
mexicana P. (= *hispida* Juss. = *Blairia cordifolia* Mch. = *B. mexicana* G. = *Verbena mexicana* L. = *Zapania mexicana* Lam.).
Mitchellii Endl. (= *Phryma leptostachya* L.), Mitchell's, 4. f. Nordamerika.
Roxburghii Endl. (= *Streptium asperum* Roxb., p. 790, = *Tortula aspera* W.), Roxburgh's, 4. w. Ostindien.
Proboscidea Jussieui Schmidel, (= *cordifolia* Mch.), v. *Martynia proboscidea*, p. 498.
- Prockia** P. Br., Prockia.
racemosa H. Lecchi, Colla, traubige, f. w. ?
- Procris** Commers., Procris.
fagifolia Poir. (= *hypocrypta* Commers. = *Böhmeria fagifolia* P. = *Elatostemma fagifolium* Gaudich.), buchenblättrige, f. w. Mascarenas.
- Pronaya** Hügel, Pronaya, p. 657.
elegans Hügel, (= *Campylanthera Fraseri* Hook. = *Spiranthera Fraseri* Hook.).
speciosa Endl. (= ? *Billardiera rosmarinifolia* DC.), prächtige, f. t. Neuholland.
- Prosartes** Don, Endl., Prosartes, VI. 1., Sarmenaceae (Asparagineae) Smilaceae.
lanuginosa Don, (= *Streptopus lanuginosus* Mchx., p. 790, = *Uvularia lanuginosa* P. Ker in bot. reg.).
Menziesii Don, Menzies's, 4. f. b. Nordwestl. Amerika.
- Prosopis** L., Harzhülse.
dulcis H. B. K. (= *inermis* Gill. = *Acacia laevigata* W.).
humilis Gill., niedrige, f. t. Bonaria.
juliflora DC. (= *Acacia falcata* Dsf. = *A. juliflora* W. = *Mimosu piliflora* Sw.).
Siliquastrum DC. (= *Acacia Siliquastrum* Lagasca), langeschotige, f. t. Chili.
elephantina E. Mey. (= *elephantorrhiza* Spgl. = *Acacia elephantorrhiza* Burch.), v. *Elephantorrhiza Burchellii*, p. 218, II.
- Prostanthera** LaBill., Geneigtfaeden.
aspalathoides Cunningh., witschenähnlicher, f. k. t. Neuh.
grandiflora Hort. belg., großblumiger, f. k. t. Neuholl.
nivea Cunningh., schneeweiser, f. k. t. Neuholland.
ocimoides Hort. Berol., basilicumähnlicher, f. k. t. Neuholland.

Prostanthera

retusa RBr., abgestutzter, $\frac{1}{2}$. k. t. Neuholland.

thymifolia Benth. (= *retusa* Sbr., non RBr.), thymianblättriger, $\frac{1}{2}$. k. t. Neuholland.

Prostea pinnata Cambess., v. *Schmidelia pinnata*.

Protea L., Wunderfichte (Silberfichte).

acaulis Thbg. (= *glaucophylla* Salisb. = *nana* Lam., non Thbg. = *Leucadendron acaulon* L.).

acerosa RBr., β) *virgata* Andr.

amplexicaulis RBr. (= *repens* Andr. = *Erodendron amplexicaule* Salisb.).

auriculata Tausch, (= *grandiflora affinis* Eckl.), geöhrt, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.

canaliculata Andr. (= *polygaloides* W.).

coccinea RBr. (= *rangiferina* Hort.).

cordata Thbg. (= *cordifolia* Sims).

formosa RBr. (= *coronata* Andr. = *Erodendron formosum* Salisb.).

fulva Tausch, gelbrothe, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.

grandiflora Thbg. (= *cynaroides* β L. = *nitida* Mill.).

latifolia RBr. (= *radiata* Andr. = *spectabilis* Lichtenst. = *Erodendron eximium* Knight, Salisb.).

Lepidocarpon RBr. (= *cristata* Lam. = *Lepidocarpodendron* β L. = *speciosa* Thbg. = *Leucadendron Lepidocarpodendron* L.).

longiflora Lam. (= *cristata* Lam. var.? Poir. = *lacticolor* Salisb. = *ochroleuca* Sm. = *Erodendron bombycinum* Salisb.), β) *Mundii* Lk., Kl.

macrocephala Thbg., großköpfige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.

melaleuca RBr. (= *Lepidocarpon* Curt. = ? *marginata* Thbg. = *speciosa nigra* Andr.).

mellifera Thbg. (= *repens* L. mant. = ? *staticifolia* Hort. = *Erodendron mellifluum* Salisb.).

mucronifolia RBr. (= ? *mucronata* Hort. = *odoratissima* Mass.).

obovata Andr. (= *Serruriae species* RBr. ?), verkehrt-eiförmige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.

patens RBr. (= *speciosa patens* Andr.).

rosacea L. (= *acutifolia* Salisb. = *nana* Thbg. = *Leucadendron nanum* Berg.), rosenförmige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.

Scolymus Thbg. (= *angustifolia* Salisb. = *scolymcephala* L.).

speciosa L. (= *barbata* Lam. = ? *coronata* Lam. = *grandiceps* Trattin. = *Lepidocarpodendron* β L. = *Erodendron magnificum* Salisb. = *Leucadendron Lepidocarpodendron* L. = *P. speciosa rubra* Hort.).

turbiniflora RBr. (= *caespitosa* Andr. = *Erodendron turbiniflorum* Salisb.).

Unbestimmtere: *arborescens* Hort., *asplesifolia* Hort., *brassicaefolia* Hort., *carinata* Hort., *carnosa* Hort., *cerifera* Hort., *concolor* Hort., *declinata* Hort., *densa* Ait., *dioica* Hort., *ericoides* Hort., *glauca* Hort., *glutinosa* Hort., *graminea* Hort., *grandis* Hort., *hirtella* Hort., *humifusa* Hort., *incana* Hort., *lanceolata* Hort., *leucantha* Hort., *micrantha* Hort., *mollis* Hort., *mollissima* Hort., *multifida* Hort., *Passerina* Dsf., *pinas-trifolia* Hort. (= ? *Pinaster* Hort.), *pinnata* Cav., *radula* Hort. (= *radulifolia* Don), *reflexa* Hort., *retroflexa* Dietr., *setacea* Hort., *spiralis* Hort., *statice-*

Protea

folia Hort., subacaulis Hort., tenella Hort., tenera Hort., tridentata Hort., viscosa Hort.

alba Thbg. (= *cinerea* Ait.), *arcuata* Lam. (= *plumosa* Ait. = *obliqua* Thbg. = *parviflora* L.), *ciliaris* Voigt, (= *ciliata* Hort.), v. *Leucadendron cinereum*, *marginatum* et *plumosum*, *argentiflora* Andr. (= *triternata* Thbg.), v. *Serruria triternata*, p. 748, *conifera* Andr., *decora* Hort., v. *Leucadendron strictum* et *grandiflorum*, p. 458, *dichotoma* Cav. (= *pulchella* Schrad., Wendl.), v. *Petrophila pulchella* p. 610, *dichotoma* Lam., v. *Mimetes divaricata*, p. 524, *diversifolia* W., *globosa* Andr. (= *strobilina* Don), v. *Leucadendron salignum* et *concolor*, p. 458, *heterophylla* Thbg., v. *Leucospermum diffusum*, p. 356, II., *imbricata* Wendl. (= *Wendlandi* Poir.), v. *Leucadendron buxifolium*, p. 457, *Lagopus* Andr. (non Thbg.), v. *Nivenia crithmifolia*, p. 549, *nectarina* Schrad., Wendl., v. *Lambertia formosa*, p. 444, *pallens* L. (= *stricta* Don), *pallens* Thbg., v. *Leucadendron adscendens* et *decurrens*, p. 458, *pedunculata* Lam., *phyllicoides* Lam., *procumbens* L., v. *Serruria glomerata*, *villosa* et *decumbens*, p. 748, *prolifera* Thbg., v. *Spatalla prolifera*, p. 775, *saligna* Andr., v. *Leucadendron floridum*, p. 458, *Serruria* L., v. *Serruria Burmanni*, p. 748, *sphaerocephala* L., *sphaerocephala* Thbg., *sphaerocephala* W. herb, v. *Serruria phyllicoides*, *rubricaulis*, *arenaria*, p. 748, *spicata* L., *spicata* Andr., v. *Nivenia spicata* et *media*, p. 549, *strobilina* L., v. *Leucadendron squarrosum*, p. 459.

Uebrigens sind noch die hierher gehörigen Synonymen p. 659 zu vergleichen, sowie überhaupt die Gattungen *Aulax*, *Isopogon*, *Leucadendron*, *Leucospermum*, *Mimetes*, *Nivenia*, *Petrophila*, *Serruria*, *Sorocephalus*, *Spatalla*.

Proustia Lagasca, Cass. (Proust, spanischer Naturforscher), XIX. II., Compositae-Eupatorineae (Perdicieae).
pungens Poepp. (= *cuneifolia* Don), stechende, h. k. Chili.
β) *ilicifolia* Hook.

pyrifolia DC., birnblättrige, h. k. Chili.

Prunella L., Brunelle.

alba Pall. (= *laciniata* L. = *grandiflora* β W. = *sulphurea* Mill. = *vulgaris* L. var. L., Benth.).

caroliniana Mill. (= *vulgaris* L. var. Benth.), carolinische, 4. f. Carolina.

grandiflora Jacq., Mch. (= *officinalis* β Crantz, = *speciosa* Wender.), β) *hastaefolia* Brotero, (= *hastata* Spgl. = *laciniata hastaefolia* Hfsg., Lk. = *lusitana* Perrault).

pennsylvanica W. (= *angustifolia* Wender. = *australasica* Moric. = *latifolia* Don, = ? *novae Angliae* Mill. = *vulgaris* γ *elongata* Benth.), β) *macrophylla* Hamilt. (= *ovata* Dsf., P.).

vulgaris L. (= *officinalis* Crtz. = *reptans* Dumort. = *surrecta* Dumort.), β) *parviflora* Poir., γ) *hirta* Benth. (= ? *hirsuta* Wender. = *hispida* Benth.), δ) *pinna-tifida* P. (= *dissecta* Wender. = *incisa* Lk. = *intermedia* Brotero, = *laciniata* Auct. quor. = *longifolia* P.), ε) *aequinoctialis* H. B. K.

Prunus L., Pflaume.

II. Cerasus T. (et Padus R.) Kirsche.

aspera Thbg., rauhe, f. k. f. b. Japan.

avium L. (= *sylvestris* P.), var. *asplenifolia* Hort., *rubicunda* Bechstein.

β) *duracina* DC., γ) *mammillaris* Sering. (= *macrophylla* Poir. = *nicotianaeifolia* Loisel.).

brachybotrya Zuccar., kurztraubige, f. k. Mexico.

caroliniana Ait. (= *sempervirens* W. = *Bumelia serrata* Pursh, = *Padus caroliniana* Mill., Borkh.).

Cerasus L. (= *hortensis* P.), f) *persiciflora* Sering. (= *rosea* Hort.).

Chamaecerasus Jacq. (= *C. humilis* Host).

β) *fruticans* Weihe.

demissa Nutt., niedergedrückte, f. f. Nordamerika (Oregongebiet).

densiflora Spach, dichtblumige, f. f. ? Nordamerika.

divaricata Ledeb. (= ? *syriaca* Borkh.), ausgespreizte, f. f. Caucasus.

Duerinckii Martens, *Duerinck's*, f. f. Nordam. (St. Louis).

elliptica Thbg., elliptische, f. f. Japan.

fimbriata Spach, gefranzte, f. f. ? Nordamerika.

glandulosa Thbg., drüsige, f. f. b. k. Japan.

graeca Dsf. (= *C. Fontanesiana* Spach), griechische, f. f. Griechenland.

hirsuta Ell., rauhhaarige, f. f. Nordamerika.

humilis Bunge (non Moris), niedrige, f. f. Nordchina.

hyemalis Mchx. (= *acinaria* Dsf. = *nigra* Ait. var. ? Poir.).

japonica Thbg. (= *sinensis* P.), β) *chinensis* G. Don, (= *Amygdalus pumila* L.), b) *multiplex* Sering.

incisa Thbg., eingeschnittene, f. f. b. Japan.

intermedia Host, mittlere, f. f. Oestreich.

Kerii Steud. (= *C. japonica* Ker, non Loisel.), Ker's, f. f. b. Japan.

Marasca Host, Maraschiner-K., f. f. Dalmatien.

micrantha Spach, kleinblumige, f. f. ?

Mume Sieb. et Zuccar., (= *Amygdalus nana* Thbg.), Mume-K., f. f. b. Japan.

Padus L. (= *Padus racemosa* Lam. = *P. avium* Mill. = *P. germanica* Borkh. = *P. vulgaris* Host), var.

heterophylla Hort., *variegata* Hort.

paniculata Thbg., rispige, f. f. b. Japan.

persicifolia Dsf. (= *borealis* P. = *nigra* Ait. var. Spgl.).

prostrata LaBill. (= *Amygdalus prostrata* Sweet).

β) *incana* Steven, (= *A. incana* Pall.).

semperflorens Ehrh. (= ? *C. effusa* Host).

sphaerocarpa Sw. (= *brasiliensis* Schott).

tomentosa Thbg., filzige, f. f. b. Japan.

β) *fructibus oblongis*: *trichocarpa* Bunge, haarfrüchtige, f. f. b. Nordchina.

III. Prunus T., Pflaume.

Chicasa Mchx. (= *insititia* Walt.).

domestica L., var. *cerea*, *minor*, *enucleata*.

insiticia L., β) *vinaria* Bechst. (= *floribunda* Weihe).

Poiretiana * (= *pubescens* Poir. = *pubigera* Steud.).

spinosa L., var. *semiplena*, *dulcis*, *viridis*.

Unbestimmtere: *italica* Borkh., *latifolia* Räusch., *montana* Hort., *virginalis* Wender.

- Psacalium** Cass., *Psacalium*, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.
 peltatum Cass. (= *Cacalia peltata* H. B. K., p. 141, p. 871), schildförmiges, 4. ⚥. t. Mexico.
Psephellus Cass., *calocephalus* Cass., *carthamoides* Fisch. et Mey., *phaeopappus* Fisch. et Mey., *spectabilis* Fisch. et Mey., v. *Centaurea dealbata*, p. 177 et *Amberboa carthamoides*, *phaeopappa* et *spectabilis*, p. 31, 32, II.
- Pseudarthria** Wight, Arn., Gliederhülschen, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 viscida Wight, Arn. (= *Desmodium viscidum* DC. = *Hedysarum prostratum* Roxb. = *H. viscidum* L. = ? *H. viscosum* Burm. = *Rhynchosia viscida* DC., p. 688), schmieriges, 4. ⚥. Sch. w. Java, Ostindien.
Pseudocapsicum Medic., Mch., *diphyllum* Medic., *lanceifolium* Mch., *torulosum* Mch., *undulatum* Mch., v. *Solanum diphyllum*, *lanceolatum*, *aethiopicum*, *pseudocapsicum*.
Pseudodictamnus Mch., *acutus* Mch., *emarginatus* Mch., v. *Beringeria hispanica* et *africana*, p. 119.
Pseudosophora alopecuroides Sweet, *sericea* Sweet, v. *Radiusia alopecuroides* et *sericea*.
- Psiadia** Jacq., Tropfenpflanze.
 glutinosa Jacq. (= *Conyza glutinosa* Lam., Spgl. = *Erigeron glutinosum* Dsf. Hort. Par. = *E. viscosus* Dsf. = *Solidago viscosa* Schrad., Wendl.).
 penninervis DC. (= *glutinosa* Boj.), fiedernervige, ⚥. t. Mauritius.
- Psidium** L., Guajavabaum.
 amplexicaule P. (= *cordatum* Sims), stengelumfassender, ⚥. w. Antillen.
 Araça Raddi, (= *minus* Mart.), Araça-G., ⚥. w. Brasil.
 Cattleyanum Sabine, (= *coriaceum* Mart.). China, Brasil.
 crassifolium Brotero, dickblättriger, ⚥. w. Brasilien.
 dichotomum Weinm., zweizinkiger, ⚥. w. Brasilien.
 fluviatile Rich. (= *guianense* P.), flussliebender, ⚥. w. Guiana.
 oligospermum Mart., wenigsaamiger, ⚥. w. Brasilien.
 pomiferum L. (= *Guajava* β Raddi, = *sapidissimum* Jacq.).
 pyrifera L. (= *Guajava* Raddi, = *vulgare* Rich. = *Guajava pyriformis* G.).
 rubrum Lour., rother, ⚥. w. t. China.
- Psilathera** Lk., tenella Lk., v. *Sesleria* Sect. II., p. 750.
- Psilonema** C. A. Mey., Borstenfaden, calycynum C. A. Mey., dasycarpum C. A. Mey., homalocarpum Fisch. et Mey., v. *Alyssum* Sect. IV. p. 28, II.
Psilothonna Tagetes E. Mey., v. *Ganolepis Tagetes*.
Psilotum Sw., *complanatum* Sw. (= *dichotomum* Hort.), *dichotomum* Lk. (= *triquertum* Sw. = *floridanum* Mchx.), v. *Bernhardia complanata*, p. 66, II. et B. *dichotoma*, p. 119.
- Psittacoglossum** LaLlave, Lindl., Papageienzügel, XX. 1., Orchideae.
 atratum LaLlave, schwärzliches, 4. w. Mexico.
- Psoralea** L., Harzklec.
 aculeata L. (= *acuminata* Lam.).
 aphylla L. (= *decidua* Berg. = *denudata* Hffg. = *filifolia* Eckl., Zeyh. = *Jacquiniana* Eckl., Zeyh., non Endl. = *Ruderia decidua* Mch.).

Psoralea

- bituminosa L. (= *Aspalathium bituminosum* Medic. = *Dorychnium angustifolium* Mch.), β) frutescens Poir.
 bracteata L. (= *cuneifolia* Brot. = *Ononis trifoliata* L. = *Trifolium fruticans* L.).
 bracteolata Eckl., Zeyh. (= *bracteata* Jacq., non L. = *bracteata* β *Jacquiniana* E. Mey.), kleindeckblättriger, \S . k. Cap d. g. Hoffn.
 capitata Thbg., L. fil. (= *astragalifolia* Poir. = *multicaulis* Jacq.).
 cuspidata Pursh, (= *macrorrhiza* Fraser).
 decumbens Ait. (= *mucronata* Thbg. = *ononoides* Poir. = *Ononis decumbens* Sieber).
 fascicularis DC. (= *tenuifolia* Thbg., non L. = *Thunbergiana* Eckl., Zeyh. = *Lotus tenuifolius* Burm.), hüschelförmiger, \S . k. Cap d. g. Hoffn.
 foetida Presl, stinkender, \odot . f. Sicilien.
 glandulosa L. (= *Cullen* Poir. = *lutea* Molina), drüsig, 4. \S . k. Chili.
 humilis Mill., niedriger, \S . t. Vera Crux.
 Jacquiniana Sweet, Endl., non Eckl. (= *hirta* Jacq., non L.), Jacquin's, \S . k. Cap d. g. Hoffn.
 Jaubertiana Fenzl, Jaubert's, \odot . \S . f. k. Mesopotamien.
 obtusifolia DC., stumpfblättriger, \S . k. Cap d. g. H.
 odoratissima Jacq. (= *pinnata* Andr., nec alior.).
 striata Thbg. (= *Ecklonis* Hort. Viadr. = *rupicola* Eckl., Zeyh.).
 subacaulis Torr. et Gray., faststengelloser, 4. k. f. b. Nordamerika.
 Tauschiana Steud. (= *parviflora* Tausch, non ? E. Mey. = *spicata* Hort.), Tausch's, \S . k. Cap d. g. Hoffn.
 triantha E. Mey. (= *hirta* Thbg. = *triflora* Poir., non Thbg.), dreiblumiger, \S . k. Cap d. g. Hoffn.
 verrucosa W. (= *angustifolia* Jacq. = *tenuifolia* W. herb. = *triflora* Eckl., Zeyh.), β) *intermedia* Bess. (= ? *axillaris* Poir.), ? γ) *triflora* Thbg.
 Unbestimmtere: *biflora* Rudolph., *genistoides* Hort., *lathyriifolia* Balb.
alopecuroides Poir. (= *annua* Mill. = *Dalea* L.), *Lagopus* Cav. (= *leporina* Ait.) etc., v. *Dalea alopecuroides* etc., *candida* Poir., *carnea* Poir., *corymbosa* Poir., *violacea* Poir., v. *Petalostemon candidum* etc., p. 609, *cytisoides* L., v. *Indigofera cytisoides*.
Psorophytum undulatum Spach, v. *Hypericum blearicum*.

Psychotria L., Psychotria.

- alba* R. et P. (= *ardisiaefolia* H. B. K. = *decidua* Arrabida, = *densiflora* W. = *patula* W.), weiß, \S . w. Südamerika.
carthagenensis Jacq., carthagaische, \S . w. Carthago.
floribunda H. B. K., blüthenreiche, \S . \S . w. Südamer.
sambucina Lk., hollunderähnliche, \S . w. Brasilien.
undata Jacq. (= *undulata* Poir.).

Zweifelhaft: *discolor* H. belg.

Pavetta Sw., *pedunculosa* Rich., *rigida* Bredem., W. (= *byrsophylla* Spgl.), v. *Palicourea Pavetta*, *pedunculosa et rigida*, p. 472, II. Die übrigen Synonyme vergl. p. 663.

Psyllium Juss., *aegyptiacum* Mirb., *annuum* Mirb. (= *erectum* St. Hil.), *annuum* Thuill., *genevense* Poir. (= *suffruticosum* St. Hil.), v. *Plantago squarrosa*, *Psyllium*, *indica*, *Cynops*, p. 631—633.

Ptarmica T., Bertramskraut, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Bocconi Steud. (= *Achillea Bocconi* K. Hort. Erl.), Boccone's, 4, f. ? Sibirien.

borealis DC. (= *Achillea borealis* Bong.), nördliches, 4. f. Nordasien (Insel Sitcha).

ircutiana DC. (= *Achillea lenensis* Turcz.), ircuitisches, 4. f. Dahurien.

mucronulata DC. (= *Anacyclus mucronulatus* Guss. = *Anthemis mucronulata* Bertol., p. 62).

multifida DC. (= *Achillea setacea* Auch., non W. K.), vieltheiliges, 4. f. b. Olymp, Bithynien.

oxyloba DC. (= *Anthemis alpina* L., p. 62, = *Chamaemelum alpinum* All. = *Chamomilla alpina* Hall.), spitzzipfeliges, 4. f. Oestreichische Alpen.

umbellata DC. (= *Achillea umbellata* Sibth., Sm.), doldiges, 4. f. b. Griechenland.

Außerdem gehören zu dieser Gattung nach DeCandolle noch folgende früher zu *Achillea* gestellte p. 9—11 verzeichnete Arten:

alpina DC. (= *Achillea alpina* L. = *cristata* W., non Retz, = *punctata* Mch.), β) *angustifolia* H. Prag.,

atrata DC. (= *Achillea atrata* L. = *A. Halleri* Crantz, = *Anthemis corymbosa* Hænke),

biserrata DC. (= *Achillea biserrata* MB.),

Clavennae DC. (= *Achillea argentea* Visiani, = *A. capitata* W. = *A. Clavennae* L. = *A. sericea* Visiani, = *A. tyrolensis* Wender.),

Clusiana Steud. (= *atrata* γ DC. = *A. Clusiana* Tausch, = *A. Clusii* Sauter),

cristata DC. (= *Achillea cristata* Retz, non W.),

grandiflora DC. (= *Achillea dracunculoides* Dsf. = *A. grandiflora* MB. = *A. leucanthema* P. = *Anthemis ptarmicaefolia* Adams, = *Chrysanthemum ptarmicaefolium* Muss. Puschk. = *Pyrethrum ptarmicaefolium* W.),

Herba-rota DC. (= *Achillea cuneifolia* Lam. = *A. herba-rota* All. = *A. nana* Lam.),

Impatiens DC. (= *Achillea Impatiens* L. = *A. nilida* Auct.),

lingulata DC. (= *Achillea lingulata* W. K.),

macrophylla DC. (= *Achillea macrophylla* L.),

mongolica DC. (= *Achillea mongolica* Fisch.),

moschata DC. (= *Achillea Genipi* Murr. = *A. livia* Scop. = *A. moschata* Wulf., Jacq.),

β) *A. impunctata* Vest, *nana* DC. (= *Achillea lanata* Lam. = *A. nana* L.),

serrata DC. (= *Achillea serrata* Retz),

speciosa DC. (= *Achillea serrulata* Hornem. = *A. speciosa* Henckel),

Thomasiana DC. (= *Achillea montana* Schleichr. = *A. Thomasiana* Hall. fil. = *A. Thomasii* C. C. Gmel.),

valesiaca DC. (= *Achillea helvetica* Murray, = *A. incisa* Clairv. = *A. valesiaca* Suter),

vulgaris DC. (= *Achillea Ptarmica* L.), β) *multiplex* DC. (= *Achillea multiplex* Renar. (Bouton da'rgent Hort.), γ) *A. pyrenaica* Sibth., δ) *linearis* DC. (= *Achillea fragilis* Balb.), ϵ) *cartilaginea* DC. (= *Achillea cartilaginea* Ledeb. = ? *A. salicifolia* Besser).

Ptelea L. Lederblume.

monophylla Lam. (= ? *caroliniana* Hort. = *microphylla* Dietr.), einblättrige, ♂. f. Carolina.

trifoliata L. (= *americana* Hort.), ♂) *pentaphylla* Münchh.

Pteranthus L., Flügelblümchen, IV. 1., Aizoideae-Atripliceae.

echinatus Dsf. (= *P. Forskohlei* Mirb. = *Camphorosma Pteranthus* L. = *Louichea cervina* L'Her. = *L. Pteranthus* Auct.), igelstacheliges, ☉. f. Nordafrika, Arabien, Cypern.

Pteris L., Saum-(Adler-)farn.

allosora Lk. (= *Swartziana* Agardh), krauser, 4. w. Brasilien.

aquilina L. (= *caudata* Jacq.).

arachnoidea Desv. (= *lanuginosa* Spgl.), spinnenwebiger, 4. k. Nordamerika.

contracta Lk. (= *stenophylla* H. Berol., non Hook. et Grev), zusammengezogener, 4. w. Brasilien.

crenata Sw. (= *chinensis* Lodd.), kerbiger, 4. w. China.

cretica L., ♂) *caspica* Fisch. et Mey.

decurrens Raddi, herablaufender, 4. w. Brasilien.

deflexa Lk., herabgebogener, 4. w. Brasilien.

edulis Hort. Berol. et Birmingh. (= *tremula* RBr. var.? Kunze), genießbarer, 4. w. ? Neuholland.

elegans Jacq. (= *arguta* Lk., non Vahl), zierlicher, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

emergens Lk. (= *angustata* Ag.), hervorragender, 4. w. Brasilien.

flabellata Thbg. (= *arguta* Schldtl., non Vahl), fächerförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

geraniifolia Raddi, (= *pedata* Sw. et Hort., non L.), storchschnabelblättriger, 4. w. Brasilien.

grandifolia L. (= *vittata* Schk.).

lata Kaulf., Lk., breiter, 4. w. Brasilien.

leptophylla Sw. (= *spinulosa* Raddi, = *Cheilanthes spinulosa* Lk.).

longifolia L. (= *costata* Sw.).

macroptera Lk. (= *intermedia* Kaulf. = ? *elata* Ag.), großflügeliger, 4. w. ?

nemoralis W., ♂) *Plumierii* W.

paleacea Roxb., spreuiger, 4. w. St. Helena.

pallida Raddi, bleicher, 4. w. Brasilien.

pedata L. (= *Litobrochia pedata* Presl).

polita Lk. (= *podophylla* Presl, Lk. = *propinqua* Ag), geschmückter, 4. w. Brasilien.

repandula Lk. (= *biaurita* H. Berol., non L.), ausgeschweiffter, 4. w. Brasilien.

semihirta Lk., halbrauher, 4. w. Cuba.

stenophylla Hook. et Grev., schmalwedeliger, 4. w. ? Brasilien.

sulcata Mey., gefurchter, 4. w. Südamerika.

tremula RBr. (= *chrysocharpa* Lk., non Hook. et Grev.).

Vespertilionis LaBill., var. *aurita* Ag., Hort. Bonn.

atropurpurea L., *auriculata* Sw., *Calomelanos* Sw.,

cordata Cav., Lk. (= *flexuosa* Hook.), *chrysocharpa*

Hook et Greville, non Lk., *hastata* Sw. (= *Chei-*

lanthes hastata Kunze), *intramarginalis* Kaulf., *sa-*

gittata Cav., *subverticillata* Sw. (= *peruviana* Poir.

= *ternifolia* Cav.), v. *Allosorus atropurpureus*, *au-*

riculatus, *Calomelanos*, *flexuosus* etc., p. 22, 11.

Pterocarpus Löfl., L., Flügelfrucht.

Adansonii DC. (= *erinaceus* Lam. = *senegalensis* Vahl), Adanson's, h. w. Senegal.

Marsupium Roxb. (= *bilobus* Roxb.).

Draco L. (= *officinalis* Jacq. = *hemipterus* G.),

Moutouchi Lam. (= *suberosus* P.), v. *Moutouchia*

Draco et suberosa, p. 421, II.

Pterocarya Kunth, Flügelnufs.

caucasica Kunth, (= *fraxinifolia* Spach, = *Fraxinus*

laevigata Hort. Par. = *Juglans fraxinifolia* Lamond,

Duham. = *J. pterocarpa* Mchx. = *Rhus obscurum* MB.).

Pterocaulon Elliot, DC., Flügelstengel, p. 885.

pyncnostachyum Ell. (= *Chlaenobolus pyncnostachyus* Cass.

= *Conyza pyncnostachya* Mchx. = *Gnaphalium undu-*

latum Walt. = *Pluchea pyncnostachya* Less.), dicht-

ähriger, 4. f. Nordamerika.

virgatum DC. (= *Chlaenobolus virgatus* Cass. = *Conyza*

virgata L. = *Gnaphalium virgatum* L. = *Pluchea*

virgata Less.).

Pterocelastrus Meisn., Flügelcelaster, V. 1., Celastriaceae.

tricuspidatus Meisn. (= *Asterocarpus tricuspidatus* Eckl.,

Zeyh. = *Cassine laevigata* Lam. = *Celastrus tric-*

spidatus Lam., p. 174, = *Olea capensis* Buchoz.),

dreispitziger, h. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Pterocephalus Vaill., Coult., Federköpfchen.

brevis Coult. (= *Trichera brevis* Schult.), kurzes, \odot . f. ?

dumetorum Coult. (= *Scabiosa dumetorum* Brouss. =

Trichera dumetorum R. et S.).

lasiospermus Lk. (= *dumetorum* var. *pusilla* Coult. =

Scabiosa fruticulosa Sm.), haarsaamiges, h. k. Cana-

rische Inseln.

lusitanicus DC. (= ? *Asterocephalus intermedius* Lagasca,

= *Cephalaria plumosa* R. et S. = *Scabiosa gramun-*

tia Brotero, = ? *S. intermedia* R. et S. = ? *S. ma-*

ritima Lagasca, = *S. plumosa* Hffg., Lk. = ? *S.*

tenuifolia Lagasca), portugiesisches, f. 4. f. b. Portugal.

multisetus Endl. (= *Scabiosa multisetata* Visiani), viel-

horstiges, \odot . f. Dalmatien.

niveus Coult. (= *spathulatus* Coult. = *Scabiosa nivea*

Agardh), schneeweisses, 4. f. b. Spanien.

palaestinus Coult. (= *brachiatus* Speg. = *Asterocephalus*

brachiatus Rehb. = *Knautia palaestina* L. =

Scabiosa brachiata Sm.), morgenländisches, \odot . f.

Dalmatien, Griechenland, Syrien.

β) *calabricus*.

papposus Coult. (= *involucratus* Speg. = *Vilantii*

Lagasca, = *Scabiosa divaricata* Speg. = *S. involu-*

crata Sibth., Sm. = *S. papposa* L.), hülliges, \odot . f.

Portugal, Spanien, Griechenland.

β) *diandrus* Lagasca, (= *Cephalaria diandra* R.

et S. = *Scabiosa diandra* Lagasca).

perennis DC. (= *Parnassi* Speg. = *Scabiosa pterocephala*

L.), ausdauerndes, 4. h. f. b. k. Parnassus.

plumosus Coult. (= *marcescens* Mch. = *Cephalaria*

Willichii R. et S. = *Knautia plumosa* L. = *Scabiosa*

papposa G., Host, = *S. plumosa* Sibth. Sm. =

S. Willichii Lk. = *Trichera Willichii* Schult. mant.).

Sibthorpianus Steud. (= *palaestinus* Coult. var. Coult.

Pterocephalus

= *Scabiosa decemaristata* Portenschl. = *S. Sibthorpiana* Sm.), Sibthorp's, ♂. f. Cypren.

tomentosus Coult. (= *Asterocephalus sphaciolicus* Speg.

= *Scabiosa sphaciotica* R. et S. = *Scabiosa tomentosa* Sibth., Sm.), filziges, 4. k. Creta.

Pteroceras Hassk., Flügelhorn, XX. 1., Orchideae.

radicans Hassk., starkwurzelndes, 4. w. Java.

Pterochilus Hook., Flügellippe, XX. 1., Orchideae.

plantaginea Hook. (= *Microstylis plantaginea* Steud.), wegetrittähnliche, 4. w. Societätsinseln.

Pterochlamis Fisch., v. *Panderia*, p. 583.

Pterococcus aphyllus Pall., v. *Calligonum* Palasia, p. 147.

Pterodiscus Hook., Flügelscheibe, XIV. 11., Personatae-Pedalineae.

speciosus Hook., prächtige, 4. t. Südafrika.

Pterolobium RBr., Flügellappen, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

Kantuffa W. A. (= *Acacia Kantuffa* Bruce, = *Fillaea Brucei* Fresen. = *Mimosa Kantuffa* DC.), Kantuffa-Fl., ♂. w. Abyssinien.

lacerans RBr. (= *Caesalpinia lacerans* Roxb. = *C. ligulata* Rottl. = *Reichardia decapetala* Wight, = *R. hexapetala* Roth, Benth. = *Quartinia abyssinica* A. Rich.), zerschlitzte, ♂. w. Ostindien, Abyssinien.

Pteroloma Hochst., Steud., Flügelsaum, XV. 111., Capparideae.

arabicum Hochst., Steud. (= *Dipterygium glaucum* Decaisne), arabischer, 4. t. Glückliches Arabien.

Pterolophus lanceolatus Cass., *pinnatifidus* Cass., v. *Centaurea Pterolophia* et *leucolepis*, p. 178.

Pteromarathrum K., v. Prangos.

Pteroneuron DC., Flügelnäse.

bipinnatum Rchb., doppeltfiederspaltige, ♂. f. b. Dalmatien.

maritimum Rchb. (= *dalmaticum* Visiani, = *Cardamine maritima* Portenschl., p. 160, = *C. microphylla* Presl).

Pteronia L., Pteronie.

divaricata Less. (= *Chrysocoma oppositifolia* L. = *Eupatorium divaricatum* Berg.).

hirsuta L. fil., Thbg. (= *uniflora* Poir.), rauhhhaarige, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

incana DC. (= *rigida* Berg. = *Chrysocoma incana* Burm. = *Eupatorium cinereum* Thbg.), weißgraue, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

viscosa Thbg., schmierige, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

echinata Thbg., v. *Felicia echinata*, p. 99, Aster Sect. VIII., *Chamaepeuce* Speg., *Chamaepeuce* Tenor., v. *Chamaepeuce mutica* et *gnaphalodes*, p. 187.

Pterophorus camphoratus Cass., *strictus* Less., v. *Pteronia camphorata* et *stricta*, p. 664.

Pterophylla Don, Flügelblatt, VIII. (X.) 11., Saxifrageae-Cunoniaceae.

fraxinea Don, (= *Weinmannia fraxinea* Sm.), eschenähnliche, ♂. w. Molucken.

Zweifelhaft: *sessilis* Hort. Dyck.

Pterophyton alatum Cass., *alternifolium* Cass., *procerum* Cass., v. *Actinomeris tetraptera*, *alternifolia*, *procera*, p. 17 et p. 9, 11.

- Pteropogon** Fisch. et Mey., DC., Flügelbart, XIX. II.,
Compositae-Helichryseae.
andicola N. E., Anden-F., ☉. f. Chili.
australe N. E. (= *pygmaeum* DC.), neuholländischer,
☉. f. Neuholland.
chilense Fisch. et Mey. (= *Gnaphalium eriospermum*
Trevir.), chilesischer, ☉. f. Chili.
 α) minus Fisch. et Mey., β) majus Fisch. et Mey.
- Pterospermum** Schreb., Flügelkern.
glabrescens Wight, Arn. (= *aceroides* Wall. = *Heyne-*
anum var. Wall.), glatter, ♀. w. Ostindien.
Heyneanum Wall. (= *suberifolium* Auct. = *Velaga*
xylocarpa G.), Heyne's, ♀. w. Ostindien.
suberifolium W. (= *canescens* Roxb. = *Pentapetes*
suberifolia L.).
- Pterostigma** Benth., Flügelnarbe, XIV. II., Persona-
tae-Scrofularineae (Antirrhineae-)Gratioleae.
grandiflorum Benth. (= *Digitalis chinensis* Lour. =
Gerardia glutinosa L. = *Spathostigma glutinosa* Hook.
Arn.), großblumige, 4. k. China.
- Pterostylis** RBr., Flügelorche.
hirsuta Ait., rauhhaarige, 4. Kn. w. ? Neuholland.
squamata RBr., schuppige, 4. Kn. w. Van Diemens Land.
- Pterostyrax** Sieb. et Zuccar., Flügelstorax, X. I.,
Sapotaceae-Styracineae.
corymbosum Sieb. et Zuccar., traubendoldiger, ♀. k.
(Ob kultivirt?)
- Pterygodium** Sw., Flügelstendel.
acutifolium Lindl., spitzblättriger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.
platypetalum Lindl., breitkroniger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.
venosum Lindl., aderiger, 4. Kn. w. Cap d. g. Hoffn.
 Volucris Sw., v. *Ommatodium Volucris*, p. 447, II.
 Ptilimnium Rafin., *capillaceum* Rafin., *costatum*
 Rafin., v. *Discopleura capillacea*, *costata*, p. 877.
 Ptilocnema bracteatum Don, v. *Pholidota pallida*,
 p. 517, II.
 Ptilomeris californica Nutt., v. *Hymenoxis califor-*
 nica, p. 310, II.
 Ptilostemum appendiculatum Cass., *muticum* Cass.,
 v. *Chamaepeuce fruticosa*, *mutica*, p. 186.
- Ptilotrichum** C. A. Mey., Federhaar, XV. II., Cruciferae.
canescens C. A. Mey. (= *Adysetum Fischerianum* Swt.
= *Alyssum canescens* DC. = *A. Fischerianum* DC.
= *A. minutum* Patrin, = *A. sibiricum* Fisch., non
W. = *A. tenuissimum* MB. = *Koniga sibirica* α
Spach, = *Lobularia canescens* Steud.), grauliches,
4. ♀. f. Sibirien.
elongatum C. A. Mey. (= *Alyssum canescens* β *elon-*
gatum DC. = *A. dauricum* W. herb. = *Lobularia*
elongata Steud.), verlängertes, 4. ♀. f. Alt. Sibirien.
tenuifolium C. A. Mey. (= *Alyssum tenuifolium* Steph.
= *Koniga sibirica* β Spach, = *Lobularia tenuifolia*
Steud.), dünnblättriges, 4. ♀. f. Sibirien.
 Ptychosperma gracilis LaBill., v. *Seafforthia gracilis*.
- Ptychotis** K., DC., Faltendolde.
anethifolia DC. (= *Athamanta anethifolia* Wall. = *Pim-*
pinella anethifolia Don), dillblättrige, ☉. f. Nepal.
coptica DC. (= *Ammi copticum* L. = *Bunium copti-*
cum Spgl. = *Daucus copticus* P. = *Trachyspermum*

Ptychotis

copticum Lk., Enum., p. 814), coptische, ☉. f. Aegypten.

β) *Seseli-ammoides* Jacq. (= *Seseli foeniculifolium* Poir. = *Sison Ammi* Lam.).

heterophylla K. (= *Bunius* Rchb. = *Aethusa Bunius* Rchb. = *A. montana* Lam. = *Carum Bunius* Jacq. = *Critamus heterophyllus* DC. = *C. saxifragus* Rchb. = *Ligusticum Bunius* Lk. = *Meum Bunius* Loud. = *M. heterophyllum* Mch. = *Pimpinella genevensis* Vill. = *Seseli Bunius* Vill. = *S. saxifragum* L. = *Sison divaricatum* Spgl. ex parte, = *Sium saxifragum* Roth).

verticillata Duby, (= *ammoides* K. = *Ammi Matthioli* Auct. = *Seseli ammoides* Gouan, = *S. corsicum* Lk. = *S. pusillum* Brotero, = *S. Turbith* Tenore, = *S. verticillatum* Dsf. = *Sison Ammi* Ucria), p. 666.

Pugionium G., Dolchfrucht, V. II. (XV. I.), Atripliceae s. Chenopodeae A. v. Bunge, (Cruciferae s. Tetradyndamae Lomentaceae Auct.).

cornutum G. (= *Bunius cornuta* L.), gehörnte, ☉. f. Orient.

Pulegium cervinum Mill., *erectum* Mill., *vulgare* Mill., v. *Mentha cervina* et *Pulegium*, p. 510.

Pulicaria G., Flöhalant.

arabica Cass. (= *villosa* Lk. = *Inula arabica* L. = *I. villosa* Vahl), arabischer, ☉. f. Nordafrika, Creta, Spanien.

calycina Presl, (= ? *odora* Rchb. var. = *Inula calycina* Spgl. = ? *I. conyzoides* Dsf. = *I. montana* Bivone, non L.), kelchiger, 4. f. Sicilien.

hydrabadensis Lindl. (= *Aster hydrabadensis* Wall.), ostindischer, ☉. f. Ostindien.

undulata DC. (= *Inula crispa* Sbr. = *I. undulata* L.).

vulgaris G. (= *germanica* Presl, = *Aster Pulicaria* Scopol. = *Inula cylindrica* Hall., Wither. = *I. Pulicaria* L. = *I. uliginosa* Sibth., non Stev.).

viscosa Lk. p. 666 ist zu streichen.

annua G. (= *bellidiflora* Wallr.), v. *Stenactis annua*, p. 786.

Pulmonaria T., Lungenkraut.

angustifolia L. (= *montana* Lejeune, = *tuberosa* Schrank).
officinalis L., α) albo maculata, β) immaculata.

Nicht hinlänglich bekannte Arten: *alpina* Mill., *pendula* Hort., *undulata* Lavy.

amoena Stev. (= *dahurica* Fisch. = *gracilis* W.),
denticulata R. et S. (= *sibirica* Pursh), *lanceolata* Pursh, (= *marginata* Nutt.), *maritima* L., *paniculata* Ait. (= *elegans* Hort.) etc., v. *Mertensia dahurica*, *denticulata* etc., p. 399 et p. 400, II.

Pulsatilla Bauh., T., Mill., Küchenschelle.

alpina de l'Arbre, (= *alba* Rchb. = *Anemone alpina* L.),
β) *A. apiifolia* Wulf., Hoppe, (= *Anemone sulphurea* Auct.),
γ) *Burseriana* Rchb. (= *Anemone Burseriana* Scop. = *A. millefoliata* Bert. = *A. myrrhidifolia* Vill.),
δ) *micrantha* Sweet, ε) *grandiflora* Hoppe.

ambigua Turcz., zweifelhafte, 4. f. Sibirien.

Bogenhardiana Rchb. (= *montana* Wirtgen, nec Hoppe, = *acutipetala* Schlchr. = *tenuifolia* Schlchr., nec Spgl. = *vulgaris* Mill. = v. fl. violaceo Botanic. gall.

Pulsatilla

= *v. media* Bogenh.), Bogenhard's, 4. f. Westdeutschland, Frankreich.

β) *laciniata* Bogenh.

Bungeana Ledeb., Bunge's, 4. f. Alt. Sibirien.

chinensis Bunge (non Hort.), chinesische, 4. k. f. b. China.

flavescens Zuccar., gelbliche, 4. f. Sibirien.

Halleri W. (= *Anemone Halleri* All.), α) villosissima Pritz., β) bohémica Pritz. (= *Hackelii* Pohl, = *Halleri* Presl, Tausch, = *hybrida* Mikau, = *Anemone Hackelii* Pohl, = *A. patens* Hoppe, Sturm.), γ) auricoma Pritz. (= *Hackelii* Rchb.), δ) styriaca Pritz., ? ε) Wolfgangiana Besser.

intermedia Fisch., mittlere, 4. f. Sibirien.

montana Rchb. (= *Anemone intermedia* Hoppe, = *A. montana* Hoppe, = *A. Pulsatilla nutans* Gaud.), Berg-K., 4. f. Südeuropa.

Nuttalliana Spgl. (= *Anemone ludoviciana* Nutt. = *A. Nuttalliana* DC. = *A. patens* L. var.? = *Clematis hirsutissima* Pursh).

patens Mill. (= *Anemone longipetala* Schleich. = *A. patens* L.), α) patenti-pratensis Lasch, β) subintermedia Lasch, γ) flaccida Lasch, δ) multifida Pritz. (Sibiria), ε) elongata Pritz., ζ) ochroleuca Bot. mag.

pratensis Mill. (= *nigricans* Stoerk. = *Anemone pratensis* L.), α) affinis Lasch, β) cylindriflora Pritz., γ) patula Pritz., δ) minor Pritz. (= *intermedia* Schult., non Hoppe, Hornsch., nec Fisch.), ε) chlorantha Pritz. (= *helleboriflora* Richt.), ζ) alba Tausch., θ) sulphurea Tausch., ι) multiplex Tausch.

vernalis Mill. (= *Anemone sulphurea* All. = *A. vernalis* L.), α) vulgari-vernalis Rchb., β) patenti-vernalis Lasch, (= *intermedia* Lasch, nec Hoppe, Hornsch.), γ) vernalipratensis Lasch, δ) propinqua Lasch.

vulgaris Mill. (= *Anemone collina* Salisb.).

Unbestimmtere: grandis Wender., obsoleta Sweet, (= ? *pratensis* Mill. var.?)

Pultenaea Sm., Pultenaea.

aciphylla Benth., spitzblättrige, ꝥ. t. Neuholland.

baeckeoides Cunningh., bäckeähnliche, ꝥ. t. Neuholland.

biloba RBr., β) scabra RBr.

brachytropis Benth., kurzkielige, ꝥ. t. Neuholland.

Brunonis Benth., Brown's, ꝥ. t. Neuholland.

cordifolia Hook. (= *cordata* Grah.).

cuneata Benth., keilblättrige, ꝥ. t. Neuholland.

elliptica Sm. (= *tuberculata* P.).

ericaefolia Benth., heideblättrige, ꝥ. t. Neuholland.

eriophora Lodd., wolltragende, ꝥ. t. Neuholland.

fasciculata Benth., büschelförmige, ꝥ. t. Van Diemens Land.

foliolosa Cunningh., blattreiche, ꝥ. t. Neucambria.

Gunnii Benth., Gunn's, ꝥ. t. Van Diemens Land.

lanata Cunn. (non Sieb.), wollige, ꝥ. t. Neucambria.

laxa Kunze, lockere, ꝥ. t. Neuholland.

linophylla Sm. (= *glaucescens* Sbr.), β) amoena Sieb.

mollis Lindl., weiche, ꝥ. t. Neuholland.

montana Lindl., Berg-P., ꝥ. t. Neuholland.

mucronata Lodd., stachelspitzige, ꝥ. t. Neuholland.

myrtoides Cunn., myrtenähnliche, ꝥ. t. Neuholland.

parviflora Sieb. (= *stenophylla* Cunningh.).

peduncularis Hook., langstielige, ꝥ. t. Neuholland.

Pultenaea

- petiolaris Cunn., stielblättrige, ⚥. t. Neucambria.
 setigera Cunn., borstentragende, ⚥. t. Neuholland.
 stipularis Sm. (= *proteoides* Sbr. = *psoraleoides* Sbr.).
 styphelioides Cunn., styphelienähnliche, ⚥. t. Neuholland.
 Sweetii G. Don, (= *flexilis* Sweet, non Sm.), Sweet's,
 ⚥. t. Neuholland.

uncinata Benth., hakiggekrümmte, ⚥. t. Neuholland.

Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch folgende: *aloppecuroides*, *nana*, *obtusa*, *ovata*, *sericea*, *spathulata*, *tenuissima*.

aspera Sbr., *comosa* Sbr., *phylicoides* Sbr., *squarrosa* Sbr., v. *Phyllota aspera*, *comosa* etc., p. 520, II., *euchila* DC., v. *Spadostyles Sieberi*, *juncea* W. (= *denudata* W.), v. *Viminaria denudata*, p. 849, *villosa* Andr., v. *Aotus villosa*, p. 40, II.

Punica T., Granatum L., b) *grandiflora* Hort., c) *multiflora* Hort.

Pupalia Mart., Pupalie, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.
densiflora Mart. (= *Desmochaeta achyranthoides* H. B. K. = *D. densiflora* H. B. K. = *D. uncinata* W.), dichtblumige, 4. w. Südamerika.

prostrata Mart. (= *Achyranthes prostrata* R. et S. = *Cyathula geniculata* Lour. = *C. prostrata* Blume, = *Desmochaeta prostrata* DC.), gestreckte, 4. w. Ostindien.

Puschkinia Adams, Puschkinie.

?*dubia* Kunth, (= *Hyacinthus spicatus* Sm., Lindl.), zweifelhafte, 4. Zw. f. b. Griechenland.

libanotica Zuccar., libanonische, 4. Zw. f. b. k. Libanon.

Putoria P., DC., Stinkröthe, IV. 1., Rubiaceae.

calabrica P. (= *Asperula calabrica* L. fil. = *Ernodeu montana* Sibth., Sm. = *Lonicera sicula* Ucria, = *Pavetta foetidissima* Cyril. = *Sherardia foetida* Lam.), calabrische, ⚥. k. Calabrien, Creta, Syrien.

Putranjiva Wall., (? ostindischer Name), IV. 1. (XXII. iv.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

Roxburghii Wall. (= *Nageja ?Putranjiva* Roxb., Hamilt. p. 539), Roxburgh's, ⚥. w. Ostindien.

Putterlickia Endl., (Putterlick, östreich. Botaniker), V. 1., Celastrineae.

pyracantha Endl. (= *Celastrus pyracanthus* L. = *C. bullatus* Hort. = *C. Colpoon* Hort. = *C. octogonus* Hort.), rothdornige, ⚥. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Puya Molin., Puya, (einheimischer Name), VI. 1., Bromeliaceae.

Altensteinii Lk., Kl. (= *Pitcairnia Altensteinii* Schweidw.), Altenstein's, 4. w. Caracas.

Bonplandiana Schult. (= *Pitcairnia furfuracea* W. = *P. pyramidata* Lk, = *Pourretia Bonplandiana* Dietr. = *P. pyramidata* H. B. K.).

chilensis Molina, (= *suberosa* Molina, = *Pitcairnia chilensis* Lodd., p. 630, = *P. coarctata* P. = *Pourretia coarctata* R. et P.), chilesische, 4. w. Chili.

coerulea Steud. (= *Pourretia coerulea* Miers), blaue, 4. w. Chili.

heterophylla Hort. belg., verschiedenblättrige, 4. w. Südam.

lanata Schult. (= *Bromelia lasiantha* W. = *Pitcairnia lanata* Dietr. = *Pourretia lanata* H. B. K.), wollblumige, 4. w. Peru.

Puya

lanuginosa Schult. (= *Pitcairnia crystallina* P. =

Pourretia lanuginosa R. et P.), wollige, 4. w. Südamer.

pyramidata Schult. (= *Pitcairnia pyramidata* P. =

Pourretia pyramidata R. et P.), pyramidenförmige,
4. w. Peru.

recurva Hort. belg., zurückgekrümmte, 4. w. Südamer.

rubricaulis Steud. (= *Pourretia rubricaulis* Miers), roth-
stengelige, 4. w. Chili.

saxatilis Mart., v. *Encholirium spectabile*, p. 221, II.

Pycnanthemum Mchx., Ballblume.

aristatum Mchx. (= *verticillatum* Pursh, = *Origanum*
clinopodioides Walt.).

arkansanum Fresen., arkansanische, 4. f. Nordamerika.

hyssopifolium Benth. (= *aristatum* Pursh, = *setosum*
Nutt.), ysopblättrige, 4. f. Nordamerika.

lanceolatum Pursh, α) latifolium Benth. (= *verticilla-*

tum P. = *Brachystemum verticillatum* Mchx. =

Thymus verticillatus Poir.), β) angustifolium Benth.

(= *virginicum* P. = *Brachystemum lanceolatum* W.

= *B. virginicum* Mchx. = *Nepeta virginica* W. =

Thymus lanceolatus Poir.).

linifolium Pursh, (= ? *tenuifolium* Schrad. = *Brachy-*

stemum linifolium W. Enum. = *Koellia capitata*

Mch. = *Origanum flexuosum* Walt. = *O. lineare*

Hort. = *Thymus virginicus* L.).

Loomisii Nutt., Loomis's, 4. f. Nordamerika.

muticum P. (= *pilosum* Nutt. = *Brachystemum muti-*

cum Mchx. = *Satureja virginiana* L. = *Thymus*

serratus Poir.), unbewehrte, 4. f. Nordamerika.

ovatum West., Sweet, eiförmige, 4. f. Nordamerika.

Torreyi Benth. (= *virginicum* Nutt.), Torrey's, 4. f.
Nordamerika.

Tullia Benth. (= *Tullia pycnanthemoides* Leavenw.),

Tullia-B., 4. f. Nordamerika.

Pycnocephalum DC., Balkköpfchen, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

plantaginifolium DC. (= *Vernonia plantaginifolia* Less.),

wegetrittblättriges, 4. t. w. Brasilien.

spathulaefolium DC. (= *Vernonia montevidensis* Hort.

= *V. spathulaefolia* Mart.), spatelblättriges, 4. t.

w. Brasilien.

Pycnocomma rutaefolium Hffg., Lk., v. *Scabiosa ur-*
ceolata, p. 728.

Pycnomon Adans., Cass. (= *Picnomon* Auct.), Balldistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

Acarna Cass. (= *Carduus Acarna* L. = *Carlina Acarna*

MB. = *Carthamus canescens* Lam. = *Cirsium Acarna*

Mch. = *Cnicus Acarna* L.), grauliche, \odot . f. Süd-

und Westeuropa, Orient.

Pycreus P. B., *flavescens* Rchb. etc., v. *Cyperus fla-*
vescens etc.

Pyrethrum Hall., G., Bertramwurz.

arvense Salzm. (= *tingitanum* Hort. = *Chrysanthemum*

praecox Hort. = *Ch. tingitanum* Bernh. = *Phala-*

crodiscus arvensis Fisch. et Mey., p. 612).

chiliophyllum Fisch. et Mey. (= *Achillea pauciflora*

W. herb.), zahnblättrige, 4. f. Caucasus.

conicum Less., kegelförmige, \odot . f. Asiat. Rufsländ.

defloratum Engelm., blüthenarme, \odot . f. Nordamerika.

Pyrethrum

- elongatum Fisch. et Mey., verlängerte, 4. f. Persien.
 indicum Cass. (= *Arctotis elegans* Cass. = *Chrysanthemum indicum* L. = *Ch. japonicum* Thbg. =
 ? *Ch. procumbens* Lour. = *Ch. purpureum* P. =
Ch. tripartitum Sweet).
 Kirilowii Turcz., Kirilow's, ☉. f. Baical.
 macrophyllum W. (= ? *Achillea* Wendl. = ? *hybridum*
 Wender. = *Achillea macrophylla* Pill. et Mitterb.,
 non L. = *A. sambucifolia* Dsf. = *A. sambucina*
 Thouin, = *Chrysanthemum macrophyllum* W. K. =
Gymnocline leucocephala Cass. = *G. macrophylla*
 Bluff et Fingerh).
 multicaule W. (= *Chrysanthemum multicaule* Dsf.), viel-
 stengelige, 4. f. b. k. Nordafrika.
 myriophyllum C. A. Mey. (= β *Achillea bipinnata* L.
 = *Tanacetum myriophyllum* W. = *T. setaceum*
 Tausch), vielblättrige, 4. f. Caucasus.
 pulchrum Ledeb., schöne, 4. f. Altaisches Sibirien.
 pulverulentum Lagasca, (= *Chrysanthemum minimum*
 Brot. = *Ch. pallens* Lam. = *Ch. pallidum* Lag.,
 Mill. = *Ch. pulverulentum* P. = *Matricaria minima*
 β Lam. = *M. pallida* Poir.).
 sinense DC. (= *Anthemis artemisiaefolia* DC. = *A.*
grandiflora DC. = *A. stipulacea* Mch. = *Chrysanthemum indicum* Thbg., Lour., non L. = *Ch. sinense*
 Sabin.). Gartenvarietäten: album semiduplex,
 atropurpureum, aurantiacum, aureum, bicolor, blandum,
 chryseides, chrysocomum, cupreum, discolor,
 expansum, fasciculatum, flammeum, fulvescens, fulvum,
 involutum, leucanthum, lilacinum, mutabile, ornatum,
 pallens, pallidum, papyraceum, parvulum, Parkii, pur-
 purascens, purpureum, Sabini, salmoneum, serotinum,
 stellatum, stramineum, sulphureum, superbum, tessellatum,
 tubulosum, variabile, verecundum, versicolor,
 Waratah. Andere vergl. p. 670.
 tanacetoides DC. (= *incanum* Ledeb. = *millefoliatum*
 Ledeb., non W.), rainfarnähnliche, 4. f. Alt. Sibirien.
 Tanacetum DC. (= *Balsamita major* Dsf. = *B. suaveolens*
 Dsf. = *B. vulgaris* W., p. 110, = *Chrysanthemum apetalum*
 Hort. = ? *Matricaria apetalum* Hort. = *Tanacetum Balsamita*
 L.), Rainfarn-B., 4. f. Südeuropa.
 trifurcatum W. (= *Chrysanthemum macrocephalum* Viv.
 = *Ch. trifurcatum* Dsf.).
 uliginosum W. K. (= *Chrysanthemum uliginosum* P. =
Matricaria inciso-serrata Poir.).
 uniflorum Fisch. et Mey. (= ? *orientale* W.), einblu-
 mige, 4. f. Persien.
 Unbestimmtere: heterospermum Brotero, lusitanicum
 Brotero, Maundianum Hort.
adauctum Lk. et Broussonetii β Chois. (= *grandiflorum*
 W. = *pinnatifidum* Chois. = *speciosum*
 W. = *coronopifolium* W. etc.), v. *Chrysanthemum*
grandiflorum var. p. 193 et p. 141, II., *breviradiatum*
 Hort. (= *indicum* Roxb. = *senecioides* Dun.),
 v. *Chrysanthemum Roxburghii*, p. 193, *inodorum*
 Sm., *praecox* MB., v. *Chamomilla inodora* et *praecox*,
 p. 136, II., *ceratophylloides* W., *latifolium* W.
 Enum. (= *maximum* Hffg.), v. *Chrysanthemum*

Pyrethrum

Sect. II. *latifolium*, p. 193, *chrysanthemifolium* Hort. anglor., v. *Anthemis parthenioides* Nachlese.

Pyrethrum Acmella Medic., *Spilanthus* Medic., v. *Spilanthes Pseudacmella* et oleracea, p. 778.

Pyrgosea Haw. (= *Purgosea* Sweet, = *Purgosia* Loud. = *Turgosea* Haw. = *Turgosia* Loud.), Dickblatt, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

aloides Haw. (= *Crassula aloidea* Ait.), aloähnliches, ♂. k. t. Südafrika.

capitellata Haw. (= *Crassula capitella* L. fil. = *Crassula capitellata* DC.), kopfförmiges, ☉. ♂. f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

corymbosula Loud. (= *pertusa* Haw. = *Aloe pertusa* Haw. = *Crassula corymbosula* Lk.), doldentraubiges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

linguaefolia Haw. (= *Crassula linguaefolia* Haw. = *C. tomentosa* L. var.? Haw.), zungenblättriges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

obovata Haw. (= *Crassula obovata* Haw.), verkehrteiförmiges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

sediflora Eckl., Zeyh. (= *Crassula sediflora* D. Dietr.), mauerpfefferähnliches, ♀. ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

thyrsiflora Haw. (= *Crassula thyrsiflora* L. fil. = *Orostachys thyrsiflora* Fisch.), straußblumiges, ♂. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tomentosa Haw. (= *Crassula tomentosa* L. fil. = *Sphaeritis tomentosa* Eckl., Zeyh.), filziges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Turrita Haw. (= *Crassula Turrita* Thbg.), thurmkrautartiges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Pyrola T., Wintergrün.

I. Genuina.

dentata Sm., gezahntes, ♀. f. b. Nordamerika.

elliptica Nutt. (= *reticulata* Rafin.).

secunda L., β) *hybrida* Vill.

II. *Chimophila* Pursh, Nutt. (= *Chimaphila* Auct.).

Menziesii RBr., *Menzies's*, ♀. f. b. Nordamerika.

Pyrolirion Herb., Flammenlilie, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

aureum Herb. (= *Amaryllis aurea* R. et P. = *A. peruviana* Lam., Ker, = *A. tubiflora* L'Herit.), goldfarbige, ♀. Zw. w. Peru.

flammeum Herb. (= *Amaryllis flammea* R. et P., p. 44).

flavum Herb. (= *aureum* Bot. reg. = *Amaryllis flava* R. et P.), hellgelbe, ♀. Zw. w. Peru.

tataricum Herb., v. *Ixiolirion Pallasii* Fisch., p. 327, II.

Pyrrhopappus DC., Flammenfederchen, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

carolinianus DC. (= *Barckhausia caroliniana* Nutt. = *Chondrilla laevigata* Pursh, = *Leontodon carolinianus* Walt. = *Scorzonera pinnatifida* Mchx.), carolinisches, ♀. f. Nordamerika.

Pyrus T., L., Birne, Apfel.

I. *Pyrophorum* Neck. DC.

amygdaliformis Vill. (= *communis* Gou. = *cuneifolia* Guss. = *elaeagnifolia* Pall. var. Spgl. = *nivalis* Lindl. = *salicifolia* Loisel., non L.).

Pyrus

communis L. (= *Achras* G. = *Pyraster* Hort. = *sylvestris* Mch. = *Sorbus Pyrus* Crtz.). Var.: *pompejana* Hort., *favoria* Hort., *valerna* Hort., *sinensis* Hort. (non Lindl.), *liquescens* Hort., *rufescens* Hort., *pyramidalis* Hort. etc., vergl. p. 671.

crenata D. Don, (= *vestita* Wall.).

dasyphylla Borckh. (= *Pollveria* Lejeun., non L. = *communis* L. var. β *tomentosa* K. = *upsaliensis* Hort.), rauchblättrige, \S . f. Siebenbürgen, Belgien.

elaeagnifolia Pall. (= *nivalis* Pall. = *orientalis* Hornem. = *persica* P. = *salicifolia* Habl.).

eriopleura Rchb. (= *parviflora* Welden), wollrippige, \S . f. Dalmatien.

Michauxii Bosc, (= *sinaica* Guimp. et Heyn., non Thouin).

nepalensis Lodd., nepalsche, \S . f. b. k. Nepal.

Pollveria L. (= *Bollwylleriana* DC. = *irregularis* Münchh., DuRoi, = *Pollvilleria* Hort. = *tomentosa* Mch. = *Lazarolus Pollvilleriana* Borckh.).

II. *Malus* T., Apfel.

angustifolia DC. (= *coronaria* Wangenh., non L. = *sempervirens* Dsf.).

baccata L. (= *microcarpa* Wendl., Mch. = *Malus sibirica* Borckh. = *Mespilus baccata* Dum.Cours.).

β) *hyemalis*, γ) *major*, δ) *pyriformis*, ϵ) *xanthocarpa*.

cerasifera Tausch, (= *Malus baccata* Loisel., Duham., non Dsf. = *Malus prunifolia* Dsf., non W.), kirschen-tragender, \S . f. Sibirien.

Fontanesiana Spach, (= ? *M. astracanicum* Dum.Cours. = *M. hybrida* Dsf., non Lois.), Desfontaine's, \S . f. ?

heterophylla Spach, verschiedenblättriger, \S . f. ?

Malus L. (= *M. communis* Dsf. = *M. sylvestris* Mill., Mch. = *Sorbus Malus* Crtz.), α) *mitis* Wallr. (pommier à couteau), β) *austera* Wallr. (pommier à cidre), γ) *paradisiaca* Hort. (= *praecox* Pall., Borckh. Hort. = *pumila* Mill., Hort.), δ) *prasonila* Hort., ϵ) *rubelliana* Hort., ζ) *cestiana* Hort., η) *cavillea* Hort., θ) *epirotica* Hort., ι) *apiosa* Hort., κ) *sinensis* Hort., λ) *upsaliensis* Hort.

prunifolia W., γ) *major* Hort., δ) *xanthocarpa* Hort.

spectabilis Ait. (= *Malus sinensis* Dum.Cours. = *Mespilus spectabilis* Hort.), β) *flore pleno*.

tomentosa Dum.Dours., DC., filziger, \S . f. Sibirien.

Unbestimmtere: *canescens* Spach, *ceratocarpa* Wender., *florentina* Tozzetti, *glutinosa* Madiot, *graeca* Hort., *malifolia* Spach, *oblongifolia* Spach, *pennsylvanica* Fisch., *sphaerocarpa* Wender., *suaveolens* Wender.

Bartramiana Tausch, (= *Aronia praecox* Neum.),

Neumanniana Tausch, (= *Aronia affinis* Neum.),

Wangenheimiana Tausch, (= *P. Botryapium* Wangenh. = *Aronia nivea* Neum.), v. Amelanchier Nachlese, hinsichtl. d. übrig. vergl. *Sorbus*, p. 772.

Pythagorea cochinchinensis Lour., v. *Blackwellia padifolia*, p. 124.

Pythagorea alata Rafin., *linearis* Rafin., *virgata* Rafin., v. *Lythrum alatum*, *lineare*, *virgatum*, p. 486.

Pythion campanulatum Mart., v. *Amorphophallus campanulatus*, p. 33, II.

Pythonium Schott, Endl., Kunth, Drachenstaude, XXI. IX., Aroideae.

Wallichianum Schott, (= *Thompsonia nepalensis* Wall.), Wallich's, 4. w. Nepal.

Hookeri Kunth, (= *Caladium petiolatum* Hook. bot. mag.), Hooker's, 4. w. Neuguinea.

Letztere wird von H. Prof. Kunth nur fraglich zu dieser Gattung gestellt.

bulbiferum Schott, Endl., v. *Amorphophallus bulbifer*, p. 33, II. (= *Arum bulbiferum* Roxb., p. 85).

Pyxipoma polyandra Fenzl, v. *Trianthema polyandra*.

Quadria heterophylla R. et P. (= *Avellana* G.), v. *Guevina Avellana*.

Qualea Aubl., *Qualea*.

coerulea Aubl., blaue, 5. w. Guiana.

grandiflora Mart., großblumige, 5. w. Brasilien.

macroptera Lk., A. Dietr., großflügelige, 5. w. Brasilien.

rosea Aubl. (= ? *violacea* Mart. et Zuccar.), rosafarbige, 5. w. Guiana, Brasilien.

Quamoclit T., Mch., Choisy, G. Don, *Quamoclit*winde, V. I., Convolvulaceae.

angulata Boj. (= *Convolvulus angulatus* Spgl. = *Ipomoea angulata* Lam. = *I. dentata* W.), kantige, ☉. Sch. w. Mascarenas, Madagascar.

coccinea Mch. (= *Q. cholulensis*, *dichotoma* et *Ruiziana* G. Don, = *Convolvulus coccineus* et *cholulensis* Spgl. = *C. indivisus* Vellozo, = *Ipomoea coccinea* L., p. 419, = *I. stylosa* Hort. Madrit. = *I. cholulensis* et *dichotoma* H. B. K. = *I. acuminata* et *angulata* R. et P. = *I. dubia* R. et S. = *I. mexicana* et *erythraea* Moç. et Sess.), scharlachfarbige, ☉. Sch. m. f. Mittägl. Amerika, Georgia, Carolina, Java, Ostind.

β) *luteola* G. Don, (= *Ipomoea luteola* Jacq., p. 429), Guatimala, γ) *pubescens* Choisy, Cham. et Schltld., Jalapa.

hederaefolia Choisy, G. Don, (= *hastigera* G. Don, = *pallescens* Auct. = *Convolvulus hederaefolius*, *hastigerus* et *sanguineus* Spgl. = *Exogonium curviflorum* Moç., Sess. = *Ipomoea hederaefolia* L., p. 419, = *I. sanguinea* Vahl, Ker, = *I. hastigera* H. B. K. = *I. Humboldtiana* R. et S. = *I. ? peduncularis* Bertol.), epheublätterige, ☉. Sch. m. f. Mexico, Brasilien, Guiana, Caribäen.

phoenicea Choisy, (= ? *Ipomoea angularis* W. = *I. phoenicea* Roxb., Wall. = *Convolvulus phoeniceus* Spgl.), hochrothe, ☉. Sch. w. m. f. Ostindien.

solanifolia Plum. (= *Convolvulus solanifolius* Spgl. = *Ipomoea solanifolia* L., non Burm., p. 421).

vitifolia G. Don, (= *globosa* G. Don, = *Calboa vitifolia* Cav. = *Macrostemma vitifolia* P. = *Exogonium umbellatum* Moç., Sess. = *Convolvulus Neei* Spgl. = *Ipomoea funis* ? Schltld. et Cham. = ? *Morenoa globosa* Llav. et Lex.), weinblätterige, ♂. ☉. Sch. w. m. f. Mexico.

vulgaris Choisy, (= *pinnata* Boj. = *Ipomoea Quamoclit* L., p. 420, = *Convolvulus pennatifolius* Salisb. = *C. pennatus* Lam. = *C. Quamoclit* Spgl.), gefiederte, ☉. Sch. w. m. Ostindien, Mascarenas, Südamerika etc.

Quamoclit

Q. acutangula Choisy, (= *Convolvulus acutangulus* Spgl. = *Ipomoea acutangula* R. et P.), Peru, mutica Choisy, (= ? *Ipomoea serotina* R. et P.), Peru, sagittaeifolia Choisy, (= *Ipomoea sagittaeifolia* Burm., non Pursh, Ker, = *I. hastata* L. mant. = *Convolvulus javanicus* Garc.), Java, scheinen nicht kultivirt zu werden. Als „species minus notae“ werden dieser Gattung von Choisy *Morenoa grandiflora* Llav. et Lex. et *globosa* (vergl. *Quamoclit vitifolia* Choisy) Llav. et Lex. zugeheilt. Vergl. p. 531.

leucantha G. Don, *triloba* G. Don, v. *Ipomoea leucantha et triloba*, p. 419 et 421, *longiflora* G. Don, v. *Calonyction speciosum* var. *a* p. 109, II., *Mina* G. Don, v. *Mina lobata*, p. 411, II., *serotina* G. Don, v. *Pharbitis* ? *serotina*, p. 509, II.

Quararibea turbinata Poir., v. *Myrodia turbinata*, p. 538.

Quercus T., L., Eiche.

acuminata Roxb. (= *glabra* Hamilt. herb.), zugespitzte, β . k. Ostindien.

acutifolia Nee, spitzblättrige, β . k. Neuspanien.

ambigua Humb. (non Mchx., W.), (= *Bonplandiana* Sw.).

Ballota Dsf. (= *Q. Ilex Brotero*).

β) *rotundifolia* Brotero.

calophylla Cham., Schltld., schönblättrige, β . k. Mexico.

castaneaefolia C.A.Mey., kastanienblättrige, β . f. Caucasus.

chrysophylla H. B. K., goldblättrige, β . k. t. Neuspanien.

conferta Kit., Schult. (= ? *glomerata* Lam.), gedrängte, Slavonien.

confertifolia H. B. K., gedrängtblumige, β . k. t. Neuspanien.

crassifolia H. B. K. (= *peduncularis* Nee, = *tomentosa* W.), dickblättrige, β . k. t. Neuspanien.

dilatata Lindl., Wall., verbreiterte, β . k. t. Ostindien.

Esculus L. (= *Secundati* P.).

exoniana Bosc, exonische, β . f. Nordamerika.

falcata Mchx. (= *discolor* Ait. ed. I. = *elongata* W.

= *rubra montana* Marsh.), sichelförmige, β . f. Nordam.

β) *triloba* Meh. (= *cuneata* Wangenh.).

gemelliflora Blume, (= ? *spicata* Auct., non Wall., nec H. B. K.), paarblumige, β . t. Java.

Ghisebrechtii Hort. belg., Ghisebrecht's, β . k. t. Mexico.

glaberrima Blume, kahlste, β . t. Java.

glabra Thbg., kahle, β . k. Japan.

glauca Thbg., blaugrüne, β . k. Japan.

hispanica Lam. (= *aequilopifolia* P. = *crenata* Lam.

= *exoniensis* Lodd. = *Lucombeana* Sweet, =

Pseudo-suber Dsf.), spanische, β . f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

humilis Lam. (= *Brossa* Bosc, = *fruticosa* Brotero, = *prasina* Bosc), niedrige, β . f. Spanien, Frankr.

insignis Hort. belg., ausgezeichnete, β . w. t. ? Ostindien.

Lezermiana Bosc, Poir. (= *Ilex* L. var. Spgl.), Lezermische, β . f. Südeuropa.

Lindleyana Wall., Lindley's, β . w. t. Ostindien.

lusitanica Lam. (= *australis* Lk. = *canariensis* W.

= *faginea* Lam. = *hybrida* Brotero, = *Ilex* L. var.

Spgl. = *infectoria* Oliv. = *Turneri* W. = *valentina* Cav.), portugiesische, β . f. b. k. Portugal, Spa-

nien, canarische Inseln, Kleinasien.

Quercus

- macranthera* Fisch. et Mey., großbeutelige, ♀. f. Caucasus.
macrophylla Nee, großblättrige, ♀. t. Neuspanien.
mexicana H. B. K. (= *callosa* Hort. belg.).
Michauxii Nutt. (= *bicolor* W. = *discolor* Lodd. = *Prinus discolor* Mchx. fil. = *P. tomentosa* Mchx.),
 Michaux's, ♀. f. Nordamerika.
 var. *b. pendula* (= *pannosa* Bosc).
mongolica Hort., mongolische, ♀. f. Mongolei.
nepaulensis Dsf., nepalsche, ♀. k. Nepaul.
obovata Bunge, verkehrteiförmige, ♀. f. China.
pendulina Kit., Schult., überhängende, ♀. f. Ungarn.
petiolaris Benth., gestielte, ♀. t. k. Mexico.
Phellos L., β) *brevifolia* Lam. (= *humilis* Wangenh.).
prasina P. (= *glauca* Bosc, = *pseudococcifera* Dsf.
 var. ? P.), lauchgrüne, ♀. f. b. k. Spanien.
Prinus L. (= *platanoides* Lam.).
Pseudo-coccifera Dsf. (= *coccifera* L. var. Spgl.), un-
 ächte Kermes-E., ♀. k. f. b. Süd- und Westeuropa,
 Nordafrika.
pubescens W. (= *hungarica* et *pannonica* Hort.).
repanda H. B. K., ausgeschweifte, ♀. t. k. Neuspanien.
Robur L. suec. (= *sessiliflora* Sm.), e) *subintegra*,
 f) *variegata*.
rotundifolia Lam. (= *Ilex* L. var. Gmel. Spgl.), rund-
 blättrige, ♀. k. f. b. Spanien.
rugosa Nee, runzelige, ♀. t. k. Neuspanien.
salicifolia Nee, weidenblättrige, ♀. t. k. Neuspanien.
Sideroxylon H. B. K., Eisenholz-E., ♀. t. k. Neuspanien.
spicata H. B. K. (= *Bonplandiana* Sweet).
squamata Roxb. (= *spicata* Wall., non H. B. K.),
 schuppige, ♀. t. k. Nepal.
sublobata Kit., Schult. (= ? *Robur platyphylla* Lam.),
 fastgelappte, ♀. Ungarn.
Tauzin P. (= *Cerris* γ DC. = *crinita* ϵ Lam. = *humi-*
 lis Bosc, = *nigra* Thore, = *pubescens* Brotero, non
 W. = *pyrenaica* W. = *stolonifera* Lapeyr. = *Tauza*
 Dsf. = *Toza* Bosc), mähnige, ♀. f. Frankr., Spanien.
Tournefortii W. (= *Cerris* Oliv. = *crinita* Oliv.,
 Sibth., Sm. = *haliphleos* Bosc), Tournefort's, ♀. f.
 Armenien, Griechenland.
undulata Torrey, wellenblättrige, ♀. f. Nordamerika.
villosa Walt., zottige, ♀. f. Carolina.
virens Ait. (= *obtusifolia* Lam. = *Phellos* β L. =
 sempervirens Walt. = *virginiana* Mill.).
xalapensis H. B. K., xalapa'sche, ♀. t. k. Mexico.

Außer diesen führen die Pflanzen-Cataloge der belgi-
 schen Gärten noch eine *castaneifolia* du Mexique
 (= *dealbata* Hort.) und *Skinneri* auf, wahrscheinlich
 letztere auch in Mexico heimisch.

Unbestimmtere: *abelicea* Lam., *candida* Hort., *expansa*
 Poir. (= *Ilex* L. var. Spgl.), *lobulata* Sm. Nord-
 amerika, *paleacea* Desv., *Phellodrys* Lk.

Queria L., Querie, p. 674.

- chilensis* Steud. et Hochst. (= *Donatia fascicularis*
 Bertero), chilesische, ♂. f. Chili.
hispanica L. (= *Alsine hispanica* Fenzl).
 canadensis L., *capillacea* Nutt., v. *Paronychia dichot-*
 toma et β *capillacea*, p. 477, II.

Quillaia Molina, (? einheimischer Name), XI. 1v.,
Rosaceae.

Smegmadermos DC. (= *Q. Saponaria* Poir. = *Smegmadermos emarginata* R. et P. = *Smegmaria emarginata* W.), seifegebende, h. t. Chili.

Quinaria Lancium Lour., v. *Cookia punctata*.

Quisqualis L., Röhrenkelch.

sinensis Lindl. (= ? *indica* Lour.), indischer, h. Sch. w. China.

villosa Roxb. (= *indica* L. var. W. A.), zottiger, h. Sch. w. Pegu.

Quivisia Commers., Quivisie.

oppositifolia Cav. (= *Gilbertia oppositifolia* W.), gegenblättrige, h. w. Mascarenas.

ovata Cav. (= *heterophylla* Sieb. = *Gilbertia ovata* W. = *G. rutilans* Sm.), eiförmige, h. w. Mascarenas.

racemosa P. (= *decandra* Cav. = *Gilbertia decandra* W.), traubige, h. w. Mascarenas.

Radicula Hall., Mch., *lancifolia* Mch., *palustris* Mch., *pinnata* Mch., v. *Nasturtium amphibium*, palustre, sylvestre, p. 543.

Radiusia Rchb. (Dr. Radius, Prof. d. Medicin zu Leipzig), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides Rchb., Endl. (= *Pseudosophora alopecuroides* Sweet, = *Sophora alopecuroides* L., p. 772, = *S. albicans* Jaum.).

chinensis * (= *Sophora chinensis* Lodd.), chinesische, 4. h. f. b. China.

flavescens Endl. (= *Sophora flavescens* Ait., p. 772, = *S. glabra* Mch. = *S. macrosperma* Jaum.).

galegoides * (= *Sophora galegoides* Pall. = *S. flavescens* β DC.).

sericea * (= *Sophora sericea* Nutt., p. 772, non Andr. et Jaum. = *Astragalus carnosus* Pursh, non Nutt. = *Pseudosophora sericea* Sweet).

Rafnia Thbg., Rafnie.

cordata Mart. (= ? *Hallia cordata* Thbg.).

filifolia Thbg. (= *angulata* γ E. Mey.), fadenblättrige, h. t. Cap d. g. Hoffn.

triflora Thbg. (= *diffusa* Eckl., Zeyh. = *intermedia* Vogel, = *Borbonia cordata* Andr. = *B. triflora* Hort. = *Crotalaria triflora* L.).

Ramondia Rich., p. 675, Cyrtandraceae DC.

pyrenaica Rich. (= *R. Myconi* Rchb. = *scapigera* St. Hil. = *Chaixia Myconi* Lapeyr. = *Myconia boraginea* Lapeyr. = *M. pyrenaica* Auct. = *Verbascum Myconi* L.).

Rancagua Poepp. et Endl., Rancagua, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

Bridgesii Poepp., Endl. (= *Lasthenia Bridgesii* Steud. = *L. obtusifolia* β *Bridgesii* DC.), Bridges's, \odot . f. Chili.

Feuillei Poepp., Endl. (= *Lasthenia obtusifolia* Cass. = *Tagetes Feuillei* Bertero, Colla), Feuillée's, \odot . f. Chili.

Randia L., Randie.

aculeata L. (= *latifolia* Lam. = *Gardenia aculeata* Ait. = *G. lycioides* Hort. = *G. Randia* Sw.), β)
mitis L. (= *Gardenia Randia* β *mitis* Sw.).

Randia

armata DC. (= ? *Foscarenia spinosa* Vand. = *Gardenia armata* Sw. = *G. tetracantha* Lam., non Cav. = *Mussaenda spinosa* L.), bewaffnete, ⚔. w. Ostindien.

capitata DC., kopfförmige, ⚔. w. Mexico.

dumetorum Lam. (= *spinosa* Blume, = *Canthium coronatum* Lam. = *Ceriscus malabaricus* G. = *Gardenia dumetorum* Retz, = *G. spinosa* L. fil. = *Posoqueria dumetorum* Roxb.), Hecken-R., ⚔. w. Ostindien.

longiflora Lam. (= ? *sinensis* R. et S. = *Gardenia multiflora* W. = *Posoqueria longiflora* Roxb. = *P. multiflora* Blume).

longispina DC. (= *Gardenia longispina* Speg. = *Posoqueria longispina* Roxb.), langdornige, ⚔. w. Ostindien.

Mussaenda DC. (= *Gardenia maritima* Vahl, = *G. Mussaenda* L. = *Mussaenda formosa* Jacq.), Mussaenda-R., ⚔. w. Südamerika.

nutans Roxb. (= ? *Ceriscus malabaricus* G. = *Gardenia nutans* Speg. = *Posoqueria nutans* Roxb.), nickende, ⚔. w. Ostindien.

obovata H. B. K. (non R. et S.), verkehrteiförmige, ⚔. w. Neugranada.

oxypetala Lindl., spitzkronige, ⚔. w. Ostindien (Saharumpur).

parviflora Lam. (= ? *Gardenia micrantha* Thbg. = *G. Sonneratii* Speg.).

propinqua G. Don, (= *Gardenia propinqua* Lindl.), verwandte, ⚔. w. ?

pubescens R. et P. (= *obovata* R. et P. = *Gardenia obovata* Dietr.), weichhaarige, ⚔. w. t. Peru.

rigida DC. (= *Gardenia spinosa* Thbg.), starre, ⚔. t. Nepal.

stricta Roxb. (= *Hyptianthera stricta* W. A. = *Macrocneum strictum* W. = *Rondeletia stricta* Roth), steife, ⚔. w. Bengalen.

tetracantha DC. (= *Gardenia armata* Bartl. = *G. tetracantha* Speg. = *Mussaenda tetracantha* Cav.), vierstachelige, ⚔. w. Südamerika.

uliginosa DC. (= *Gardenia uliginosa* Retz, = *Posoqueria uliginosa* Roxb.), sumpfliebende, ⚔. w. Coromandel.

malabarica Lam., v. *Griffithia fragrans*, p. 275, II., *racemosa* Roxb., v. *Petunga Roxburghii* Nachlese.

Ranunculus C. Bauh., T., Ranunkel.

I. *Batrachium* DC., Godron, Dumort., Wasser-ranunkel.

aquatilis L. (= *capillaris* Gater. = *diversifolius* Gilib., Schrk. = *heterophyllus* Hoffm.), β) *peltatus* Mch., Schrk., γ) *capillaceus* Thuill., Hoffm. (= *flaccidus* P. = *foeniculaceus* Gilib. = *pantothrix a capillaceus* DC. = *pectinatus* Duby, = *trichotomus* Chaix., Vill. = *tripartitus* Nolte, non DC.), δ) *paucistamineus* DC., ε) *Bauhini* Tausch).

Boudotii Godr., Boudot's, 4. Wa. f. Elsass, Lothringen.

divaricatus Schrk. (= *abrotanifolius* Auct. etc., p. 676).

β) *caespitosus* Thuill.

fluitans Lam., hederaceus L. (= *hederaefolius* Salisb.).

Lenormandii Schultz, (= *tripartitus* Lenorm., non DC.),

Lenormand's, 4. Wa. f. Frankreich, Spanien.

longirostris Godr., langschnäbelige, 4. Wa. f. Missouri.

Ranunculus

- marinus Fr., meerliebende, 4. Wa. f. Schweden.
 rigidus Godr. (non Hoffm.), starre, 4. Wa. f. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 tripartitus DC. (= *aquatilis* L. var. Spgl. = *hederaceus* β DC. syn.).
 II. Ranunculastrum DC. etc., Halnenfufs, Ranunkel.
 aconitifolius L., δ) platanifolius L. (= *palmatus* Murrith),
 ϵ) dealbatus Lapeyr.
 alpestris L. (= *crenatus* Baumg. = *mugellensis* Tenore).
 amoenus Ledeb., lieblicher, 4. f. Altaisches Sibirien.
 amplexicaulis L. (= *plantaginifolius* Salisb.).
 arachnoideus C. A. Mey., spinnwebiger, 4. f. Caucasus.
 belgicus Stoffels, Dumort., belgischer, 4. f. Belgien.
 (Wahrscheinlich Hybride von *graminifolius* und *platanifolius*).
 binatus Kit., zweizähliger, 4. f. Siebenbürgen.
 bonariensis Poir. (= *heterophyllus* Sm. = *phyteumae-*
folius Spgl. = *Casalea ficariaefolia* St. Hil.).
 bulbosus L. (= *flabellatus* Bivone, = *lactus* Salisb.).
 chinensis Bunge, chinesischer, 4. f. China.
 constantinopolitanus d'Urv. (= *lanuginosus* γ DC.), con-
 stantinopolitanischer, 4. f. Constantinopel.
 cortusaefolius W. (= *creticus* var. b. Biria, = *heuche-*
raefolius Presl, = *Teneriffae* P.).
 Cymbalariae Pursh, (= *hederaceus* Pall. = *nanus* Fisch.
 = *saxifragaefolius* Stephan.).
 flabellifolius Heuff., fächerblättriger, 4. f. Ungarn.
 glacialis L., γ) gelidus Hffg.
 Hornemanni Schltld. (= *tuberosus* Hornem., non Lapeyr.).
 insubricus Cesati, mailändischer, 4. f. Mailand.
 lasiocarpus C. A. Mey., wollfrüchtiger, 4. f. Alt. Sibirien.
 lateriflorus DC. (= *Nendtwichii* Frivald. = *nodiflorus*
 L. var. Spgl.), seitenblumiger, \odot . f. Orient.
 lomatocarpus Fisch. et Mey. (= *tuberculatus* C. A. Mey.).
 longicaulis C. A. Mey., langstengeliger, 4. f. Alt. Sibirien.
 major Dumort. (= *acris* L. var. ?), großer, 4. f.
 Belgien.
 montanus W. (= *nivalis* Jacq. = *polymorphus* Roch.),
 β) gracilis Schlchr. (= *tenuifolius* Schlchr.), γ)
 Gouani Auct. (= *trilobatus* Kit.).
 muricatus L. (= *lobatus* Mch.), δ) ventricosus Vent.
 neapolitanus Tenore, neapolitanischer, 4. f. Neapel.
 nepalensis Spgl. (= *nepaulensis* DC. = *trilobatus* Don),
 nepalscher, 4. f. b. k. Nepal.
 nitidus Mühlbg., Hook. (= *carolinianus* DC. = *septen-*
trionalis Pursh), glänzender, 4. f. Nordamerika.
 obtusifolius Hornem., stumpfblättriger, 4. f. Spanien.
 ophioglossifolius DC. (= *cochlearifolius* Hornem. =
cordifolius Bast. = *fistulosus* Brign. = *humilis* P.
 = *minus* Hortul. = *ophioglossoides* W. = *pusillus*
 Poir. = *telonensis* Robert), β) uliginosus Tenore.
 palustris L., Sm. (= *corsicus* DC.), Sumpf-R., 4. f.
 Orient, Corsica.
 pennsylvanicus L. (= *canadensis* Jacq. = *triflorus* Mch.).
 platyspermus Fisch., breitsaamiger, 4. f. Alt. Sibirien.
 propinquus C. A. Mey., verwandter, 4. f. Alt. Sibirien.
 pulchellus C. A. Mey., schöner, 4. f. Altaisch. Sibirien.
 radicans C. A. Mey. (= *Purshii* Hook.), starkwurzelnder,
 4. f. Altaisches Sibirien.

Ranunculus

rheoadifolius DC., klatschrosenblättriger, 4. k. Mogador.

Canarische Inseln.

salsuginosus Pall. (= *plantaginifolius* Murray, = *ruthe-
nicus* Jacq.).

segetalis Kit., Saat-H., ☉. f. Ungarn.

spicatus Dsf., ährenförmiger, 4. k. f. b. Portugal, Algier.

Thomasii Tenore, Thomas's, 4. f. Italien.

tomentosus Poir. (= *lanuginosus* var. Pursh, = *sani-
culaefolius* Mühlbg.), filziger, 4. f. Carolina.

trilobus Dsf. (= *ammoides* Pall. = *parviflorus* L. var.

Bivone, = *Rosani* Tenore, = *verrucosulus* Poir.).

tuberculatus Kit., C. A. Mey. (= *arvensis* L. var. Spgl.),

höckeriger, ☉. f. Ungarn, Caucasus, Taurien.

velutinus Tenore, samanthaariger, 4. f. Neapel.

Nicht hinlänglich bekannte: *depressus* Fisch., *fruticosus*

Hort., *triternatus* Sm. (= *Commersonii* Poir.).

Rapa Adans., Mill., *Napus* Mill., *oblonga* Mill.,

rotunda Mill., v. *Brassica Napus*, *Rapa*, oleracea,

p. 130.

Raphia P., Beauv., Nadelpalme, XXI. vi. (VI. iii.),
Palmae.

Ruffia Mart. (= *Metroxylon Ruffia* Spgl. = *Sagus
Ruffia* Jacq.), madagascarische, ♀. w. Madagascar.

vinifera P. Beauv. (= *Metroxylon viniferum* Spgl. =

Sagus Palma-Pinus G. = *S. Raphia* Poir. = *S.*

Ruffia β W. = *S. vinifera* P.), weingebende, ♀. w.

Südamerika.

Raphidophora Hassk., Nadelträger, XXI. ix., Aroideae.

lacera Hassk., schlitzblättriger, 4. ♀. w. Java. (Ob kult.?)

Raphiolepis Lindl., Hagestrauch.

japonica Sieb. et Zuccar., japanischer, ♀. ♀. k. Japan.

(Ob kultivirt?)

Mertensii Sieb. et Zuccar., Mertens's, ♀. ♀. k. Japan.

(Ob kultivirt?)

phaeostemon Lindl. (= *indica* Bot. reg., non Lindl. =

= *Loureiri* Spgl. = *Crataegus indica* Lour., non L.).

Raphisanthe lateritia Lilja, v. *Cajophora lateritia*,

p. 103, II.

Rapistrum Boerh., Rapsdotter.

clavatum DC. (= *Cakile clavata* Spgl. = *Myagrum
clavatum* Poir.), keulförmiger, ☉. f. Syrien.

hirtum Host, (= *rugosum* All. var. K.), rauhhaariger,

♂. f. Steyermark.

rugosum All., Berg. (= *hirsutum* Host, = *Arthrolobus*

rugosus Andrzy, = *Cakile rugosa* L'Her. = *Myagrum*

orientale Pall. = *M. rugosum* L.).

arvense All. (= *Raphanistrum* Crantz), v. *Rapha-*

nistrum arvense, *bursaefolium* Berg., v. *Calepina*

Corvini, *filiforme* Mch., *hispanicum* Medic. (= *sca-*

brum Mch.), v. *Crambe filiformis et hispanica*,

glandulosum Berg., v. *Laelia orientalis*, p. 340, II.,

maritimum Berg., v. *Cakile maritima*, *perfoliatum*

Berg., v. *Myagrum perfoliatum*.

Rapunculus Hall., Mill., Mch., *comosus* Mill., *hemi-*

sphaericus Mill. etc., v. *Phyteuma comosum*, *hemi-*

sphaericum etc.

Rapuntium Mill., *acuminatum* Presl, v. *Lobelia*,

Sect. XII. *Tupa acuminata*, p. 473, *amoenum* Presl

etc., v. *Lobelia amoena* etc.

Rauwolfia Plum., Rauwolfie.

canescens L. (= *hirsuta* Jacq. = *subpubescens* L.).

nitida L. (= *nitidissima* Jacq.).

psychotrioides H. B. K. (= ? *nitida* L. = *viridis* W. herb.), psychotriaähnliche, ♀. w. Südamerika.

Ravenalia Adans., Sonner., Ravenalie, VI. 1., Scitamineae.

guyanensis Rich. (= ? *amazonica* Hort.), guyanische, 4. ♀. w. Guyana.

madagascariensis Sonner., Poir. (= *Urania madagascariensis* Rausch. = *U. Ravenalia* Rich. = *U. speciosa* W.), madagascarisches, 4. ♀. w. Madagascar.

Razoumowskia caucasica Fisch., v. *Viscum Oxycedri*, p. 852.

Razumowia paniculata Sogl., v. *Humea elegans*.

Reaumurea L.

hypericoides W., p. 679, (= *cistoides* Adam, = *linifolia* Salisb. = *vermiculata* β *latifolia* MB. = *Hypericum alternifolium* LaBill.).

Reboulea Kunth, (Reboul, franz. Botaniker), III. 11., Gramineae.

gracilis Kunth, (= *Aira mollis* Mühlbg. = *A. nitida* Sogl. mant. = *A. obtusata* Mchx. = *A. pensylvanica* Sogl. = *A. truncata* Mühlbg. = *Airopsis obtusata* Desv. = *Eulonia purpurascens* Rafin. = *Koeleria pensylvanica* DC. = *Poa obtusata* P. Beauv. = *Trisetum lobatum* Trin. = *T. pensylvanicum* Trin.), schlanke, 4. f. Nordamerika.

Redoutea heterophylla Vent. = *Fugosia heterophylla*, p. 250, II.

Regelia J. C. Schauer, (Eduard Regel, Inspector am botan. Garten zu Zürich), XVIII. 11., Myrtaceae.

ciliata J. C. Schauer, (= *Melaleuca sprengelioides* DC.), gewimperte, ♀. t. k. Westl. Neuholland.

Reichardia hexapetala Roth, (= *decapetala* Wight), v. *Pterolobium lacerans*, p. 570, II.

Reichardia integrifolia Mch. (= *picroides* Roth), *runcinata* Mch. (= *tingitana* Roth), v. *Picridium vulgare et tingitanum*, p. 623.

Reimaria elegans Flüge, v. *Paspalum pulchellum*, p. 479, *fascicularis* Lk., *purpurascens* Lk., v. *Panicum Schraderi et denudatum*, p. 475 et p. 474, II.

Reinwardtia Dumort. (non Sogl.), *indica* Dumort., v. *Linum trigynum*, p. 468.

Relhania L'Her., Relhanie.

microphylla L'Her., kleinblättrige, ♀. k. Cap d. g. H. paleacea L'Her. (= *ericoides* Cass. = *Eclopis paleacea* G. = *Leyssera ericoides* Berg. = *L. paleacea* L.).

squarrosa L'Her. (= *Athanasia squarrosa* L. = *Santolina squarrosa* L. amoen.).

cuneata L'Her., *pungens* Ker, v. *Eclopes cuneata et trinervis*, p. 217, II.

Remijia DC., Remijia, V. 1., Rubiaceae.

Hilarii DC. (= *Cinchona Remijiana* St. Hil.), Hilar's, ♀. w. Brasilien.

Remusatia Schott, Endl. (Rémusat, berühmter Orientalist, † 1832 in Paris).

vivipara Schott, (= *Arum viviparum* Roxb. = *Caladium viviparum* N. E. = *Maravara Tsjembo* Rheede), lebendiggebährende, 4. w. Malabar, Nepal.

Renanthera Lour., Lindl., Strauchstendel, XX. 1.,
Orchideae.

elongata Lindl. (= *Aerides elongata* Blume), verlängerter, 4. w. Java.

matutina Lindl. (= *Aerides matutina* Blume), frühblühender, 4. w. Java, Philippinen.

Renalmia RBr., *grandiflora* Banks, *paniculata* RBr., *pulchella* RBr., v. *Libertia grandiflora*, *paniculata*, *pulchella*, p. 461.

Renalmia capensis Houtt., v. *Villarsia ovata*, p. 848.

Renalmia calcarata Andr. (= *minor* Dsf.), *mutica* Salisb., *nutans* Andr., v. *Alpinia calcarata*, *mutica*, *nutans*, p. 37 et 38.

Requienia DC., Requinie.

sphaerosperma DC. (= *Borbonia sphaerosperma* Speg.), kugelsaamige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

Reseda T., Reseda.

crystallina Webb, crystallartige, ☉. f. Canarische Inseln.

globulosa Fisch. et Mey., kugelige, ♂. f. Caucasus.

gracilis Tenore, schlanke, 4. f. Neapel.

incisa Tenore, geschlitzte, ☉. f. Süditalien.

inodora Rchb., β) *macrocarpa* Fisch. et Mey. (= *macrocarpa* β *natolica* Fisch. et Mey.), Süd- und Osteuropa.

laevigata G. Don, glatte, ♂. f. Aegypten.

lutea L. (= *undulata* Habl. = *vulgaris* Mill.).

β) *crispa* Mill.

macrocarpa Rchb., großsaamige, ☉. f. Portugal.

mediterranea L. (= *difformis* Mch. = *hexagyna* Forsk.).

Phyteuma L. (= *calycinalis* Lam. = *media* Lagasca).

podocarpus Vivian. (= *canescens* Fresen. = *hexagyna* Forsk.), fußfrüchtige, ♂. f. Aegypten.

undata L. (= *alba* L. var. *Delil.* = *bipinnata* W. En. = *decussiva* Forsk. = *ochracea* Mch.).

Clusii Speg. (= *stellata* Lam.), *sesamoides* β DC.

(= *purpurascens* L.), v. *Astrocarpus sesamoides* et

purpurascens, p. 53, II., *subulata* Delile, (= *dipetalata* Ait.), v. *Oligomeris glaucescens*, p. 447.

Retama Boiss., Retamaginster, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angulata Griseb. (= *Genista parviflora* DC. = *Spartium angulatum* L.), kantiger, 4. f. b. Bithynien.

monosperma Boiss. (= *Genista monosperma* Lam. = *Spartium Clusii* Spach, = *S. monospermum* L. ex parte, Bot. mag.), einsaamiger, 4. f. b. Spanien, Portugal.

sphaerocarpa Boiss. (= *Spartium sphaerocarpum* L. mant.), kugelfrüchtiger, 4. f. b. Südeuropa.

Retzia Thbg., Retzie.

roelloides Speg. (= *Polemonium roelloides* Thbg.), roellaähnliche, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

spicata Thbg. (= *capensis* Thbg.).

Reuteria Boiss., (F. G. Reuter, Conservator d. Boissierschen Herbariums), V. II., Umbelliferae.

Fontanesii Boiss. (= *Pimpinella lutea* Dsf., p. 624), Desfontaine's, ♂. 4. f. b. Nordafrika.

Rhabarbarum palmatum Mch., *Rhaponticum* Mch.,

Ribes Mch., v. *Rheum palmatum*, *Rhaponticum*, *Ribes*.

Rhabdotheca sonchoides Cass., v. *Microrhynchium nudicaule*, p. 407, II.

Rhagadiolus T., Sichelsalat.

edulis G. (= *intermedius* Tenore, = *lampsanifolius* Mirb. = *lampsanoides* Dsf. = *stellatus* MB., G. var. DC. = *Lapsana lampsanaefolia* Mill. = *L. Rhagadiolus* L. = *L. stellata* Pall.).

Koelpinia Lam. (= *Koelpinia linearis* Pall. = *Lapsana Koelpinia* L.), gleichbreitblättriger, ☉. f. Caucasus, Sibirien.

stellatus G. (= *Lapsana stellata* L.).

Rhagadiolus creticus All., *Hedypnois* All., *radiata* All., *scaber* All., v. *Hyoseris cretica*, *Hedypnois*, *radiata*, *scabra*, *R. taraxacoides* All., v. *Thrinicia hispida*, *R. Zazantha* All., v. *Zazantha verrucosa*.

Rhamnoides Hippophae Mch., v. *Hippophae rhamnoides*.

Rhamnus T., L., Juss., Wegdorn.

Alaternus L., β) *balearicus* H. Par. (= *rotundifolius* Dum.Cours.).

alnifolius L'Her. (= *franguloides* Mchx. = ? *Frangula americana* Mill.).

alpinus L. (= *Frangula latifolia* Mill.), β) *hydriensis* Hacq.

cuneatus Hook., keilförmiger, ♀. f. Californien.

infectorius L. (= *R. Lycium* Scop. = *minor* Mill. = *saxatilis* Hort.).

integrifolius DC. (= *coriaceus* Brouss., N. E. = *R. Teidis* Brouss. = *Condalia coriacea* Rehb.).

oleaefolius Hook., ölbaumblättriger, ♀. f. Californien. *Pallasii* Fisch. et Mey. (= *Erythroxylo* MB., non Pall. = *lycioides* Pall., non L.).

persicaefolius Moris, (= *amygdalinus* Moris), pfirsichblättriger, ♀. f. Sardinien.

prunifolius Sib., Sm. (= ? *amygdalinus* Dsf.), pflaumenblättriger, ♀. f. b. Creta.

pumilus L. (= *repens* Hort. ? = *hydriensis* Hacq. = *Frangula rotundifolia* Mill.). β) *rupestris* Vill.

pusillus Tenore, (= *pumilus* δ *neapolitanus* DC.).

terniflorus Moç., Sess., dreiblumiger, ♀. k. Mexico.

Wulfenii Hoppe, (= *pumilus* Wulff. = *pumilus* var. ε DC. = *rupestris* Scopol., non Vill. = *Frangula Wulfenii* Rehb.), Wulfen's, ♀. f. Oestreichisches Littorale.

Unbestimmt: *virginicus* Page.

theezans L. (= *R. Thea* Osb.), v. *Sageretia theezans*, *umbellatus* Cav., v. *Karwinskia umbellata*, p. 333, II.

Rhaphiodon Schauer, Nadelkraut, XIV. II., Verbenaceae.

Echinus Schauer, (= *Lippia Echinus* Spgl. = *Zappania Echinus* Mart.), igelstacheliges, 4. w. Brasilien.

Rhaphiolepis Lindl. = *Raphiolepis*.**Rhapis** L. fil., Fächerpalme.

cochinchinensis Mart. (= *Chamaerops cochinchinensis* Mart.), cochinchinische, ♀. w. Cochinchina.

Die Pflanzen-Verzeichnisse der belg. Gärten führen noch eine *R. Sierotsk* auf, ob in Japan heimisch?

arundinacea Ait., v. *Chamaerops Hystris*, p. 136, II.

Rhaponticum Scop., DC., Flockendistel.

atriplicifolium DC. (= *Carduus atriplicifolius* Trevir. = *Cirsium atriplicifolium* Fisch. = *C. filifolium* Fisch. = *Onopordon deltoides* Ait. = *Silybum atri-*

Rhaponticum

plicifolium Fisch. = *Stemmacantha ficifolia* Turcz.
= *Stephanocoma atriplicifolia* Turcz.).

cynaroides Less. (= *Cnicus centauroides* L. = *Cnicus Cynara* Lam. = *Serratula cynarifolia* Poir. = *S. cynaroides* DC. = *Stemmacantha cynaroides* Cass.),
 β) *inerme* * (= *Carduus inermis* P. = *Cirsium inermis* Lk. = *Cnicus inermis* W. = *Serratula inermis* Poir.).

dahuricum Fisch., Sweet, dahurische, 4. f. Dahurien.

doronicaefolium Fisch., Sweet, gemswurzblättrige, 4. f. Sibirien.

ficifolium Fisch., feigenblättrige, 4. f. Sibirien.

nitidum Fisch., glänzende, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.

Rheum L., Rhabarber.

crassinervium Fisch., Lindl., dicknerviger, 4. f. ?

dentatum Mart., gezahnter, 4. f. ?

leucorrhizon Pall. (= *compactum* L. var. Spgl. = *nanum* Sievers).

Rhaponticum L. (= *sibiricum* Pall. = *undulatum* Pall.).

rotundifolium Fisch., rundblättriger, 4. f. ?

rugosum Dsf., runzeliger, 4. f. ?

soongaricum Fisch. et Mey., soongarischer, 4. f. Soongaria.

tetragonopus Mart., vierkantigstieliger, 4. f. ?

Rhexia P. Br., Rhexie.

glabella Mchx., kahle, 4. k. Carolina, Georgia.

jussiaeoides L. fil., Jussiaeaähnliche, 5. w. Surinam.

lutea Mchx. (= *linearifolia* Poir.), gelbe, 4. k. Florida, Georgia.

Nicht hinlänglich bekannte: *aspera* Voigt, *cognata* Weinm., Venezuela Hort.

canescens Bonpl., *cardinalis* Bonpl., *hypericoides* W., v. *Chaetogastra canescens*, *cardinalis*, *hypericoides*, p. 135, II., *grandifolia* Schldtl., *inaequilateralis* Cham., Schldtl., v. *Centradenia grandifolia*, *inaequilateralis*, p. 142, II., *imbricata* Thbg. (= *blepharocentra*, *ciliata* et *floribunda* Mart.), *alba* Schrk., Mart., *pulcherrima* Schrk., Mart., v. *Lavoisiera imbricata*, *alba*, *pulcherrima*, p. 346, II., *holosericea* Bonpl., *Fothergillae* Schrk., *viminea* Spgl. etc., v. *Lasiandra argentea*, *Fothergillae*, *coerulea* etc., p. 344, II., *Fontanesii* Bonpl. (= *alata* Raddi, = *dasysteminea* Schrk.), v. *Pleroma Fontanesianum*, p. 539, II., *diversifolia* Domb., v. *Heteronema diversifolium*, p. 298, II., ? *variabilis* Mart. (= *cordata* Spgl. = *venusta* Mart.) etc., v. *Microlicia cordata* etc., p. 406, II., *quadrivalvis* Mart., *excorticata* Mart. etc., v. *Marcetia glandulosa*, *excorticata* etc., p. 386, II., *semiserrata* Schrk., Mart., v. *Huberia semiserrata*, p. 306, II., *Hilariana* H. B. K. (= *galioides* Mart., Schrk. = *suberosa* Spgl.), v. *Rhynchanthera Hilariana*.

Rhigozum Burch. (= *Rhizogum* Rchb.), Büschelblatt, XIV. II., Bignoniaceae.

obovatum Burch., verkehrteiförmiges, 5. t. k. Cap d. g. H.

trichotomum Burch. (= *brachiatum* E. Mey.), dreizinkiges, 5. t. k. Cap d. g. Hoffn.

Rhinacanthus N. E., *communis* N. E., v. *Justicia*, Sect. XI., p. 435.

Rhinactina Less., Spornstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

limonifolia Less. (= *Aster obovatus* C. A. Mey.), wegerichnelkenblättriger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

uniflora Bunge, (= *Aster cremophilus* Bunge), einblumiger, 4. f. Altaisch. Sibirien.

Rhinanthus L., MB., Nasenblume.

orientalis L., morgenländische, ♂. f. Caucasus, Kleinasien. Hinsichtl. d. übrigen s. *Alectorolophus* u. *Trixago*.

Rhipsalis G., DC., v. Cacteeae Sect. XII., p. 784 et p. 98, 99, II.

Rhizobolus G., *glaber* Correa, (= *Souari* Auct.), *Pekea* G. (= *tuberculosum* Räsch.), v. *Caryocar glabrum et tomentosum*, p. 168.

Rhizobotrya Tausch, Wurzelträubchen, XV. II., Cruciferae.

alpina Tausch, (= *Draba Rhizobotrya* Steud. = *D. stellata* Sieb., non Jacq.), Alpen-W., 4. f. Oestreichische Alpen.

Rhodax Chamaecistus Spach, *dichotomus* Spach, *polyanthos* Spach, v. *Helianthemum Rhodax*, *dichotomum*, *polyanthum*, p. 380 et p. 288, II.

Rhodea Endl. = *Rohdea japonica*, p. 693.

Rhodiola L., Rosenwurz.

asiatica Don, (= *Sedum asiaticum* DC.), asiatische, 4. k. f. b. Nepal.

elongata Schrenk, C. A. Mey. (= *Sedum elongatum* Ledeb. = *S. Ledebourii* Hort. Berol.), verlängerte, 4. f. Soongaria.

rosea L. (= *odorata* Lam. = *officinarum* Crtz. = *Sedum Rhodiola* DC. = *S. roseum* Scop.).

β) *minor* Mill.

sibirica Fisch. (= *Sedum altaicum* Don).

Rhodochiton Zuccar., Rothhülle, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrofularineae).

volubile Zuccar. (= *Lophospermum atrosanguineum* Zuccar. = *L. Rhodochiton* D. Don), windender, 5. 5. Sch. k. Mexico.

Rhododendron L., Alpenrose (Alpenbalsam).

I. *Buramia* DC. (= *Booram* D. Don).

arboreum Sm. Var. u. Hybriden: *Alberti*, *album* Wall., (= *ferrugineum magnum*, = *niveum* Sweet), *albidum*, *Admiral de Ruyter*, *Berg Vesuvius*, *biburgense*, *Boddaertii*, *Boerhavei*, *Beauté de Flandre* van Houtte, *cardinale* Knight, *Carmin duc d'Arenberg*, *cinnamoemum* Lindl. fl. *roseis*, *cinnamoemum rubricaulum* Lodd., *Clyto* Knight, *Comte d'Egmont*, *diadematum*, *favorite* Knight, *Hartoppii* Knight, *Hercule v. Houtte*, *Héroine*, *medio-pictum argenteum*, *papilionaceum*, *Pardoloton Pince*, *puniceum purpureum fl. pleno*, *Rollissonii*, *roseo-purpureum*, *rubiniflorum* Knight, *strictopetalum superbum* Pince, *Sultan Achmet*, *Triomphe de Gand* v. Houtte, *Victorie Pince*, *Zizianum* etc.

barbatum G. Don, Wall., β? *totibarbatum* v. Houtte.

III. *Eurhododendron* DC. (= *Brachycalyx* Swt. = *Ponticum* et *Lepipherum* G. Don).

Aprilis Lindl. (= *dahurico-ponticum*), Frühlings-A., 5. f. Hybride.

campanulatum D. Don, Wall., Var.: *Hibbertii*, *strictum* etc.

Rhododendron

catawbiense Mchx., β) hybridum robustissimum fastuosum Hort. belg. (= *fastuosum fl. pleno* Hort. = *Van Houtteanum* Hort. = *pontico-catawbiense*).

Andere Var.: fol. aureo-variegatis, imbricatum etc.

caucasicum Pall. Var.: β) arboreum, γ) hybridum. (Mit einer *Azalea pontica alba* erzeugt).

citrinum * (= *Azalea citrina* Hassk. = ? *Vireya javanica* Blum. var.), citrongelbe, $\frac{1}{2}$ t. Java.

hirsutum L., b) fol. marginatis (= *variegatum*), β) hybridum (= *ferrugineo-hirsutum* = *intermedium* Tausch).

maximum L. Var.: decorum v. Houtte, new white Cunn., pyramidatum fl. semipleno v. Houtte.

ponticum L. Var.: guttatum, medio-pictocitrinum, multi-maculatum, nazarethinum fol. argent. var., nereifolium, nereifolium Smithii, nereifol. fol. variegatis.

Andere Hybriden von verschiedenen Arten: hybridum robustissimum fastuosum (= *Van Houttei fl. semipleno*) s. R. catawbiense, hyb. album superbum, hyb. amoenum, hyb. carneum, hyb. albo-roseum, hyb. atropurpureum, hyb. elegans, hyb. Pelmölleri Booth, hyb. puniceum, — Barkerii, Cavendishii, Cunninghamii et Knighthii, et Nobleanum, et venustum, Gibsonii, Herbertii, reticulatum etc.

Andere Varietäten oder Hybriden sind p. 684—686 verzeichnet.

V. Tsutsusi G. Don, (= *Beverningia* Salisb. = *Loiseleuria* Rehb. = *Azalea indica* L. etc.).

Hybriden u. Varietäten v. R. indicum Sweet, ledifolium G. Don, pulchrum Sweet. Vergl. p. 686.

Adolphe van Houtte, alba insignis et macrantha, et insignis Rinz, et plena, et rotunda Baron de Pronay, et striata Knight et Perry, amabilis, Apollo Knight et Perry, atropurpurea splendida, augustissima Knight et Perry, aurantiaca grandiflora et superba, Baron de Pronay Rinz, bella Knight et Perry, Bellérophon Baron de Pronay, Benno Rinz, blanda Kn. et Perr., bright pink, Briza Kn. et Perr., Broughtonii Kn. et Perr., Calypso Kn. et Perr., candida, candidissima maxima, coccinea elegans, et grandiflora et superba, coerulescens, colorans Kn. et Perr., color di lacca (= *couleur de lacque*) Bar. Pr., comosa, concolor, conspicua, coronaria grandiflora, coronata Kn. et Perr., coruscans Bar. Pr., crimson, cuprea Bar. Pr. et splendens Rinz, et violacea Bar. Pr., Cunninghamii, Dalstonii, Danielsiana amabilis Rinz et concessa Rinz et fasciculata Bar. d. Pron. et superba Rinz, dark crimson, decora Kn. et Perr., Diana, dilecta Kn. et P., Duc de Brabant v. Houtte, Egertonii Kn. et Perry, elata flore pleno, exornata superba v. Houtte, exquisita Kn. et Perr., Fioni, Flora Kn. et Perr., floribunda elegans, formosa, formosa aurantiaca Kn. et Perr., formosissima, Frostii Kn. et Perr., fulgens et superba Kn. et Perr., Garland Kn. et Perr., Gledstanesii, Goliath Rinz, gracilis Kn. et Perr., grandiflora rosea, Helena Kn. et Perr., Hellyana, Hertha Rinz, Hibbertii Rinz, Hookeri, Holfordii Kn. et Perr., ignea Kn. et Perr., ignescens, Jenkinsonii, Knightii, lacteola superba, large salmon, lateritia et grandiflora, Lehmanni, Leucomagiste, light purple, lilacina grandi-

Rhododendron

flora, et semiplena, et macrantha, lilac perfection, liliiflora nova, longifolia, lovaniensis, magnifica Kn. et Perr., magniflora Kn. et Perr., maxima, Moritz v. Bethmann Rinz, multiflora J. Makoy, mundula Kn. et Perr., Murrayana Kn. et Perr., nec plus ultra (tricolor) Verschaff., nereiflora, nereiflora rubra, Nerissonii, New large white Lucombe et Pince, optima Kn. et Perr., ornatissima (= *Arnematia*) Kn. et Perr., Ottonis, ovata, pallida, papillosa, Perryana Kn. et Perr., phoenicea et alba Kn. et Perr. et semiplena, picturata Kn. et Perr., pilosa Kn. et Perr., praecipua Lucombe et Pince, praeclara Kn. et Perr., praestantissima Kn. et Perr., Prima Donna Kn. et Perr., Prince Albert Kn. et Perr., princeps Kn. et Perr., pulcherrima, pulchra, punctata superba Kn. et Perr., purpurea plena et maculata, Reddingii Kn. et Perr., Reewesii, refulgens Kn. et Perr., Reyndersiana v. Houtte, Robertsonii, robusta, Rosa Mundi Rinz, rosea bicolor nova, rosea superba, rotundifolia, rotundiflora Kn. et Perr., rubicunda, Smiths coccinea et elegans, et grandiflora, et fine pink, et large pink, et fine large pink, et large purple, et light purple, et orange pink, et pink, et speciosa, et splendens nova, et superba duplex, et triflora, et variegata, splendida Kn. et Perr., squamata, striata Kn. et Perr., striata formosissima v. Houtte, Sylph Rinz, tricolor (= *nec plus ultra*), triumphans, Urseli, variegata, Vesta Kn. et Perr., vestita Kn. et Perr., Wadii, Warreana, White van Houtte, Woodfordii etc. etc. etc.

Hybriden von Rhododendrons der ersten Abtheilungen mit Rhododendron indicum etc. (= *Azalea indica* L. etc.) u. versch. Azaleen: rhododendroides, aureum, carneum elegantissimum Sm., decorum, norbitonense Sm., yellowish etc. Zu ergänzen p. 684—686.

Rhodomyrtus tomentosa Hassk., v. *Myrtus tomentosa*, p. 528.

Rhodostoma Scheidw., Rothschlund, V. I., Rubiaceae. gardenioides Scheidw., gardenienähnlicher, f. w. ? Südamerika.

Rhombifolium canescens Rich., v. *Neurocarpum guianense*, p. 547.

Rhopala Aubl. (= *Rupala* Auct.), Rhopala. elegans Schott, Pohl, zierliche, f. w, Brasilien.

Rhus T., Sumach.

angustifolia L. (= *argentea* Mill., non Eckl., Zeyh.).

aromatica Ait. (= *canadensis* Marsh. = ? *suaveolens* Ait. = *Lobadium aromaticum* Rafin. = ? *Myrica trifoliata* Hortul. = *Schmalzia aromatica* Desv. = *Turpinia aromatica* Rafin.).

dioica Brouss. (= ? *Oxyacantha* Cav. = *oxyacanthoides* Dum.Cours., non Schousb.).

diversiloba Torr. et Gray, verschiedenlappiger, f. f. Californien.

erosa Thbg., ausgebissener, f. k. Cap d. g. Hoffn.

filicina DC., farnähnlicher, f. k. Mexico.

glabra L., a) hermaphrodita DC. (= *Toxicodendron glabrum* Mill.), β) dioica Lam., DC.

laevigata L., β) elongata Jacq. (= *trifoliata* W. Enum. Suppl.).

Rhus

Meerburgiana Schult. (= *pumila* Meerb.), Meerburg's,
 f. f. b. Nordamerika.

pruinosa Hffg., bereifter, f. w. t. Ostindien.

semialata Murr., β) Osbeckii DC. (= *javanica* L.),
 γ) Roxburghii DC. (= *Amela* Don, = *Bucki Ame-*
lam Roxb.).

suaveolens Ait. (= *Lobadium suaveolens* Rafin. =
Myrica trifoliata Hort. = *Schmaltzia suaveolens* Desv.
 = *Toxicodendron crenatum* Walt. = *Turpinia sua-*
veolens Rafin.).

undulata Jacq. (= *theezans* Hort.).

vari lobata Steud. (= *lobata* Hook., non Poir.), ver-
 schiedenlappiger, f. f. b. Columbia, Californien.

vernificera DC. (= *juglandifolia* Wall., Don, = *Vernix*
 L. mat. med., Thbg., non L. spec. plant. = *Wal-*
lichii Sweet).

villosa L. (= *atomaria* Jacq. = *incana* Mill.).

Cacodendron Ehrh. (= ? *canadensis* Mill. = *hypsi-*
lodendron Mch.), v. *Ailanthus glandulosa*, p. 25,
caustica Hook., v. *Mauria simplicifolia*, p. 390, II.,
Cobbe L., *Cominia* L., v. *Schmidelia Cobbe et Co-*
minia, obscura MB., v. *Pterocarya caucasica*, p. 665
 et p. 569, II., *odorata* Nois. = ?, *Thunbergii* Hook.,
 v. *Heeria argentea*, p. 287, II., *zeylanica* Burm.
 (= *R. Raedaetijavel* Mill.), v. *Omphalobium indi-*
cum, p. 557.

Rhynchanthera DC., Schnabelbeutel, X. 1. (V. 1.),
 Melastomaceae.

grandiflora DC. (= *Melastoma Aubletiana* Vahl, =
M. grandiflora Aubl. = *Osbeckia Aubletiana* Spgl. =
Rhexia grandiflora Bonpl.), großblumiger, f. w. Guiana.

Hilaireana (DC.), (= *Cambessedia Hilaireana* DC. =
Rhexia galioides Mart., Schrk. = *R. Hilariana* Kunth),
 St. Hilair's, f. w. Brasilien.

Schrankiana DC. (= *pentanthera* DC. = *Rhexia pen-*
tanthera Sering. = *R. Schrankiana* Mart.), Schrank's,
 f. w. Brasilien.

Rhynchocharpa Schrad., Schnabelfrucht, XXI. 11.,
 Cucurbitaceae.

foetidissima Schrad. (= *Melothria foetida* Desr., p. 509,
 = *Trichosanthes foetidissima* Jacq.), stinkende, \odot .
 Sch. w. m. f. Guinea.

Rhynchocharpus lateriflorus Less., v. *Rhynchopsidium*
lateriflorum.

Rhynchoglossum Blume, (= *Rhincoglossum* Auct.
 = *Antonia* RBr. = *Loxotis* RBr. = *Wulfenia* spec.
 Wall.), Schnabelzunge, XIV. 11., Cyrtandraceae.

obliquum DC. (= *Loxotis obliqua* RBr. = *Wulfenia*
obliqua Wall.), schiefe, \odot . σ . w. Nepal, Ostindien.

zeylanicum Hook., zeylanische, \odot . σ . w. Zeylon.

Rhynchopsidium Cass., DC., Schnabelkraut.

pumilum DC. (= *Athanasia pumila* L. fil. = *Eclopes*
pumila Less. = *Nanophytum pumilum* Less. = *Rel-*
hania pumila Thbg.), niedriges, \odot . f. Cap d. g. Hffn.

Rhynchosia Lour., Schnabelschiffchen.

biflora DC. (= *scarabaeoides* DC. = *Dolichos scarabae-*
oides L. = *Cantharospermum pauciflorum* W. et A.
Stizolobium scarabaeoides Spgl.).

Rhynchosia

cana DC. (= *Glycine cana* W. = *flexuosa* Heyne),
graulichs, 4. ♂. Sch. w. Ostindien.

β) *suaveolens* DC.

caribaea DC. (= *Copisma caribaeum* DC. = *Glycine caribaea* Jacq. = *G. reflexa* Nutt. = *G. sublobata* Schum.).

medicaginea DC. (= *nuda* Wall. = *rhombofolia* DC. = *Dolichos medicagineus* Lam. = *D. scarabaeoides* Roxb. = *Glycine rhombifolia* W.), schneckenklee-ähnliches, ☉. m. f. Ostindien.

Memnonia DC. (= *Dolichos Memnonia* Del. = *Glycine Memnonia* Spgl.), Memnon's, 4. Sch. t. w. Aegypten, (Theben).

precatoria DC. (= *Glycine* prec. H. B. K. = *Indigofera volubilis* Wendl.), Paternoster-S., ♂. Sch. w. Neugranada.
angustifolia DC., v. *Chrysosias calycina*, p. 143, II.,
viscida DC., v. *Pseudarthria viscida*, p. 565, II.

Rhynchopera Kl., Schnabelstendel, XX. I., Orchideae.

pedunculata Kl., gestielter, 4. w. ? Mexico.

Rhynchospermum jasminoides Hort., v. *Gardenia scandens*.

Rhynchospora Vahl, Schnabelriet.

aurea Vahl, (= *surinamensis* N. E. = *Chaetospora aurea* H. B. K. = *Schoenus corymbosus* P. = ? *S.*

longirostris Sbr., non Ell. = *S. surinamensis* Rottb. = *Scirpus corymbosus* L.).

paraensis Schrad., parasches, 4. w. Brasilien.

polyphylla Vahl, (= *gracilis* W. = *Mitrospora polyphylla* N. E. = *Schoenus polyphyllus* Vahl).

sylvatica N. E. (= *comosa* Lk. = *Schoenus comatus* Lk.), Waldliebendes, 4. w. Brasilien.

Rhynchostylis Blum., Schnabelgriffel, XX. I., Orchideae.

papillosa * (= *Aerides undulata* Sm. = *Cymbidium praemorsum* Sw. = *Epidendrum praemorsum* Sw., Roxb. = *Sarcanthus praemorsus* Lindl., p. 721, = *Sarcochilus praemorsus* Spgl. = *Saccolabium papillosum* Lindl., p. 709).

praemorsa Blume, (= *Aerides praemorsa* Sw. = *Epidendrum indicum* Poir. = *Saccolabium praemorsum* Lindl.), abgestutzter, 4. w. Java.

retusa Blume, (= *Aerides guttata* Roxb. = *A. retusa* Sw. = *Cymbidium retusum* Hamilt. = *Epidendrum retusum* L. = *Limodorum retusum* Sw. = *Sarcanthus guttatus* Lindl., p. 721, = *Saccolabium guttatum* Lindl.), abgestutzter, 4. w. Ostindien.

Rhysocarpus Endl., Runzelfrucht, V. I., Rubiaceae.

pubescens Endl. (= *Cinchona pubescens* Hort. Makoy, non Vahl), weichhaarige, ♂. ♀. w. Tropisch. Amerika.

Rhytidanthe scabra Benth., v. *Waitzia aurea*.

Ribes T., L., Johannisbeere (Stachelbeere).

I. *Grossularia* T., Stachelbeere.

caucasicum Adams, (= *Uva crispera* L. var. DC.), caucasische, ♂. f. Caucasus.

Grossularia L., var. *Groseillier cerise*.

hirtellum Mchx. (= *saxosum* Hook. = *triflorum* Bigelow).

rotundifolium Mchx. (= *triflorum* W. Enum. = *gracile* Pursh).

triflorum W. (= *stamineum* Hornem. = *Grossularia triflora* Spach), dreiblumige, ♂. f. Nordamerika.

Ribes

II. Botryocarpum Rich., DC.

Dikuscha Fisch. (= *boreale* Turczsch.), nördliche, ⚭. f. Sibirien.

orientale Dsf. (= *punctatum* Lindl. = *resinosum* Bot. mag.).

III. Ribesia Berland. DC., Johannisbeere.

albinervium Mchx. (= *rubrum* L. var. Spgl.).

alpinum L. (= *dioicum* Mch. = *multiflorum* Hort.),

δ) Fleischmanni Rchb., ε) grossulariaefolium Rchb.,

ζ) Hladnickianum Freyer, Rchb. (= *alpinum* Lodd.),

η) leucocladon Rchb., θ) pilosum Rchb., ι) tortuosum Rchb., κ) viridissimum Rchb.

cereum Dougl. (= *inebrians* Lindl. = *pumilum* Nutt. = *Cerophyllum Douglasii* Spach).

floridum L'Her. (= *americanum* Mill. = *campanulatum*

Mch. = *Dillenii* Medic. = *nigrum americanum* Mch.

= *pensylvanicum* Lam. = *Coreosma florida* Spach),

β) recurvatum Mchx.

fragrans Pall. (= *suaveolens* Turczsch.).

glutinosum Benth., klebrige, ⚭. f. Californien.

heterotrichum C. A. Mey., verschiedenhaarige, ⚭. f. Altaisches Sibirien.

malvaceum Sm. (= *tubulosum* Eschsch. = *tubiflorum*

C. A. Mey.), malvenblättrige, ⚭. f. Nordw. Amerika.

multiflorum Kit. (= *spicatum* Schult.), β) vitifolium Host.

opulifolium Loud., wasserholderblättrige, ⚭. f. ? Rußland.

prostratum L. (= *glandulosum* Ait. = *rigens* Mchx.).

sanguineum Pursh, var. albidum, flore pleno.

IV. Symphocalyx Berl.

aureum Pursh, (= *fragrans* Lodd.), var. album, Jeffersonii.

tenuiflorum Lindl., var. atropurpureum, luteum, rubrum.

Unbestimmtere ohne nähere Angabe des Vaterlandes:

bullatum Otto et Dietr., callibotrys Wendl., holoseri-

ceum Otto et Dietr., intermedium Tausch, macran-

thum Lodd., pallidum Otto et Dietr., Schmidtianum

Tausch, (= *floridum* Hort. Schönbr.), urceolatum

Tausch, (= *petraeum* Hort. Prag).

fuchsioides Berland. (= *speciosum* Pursh, = *stamineum* Sm.), v. *Robsonia speciosa*.

Richardsonia Kunth, Richardsonie.

rosea St. Hil. (= *emetica* Mart.), rosafarbige, 4. ⚭. w. Brasilien.

scabra St. Hil. (= *pilosa* Kunth, = *Richardia scabra*

L. = *R. pilosa* R. et P. = *Spermacoce hexandra*

Rich. = *S. hirsuta* W.).

Richea RBr., (F. J. Riché, Oberaufseher des Jardin des plantes zu Paris, † 1838), V. 1., Epacrideae.

dracophylla RBr., drachenbaunblättrige, ⚭. Van Diemens Insel.

Richea glauca LaBill., v. *Craspedia uniflora*, p. 164.

Ricinocarpus Dsf., Ricinusfrucht, X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

glaucus Endl., blaugrüne, ⚭. t. Neuholland.

pinifolius Dsf. (= *Roeperia pinifolia* Spgl.), kieferblättrige, ⚭. t. Neuholland.

Ricinus T., Wunderbaum.

communis L. (= *vulgaris* Mill.), β) armatus Andr.,

γ) minor Mill., δ) undulatus Hort., ε) Krappa Hort.,

ζ) macrocarpus Hort.

glaucus Hffg., blaugrüner, ©. ♂. ⚭. m. f. t. Nepal.

Ricinus

inermis Jacq. (= ? *rugosus* Mill.).

integrifolius W. (= *dioicus* Chevall., non Jacq.), ganzblättriger, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Mauritius.

laevis DC., glatter, ☉. ♂. ♀. m. f. t. ?

lividus Jacq. (= *perennis* Hort.).

medicus Forsk. (= *communis* L. var. Delil. Poir.), heilender, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Arabien.

megalospermus Caill., Delil., großsaamiger, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Aegypten.

paniculatus Lk., Otto, rispiger, ☉. m. f. ?

rutilans Hort. Berol., röthlicher, ☉. m. f. ?

spectabilis Blume, ansehnlicher, ♀. w. Java.

tunetensis Dsf. (= *tunesensis* Auct.), tunetanischer, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Tunis.

Unbestimmtere: *leucocarpus* Hort. Bologna., *macrophyllus* Hort. Bologn.

globosus W., *Mappa* L., *tanarius* L., v. *Mappa jamaicensis*, *moluccana*, *tanaria*, p. 386, II.

Ridolfia Moris, (*Cosmus Ridolfio*, Prof. d. Agronomie zu Pisa), V. II., Umbelliferae.

segetum Moris, (= *Anethum segetum* d'Urv., non L. = *A. arvense* Bess. = *A. graveolens* Ucria, = *A. ?pusillum* Hort. = *Foeniculum segetum* Presl, = *Meum segetum* Gussone, Tenore), Saat-R., ☉. f. Süd- u. Osteuropa, Persien.

Riedleia Vent., *Ridlea*.

hirsuta DC. (= *Melochia hirsuta* Cav. = *Mougeotia hirsuta* H. B. K. = *Visenia hirsuta* Spgl.), rauhaarige, ♀. w. Südamerika.

odorata DC. (= *Melochia odorata* Forst. = *Visenia indica* Houtt. = *V. umbellata* Spgl.), wohlriechende, ♀. w. t. Neue Hebriden.

truncata DC. (= *Dictyocarpus truncatus* Wight, = *Melochia truncata* W. = *Sida cuneifolia* Roxb. = *S. retusa* Roxb.).

Rigidella Lindl., *Steifling*, III. I., Irideae.

flammea Lindl., feuerfarbiger, 4. Zw. k. Mexico.

immaculata Lemaire, ungefleckerter, 4. Zw. k. Mexico.

orthantha Lemaire, geradblumiger, 4. Zw. k. Mexico.

Rindera cristata R. et S. (= ? *emarginata* R. et S.), *glastifolia* R. et S., v. *Mattia cristata*, *angustifolia*, *glastifolia*, p. 389, II, *lateriflora* R. et S., v. *Pectocarya lateriflora* Nachlese.

Rinzia J. C. Schauer, (Sebastian u. Jacob Rinz, Handelsgärtner in Frankfurt am Main), ? VIII. I., Myrtaceae.

Fumana J. C. Schauer, ciströschchenähnliche, ♀. t. Westl. Neuholland (Ob kultivirt?)

Ripogonum Forst.

parviflorum RBr. (= *scandens* Forst. = *Smilax Ripogonum* Forst.).

Rissoa W. Arnot. (A. Risso zu Nizza, Versasser einer Naturgeschichte d. Orangenbäume u. a. naturh. Werke), X. I., Hesperideae-Aurantiaceae.

ceylanica W. Arnot. (= *Limonia citrifolia* Moon, non Roxb., W.), ceylonische, ♀. w. Ceylon.

Rivea Choisy, (Rive, Auguste-Arthur de la, Prof. der Physik zu Genf), V. I., Convolvulaceae.

bona-nox Choisy, (= *Argyreia bona-nox* Sweet, p. 77, = *Lettsomia bona-nox* Roxb.).

Rivea

brasiliensis Mart., brasilianische, ♂. Sch. w. Brasilien.
 hypocrateriformis Choisy, (= *Argyreia uniflora* Sweet,
 = *Convolvulus candicans* R. et S., non Roth, =
C. hypocrateriformis Desr. = *C. hypoleucus* R. et S.
 = *Lettsomia uniflora* Roxb.).

ornata Choisy, (= *Argyreia ornata* Sweet, p. 77, =
Convolvulus candicans Roth, = *Lettsomia ornata* Roxb.).

tiliaefolia Choisy, (= *Convolvulus gangeticus* Roxb. =
C. grandiflorus Hort. brit. = *C. leucanthus* Herb.
 Madrit. = *C. marginalis* Hamilt. = *C. melanostictes*
 Schltl. = *C. platyphyllus* Juss. = *C. spectabilis*
 Hort. brit. = *C. tiliaefolius* Desr. = *Ipomoea bacci-*
fera Russ. = *I. benghalensis* Roth, = *I. gangetica*
 Sweet, = *I. campanulata* Arn. = *I. melanosticta*
 Don, = *I. tiliaefolia* R. et S.), lindenblättrige, 4.
 ♂. Sch. w. Ostindien, Polynesien, Philippinen, Mas-
 carenas, Madagascar, Caribäen, Peru.

Rivinia Plum., L., Rivinie.

acuminata H. B. K. (= *laevis* L. var. Spgl. = *lau-*
ceolata W.), zugespitzte, ♂. w. Südamerika.

affinis N. E., Mart., ähnelnde, ♂. w. Brasilien.

humilis L. (= *Solanoides pubescens* Mch.), β) canes-
 cens Don, (= *Piercea tomentosa* Mill.).

laevis L. (= *humilis* Mill. = *Piercea glabra* Mill. =
Solanoides laevis Mch.).

latifolia Lam. (= *laevis* L. var. Spgl.), breitblättrige,
 ♂. w. Westindien.

octandra L. (= *dodecandra* Jacq. = *Mutisii* W. =
scandens Mill.).

tetrandra Dsf., viermännige, ♂. w. ?

Robertia pinnatifida Spgl., v. *Achyrophorus pinna-*
tifidus, p. 7, II.

Robertia hyemalis Merat, v. *Eranthis hyemalis*.

Robertsonia Haw., *crenata* Haw., *cuneifolia* Haw.,
dentata Haw., *micranthifolia* Haw., *polita* Haw.,
serrata Haw., *sphaeroidea* Haw., *umbrosa* Haw., v.
Saxifraga Sect. III., *S. umbrosa*, *cuneifolia*, *hirsuta*,
erosa, *polita*, *serrata*, *hirsuta et umbrosa*, p. 724.

Robinia L., Schotendorn.

davurica Lodd., dahurischer, ♂. f. Dahurien.

Ehrenbergii Schltl., Ehrenberg's, ♂. k. Mexico.

glabra Mill., kahler, ♂. t. Campeche.

latifolia Mill., breitblättriger, ♂. t. Campeche.

nana Ell., zwergiger, ♂. f. b. Carolina, Georgien.

Pseudacacia L., var. *echinata*, *humilis*, *myrtifolia*, *nigra*,
subtortuosa, variegata.

pyramidata Mill., pyramidenförmiger, ♂. w. Campeche.

rosea Mill., ? Ell., rosafarbiger, ♂. k. Campeche, Carolina.

viscosa Vent., β) *alba*, γ) *pendula*.

Unbestimmtere: *geminiflora*, *pinnata* Hort., *radicans*
 Sw., Fisch.

Robsonia Berland. (Ed. Robson, englischer Botaniker),
 V. 1., Grossularieae (Ribesiaceae).

speciosa Spach, (= *fuchsoides* Berland. = *Ribes spe-*
ciosum Pursh, p. 689, = *R. stamineum* Sm. = *R.*
fuchsoides Sessé), prächtige, ♂. k. f. b. Californien.

Rocama Forsk., *arabica* Gmel. (= *digyna* Forsk.),
 v. *Trianthema pentandra*.

Rochea DC. (= *Larochea* P., p. 446 et *Kalosanthes* Haw., p. 436).

I. *Franciscea* DC.

bicolor Steud. (= *odoratissima* β *bicolor* DC. = *Dietrichia bicolor* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes bicolor* Haw.), β) *capitata* (= *Crassula capitata* Lodd.).

biconvexa DC. (= *Crassula biconvexa* Haw. = *Kalosanthes biconvexa* Haw.).

Burmanniana Steud. (= *Crassula Burmanniana* D. Dietr. = *Cyrtogyne Burmanniana* Eckl., Zeyh.), Burmann's, \S . t. k. Cap d. g. Hoffn.

coccinea DC. (= *Crassula coccinea* L. = *Dietrichia coccinea* Tratt. = *Kalosanthes coccinea* Haw.).

cymosa DC. (= *Crassula capitata* Lam. = *C. cymosa* L. = *Kalosanthes cymosa* Haw.).

dejecta Steud. (= *Crassula dejecta* Jacq. = *C. undata* Haw. = *Cyrtogyne dejecta* DC. = *C. undata* Haw.), veränderte, \S . t. k. Cap d. g. Hoffn.

fascicularis DC. (= *Crassula fascicularis* Lam.), büschelförmige, \S . t. k. Cap d. g. Hoffn.

flava DC. (= *Crassula flava* L. = *Kalosanthes flava* Haw.).

jasminea DC. (= *Crassula jasminea* Sims, = *C. jasmiflora* Haw. = *C. obtusa* Haw. = *Dietrichia jasminea* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes jasminea* Haw.).

media DC. (= *Crassula media* D. Dietr. = *Dietrichia media* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes media* Haw.).

odoratissima DC. (= *Crassula odoratissima* Andr. = *Dietrichia odoratissima* Tratt. = *Kalosanthes odoratissima* Haw.).

undosa Steud. (= *Cyrtogyne undosa* Haw., Dietr.), wellige, \S . t. k. Cap d. g. Hoffn.

undulata Steud. (= *Crassula undulata* Haw. = *Cyrtogyne undulata* Haw.), wellenförmige, \S . t. k. Cap der guten Hoffnung.

versicolor DC. (= *Crassula versicolor* Burch. = *Dietrichia versicolor* Eckl., Zeyh. = *Kalosanthes versicolor* Haw.).

II. *Danielia* DC.

albiflora DC. (= *Crassula albiflora* Sims, = *Cyrtogyne albiflora* Eckl., Zeyh.), weißblumige, \S . t. k. Cap der guten Hoffnung.

falcata DC. (= *Crassula falcata* W. = *C. obliqua* Andr. = *C. retroflexa* Meerb.).

perfoliata DC. (= *Crassula perfoliata* L.).

Rochelia Rchb. (Anton Rochel, Wundarzt u. ehemaliger Gartenmeister in Pesth, sehr thätiger Botaniker), V. I., *Asperifoliaceae*.

stellulata Rchb. (= *saccharata* Auct. = *Cynoglossum dispernum* L. fil. = *Lithospermum dispernum* L. = *L. retortum* Pall. = *Messerschmidia cancellata* Asso), sternförmige, \odot . f. Spanien, Griechenland, Ungarn, Podolien, Taurien, Sibirien.

barbata R. et S., *deflexa* R. et S., *Lappula* R. et S., *Redowskii* R. et S. etc., v. *Echinosperrum barbatum*, *deflexum*, *Lappula* etc.

Rodigia ailiata G. Don, *laevigata* Spgl., v. *Seriola laevigata*, cum variet.

Rodriguezia R. et P., *Rodriguezie*.

Batemanni Lindl., *Batemann's*, 4. w. Peru.

candida ? Lindl., weißglänzende, 4. w. Südamerika.

Rodriguezia

- ensiformis R. et P., schwertförmige, 4. w. Peru.
 lanceolata R. et P., lanzettförmige, 4. w. Peru.
 macrostachya ? Lindl., grofsährige, 4. w. Südamerika.
 recurva Lindl. (= *Gomezia recurva* RBr.), zurückgekrümmte, 4. w. Brasilien.
 secunda H. B. K., β) latifolia Hort. belg.
 stricta Steud. (= *Gomezia stricta* Spgl. = *Physanthera callistachys* Bertero), steife, 4. w. Jamaika. (Ob kultivirt?)
 suaveolens Lindl. (= *Pleurothallis foliosa* Hook.), feinriechende, 4. w. Brasilien.

Rodschiedia Bursa pastoris Flor. Wetter., v. *Cap-sella Bursa pastoris*, p. 158.

Roea Hügel, (= *Hügelroea* Steud.), Roea, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

linophylla Hügel, leinblättrige, 4. t. k. Neuholland.

Roella L., Roella.

- ciliata L. (= *reticulata* Lam., non L.).
 cinerea Alph. DC. (= *glabella* Banks, = *Campanula cinerea* Thbg., L. fil.), aschgraue, 4. t. Cap d. g. H.
 squarrosa Thbg., L. fil. (= *filiformis* Lam. = *rigidula* Banks).
 Thunbergii A. DC. (= *Campanula ciliata* Thbg. = *C. Thunbergii* R. et S.), Thunberg's, 4. t. Cap der guten Hoffnung. ¹⁾

filiformis Poir., non Lam., (= *glabra* Poir. = *recurva* Banks), v. *Lightfootia tenella*, p. 357, II., *pinifolia* Thbg. (= *compacta* Thbg. = *tenuifolia* Thbg.), v. *Merciera tenuifolia*, p. 399, II.

Roemeria Medic., DC., Roemerie.

bivalvis DC. (= *Glaucium mesopotamicum* Spgl.), zweiklappige, \odot . f. Mesopotamien.

Roemeria polygonoides Mch., v. *Amaranthus polygonoides*, p. 43.

Roemeria Thbg., *argentea* Thbg., *inermis* Thbg., v. *Heeria argentea et inermis*, p. 287, II., *melanophleos* Thbg., v. *Myrsine melanophleos*, p. 426, II.

Roemeria Zea, *Zea* R. et S., v. *Corycarpus arundinaceus*.

Roeparia pinifolia Spgl., v. *Ricinocarpus pinifolius*.
Roeslinia Mch., *angustifolia* G. Don, *decussata* G. Don, *frutescens* G. Don, v. *Orphium frutescens cum var.* p. 461, II., *baccifera* G. Don, (= *tetragona* Mch.), v. *Chironia baccifera*, p. 191.

Rohdea nutans Schult., *Tupistra* Schult., v. *Tupistra nutans et squalida*, p. 827.

Rohria Thbg., *cuneata* Thbg., *cynaroides* Thbg., *grandiflora* Thbg. (= *ilicifolia* Vahl), *incana* Thbg., *lanceolata* Thbg. (= *revoluta* Vahl), *obovata* Thbg., *palmata* Thbg., *spinosissima* Thbg., *monanthos* Thbg., v. *Berkheya cuneata*, *cynaroides*, *grandiflora*, *incana*, *obovata*, *palmata*, *spinosissima*, *uniflora*, p. 118 et 119, *ciliaris* Thbg., *patula* Thbg., *pectinata* Thbg., *sulcata* Thbg. etc., v. *Cullumia ciliaris* etc., p. 230 et p. 175, II.

1) *elegans* Paxt., v. Houtte, Lem., Scheidw., gehört kaum zu dieser Gattung.

Rokejeka capillaris Forsk. (= *deserti* Poir.), v. *Gypsophila Rokejeka*.

Romulea Bulbocodium Sebast. et Mauri, *Columnae* Sebast. et Mauri, *filifolia* Eckl., *Linairesii* Parlat., *ramiflora* Tenore, v. *Trichonema Bulbocodium*, *Columnae* etc., p. 817, *fragrans* Eckl., v. *Sparaxis fragrans*, p. 774, *minuta* Eckl., v. *Galaxia minuta*, p. 152, II.

Rondeletia Plum., Rondeletie.

americana L. (= *dichotoma* P.).

buxifolia Vahl, (= *Catesbaea inermis* Spgl. = *C. parviflora* Spgl. = *Ixora buxifolia* Spgl.), buchsbaumblättrige, ♀. w. Brasilien.

elongata Bartl., verlängerte, ♀. ♀. t. Mexico.

jasminiodora Makoy, jasminduftende, ♀. ♀. w. Südamer.

longiflora Cham., langblumige, ♀. w. Brasilien.

odorata Jacq. (= *coccinea* Moç., Sess. = *obovata* L. = *speciosa* Lodd.), wohlriechende, ♀. w. Cuba, Havana, Mexico.

β) *major* Hort. belg. 1)

triflora Vahl, (= *pilosa* Sw. = *Hedyotis longiflora* Spgl. = *Oldenlandia longiflora* Lam.), dreiblumige, ♀. w. Caribäen, Martinique.

Landia Spgl., v. *Mussaenda Landia*, p. 535 et p. 423, II., *paniculata* Roxb., v. *Wendlandia paniculata*.

Ropala Auct., v. *Rhopala*.

Roripa Scop., *amphibia* Spach, *armoracioides* Tausch, *austriaca* Spach, *Camelinae* Spach, *nasturtioides* Spach, *pyrenaica* Spach etc., v. *Nasturtium amphibium*, *armoracioides*, *austriacum* etc., p. 543 et 430, II.

Rosa T., Rose.

Acharii Billb. (= *pratensis* Sw.), Acharius's, ♀. f. Schweden.

acuta Fisch., spitze, ♀. f. Caucasus.

alba L. (= *Boreykiana* Bess. = *canina* L. var. K. = *cannabina* Pellet. = *digitaria* Bosc, = *usitatissima* Gater.), β) *carnea* Dum.Cours. (= ? *incarnata* Mill.).

Gartenvarietäten: *Agate magnifique*, *Agate Marie Louise*, *Agate nouvelle*, *Agate prolifère*, *Agate royale*, *Agate superbe*, *Agate Thalie*, *Angelin*, *Angélique*, *Astrée*, *Belle de Ségur*, *belle Henriette*, *Belle Thérèse*, *blanche a coeur vert*, *Cocarde*, *fausse unique* (cuisse de Nymphe en bouquets), *Félicité Parmentier*, *Florine*, *full double white*, *gracilis*, *Jeanne d'Arc*, *Marie de Bourgogne*, *Naissance de Vénus*, *Pompon Bazar*, *Pompon carné*, *Princesse Lamballe*, *Remarquable*, *rosea*, *Royale*, *Séduisante*, *semidouble white*, *Sophie de Bavière*, *Sophie de Marcilly*, *vix bifera* etc.

albiflora Steven, (= ? *alba* L. var. MB. = ? *montana* Steven), weißblumige, ♀. f. Taurien.

alpina L., var. *hybrida gracilis*.

amoena Waitz, Lk., liebliche, ♀. f. ?

amygdalifolia Sering., mandelblättrige, ♀. k. China.

Andrewsii Tratt. (= *inermis* Andr.), Andrew's, ♀. f. ?

1) L. van Houtte führt in seinen *Établissement horticole* 1846 p. 5 noch eine *species nova* mit folgender Bemerkung auf: „De la Havane, à longues fleurs jaunes; elle diffère toto coelo de la plante que M. Decaisne a déterminée sous le nom de *Bouvardia flava* (V. la Flore des serres et des jardins de l'Europe).“ Auch Makoy erwähnt selbige als „*species de la Havane*“.

Rosa

- arvensis Huds. (= *glauca* Dierb. = *montana* Vill.),
 a) *hibracteata* Bast., β) *repens* Scop., W. (= ? *fusca* Mch. = *ovata* Lejeune, = *procumbens* Sering. = *serpens* Wib. = *sylvestris* Herm. = *tuguriorum* W.),
 γ) *prostrata* DC., δ) *Ayreshirea* Sering. (= *capreolata* Neill), var. A fleurs pleines, A fleur blanches, rubra plena.
- Banksiae RBr., d) *alba plena*, e) *Diadème*, f) *lutescens spinosa*, g) *philadelphiflora*, h) *Roi de blancs*.
- blanda* Ait. (= *alpina* β *laevis* Red. = *cinnamomea* ζ *blanda* Red. = *corymbosa* Bosc, Poir. = *fraxinifolia* Sering. = ? *sinica* Dsf.), β) *Heritieriana* Red.,
 γ) *turgida* P. (= *fraxinea* W. = *fraxinifolia* Borkh. Dum.Cours. = *turneps* Hort. = *virginiana* Mill.).
- bracteata* Roxb., Wendl. (= *lucida* Lawr., non Ehrh.), var. *alba odorata*, *alba venusta*, *lucida duplex*, *Maria Leonida*, *Victoire modeste*.
- californica* Schtdl., *californische*, η . f. Californien.
- campestris* Dumort., *Feld-R.*, η . f. Belgien.
- camtschatica* Vent., *camtschatkaische*, η . f. Kamtschatka.
 β) *ferox* Ait. (= *echinata* Dupont, = *horrida* Bess., Fisch. = *kamtschatika* Redout. = *provincialis* MB.).
- canina* L. (= *Cynorrhodon* Wallr. = *polymorpha* Schimp. et Spenn.), var. *armata* Stev., *calycina* MB., *stipularis* Merat, *Swartziana* Afzel., Fr., *venosa* Sw., *verticillacantha* Desv., *Gloriette* Hort.
- carolina* L. (= *balearica* Dsf. = *corallina* W. Enum. = *corymbosa* Ehrh. = *elongata* Roess. = *enneaphylla* Rafin. = *euratina* Bosc, = *florida* Don, = *fraxinifolia* Roess. = *Hudsoniana* Redout. = *orthosepala* var. Schimp. et Spenn. = *palustris* Roess. = *pensylvanica* Mchx. = *virginiana* du Roi).
- caucasica* MB., β) *leucantha* MB. (= *canina* L. var. K.),
 γ) *montana* Steven.
- centifolia* L., var. *anemonoides* Thory, *apiifolia* W., *burgundica* P., *carnea* Dum.Cours., *caryophyllea* Poir. *hollandica* P., *lacteola* Waitz, *maxima* Dsf., *meldensis* Dum.Cours., *minor* Dum.Cours., *monstrosa* Hort., *nivea* Hort. *prolifera* Sering., *remensis* Dsf., *unguiculata* Dsf., *unica* Hort. etc.
- a) *genuina* (Rosiers Centfeuilles).
- Adèle Prévost, Carné ou Robin, Cristata, d'Anjou, Désirée Parmentier, Des Peintres (Rose), Diable Boiteux (Le), Duc de Brabant, Foliacée carnée, Grande Renoncule violette, Grand Maman, Horatius Coclès, Lieter, Lucile Mathieu, Madame A. Labbey, Mutabilis, Oillet, Pauline, Petite Hollande, Pompon de Bourgogne, Pompon a fleur blanche, Pompon Kingston, Princesse de Portugal, Reine des Centfeuilles, Reine des Pays-Bas, Seleron, Unique blanche, Unique panachée.
- b) *hybrida* (Centfeuilles hybrides).
- Adèle de Sénanges, Adeline ou Unique admirable, Admiration, Anais Segalas, Athénais, Bailly de Suffren, Bretonne (La), Chérie (La), Christine de Pisan, Clélie, Délices de Flander, Duc d'Angoulême, Duchesse d'Orléans, Duchesse d'Ursel, d'Yébles, Elisa Leker, Feu d'Enghien, Fiancée (La), Gloire de France (M.), Hypatia, Illustre Beauté, Inès de Castro, la Tour

Rosa

d'Auvergne, Laure, lilacea variegata, Madame Henriette, Madame Malibran, Mahieux, Nicolette, Petite beauté, Petite grenade, Pompon bizarre, Pompon de la Queue, Rachel, Salmacis, Simplicité (La), Sulkowski, Wilberforce, Zérah.

c) *muscosa* Ait. (Centfeuilles mousseuses).

A feuilles d'Agathe, A feuilles pourpres, A feuilles de Sauge, A feuilles luisantes, A gros fruits, Alice Leroy, Angélique Quétier, Asepala (oeillet), Blanche, Blanche Anglaise, Carnée, Celina ou la Gracieuse, Charlotte de Sor, de Colmar, Comtesse de Murinais, Commune, Cristata, de la Flèche, Diane de Colmar, d'Orléans, Ferrugineuse du Luxembourg, Flagellipetala, Globuleuse, Hélène Mauget, Lancel, Lansezeur ou Panaget, Louise Collet, Malvina, Marbrée (La), Mauget, Metz (de), minor ou gracilis, Mistriss Wood, Ordinaire, Oscar Foulard, Panachée pleine, Perpétuelle Mauget, Picciola, Pompon feu, Pompon Mousseux, Ponctuée, Pourpre, Précoce, Prolifère, Pyracanthe, rose foncé, rosinella, Rouge, Sanguine, Sans sepales ou Asepala, semi-double, Unique de Provence, Zoé.

d) *pomponia* Lindl., DC. (= *burgundica* P. = *provincialis* Ait.), (Rosiers provins).

Abbesse, Abeilard, Adèle Courtois, Adèle Heu, Adèle Lepetit, Adieu de bortier, Admirable, Adorée, A fleurs de rose-trémière de la Chine, Agathe de Montmorency, Agenor, Agnodice, Aimable Amie, Aimable Fanny, Aimée (rose), Alexandre Chartry, Alexandre von Humboldt, Alfieri, Alicia, Aline, Alcine, Alphonse de Coster, Alphonse de Lamartine, Althéer, Alvarès, Amarante (L'), Ambassadeur (L'), Amédée Fouquier, Amélie Mansfeld, Ami Derair (L'), Admiral Dupetit-Thouars, Amphitryon, André, André Fouquier, Antoine Dorimont, Apollon, Argus, Ariane, Ariel, Asmodée, Auristus, Avenant, Avocat Sauzet, Avocat Sirey, Bachelier, Baron de Vicq de Cumptich, Baronne de St. Cyr, Baronne de Stael, Baronne d'Ivry, beauté parfaite, beauté pourpre, beauté sauvage, Bellard (rose), belle Adélaïde, belle cramoisie, belle de Marly, belle des-brosses, belle dévide, belle d'Hyvré, belle d'Yèbles, belle Ecossaise, belle Elodie, belle Inconnue, belle Kaloos, belle Louisa, belle Octavie, belle Rosalie Delacroix, belle Rosine, belle Virginie, Benjamin Mary, Béranger, Bérénice, Berryer, Bijou des amateurs, Bizarre changeant, Blanche Hocédé, Blucher, Bonheur du jour, Bossuet, Bougainville, Boula d'Auteuil, Bouquet charmant, Brennus, Briséis, Buffon, Cadisché, Cagliostro, Cambronne, Camille-Desmoulins, Capitaine William, Caran jean, Cardinal d'Amboise, Casimir Bonjour, Caspar Hauser, Caura, Cellier, Cerise d'Orlin, Champion, Chapeau noir, Chapelain d'Aremberg, Charles de Mils, Charles Lemaire, Charlotte Corday, Charmante Louise, Chateaubriand, Chou (rose), Cicéron, Clorinde, Cocquereau, Colonel Loix, Columelle, comte de Nanteuil, comte d'Épernon, comte Foy (de Rouen), comte Lacépède, comte Walsh, comtesse Al-maviva, comtesse d'Alvilliers, Coq de Biez, Coq de Village, Cordon bleu (Le), Couleur de Brennus, Couronne d'Amour, Couronne des Roses, Couronne im-

Rosa

périale, Couronne tender, Cramoisi des Alpes, Cramoisi nuancé, Cramoisi velouté, Curé de Biez, Cuvier, Cimodocée, Cynthia, d'Aguesseau, Damoisel, Darius, Daubenton, Delaborde, du Maître d'École, Delauny, de Bortier, de Theux (rose), diable boiteux, Diderot, Didon, double brique, duc d'Aremberg, duc de Beaufort, duc de Bordeaux, duc de Guiche, duc de Guise, duc de Fitz James, duc de Trévise, duc de Valmy, Duchesse d'Abrantès, Duchesse d'Aremberg, Duchesse de Buccleugh, Duchesse de Berry, Duchesse de Nemours, Duchesse de Richmond, Duguesclin, Dumortier, Dupuytren, Eclat des Roses, Edouard Van Rullen, Eglé, Elisa de Vicq, Elisa Novella, Elisa Lemaire, Elodie, Emile Nelson, Enchanteresse, Enfant de France, Enfant de l'Ouragan, Ernest Bachelier, Ernestine Miellez, Eucharis, Eugène Janvier, Eugénie, Eurydice, Evelina, Evraerts, Extase (L'), Fanny Bias, Fanny Marshal, Félicité Ruelens, Ferdinand de Buck, Feu brillant, Feu de Buck, Fina Soetmans, Flora Prévost, Franklin, Gain d'Héverlé, Gazelle, Général Bertrand, Général Brias, Général Damremont, Général de Léry, Général Donnadiou, Général Junot, Général Moreau, Gendebien, Gentille (La), Gigantesque, Gérardon, Girodet, Gloire de France, Glorieuse (La), Gonzalve, Grande impériale, Grand cramoisi de Vibert, Grand Monarque, Grand Palais de Fontainebleau, Grand Palais de Laeken, Grande Renoncule, Grotius, Guillaume Tell, Harpagon, Hennequin, Hélène de Lobkowitz, Héliodore Dober, Helvétius, Henrion de Pansey, Henri V., Henri de Buck, Henri Fouquier, Henri Lemaire, Hercule, Hermione, Heureuse surprise, Hippolyte, Hybride van Rullen, Inconnu, Infante, Inflexible, Isoline, Jacques Dessailis, Jean, Jean de Puydt, Jean Bart, Jeanne Sellier, Jeanne Seymour, Jenny Duval, Jenny Vertpré, Jéricaut, Jolie Parmentier, Joseph Wattecamp, Joséphine Fouquier, Juanita, Juive (La), Juli d'Étanges, Juli Everaerts, Juliette, Justine, Lambert (rose), Laomédon, Latone, Lée, Legouvé, Leonel Desmoustier, Léopold I., Loisel, Lord Byron, Lord Londonderry, Louis Carlier, Louis Parmentier, Louis Philippe, Louis Philippe Fouquier, Louis van Tilt, Ma clochette, Madame Cottin, Madame Dacier, Madame Damoreau, Madame de Coster, Madame de Fabernier, Madame Deshouillères, Madame Desmoutiers, Madame Saportas, Madame Ville, Mademoiselle Berryer, Mademoiselle Montessu, Mademoiselle Sonntag, Maître d'École, Malesherbes, Malinois, Mariquita, Marguërite Lansezeur, Marie Antoinette, Marie Louise, Marie Tudor, Marjolin, Marquis de Dreux-Brézé, Marquise d'Exeter, Marquise de Trazegnies, Mathieu Molé, Maximilian d'Aremberg, Meunière de Senlis, Moïse, Moïse Parmentier, Montigny, Monthlyon, Napoléon, National, Nausica, Néala, Nec plus ultra, Nelly, Nestor, Ninon de Lenclos, Niobé, Noble cramoisi, Noble pourpre, Nouveau Feu, Nouveau Vulcain, Nouvel Evêque, Nouvelle Pivoine, Nouvelle Redouté, Nouvelle transparente, Oberlin, Olivier de Clisson, Olympe, Ombrée parfaite, Oracle du Siècle, Paganini, Palais de Laeken, Paméla, Pa-

Rosa

quita, Parthon de Von, Pergolèse, Perle de Brabant, Pérou de Gossart, Petite Orléanaise, Phararigus, Phœbus, Pierre Corneille, Pierre Janssens, Pierre Sterckmans, Pindare, Placidie, Président de Sèze, Prince Alexander, Prince Frédéric, Prince Normand, Poniatowski, Princesse de Siam, Professeur Michaux, Professeur Sterckmans, Provins éclatant, Prunelle (rose), Pucelle de Lille, Pucelle Jolie, Pucelle Sadeur, Quesné, Rebecca, Reine de Prusse, Reine des Amateurs, Reine d'Espagne, Revenante (La), Robert le diable, Roi d'Angleterre, Roi de France, Roi des Amateurs, Roi des Pays-Bas, Roi de Rome, Roi des Pourpres, Romulus, Rose de wez, Rose Foucheaux, Samson, Sanchette, Semis de Coster, Serinka, Simon Lebouck, Soeur hospitalière, Sophie Cottin, Splendens, Stéphanie Chevrier, Surllet de Chokier, Supérieure (rose), Surpasse tout, Surprise Hoebaerts, Sydonie, Taffin, Tatius, Tête de Maure, Théodolinde, Thérèse Lemaire, Tombeau de Napoléon, Tombeau des amateurs, Transon Gombault, Triomphe d'Aubey, Triomphe de Borgerhout, Triomphe de Flore, Triomphe de Louvain, Triomphe de Parmentier, Triomphe de Sterckmans, Triomphe de Vibert, Valenciennoise, Van Dyck, Vélonie, Velours d'Enghien, Velours noir, Veneux (rose), Véturie, Vicomte de Spoelberg, Villageoise parée, Vilmorin, Vingt-huit Juin, Vingt-sept Mai, Violette blanche (La), Violette de Canterbury, Violette incomparable, Virgile, Virginie, Walter Scott, Washington, Zénobie.

Aeltere: Abbé Robert, Adèle Gérard, Admirable (L'), Adrien, Aglaé Adanson, Agnès Sorel, Aimable Tastu, Admiral Coligny, Anacréon, Anémone du Luxembourg, Antonine d'Ormois, Aspasia, Bel Alexandre, Belle de Ségur, Blanche de Castille, Blanche fleur, Boule de Neige, Calaisienne (La), Clémence Isaure, Cléopâtre, Corinne, Cupidon, Desbordes Valmore, Duboys Des-sauzais, Duc de Luxembourg, Duchesse de Berry, Elisa Lemesle. Émérance, Félicité Parmentier, Flora, Grand Sultan (Le), Jeanne d'Urcé, Laetitia, Ledonau le Blanc, Lisbeth, Madame Asselin, Madame Campan, Madame Dubarry, Madame Fontaine, Madame Sadeur, Madame Sommeson, Mélanie Waldor, Mon Protocole, Nouvelle Rose-Pavot, Odette de Champdivers, Princesse Clémentine, Reine des Belges, Sophie de Bavière, Théodora, Vestale (La), Ville de Londres (La).

e) *pomponia striato-punctata* (Rosiers provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées et panachées).

Abbé Berlèze, Agamède, Agar, A feuilles et fleurs marbrées, Aimable Henriette, Alcine, Anacréon, André Thouin, Anna Czartoriska, Antiope, Aréthuse, Artémise, Arlequin, Bance, Beauté de la Malmaison, Belle de Fontenay, Belle Esquermoise, Belle Herminie, Bizarre marbrée, Baron Louis, Camayeux, Casseret foncé, Catinat, Cosimo Ridolfi, Changeante (La), Château de Namur, Comte de Murinais, Cramoisi picoté, Cuvier, d'Assas, Delphine Gay, Donna Sol, Duc de Basano, Duc de Nemours, Duc d'Orléans, Eulalia Lebrun,

Rosa

Euphrasie, Fanny Essler, Fatime, Fénélon, Fontenelle, Fornarina, Gil blas, Hospital (L'), Hersilie, Hortense de Beauharnois, Hypatia, Insigne d'Estèkles, Iphigénie, Isabelle de Lorraine, Jeanne de Laval, Jeanne Hachette, Jean Bart, Kettley, Lavoisier, Lucile Duplessis, Lycoris, Madelon Friquet, Malesherbes, Minos, Monime, Nelson, Nouvelle rubannée, Oeillet parfait, Omphale, Othello ou Maure de Venise, Pañachée a fleurs pleines (rubannée), Panaché (Vibert), Panaché a fleurs doubles, Phénice, Pourpre strié de blanc, Régent (Le), Renoncule ponctuée (Vibert), Rosemary, Rouget de L'isle, Royale marbrée, Sombreuil, Ste. Adelgonde (rose de), Sthéphanie Chévrier, Talbot, Tibule, Tricolore de Flandre (Van Houtte), Tricolore de Wazemmes, Tricolore ou Reine Marguèrite, Tricolore (Vibert), Triomphe de beauté, Tulie, Uniflore marbrée, Violette de Douai.

cinerascens Dumort., aschfarbige, *h. f.* Belgien.

cinerea Sw. (= *cinnamomea* L. var. Sogl.), aschgraue, *h. f.* Schweden.

cinnabarina Wrede, zinoberfarbige, *h. f.* ?

cinnamomea L. (= *acuminata* Sw. = *aristata* Lapeyr. = *collincola* Ehrh. = *fluvialis* Flor. dan. = *majalis* Retz, Herrm. = *mutica* Flor. dan. = *orthosepala* γ Schimp. et Spenn. = *spinosissima* Whlbg.), β) *foecundissima* Münchh., γ) *turbinella* Sw., δ) *gemella* W. (= *dahurica* Pall.).

clinophylla Redouté, (= *cinnamomea pallida* Sering.), geneigtblättrige, *k.* ? Ostindien.

Clusiana Waitz, (= *blanda* Ait. var. ? Rchb.), Clusius's, *h. f.* ?

collina Jacq. (= *canina* L. var. Desv., K., DC. = *campestris* Sw.). Var.: *bractescens* Woods, *caucasica* MB., *fastigiata* Bast., *flexuosa* Rau, *Friedländeriana* Bess., *glandulosa* Bess., *non Bell.*, *humilis* Bess., *Jundzilliana* Bess. (= *Jundzilli* MB.), *leucantha* MB., *nitidula* Bess., *platyphylla* Rau, *psilophylla* Rau, *puberula* Desv., *Ratomsciana* Rau, *Ravi Tratt.*, *trachyphylla* Rau.

concaevifolia Waitz, Lk., hohlblättrige, *h. f.* ?

concinna Hort., Hamb., nette, *h. f.* ?

coriifolia Fr. (= ? *calycina* MB. = *canina fulgens* Leineunier, = *canina grandiflora* Red. = *collina* γ Whlbg. = *crassifolia* Liljebl. = *sepincola* Sw. = *sepium* Sw.).

cuspidata MB. (= *pseudorubiginosa* Lejeun. = *spinulifolia* β Foxyana Thory Red. = *tomentosa* Sm. var. K.).

damascena L. (= *belgica* Mill. = *bifera* P. = *calendarum* Borckh. = *gallica portlandica* Bosc, = *menstrua* Andr. = *myropolarum* Duham. = *semperflorens* Dsf., non Curt.), α) *coccinea* Red. et Thor., β) *officinalis* Ser., γ) *variegata* Ser.

Gartenvar. α) (Rosiers des quatre saisons et Portlands dits Perpétuelles.

Adrienne, Antinous, Belle Fabert, Belle Italienne, Bernard, Bifera venusta, Bigard, Billiard, Carmin royal, Claire du Chatelet, Coelestine, Couronne de Béranger, Damas monstrueux ou la Magnanime, Dame Rose, d'Angers, de Rennes, d'Esquermes, du Roi (rose),

Rosa

du Roi strié, Duc d'Enghien, Ebène, Emilie Duval, Ernestine Odiot, Fanta, Féburier, Ferox, Florin, Foulard, Gentilhomme, Gracieuse, Grand Papa carré, Gris cendré, Isaure Lablé, Jenny Audio, Joséphine Antoinette, Lady Seymour, Laurence de Montmorency, Lodoiska Marin, Loïsa Puget, Madame Aimée, Madame Féburier, Madame Tellier, Marie Denise, Marjolin, Mienne (La), Minerva, Mogador ou rose du Roi, Momus, Monstrueuse, Montmorency (De), Noël, Odeur (A) de Jacinthe, Page (Le), Palmyre, Palotte picotée, Pauline de Mondeville, Philippe I., Phoebus, Portland blanc ou Quatre-Saisons magnifique, Portland double, Portland pourpre, Portland rose a grandes fleurs, Preval, Prince de Galles, Prud Homme, Pulchérie, Quatres-Saisons a feuilles bullées, Quatres Blanc, Quatres mousseux, Quatres Rose, Reine des Perpétuelles, Réquien, Saint-Barthélemy, Saint-Fiacre, Surpasse Antinous (Thierry), Taffin, Thiers, Torrida, Van Mons, Waratah, Zelpha.

b) Rosiers Damas.

Admirable bordée rouge, Angèle, Arlinde, Atala, Atlante (*Damas hybride*), Blanche Davillers, Blanche Hocédé, Bouvet, Calypso, Cardinal d'Amboise, Césonie, Comtesse Odouard, Constance (La), Déesse de Flore, Douceur (La), Duc de Sussex, Elise Voïart, Fiancée (La), Léda, Les 221 de 1830, Les trois Mages, Louis XVI., Madame Deshouillères, Madame Hardi du Luxembourg, Madame Lambert, Madame Zoutmann, Malvina, Marguèrite de Flandre, O'Eillet parfait, Pénélope, Pompon Toussaint, Princesse Amélie, Princesse de Portugal, Rose Verhux, Sémiramis, Soyeuse (La) ou Grand Edouard, Triomphe de Rouen, Ville de Bruxelles (La).

dumetorum Thuill. (= *affinis* Rau, = *agrestis* Rau, = *arvensis* Wib. = *Borreri* Woods, = *Forsteri* Sm. = *laciniata* Lejeun. = *platyphylla* Rau, = *sepium* Borckh. = *solstitialis* Bess. = *sylvestris* Schultz, = *umbellata* Lejeun. = *uncinella* Bess.), var. *sylvestris* Rehb.

erubescens Andr., bleichrothe, *h. f.* ?

Fischeriana Bess., Lk., Fischer's, *h. f.* Rufsländ.

flexuosa Rafin., (non Rau), (= *Rafinesqueana* Tratt.), hin- und hergebogene, *h. f.* Nordamerika.

fragariaefolia Sering., erdbeerblättrige, *h. k. f. b.* China.

gallica L. (= *varia* Schimp. et Spann.). Var.: *agrestis* Gmel., *arvina* Rau, *basilica* Roess., *belgica* Mill., *bourbonica* Roess., *Candolleana* Thor., *cardinalis* Lawr., *cordifolia* Hort., *episcopalis* Hort., *formosa* Roess., *geminata* Rau, *Mundi* Hort., *papaverina* Mch., *Pollianiana* Spgl., *praenaestina* Mill., *striata* Wrede, *versicolor* Hort. β *pumila* Jacq. var. *cuprea* Jacq., *holosericea* Roess., *humilis* Tausch, *Makeka* Dupont., *mutabilis* Dum. Cours., *olympica* Don, *sanguinea* Roess. etc.

glaberrima Dumort., kahlste, *h. f.* Belgien.

glabra Andr., kahle, *h. f.* ?

globosa Rafin., kugelblumige, *h. f.* Nordamerika.

Gmelini Bunge, (= *canina* Sievers), Gmelin's, *h. f.* Sibirien.

Rosa

Grevillei Hort., Greville's, f. f. China.

Hystrix Lindl. (= *nivea* DC.).

inodora Fr., Hook. (= *Borreri* Woods, = *dumetorum* Sm. = *grandiflora* Wallr. = *rubiginosa inodora* Fr.), geruchlose, f. f. Europa.

Lawrenceana Sweet, (= *semperflorens minima* Sims).

Var.: Blanc, de Chartres, Désirée (La), Dieudonné, Gloire des Lawrenceanas (La), Jenny, Laponne (La), La Mouche, Miniature (La), Multiflore, Pompon ancien, Pompon Bijou, Pourpre brun, Retour de Printemps.

Lindleyi Spgl. (= *caroliniana* ε Ait. = *laxa* Lindl. = *pseudolucida* Bess.).

microphylla Roxb. Var. (Rosiers microphylls ou à petites feuilles), Ancien à fleurs pleines, Pourpre ancien, Pourpre du Luxembourg, Rose cendrée, Triomphe de Macheteaux.

moschata Mill. Var.: Comtesse de Nassau, Comtesse Platre (La), Double ancienne, Nantaise (La).

multiflora Thbg. (= *florida* Poir., Curt. = *floribunda* Hort. = *prolifera* Hort.).

a) Rosiers multiflores.

A fleurs blanches, Coccinée, de la Grifferaie, Graulhié, Laure Davoust, Rose.

b) Rosiers multiflores Américains.

Beauté des Prairies, Rubifolia elegans, Rubifolia purpurea, Rubifolia superba, Rubifolia belle de Baltimore.

purpurascens Fisch., purpurfarbige, f. f. Sibirien.

Raffinesquii Sering., Raffinesque's, f. f. Nordamerika.

Redowskyana Bess., Redowsky's, f. f. Sibirien.

Roxburghii Hort. (= *alpina* Pall. = *Candolleana* DC. = *pendulina* Roth, = *polyphylla* W.), Roxburgh's, f. f. England.

rubiginosa L. Gartenvariet.: double massy sweet briar, double red sweet briar, double rosy sweet briar, double rosy sweet briar, double tree sweet briar, eglantine sweet briar, Eglanteria alba, evergreen sweet briar, large blus sweet briar, maiden sweet briar, Mannings sweet briar, monstrous sweet briar, royal sweet briar, scarlet sweet briar, semidouble dwarf, semidouble white sweet briar etc.

rugosa Thbg., runzelige, f. k. Japan.

rupicola Fisch., Felsen-R., f. f. Altaisches Sibirien.

semperflorens Curt. (= *indica* L. var. Auct. = *longifolia* W. = *sinica* Sm.). Var.: Noisettiana Red. (= *paniculata* Hort. Genev.), odoratissima Swt. (= *Thea* Hort) etc.

Hybriden: a) Rosiers Bengales.

Abbé de Lacroix, Abbé Mioland, A bois strié, Adeline Come, A feuilles luisantes, A odeur d'Anis ou EGINE, Aimé Plantier, Aîné Desprez, Alcine, Alphonsine, Amiral de Rigny, Amiral Duperré, Anaïs, Annette Gysels, Antoinette d'Orgot, Archiduc Charles, Arsinoé, Assuérus, Atropurpurea, Augustine Hersant, Azaïs, Baronne Delaage, Beau Carmin du Luxembourg, Beau Narcisse, Belle de Monza, Bernard de Monthyon, Bleu de la Chine, Boisnard, Bolivar, Bonheur du jour, Bouquet

Rosa

des Dames, Brillant Email, Buret, Caméléon (Desprez), Camellia (Lelieur), Camellia (Orly), Camelliaeflora, Camoens (Le), Carmin du Luxembourg, Carmin d'Yèbles, Caryophyllata, Charles Maurice, Charmante (La), Clara, Clarisse, Comble de Gloire, Comtesse de Méloré, Confucius, Conquête heureuse, Couronne des pourpres, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, d'Allemagne (rose), Darius, David, de Créqui, Desfontaines, Don Carlos, Doux Espoir, Duc de Bordeaux, Duchesse de Kent, Elisa Mercoeur, Etna (L'), Eugène de Beauharnois, Eugène Hardy, Fabvier, Fanny Duval, Faucheux, Fénélon, Fénélon (du Luxembourg), Flore, Fraiche Elisa, Frédéric Weber, Futardo, Général Lowestine, Général Soyer, Général Gerson, Gloire de Modeste, Gloire de Peley, Gouvion de St. Cyr, Gracilis, Grandidier, Hanneloup, Hardi, Henriette, Henry V., Hermine, Hermite, Hortensia, Hospitalière, Hippolyte, Icteros, Indica superba, Isidore (d'Angers), Jacques Plantier, Jeanie Deans, Jean Marie, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Joubert, Jules Janin, Lacépède, Lemesle, Léonidas, Louis XII., Louis Philippe (d'Angers), Lucile, Madame Bréon, Madame Bureau, Madame de Créqui, Madame Desprez, Madame Desrongé, Madame Fries Morel, Marjolin (du Luxembourg), Marquis de las Marismas, Mars, Maxima rosea, Mazerati, Menès, Miellez, Miranda, Mistriss Clarendon, Modeste, Molière, Mont St. Bernard, Mousseaux, Némésis, Paillet, Parfaite (La), Pajol, Parure de flore, Pépin, Perfection, Petite Nini, Philippe I., Pluton, Pompon Parfait, Pourpre (Lelieur), Prince Charles (Luxembourg), Prince Eugène (Luxembourg), Régulière (La), Reine Blanche, Reine de Lombardie, Rhadamiste, Roi des Belges, Roi des Pourpres, Romain Desprez, Roméo, Rouge transparent, Rubens, Saint-Priest de Breuze, Saint-Samson, Sanguin, Snelgrave, Superba ou belle Marguérite, Superba purpurea, Superbe (La), Superbissima, Taglioni, Tancrede, Thérésia Stravius, Thétis, Triomphant, Triomphe des Bengales, Triomphe de Gand, Unique, Valentina, Vésuve (Le), Victoire (d'Angers), Victoire d'Aumy, Vincent Couturier, Virginale, Virginie Lebon, Zèlie, Zirko.

b) Rosiers Noisettes.

A grandes fleurs pourpres, Aimable Fanny, Aimée Vibert, Anatole de Montesquieu, Anémone du Luxembourg, Antonine, Angelica, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Belle Sarah, Bernard, Biche (La), Bizarre, Blanche de Chatenay, Blanche d'Orléans, Bougainville, Boulogne, Bourdon blanc de Chatenay, Camellia (rose), Charles X., Chloris, Chromatelle (Cloth of Gold), Clara Wendel, Clarisse Harlowe, Comtesse de Tolosan, Comtesse Orloff, Coronis, Corymbosa, Désiré Roussel, Despalais, Desprez, Donna Maria, Duc de Nemours, du Luxembourg (rose), Ducreux, Edmond Garat, Elisa Lemaire, Eugène Pirolle, Eugénie Dubourg, Euphrosine, Fellemborg, Fleur du jeune age, Galaxie, Halingen (D'), Henri, Holopherne, Jeanne d'Arc, Jules Deschiens, Julie de Loynes, Julienne Lesourt, Juliette, Lactans, Lady Stanhope, Lamarque, Lascaris, Lée,

Rosa

Lerby, Maculée de Buret, Madame de Chalogne, Madame Guérin, Madame Jouvain, Majestueuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons, Monstrueuse, Morphée, Narcisse, Némésis, Nymphé Echo (La), Ophiric, Paniculée, Pauline, Pauline Henry, Petit, Philomèle, Pourpre de Tyr, Princesse d'Orange, Pumila, Rotanger, Similor, Solfatare, Spectabilis, Tendresse (La), Théobaldine, Uranie, Victoire d'Aumy, Victorieuse (La), Vitellina, Zobéide.

c) Rosiers thés ou rosiers de l'Inde.

Abricotée, Adam, Adelina Camille, Afranie, A grandes fleurs, Albion, Alexandre Rohard, Aline, Amona, Anthérose, Arabella, Arance de Navarra, Archinto, Archiduchesse Thérèse Isabelle, Aurore, Barbot, Bardou, Bause, Belle Allemande, Belle Archinto, Belle Fédore, Belle Georgine, Belle Mélanie, Belle Traversi, Bergmann, Besnier, Blanc Lelieur, Bocage, Boidron, Bou Silène, Bougère, Bourbon, Boutelaud, Boutrand, Buret, Caennaise (La), Caroline, Cassio, Charles V., Charles Raybaud, Chevalier d'Amour, Chrysocome, Clara Sylvaia, Clarisse Desarbres, Claudia Gourd, Comte de Paris (Luxembourg), Comte d'Osmond, Corinne, Curieuse (La), Delicatissima, Delphine Gaudot, Desfontaines, Devoniensis, Douceur d'Henri IV., Duc de Grammont, Duc d'Orléans, Duchesse de Kent, Duchesse de Lavallière, Duchesse de Mecklembourg, Duchesse d'Orléans, d'Yèbles, Eclair de Ju, Élixa Mercoeur, Élixa Sauvage, Esther Duval, Eugène Hardy, Eugénie Desgaches, Eugénie Jovin, Fanny Boytd, Favorit, Fiancée d'Abidos, Flavescens, Fleur de Cypris, Floralie, Fragoletta ou Roi des Belges, Framina vera, Galathée, Gama, Général Valazé, Général Vallée, Georges Sand, Gigantesque, Gonda, Goubault, Grandidier, Guillaume II, Hamon, Hétéroclite, Honneur de Flandre, Hortensia, Hyménée, Jaunatre, Jaune ancien, Jeune Arcole, Joseph, Joséphine Malton, Jules Félice, Julie Massais, Lady Palmer, Lady Warender, Lawson Gower, Lebreton, Lucile Dubourg, Lutescens mutabilis, Lyonnaise, Madame Astaix, Mad. Chavant, Mad. de Rohan, Mad. Dupuis, Mad. Féray, Mad. Goubault, Mad. Guérin, Mad. Jacqueminot (du Luxembourg), Mad. la princesse Adélaïde, Mad. Roussel, Mad. Tissot, Mad. Villerand, Mademoiselle de Salvandy, Magnus Ladulus, Malibrant, Malmort, Mansais, Maréchal Bugeaud, Maréchal Vallée, Marguèrite, Marie de Médicis, Ma tante Aurore, Maximilien, Mélesville, Merlet de Laboulay, Mirabilis, Moirée, Mondon, Morphée, Narcisse (*Mansais*), Néreïde (La), Nid d'Amour, Nina, Niphétos, Nisida, Nitida, Olympie, Originale, Orphaline, Pactole (Le), Pair de France, Paris, Pauline Plantier, Pellonia, Pépin le Bref, Perfection, Pharaon, Prince d'Esterhazy, Princesse Adélaïde du Luxembourg, Princesse Charlotte, Princesse Hélène (Luxembourg), Princesse Marie, Stéphanie, Reine de Golconde, Reine de Paestum, Reine des Belges, Reine Victoria, Rénommée (La), Rêve de Bonheur, Romain, Rose du Luxembourg, Rubis, Safrano, Scholastique, Sémélé, Silène, Smith, Soliman, Solitaire, Souvenir du 30. Mai, Strombio, Sylphide (La), Taglioni, Thémistocle, Thouin,

Rosa

- Triomphe de la Guillotière, Triomphe du Luxembourg, Valentine, Vandaël, Venusta, Victoire modeste, Victoria, Virginie, Walter Scott.
- sempervirens L. (= *fusca* Flor. Wetter. = *prostrata* DC.).
 β) Leschenaultiana Redout. (= *Wallichii* Sabine).
 Var. (Rosiers toujours verts): Adélaïde d'Orléans, Blanc a fleurs pleines (Vibert), Donna Maria, Félicité Perpétuel, Madame Plantier, Princesse Louise, Princesse Marie, Rose de Laffay.
- sepium Thuill. (= *balsamea* Bess. = *glutinosa* Schultz, = *Kluckii* Bess. = *resinosa* Lej. = *rubiginosa glabra* Rau, = *rubiginosa resinosa* Wallr. = *rubiginosa sepium* Sering. = *stipularis* Merat), Zaun-R., f. f. Europa. Serafinii Visiani, (= *rubiginosa* L. var. Spgl.), Serafini's, f. f. Corsica.
- serrulata Rafin., sägezähnlige, f. f. Nordamerika.
- setosa Bess., Lk., borstige, f. f. Podolien.
- sicula Trattin., sicilianische, f. f. Sicilien.
- Sielverhielmii Hort. Petropol., Sielverhielm's, f. f. Sibirien.
- sinica RBr. (= *macarthea* Dum.Cours).
- soongarica Bunge, soongarische, f. f. Soongaria.
- spinosissima L., δ) sanguisorbaefolia Donn, (= ? *sorbifolia* Hort.). Var.: hispida argentea Redout., Candolleana flavescens Redout. — (Rosiers pimpreuelles) Blanche double, Cénomane (La), Estelle, Jaune double, Scotch perpetual, Stanwell, Victoria. — (R. Pimpreuelles hybrides), Gracieuse (Peltier).
- sulphurea Ait. Var.: Ancien Jaune a fleurs doubles, Minor ou Pompon jaune.
- tomentosa Sm. (= *Borkhausenii* Tratt. = *polymorpha tomentosa* Schimp. et Spenn. = *villosa* Auct., non L.).
- Ventenatiana Redout., Ventenat's, f. f. ?
- Wallichii Sabine, Wallich's, f. k. Ostindien.
- Webbeana Wall., Webb's, f. k. Ostindien.
- Wilsoni Don, Wilson's, f. f. England.
- Wolfgangiana Bess., Wolfgang's, f. f. Galicien.
- Wulffenii Tratt., Wulffen's, f. f. Kärnthen.
- Unbestimmtere: Belladonna Hort., Clusiana Waitz, concinna Hort., echinata Waitz, Lk., elliptica Tausch, (= *rubiginosa* Guimp.), georgina Hort. Hamb., grisea Wrede, hemisphaerica Spgl., Hillebraudtii Weitenw., hispanica Mill., Krockeri Tratt., japonica Waitz, (= *multiflora* Auct.), Leana Swt., Longii Swt., maritima Wrede, marmorea Roess., massiliensis Hort., Maukschii Schult., Ungarn, miniata Wrede, minuta Hort. anglor., missourensis Hort., muricata Waitz, polyantha Roess, Portenschlagiana Tratt. (= *alpina* L. var. Wallr.), praecox Hort. angl., procera Hort., Sibirien, pubescens Fisch., pyramidalis Wrede, ranunculiformis Hort., reclinata Hort., repanda Hort. angl., Schottland, Roxburghii Hort., rubricans Roess. (= *reginae* Hortul. = *virginialis* Wrede), rubripetala Roem., ruficaulis Ehrh. (= ? *portlandica* Hortul.), Russeliana Hort. Lond., simplex Scopol. (= *Scopoliana* Tratt.), Sprengeliana Tratt. (= *virginica* Curt., Spgl.), subalba Hort., China, superbissima Waitz, sylvatica Tausch, Böhmen, teneriffensis Hort., trichocarpa Waitz, verecunda Waitz, (= *damasena* Mill. var. ?), Waitziana Rchb., versicolor et violacea Hort. (var. R. gallic.).

Hybriden verschiedener Abstammung, welche man unter folgende Abtheilungen gebracht hat:

I. Topfrosen.

A. Rosiers perpétuelles de l'Île Bourbon.

Abbé Plantier, Abrabanelle, Acidalie, Aliza, Alfred Colomb, Amarantine, Aménaïde, Amourette, Anaïs (R. Thibaut), Anomala, Antoine, Armanda, Astaroth, Astérodié, Auguste de Chalonges, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Béluze, Belzunce (Dorizy), Bizarine, Bossue, Bouquet de Flore, Bréon, Cardinal Fesch, Carnée de Montmorency, Célimène, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cérés, Charles Desprez, Charles Souchet, Charméide, Chatenay, Clémentine, Comice de Seine et Marne, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comte de Troyes, Comtesse de Colbert, Cythérée, Delamartine, Delille, Desgaches, Deuil du duc d'Orléans, Docteur Blandin, Docteur Roques, Don Alvar, Duc de Chartres, Duc de Grammont, Dumont de Courset, Dupetit Thouars, d'Yèbles, Edouard Desfossé, Elvire, Emile Courtier, Emile Plantier, Enfant d'Ajaccio, Fafait, Faustine, Féдора, Fin Rubis, Fleur de Nérium, Gantin, Georges Cuvier, Gloire de la Guillotière, Gloire de Paris, Hennequin, Henri Lecoq (Lacharme), Henri Plantier, Hermosa, Hersilie, Ida Percot, Ida Sisley, Impératrice Joséphine, Jacquard, Joséphine Garnier, Julie de Fontenelle, Julie de Loynes, Julie Sisley, Justine (Rousseau), Lavinie d'Ost, Lady Canning, Le Camée (Béluze), Le Creps, Le Grenadier, Lord Grey, Louis XIV., Lychas (Guillot), Madame Angéline, Mad. Aubis, Mad. Aude, Mad. Desprez, Mad. Hobetz, Mad. Lacharme, Mad. Margat, Mad. Nérard, Mad. Plantier, Mad. Rachel, Mad. Tripet (Margottin), Madeleine, Mademoiselle de Montesquiou, Manteau de Jeanne d'Arc, Maréchal de Villars, Maréchal du Palais (Béluze), Marianne, Marie Duleau (Renard Courtin), Marquis de Moyria (Lacharme), Marquis d'Ossey (Boyau), Marquise d'Ivry, Meldoise (La), Menoux (Lacharme), Méris, Miss Fanny, Mistriss Bosanquet, Mistriss Lane, Napoléon, Néphis (R. Thibaut), Nérine, Neumann, Nicolas Rollin (Dorizy), Ninon de l'Enclos, Palatine, Pallas (R. Thib.), Panachée (R. Thib.), Pandore (R. Thib.), Parfaite (La), Parquin, Phoenix (Le), Paul Joseph, Pauline Leclerc, Pierre de St. Cyr, Pourpre Fafait, Prémices des Charpennes (Et. Armand), Prince de Croy, Prince de Salm, Princesse Clémentine, Princesse de Joinville, Proserpina, Reine des Îles-Bourbon, Reine du Congrès, Rémond (Sylvain Jean), Roblin, Sepintarns (Guillot), Souchet, Souvenir d'Anselme, Souvenir de la Malmaison, Souvenir de Dumont d'Urville, Stavius, Terenta, Thérèse Margat, Thérésita, Triomphe de la Guillotière, Triomphe de Plantier, Valérie, Véléda, Vicomte de Cussy (Margottin), Victoire argentée, Virgile, Zélinda, Zuléma.

B. Rosiers hybrides remontants.

Abbé Raynal, Aricie, Aubernon, Augustine Mouchelet, Baronne Prévost, Blanche Lamouroux, Clémentine Duval, Clémentine de Neuilly, Comte de Paris, Comte d'Eu, Comtesse Taneguy Duchatel (Laffay), Coquette

Rosa

de Montmorency, Coquette de Bellevue, Descrivieux, Deuil de l'amiral Dumont d'Urville, Docteur Jobert, Docteur Marjolin, Docteur Marx, Duc d'Alençon, Duc d'Aumale, Duchesse de Montmorency, Duchesse de Nemours, Duchesse de St. Quentin, Duchesse de Sutherland, Edouard Jesse, Elisa Balcombe, Enfant d'Ajaccio, Ernestine de Barante, Fulgorie, Général Merlin, Gloire de Guérin, Julie Dupont, La Bouquetière, Lady Elphinstone, Lady Alice Peel, Lady Fordwich, Lane, La Reine, Laure de Montmorency, Liliacée (Lacharme), Louis Bonaparte, Louis Napoléon, Louis XIV., Madame Damême, Mad. Daresmes, Mad. Emma Dampierre, Mad. Jobez Desgaches, Mad. Laffay, Mad. Lucy Astaix, Mad. Morel, Mad. Oudin, Maréchal Soult, Marjolin, Marquis d'Ailsa, Marquesa Boccella, Mélanie Cornu, Mérope, Miroir (Le), Mistriss Cripps (Laffay), Mistriss Elliot, Newton, Pauline Plantier (Clémentine Seringe, Baronne Aymer, Mistriss Wood), Pauline Levaneur, Perpétuelle indigo (Laffay), Perpétuelle de Neuilly, Perpétuelle ponctuée (Laffay), Prince Albert, Prince Bonaparte, Princesse de Salerne (Margottin), Princesse Hélène, Prudence Rieser, Reine de Fontenay, Reine de la Guillotière, Reine de Lyon, Reine Victoria, Renoncule (La) (Margottin), Rivers, Roch Plantier, Rose de la Reine, Sisley, Talbot, Thibault, Yolande d'Aragon.

C. Variétés ayant rapport aux rosiers de l'île Bourbon.

Cadoudal (Dorisy), Duc d'Isly (Lacharme), Madame Gros.

D. Variétés ayant rapport aux Portlands ou Perpétuelles.

Amanda Patenote (Vibert), Cornet (Lacharme), Lindley (Oudin, aîné et fils), Madame Verdier (E. Verdier, fils), Mardonius (Béluze), Reine du Matin (Béluze), Renufe d'Osmond (Cornu).

II. Landrosen.

A. Rosier hybrides incertains.

Agathe Porukez, Amandine, Ancelin (rose), Blanc de M. Dubus, Catherine Guislaine, Charles Fouquier, Comtesse Lacépède, Comtesse Plater, Emmeline, Géorgienne (La), Hélène Maret, Michaela, Reine de Belges (La), Sextus Pompilius, Targélie.

B. Rosiers hybrides de Bengale.

(non remontants).

Abondante, Adèle Ancelin, Adolphe Cachet, A fleurs blanches, Alphonse Maille, Alzire, Ami Decoster, Amiral de Rigny, Ancelin, A odeur d'Anisette, A odeur de Pate d'Amandes, A pétales frangés, Archevêque de Besançon, Arpajon, Aspidie, Assuérus, Anzou, Beauté du jour, Bellard, Belle de Parny, Belle de Rosny, Belle d'Yvrée, Belle Ecossaise, Belle Hélène, Belle Héloïse, Belle Thuraite, Béquet, Béranger, Bombelina, Bonne Geneviève, Brennus, Camuzet carné, Célestial, Charles Louis, Chateaubriand, Claude Lorrain, Clef d'or, Colonel Fabvier, Comte Coutard, Comte de Breteuil, Comte de Colbert, Comtesse de Lacépède, Comtesse de Montalivet, Cornélie, Coupe d'Hébé,

Rosa

Couture, Dandigné de la Blanchaie, Daubenton (Laffay), Dauphine, David (Vibert), DeCandolle, Delaage, Delaborde, Desmarchais, Deuil du maréchal Mortier, Docteur Billiard, Dollon, Duc de Choiseuil, Duc de Devonshire, Duc de Richelieu, Duc de Sussex, Duchesse de Montebello, Duvivier, Edelmonde, Edouard van Maelen, Ernest Féray, Eucharis, Euphrosine, Eynard, Fenner, Ferdinand St. Esseille, Fleurette, Flora Mac-Yvor, Fontaine Yolande, Fraiche Erigone, Frédéric de Prusse, Général Athalin, Général Bernard, Général Dauménil, Général Kléber, Georges IV., Georgine, Gloire de Colmar, Gloire des Helènes, Gloire d'un parterre, Grand Edouard, Grand Hubert, Henri Barbet, Hortense Leroi, Hortensia, Jacques, Jeanne Seymour, Kléber, Lady Stuart, Laharpe, Lascases, Lastente, Le 29. Juillet, Lord Kelt, Lord Nelson, Louis Grand, Luxembourg, Madame Poncey, Magnagnime, Magna rosea, Marbrée, Maréchal Duroc, Maréchal Lannes, Maréchal Mortier, Marie de Champ-louis, Météore (Le), Miralba, Miss Rosalie, Mistriss Rivers, Moyenne, Manteau de l'Évêque d'Angers, New white, Ninon, Noémi, Nubienne (La), Pallagi, Parny, Petit Pierre, Plantier, Ponceau Capiaumont, Poncey, Pourpre (rose), Quintinie (La), Reine des Belges, Reine des Hybrides, Richelieu, Rodriguez, Roi des Hybrides, Sans égale, Saphirine, Sauteur, Tragélie, Titus, Vandael, Vanhuissen, Vauban, Velours épiscopal, Vibert, Violette Billard, Violette sans Aiguillon, Volney, Zelinada, Zéphyrine.

C. Rosiers hybrides de Noisettes.
(non remontants).

Adolphe, A fleurs blanches, Belle Parabère, Briséis, Claire d'Olban, Colombienne (La), Comtesse Baillet, Dauphine (La), Egérie, Elisabeth Fry, Hybride parfaite, Madame Plantier, Madeleine, Nathalie, Plantier, Pompon carmin, Rachel Ruich, Rosalba, Sophie d'Houedetot, Ursule Deveaux.

D. Rosiers hybrides de l'île Bourbon.

Admiration (L'), Andrieux, A pétales mucronés, Athalin, Brenns, Brown, Capitaine Sisolet, Charles Duval, Chatelain, Coeline, Daphné, Dauphine, Duc Decazes, Esméralda, Helvétius (Laffay), Horatius, Lascases, Legouvé, Lord John Russell, Louis Philippe, Milton, Moyenne, Paul Perras, Riégo, Striée, Superbe (La), Sylvain Chaubert, Victor Hugo, William Jesse.

E. R. hybrides de l'île Bourbon mousseux.

Delphinie, Princesse Adelaïde (Laffay). —

Rosiers Capucines Hortul. sind = mit *Rosa lutea* Dalech., Mill., deren wenige Varietäten p. 698 verzeichnet sind.

berberifolia Pall. (= *monophylla* Hort. = *persica* Mchx. = *simplicifolia* Salisb.), (Rosiers à feuilles d'épine-vinette) et hybrid. Hardyi, v. *Lowea berberifolia*, p. 479 et p. 373, II.

Pag. 693—701 zu ergänzen und zu berichtigen. ¹⁾

1) Was die neueren Rosenvarietäten und Hybriden, die viele der älteren verdrängt haben, anlangt, so habe ich dabei vor-

Roscyna Spach, *americana* Spach, *Gebleri* Spach, *Gmelini* Spach, v. *Hypericum pyramidat.*, *Gebleri*, *Ascyrum*.
Rosea elatior Mart., v. *Iresine elatior*, p. 421.

Rosmarinus chilensis Molin., v. *Sphacele campanulata*.

Rospidios A. DC., Dattelkirsche, XXII. XII., Sapotaceae-Ebenaceae.

vaccinioides A. DC. (= *Diospyros vaccinioides* Hook., Lindl.), heidelbeerähnliche, f. f. t. China, Malacca.

Rostellaria N. E., *diffusa* N. E., *procumbens* N. E. (= *Justicia hirtella* Wall.), v. *Justicia* Sect. XII., p. 435.

Rostraria laevis Trin., v. *Avena* (Sect. IV. *Trisetum*) *neglecta*, p. 107. *R. pubescens* Trin., v. *Koeleria phleoides*, p. 439.

Rotala Roxburghiana Wight, v. *Ammannia pentandra*, p. 47.

Rothia trifoliata P., v. *Westonia humifusa*.

Rothia Schreb., *andryaloides* G., *argentea* L., *cheiranthifolia* Roth, *runcinata* Roth, v. *Andryala* *Rothia*, *ragusina* β *lyrata*, *sinuata* et *integrifol.*, p. 58.

Rothmannia capensis Thbg., v. *Gardenia Rothmannia*.

Rottboellia L. fil., RBr.

hirsuta Vahl, (= *Coelorhachis hirsuta* Brogn. = *Ischaemum hirsutum* N. E. = *I. mastrucatum* Trin. = *Triticum aegilopsoides* Forsk.), rauhaarige, 4. k. Aegypten, Arabien.

perforata Roxb., p. 701, (= *Hemarthria perforata* Kunth, = *Ophiurus perforatus* Trin.), wird kaum kultivirt.

dimidiata Thbg., v. *Stenotaphrum americanum*, *fasciculata* Lam. (= *altissima* Poir. = *articulata* Thbg. = *spatulata* Tenore), v. *Lepturus fasciculatus*, p. 353, II. — *biflora* Roth, (= *pannonica* Host, = *salina* Spgl. = *salsa* Fisch.), *filiformis* Roth, (= *compressa* Guss. = *erecta* Savi, = *incurvata* β DC. = *gracilis* Mill.), *incurvata* L. fil. *subulata* Savi, (= *adscendens* Brotero, = *cylindrica* W.), v. *Lepturus pannonicus*, *filiformis*, *incurvatus*, *cylindricus*, p. 456.

Rottleria Roxb., *Rottlera*.

fulva Kl., Hffg., rothgelbe, f. w. Java.

Rubieva multifida Moq., Tand., v. *Chenopodium multifidum*, p. 189.

Roucela Erinus Dumort., v. *Campanula Erinus*, p. 153, *hederacea* Dumort., v. *Wahlenbergia hederacea*, p. 854.

Roulinia Decaisne, (Dr. Roulin, hat über naturhistorische Gegenstände Nordamerikas geschrieben), V. II., Asclepiadeae.

Jacquini Decaisne, (= *Cynanchum foetidum* H. B. K. = *C. racemosum* Jacq. = *Asclepias foetida* Cav.), *Jacquin's*, f. t. Mexico.

versicolor Decaisne, (= *Morrenia odorata* Hort., non Lindl.), verschiedenfarbige, f. Sch. t. w. Buenos Ayres.

zöglich auf van Houttes reichhaltige Sammlung in Gent, deren sorgfältiges Verzeichniß in dessen „Etablissement horticole“ (Prix-courant pour l'automne de 1846, le printemps et l'été 1847) enthalten ist, Rücksicht genommen, und selbiges hier dankbar benutzt. Die wissenschaftliche Kritik vieler Arten (species) aber betreffend, so hat dieselbe noch eine eben so schwierige Aufgabe als bei der Gattung *Rubus* zu lösen.

- Roumea coriacea* Poit., v. *Drypetes crocea*.
Roupala Aubl., v. *Rhopala*, p. 686 et 592, II.
Rourea Aubl., *frutescens* Aubl., v. *Conarus pubescens*, p. 214.
- Rousseauxia** DC., (Desrousseaux, franz. Botaniker u. Mitarbeiter an Lamarck's Encyclopaed. botanique), X. 1., Lythraeae-Melastomaceae.
chrysophylla DC. (= *Melastoma* ? *bicolor* Mill. = *M. chrysophylla* Desr.), goldblättrige, ♀. w. Madagascar.
- Roxburghia** Jon., Roxburghiaceae Endl.
gloriosoides Roxb. (= *gloriosa* P. = *viridiflora* Sm.), p. 701.
Roxburghia Koen., *baccata* Koen., v. *Olox scandens*, p. 556.
- Royena** L., Royena.
cuneata Poir. (= *pubescens* W.), keilförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
myrtifolia Wendl., myrtenblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.
villosa L. (= *scabra* Burm.).
 Unbestimmtere: *latifolia* W., *media* Hort.
ambigua Vent., *polyandra* L., v. *Euclea elliptica*, p. 235, *lycioides* Dsf., v. *Diospyros lycioides*.
Rubentia Boj., *angustifolia* Boj., v. *Toddalia angustifolia*, p. 812.
Rubentia Juss., *angustifolia* Colla, (= *longifolia* Juss. = *mauritiana* Dsf. = *olivina* Gmel.), v. *Elaeodendron orientale*.
Rubeola heterophylla Mch., *linearifolia* Mch., *maritima* Mch., v. *Crucianella monspeliaca*, *angustifolia*, *maritima*.
- Rubia** T., Röthe.
cordifolia L. (= *secunda* Moon), β) *alata* Wall. Sibirien, Nepal.
fruticosa Ait. (= *canariensis* Poir.), β) *galioides* Poir.
longifolia Poir. (= *Requienii* Duby, = *tinctorum* L. var. Spgl.), langblättrige, 4. f. Corsica.
lucida L. (= *peregrina* Latour., non L. = ? *rotundifolia* Poir. = *tenuifolia* Urvil.).
Munjista Roxb. (= *cordata* Thbg. = *cordifolia* L. var. Don, = *Manjith* Roxb.), *Munjista-R.*, 4. k. f. Ostindien, Japan.
 Olivieri A. Rich., Olivier's, 4. f. Insel Scio.
- Rubus** T., Brombeere.
acerifolius Wall. (= *moluccanus* Wall., non L.), ahornblättrige, ♀. w. Ostindien.
altheaefolius Host, wintermalvenblättrige, ♀. f. Oestreich.
amoenus Portensch. (= *discolor* Weihe, = *sanguineus* Friw.), b) *fl. pleno* (= *fruticosus fl. roseo pleno* Auct.). Aufser in Süd-, West- und Osteuropa, auch auf den Canarischen Inseln und in Brasilien heimisch.
apiculatus Weihe, feinspitzige, ♀. f. Westphalen.
arduennensis Lejeune, Ardennen-B., ♀. f. Belgien.
argenteus Weihe, silberfarbige, ♀. f. Westphalen.
canus Kit., graue, ♀. f. Banat.
castoreus Laest., Fr. (= *arcticus* β Laest. = *arctico-saxatilis* *), bräunliche, ♀. f. Schweden, Lappland.
cordatus Bluff. (= *cordifolius* Presl, non Weihe), herzförmige, ♀. f. Böhmen.
Douglasii Steud. (= *leucostachys* Dougl., non Schlchr.), Douglas's, ♀. f. Nordwestl. Amerika.

R u b u s

dumetorum Weihe, (= *Fieberi* Ort. = *mollis* Presl, = *ulmifolius* Presl, non Schott, = *ferox* Vest), Hecken-B., \mathfrak{h} . f. Deutschland.

glandulosus Bellardi, (= *Bellardi* Weihe, = *flagelliformis* Koehl.).

hispidus L. (= *flagellaris* W. = *procumbens* Mühlbg. = *prostratus* Seidel, = *trivialis* Mch.).

Histrix Weihe, igelstachelige, \mathfrak{h} . f. Deutschland.

humifusus Weihe, niedergestreckte, \mathfrak{h} . f. Deutschland.

Jdaeus L., γ) semperflorens.

Lejeunii Weihe, Lejeun's, \mathfrak{h} . f. Nord- u. Westdeutschl.

leucostachys Schl. (= ? *Wiegmanni* Weihe).

paniculatus Sm (non Schldl.), (= *cordifolius* Don), rispige, k. f. b. Nepal.

rosaefolius Sm. (= *borbonicus* P.), β) Commersonii Poir. (= *coronarius* Sims, = *sinensis* Hortul.).

rugosus Sm. (= *alceaefolius* Poir.).

saxatilis L., β) americanus P. (= *canadensis* Pursh).

smilacifolius v. Houtte, stechwindenblättrige, \mathfrak{h} . k. ?

Sprengelii Weihe, (= *suberectus* var. Baer, = *villosus* β *vulpinus* Sering. = *vulpinus* Dsf.).

thyrsiflorus Weihe, (= *floribundus* Weihe), straußblumige, \mathfrak{h} . f. Westphalen.

tomentosus Borkh. (= *Thuillieri* Poir.), β) canescens DC.

triphyllus Thbg. (= *parvifolius* Ker, non L.), drei-blättrige, \mathfrak{h} . k. China, Japan.

urticaefolius Poir., nesselblättrige, \mathfrak{h} . t. k. Peru.

velutinus Hook., sammethaarige, \mathfrak{h} . f. Californien.

vulgaris Weihe, (= *villicaulis* Koel.), β) carpinifolius Weihe, γ) Wimmeri Weihe, δ) mollis Weihe

Außerdem hat man noch folgende in Deutschland und Ungarn wildwachsende angebliche Arten dieser Gattung aufgestellt, deren spezifische Aechtheit zum Theil, so wie auch mehrerer vorstehender deutscher Arten (oder Formen), wovon der größte Theil schon im ersten Bande p. 702 — 704 verzeichnet ist, von mehreren Botanikern, so auch vom H. Hofrath Koch, sehr in Zweifel gezogen wird. Als: *agrestis* W. K. (= *tomentosus* W. var. Spgl.), *albicans* Kit., *amoenus* Köhl. (non Portenschl.), *appendiculatus* Tratt., *carpinifolius* Presl, (= *Preslii* Weitenw.), *erectus* Köhl., *fuscus* Weihe, *Grabowskii* Weihe, *Güntheri* Weihe, (= ? *glandulosus* Bellard. var.), *heptaphyllus* Opiz, *holosericeus* Vest, *infestus* W. K., *intermedius* Ort., *Lingua* Weihe, *macroacanthus* Weihe, *Menkei* Weihe, (= *glandulosus* Menke, = *velutinus* Vest), *Mikani* Köhl., *montanus* Lejeune, *pubescens* Vest, *pygmaeus* Weihe, (= *microphyllus* Rchb. = *petraeus* Köhl.), *Radula* Weihe, (= *villicaulis* Köhl. var. Wimm. = *villosus* Lasch), *rhombifolius* Weihe, *rosaceus* Weihe, (= *pallescens* Weihe), *Schummelii* Weihe, *senticosus* Köhl., *Treviranii* Köhl., *trifoliatus* Weihe, *ulmifolius* Presl (non Schott), *vestitus* W. K., *Weigelii* Köhl., *Weihei* Köhl. etc.

R u d b e c k i a L., Rudbeckie.

Drummondii Paxt., Drummond's, \mathfrak{h} . f. Nordamerika.

fulgida Ait. (= *aspera* Dsf. = *discolor* Ell. = *gracilis* Nutt. = *spathulata* Pursh, = *chrysomela* Mchx.).

β) Neumanni Loud. (= *Centrocarpa acutifolia* Don, Spgl.), \mathfrak{h}) *chrysantha* Dens.

Rudbeckia

- glabra DC., kahle, 4. f. Nordamerika (Georgia).
 laciniata L., β) quinata Mill.
 mollis Elliot, weiche, 4. f. Nordamerika (Georgia).
 speciosa Wender. (= *fulgida* Nutt., non Ait.).
 tomentosa Ell. (= ? *subtomentosa* Pursh, = ? *triloba*
 var. *tomentosa* Mchx. = *C. subtomentosa* Don).
 triloba L. (= *aristata* Pursh, = *Centrocarpha aris-*
tata Don).

Rudolphia W., Rudolphe.

- volubilis W. (= *scandens* Poir. = *Butea volubilis* P.),
 windende, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. Sch. w. Portorico, Mexico.
 β) portoricensis Sweet, (= *Erythrina cordifolia*
 Juss. = *E. portoricensis* Dsf.).
dubia H. B. K., v. *Centrosema hastatum* Nachlese,
frondosa Poir., *superba* Poir., v. *Butea frondosa* et
superba, p. 140.
Rudolphia edulis Medic., v. *Malpighia urens*, p. 490.

Ruellia Plum., L., N. E., em. Ruellie.

- achyranthifolia Dsf., spreublumenblättrige, $\frac{1}{2}$. w. ?
 brasiliensis Spgl., brasilianische, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
 cayennensis Spgl. (= *longifolia* P., Rich., non Vahl, =
longifolia Räusch. = *ventricosa* Poir.), cayennische,
 $\frac{1}{2}$. w. Cayenne.
 cernua Heyne, Roxb. (= *Adenosma Thymus* N. E.).
 ciliatiflora Bot. mag., wimperblumige, $\frac{1}{2}$. w. Buenos Ayres.
 curviflora N. E., Mart., gekrümmtblumige, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
 Hoffmannseggii Steud. (= *divaricata* Hffg. = *lactea*
 Hort. Berol., non Cav.), Hoffmannsegg's, 4. w. ?
 Ob zu *Cryphiacanthus* p. 173 II. gehörig?
 lilacina Hook. (= *Justicia glabrata* Hort.), lilafarbige,
 $\frac{1}{2}$. w. ?
 longiflora Vahl, (= *grandiflora* P., non Poir. = *Camellia*
grandiflora Forsk.), langblumige, $\frac{1}{2}$. w. Arabien.
 nova Colla, (= *discolor* Lecchi), neue, $\frac{1}{2}$. w. ?
 ocimoides Cav. (= *concauifolia* Ortega).
 ovata Cav. (= *Dizygandra ovata* Meisn.).
 pulchella Schott, (= ? *foetida* H. B. K.), hübsche, $\frac{1}{2}$.
 w. Brasilien.
 tetragona Lk. (= ? *quadrangularis* Arrabida).
 tubiflora H. B. K., röhrenblumige, 4. w. Südamerika.
barlerioides Roth, (= *bracteata* Roxb.), v. *Petalid-*
dium barlerioides, p. 502, II., *biflora* L. (= *ob-*
longifolia Mchx.), *ciliata* Hornem., *ciliosa* Pursh,
hybrida Pursh, *repens* L. mant., *patula* Jacq. (= *ar-*
omatica Roxb.), *brasiliensis* Hort. (non Spgl.),
strepens L., *stricta* H. Cels., *viscidula* Mart., v.
Dipteracanthus biflorus, *ciliatus* etc., p. 207, II.,
glabrata Wall., v. *Strobilanthes glabrata*, *lactea* Cav.,
clandestina L. et *tuberosa* L., v. *Cryphiacanthus*
lacteus et *barbadensis*, p. 173. II., *longifolia* Roth,
obovata Roxb., *salicifolia* Vahl, *undulata* Vahl, v.
Hygrophila longifolia, *obovata*, *salicifolia*, *undulata*,
 p. 309, II., *imbricata* Forsk. (= *dorsiflora* Retz),
 v. *Aetheilema imbricatum*, p. 12, II., *angustifolia*
 Sw., *Blechum* L., *blechoides* Sw., v. *Blechum an-*
gustifolium, *Brownei* et *laxiflorum*, p. 125, *fulgida*
 Andr., v. *Geissomeria fulgida*, p. 246, II.

Ruizia Cav., Ruizia.

- aurea H. Angl., goldfarbige, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. w. Insel Bourbon.

Ruizia

integrifolia H. Angl., ganzblättrige, ⚥. ⚥. w. Insel Bourbon.
variabilis W. (= *diversifolia* Jacq. = *palmata* Cav.).

β) *laciniata* Cav.

Ruizia fragrans Pav., v. *Boldoa fragrans*, p. 72, II.

Rulingia RBr. (non Ehrh., Haw.), (J. P. Rüling, ehem. in Göttingen, hat über natürliche Pflanzenfamilien geschrieben), V. I., Büttneriaceae.

corylifolia Grah, Cunn. (= *Büttneria corylifolia* * p. 136, non H. B. K., p. 80, II.), haselnufsblättrige, ⚥. t. Neuholland.

dasyphylla Sweet, (= *Büttneria dasyphylla* Gay, p. 136).

grandiflora Endl., großblumige, ⚥. t. Neuholland.

hermanniaefolia RBr, Sweet, (= *Büttneria hermanniaefolia* Gay, p. 136).

pannosa RBr. (= *Büttneria pannosa* DC., p. 136, = *B. australis* Sbr. = *B. inodora* Gay. = *Lasiopetalum tomentosum* Cels).

parviflora Endl., kleinblumige, ⚥. t. Neuholland.

Rulingia Ehrh., Haw., *Anacampseros* Ehrh., *angustifolia* Haw., *arachnoides* Haw., *filamentosa* Haw.,

polyphylla Haw., *rufescens* Haw., *varians* Haw.,

v. *Anacampseros rotundifolia*, *angustifolia*, *arachnoides* etc., p. 34, II. et p. 51, *patens* Ehrh., *triangulare* Ehrh., v. *Talinum patens* et *triangulare*,

p. 797 et Nachlese.

Rumex L., (*Acetosa* T. et *Lapathum* T.), Ampfer.

alismaefolius Fresen, (= ? *nervosus* Vahl), wasserwegerichblättriger, 4. k. Abyssinien.

aquaticus L. (= *acutus* Ehrh. = *Hippolapathum* β Fr.).

arifolius L. suppl. (non All. nec Ait.), (= ? *abyssinicus* Dsf. = *macrophyllus* Campd.), zehrwurzblättriger, 4. ⚥. k. Cap d. g. Hoffn.

bipinnatus L. fil. (= *Acetosa bipinnata* Mill.), doppeltgefiederter, 4. w. Mauritius.

brasiliensis Lk. (= *incomptus* Weinm. = ? *litoralis* H.B.K.).

Britannica L. (= *Claytoni* Campd. = *xanthorrhizus* Hffg. = *Lapathum bienne* Mch.).

bucephalophorus L. (= *lacerus* Hort. = *leucocephalus* Hort.), β) *membranaceus* Poir.

chalepensis Mill., aleppischer, ⚥. k. f. b. Aleppo.

chinensis Campdera, (= *denticulatus* Dunal, = *Loureiri* Campdera).

comosus Forsk. (= *aegyptiacus* Rchb., Shr.), schopfiger, ☉. f. Aegypten.

confertus W., gedrängter, 4. f. Sibirien, Volhynien.

conglomeratus Murr., Roth, (= *dubius* Retz, = *tauricus* Hort. = *undulatus* Schrk., non Dsf. = *virgatus* Haenke), β) *campestris* Savi, (= *divaricatus* Thuill.

= *pyncocarpus* Wallr. = *Winterli* Haberl), γ) *pussillus* Delarbre.

cordifolius Hartm. (= *alpinus* L. var. Sm. = *cristatus* Hort. = *rheifolius* Hort.), herzblättriger, 4. f. Nördliche europäische Alpen, Sibirien.

crispus L. (= ? *longifolius* H.B.K.), β) *elongatus* Guss.

cristatus DC. (= *confertus* β Poir.), β) *undulatus* Dsf. Volhynien.

cuneifolius Campd. (= *montevidensis* Spgl.). keilblättriger, 4. k. Centralamerika.

dentatus Murr. (= *multiflorus* P.).

Rumex

- distans* Dumort., absteher, 4. f. Belgien.
domesticus Hartm. (= *aquaticus* β Wahlbg. = *crispus* a L. = *Hippolapathum* Fr. = *strepens* Hort.).
 Nordeuropa, Asien u. Amerika.
Fischeri Ledeb., Rchb., Fischer's, 4. f. Sibirien.
garipensis Meisn., garipischer, 4. k. Cap d. g. Hoffn.
Gmelini Turcz., Gmelin's, 4. f. Sibirien.
hamatus Trevir. (= *nepalensis* Svgl. = *Roxburghianus* Schult. = *tuberosus* Roxb., non L.), hakiggekrümmer, 4. Kn. f. Nepal.
 β) *uncinulatus* Schrad. (= *uncatus* Hort.).
laevigatus W. (= *obtusifolius* L. var.?) Polen.
longifolius H. B. K. (= *Kunthianus* Campd.).
lucidus Campd. (= *atriplicifolius* Rchb.), schimmerner, 4. k. Nordafrika.
Lunaria L. (= *polygamus* Cav. = *Lapathum arborescens* Mch.).
montanus Dsf. (= *Acetosa* var. L. et plur. Auct. = *arifolius* All., non L. = *hispanicus* Gmel. fl. bad. = *italicus* H. Par.), Berg-A., 4. f. Europäische Voralpen.
nemosus Schrad. (= *acutus* β Huds., Curt. = *condylodes* MB. = *exsanguis* Kit. = *Nemolapathum* Whlbg., et pl. auct. = *sanguineus* β *viridis* Sm., K. = *sylvaticus* Auct. = *viridis* Sibth.), Hain-A., 4. f. Europa.
orientalis Bernh., morgenländischer, ♂. 4. f. Orient.
palustris Sm. (= *Steinii* Beck.).
polygonifolius Loud., knöterichblättriger, 4. f. Rußland.
pratensis M. et K. (= *acutus* W. et plur. Auct. = *ambiguus* Gay, = *cristatus* Wallr., non DC. = *obtusifolius* G., non L. = *Oxylapathum* Wallr.), Wiesen-A., 4. f. Europa.
reticulatus Bess., netzförmiger, ♂. f. Caucasus.
salicifolius Weinm. (= *pallidus* Bigel. = *verticillatus* Rich.), 4. Californien („adportum St. Francisci“).
scutatus L., β) *glaucus* Jacq. (= *alpestris* Jacq.).
 γ) *hastaefolius* MB., δ) *luxurians* Hort., ϵ) *oxyotus* Campd.
soongaricus C. A. Mey., soongarischer, ♂. f. Soongaria.
stenophyllus Ledeb., schmalblättriger, 4. f. Alt. Sibirien.
Stuedelii Hochst., Steudel's, 4. k. Abyssinien.
thyrsoides Dsf. (= *intermedius* Gussone), straufsblumiger, 4. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
tingitanus L. (= *sinuatus* Hort.).
ucranicus Fisch., Bess. (excl. Synon.).
verticillatus L. (= *polygonoides* Hort.).
 Unbestimmtere: *afer* Bert., *alexandrinus* Hort., *americanus* Campd., *auritus* Campd., *bulbosus* Campd., *calthaefolius* Campd. Aegypten, *creticus* Campd., *monticola* Schult. (= *montanus* Campd.) Toscana, *nebroides* Campd., *oblongus* Campd., *peregrinus* Schult. (= *uncatus* Hort.), *retroflexus* Lagasca, *subrotundus* Campd., *trifidus* Campd. etc.

Rumia Hoffm., Rumie.

- athamantoides* DC. (= *Athamanta Carvifolia* W. herb. = *Cachrys athamantoides* MB., p. 142, = *Stenocoeilium athamantoides* Ledeb.). Sibirien, Taurien.
microcarpa Hoffm. (= *Cachrys microcarpa* MB., p. 142, = *C. sicula* Goldenst.).

Rumia

seselioides Hoffm. (= *Cachrys seselioides* MB., p. 142, = *Seseli glabratum* W. herb. = *Stenocoelium divaricatum* Turtsch. = *Trinia dahurica* Turtsch. = *T. seselioides* Ledeb.).

taurica Hoffm. (= *Artedia squamata* Pall., non L. = *Cachrys taurica* W., p. 142, = *Sanicula crithmi-folia* W.), p. 70².

Rumohrea aspidioides Raddi, v. *Aspidium* (Sect. VII.) coriaceum, p. 50, II. et p. 91.

Rungia N. E. (Dr. F. Runge, Prof. zu Oranienburg, früher in Breslau, berühmt als Phytochemiker), II. 1., Acanthaceae.

pectinata N. E. (= *Dicliptera coerulea* Blum. = *D. pectinata* Juss. = *Justicia ciliaris* Retz, = *J. parviflora* Retz, = *J. pectinata* L.), kammförmige, ♀. w. Ostindien.

repens N. E. (= *Adhadota spicata* Burm. = *Dicliptera repens* Juss. = *Justicia repens* L.). 4. Ostindien. Scheint nicht kultivirt zu werden.

Rupala W., v. *Rhopala*.

Ruscus T., L., Mäusedorn (Korallenblatt).

racemosus L. (= *Danae Laurus* Medic. = *D. racemosa* Mch. = *Danaidia racemosa* Lk.).

β) ? *laurifolius* Hort.

Russelia Jacq., Russelie.

polyedra Zuccar., vielkantige, 4. ♀. t. Mexico.

verticillata H. B. K., wirtelförmige, ♀. t. w. Neuspanien.

Ruta T., Raute.

acutifolia DC., spitzblättrige, 4. ♀. f. b. k. Persien.

divaricata Tenore, (= *intermedia*, *montana* Auct. = *graveolens* L. var. Tausch).

? *Fernandesia* Colla, *Fernandesische*, 4. ♀. f. b. ? Südeuropa.

Ungewifs: *diversifolia* Wender.

Buxbaumii Poir., *dahurica* DC., *linifolia* L., *pata-vina* L., *spathulata* Sibth. (= *suaveolens* DC.) etc. v. *Haplophyllum Buxbaumii* etc.

Ruyschiana Adans., Mill., *laciniata* Mill., *spicata* Mill., *verticillata* Mill., v. *Dracocephalum austriacum*, *Ruyschiana*, *peregrinum*.

Rymia polyandra Endl., v. *Euclea elliptica*, p. 235.

Rytidophyllum Mart., DC., Grübchenblatt.

auriculatum Hook., p. 709.

crenulatum DC. (= *Gesneria crenulata* DC. fil. = *G. tomentosa* Jacq., H. B. K., non L.), gekerhtes, ♀. w. Cuba.

grande Mart. (= *Gesneria grandis* Sw.), großes, ♀. w. Westindien.

prasinatum Mart. (= *Codonophora grandiflora* Lindl. = *Columnnea speciosa* Wendl. = *Gesneria prasinata* Ker, p. 354, = *Orobanche racemosa* Arrabida).

tomentosum Mart. (= *Codonophora lanceolata* Lindl. = *Gesneria tomentosa* L., p. 354).

Rytlix glandulosa Rafin., v. *Manisuris granularis*, p. 495.

Subadilla caricifolia Schldl., *officinalis* Schldl., Brandt, v. *Schoenocaulon caricifolium*, officinale.

Sabal Adans, Sabalpalme.

Adansonii Guerns. (= *caroliniana* Hort. = *minor* P. = *pumila* Ell. = *Chamaerops acaulis* Mch. =

Sabal

? *Ch. glabra* Mill. = *Corypha minor* Murr., Jacq. =
C. pumila Walt. = *Raphis acaulis* W.).

Moçini Otto et Dietr. (= ? *Chamaerops Moçini* H. B.
 K.), Moçino's, ꝥ. w. Westl. Amerika.

Palmetto Lodd. (= *Chamaerops Palmetto* Mchx., p. 187,
 = *Corypha Palmetto* Walt.).

umbraculifera Mart. (= *Blackburniana* Kirkland Glaze-
 brook, = ? *gigantea* Fulchir. = *Corypha umbraculi-
 fera* Jacq.), schirmitragende, ꝥ. w. Westindien.

glaucescens Lodd., blaugrüne, ꝥ. w. Trinidad.

graminifolia Lodd. (= *Woodfordii* Lodd.). Südamerika.

Beide sind H. Prof. Kunth als Angehörige zu dieser
 Gattung zweifelhaft.

Hystrix Nutt., *serrulata* Nutt., v. *Chamaerops Hys-
 trix et serrulata*, p. 187 et p. 136, II., *rubra* Hort.,
 v. *Latania Commersonii*, p. 344, II.

Sabbatia Adans., Sabbatie.

gracilis Salisb. (= *campanulata* Torrey).

paniculata Pursh, (= *corymbosa* Baldw., Ell. = *Chiro-
 nia cymosa* Lam. = *Ch. paniculata* Mchx. = *Swer-
 tia difformis* L.).

stellaris Pursh, (= *gracilis* Ell., non Salisb.), stern-
 förmige, ꝥ. f. b. k. Carolina.

Sabbatia corymbosa Mch., v. *Micromeria Juliana*,
 p. 722 et p. 406, II.

Sabicea Aubl. (= *Schwenkfeldia* Schreb.), (einheimi-
 scher Name), IV. 1., Rubiaceae.

aspera Aubl. (= *Schwenkfeldia aspera* W.), rauhe, ꝥ.
 w. Guiana.

cinerea Aubl. (= *Schwenkfeldia cinerea* Sw.), aschgraue,
 ꝥ. w. Guiana, Westindien.

Sabinea DC. (Joseph Sabine, Stifter des Vereins für
 Gartenkultur in London, † 1837), XVII. IV. (VI.),
 Leguminosae-Papilionaceae.

dubia DC. (= *Robinia dubia* Lam. = *R. martinicensis*
 P.), zweifelhafte, ꝥ. ꝥ. w. Martinique.

florida DC. (= *Robinia florida* Vahl), blüthenreiche,
 ꝥ. ꝥ. w. Westindien.

Saccharum L., Zuckerrohr.

caudatum Mey. (= *contractum* Poir. = *Anatherum
 portoricense* Spr. = *Imperata caudata* Trin.).

edule Hassk., genießbares, 4. w. Java.

exaltatum Roxb. (= *arundinaceum* Retz, = *Imperata
 exaltata* Brongn.), hohes, 4. ꝥ. w. Ostindien.

polystachyum Sw., p. 709, (= *polydactylon* W. herb. =
Paspalum saccharoides N. E. = *Panicum saccharoi-
 des* Kunth), wird kaum kultivirt.

Saccolabium Blume, Sackstendel.

calceolare Lindl. (= *Aerides calceolaris* Sm. = *Gastro-
 chilus calceolaris* Don), pantoffelförmiger, 4. w.
 Ostindien.

Cumingii Lindl., Cuming's, 4. w. Ostindien.

dasyogon Lindl. (= *Aerides dasyogon* Sm. = *Epi-
 dendrum umbellatum* Hamilt.), rauchbartiger, 4. w.
 Nepal.

gemmatum Lindl., keintragender, 4. w. Ostindien.

giganteum Lindl., riesenhafter, 4. w. Ostindien.

racemiferum Lindl. (= *Aerides racemifera* Wall.), trau-
 biger, 4. w. Ostindien.

Saccolabium

ramosum Lindl. (= *Aerides ramosa* Wall.), ästiger, 4. w. Ostindien.

rubrum Lindl. (= *ampullaceum* Lindl.), rother, 4. w. Ostindien.

Wightianum Lindl. (= *lineare* Lindl.), Wight's, 4. w. Ostindien.

guttatum Lindl., *papillosum* Lindl., *praemorsum* Lindl., v. *Rhynchostylis retusa*, *papillosa*, *praemorsa*, p. 594, II.

Saelanthus glandulosus Forsk., *quadragnus* Forsk., v. *Cissus glandulosa et quadrangularis*, p. 200.

Sageretia Brongn., Sageretie, V. 1., Rhamneae.

theezans Brongn. (= *Rhamnus theezans* L.), theegebende, f. k. t. China.

Sagina L. (et *Spergella* Rchb., p. 776), Mastkraut.

apetala L. (= *erecta* β Lam.), β) ciliata Fr. (= *depressa* Schultz).

decumbens Torr. et A. Gr. (excl. Syn.), (= *Spergula decumbens* Ell.), niederliegendes, \odot . f. Nordamerika.

glabra Fenzl, (= *Spergula glabra* W. = *S. saginoides* All. = *S. subulata* β P.).

laricina Fenzl, (= *Alsine laricina* Crantz, = *Spergula laricina* L.).

Linnaei Presl, (= *Spergula saginoides* L. = *Phaloe saginoides* Dumort.).

muscoides Fröl., K. (= *bryoides* Fröl.).

nodosa Fenzl, (= *Phaloe nodosa* Dumort. = *Spergula nodosa* L.), β) glandulosa Bess.

pilifera Fenzl, (= *Spergula pilifera* DC.), haartragendes, \odot . f. Corsica.

subulata Presl, (= *Spergella* Fenzl. = *Spergula saginoides* Retz, = *Phaloe subulata* Dumort.).

Sagittaria L., Pfeilkraut.

mexicana Steud. (= *macrophylla* Zuccar., non Bunge), mexicanisches, 4. Wa. t. w. Mexico.

Sagraea DC., Sagraea, X. 1., Melastomaceae.

columnaeifolia DC. (= *Melastoma columnaeifolia* Schrk.), columneablätterige, f. w. Peru.

sessiliflora DC. (= *Clidemia heteromalla* Bonpl. = *C. rubra* G. Don, = *Melastoma rubra* Aubl., Rich. = *M. sessiliflora* Vahl), stiellosblumige, f. w. Südamerika.

Saguerus Rumphii Roxb. (= *Gomuto* Houtt.), v. *Gomutus* saccharifer, p. 364.

Sagus Palma Pinus G. (= *Raphia* Poir.), *Ruffia* Jacq., v. *Raphia vinifera et Ruphia*, p. 585, II.

Saintmorysia Endl. emend. (= *Morysia* Cass., DC.).

dentata Endl. (DC.), (= *M. diversifolia* Cass.) etc., v. p. 532.

Sairanthus glutinosus G. Don, v. *Nicotiana glutinosa*, p. 547.

Salacca edulis Reinw., v. *Calamus Zalacca*, p. 145.

Salacia L., DC. (= *Calypso* Pet. Th. = *Johnia* Roxb., p. 430, = *Tonsella* Schreb. = *Tontelea* Aubl.), Salacie, III. 1., Evonymeae-Hippocrateaceae.

prinoides DC. (= *Wightiana* Wall. = *Johnia coromandelina* Roxb. = *Tonsella prinoides* Roxb.), winterbeerähnliche, f. Sch. w. Ostindien.

Salacia

pyriformis Steud. (= *Calypso pyriformis* G. Don, = *Tonsella pyriformis* Sweet), birnförmige, ♀. w. Sierra Leone.

Roxburghii Wall. (= ? *chinensis* L. = *Johnia salacioides* Roxb.), Roxburgh's, ♀. w. Bengalen.

Salaxis Salisb., Salaxis.

artemisioides Kl. (= *Erica artemisioides* E. Meyer), beifusähnliche, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.

micrantha Benth., kleinblumige, ♀. t. k. Cap d. g. H. *Salicaria* Adans., Lam., *Graefferi* Hort. Berol., *hyssopifolia* Lam., *spicata* Lam., *Thymifolia* Lam., v. *Lythrum Graefferi*, *hyssopifolia*, *Thymifolia*, p. 486.

Salicornia T., Glasschmalz.

foliata L. (= *foliosa* Auct. = *strobilacea* G. = *Halocnemum foliatum* Speg.), beblättertes, ♀. f. Sibirien.

radicans Sm. (= *biennis* Afz. = *europaea* β Huds. = *herbacea* β Sm.).

caspiaca L., *fruticosa* L., *strobilacea* Pall., W. (= *caspiaca* Stev. = *glauca* Delil. = *mucronata* Lagasc.), v. *Halocnemum caspicum*, *fruticosum* et *strobilaceum*, p. 283, II.

Salisburya Smith, (R. A. Salisbury, berühmter engl. Botaniker).

adiantifolia Sm. (= *Ginkgo* Rich. = *Ginkgo biloba* L.).

Billardieri Rich., v. *Phyllocladus rhomboidalis*, p. 620.

Salix T., Weide.

acuminata Sm. (= ? *phlomoides* MB. = *Smithiana* K. = *longifolia* Host).

acutifolia W. (= *caspiaca* Hort. = *daphnoides* Vill. var. = *pruinosa* Wendl., Rchb. = *violacea* Andr., Sm.).

ambigua Ehrh. (= *aurito-repens* Wimm. = *uliginosa* Sering. = *Schultziana* W.).

Arbuscula L., Wahlbg., α) *Waldsteiniana* W. (= *alpestris* Host, = *Hosteana* W.), β) *Weigeliana* W. (= *Dicksoniana* Sm.), γ) *humilis* W., δ) *Croweana* Sm., ε) *tetrapla* Walk., ζ) *Schraderiana* W. (= *discolor* Schrader).

betulifolia Forb., Sweet, (= *myrsinites* Sm., non L.), birkenblättrige, ♀. f. England.

betulina Hort. angl., birkenähnliche, ♀. f. ?

cinerea L. (= *dumetorum* Suter, = *glaucescens* Mch. = *Rothii* Hoppe, = *Timmii* Schkr.), β) *cinereo-repens* Wimm.

cochleata Dumort., löffelförmige, ♀. f. Belgien.

comosa Fr. (non Tausch), schopfige, ♀. f. b. Canarische Inseln.

corylifolia Turtsch., haselnufsblättrige, ♀. f. Alt. Sibirien. *cuspidata* Schultz, (= *Ehrhartiana* Sm. = *hexandra* Ehrh. = *pentandra* β L. flor. suec. = *tetrandra* L. = *tinctoria* Sm.), β) *Meyeriana* W.

finnmarchica Fr. (= *aurito-myrtilloides* Wimm.).

floribunda Forb., blüthenreiche, ♀. f. England.

fragilis L. (= *androgyna* Roth, = *antifebrilis* Auct. = *decipiens* Hoffm. = *excelsior* Host, = *fragilior* Host, = *fragilissima* Host, = *gracilentata* Tausch, = *palustris* Host, = *persicifolia* Schleich. = *Treviranii* Speg. = *Wargiana* Lejeun.).

Salix

- hastata* L. (= *alpina* Schlchr. = *cerasifolia* Schlchr. = *cinerascens* Schlchr. = *coruscans* W. = *Ludwigii* Sckchr. = *majalis* Wahlbg. = *malifolia* Sm. = *pilosa* Schl. = *Pontederiae* Vill. = *serrulata* W. = *tenuifolia* Sm. = *viburnoides* Schleich.),
japonica Thbg., japanische, *h.* f. b. Japan.
Kochiana Trautv. (= *Pontederiana* Ledeb.), Koch's, *h.* f. Sibirien, Caucasus.
Lambertiana Sm. (= *monandra* Hoffm. = *mutabilis* Host, = *oppositifolia* Host, = *ramulosa* Hort. angl. = *Wolgariana* Sm.), Lambert's, *h.* f. Europa, Sibirien.
Ledebouriana Trautv. (= ? *caspica* Pall. = *pallida* Ledeb.), Ledebour's, *h.* f. Alt. Sibirien.
lenta Fr., zähe, *h.* f. b. Nepal.
ligustrina Mchx., ligusterähnliche, *h.* f. Nordamerika.
microstachya Turcz., Trautv., kleinährige, *h.* f. Sibirien.
nigra Mühlbg. (= *caroliniana* Mchx. = *flavovirens* Hornem. = *pentandra* Walt.).
nigricans Sm., a) *phylicifolia* K. Whlbg., b) *paludosa* Schlchr.
nobilis Fr., edle, *h.* k. f. b. Nepal.
Otites Schrad. (= *monandra* Brotero), geöhrt, *h.* f. Portugal.
proteaeifolia Schlchr., proteablätterige, *h.* f. Schweiz.
purpurea L., ζ) *purpureo-repens* Wimmer.
pyrolaeifolia Ledeb., wintergrünblätterige, *h.* f. Alt. Sibirien.
repanda Dumort., ausgeschweifte, *h.* f. Belgien.
Reuteri Moritzi, Reuter's, *h.* f. Schweiz.
rhamnifolia Pall. (= *hastata* L. var.), wegdornblätterige, *h.* *h.* f. Sibirien.
sericans Tausch, (= *conifera* Hort. = *holosericea* Hort. = *stipularis* Hort.), seidenhaarige, *h.* f. ?
spectabilis Host, ansehnliche, *h.* f. Bukowina.
Starkeana W. (= *Arbuscula* β L. = *Besseriana* Host, = *bicolor* Fr. = *depressa* L. suec. = *foliolosa* Afz. = *livida* Whlbg. = *malifolia* Bess.), Starke's, *h.* f. Nordeuropa, Sibirien.
subserrata W. (= *fragilis* Forsk. = *octandra* Sbr. = *Sassaf beledi* Forsk.), wenigssägezähmige, *h.* f. Aegypten.
tuberculata Dumort., höckerige, *h.* f. Belgien.
undulata Ehrh. (= *alopecuroides* Tausch, = *speciosa* Host).
Wilhelmsiana MB. (= *angustifolia* MB., W.).
- Salmalia** Schott et Endl., Salmalie, XVI. VIII., Bombaceae.
insignis Schott, Endl. (= *Bombax insigne* Wall.), ausgezeichnete, *h.* w. Ostindien.
malabarica Schott, Endl. (= *Bombax Ceiba* Burm. = *B. heptaphyllum* Cavan. = *B. malabaricum* DC., p. 127, = *Gossampinus rubra* Hamilt.).
- Salmea** DC. (J. Fürst von Salm Dyck Reifferschied, ausgezeichnete Kenner u. Bearbeiter der sogenannten Fettpflanzen).
Eupatoria DC. (= *grandiceps* Cass. = ? *Bidens scandens* Sw. = *Eupatorium Gouani* et *Houstonis* Hort., non L. = *Hopkirkia Eupatoria* Spgl.).
hirsuta DC. (= *oppositiceps* Cass. = *Bidens hirsuta* Sw. = *Eupatorium vestitum* Spgl. = *Hopkirkia hirsuta* Spgl.).

Salmea

scandens DC. (= *purviceps* Cass. = *Bidens frutescens* Mill. = *B. scandens* L. = *Calea Amellus* L. = *Hopkirkia scandens* Spgl. = *Isocarpha Amellus* Spgl. = *Santolina Amellus* L. amoen.).

Salmia W., Spgl., *angustifolia* W., *funifera* Spgl., *jamaicensis* Steud., *latifolia* W., *palmaefolia* W., *palmata* W., v. *Carludovicia angustifolia*, *funifera*, *jamaicensis*, *latifolia*, Plumieri et *palmata*, p. 167 et p. 122, II.

Salmia Cav., *obraceata* Cav., *guineensis* Cav., *spicata* Cav., v. *Sanseviera lanuginosa*, *guineensis*, *spicata*, p. 720.

Salpiglossis R. et P., Zungenröhre, Personatae-Scrophularineae-Salpiglossideae.

sinuata R. et P., Var.: *atropurpurea* Grah., *coccinea*, *fulva* Court., *Barclayana* Penny, (= *intermedia* Swt.), *picta* Sw., *straminea* Hook., p. 716. 1)

integrifolia Hook., *linearis* Hook., *parviflora* G. Don, v. *Petunia Mirabilis* etc., p. 610 et p. 503, II.

Salpi(g)xantha Hook., Trompetenblume, XIV. II., Acanthaceae.

coccinea Hook., scharlachfarbige, ♂. w. Jamaika.

Salsola L., Salzkraut.

anomala Eichw. et C. A. Mey., abweichendes, ♂. f. Gegend des caspischen Meeres.

brachiata Pall. (= *Pallasiana* Vest.).

brevifolia Dsf., kurzblättriges, 4. ♂. k. Nordafrika.

collina Pall. (= *Kali γ* Pall.), Hügelliebendes, ☉. f. Altaisches Sibirien.

ericoides MB. (= *dendroides* Pall. = *ericaefolia* Adams), heideähnliches, ☉. ♂. f. Kleinasien.

foliosa Schrad., Schult. (= *baccifera* Pall. = *clavifolia* Pall. = *Anabasis foliosa* L.).

genistoides Juss., Poir., ginsterähnliches, ♂. k. Spanien.

incanescens Ledeb., C. A. Mey., grauliches, ♂. f. b. Caucasus.

oppositifolia Dsf. (= *fruticosa* Cav. = *longifolia* Forsk.).

rosacea L. (= *rosea* Falk, = *Kali rosacea* Mch. = *Tragum rosaceum* Medic.).

Soda L. (= *longifolia* Lam. = *Kali inermis* Mch. = *Kali Soda* Scopol.).

subaphylla Ledeb., C. A. Mey., fastblattloses, ♂. f. b. Caucasus.

turgida Dumort., aufgeschwollenes, 4. f. Holland, Belgien.

vermiculata L. (= *laricina* Pall. = *prostrata* Pall.).

africana Hort. (= *aphylla* L. fil.), v. *Caroxylon Salsola* Nachlese, *altissima* L., *baccifera* Schrad., *fruticosa* MB., *hortensis* Dsf. (= *divergens* Poir. = *trigyna* Cav.), *maritima* MB., *monoica* Poir., *salsa* L., *setigera* Lagasca, *spicata* W. (= *strobilifera* Hort.), *trigyna* W., v. *Suaeda altissima*, *baccifera* etc., *eriphora* Spgl. (= *eriantha*, *lanata* et *laniflora* Hort.), *hyssopifolia* Pall. (= *muricata* L.), *sedoides* Pall., v. *Echinopsilon eriophorum*, *lanatum* etc., p. 214, II., *arenaria* W. K., *dasyantha* Pall. (= *laniflora* Gmel. = *prostrata* Ortega, = *tenui-*

1) Nach Bentham (DeCandolle prodrom. X. p. 202) nur Varietäten von *Salpiglossis sinuata*.

Salsola

folia MB.), *prostrata* L., *scoparia* MB., *sericea* Ait. (= *canescens* Dsf. = *diffusa* Thbg.), *Sieversiana* Pall. (= *soongarica* Sievers), v. *Kochia arenaria*, *dasyantha* etc., p. 438 et p. 336, II., *pilosa* Pall. (= *arborescens* L.), v. *Halimocnemis malacophylla*, p. 282, II., *platyphylla* Mchx. (= *radiata* Dsf. = *atriplicifolia* Spgl.), v. *Cycloloma platyphylla*, p. 119, II., *tamariscifolia* Lagasca, *glomerata* Steph., *monandra* Pall., v. *Halogeton tamariscifolius*, *glomeratus* etc., p. 283, II.

Salvadora surinamensis Spgl. fil., v. *Weigeltia myrianthos*.

Salvia T., L., Salbei.

acetabulosa L., säuerliche, ♀. f. b. k. Orient.

aegyptiaca L. (= *Melissa perennis* Forsk. = *Thymus hirtus* Viviani).

affinis Schldl., ähnelnde, ♀. t. Jalappa.

africana L. (= *barbata* Lam. = *colorata* Vahl, = *integerrima* Mill.).

amarissima Ortega, (= *amara* Jacq. = *circinnata* Cav. = *nepetoides* H. B. K.).

argentea L. (= *atlantica* P. = *candidissima* Gussone, non Vahl, = *orientalis* H. Par. = *patula* Dsf. = *pyramidalis* Petagna, = *Sclaraea argentea* Mill.). Südeuropa, Creta, Nordafrika.

axillaris Moç., Sess., achselblumige, 4. ♀. t. Mexico.

azurea Lam. (= *acuminata* P. = *acuminatissima* Vent. = *angustifolia* Mchx. = *elata* Poir. = *mexicana* Walt., non L.).

bicolor Lam., Dsf. (= *crassifolia* Jacq., Cav.).

canariensis L. (= *Schraderia hastata* Mch. = *Sclaraea tomentosa* Mill.).

Candelabrum Boiss., kronenleuchterförmige, ♀. k. Spanien.

ceratophylloides L. (= *ceratophylla* Tenore et plur. Auct., non L.).

chamaedryoides Cav. (= *chamaedryfolia* Andr. = *Chamaedrys* W. Enum.).

chinensis Benth., chinesische, 4. f. b. China.

clandestina L. (= *acutata* Lk. = *clandestinoides* Lk. = *micrantha* Dsf. = *oblongata* Rchb. = *obtusata* Lk. = *pallidiflora* St. Am. = *parviflora* Lk. = *polymorpha* Hffg. et Lk. = *praecox* Savi, = *variabilis* Lois. (ex parte) = *verbenaca* Vahl, = *verbenaoides* Brotero, = *Viviani* Spgl. = *Sclaraea decidua* Mch.), β) *multifida* Sibth., Sm. (= ? *ceratophylla* Mey. = *ceratophylloides* W., non L. = *erosa* Dsf. = *clandestina* Vahl, = *laciniata* W. Enum. suppl.).

coccinea L. (= *glaucescens* Pohl, = *Horminum coccineum* Mch.), β) *rosea* Vahl.

coerulea Benth., blaue, 4. w. Brasilien.

compressa Vahl, platte, 4. f. Orient.

concolor Lamb., einfarbige, ♀. t. k. Mexico.

confertiflora Pohl, gedrängtblumige, ♀. w. t. Brasilien.

controversa Tenore, (= *clandestina* = *lanigera* Poir., Bové), streitige, 4. f. Südeuropa.

corymbosa Wall. (= ? *plebeja* RBr. var.), traubendoldige, 4. w. Ostindien.

Cruikshanksii Benth. (= *rhombofolia* β Hook.), Cruikshank's, 4. w. t. Peru.

Salvia

- discolor H. B. K. (= *Bonplandiana* Dietr.), verschiedenfarbige, ⚥. t. Peru.
 dominica L. (= *commutata* Benth.), verwechselte, 4. f. ? Syrien, ? Italien.
 dumetorum Andryz., Bess. (= *pratensis* L. var. Auct.), Hecken-S., 4. f. Altai, Mittelasien, Cashmire, Vohynien.
 β) flore albo.
 elegans Vahl, (= *incarnata* Cav. = *microcaulis* Poir.), zierliche, ⚥. t. Mexico.
 eriocalyx Bertero, Sshult., wollkelchige, ⚥. w. Jamaica.
 excelsa Benth., hohe, 4. w. t. Guatemala.
 Forskohlei L. (= *bifida* Forsk.).
 fruticulosa Benth., strauchige, ⚥. t. k. Mexico.
 Gilliesii Benth., Gillies's, ⚥. t. k. Chili.
 gesneriflora v. Houtte, gesnerienblumige. ⚥. t. ? Südamer.
 glabrata H. B. K., glattliche, 4. t. k. Neuandalusien, Mexico.
 grandiflora Ettl. (= *tomentosa* Mill.).
 hians Royle, klaffende, 4. ⚥. t. Ostindien.
 hirsuta Jacq. (= *bracteata* Poir. = *ciliata* Hort. Par. = *cryptanthos* Schult. = *nepetifolia* Poir. = *phlommoides* Cav. = *praecox* Hortul. = *Sideritidis* Vahl, = *tetragona* Hortul.).
 hispanica L. (= *prismatica* Cav. = *tetragona* Mch.).
 Horminum L. (= *colarata* Thore, = *Horminum coloratum* Mch. = *H. sativum* Mill.).
 involucrata Cav. (= *laevigata* H. B. K.).
 Karwinskyi Benth., Karwinsky's, ⚥. t. Mexico.
 Kotschyana Endl., Kotschy's, 4. f. b. k. Taurus (Asien).
 lanceolata Brouss., Jacq. fil. (= *aspidophylla* R. et S. = *reflexa* Hornem. = *trichostemmoides* Pursh).
 lamiifolia Jacq. (= *amoena* Sims, = *azurea* Hort. = *Boosiana* Jacq. fil. = *Boosii* Trat. = *coerulea* Hort. = *cyanea* Fisch. = *cyaniflora* Hort. = *hyemalis* Boos, = *latifolia* Anders. = *melissaefolia* Dsf. = *thymiflora* W. Enum. = *violacea* Hortul.), taubnesselblättrige, 4. ⚥. w. Peru, St. Vincent, Trinidad.
 lavanduloides H. B. K. (= *Humboldtiana* R. et S. = *lavandulaefolia* Spgl., non Vahl), lavendelähnliche, 4. t. Neuspanien.
 leucanthera Visiani, (= *tinifolia* Hort.), weißbeutelige, ⚥. k. t. ?
 longiflora R. et P., langblumige, ⚥. w. t. Peru.
 lyrata L. (= *Cunila lyrata* Schrk. = *Horminum lyratum* Mill., Mch. = *H. virginicum* L.).
 macrophylla Benth. (non Tausch), großblättrige, 4. w. t. Peru.
 mexicana L. (= *melissaefolia* Dsf. = *Jungia altissima* Mch. = *Sclaraea mexicana* Mill.).
 β) nitidifolia Ortega (= *papilionacea* Cav.).
 multicaulis Dsf., Vahl, vielstengeliche, 4. f. b. Orient.
 napifolia Jacq. (= *verticillata* β P. = *Covola napifolia* Medic.).
 nilotica Murray, Vahl, (= *abyssinica* L. fil., Jacq. = ? *applanata* W. Enum. = *intermedia* Schult. = *nepetaefolia* Plur. auct. et Hortul., non Jacq. = *nubia* Murray, = ? *spinosa* Mch. = ? *Horminum napifolium* Mill. = *H. niloticum* Mch.).

Salvia

- nivea Thbg. (= *lanceolata* Lam., non Brouss.), schneeweisse, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.
- nubia Ait. (= *abyssinica* Hochst.), nubische, 4. k. Abyssinien.
- nutans L., W. K. (= *acutifolia* Lam. = *betonicaefolia* Ettl. (ex parte) = *hastata* Ettl. = *pendula* Bess., non Vahl).
- occidentalis Sw. (= *procumbens* Lam. = *radicans* Poir. = *Hyptis glandulosa* Sieb. fl. mart.).
- odorata W. Enum. (= *albida* Jacq. = *argentea* Hort., non L.).
- officinalis L. (= *grandiflora* Tenore, non Ettl. = ? *papillosa* Hffg.).
- oppositiflora R. et P. (= *grata* Vahl), gegenblumige, ♀. t. Quito.
- paniculata L. (= *chamaeclacagna* Berg.).
- parviflora Vahl, (= *varia* Vahl), kleinblumige, 4. k. Syrien.
- patens Cav., Benth. (= *grandiflora* Nee, = *macrantha* Schltld. = *spectabilis* H. B. K.).
- phoenicea H. B. K. (= *hirtella* Vahl), hochrothe, ♀. t. Quito.
- plebeja RBr. (= *brachiata* Roxb. = *parviflora* Roxb., non Vahl, = *Lumnitzera fastigiata* Spgl. = *Ocimum fastigiatum* Roth), unansehnliche, ♀. t. w. Neuholland, Ostindien. Vergl. *S. corymbosa*.
- polystachya Ortega, (= *caesia* H. B. K. = *lineatifolia* Lagasca, = *breyניתica*, *eremetica*, *spicata* et *tetragona* Hort.), vielährige, ♀. k. Mexico.
- pratensis L. (= *agrestis* L.). Var.: *Barrelieri* Tenore, (= *Tenorei* Spgl. = *virgata* Savi), haematodes L., variegata W. K. (= *tricolor* Hortul.), alba, rubicunda Wender. (= *rubra* Hort.), rostrata Schm.
- prunelloides H. B. K., prunellaähnliche, ♀. t. k. Mexico.
- pseudococcinea Jacq., b) filamentosa Tausch.
- pulchella DC. (= *coccineo-fulgens hybrida* Uechtr. = *doliostachya* Lagasca).
- rectiflora Visiani (= *Karwinskyi* Hort., non Benth.), geradblumige, 4. ♀. k. t. ?
- Regla Cav. (= *deltoides* P. = *regina* Hort.), delta-blätterige, ♀. t. k. Mexico.
- rhombifolia R. et P. (= *foliosa* Benth. = *pilosa* Vahl), rautenblätterige, ♂. ♀. t. Peru.
- rosaefolia Sm. (= *orientalis* Mill., non Hort.).
- runcinata L. fil. (= *erosa* Dsf., Poir. = *scabra* Benth.).
- Russelii Benth., Russel's, 4. f. b. k. Syrien.
- ruthenica Weinm. (= *sylvestris* L. var.), russische, 4. f. Südl. Rußland.
- sagittata R. et P., pfeilförmige, 4. ♀. k. Peru.¹⁾
- salicifolia Pohl, (= *arguta* Benth. in Hrb. Berol.), weidenblätterige, ♀. w. Brasilien.
- scabiosaefolia Lam. (= *Habliziana* Pall., W. = *pini-folia* Pall. = *Scabiosae* P. = *taurica* Habl. = *vulnerariaefolia* W.).
- Sclarea L. (= *bracteata* Bot. mag. = *Simsiana* R. et S. var. = *haematodes* Scop. = *Sclarea vulgaris* Mill., Mch.).

1) Von den Eingebornen „Salvia real“ genannt, wird da-selbst wie unsere *Salvia officinalis* angewendet.

Salvia

scutellarioides H. B. K., schildkrautähnliche, 4. ⚥. w. t. Quito.

semiatrata Zuccar., halbschwärzliche, ⚥. t. k. Mexico.

Sibthorpii Sm. (= *amplexicaulis* Hort. = *Barrelieri* Hort. = *campestris* MB., Rehb. = *caucasica* Hort. = *hypanica* Andrzy., Bess. = *mollis* Jacq. fil. = *praecox* Loisel. = *pratensis* Haberl. = *taurica* et *virgata* Hort.), Sibthorp's, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

spicata R. et S. (= *Humboldtiana* Dietr. = *Humboldtii* Spgl. = *pulchella* H. B. K. = *saligna* W. herb.), ährenförmige, ⚥. t. k. Neuspanien.

spinosa L. mant. (= *abyssinica* L. fil. = *aegyptiaca* L. mant. = *praecox* Dsf. Hort. Par., et ? Vahl).

stachyoides H. B. K. (= ? *elongata* H. B. K. var. Benth. = *longifolia* W. herb.), ziestähnliche, 4. k. t. Mexico.

sylvestris L. (= *alpestris* Hort. = *asperula* Hort. = *desertorum* (= *deserta*) Schangin, = *taurica* Hort.), β) nemorosa L. (= *elata* Host, = *Sclaraea nemorosa* Mill. = *S. punctata* Mch. = *S. syriaca* Mill.), var. alba, rosea.

sylvicola Burch., waldliebende, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

triangularis Thbg. (= *tenuifolia* Burch.), dreikantige, 4. ⚥. k. Cap d. g. Hoffn.

triloba L. suppl. (= *auriculata* Mill. = *baccifera* Ettl. = *Clusii* Jacq. = ? *fruticosa* Mill. = *marrubiioides* Vahl, = *subtriloba* Schrk. = *sypilea* Lam.).

β) ovata Dietr.

tuberifera Cav. (= *longiflora* W., non R. et S.).

tubiformis Lk., Kl., Otto, röhrenförmige, 4. ⚥. t. w. Mexico.

Verbenaca L. (= *byzantina* Hort. = *heterophylla* Hort. = *horminoides* Pourr. = *illyrica* Schult. = *micrantha* Dsf. = *Spielmanni* W. Enum., non Scopol. = *Spielmanniana* MB. = *variabilis* Poir.), β) oblongifolia Benth. (= *betonicaefolia* Lam., non Ettl. = *oblongata* Vahl).

verticillata L. Var.: floribus albis, lampsanaefolia Vahl, mollis Don (non Jacq. fil.).

virgata Ait. (= *affinis* Spgl. = *Barrelieri* Hort. = *Bauhini* Hort. = *caduca* Hornem. = *caucasica* Schrk. = *garganica* Tenore, = *gigantea* Dsf. = *grandidentata* Tenore, = *quercifolia*, *taurica* et *taurina* Hort. = *pyrenaica* L. = *tiberina* Mauri, = *Sclaraea virgata* Mch.), b) rubra Spgl. Süditalien, Kleinasien etc.

viridis L. (= ? *Rosani* Tenore, = *Spielmanni* Scopol., non W. = *truncata* W. = *Horminum viride* Mch.), ♂. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

Unbestimmtere: antirrhiniflora Dehnh., arborescens Hort. (= *arborea* Hort.) crispa Tenore, dulcis Hort., flavescens Juss, Delil., Halleri Fisch., neglecta Tenore, scorodoniaefolia Dsf., tiliaefolia Brot. (non Vahl), undulata Wender.

Pag. 715 — 719 zu ergänzen und zu berichtigen.

Salzwedelia sagittalis Flor. Wetter., v. *Genista sagittalis*.

Samadera indica G., v. *Vittmannia elliptica*, p. 853.

Samara floribunda W., *coriacea* Sw., v. *Myrsine coriacea*, p. 538.

Sambucus T., L., Hollunder.

hirta Tausch, rauher, ♀. f. ?

japonica Thbg., japanischer, ♀. f. b. Japan.

lucida Tausch, spiegelnder, ♀. f. ?

mexicana Presl, (= *bipinnata* Ch. et Schldl.), mexicanischer, ♀. k. Mexico.

pubens Mchx., β) leucocarpa Nutt., γ) arborescens Nutt.

racemosa L., γ) praecox.

Sameraria armena Desv., v. *Isatis armena*, p. 424.**Samolus** T., p. 719, Pungen, Primulaceae-Samoleae.campanuloides RBr. (= *porosus* Thbg. = *Campanula porosa* Thbg.).litoralis RBr. (= *repens* P. = *Sheffieldia repens* L. fil.).β) *S. incana* LaBill.Valerandi L. (= *aquaticus* Lam.).**Samyda** L., (griechischer Name für Birke).

grandiflora Spgl., großblumige, ♀. w. Brasilien.

multiflora Cav., vielblumige, ♀. w. Caribäen.

pubescens L. (= *rosea* Sims, = *serrulata* Andr., nou L.).serrulata L. (= *denticulata* Poir.).

spinulosa Vent., dorniger, ♀. w. Caribäen.

tinifolia Vent., lorbeerblättrige, ♀. w. Ostindien.

Unbestimmt: *S. lucida* Hort., ♀. w. Westindien.**Sanguinaria** Dill.,canadensis L. (= *acaulis* Mch. = *virginiana* G.).β) *stenopetala* Otto.grandiflora Bosc, (= ? *Bartonis* Auct.).**Sanguisorba** Riv., L., Wiesenschopf.

alpina Bunge, Ledeb., Alpen-W., 4. f. Alt. Sibirien.

Andersonii Don, Anderson's, 4. f. Sibirien.

angustifolia Fisch., schmalblättriger, 4. f. Sibirien.

annua Nutt. (= *Poterium annuum* Nutt.), jähriger,
☉. f. Arkansasgebiet.carnea Fisch. (= *cernua* Bess. = *officinalis* L. var.Spgl. = *rubra* Schrk.), fleischfarbiger, 4. f. Galicien.dodecandra Morett. (= *macrostachya* Comolli), mehrfädiges, 4. f. Oberitalien.

mauritanica Dsf., mauritanischer, 4. k. f. b. Nordafrika.

officinalis L., β) altissima Mill. (= *auriculata* Scopol.,All. = *cordifolia* Opiz, = *praecox* Bess.), γ) sabauda Mill., δ) hispanica Mill., ε) ? *neglecta* G. Don,ζ) ? *ingrica* Sweet.

tenuifolia Fisch., Lk., dünnblättriger, 4. f. Dahurien.

Sanicula T., Sanikel.elata Hamilt. (= *canadensis* Thbg., non L. = *hermaphrodita* Don), hoher, 4. f. b. k. Nepal.**Sanseviella** Rchb., p. 720, Coronariae-Aloineae Endl. (Aroideae-Taccaceae Rchb.).carnea Rchb. (= *Aletris chinensis* Hort. = *Sansevieria**carnea* Andr. = *S. rosea* Dietr. = *S. sarmentosa*Jacq. = *S. sessiliflora* Ker).**Sansevieria** Thbg, Sansevieria.

flexuosa Blume, gebogene, 4. w. Java.

glauca Haw., blaugrüne, Sierra Leone.

guineensis W. (= *hyacinthoides* Hort. = *thyrsiflora*Thbg. = *Acyntha guineensis* Medic. = *Aletris* et*Aloe guineensis* Jacq. = *Salmia guineensis* Cav.).

polyphylla Haw., vielblättrige, 4. w. Sierra Leone.

Roxburghiana Schult. (= *zeylanica* Roxb.), Roxburgh's,
4. w. Ostindien.

Sansevieria

zeylanica W. (= ? *aethiopica* Thbg. = *Aletris hyacinthoides* a L. = *A. zeylanica* Mill. = *Aloe hyacinthoides* L. = *A. zeylanica* Jacq.).

Unbestimmtere: *striata* Don, *venosa* Don.

fragrans Jacq., v. *Dracaena fragrans*.

Santia plumosa Savi, v. *Polypogon monspeliensis*, p. 646 et p. 552 II.

Santolina T., Heiligenpflanze (Cypresse).

Chamaecyparissus L. (= *cupressiformis* Lam. = *dentata* Mch. = *incana* Lam.), β) *tomentosa* Moris, (= *squarrosa* P.), γ) *ericoides* Poir. (= *squarrosa* W. = *villosa* Mill.), δ) *villosissima* Poir.

elegans Boiss., zierliche, f. k. Spanien.

fragrantissima Forsk., wohlriechendste, f. k. Aegypten, Arabien, Syrien. ¹⁾

β) *ptarmicoides* Lam. (= *simplicifolia* L'Her.).

rosmarinifolia L. (= *tuberculosa* Lam.).

β) *canescens* Lagasca, (= ? *minor* Mill.).

Unbestimmtere: *chamaemelifolia* Mill., *decumbens* Mill.

crithmifolia Hornem., *eriosperma* P. (= *alpina*

Bertol. = *erecta* Murr., Lam.), v. *Lasiospermum*

crithmifolium et *pedunculare*, p. 447 et p. 344, II.,

muricata Guss., *anthemoides* L., ? *rigida* Sibth., Sm.,

montana Sibth., Sm., v. *Lyonnetia muricata*, *abro-*

tanifolia, *rigida* et *tenuiloba*, p. 485, 883 et 377, II.,

Amellus L., v. *Salmea scandens*, p. 715, *jama-*

censis L., v. *Calea jamaicensis*, p. 146, *maritima*

L., v. *Otanthus maritimus*, p. 573, *oppositifolia* L.,

v. *Isocarpha oppositifolia*, p. 425 et p. 323, II.,

squarrosa L., v. *Relhania squarrosa*, p. 680 et p.

586, II., *terrestris* Forsk. (= ? *rigida* Sibth., Sm.),

v. *Cyrtolepis monantha*, p. 184, II., *tinctoria* Mo-

lina v. *Cephalophora glauca*, p. 180.

Sanvitalia Gualt., Cav., Sanvitalie.

acinifolia DC., bergmünzenblättrige, \odot . m. f. Mexico.

Saouari glabra Aubl., v. *Caryocar glabrum*, p. 168.

Sapindus T., L., Seifenbaum.

esculentus St. Hil., geniefsbarer, f. w. Brasilien.

guineensis Don, guineischer, f. w. Guinea.

aurifolius Vahl, (= *acutus* Roxb. = *trifolius* L.).

Rarax DC. (= ? *pinnatus* Mill. = *Saponaria* Lour.),

chinesischer, f. t. w. China, Ostindien.

rubiginosus Roxb. (= *alternifolius* Hamilt. = *fraxini-*

folius DC. = *longifolius* Hamilt. = *Moulinsia cupa-*

nioides Camb. = *M. rubiginosa* Den).

Sapium Jacq., Saftbaum.

ilicifolium W. (= *Hippomane spinosa* L.).

indicum W. (= *bingerium* Roxb.).

laevigatum Lam., glatter, f. w. Insel Bourbon.

Laurocerasum Dsf., Kirschlorbeer-S., f. w. Antillen.

Aufser diesen werden in van Houtte Établissement horti-

cole et Makoy's Extrait du Catalogue des Plantes noch

folgende aufgeführt: *berberidifolium* (= *Coelobogyne*

berberifol. Hort. angl. = *Stillingia berberifol.* Hort.),

1) „Flores sicci odoratissimi, aqua pharmacopolas kahirenses loco Anthemidis nobilis, nomine „Bobouny s. Zeysoun“ venales prostant. Endl. Hort. acad. Vindob. I. p. 359.

Sapium

†. t. w., Drummondii †. t., heterophyllum †. t., Manglesii †. t., deren Vaterland mir unbekannt ist.
sebiferum Juss., Mirb., v. *Stillingia sebifera*, p. 789.

Saponaria L., Seifenkraut.

astroides Fenzl, sternförmiges, ☉. f. Mesopotamien.

caespitosa Sm. (= *Smithii* Sering.).

officinalis L. (= *Bootia vulgaris* Neck. = *Lychnis officinalis* Scopol.), d) foliis eleganter variegatis.

β) hybrida Mill

prostrata W., gestrecktes, 4. k. Orient.

pungens Bunge, stechendes, †. k. Altaisches Sibirien.

acaulis Fenzl, v. *Silene acaulis*, p. 755.

Sapota Adans., Mill. (= *Achras* L.), Breiapfel, VI. 1., Sapotaceae.

Achras Mill. (= *Achras Sapota* L., p. 11).

β) Zapotilla Jacq.

costata A. DC. (= *Achras costata* Endl.), gerippter, †. t. Norfolkinsel, Neuzeeland.

mammosa Mill., v. *Lucuma mammosa*, p. 479 et p. 373, II.

Saraca indica L. (= *arborescens* Blume), v. *Jonesia Asoca*, p. 430.

Saracha R. et P., Saracha.

allogona Schtdl. (= *Physalis allogona* Bernh., Kunze), krauskantige, ☉. 4. m. f. k. Südamerika.

biflora R. et P. (= *procumbens* R. et P. var. Spgl. = *Atropa biflora* P. = *Bellinia biflora* R. et S.), zweiblumige, ☉. 4. m. f. k. Peru.

brasiliensis Kl., brasilianische, ☉. 4. m. f. w. Brasilien.

Jaltomata Schtdl. (= *Jaltomata edulis* Schtdl.), genießbare, ☉. 4. m. f. k. Mexico.

micrantha DC. (= *Bellinia micrantha* R. et S.), kleinblumige, ☉. m. f. Südamerika.

procumbens R. et P. (= *Atropa plicata* Roth, = *At. procumbens* Cav. = *Bellinia procumbens* R. et S. = *Physalis solanacea* Mart. = *Solanum procumbens* DC.).

viscosa Schrad., schmierige, ☉. 4. m. f. k. Mexico.

Saragodra glabra Hort., v. *Gelonium fasciculatum*.

Sarcanthus Lindl., Fleischblume(stendel).

multiflorus Hoffg. (= *Vanda multiflora* H. Cels., non Lindl.), vielblumige, 4. w. ? Ostindien.

Die Pflanzenverzeichnisse der Handelsgärten erwähnen noch: *macranthus*, *oxyphyllus*.

guttatus Lindl., *praemorsus* Lindl. (= *papillosus* Hort.), v. *Rhynchostylis retusa* et *papillosa*, p. 594, II.

paniculatus Lindl., *rostratus* Lindl., v. *Vanda paniculata* et *recurva*.

Sarcochilus RBr., Fleischlippe(orche).

falcatus RBr., p. 722.

nepalensis Spgl. (= *Gastrochilus calceolaris* Don), nepalsche, 4. w. Nepal.

olivaceus Lindl., olivenfarbige, 4. w. Neuholland.

praemorsus Spgl., v. *Rhynchostylis papillosa*, p. 594, II.

Sarcocolla Neck., *officinalis* Kunth, v. *Penaea Sarcocolla*, p. 605.

Sarcoglottis Presl, Fleischzüngel, XX. 1., Orchideae.

grandiflora Klotzsch, großblumiges, 4. w. Brasilien.

picta Kl., a) variegata Kl. (= *Arethusa picta* Sims, = *Neottia acaulis* Sm. = *N. picta* Sims, Ait. =

Sarcoglottis

Spirathes picta Lindl., p. 779), β) *immaculata* Kl. Caracas.

speciosa Presl, prächtiges, 4. w. Peru.

Sarcogonum G. Don, Kunze, (= *Polygonum* Sect. *dubia* Endl.), Fleischknöterich, VIII. III.

adpressum G. Don, (= *Coccoloba appressa* Meisn. = *Polygonum appressum* LaBill.), angedrückter, $\frac{1}{2}$. k. Neuholland. ¹⁾

complexum Kunze, (= *Polygonum complexum* A. Cunn.), verwebter, $\frac{1}{2}$. k. Nördl. Neuzeeland.

Sarcophyllum carnosum Sims, (non Thbg., p. 722), v. *Lebeckia sarcophylloides* Nachlese.

Sarcostemma RBr., Fleischkrönchen.

aphyllum RBr. (= *viminale* RBr. var.? = *Asclepias aphylla* Thbg. = *Cynanchum aphyllum* L.), blattloses, $\frac{1}{2}$. Sch. w. Cap d. g. Hoffn.

campanulatum Decaisn. (= *Philibertia campanulata* L.), glockiges, $\frac{1}{2}$. Sch. w. Peru.

grandiflorum Decaisn. (= *Philibertia grandiflora* Hook. = *P. gracilis* D. Don, p. 615).

Swartzianum R. et S. (= *Asclepias scandens* Mill. = *A. viminalis* Sw. = *Schollia viminalis* Jacq. fil.).

viminale RBr. (= *Apocynum viminale* L. = *Cynanchum viminale* L. = *Euphorbia viminalis* L.).

Sarotes Lindl., Sarotes, V. 1., Büttneriaceae.

ledifolia Lindl., porstblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

Sarothamnus Wimmer et Grab., Besenstrauch(ginster).

arboreus B. Webb. (= *Cytisus arboreus* DC. = *Genista arborea* Spgl. = *G. pendulina* Poir., nec Lam. = *Spartium arboreum* Dsf.), baumartiger, $\frac{1}{2}$. k. Nordafrika.

patens B. Webb. (= *Cytisus patens* L. = *C. pendulinus* L. fil. = *Genista tomentosa* Poir. = *Spartium patens* L.), absteher, $\frac{1}{2}$. k. Portugal.

vulgaris Wimm. (= *scoparius* Wimm., Grab. = *Cytisus scoparius* Lk. Enum.).

Die übrigen Synon. s. p. 885.

Sarracenia T. (= *Sarrazinia* Hffg.), Sarracenie.

Catesbaei Ell. (= *flava* L. var. Croom, = *heterophylla* Ell.), Catesbaei's, 4. k. Nordamerika.

Drummondii Cerom, Drummond's, 4. k. Nordamerika.

psittacina Mchx. (= *calceolata* Nutt. = *pulchella* Croom), bunte, 4. k. Nordamerika.

Sassa Bruce, *gummifera* Gmel., v. *Acacia gummifera*; p. 3.

Sassafras N. E., Sassafrasbaum, IX. 1., Laurineae.

albidum N. E. (= *Evosmus albida* Nutt. = *Tetranthera albida* Spgl.), weißlicher, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Carolina.

officinale N. E. (= *Evosmus Sassafras* Nutt. = *Laurus Sassafras* L., p. 449, = *Persea Sassafras* Spgl.), gebräuchlicher, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordamerika.

Sassia perdicaria Molina, *S. tinctoria* Molina, v. *Oxalis lobata* et *violacea*, p. 576 et 578.

1) „Habitat in Novae Zeelandiae borealis littoribus arenosis, prope Bay of Islands dumos densos formans (Hügel). Nondum floruit, nec siccam vidi nisi sterilem.“ Endl. Hort. acad. Vindob. I. p. 273.

Satureja T., L., Benth., *Saturei* (Pfeffer- oder Bohnenkraut).

inodora Salzm. (non Host), geruchloses, ♀. k. Nordafrika.
intermedia C. A. Mey., mittleres, 4. ♀. f. b. Caucasus.
montana L. (= *cuneifolia* Tenore, = *obovata* Lagasca, = *Juliana* Pall., non L., = *trifida* Mch. = *Micromeria montana* Rehb.).

parviflora Presl, (non Visian.), kleinblumiges, 4. ♀. f. b. k. Sicilien.

pygmaea Sieber, (= *hyssopifolia* Auct. = *illyrica* Host, *montana* β *subspicata* Bernh., Benth. = *subspicata* Barth., Visian. = *Micromeria pygmaea* Rehb.).

β) *variegata* Host.

spinosa L., dorniges, ♀. k. Creta.

rupestris Wulf. (= *thymifolia* Scop.).

Thymbra L. (= *S. Tragoriganum* Tausch, = *Thymus Tragoriganum* L. mant.).

virgata Visian. (= *fasciculata* Tausch, = *spicata* Visian. = *Micromeria spicata* Rehb.), ruthenförmiges, 4. ♀. f. b. k. Dalmatien.

capitata L., *Mastichina* L., v. *Thymus capitatus* et *Mastichina*, *origanoides* L., v. *Cunila Mariana*, *virginiana* L., v. *Pycnanthemum linifolium*, p. 668.

Hinsichtlich der übrigen (Sect. II. p. 722) s. *Micromeria* p. 406 et p. 407, II.

Satyrium L., Faunstendel.

bracteatum Thbg. (= *Diplectrum bracteatum* P. = *Ophrys bracteata* L. fil. = *Orchis bracteolaris* Salisb.), deckblättriger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

cassideum Lindl., haubiger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

cordifolium Lindl., herzblättriger, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.

coriifolium Sw. (= *cucullatum* Lodd., non Sw. = *Diplectrum coriifolium* P. = *Orchis cornuta* Houtt.).

cucullatum Sw. (= *bicorne* Thbg. = *Diplectrum cucullatum* P. = *Orchis bicornis* L.).

erectum Sw., Thbg. (= *Diplectrum erectum* P.), aufrechter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

lineatum Lindl. (= ? *bracteatum* Ker), linirter, 4. t. w. Cap d. g. Hoffn.

parviflorum Sw. (= *bicorne* var. Thbg. = *cucullatum* Sw. var. Sogl. = *Diplectrum parviflorum* P. = *Orchis bicornis* Ait., Jacq.).

pictum Lindl., bemalter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

striatum Thbg. (= *Diplectrum striatum* P.), gestreifter, 4. Kn. t. w. Cap d. g. Hoffn.

adnatum Sw., v. *Pelexia adnata*, p. 604, *albidum* L., v. *Leucorchis albida*, p. 356, *alpinum* P., v. *Chamorchis alpina*, p. 187, *anthropophorum* L., v. *Aceras anthropophora*, p. 9, *bifolium* Wahlbg., v. *Platanthera bifolia*, p. 633 et 536, II., *bracteatum* P., *diphyllum* Lk., *virescens* P., *viride* L. (= *fuscescens* Huds.), v. *Peristylus bracteatus*, *cordatus*, *virescens* et *viridis*, p. 500, II., *conopseum* Wahlbg., v. *Gymnadenia conopsea*, *Epipogium* L., v. *Epipogium* Gmelini, p. 291, *flexuosum* Thbg., v. *Schizodium flexuosum*, *giganteum* L. fil., v. *Cyrtopera gigantea* p. 184, II., *grandiflorum* Thbg., v. *Disa grandiflora*, p. 207, II., *hircinum* L., *maculatum* Dsf. (= *parviflorum* P.), v. *Himantoglossum hircinum*, p. 880 et *H. secundiflorum*, p. 301, II., *Mo-*

Satyrium

norchis P., v. *Herminium Monorchis*, *nigrum* L., v. *Nigritella angustifolia*, p. 548, *orchioides* Sw. (= *plantagineum* L.), v. *Stenorhynchus orchioides*, p. 787, *repens* L., v. *Goodyera repens*, *spirale* Sw., *elatum* Sw., v. *Spiranthes tortilis et elata*, p. 779, *triste* L. fil. (= *capense* Houtt.), v. *Eulophia tristis*, *rufescens* Sw., v. *Monadenia rufescens*, p. 415, II.

Saurauja W. (= *Sauravia* Auct. = *Leucothea* Moç., Sess. = *Palava* R. et P., non Cav.), Saurauja.

gigantea DC. (= *Scapha gigantea* Noronh. = *Ternstroemia racemosa* Don), riesenhafte, f. w. Java, Nepal.

macrophylla v. Houtte, großblättrige, f. w. Java.

nepalensis DC. (= *micrantha* Blume, = *Ternstroemia paniculata* Wall.).

serrata DC. (= *Davaya serrata* Moç., Sess. = *Leucothea serrata* Moç., Sess.), sägezähnlige, f. t. Java.

spectabilis Hook., ansehnliche, f. w. Bolivia.

Sauromatum Schott, Endl., Eidechsenwurz, XXI. ix., Aroideae.

guttatum Schott, (= *Arum guttatum* Wall.), getüpfelte, 4. w. Ostindien.

pedatum Schott, (= *Arum clavatum* Dsf. = *A. pedatum* Fisch. msc., Lk. et Otto, p. 86). Caracas.

sessiliflorum Schott, (= *Arum sessiliflorum* Roxb.), stiellosblumige, 4. w. Ostindien.

venosum Kunth, (= *Arum venosum* Ait.), aderige, 4. w. Ostindien.

Saururus natans L., v. *Aponogeton monostachys*, p. 69.

Saussurea DC., Saussurea.

alpina L., β) *pumila* Fisch., δ) *viridis* DC.

amurensis Turcz., amurische, 4. f. Dahurien.

crassifolia DC. (= ? *salsa* Ledeb. = *Heterotrichum salsum* MB. = *Serratula salina* Pall. = *S. salsa* Pall.).

denticulata Ledeb., gezähnelte, 4. f. Sibirien.

discolor DC. (= *controversa* DC.), β) *eriolepis* Bunge. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.

elongata DC. (= *salsa* Ledeb.), β) *polypodiifolia* DC. (= *Heterotrichum Stelleri* MB. = *Serratula Stelleri* Stephan.).

glomerata Poir. (= *amara* var. *integrata* DC. = *laevigata* Tausch), knaulförmige, 4. f. Sibirien.

laciniata Ledeb., schlitzblättrige, 4. f. Alt. Sibirien.

liatroides Fisch. (= *pycnocephala* Ledeb. = *Lagrostemon liatroides* Fisch., Wydl. = *Serratula liatroides* Adams), prachtschartenähnliche, ♂. f. Sibirien.

macrocephala Less., großköpfige, 4. f. Sibirien.

macrophylla Sauter, (= ? *alpina* DC. var.), großblättrige, 4. f. Tyroler Alpen.

pulchella Fisch. (= *dissecta* Ledeb. = *Heterotrichum pulchellum* Fisch. = *Serratula pulchella* Sims, = *Theodora pulchella* Cassini).

pygmaea Spgl. (= *monocephala* Cass. = *Carduus pygmaeus* Jacq. = *Cirsium pygmaeum* Scop. = *Cnicus pygmaeus* L. = *Lagrostemon pygmaeus* Cass.).

rigida Ledeb., starre, 4. f. Altaisches Sibirien.

robusta Ledeb., starke, 4. f. Alt. Sibirien.

salicifolia DC. (= *multiflora* DC. = *Heterotrichum leptophyllum* MB.).

Saussurea

serrata DC. (= *Serratula alpina* β *cynoglossifolia* L., W.), sägezähnige, 4. f. Alt. Sibirien.

β) *atriplicifolia* MB.

Saussurea Salisb. v. *Funkia*.

Saussurea pinnatifida Mch., v. *Nepeta lavandulacea*, p. 545.

Sauvagesia L., Spgl., Sauvagesie.

erecta L. (= *Adima* Auct. = *geminiflora* Ging. = *peruviana* R. et S.).

fruticosa Mart., Zuccar., strauchige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

nutans Pet. Thouars, (= ? *erecta* L. var.).

salicifolia Ging., weidenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

Savastana hirta Schrk., v. *Hierochloa australis*.

Saxifraga T., L., Steinbrech.

I. *Bergenia* Mch. (= *Geryonia* Scrk. = *Megasea* Haw.).

aemula Tausch, (? Hybride von *cordifolia* u. *crassifolia*), lieblicher, 4. f. ?

ciliata Royle (non Haw.), gefranzter, 4. k. Nordindien.

II. *Diptera* Borkh., Lk. (= *Ligularia* Borkh., Duval, Haw.), v. p. 206, II.

III. *Gymnopera* D. Don, (= *Robertsonia* Haw.).

dahurica Pall., W. (= *punctata* Pall., non L.), dahurischer, 4. f. Dahurien.

erosa Pursh, (= *caroliniana* Schl. = *gracilis* Schl. = *micranthifolia* Steud. = *Aulaxis micranthifolia* Haw. = *A. nuda* Haw. = *Rorberts. micranthifol.* Haw.).

excavata Kunze, ausgehöhlter, 4. f. Graubünden.

leucanthemifolia Lapeyr. (= *Clusii* Gouan, = *Spathularia Clusii* Haw. = *Sp. leucanthemifolia* Haw.).

umbrosa L. (non Hort.), (= *spathularis* Brot.).

? β) *crenata* Haw.

Wildiana Kunze, (= *hirsuto-Aizoon* Rchb.), Wild's, 4. f. ?

IV. *Leiogyne* D. Don, (= *Lobaria* Haw., pro parte et *Micropetalum* Tausch).

aspera L. (= *cherlerioides* Don, = *intermedia* Hegetschw. = *Ciliaria aspera* Haw.).

cochlearifolia Schrad., löffelkrautblättriger, 4. f. ?

cuneata W. (= *cuneifolia* Cav., non L. = *L. cuneifolia* Haw.).

Hirculus L. (= *Hirculus hieracioides* Haw.).

β) *propinqua* RBr.

multiflora Ledeb., vielblumiger, 4. f. Sibirien.

sibirica L. (= *Cymbalaria* MB. = *granulata* β Stev. = *rivularis* Towns.), β) *grandiflora* Stbg.

V. *Micranthes* D. Don.

elongata Stbg. (= *pilosa* Haw. = *verna* Hort. = *vernalis* Hort. = *virginiensis* Don, = *Dermasea elongata* Haw.), verlängerter, 4. f. Nordamerika.

β) *subspathulata* Stev. (= *nivalis* Mühlbg. = *pilosa* Banks, = *vernalis* W. = *virginica* Nutt. = *virginiensis* Mchx.).

hieracifolia W. K. (= *nivalis* var. *racemosa* Towns. = *rigida* Chr. Sm. = *uliginosa* Fisch. = ? *Micranthes hirta* Haw.).

melaleuca Fisch. (= *altaica* Stephan. = *elongata* β *glabra* Stbg.), schwarzweißser, 4. w. Alt. Sibirien.

nivalis L. (= *Dermasea nivalis* Haw.), γ) *tenuis* Whlbg.

pennsylvanica L. (= *caroliniana* Hort. = *marylandica* Hort. = *palustris* Hort.).

pyrolaefolia D. Don, (= *Leptarrhena pyrolaefolia* RBr.).

Saxifraga

VI. Saxifraga genuina.

- Aizoon Jacq. (= *Cotyledon* ε L. = *rosularis* Schlchr. = *rosulenta* Ehrh. = *submutica* Hort. = *Chondrosea Aizoon* et *rosularis* Haw.), var. *neglecta* Tenore, (= *retusa* D. Don).
- australis* Moric. (= *Aizoon* Guss. = *longifolia* Lapeyr. var. Moretti, = *pyramidalis* Tenore), südlicher, 4. f. b. Neapel.
- caespitosa* L., Sm. (= *dubia* Schlchr. = *hirta* Don, = *hypnoides aristata* et *septifida* Haw. = *hypnoides* ϑ *villosa* Walk. Arn. = *incurvifolia* Don, = ? *Lapeyrousii* Stbg. = *palmata* Sm. = *petraea* Roth, non L. = *rupestris* Schlchr. etc.).
- capitata* Lapeyr. (= *ajugaefolia* β DC. = *geranioides* Geners. = *perdurans* Kit.), kopfförmiger, 4. f. Pyrenäen, Ungarn.
- cartilaginea* W. (= *Aizoon* L. var. Sering. = *intacta* W. var. Don, = *Chondrosea cartilaginea* Haw.), knorpeliger, 4. f. Caucasus.
- ceratophylla* Dryand. (= *paniculata* Hornem. = *trifurcata* Schrad.).
- depressa* Stbg. (= *androsacea* L. var. Spgl.), niedergedrückt, 4. f. b. k. Italien.
- diapensioides* Bell. (= *caesia* β Lam. = *glauca* Murr. = *Chondrosia diapensioides* Haw.).
- dissimilis* G. Don, verschiedenähnlicher, 4. f. Schottland.
- Friederici Augusti* Biasoletto, Friedrich-August's, 4. k. f. b. Montenegro.
- geranioides* L. (= *cuspidata* et *paniculata* Schlchr. = *quinquefida* Lam.), ? β) *Candollei* Tausch.
- hypnoides* L., α) *gemmifera* Sering., β) *angustifolia* Sering. (= *curvata* Schlchr. = *densa* Schlchr. = *densifolia* Schlchr. = *elongella* Schlchr., Sm. = *sponhemica* Gmel. = *Aitoni* Haw.), γ) *condensata* Gmel. (= *flavescens* Stbg. = *Gmelini* Hort. = *palmata* Lej., Panz. = *Sternbergii* W.), δ) *leptophylla* Sering. (= *angustifolia* Hort. = *denudata* Don, = *leptophylla* P. = *planipetala* Hort. = *platypetala* Sm. = *procumbens* Juss. herb. = *recurva* Schlchr. = *retroflexa* Hort. = *h. rhodopetala* Haw. = *Schraderi* Stbg.), ε) *elongella* Sering. (= *affinis* Don, = *congesta* Schlchr. = *laetevirens* Don, = *laevis* Schlchr., Don, = *latifida* Haw. = *rupestris* Schlchr. = *trifida* Schlchr.), ζ) *spathulata* Haw. (= *crateriformis* Hort. = *dubia* Schlchr.).
- juniperina* Adams, MB., wachholderähnlicher, 4. f. Caucasus.
- laevis* MB., glatter, 4. f. Caucasus.
- Lapeyrousii* Don, (= *aretioides* et *mediae* var. *hybrida* DC. = *luteo-purpurea* Lap.), Lapeyrous's, 4. f. b. k. Pyrenäen.
- longifolia* Lapeyr., α) *nutans* Stbg., β) *media* Stbg.
- muscoides* Wulf. (= *varians* Sbr.), α) *microphylla* Gaud. (= *caespitosa* Scopol., Suter, = *pygmaea* Haw. = *pyrenaica* Vill.), β) *elatior* Gaud. (= *caespitosa* Stbg. = *elongella* Haw. = *muscosa* Suter, = *nervosa* Schlchr. = *Muscaria muscoides* β *elongella* Haw.), γ) *crassifolia* Gaud., δ) *uniflora* Gaud. (= *acaulis* Gaud. = *caespitosa* Lapeyr. = *Muscaria acaulis* Haw.), ζ) *capitata* Gaud. (= *striata* Hall. fil.), ϑ) *atropur-*

Saxifraga

purea Stbg. (= *ampullacea* Tenore, = *Muscaria atropurpurea* Haw.).

pedatifida Ehrh., Sm. (= *fragilis* Schrk. = *geranioides* δ *pedatifera* Sering. = *ladanifera* Lapeyr. = *quinquefida* var. Lam.).

sedoides L. (= *androsacea* Comoll. = *aphylla* Tenore, = *trichodes* Scopol.).

β) *saginoides* Fröl., γ) *Hohenwarthii* Stbg.

valdensis DC. (= *caesia* β *major* Don, = *compacta* Stbg. = *patens* Stbg., non Gaud. = *rupestris* Thomas), waldensischer, 4. f. b. k. Savoyen.

Vandelli Stbg. (= *Burseriana* Lapeyr. = *Burseriana* β Jacq. = *Chondrosia Vandelli* Haw.), Vandelli's, 4. Oberital. Alpen, Pyrenäen.

VII. Zahlbruckneria Rchb. (*Lobaria* Haw. pro parte).

Cymbalaria L. (= *hederacea* MB. = ? *orientalis* Jacq., W.), cymbelkrautähnlicher, ♂. 4. f. b. k. Orient.

hederacea L., p. 725.

orientalis Jacq. (= *reticulata* W. = *Lobaria orientalis* et *reticulata* Haw.), morgenländischer, ☉. ♂. f. Orient, Caucasus.

paradoxa Stbg. (= *Lobaria paradoxa* Haw. = *Z. paradoxa* Rchb., p. 862).

Unbestimmtere: *Bucklandii* Hort., *canescens* Haw., *elegans* Zeyh., Schrk., *florulenta* Moretti, Oberitalien, *furcata* Lapeyr., Pyrenäen, *hirta* Haw., *intermedia* Sweet, (= *Chondrosia intermedia* Haw.), *lanceolata* Haw., *minor* Sbr., *modesta* Rchb., *nitida* Schreb., Stbg. (= *Chondrosia nitida* Haw.), *nuda* Haw., *pulchella* Don, *quinquedens* Haw., *ranunculoides* Dsf., *tridens* Haw., Schottl., *tridentata* Don, *viscosa* Haw.

Scabiosa T., L., R. et S. (= *Chaetaria* Neck. = *Columbaria* Thuill. = *Sclerostemma* Schott, = *Spongostemma* Rchb.).

africana L., β) *incisa* Mill., γ) *indurata* L.

aleppica Coult., aleppische, ☉. f. Aleppo.

amoena Jacq. (= *Columbaria* L. var. *a* Coult. = *longepedunculata* Fisch. = *nitida* Bernh.).

atropurpurea L. (= *calyptocarpa* St. Am.), g) *grandiflora* Hort., non Scopol.

caucasica MB. (= *coerulea* Fisch.).

cretica L. (= *frutescens* Mill.).

Cupani Gussone, (= *maritima* L. var. Auct.), Cupani's, ☉. ♂. f. Sicilien.

Fischeri DC. (= ? *comosa* R. et S. = *dahurica* Fisch., non W.).

Hornemanni Spgl. (= *pyrenaica* Hornem., non All.), Hornemann's, 4. f. ?

limonifolia Vahl, wegerichnelkenblättrige, ♂. k. Sicilien.

micrantha Dsf. (= *Biebersteinii* R. et S. = *sicula* MB., non L. = *ucranica* var. δ Coult.).

monspeliensis Jacq. (= *Jacquini* R. et S. = *simplex* DC. = *stellata* L. var. DC.), südfranzösische, ☉. f. Südfrankreich, Nordafrika.

palaestina L. (= *fimbriata* Mill. = *Vahlia* Coult.).

pumila L. (= *acaulis* L. = *nudicaulis* Lam.), kleine, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

reversa Ledeb., rückwärtshaarige, 4. f. Sibirien.

stellata L. (= *rotata* MB.).

Scabiosa

suaveolens Dsf. (= *asterocephala* Thuill. = *canescens* W. K. = *incana* Schult.).

ucranica L., β) *argentea* L. (= *alba* Scopol. = *Gmelini* St. Hil. = *pilosa* R. et S.), γ) *sicula* L. (= *divaricata* Jacq. = *eburnea* Sibth., Sm. = *maritima* Wulf. = *Wulfenii* R. et S.).

Unbestimmtere: *humilis* Host, (= *Gemonae* Dietr.), *tenuifolia* W., *villosa* Schousb., *vivipara* N. E.

Hinsichtlich der übrigen siehe die Gattungen *Knautia*, *Pterocephalus*, *Succisa*.

Scabiosa L., Spaltglocke.

anchusaefolia Benth., ochsenzungenblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuh. *ciliata* G. Don, (= ? *Gaudichaudiana* Chamiss.), gewimperte, $\frac{1}{2}$. t. Sandwichinseln.

glabra Hook., kahle, $\frac{1}{2}$. t. Sandwichinseln.

ivaefolia G. Don, ivablättrige, $\frac{1}{2}$. t. w. Trinidad.

microcarpa Cavan. (= *laevigata* P. = *Goodenia albida* Sm. = *G. laevigata* Curt.).

mollis Hook., weiche, $\frac{1}{2}$. t. Sandwichinseln.

Plumieri L., Vahl, (= *S. Lobelia* Vahl, W. = *Lobelia frutescens* Mill. = *L. Plumieri* L.).

suaveolens RBr. (= *Goodenia calendulacea* Andr. = *G. stricta* Sm. var. ? Poir.).

Unbestimmt: *Tournoa* W. Enum.

Scandix T., G., Kerbel.

apiculata DC., kurzspitziger, \odot . f. Orient.

australis L. (= *petraea* Auct. = *Pecten* β Lam. = *Chaerophyllum australe* Crtz. = *Ch. rostratum* β Lam. = *Myrrhis australis* All. = *Wylia australis* Hoffm.).

grandiflora L. (= ? *hirsuta* Biasol. = *Chaerophyllum grandiflorum* Lam. = *Wylia grandiflora* Hoffm.).

macrorhyncha C. A. Mey. (= *australis* Hort.), großschnäbeliger, \odot . f. ?

pinnatifida Vent. (= *Stella* Russel, = *Chaerophyllum pinnatifidum* Poir.), β) *soongarica* Schrenk.

Unbestimmtere: *aegyptiaca* Hort., *parviflora* Retz.

aurea Roth, *hirsuta* Scopol., *nodosa* L., *procumbens* L., *temula* Roth, (= *nutans* Mch.), v. *Chaerophyllum aureum*, *hirsutum* etc., p. 185—186, *Bulbocastanum* Mch., v. *Carum Bulbocastanum*, p. 167, *Anthriscus* L., *Cerefolium* L., *fumarioides* W. K., v. *Anthriscus vulgaris*, *Cerefolium* etc., p. 65, *dulcis* Mühlbg., v. *Osmorhiza longistylis*, p. 463, II., *infesta* L. (non Jacq.), *infesta* Jacq., *trichosperma* L., v. *Torilis helvetica*, *infesta*, *trichosperma*, p. 813, *macrosperma* W., v. *Grammosciadium meoides*, p. 273, II., *odorata* L., v. *Myrrhis odorata*, p. 534, *ternata* Mch., v. *Cryptotaenia canadensis*, p. 174, II. *Scapha gigantea* Noronh., v. *Saurauja gigantea*.

Scaphyglottis Poepp., Endl., Nachenlippe.

graminifolia Poepp., Endl., grasblättrige, 4. w. Peru.

pallidiflora Lindl., bleichblunige, 4. w. Trinidad.

stellata Lindl., sternförmige, 4. w. Demerara.

Scelochilus Kl., Lippenstendel, XX. 1., Orchideae.

Ottonis Kl., Otto's, 4. w. Caracas.

Scepinia Neck., *lepidophylla* Cass., v. *Pteronia glomerata*, p. 665.

Sceptranthes Drummondii Grah. (= Cooperia pedunculata Herb. = Zephyranthes Drummondii D. Don), p. 729.

- Schaefferia** Jacq., completa Sw. (= *frutescens* Jacq.).
- Schanginia** Ledeb., C. A. Mey., Schanginie.
linifolia C. A. Mey. (= *Chenopodium linifolium* Schult. = *Suaeda linifolia* Pall.), gleichbreitblättrige, ☉. f. Alt. Sibirien.
altissima C. A. Mey., *trigyna* * v. *Suaeda altissima*, *trigyna*.
- Schaueria** N. E. (J. C. Schauer, Prof. in Greifswalde, früher in Breslau, et S. Schauer in Breslau, sehr thätige Botaniker), v. *Justicia* Sect. XIII., p. 435 et p. 332, II.
- Schedonorus** P. Beauv. (pro parte), (= *Schoenodorus* Auct. = *Schoedonorus* R. et S.), Trespenschwingel, v. *Bromus* Sect. c. p. 133 et p. 79, II.
Schefflera digitata Forst., v. *Aralia Schefflera*, p. 41, II.
- Schelhameria** RBr., *multiflora* RBr., *undulata* RBr., p. 729.
multiflora Hort., v. *Kreysigia multiflora*, p. 337, II.
Schelveria arguta N. E., v. *Angelonia procumbens*, p. 36, II.
- Schidiomyrtus** J. C. Schauer, (= *Jungia* G. = *Imbricaria* Sm. = *Mollia* Gmel.), Spaltmyrte, VIII. 1., Myrtaceae.
crenulata J. C. Sch. (= *Baeckea crenulata* DC. = *Escallonia crenulata* R. et S. = *Imbricaria crenulata* Sm. = *Jungia imbricata* G. = *Mollia imbricata* Gmel. = *Philadelphus imbricatus* Soland. = *Stereoxylon crenulatum* R. et S.), gekerbte, ♀. t. k. Neuholland.
diosmaefolia J. C. Sch. (= *Baeckea diosmaefolia* Rudge, p. 110), Diosmablättrige, ♀. t. k. Neuholland.
micrantha J. C. Sch. (= *Baeckea micrantha* DC.), kleinblumige, ♀. t. k. Neuholland.
microphylla J. C. Sch. (= *Baeckea gracilis* Cunn. = *B. microphylla* Rudge, Sieb. = *Escallonia ciliata* R. et S. = *Imbricaria ciliata* Sm. = *Jungia tenella* G. = *Philadelphus tenellus* Soland. = *Stereoxylon ciliatum* Poir.), kleinblättrige, ♀. t. k. Neuholland.
Sieberi J. C. Sch. (= *Baeckea diosmoides* Sbr.), Sieber's, ♀. t. k. Neuholland.
Schilleria abutiloides Kunth, *catalpaefolia* Kunth, *caudata* Kunth, v. *Piper abutiloides*, *catalpaefolium*, *caudatum* etc., p. 628 et p. 530, II.
Schima Noronhae Reinw., v. *Gordonia Wallichii*, p. 272, II.
- Schinus** L., Mastixstrauch.
dentatus Andr., gezählter, ♀. t. k. Sandwichinsel.
tenuifolius Gill., Hook., dünnblättriger, ♀. t. k. Chili.
virgatus Sweet, ruthenförmiger, ♀. t. k. Lima.
- Schismus marginatus** P. Beauv. (= *fasciculatus* Trin. = *Electra nilida* Panz. = *Festuca barbata* Lam. = *F. calycina* L. = *F. pilosa* Hort. = *Hemisacris gonatodes* Steud. = *Koeleria calycina* DC.).
- Schistanthe** Kunze, Spaltblümchen, XIV. 11., Personatae-Scrofularineae (Scrophularineae-Antirrhineae).
peduncularis Kunze, langstieliges, 4. k. t. Cap d. g. Hffn.
- Schistocarpa** Less., Spaltnüfschen, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
bicolor Less. (= *Perymenium discolor* Hort., non ? Schrad.), zweifarbiges, ♂. ♀. k. Mexico.

Schizanthus R. et P., Schlitzblume.

alpestris Poepp., Voralpen-S., ☉. m. f. Chili.

candidus Lindl., weißglänzende, ☉. m. f. Chili (Coquimbo).

Grahamii Gill., Hook., Graham's, ☉. m. k. f. Chili.

Hookeri Gill. (= *Cruikshanksii* Hort.), Hooker's, ☉. m. f. Chili.

pinnatus R. et P., β) *humilis* Lindl., γ) *porrigens* Grak.,

δ) *pinnatifidus* Lindl. (= *major* Hffg.), ? ϵ) *gracilis* Benth.

retusus Hook. (= *Grahamii* var. Auct.).

Hybriden: *Ewansianus* Paxt., *Priestii* Paxt.

Schizocarpum Schrad., Schlitzkürbis, XXI. x., Cucurbitaceae.

filiforme Schrad., fadenförmiger, ☉. m. f. Mexico.

Schizocarya Drummondii Spach, *Kunthii* Spach, *micrantha* Spach, v. *Gaura Drummondii*, *epilobioides*, *parviflora*, p. 256.

Schizodium Lindl., Spaltstendel, XX. r., Orchideae.

flexuosum Lindl. (= *Disa flexuosa* Sw. = *Orchis flexuosa* L. = *O. undulata* Poir. = *Satyrium flexuosum* Thbg.), gebogener, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Schizonotus Lindl., *Lindleyanus* Wall., *sorbifolius* Lindl., v. *Spiraea Lindleyana*, *sorbifolia*.

Schizopleura Lindl., Schlitzrippe, XVIII. ii., Myrtaceae.

Dampieri Cunningh. (= *Beaufortia carinata* Cunn. = *B. Dampieri* Cunn., p. 115).

macrostemma Lindl. (= *Beaufortia macrostemma* Lindl.), großfadige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland (Schwanenfluß).

purpurea Lindl. (= *Manglesia purpurea* Lindl.), purpurfarbige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland (Schwanenfluß).

Schkuhria Roth, Schkuhrie.

virgata DC. (= *Miersia virgata* Llalav. et Lex.), ruthenförmige, ☉. f. Mexico.

Schkuhria dichotoma Mch., v. *Siegesbeckia flosculosa*, p. 755.

Schlechtendalia W. (non Spgr., nec Less. et DC.),

(D. F. C. v. Schlechtendal, königl. preufs. Oberlandesgerichts-Präsident † zu Paderborn 1842, Freund des unvergeßlichen Willdenow, Kenner und eiferiger Förderer der amabilis scientia; Dr. F. L. v. Schlechtendal, dessen Sohn, Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens zu Halle a. d. S., einer der kenntnißreichsten u. unermülichsten Pflanzenforscher unserer Zeit), XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

glandulosa W. (= *Adenophyllum coccineum* P. = *Boebera Cavanillesii* Spgl. = *Dysodia Cavanillesii* Lagasc. = *Tagetes punctata* Moç., Sess. = *Willdenowia glandulosa* Cav.), drüsige, ☉. m. f. Mexico.

capillacea Moç., Sess. (= *Adenophyllum capillaceum* DC.), Mexico, scheint nicht kultiv. zu werden.

Schleichera trijuga W., v. *Melicocca trijuga*, p. 507.

Schlosseria Mill., v. *Coccoloba uvifera*, p. 209.

Schmaltzia aromatica Desv., v. *Rhus aromatica*, p. 686 et p. 592, II.

Schmidelia L., Schmidelie.

Cobbe DC. (= *cochinchinensis* DC. = *Allophyllus Cobbe* Sw. = *A. ternatus* Lour. = *Aporetica ternata* Forst. = *Ornithrophe asiatica* Hort. = *O. Cobbe* W. = *Pometia ternata* W. = *Rhus Cobbe* L. = *Toxicodendron Cobbe* G.), dreizählige, $\frac{1}{2}$. t. w. Ceylon, Neucaledonien, Cochinchina.

Schnella Radd., DC., *Schnella*, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

macrostachya Raddi, (= *Bauhinia unguolata* L., p. 115), grofsährige, f. w. Brasilien.

microstachya Raddi, (= *Bauhinia variegata* L., p. 115), kleinährige, f. w. Brasilien.

Schnizleinia nodiflora Steud., v. *Trochiscanthes nodiflorus*, p. 825.

Schoberia Ledeb., C. A. Mey., *altissima* C. A. Mey., *baccifera* C. A. Mey., *Biebersteiniana* C. A. Mey., *Clemente* Steud., *fruticosa* C. A. Mey., *hortensis* Steud., *maritima* C. A. Mey., *microphylla* C. A. Mey., *Pallasiana* C. A. Mey., *salsa* C. A. Mey., *setigera* C. A. Mey., *spicata* C. A. Mey., *trigyna* C. A. Mey., v. *Suaeda altissima*, *baccifera* etc.

Schoenocaulon Asa Gray, Läusesamen, VI. III., Colchicaceae-(Melanthaceae)-Veratreae.

caricifolium Asa Gray, (= *Asagraea caricifolia* Kunth, = *Sabadilla caricifolia* Schltdl. = *Veratrum caricifolium* Schltdl., p. 837), rietgrasähnlicher, 4. k. Mexico.

officinale Endl. (= *Asagraea officinalis* Lindl. = *Sabadilla officinalis* Schltdl., Brandt, = *Veratrum officinale* Schltdl.), gebräuchlicher, 4. k. Mexico.

S. gracile A. Gray, (= *Helonias dubia* Mchx.), 4. Carolina, Florida, scheint nicht kultivirt zu werden.

Schoenoprasum lineare H. B. K., *longifolium* H. B. K., v. *Nothoscordum Kunthii* et *longifolium* Nachlese.

Schoenus L., Knopfsgras.

mucronatus L. (= *maritimus* Lam. = *Cyperus aegyptiacus* Glox. = *C. capitatus* Vand. = *C. macrorrhizus* Rich. = *Mariscus mucronatus* Presl, = *Scirpus Kali* Forsk.).

nigricans L. (= *Chaetospora nigricans* Kunth, = *Cyperus nigricans* Wither.).

puberulus C. A. Mey., feinhaariges, 4. k. Nepal.

II. Streblidia Lk.

ferrugineus Lk. (= *Chaetospora ferrugin.* Rchb., Kunth). *scariosus* Vahl, non Thbg. (= *deustus* Berg.), v. *Ficinia scariosa*, p. 243, II., *stellatus* Lam., Sw., v. *Dichromena leucocephala*, p. 201, II.

Schollera erythrocarpa Roth, *macrocarpa* Roth, *Oxycoccus* Roth, v. *Oxycoccus erythrocarpus* etc., p. 578.

Schollera debilis Rohr, v. *Microtea debilis*, p. 533.

Schollera graminifolia W. (= *graminea* Bartr.), v. *Heteranthera graminea*, p. 287, II.

Schollia Jacq. fil., *carnosa* Schrk. (= *crassifolia* Jacq.), *chinensis* Jacq., *volubilis* Jacq., v. *Hoya carnososa*, *chinensis*, *viridiflora*.

Scholtzia J. C. Schauer, (= *Pritzelia* Schau., non Walp.), (H. Scholtz, M. Dr. u. Botaniker in Breslau), VIII. 1., Myrtaceae.

obovata J. C. Schauer, (= *Baekkea involucrata* Endl. = *B. obovata* DC.), verkehrteiförmige, f. t. k. Neuß.

Schomburgkia Lindl., non DC. (Richard u. Robert Schomburgk, berühmt als Reisende u. Naturforscher in Guiana etc.).

crispa Lindl., krause, 4. w. Guiana.

marginata Lindl., p. 731.

multiflora Lindl., vielblumige, 4. w. Südamerika.

Schomburgkia

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Südamerika (Sierra Nevada de Santa Martha).

tibicinis Batem. (= *Epidendron tibicinis* Batem.), flötenartige, 4. w. Mexico, Guatemala.

β) *grandiflora* Batem.

undulata Lindl., wellenförmige, 4. w. Neugranada.

Schotia Jacq., Schotie.

diversifolia Walp. (= *latifolia* Eckl., Zeyh., non Jacq.), verschiedenblättrige, ♀. w. t. Cap d. g. Hoffn.

parvifolia Dehnh., kleinblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

simplicifolia Vahl, einfachblättrige, ♀. t. ? Cap d. g. Hoffn.

speciosa Jacq. (= *afr* Thbg. = *Guajacum afrum* L. = *Theodora speciosa* Medic.).

Schouwia DC. (Dr. J. F. Schouw, Prof. in Kopenhagen), XV. II., Cruciferae.

arabica DC. (= *Psychine arabica* Spgl. = *Subularia purpurea* Forsk. = *Thlaspi arabicum* Vahl), arabische, ☉. m. f. Arabien.

Schraderia Vahl, Schraderie.

capitata Vahl, (= *Urceolaria exotica* Gmel.), kopfförmige, ♀. w. Caribäen.

Schraderia hastata Mch., v. *Salvia canariensis*.

Schrankia W., Schrankie.

distachya Moç., Sess., zweiährige, 4. w. t. Mexico.

Schrankia divaricata Mch., *rugosa* Mch., *sulcata* Mch., v. *Rapistrum perenne*, *rugosum*, orientale.

Schubertia Mart. et Zuccar. (non Mirb. et Spgl.), (v. Schubert, Hofrath u. Prof. d. Naturgeschichte etc. in München, einer der geistreichsten Naturforscher), V. II., Asclepiadeae.

Grahamii Decaisn. (= *Physianthus auricomus* Grah.), Graham's, ♀. Sch. w. Brasilien.

grandiflora Mart., großblumige, ♀. Sch. w. Brasilien.

graveolens Lindl., starkriechende, ♀. Sch. w. Brasilien.

Schufia arborescens Spach, v. *Fuchsia arborescens*.

Schultesia hederacea Roth, v. *Wahlenbergia hederacea*, p. 854.

Schultesia petraea Spgl., v. *Eustachys petraea*.

Schwabea Endl. (S. H. Schwabe, Hofrath u. Apotheker in Dessau), II. I., Acanthaceae-Russeggereae.

modesta Endl., zierliche, ☉. m. f. w. Tropisches Afrika.

Schweiggeria Spgl., St. Hil. (= *Glossarrhen* Mart.), (A. F. Schweigger, ehem. Prof. der Naturgeschichte etc. zu Königsberg, wurde 1822 in Sicilien ermordet), V. I., Violaceae.

floribunda St. Hil. (= *fruticosa* Spgl. = *Glossarrhen floribundus* N. E., Mart.), blüthenreiche, ♀. w. t. Brasilien.

mexicana Schldl. (= *Gl. mexicanus* Steud.), mexicanische, ♀. t. Mexico.

pauciflora Lindl. (= *Gl. parviflorus* DC., Spgl. = *G. pauciflorus* N. E., Mart.), wenigblumige, ♀. w. t. Brasilien.

Schwenkia L., Schwenkie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrofulariaceae).

discolor Kunze, verschiedenfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.

grandiflora Benth., großblumige, 4. ♀. Sch. w. Demerara.

hirta Kl., rauhe, ☉. f. Guiana.

Schwenkfeldia aspera W., *cinerea* Sw., v. *Sabicea aspera et cinerea*, p. 621, II.

Schweyckerta nymphoides C. G. Gmel., v. *Limnanthemum nymphoides*, p. 360, II. ¹⁾

Scilla L., Sternzwiebel.

amoena L., b) fl. albo, c) purpureo-coerulea.

bifolia L., β) *praecox* W.

byzantina Poir., byzantinische, 4. Zw. f. Orient.

chloroleuca Kunth, (= *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., p. 568, = *O. gramineum* Poepp., non Sims).

Clusiana Endl. (= *comata* Hffg. = *peruviana* L. = *Eriophorus peruvianus* Clus. = *Hyacinthus stellatus peruvianus* Clus. = *Ornithogalum speciosum* Rafin.). Sardinien, Sicilien, Portugal, Nordafrika (nicht in Peru), var. *alba*, *discolor* Lindl. (= *bicolor* Herb.), *pallida*, *phoenicea*, *violacea*.

Cupaniana Gussone, (= *fistulosa* Rafin. = *Ornithogalum coeruleum* Rafin.).

fallax Steinh. (= *autumnalis* var. Poir.), trügerische, 4. Zw. f. Nordafrika.

geminiflora Kunth, (= *Ornithog. geminiflorum* p. 568).

Hohenackerii Fisch. et Mey., Hohenacker's, 4. Zw. f. Caucasus.

hyacinthoides L. (= *eriphora* Mill.).

intermedia Gussone, mittlere, 4. Zw. f. Sicilien.

italica L. (= *Bertolonii* Duby, = *hyacinthoides* Hort. = *pauciflora* Lk. = *verna* Suter, non L.).

japonica Thbg., japanische, 4. Zw. f. b. Japan.
var. *rosea*.

lanceolata Viviani, lanzettförmige, 4. Zw. f. b. Corsica.

lusitanica L. (= *italica* β Sm.).

orientalis Thbg. (= *bifolia* Thbg., non L.), morgenländische, 4. Zw. f. b. k. Japan.

parviflora Dsf. (= *autumnalis* β Sm. = *numidica* Poir. = *Stellaris parviflora* Steinh.), kleinblumige, 4. Zw. f. b. k. Nordafrika.

pratensis W. K. (= *italica* Host, non L.), β) *major* R. et S. (= *amethystina* Visian).

purpurea Mill., purpurfarbige, 4. Zw. f. Italien.

sibirica Andr. (= *amoena* β *sibirica* Sims, = *praecox* Don).

Strangwaysii Tenore, Strangways's, 4. Zw. f. Byzanz.

umbellata Ram. (= *alliifolia* Lapeyr. = *pratensis* Berger, = *verna* Lapeyr.).

verna Huds. (= *bifolia* Lightf.), β) *major* Kunth, (= *Ramburei* Boiss.).

Sect. II. *Agraphis* Link, (= *Limonanthe* Lk.), v. p. 732 et 885 et p. 14, II.

anthericoides Poir., *indica* Roxb., *undulata* Dsf., v. *Urginia anthericoides*, *indica*, *undulata*, *esculenta* Hook., Ker, v. *Camassia esculenta*, p. 151 et 110, II., *maritima* L., v. *Squilla maritima*, *pomeridiana* DC., v. *Chlorogalum* Sect. III. *Ornithog. pomeridianum*, p. 459, II., *romana* Ker, v. *Bellevalia romana*, p. 117 et p. 64, II., *serotina* Schousb., Ker, v. *Uropetalum serotinum*, p. 831, *unifolia* L., v. *Ornithogalum unifolium*, p. 459, II.

1) *Sciadopitys* Sieb. et Zuccar., *verticillata* Sieb. et Zuccar., Conifere in Japan heimisch, scheint noch nicht eingeführt.

Scindapsus Schott, Sweet, Geigenarum, XXI. iv. (IV. 1.), Aroideae.

angustifolius Hassk., schmalblättriger, 4. ♀. w. Java.
 caudatus Schott, (= *Pothos caudata* Roxb. = ? *P. pinnata* L. var. Wall. = *Monstera caudata* Schott), geschweifter, 4. ♀. w. Prince of Wales Island.

decursivus Schott, (= *Monstera decursiva* Schott, = *Pothos decursiva* Roxb.), herablaufender, 4. ♀. w. Silhet.

giganteus Schott, Sweet, (= *Monstera gigantea* Schott, = *Pothos gigantea* Roxb.), riesenhafter, 4. w. Ostindien (Prince of Wales Island).

glaucus Schott, (= *Pothos glauca* Wall., non Lk., Otto, = *P. Wallichii* Steud.), blaugrüner, 4. w. Ostindien.

officinalis Schott, Sweet, (= *Calla ovata* Hamilt. = *Monstera officinalis* Schott, = *Pothos officinalis* Roxb., p. 654).

Peepla Schott, Sweet, (= *Monstera Peepla* Schott, = *Pothos Peepla* Roxb., p. 654, = *P. Pipla* Roxb.).

pertusus Schott, Sweet, (= *Monstera pertusa* Schott, = *Pothos pertusa* Roxb., p. 654), durchbrochener, 4. ♀. Sch. w. Coromandel.

pictus Hassk., bunter, 4. ♀. w. Java.

pinnatifidus Schott, Sweet, (= *Monstera pinnatifida* Schott, = *Pothos pinnatifida* Roxb.), fiederspaltiger, 4. ♀. w. Sumatra.

pinnatus Schott, Decaisn. (= *Pothos pinnata* L., p. 654).

Sciodaphyllum P. Br., Schattenblatt.

anomalum G. Don, (= *Carolinea insignis* Hort., non Sw.).

pulchrum H. Cels. et Hort. belg. (= *Aralia pulchra* Hort.), schönes, ♀. w. ? Java.

Scirpidium aciculare N. E., *tenuis* N. E., v. *Heleocharis acicularis et tenuis*.

Scirpus T., L. (et *Heleogiton* Lest., Rchb.), Binse.

cyperinus Kunth, (= *thyrsiflorus* W. herb. = *Eriophorum cyperinum* L. = *Trichophorum cyperinum* P.), cypergrasähnliche, 4. f. Nordamerika.

β) *S. Eriophorum* Mchx.

elongatus Hamilt., D. Don, (= *Eriophorum comosum* Wall. = *E. arundinaceum* Wall. = *Scirpus comosus* Wall., non Dumort.).

macrophyllus Bess. (= *lacustris* L. var. Schult.), großblättrige, 4. Wa. f. Lithauen.

maritimus L. (= *capensis* Burm., Vahl, = *compactus* Hoffm. = *cyperoides* Lam. = *decumanus* W. herb. = *glaucus* Lam. = *lucidus* Less. = *macrostachys* Mchx. = *riparius* P. = *robustus* Pursh, = *salinus* Schm. = *tridentatus* Rosc.), β) *tuberosus* Dsf., γ) *aegyptiacus* Poir. (= *corymbosus* Forsk. = *macrostachys* W.).

mucronatus L. (= *glomeratus* Scopol. = *triangularis* Roxb. = *tricarinatus* P.).

articulatus L., *Bergianus* Spgl., *brunneus* Mühlbg., *capillaris* L., *leptaleus* K. etc., v. *Isolepis articulata*, *Bergiana* etc. et Sect. II. p. 425 et p. 324, II., *quadrangularis* Vahl, *quinquangularis* Vahl, v. *Trichelostylis tetragona* et *quinquangularis*.

Die übrigen bemerkenswerthern Synonyme, welche auf die betreffenden Gattungen wohin sie gehören verweisen, s. p. 733.

Sciuris trifoliata N. E., v. *Galipea trifoliata*, p. 343.

Sclaraea Mill., Mch., *Aethiopsis* Mill., *argentea* Mill., *ceratophylla* Mill. etc., v. *Salvia Aethiopsis*, *argentea*, *ceratophylla* etc., p. 715 seq.

Scleranthus L., Knauel.

annuus L., β) *verticillatus* Tausch, (= *collinus* Hornem.).
comosus Dumort., schopfiger, ☉. f. Belgien.

divaricatus Dumort., ausgespreizter, ☉. f. Belgien.

neglectus Roch. (= *marginatus* Gussone), übersehener,
4. \ddagger . f. Ungarn, Sicilien.

Scleria Berg., L., Geisselgras.

latifolia Sw. (= *Carex latifolia* Gmel.), breitblättriges,
4. w. Jamaica, Guiana.

Sclerobasis rigida Cass., v. *Senecio rigidus*, p. 745.

Sclerochaetium Rottboellii N. E., v. *Lepidosperma Rottboellii*, p. 350, II.

Sclerochloa P. B., II. Genuina, p. 733.

dichotoma Lk. (= *maritima* Rchb. = *Agropyrum maritimum* P. B. = *Brachypodium maritimum* R. et S. = ? *Dactylis memphitica* Speg. = *Festuca dichotoma* Forsk. = *F. divaricata* Sbr., non Dsf. = *F. maritima* DC.).

rigida Panz. (= *patens* Presl, = *Festuca rigida* Kunth, = *F. rigens* Trin. = *Glyceria rigida* Sm. = *Megastachya pulchella* R. et S. = *M. rigida* R. et S. = *Poa pulchella* Stev. = *P. rigida* L. = *Triticum maritimum* Wulff.).

III. *Sphenopus* Trin., p. 734.

divaricata P. B. (= *expansa* Lk. = *Sphenop. Gouani* Trin. = *Festuca expansa* Kunth, = *F. Sphenopus* Trin. = *Poa divaricata* Gouan, = *P. expansa* Gmel.).

Sclerolepis Cass., Knorpelschüppchen, XIX. 1., Compositae-Eupatorieae.

verticillata Cass. (= *Ethulia uniflora* Walt. = *Sparganophorus verticillatus* Mchx.), wirtelförmiges, ☉. ♂. f. k. Carolina.

Sclerolepis Kalmii Monn., v. *Pachylepis Kalmii*, p. 468, II.

Sclerosciadium K., Knorpeldolde, V. II., Umbelliferae.

humile K. (= ? *Bunium rigens* Speg. = *Conium rigidum* Mert. = *Oenanthe nodiflora* Schousb.), niedrige, ☉. f. Marocco.

Sclerostemma Schott, *agreste* Schott, *argenteum* Schott, *atropurpureum* Schott etc., v. *Scabiosa Gramuntia*, *ucranica*, *atropurpurea* etc., p. 727 seq.

Scleroxylon W., *canariense* W., v. *Pleiomeres canariensis*, p. 539, II., *S. Manglilla* W., *melanophleum* W. (= *venulosum* W.), v. *Myrsine Manglilla*, *melanophleos*, p. 426, II.

Scolochloa Mert. et K. (non Lk.), *arundinacea* M. et K., v. *Arundo Donax*, p. 86.

Scolopacium incarnatum Eckl., Zeyh., v. *Erodium incarnatum*.

Scolopendrium Sm., p. 734.

officinarum Sw., e) *daedaleum* W. (= *ramosum* Hort.).

Scolymus T., Golddistel.

hispanicus L. (= *angiospermus* G. = *congestus* Mch. = *perrennis* Ger. = *vivax* Sauv. = *Myscolus microceph.* Cass.).

maculatus L. (= *annuus* L. Hort. upsal. = *gymnospermus* G. = *pectinatus* Cass.).

paniculatus Ucria, rispige, ☉. ♂. f. Sicilien.

Ungewifs: *giganteus* Roem. Hort. Turic.

Scoparia L., Besenkraut.

annua Chamiss., Schlttl., jähriges, ☉. m. f. Mexico.
 flava Cham., Schlttl. (= *plebeja* Cham., Schlttl. =
Microcarpaea montevidensis Sngl.), hellgelbes, ☉. ♂.
 m. f. w. Brasilien.

Scopolia Jacq., carniolica Jacq. (= *trichotoma* Mch.),
 β) viridiflora Frey. (= ? *Hladnickiana* Biatz.).

Scordium spinosum Cav., v. *Teucrium spinosum*.
Scorodonia Arduini Rchb., *betonicaefolia* Mch., *Botrys*
Sering., *heteromalla* Mch. (= *sylvestris* Lk.), *massi-*
liensis Lk. (= *cordata* Mch.), *spinosa* Lk. etc., v.
Teucrium Arduini, *betonicum*, *Botrys*, *Scorodonia* etc.

Scorpiurus L. (= *Scorpioides* Adans., Mch.), Scorpionkraut.

purpurea Dsf., purpurfarbiges, ☉. f. Algier.
 sulcata L. (= *echinata* β Lam.).

Ungewifs: *pinnata* Mill.

Scorpius spinosus Mch., v. *Genista germanica*.

Scorzonera T., L., Scorzonere.

I. *Euscorzonera* DC. (Genuina).

astrachanica DC. (= *pusilla* MB.), astrachanische, 4. f.
 Astrachan.

dalmatica Host, dalmatische, 4. f. Dalmatien.

deliciosa Gussone, wohlschmeckende, 4. f. Sicilien.¹⁾

divaricata Turcz., ausgespreitzte, 4. f. Mongolei.

halophila Fisch. et Mey., salzliebende, 4. f. Persien.

macrosperma Turcz., großsaamige, 4. f. Dahurien.

tenuifolia Schrad. (= *austriaca* Balb.), dünnblättrige,
 4. f. Piemont.

II. *Gelasia* Cass.

Juliana Hort. Berol., Julische, 4. f. Südeuropa.

villosa Scopol. (= *angustifolia* Host et ? L. = *hirsuta*
 L. var. Poir.).

III. *Lasiospora* Cass. (= *Lasiospermum* Fisch.).

eriosperma MB., β) *parviflora* H. Berol., non Jacq. (= *angustifolia* Hort.).

hirsuta L. mant. (= *eriosperma* Gouan, non MB. =
Julia Vest. = *G. Jacquini* Cass. = *Geropogon caly-*
culatus L. = *G. hirsutus* All. = *Hieracium capilla-*
ceum All. = *Lasiospermum hirtum* Fisch. = *Lasio-*
spora hirsuta Cass. = *Tragopogon calyculatus* Jacq.).

lanata MB. (= *Leontodon lanatus* L. amoen. = *Tra-*
gopogon lanatus W. = *Troximon lanatus* P.).

latifolia DC. (Fisch. et Mey.), breitblättrige, 4. f. Persien.

veratrifolia Fenzl, germerblättrige, 4. f. b. k. Kurdistan.
laciniata L. (= *pinifolia* Gouan, = *subulata* Lam.)

etc., v. *Podospermum laciniatum* etc., p. 639 et

p. 544, II., *acaulis* W., v. *Taraxacum palustre*, p.

799, *elongata* W. (= *graeca* Hort.), *stylosa* P. (=

aspera Dsf.), v. *Hymenonema Tournefortii* Nachl.

et H. Fontanesii p. 309, II., *dichotoma* Vahl, v. *Microrhynchium dichotomum*, p. 408, II., *picroides*

L. et *orientalis* L., v. *Picridium vulgare* et *orientale*,

p. 623 et p. 523, II., *pinnatifida* Mchx., v. *Pyrrho-*
pappus carolinianus, p. 577, II., *taraxacifolia* Jacq.,

v. *Hypochaeris Balbisii*.

1) „Radicis saccharo varie confectae et gratissime refrigerantis magnam vim Panormitani consumunt.“ Endlicher Hort. acad. Vindob.

Scovitzia Auct., v. *Szovitsia*.

Scribaea divaricata Flor. Wetter., v. *Cucubalus baccifer*.

Scrophularia T., L. (= *Scrofularia* Auct.), Braunwurz. *alpestris* Gay, (= *Scopolii* DC., non Hoppe), Voralpen-B., 4. f. Asturien, Pyrenäen.

aquatica L. (= *Balbisii* Hornem.), β) *parviflora* Benth. (= *rivularis* Moris, = ? *nepetaefolia* Presl, non Sm.), ? γ) *Neesii* Wirtgen.

auriculata L. (= *hispida* Dsf. = *lyrata* W. Hort. Berol. = *ebulifolia* Hffing. et Lk. = *subverticillata* Moris, = *nepetaefolia* Sm. herb. = *trifoliata* Bové, non L. = *umbrosa* Salzm. = *glabrata* Schimp.), Südspanien, Portugal, Nordafrika, Sardinien.

caesia Sm. (= *verbenaefolia* Dsf. Hort. Par.), hechtblaue, 4. f. b. Griechenland.

canina L. (= *bicolor* Sibth. et Sm. = *chrysanthemifolia* W. = *multifida* Lam., non W. = *atropurpurea* Moretti, = *pyramidalis* Wydl. = *pubescens* Hort.).

divaricata Ledeb., ausgespreizte, 4. f. Iberien, Caucasus. *Ewersii* Ledeb., Ewers's, 4. f. Alt. Sibirien.

foetida Wydl., stinkende, 4. ?

grandidentata Tenore, grofszähnlige, 4. f. Sicilien.

Hoppei K. (= *canina* Hoppe, = *juratensis* Schleichr.).

heterophylla ? W. (= *micrantha* d'Urv. = *Oliveriana* Wydl. = *Urvillaeana* Wydl.), verschiedenblättrige, 4. $\frac{1}{2}$. Griechenland, Taurus, Kurdistan, steiniges Arabien etc.

laevigata Vahl, (= *appendiculata* Jacq. hort. Schönbr. = *trifoliata* Dsf., non L.), glatte, 4. k. Barbarei.

lucida L. (= *glauca* Sibth. et Sm.), β) *filicifolia* Mill. (= *livida* Sibth. et Sm.), ? γ) *tanacetifolia* W.).

minima MB., kleinste, σ . 4. f. Iberien, Caucasus, Armenien.

multicaulis Turcz., vielstengeliche, 4. f. Sibirien.

nodosa L., var. *californica* Cham., *lanceolata* Pursh, *marylandica* L., *italica* Mill., *Skellii* Spgl., *umbrosa* Dumort., Europa, asiat. Rußland, Nordamerika.

orientalis L. (= *ebulifolia* MB.).

pallida Fisch., bleiche, 4. f. Iberien.

Patriniana Wydl. (= *incisa* Weinm., Bunge, = *Gmelini* Turcz. = *Stelleriana* Steud.), Patrin's, 4. $\frac{1}{2}$ f. Altai, Turcomanien.

peregrina L. (= *geminiflora* Lam. = *meridionalis* Presl, = *paniculata* Seenus, = *sexangularis* Mch.).

pyrenaica Benth. (= *vernalis* Lapeyr., non L.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

sambucifolia L. (= *mellifera* Ait. = *viridiflora* Poir.), β) *hirsuta* Wydl. (= *grandiflora* DC., Rchb. = *decora* Fisch. et Lallem.). Portugal, Spanien, Nordafrika.

Scorodonia L. (= *betonicaefolia* L. herb.). Insel Jersey, Westfrankreich, Spanien, Madeira.

trifoliata L. (= *sambucifolia* Fisch. ind. sem. hort. Petr.).

vernalis L. (= *cordata* W. K. = *latifolia* Host, = ? *anomala* Vest, = *Ceramanthe vernalis* Rchb.).

Zweifelhafte oder nicht hinlängl. bekannte: *ascendens* W. Enum., *biserrata* W. Enum., (*glabra* var. ?), *lan- cifolia* Presl, Sicil. *humilis* Dsf., *glandulifera* Clarke, Thracien, *oblongifolia* Loisel. 4. Corsica.

nudicaulis Wydl., v. *Celsia persica*, p. 129, II.

Scutellaria R., L., Helmkraut (Schildkraut).

- albida L. (= *cretica* Mill., Hortul.), β) pallida MB.
altaica Fisch., Ledeb. (= *alpina* L. var. Benth.).
canescens Nutt. (= *incana* Sggl., Mühlbg. = *integrifolia* Auct. quor. = ? *pubescens* Mühlbg. = *serrata* Sggl., non Andr.), grauliches, 4. f. Nordamerika.
coerulea Moç., Sess., blaues, 4. k. Mexico.
Columnae All. (= *altissima* Hamilt. et Auct. = *pallida* Gussone, = *peregrina* Sibth., Sm. non L. = ? *Cassida racemosa* Mch.).
commutata Gussone, Benth. (= *altissima* L. spec. = *peregrina* W. K., non L.).
fruticosa Dsf., strauchiges, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Syrien, Persien.
grandiflora Sims, (= *pulchella* Auct., non Bunge).
japonica Morr. et Decaisn., japanisches, 4. k. f. b. Japan.
incarnata Vent., p. 737. Mittelamerika.
integrifolia L. (= *caroliniana* Lam. = *hyssopifolia* L. = *polymorpha* Hamilt.).
longifolia Benth., langblättriges, 4. k. Neuspanien.
lupulina L. (= *alpina* L. β var. Benth. = *verna* Bess.).
macrantha Fisch. (= *grandiflora* Adams, non Sims).
nervosa Pursh, (= *gracilis* Nutt. = *parviflora* Rafin. = *teucriifolia* Sm.).
orientalis L. (= *caucasica* Hamilt. = *Sieversii* Bunge).
 β) pectinata Hohenack.
parvula Mchx. (= *ambigua* Nutt.? = *ovata* Hüll. = *pygmaea* W. herb.).
peregrina L. (= *rubicunda* Hornem.).
pulchella Bunge, schönes, 4. f. Alt. Sibirien.
scordifolia Fisch. (= *Adamsii* Sggl.).
splendens Lk., Kl., Otto, schimmerndes, 4. $\frac{1}{2}$. k. Mexico.
tubiflora Benth., röhrenbluniges, 4. t. Mittelbrasilien.
versicolor Nutt. (= *cordifolia* Mühlbg.), buntfarbiges, 4. f. Nordamerika.
viscidula Bunge, schmieriges, 4. f. b. Nordchina.
- Scutia** Commers., Brongn., Scutie, V. 1., Rhamneae.
capensis Eckl., Zeyh. (= *Ceanothus capensis* DC., p. 173, = *Rhamnus capensis* Thbg.).
indica Brongn. (= *Catha zeylanica* G. Don, = *Ceanothus circumscissus* G. P. = *C. zeylanicus* Heyne, Roth, p. 173, = *Celastrus zeylanicus* Schult. = *Rhamnus circumscissus* L. = *Rh. myrtinus* Burm.), indische, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
paniculata G. Don, (= *Ceanothus paniculatus* Heyne, = *Celastrus nutans* Roxb., p. 174, = *C. paniculatus* W. = *C. Rothianus* Schult.), rispige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
Scyphanthus Don, *elegans* Don, *grandiflorus* Sweet, v. *Grammatocarpus volubilis* et β *grandiflorus*, p. 273, II.
Scytalia G., *chinensis* G. (= *Litschi* Räusch.), *crinita* Räusch., *Longan* Räusch., v. *Nephelium Litschi*, lappaceum et *Longanum*, p. 433—434, II.
Scytalis Catjang E. Mey., *tenuis* E. Mey., v. *Dolichos Catjang* et *capensis*.
- Scytophyllum** Eckl., Zeyh., Tassenblatt, V. 1., Celastrineae.
laurifolium Eckl. Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. p. 174).
obtusum Eckl., Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. var. Schldl. = *C. obtusus* Thbg.), stumpfes, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Scytophyllum

oleoides Eckl., Zeyh. (= *Celastrus laurinus* Thbg. var. Schltdl. = *C. oleoides* Lam., p. 174, = *Cassine oleifolia* P. = *C. oleoides* Lam.).

Seaforthia RBr., Seaforthie.

gracilis Mart. (= *Areca gracilis* Blume), schlanke, f. w. Ostindien.

praemorsa Hort. belg., abgebissene, f. w. ? Ostindien.

Ptychosperma Mart. (= *Ptychosperma gracilis* LaBill.), faltensaumige, f. w. Neuholland.

Sebaea RBr., Sebaea.

aurea RBr. (= *minima* Jarosz. = *Exacum aureum* L. fil. = *Gentiana aurea* Thbg.).

congesta Schrad. (= *aurea* β *pallens* Griseb. = *capitata* Schrad., non Schltdl.).

sulphurea Schltdl. (= *tabularis* Eckl. mpt.), schwefelgelbe, \odot . f. m. Cap d. g. Hoffn.

guianensis Spgl. (= *jorullensis* Spgl. = *Schultesia stenophylla* Mart.), wird kaum kultivirt.

cordata RBr., *Ohlendorffiana* Eckl., v. *Belmontia cordata* et *Ohlendorffiana*, p. 64, II.

Secale T., Roggen (Korn).

arundinaceum Trautv., rohrartiger, \odot . ♂ . f. ? Südl. Asiat. Rufsland.

cereale L., var. *aegyptiacum*, *aestivum*, *archangelicum*, *aristatum*, de Vierland, *Erzereum*, *multicaule*, *norwegicum*, *perenne*, *ruthenicum* Hort. Petropol.

dalmaticum Visian., dalmatischer, \odot . ♂ . f. Dalmatien.

fragile MB. (= *campestre* Schult. = *spontaneum* Fisch. Hort. Gorenk. = *sylvestre* Host, = *Triticum fragile* Host), ♂ .

montanum Gussone, (= *cereale* L. var. Trin.), Berg-T., ♂ . f. Sicilien.

orientale L. (= *hirtum* Lam.), *prostratum* Pall. (= *pumilum* P. = *reptans* Pall.), *pungens* P., *villosum* L., v. *Triticum orientale*, *prostratum*, *squarrosum*, *villosum*, p. 824.

Secamone RBr., Secamone.

Alpini R. et S. (= *aegyptiaca* Don, Sweet, = *Periploca Secamone* L.).

emetica RBr. (= *Cynanchum vomitorium* Lam. = *Periploca emetica* Retz).

Securidaca L. (non Mill., G. Mch.), Beiltsrauch.

sylvestris Schltdl., Wald-B., f. t. Mexico.

S. legitima G., Mch. (= *lutea* Mill. = *vera* Hort.), et *Securilla Securidaca* P., v. *Securigera Coronilla*, p. 738.

Securinea Juss., nitida W. (= *durissima* Gmel. syst.).

nitida Lindl. (non W.), v. *Lithoxylon* Lindleyi, p. 365, II,

Sedum T., L., Mauerpfeffer.

aizoides S. Dyck, (non DC.), zaserlingähnlicher, 4. f. ?

albescens Haw. (= *glaucum* Sm., non W. K.).

album L. (= *teretifolium* α Lam.), β) *micranthum* Bast., γ) *turgidum* Ramond.

algidum Ledeb., kalter, 4. f. Altaisches Sibirien.

altissimum Poir. (= *dioicum* Donn, = *fruticulosum* Brot. = *Jacquini* Haw. = *nicaense* All. = *rufescens* Tenore, = *rupestre* α Gouan, = *Sempervivum sediforme* Jacq. et var. *moustrorum*), β) *ochroleucum* Sm.

Sedum

- amplexicaule DC. (= *carinatum* Lk. = *rostratum* Tenore, = *Sempervivum anomalum* Lagasca, = *S. tenuifolium* Sibth., Sm.), stengelumfassender, 4. f. Südeuropa, Griechenland.
- Anacampseros L. (= *rotundifolium* Lam. = *Anacampseros sempervirens* Haw.).
- andegavense DC. (= *atratum* Bast., non L. = *commutatum* Sogl. Hort. Hal. = *Crassula andegavensis* DC. *C. globulifolia* Moris).
- anglicum Huds. (= *dasyphyllum* β DC. = *Guettardi* Vill. = *hirsutum* Brotero, = *rubens* Lightf.).
- atratum L. (= *haematodes* Scopol.).
- bracteatum Vivian., deckblättriger, \odot . f. Nordafrika.
- brevifolium DC. (= *sphaericum* Lapeyr.), kurzblättriger, 4. f. Pyrenäen, Corsica.
- caespitosum DC. (= *Crassula caespitosa* Cavan. = *C. Magnolii* DC., Sogl. = *C. rubens* β DC. = *C. verticillaris* L. mant. = *Tillaea erecta* Sauv. = *T. rubra* Gouan), rasenartiger, \odot . f. Spanien, Frankr., Taurien.
- camtschaticum Fisch., kamtschatalischer, 4. f. Kamtschatka.
- Cepaea L. (= *paniculatum* Lam. = *Anacampseros Cepaea* Haw.), β) galioides All. (= *verticillatum* Latour, non L.), γ) spathulatum W. K. (= *Anacampseros spathulata* Hort.), δ) tetraphyllum Sibth., Sm., ϵ) alsinefolium All.
- dasyphyllum L. (= *glaucum* Lam., non W. K.), β) gracile DC., non C. A. Mey. (= *neapolitanum* Tenore), γ) reticulatum Schrk.
- delloideum Tenore, deltaförmiger, \odot . f. Neapel.
- dendroideum Sessé, baumähnlicher, § . t. Mexico.
- Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. b. k. Nordw. Amerika.
- elongatum Wall. (non Ledeb.), verlängerter, 4. k. Ostind.
- fragile Dumort., zerbrechlicher, 4. f. Belgien.
- glaucum W. K. (= *Andersonii* G. Don, = *hungaricum* Poir.).
- globulifolium ? Moris, (= ? *andegavense* DC. var. Sweet), kugelblättriger, 4. f. ? Sardinien.
- gracile C. A. Mey. (non DC.), schlanker, 4. f. Caucasus.
- haematodes Mill., blutfarbiger, 4. f. Louisiana.
- heptapetalum Hornem. (non Poir.), siebenkroniger, ? 4. f. Rußland.
- hirsutum All. (= *globiferum* Pour. = *hispidum* Poir.), Apenninen, Corsica, Pyrenäen.
- hispanicum L. (= *Guettardi* Gmel., non Vill. = *pallidum* MB.).
- hybridum L., β) altaicum Hort. Petropol.
- ibericum Steven, (= ? *spurium* MB. var. Sogl. = *stoloniferum* Gmel. jun.), iberischer, 4. f. Nördl. Iberien.
- laxiflorum DC., lockerblumiger, § . k. Teneriffa.
- maximum Sut., b) purpureum, c) rubens, d) fol. variegat.
- miserum Lindl., magerer, \odot . f. Mexico.
- multicaule Wall., vielstengeliger, 4. k. Himalaya.
- nebrodense Gaspar., nebrodischer, 4. f. Sicilien.
- Notarjanni Tenore, Notarjanni's, ♂ . § . f. b. k. Neapel.
- obtusifolium C. A. Mey., stumpfblättriger, 4. f. Caucasus.
- oppositifolium Sims, (= *ciliare* Haw. = *dentatum* Hortul. = *denticulatum* Don, = *spurium* Hortul., non MB. = *Anacampseros ciliaris* Haw. = *Crassula crenata* Dsf.), b) rubrum.

Sedum

pulchellum Mchx. (= *pulchrum* DC.), schöner, 4. f. Nordamerika.

quinquefidum Haw., fünfspaltiger, 4. f. ?

reflexum γ *cristatum* DC. (= *cristatum* Schrad. = *crassicaule* Hortul.).

rubens L., α) *decandrum* DC. (= *saxatile* Pall. = *stellatum* Habl., non L.), röthlicher, \odot . f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *pentandrum* DC. (= *Crassula rubens* L.).

sarmentosum Bunge, starkwurzelnder, 4. f. b. Nordchina.

sexfidum MB. (= *glaucum* W. K. var. Auct.), sechsspaltiger, \odot . f. Caucasus.

Sieboldii Hort. angl. (= ? *japonicum* Hort.).

spathulatum Hook., spatelförmiger, 4. f. Nordw. Amerika.

stenopetalum Pursh, schmalkroniger, 4. f. Nordamerika.

β) *coerulescens* Haw.

Telephium L., α) *albidum* Steud. (= *Anacampseros albidum* Haw.), β) *ochroleucum* Endl. (= *vulgare* Lk.

= *Anacampseros vulgaris* Haw.), γ) *purpureum* Lk.

(= *triphylllum* Steud. = *verticillatum* Donn, = ? *atropurpureum* Hort. = *Anacampseros purpurea* et *triphylla* Haw.), δ) *argutum* (Haw.), ϵ) *paucidens* (Haw.).

tenellum MB. (= ? *turgidum* DC. var. Spgl.), zarter, \odot . f. Caucasus.

ternatum Mchx. (= *americanum* Banks herb. = *deficiens* Donn, = *octogonum* Hortul. = *portulacoides* W. = *Anacampseros ternata* Haw.).

Torreyi G. Don, Torrey's, 4. f. Nordamerika.

viridulum Haw., weniggrüner, 4. f. Europa.

Unbestimmtere: *multiflorum* Hort. Dyck., *mutabile* Wender.,

procumbens Schrk., *Scheuchzeri* Gmel. Hort. Carlsr.

Ebenso mehrere der von Haworth aufgestellten Arten ohne genauere Angabe des Vaterlandes.

Cotyledon Jacq., v. *Echeveria caespitosa*, p. 213, II.,

divaricatum Ait., v. *Sempervivum aizoides*, *elongatum* Ledeb., non Wall. (= *Ledebourii* Hort. Berol.),

Rhodiola DC. (= *roseum* Scopol.), *altaicum* Don, *asiaticum* DC., v. *Rhodiola elongata*, *rosea*, *altaica*,

asiatica, p. 684 et p. 590, II., *malacophyllum* Steud.,

pilosum MB., *spinosum* Thbg., v. *Umbilicus malacophyllus*, *pubescens*, *spinosus*.

Seetzenia RBr. (Seetzen, ein Deutscher, Reisender, Geograph und Alterthumsforscher, † 1811), X. I., Zygothylleae.

africana RBr. (= *prostrata* Eckl., Zeyh. = *Zygothylum* ? *lanatum* W. = *Z. prostratum* Thbg.), afrikanische,

†. t. k. Südafrika.

Seguieria Löffl., L. (J. F. Seguier aus Nismes, ein ausgezeichnete Botaniker lebte u. starb 1784 zu Verona), Aizoideae-Phytolaccaceae.

americana L. (= *aculeata* Jacq.), amerikanische, †. w. Brasilien.

Sekika Medik., *sarmentosa* Mch., v. *Diptera sarmentosa*, p. 724 et p. 207, II.

Selaginella P. B., Spring., Lk., *apus* Spring., *cuspidata* Lk., *denticulata* Lk., *helvetica* Lk., *selaginoides* Lk., *stellata* Spring., v. *Lycopodium apodum*,

cuspidatum, *denticulatum*, *helveticum*, *selaginoides* et *stellatum*, p. 484 et p. 377, II.

Selago L., Grufskraut.

distans E. Mey., absteheendes, ⚭. k. t. Cap d. g. Hoffn.
 fasciculata L. mant. (= *fulvo-maculata* Lk. = *spuria* Sieb.).

glabrata Chois. (= ? *canescens* Thbg. = ? *triquetra* L. fil.), glattlicheres, ⚭. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *fruticosa* Thbg.

paniculata Thbg., rispiges, ⚭. k. t. Cap d. g. Hoffn.

pineae Lk., kieferähnliches, ⚭. k. t. Südafrika.

pterophylla Otto, flügelblättriges, ⚭. k. t. Südafrika.

rapunculoides L. (= *pulchella* Salisb.).

spuria L. (= *pallida* Salisb.).

angustifolia Thbg., v. *Agathelepis angustifolia*, p.

13, II., *capitata* Berg. (= *ovata* Thbg., Ait.),

lucida Vent. (= ? *rotundifolia* Thbg.), *spicata* Lk.,

v. *Microdon ovatum*, *lucidum*, *Linkii*, p. 406, II.,

lychnidea L., v. *Lyperia fragrans*, p. 378, II.

Selinum L., Hoffm.

Carvifolia L. (= *angulatum* Lam. = *membranaceum*

Vill. = *pseudocarvifolia* All. = *Angelica Carvifolia*

Spgl. = *Carvi sulcatum* Bernh. = *Laserpitium seli-*

noides Scopol. = *Mylinum Carvifolia* Gaud. = *Peu-*

cedanum cuneifolium Vill. = *Seseli Carvifolia* Mill.).

baicalense Redowsky, (= *collinum* W. K. = *tere-*

binthinaceum Trevir.), *podolicum* Bess., *argenteum*

All. (= *peucedanoides* Dsf.), *latifolium* Mill., *pa-*

lustre L. spec., *sibiricum* Retz, *sylvestre* Jacq.,

venetum Spgl., v. *Peucedanum baicalense*, *Chabraei*

β *podolicum*, *involucratum*, *latifolium*, *montanum*,

selinoides, *sylvestre* et var. β, *venetum*, p. 504 et

505, II., *caucasicum* MB., v. *Imperatoria caucasica*,

p. 315, *scabrum* Lapeyr., v. *Angelica scabra* Nachl.

Archangelica Lk., *atropurpureum* Lk., v. *Archange-*

lica officinalis et *atropurp.*, p. 72, *canadense* Mchx.

etc., v. *Cnidium canadense* etc., p. 208, *verticillaris*

Lk., v. *Peucedanum verticillare*, p. 610.

Sellou glutinosa Spgl., v. *Gymnosperma glutinosum*,

p. 278, II.

Semarillaria Cururu R. et P., v. *Paullinia Cururu*,

p. 591.

Sempervivum R., L., Hauswurz (Hauslaub).

aizoides Lam. (= ? *Anacampteros divaricata* Haw. ? =

Sedum aizoides DC. = ? *S. divaricatum* Ait.), zäse-

lingähnliches, ⚭. k. Madeira.

caespitosum Ch. Sm. (= *barbatum* Hornem. = *ciliare*

Haw. = *ciliatum* Sims, = *Simsii* Sweet).

canariense L., β) *subtabulaeforme*.

dichotomum L., zweizinkiges, ♂. k. Canarische Inseln.

glaucum Tenore, blaugrünes, 4. f. ?

latifolium Hffg., breitblättriges, ⚭. k. Teneriffa.

laxum Haw., lockeres, ⚭. k. Canarische Inseln.

molle Visian., weiches, ♂. k. t. Nubien.

montanum L., Bergliebendes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

pulchellum C. A. Mey., schönes, ⚭. k. ?

punctatum C. Sm., punktirtes, ⊙. ♂. k. Canar. Inseln.

pygmaeum C. Sm., zwergiges, 4. k. Canarische Inseln.

ruthenicum Fisch. (= ? *globiferum* L.), russisches, 4. f.

Sibirien.

Seguieri DC. (= *Sedum stellatum* Poll.), Seguier's, 4.

f. Oberitalien.

Sempervivum

Smithii Sims, (= *foliosum* C. Sm.).

Unbestimmt: mutabile Schldl.

aureum C. Sm. (= *calyciforme* Haw.), v. *Greenovia aurea*, p. 274, II.

Senacia lanceolata Lam., *undulata* Lam., v. *Pittonium lanceolatum* et P. *Senacia*, p. 533—534, II.

Maytenus Lam., *octogona* Poir., v. *Maytenus chilensis*, et *octogonus*, p. 501.

Senebiera Poir., Senebiera.

linoides DC. (= *Coronopus linoides* Spgl. = *Lepidium linoides* Thbg.), leinähnliche, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Senecillis purpurata G., v. *Cineraria purpurata* Nachl.

Senecio T. (et Jacobaea T.), Kreuzkraut.

I. *Tephroseris* Rchb. (= *Tephroserides* DC. s. *Cinerariae*, = *Cineraria* Auct. pro parte).

arachnoideus Shr. (= *lanatus* Scop. = *Scopolii* Hoppe et Hornsch. = *Arnica lanigera* Tenore, = *A. floccosa* Bertol. = *Cineraria arachnoidea* Rchb.).

crispatus DC. (= *Cineraria crispata* L. fil., Jacq.), β) *rivularis* DC. (W. K.), γ) *sudeticus* DC. (K.), δ)

Schkuhrii DC. (= *Cineraria integrifolia* Schk., non alior. = *C. Schkuhrii* Rchb.), ε) *croceus* DC. (Tratt.).

frigidus Less. (= *Cineraria atropurpurea* Ledeb. = *C. frigida* Richards.), kaltes, 4. f. Sibirien. Nördl. Amerika.

Kalmii Nutt. (= *Cineraria canadensis* L. = *C. tomentosa* Mill.), Kalm's, 4. f. Canada.

kirghisicus DC. (= *Cineraria glabrata* Ledeb.), kirghisisches, 4. f. Sibirien.

medius Sweet, (= *Cineraria media* W. K.), mittleres, 4. f. Ungarn.

II. Genuini.

anethifolius Cunn., dillblätteres, 5. k. Neuholland.

apargiaefolius Walp., apargienblätteres, 4. k. Neuholl.

auratus DC. (= *Cineraria aurea* L.), goldiges, 4. f. Sibirien.

aureus L. (= *fastigiatus* Schwzn.).

calamifolius Hook., rohrblätteres, 5. k. Cap d. g. H.

californicus DC., californisches, ☉. f. Californien.

calvescens Moris et Notar., kahlwerdendes, 5. k. Insel Capri.

caucasicus DC. (= *Cineraria caucasica* MB. = *Ligularia caucasica* Don, Sweet).

crassiflorus DC. (= *Cineraria crassiflora* Lam. = *C. vestita* Spgl.), dickblumiges, 4. t. Südamerika.

crenatus Thbg., kerbiges, 5. k. Cap d. g. Hoffn.

Cymbalaria Pursh, (= *aureus* L. var.? DC.), cymbelkrautblätteres, 4. f. Nordamerika.

dubius Ledeb. (= *vulgaris* L. var. DC.), zweifelhaftes, ☉. f. Sibirien.

dunensis Dumort. (= *Jacobaea* L. var.?), Dünen-K., 4. f. Belgien.

Duriei Gay, Durieu's, 4. f. b. Asturien.

echinatus DC. (= *Cacalia echinata* L. fil. = *Cineraria ramentosa* L'Her.), igelstacheliges, 4. k. Teneriffa.

erucaefolius L. (= *canescens* Bernh., Schrad. = *cinerarioides* Vivian. = *scanorensis* L. = *siculus* Jan etc.).

fragrans Fisch., wohlriechendes, 4. f. Sibirien.

Fuchsii C. C. Gmel. (= *alpestris* Gaud. = *commutatus* Hell. = *nemophilus* Dumort. = *nemorensis* Auct., non L. etc.).

Senecio

glaucus L. (= ? *glaucescens* Spgl., non DC.).

Haworthii Steud. (= *vestitus* Sweet, = *Cacalia vestita* Haw.), Haworth's, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Herbichia Steud. (= ? *abrotanifolius* Whlbg. carp. = *Herbichia carpatica* Zawadsky), Herbich's, 4. f. Galicien.

Jacquinianus Rchb. (= *Barrelieri* Hoppe, = *commutatus* β Spenner, = *frondosus* Tausch, = *germanicus* α Wallr. = *nemorensis* Jacq. = ? *octoglossus* DC.), Jacquin's, 4. Mittel- u. Osteuropa.

inaequidens DC. (= *Lactuca capensis* Hortul.), ungleichzahniges, 4. \ddot{h} . k. Cap d. g. Hoffn.

Kicksii Steud. (= *diversifolius* Dumort. = *Doria* Kicks), Kicks's, 4. f. Belgien.

micranthus Hornem., kleinblumiges, \odot . f. ?

nemorensis L. (= *germanicus* Wall. Die übrig. Synonyme vergl. bei S. Jacquinianus).

niveus W., Less. (= *Ciner. nivea* W. = *Doria nivea* Thbg. = *Jacobaea nivea* Thbg.), schneeweisses, \ddot{h} . t. Cap d. g. H.

obscurus Fisch., dunkles, 4. f. Sibirien.

odoratus Hornem. et Rich. (= *otiphyllus* Cunningh. = *Cacalia odorata* Dsf.), wohlriechendes, 4. k. Neuholl.

oliganthos DC. (= *Cacalia tomentosa* Thbg.), wenigblumiges, \ddot{h} . k. Cap d. g. Hoffn.

panduratus Less. (= *Cineraria incisa* W. = *C. pandurata* Thbg. = *Doria incisa* Thbg.), geigenförmiges, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

Petasites DC. (= *Cineraria Petasites* Sims, = *C. platanifolia* Schrk., p. 196).

praecox DC. (= *Cineraria praecox* Cav.), frühes, \ddot{h} . k. t. Mexico.

rapistroides DC. (= *Jacobaea squalida* C. A. Mey.), Rapsdotterähnliches, \odot . f. Caucasus.

reclinatus L. fil. suppl. (= *S. Chrysocoma* Meerb. = *graminifolius* Jacq. = *Carderina* Cass. = *Chrysocoma sphacelata* Mch. = *Jacobaea reclinata* Thbg.).

solidagineus Spgl. (= *populifolius* L., non DC. = *solidaginoides* Berg.).

spicatus Sweet, ähriges, 4. f. ?

Stauntonii DC., Staunton's, 4. k. China.

Tournefortii Lapeyr. (= *nemorensis* α Gouan, = *paludosus* β Lam. = *persicaefolius* Ram.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen. 1)

umbrosus W. K. ist 4. nicht \odot .

viscosus L. (= *Obaejaca viscosa* Cass.), β) viscososylvaticus var. intermedius Lasch, (= *viscidulus* A. Scheele), γ) radiatus Hort. Berol.

Vulneraria DC. (= *oliganthos* Spgl., non DC. = *pau-ciflorus* H. B. K., non Pursh, = *Cineraria Vulneraria* Alam.), Wollblumenähnliches, 4. k. Mexico.

III. *Cremonocephalum* Cass. (= *Crassocephalum* Mch.).

Decaisnei DC. (= *C. flavum* Decaisn., Hochst. Steud.), Decaisne's, \odot . f. Arabien.

Sect. IV. *Erechtites* Rafin. p. 746, vgl. auch p. 227, II.

Sect. V. *Gynura* Cass. p. 746, vergl. p. 278, II.

Sect. VI. *Pericallis* D. Don, *S. Tussilaginis* Lindl.

(= *Cineraria Tussilaginis* L'Her.), s. p. 607.

1) Pag. 743 fälschlich unter Sect. I. gestellt, daher hier berichtigt.

Senecio

Da die, grösstentheils auf den Canarischen Inseln einheimischen, seit einiger Zeit auch in vielen Varietäten gezogenen, ehemals zur Gattung *Cineraria* gezählten und unter diesen Gattungsnamen jetzt noch allgemein in den Gärten auf- und angenommenen (daher in diesem Buche p. 195 u. 144, II. auch als Cinerarien verzeichneten) Arten von DeCandolle zur Gattung *Senecio* gestellt worden, so werden selbige zur Berichtigung der Synonymie hier nochmals aufgeführt als:

Sect. VII. *Cinerariae hortenses* (canarienses).

cruentus DC. (= *Cineraria aurita* Andr. = *C. cruenta* Mass. = *Tussilago rubra* Riedl. hrb.), ? β) *C. hybrida* W. Enum. (= *C. lactea* Jacq., non W.).

Heritieri DC. (= *Cineraria lanata* L'Her.), var. *cyanophthalmos*.

maderensis DC. (= *Cineraria aurita* L'Her.).

malvaefolius DC. (= ? *Cineraria bracteata* C. Sm. = *C. malvaefolia* L'Her.).

multiflorus DC. (= ? *Cineraria elatior* Bouché, = *C. multiflora* L'Her.).

populifolius DC. (= *Cacalia appendiculata* L. fil. = *Cineraria appendiculata* Poir. = *C. populifolia* L'Her.), β) *lacteus* Lindl., (= *leucantha* Vent. = *C. alba* Hortul. = *C. lactea* W., non Jacq.).

Sweetii * (= *Cineraria pulchella* Sweet, non Mey., p. 144, II.).

tussilaginoïdes * (*Cineraria* Webb), hufblattähnliches, 4. $\frac{1}{2}$. k. Teneriffa.

β) *Waterhousiana* Paxt.

Den p. 144, II. verzeichneten Varietäten oder Hybriden können auch noch folgende beigefügt werden: *atropurpurea*, *Beauty of Cyston* (Ivery), *Beauty of Weinham*, *Captivation*, *compacta*, *Criterion*, *Cunninghamii*, *Emperor of Russia*, *Hope*, *Lady constable*, *nobilis*, *Nosegay*, *Osherii*, *Pet*, *perfecta*, *Wetpet* etc.

cymbalariaefolius Less., v. *Brachyrhynchos cymbalariaefolius*, p. 871, *glabra* Clairv., *hirsutus* Clairv., *tomentosus* Clairv., v. *Adenostyles glabra*, *Petasites leucophylla*, p. 9, II., *pinifolius* P. (= *Commerstonii* Spgl.), v. *Hubertia pinifolia*, p. 306, II., *rigens* L., v. *Othonna parviflora*, p. 574, *sonchifolius* Mch. (= *amboinensis* Hort.), v. *Emilia sonchifolia*, p. 220, II.

Hinsichtl. der übrigen s. *Ligularia*, p. 462 et p. 357, II. *Senkenbergia ruderalis* Flor. Wetter., v. *Lepidium ruderale*, p. 454.

Senna Mill., *Roxb.*, *Absus* Roxb., *alata* Roxb., *alexandrina* Mill. (= *officinalis* G.), *arborescens* Roxb., *auriculata* Roxb., *bicapsularis* Roxb., *esculenta* Roxb. (= *purpurea* Roxb. = *Sophora* Roxb.), *italica* Mill., *obtusata* Roxb., *occidentalis* Roxb., *prostrata* Roxb., *sensitiva* Roxb., *speciosa* Roxb., *sumatrana* Roxb., *Tora* Roxb., v. *Cassia Absus*, *alata*, *lanceolata*, *glauca*, *auriculata*, *bicapsularis*, *Sophora*, *Senna*, *obtusata*, *occidentalis*, *pumila*, *angustissima*, *suffruticosa*, *florida*, *Tora*, p. 168—170 et p. 123—125, II.

Septas Umbella Haw., v. *Petrogeton Umbella*, p. 502 II.

Serapias L., Stendelwurz.

cordigera L. (= *glabra* Lapeyr. = *Lingua* Merl. (β Lam.)
= *ovalis* Rich. = *Helleborine cordigera* P.).

Lingua L. (= *hirsuta* Lapeyr. = *Helleb. Lingua* P.).

longipetala Pollini, (= *lancifera* St. Amans, = *pseudocordigera* Moris, = *Helleborine longipetala* Tenor.
= *H. pseudocordigera* Sebast.).

oxyglottis W. (= *cordigera* var. *longipetala* Lindl. =
Lingua L. var. Spgl. = *Helleborine oxyglottis* P.),
spitzzungige, 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

β) *Helleborine leucoglottis* P.

parviflora Parlatores, kleinblumige, 4. Kn. k. f. b. Sicilien.
triloba Visian., dreilappige, 4. Kn. f. b. Oberitalien,
Dalmatien.

abortiva Scopol, v. *Limodorum abortivum*, p. 464,
atrorubens Hoffm., *latifolia* Sm., *longifolia* L.,
non Scopol. (= *palustris* Scop.), *microphylla* Ehrh.,
viridiflora Hoffm. (= *sylvestris* Murray), v. *Epipactis*
atrorubens etc., *autumnalis* Poir., v. *Pterostylis*
cucullata, p. 665, *cordata* Sw., *ovata* All., Sw.,
v. *Listera cordata*, *ovata*, p. 469, *ensifolia* Roth,
(= *grandiflora* Flor. dan. = *Helleborine* β L. =
longifolia Scopol. = *nivea* Vill. = *Xyphophyllum*
L. fil.), *Damasonium* Mill. (= *grandiflora* L. =
lancifolia Ehrh. = *Lonchophyllum* L. fil. = *pallida*
Whlbg.), *rubra* L., v. *Cephalanthera ensifolia*,
pallens et *rubra*, p. 180, *Epipogium* L., v. *Epipogium*
Gmelini, *falcata* Thbg., v. *Pelexia falcata*,
p. 604, *Loeselii* Hoffm., v. *Sturmia Loeselii*, p. 791,
patens Thbg., v. *Penthea patens*, p. 497, II., *porri-*
folia W., v. *Microtis porrifolia*, p. 408, II., *regu-*
laris Forst., v. *Thelymithra longifolia*, p. 806, *spi-*
ralis Scop., v. *Spiranthes autumnalis*, p. 779.

Sergilus scoparius G., v. *Baccharis scoparia*, p. 109.

Serjania Plum. (= Seriania Auct.), Serjanie.

australis Spgl. (= *Dodonaea pinnata* Sm.), australasi-
sche, \ddot{h} . Sch. t. k. Neuholland.

Plumieriana Spgl. (= *Paullinia Seriana* L.), Plumier's,
 \ddot{h} . Sch. w. Westindien.

spectabilis Schum., ansehnliche, \ddot{h} . Sch. m. Südamerika.

Seridia Cass., *glomerata* Cass., *megacephala* Cass.,
microcephala Cass., *sonchifolia* Cass., *sphaerocephala*
Cass., v. *Centaurea glomerata*, *Seridis*, *aspera*, *son-*
chifolia, *sphaerocephala*, p. 176—179.

Serinia caespitosa Rafin., v. *Krigia dichotoma*,
p. 337, II.

**Seriocarpus N. E., conyzoides N. E., solidagineus
N. E. etc. v. Aster Sect. XIV. p. 100.**

Seriola L., Nesselsalat.

albicans Tineo, (= *alliata* Bivon. = *laevigata* L. var.
 γ DC. = *Rodigia alliata* G. Don, = *Hypochaeris*
albicans Ucria).

glaucula Tineo, (= *laevigata* β DC. = *Hypochaeris*
glaucula Presl).

laevigata L. (= *Agenora laevigata* Don, = *Piptopogon*
decipiens Cass. = *Rodigia laevigata* Spgl.).

aethnensis L. (= *hispida* Mch. = *scabra* Hort.
= *urens* All.), *cretensis* L. (= *rubescens* Tineo,
= ? *urens* L.), v. *Metabasis aethnensis* et *cretensis*,
p. 402, II., *apargioides* Hook., Arn., non Rchb.,

Seriola

crotensis Dsf., non L., v. *Achyrophorus apargioides* et *oxydantus*, p. 7, II., *commutata* Less., v. *Rodigia commutata*, p. 692, *urens* Lam., non L., v. *Nemauchenens aspera*, p. 432, II.

Seriphium L., Heidebeifufs, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

cinereum L. (= *squarrosus* Forst. = *Stoebe alopecuroides* Sbr., non Less. = *St. cinerea* Thbg.), aschfarbiger, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

plumosum L. (= *Stoebe plumosa* Thbg.), federiger, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

β) *cinereum* Less. (= *virgatum* Steud. = *Artemisia vermiculata* Lam., non L. = *Stoebe fasciculata* Cass. = *St. virgata* Thbg.).

vermiculatum DC. (= *ambiguum* L. = *cinereum* Berg., non L. = ? *Artemisia ambigua* Thbg., non L. = *A. vermiculata* L. mant. = *Stoebe artemisioides* E. Mey.), wurmförmiger, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

aethiopicum P. (= *juniperifolium* Lam.), v. *Stoebe aethiopica*, *ericoides* P., v. *Disparago ericoides* Nachlese, *reflexum* P., v. *Trichogyne reflexa*.

Serpicula L., *repens* L. (= *capensis* Räusch. = *serpyllifolia* Burm. = *Laurenbergia capensis* Gmel. syst. = *L. repens* Berg.).

Serratula Dill., L., Scharte.

glauca Ledeb. (= *Laxmanni* Fisch. = *marginata* Tauch, = *Carduus altaicus* Patr. = *C. uniflorus* Turcz. = ? *Centaurea Cardunculus* Pall.).

leucantha DC. (= *Carduus leucanthus* Cavan.), weifsbäumige, ♂. f. Spanien.

pinnatifida Poir. (= *Carduus pinnatifidus* Cav. = *Cirsium pinnatifidum* Spgl. = *Cnicus pinnatifidus* W. = *Klasca pinnatifida* Webb), fiederspaltige, ♂. f. Spanien.

radiata MB. (= *Gmelini* Tausch, = *heterophylla* Vill., non Dsf. = *pinnatifida* Dsf. = *Carduus radiatus* W. K.).

Unbestimmtere: *dubia* Scop., *gracilis* Hill., *macrophylla* Wender., *sonchifolia* Bess., *Podol.*, *varia* Hill. Nordam.

albescens Wall., v. *Haplotaxis albescens*, p. 284, II., *alata* Dsf. etc., v. *Jurinea alata* etc., p. 433 et p.

331, II., *amara* Pall., non L. (= *Picris* MB.), v. *Acroptilon Picris*, p. 8, II., *anthelmintica* Roxb. etc.,

v. *Vernonia anthelmintica* etc., p. 841, *babylonica* L., *Behen* Lam. (= *cordata* Cass.), v. *Centaurea babylonica* et *cerinthefolia*, p. 176—177, *caspica* Pall.,

v. *Karelinia caspica*, p. 333, II., *Chamaepeuce* L. etc., v. *Chamaepeuce mutica* etc., p. 187, *conica*

Lam. (= *dubia* Brot.) etc., v. *Stachelina dubia* etc., p. 781, *conifera* DC. Brot., v. *Leuzea conifera*, p.

460, *gnaphalodes* Poir., v. *Helipterum gnaphaloides*, *Rhaponticum* DC., *acaulis* DC., *cynaroides* DC.

(= *cynarifolia* Poir.), *inermis* Poir. et *uniflora* Spgl., v. *Rhaponticum scariosum*, *acaule* etc., p. 683 et

p. 589, II., *pilosa* Ait., *scariosa* L., *speciosa* Ait., *spicata* L., v. *Liatris pilosa*, *scariosa*, *elegans* et

spicata, p. 461 et p. 356, II.

Hinsichtlich der übrigen s. *Cirsium*.

Serronia Jaborandi Gaudich., Guillem., v. *Ottonia Anisum*, p. 464, II.

Serruria RBr., Serrurie.

acrocarpa RBr., spitzfrüchtige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Bergii RBr., (= *Leucadendron sphaerocephalum* Berg.),

Bergius's, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

emarginata Sweet, (= *arenaria* Knight, non RBr. = *Protea abrotanifolia minor* Andr.).

eriocephala RBr. (= *Protea eriocephala* Lichtenst.),
wollköpfige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

hirsuta RBr. (= *Protea erecta* Thbg.? = *P. phyllicoides* Thbg. = *P. sphaerocephala* Hoult.),
rauhhaarige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Nivenii RBr. (= *Protea decumbens* Andr., non Thbg.).

odorata Sweet, (= *Pr. abrotanifolia odorata* Andr.).

pilosa R. et S. (= *Protea pinnata* Andr., non Cav.),
behaarte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

simplicifolia RBr. (= *Protea plumigera* Thbg.?), ein-
fachblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

sphaerocephala RBr. (= *Protea sphaerocephala* Hoult.,
non L. et alior.), kugelköpfige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

triplicatoternata R. et S. (= ? *congesta* RBr. = *Protea triternata* Andr., non Thbg.),
dreifachdreizählige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Sesamum L., Sesam.

laciniatum W., Klein, schlitzblättriger, ☉. w. m. Ostindien.
?β) trifoliatum Mill.

occidentale Heer Hort. Turic., westlicher, ☉. w. w. Guiana.
orientale L. (= *edule* Hort. = *oleiferum* Mch.).

radiatum Schum. (= *gracile* Endl. = *Sesamopteris radiata* DC. prodr.),
strahliger, ☉. w. m. Guinea.

Sesbania P. (= *Sesbana* RBr., Ait., Sogl.), Sesbanie.

aculeata P. (= *bispinosa* Sogl. = *Candira* Hamilt. = *Aeschynomene bispinosa* Jacq. = *A. cannabina* Roxb. = *A. Sesban* Jacq. Collect. = *A. spinulosa* Roxb. = *Coronilla aculeata* W. = *Emerus aculeat.* Schum.).

aegyptiaca P. (= *Aeschynomene indica* Burm. = *A. Sesban* L. = *Coronilla Sesban* W.).

affinis Schrad. (= *cannabina* Hort., non P. = *Aeschynomene cannabina* Hort.).

fusca Desv. (= *Aeschynomene fusca* Dsf. Hort. Par.),
braune, ☉. w. ?

macrocarpa Mühlbg. (= *picta* P. var. Sogl.), groß-
früchtige, ☉. w. m. f. Louisiana.

procumbens Wight, Arn. (= *Aeschynomene diffusa* Roxb.
mus. ind. = *A. procumbens* Roxb. fl. ind.), nieder-
liegende, ☉. w. Ostindien.

sericea Lk. (= *Coronilla sericea* W. Enum.).

uliginosa Roxb., Sumpfliebende, ☉. w. Ostindien.

Nicht hinlängl. bekannt: *geminiflora* Schrad.

platycarpa P. (= *vesicaria* Sogl. = *disperma* Pursh), v. *Glottidium floridanum*.

Seseli Boerh., L., Sesel.

campestre Bess. (= *arenarium* MB. = *tortuosum* Trevir. non L.).

defoliatum Ledeb., entblätterter, 4. f. Altaisch. Sibirien.

divaricatum Pursh, (= *lucidum* Fras. = *Adorium crassifolium* Rafin. = *Marathrum* Rafin. = *Musineon* Rafin.),
ausgespreizter, 4. f. Nordamerika.

globiferum Visiani, kugelförmiger, 4. ♀. f. b. k. Dalmatien.

graveolens Ledeb., starkkriechender, 4. f. Sibirien.

gummiferum Sm. (= *Bubon eriocephalus* Sogl. =

Seseli

B. rigidus Spgl.), gummigebender, ♂. f. Taurien, Griechenland, Sibirien.

β) *crithmifolium* DC. (= *Athamanta crithmifolia* Juss. Herb.).

Hippomarathrum L., β) *viride* Endl. Hort. Vindob.

juncum Sibth., Sm. (= *glaucum* L. var. Spgl.), simsenförmiger, 4. f. Griechenland.

Lessingianum Turcz., Lessing's, 4. f. Sibirien.

montanum L., DC., α) *laxiusculum* DC. (= *montanum* L.), β) *glaucum* L., DC. (= *elatum* Güldenst. = *osseum* Crantz), γ) *multicaule* Retz, Jacq., δ) *peucedanifolium* Merat, (= *elatum* Thuill.).

Pallasii Bess. (= *crassifolium* Schrad. = ? *Peucedanum Matthioli* Spgl.).

polyphyllum Tenore, vielblättriger, 4. f. Neapel.

puberulum DC, feinhaariger, 4. f. Türkei.

β) *pallidum* DC.

rigidum W. K. (= *Bubon rigidus* γ Spgl.), starrer, 4. f. Banat.

tenuifolium Ledeb., dünnblättriger, 4. f. Alt. Sibirien.

tomentosum Visiani, filziger, 4. f. b. Dalmatien.

tortuosum L. (= *annuum* Pall., non L. = *patens* Güldenst.).

varium Trevir. (= *glaucum* MB., non L. = *tauricum* Lk.), β) *chaerophylloides* Hort.

Unbestimmtere: *hispidum* Hort., *purpurascens* Brotero, *quinquefolium* Hort.

alpinum MB., v. *Lomatocarpum alpinum*, p. 883, *aristatum* Ait. (= *ferulaefolium* Poir.), v. *Ligusticum pyrenaicum*, p. 462, *buchtormense* K., *Libanotis* K. et ? *athamantoides* Ledeb., v. *Libanotis buchtormensis*, *vulgaris* et *sibirica*, p. 461 et 356, II., *Carum* Scop. (= *Carvi* Roth), ? *pimpinelloides* L., non Spgl., v. *Carum Carvi* et *rigidum*, p. 167 et p. 122, II., *cervariaefolium* DC. et *macedonicum**, v. *Athamanta cervariaefolia* et *macedonica*, p. 53, II., *Falcaria* Crantz, v. *Falcaria Rivini*, *foeniculifolium* Poir., v. *Ptychotis coptica* β, p. 572, II., *glabratum* W. herb., v. *Runia seselioides*, p. 620, II., *nodiflorum* Scop., v. *Helosciadium nodiflorum*, *pimpinelloides* Spgl., v. *Peucedanum Chabraei* β, p. 504, II., *pratense* Crtz. (= *selinoides* Jacq.), v. *Silaus pratensis*, p. 755, *Saxifragum* Scholl. (= *dubium* Schkr. = *selinoides* Bess. = *venosum* Hoffm.), v. *Cnidium venosum*, p. 208, *pumilum* L., *dioicum* Vill. (= *glaucum* Lam. = *pumilum* All.), v. *Trinia Kitaibelii* et *vulgaris*, p. 822. — *Meyeri* D. Dietr., v. *Soranthus Meyeri*, *Turbith* L., non Tenore, v. *Turbith Matthioli*, *Turbith* Tenore, v. *Ptychotis verticillata*, p. 666 et p. 572, II.

Die übrig. zu *Ptychotis* gehörig. Synonyme vgl. p. 750.

Sesleria Arduin., Seslerie.

cylindrica DC. (= *argentea* Savi, = *coerulea* β Pollini, = *palescens* Hartm.).

elongata Host, (= *nitida* Tenore, = ? *alba* Mart. = *Aira alba* Wulf. = *Phleum autumnale* Scopol.).

interrupta Visian., unterbrochenährige, 4. f. Dalmatien.

sphaerocephala Arduin. (= *Cynosurus sphaerocephalus* Wulf.), β) *leucocephala* DC.

Sesuvium L., Sesuvium.

revolutifolium Ortega, (= *Portulacastrum* β Sims, = *revolutum* P.).

sessile P. (= *parviflorum* DC. = *Portulacastrum* β P., DC. = *Trianthema americana* Gill.).

Setaria P. B., Borstenfennich, p. 750 oder als: **Penisetum** Sect. III. p. 494, II. anzunehmen. Denen daselbst verzeichneten Arten sind noch beizufügen:

auricomia Lk. (= ? *Panicum auricomum* N. E.), goldschopfiger, \odot . f. Brasilien.

canescens Kunth, (= *Panicum canescens* Roth), graulich, \odot . m. f. Ostindien.

chrysantha * (= *aurea* Hochst. = *Panicum chrysanthum* Steud.), goldblumiger, \odot . f. Abyssinien.

Seubertia laxa Kunth, v. *Triteleia laxa*, p. 824.

Severinia Tenore, Severinie, XVIII. II., Hesperideae-Aurantiaceae.

buxifolia Tenore, (= *Citrus buxifolia* Hort., non Poir.), buchsbaumblättriger, \S . k. ?

Seymouria asarifolia Sweet, *Heritieri* Sweet, v. *Pelargonium* Sect. XV. asarifolium et dipetalum, p. 601–602 et 486, II.

Sherardia erecta Sibth., Sm. (= *muralis* Pall.), v. *Galium verticillatum*, p. 254, II., *foetida* Lam. (= *foetidissima* Cyrill.), v. *Putoria calabrica*, p. 574, II.

Shortia Grah. (Dr. Short, Prof. d. Medicin u. Botanik zu Lexington in Nordamerika), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

californica Grah., californische, \odot . f. Californien.

Shortia californica Hort., v. *Hymenoxis californica* β , p. 310, II.

Shutteria Choisy, Shutterie, V. I., Convolvulaceae.

bicolor Choisy, (= *Calystegia Keriana* Sweet, = *Convolvulus bicolor* Vahl, = *C. bracteatus* Vahl, = *C. involucratus* Ker, = *C. sublobatus* L. = *C. Weinmannianus* Choisy, = *Ipomoea bicolor* Sweet, = *I. bracteata* R. et S. = *I. panduraeformis* Drege, = *I. timoriensis* Bl. = *Hewittia bicolor* Wight, Arn., Steud.), zweifarbige, \odot . Sch. m. f. Ostindien, Südafrika.

Shuttleworthia Meissn. (= *Uwarowia* Bunge), (R. J. Shuttleworth, lebt in Bern, einer d. thätigsten Botaniker u. Förderer d. Wissenschaft, Besitzer eines d. größten Herbar.), XIV. II., Verbenaceae.

pulchella Meissn. (= *Verbena pulchella* Sweet, p. 840, = ? *tenera* Spgl.), schöne, \odot . \S . f. k. Buenos Ayres.
b) fl. albo.

sulphurea Meissn. (= *Verbena sulphurea* D. Don, p. 840). *Berterii* Meissn. und *Diceras* Meissn., scheinen bis jetzt nicht kultivirt zu werden.

Sibbaldia L., Sibbaldie.

adpressa Bunge, Ledeb., angedrückte, 4. \S . f. Alt. Sibirien.
procumbens L. (= *Potentilla procumbens* Clairv.).

? β) octopetala Mill.

altaica L., *erecta* L. (hierzu auch β *polygyna* W.), *grandiflora* Pall., v. *Chamaerhodos altaica*, *erecta*, *grandiflora*, p. 136, II.

Sibthorpia europaea L. (= *prostrata* Salisb.).

evolulacea L. fil., v. *Dichondra repens*.

Sickingia W. (Franz v. Sickingen, einer der edelsten u. heldenmüthigsten deutschen Ritter, auch Beschützer d. Gelehrten, † 1523), ?XIV. II. (V. I.), Personatae-Biguoniaceae (Rubiaceae Alior.).

Erythroxyton W., rothholzige, h. w. Neugranada. ¹⁾
orinocensis Sogl., v. *Platycarpum orinocense*, p. 633.
Sickmannia radiata N. E., v. *Ficinia radiata*.

Sicyos L., Haargurke.

angulatus L. (= *acuta* Rafin. = *Sicyoides angulata* Mch.).

Badaroa Hook., Arn. (= *bryoniaefolia* Moris, = *Badaroa bryoniaefolia* Bertero), gichtrübenblättrige, ? \odot .
Sch. f. Chili.

triquetrus Moç., Sess., dreikantige, \odot . Sch. f. Mexico.

Garcini L., v. *Bryonia Garcini*, p. 135, *lobata* Mch.,
v. *Momordica echinata*, p. 414, II.

Sida L., Kunth, Sammetpappel.

acuta Burm., Cav. (= *lanceolata* Retz, = *scoparia*
Lour. = *Stauntoniana* DC.).

amoena Dsf. (non Weinm.), liebliche, h. w. Brasilien.

arborescens Schrk., baumartige, h. w. Brasilien.

arguta Sw. (= *glabra* Mill.).

atropurpurea Blume, schwarzpurpurrothe, h. w. Java.

betulaefolia Schrk., birkenblättrige, h. w. Brasilien.

bicolor Cav. (= *obliqua* Moç., Sess.), zweifarbige, h. t.
 h. t. Neuspanien.

carnea Moç., Sess., fleischfarbige, h. t. Mexico.

cordifolia L. (= *herbacea* Cav. = *rotundifolia* Cav.
= *Malvinda cordifolia* Medic.).

costata Schldl. (= ?*collina* Schldl. var.?), gerippte,
 h. t. k. Mexico.

densiflora Hook., Arn., dichtblumige, h. w. Südamerika.

denticulata Fresen., gezähnelte, h. w. Arabien.

denudata N. E., Mart., nackte, h. w. Brasilien.

elegans Colla, zierliche, h. h. w. Süd. (St. Martha).

emarginata W. (= *truncata* L'Her.), ausgerandete, \odot .
 h. w. St. Domingo.

erubescens Schrk. (= *Corchorus americanus* Hortul.),
rothwerdende, h. h. w. Südamerika.

fragrans L'Her., wohlriechende, h. w. St. Domingo.

frutescens Cavan., strauchartige, h. w. Mauritius.

fruticosa Mill., strauchige, h. w. Jamaika.

fulva St. Hil. (non Hffg.), rothgelbe, ? h. w. Brasilien.

geranioides DC., storchschnabelähnliche, h. t. Neuholl.

graveolens Roxb. (= *hirta* Rchb., non Lam.).

Grevilliana Gill., Greville's, h. t. Chili.

heterosperma Visiani, verschiedensamige, h. t. k. Afrika.

hirsutissima Mill., rauhhaarigste, h. w. Südamerika.

hispida Pursh, (= *betulina* Hornem.), steilhaarige, h. t.
 k. Nordamerika (Georgia), Mexico.

interrupta Balb., unterbrochene, h. w. Süd. (St. Martha).

lignosa Cav., holzige, h. w. Domingo.

linifolia Cav. (= *viminea* Fisch., Lk. = *Malva hirsuta* Aubl.).

maderensis Lowe, madeiraische, h. k. Madeira.

microsperma Cav., kleinsamige, h. w. ?

Milleri DC. (= *angustifolia* Mill., non Juss.), Miller's,
 \odot . h. w. Ostindien.

1) Ob die ächte Pflanze dieses Namens kultivirt wird, scheint noch zweifelhaft.

Sida

- morifolia* Cavan. (= *humilis* β W., DC. = *Lamarckia morifolia* Medic.), Maulbeerbaumblättrige, \odot . w. m. f. Ostindien.
- nutans* L'Her. (= *calyptata* Cav. = *Gaya nutans* Sweet), nickende, h . w. Peru.
- occidentalis* L. (= *Abutilon deflexum* Mch. = *A. occidentale* Medic. = *Gaya occidentalis* Sweet).
- philippica* DC. (= *chinensis* Retz., = ?*retusa* Cav., non L.), philippinische, h . h . w. Philippinen.
- picta* Gill., bemalte, h . k, t. Uruguay, Buenos Ayres.
- pimpinellifolia* Mill., Bibernelblättrige, h . h . w. Ostindien.
- pinnata* Cav., gefiederte, h . w. Südamerika.
- polystachya* Arrabida, vielährige, h . w. Brasilien.
- quaternata* Schrk., vierzählige, \odot . w. Brasilien.
- reclinans* Kunze, (= *urens* Hort. Ultraj.), zurückneigende, \odot . m. f. ?
- reticulata* Schrank, netzförmige, h . h . w. Brasilien.
- retrofracta* DC., zurückgeknickte, h . h . w. Martinique.
- rhubifolia* L. (= *Napaea rhombifolia* Medic., Mch.).
 β) *canescens* Cavan., γ) *submutica* C. A. Mey.
- Sellowiana* Kl., Sellow's, h . h . w. Brasilien.
- Sessei* Lagasca, Sesse's, h . h . t. w. Neuspanien.
- spinosa* L. (= *Malachodendron corchoroides* Rausch. = *Malvinda spinosa* Medic., Mch. = *Stewartia corchoroides* Forsk.). In den meisten Tropenländern heimisch.
- terminalis* Cav., endständige, h . w. Brasilien.
- ternata* L. fil., Thbg. (= *triloba* Cav.), dreizählige, h . k. Cap d. g. Hoffn.
- ulmifolia* Cav., ulmenblättrige, h . w. Domingo.
- venusta* Schldt., liebliche, h . t. k. Mexico.
- verruculata* DC. (= *arguta* Fisch.).
- vestita* Steud. (= *velutina* Schrk., non W.), bekleidete, h . h . w. Brasilien.
- vitellina* Hffg. (= *fulva* Hffg., non St. Hil.), dottergelbe, h . w. Java.
- Weinmanni * (= *amoena* Weinm., non Dsf.), Weinmann's, h . h . t. China.
- Unbestimmtere: *abutilifolia* Mill. Südamerika, *ambigua* Tenore, *corchorifolia* Tenore, *cuneifolia* Tenore, *elata* Hort., *hirsuta* Mill., *pulcherrima* L'Her., Roem. Hort. Turic., *sericea* Mill. Westindien.
- betulaefolia* Hort. (= *carpinifolia* Hort. = *carpinoides* DC. = *coromandelina* Hort. = ?*tricuspis* Dsf.), v. *Malva tricuspidata*, p. 492 et p. 384, II., *foetida* Cav. = *Bastardia foetida*, p. 61, II., *digitata* Sogl., *malvaeiflora* Moç., Sess., DC, v. *Nuttallia digitata*, *malvaeiflora*, p. 551, *Periptera* Sims, (= *Malvaviscus* Sess. = *rubra* Tenore, = *Anoda punicea* Lagasca), v. *Periptera punicea*, p. 607.
- Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Anoda*, p. 61 et p. 37, II., *Cristaria*, p. 130 et p. 170, II., *Lopimia*, p. 477 u. *Abutilon*, p. 1 nebst Nachlese.
- Sideranthus* Fras., *integrifolius* Fras. (= *villosus* Sweet), v. *Chrysopsis villosa*, p. 195 et p. 143, II.
- Sideritis** T., Magnetkraut (Gliedkraut).
- angustifolia* Lagasca, (= *incana* Cav., non L. = ?*linearifolia* Lagasca).
- dura* Benth., hartes, h . f. ?

Sideritis

- hirsuta* L. (= *hispanica* Mill. = *rotundifolia* W. herb. = *tomentosa* Mill.).
incana L. (= *virgata* Dsf.).
lanata L. (= *elegans* Murr. = *nigricans* P. Lam. = *Marrubiastrum elegans* Mch.).
libanotica LaBill. (= *pullulans* Vent. Hort. Cels.), Libanon's-G., 4. ♂. k. Syrien.
macrostachya Poir. (= *discolor* W. herb. = *canariensis* L. var. Spgl.), großsähriges, ♂. k. Canarische Inseln.
Massoniana Benth., Masson's, ♂. k. Madeira.
oleaeifolia Mill., oelbaumblättriges, ♂. k. Creta.
pungens Benth., stechendes, 4. ♂. k. f. b. Spanien.
purpurea Talbot, Benth., purpurfarbiges, ♂. f. Corfu, Zante.
remota D'Urvill. (= *lanata* Hochst. et Steud. = *montana* Sibth., Sm., non L.), entferntes, ♂. f. Griechenland (Samos).
scordioides L., α) *grandiflora* Benth. (= *subspinosa* Cav.), β) *communis* Benth., γ) *elongata* Benth. (= *hyssopifolia* Auct. = *foetida* Poir. = *hirta* Roth, = *hirtella* Brotero, = *fruticulosa* Pourr.), δ) *alpina* Vill., Knowl. et Westc. (= *crenata* Lam. = *pyrenaica* Poir.), ε) *glabrata* Benth. (= *hyssopifolia* plur. Auct.), ζ) *angustifolia* Benth. (= *hyssopifolia* L.), η) *incana* Gouan, Benth. (= *pyrenaica* Endress).
sericea P., seidenhaariges, 4. ♂. f. b. k. Spanien.
sicula Ueria, (= *brutia* Tenore, = *Empedoclea montana* Rafin.), sicilianisches, 4. f. Neapel, Sicilien.
syriaca L. (= *decumbens* Mch. = ?*Navicularia Heisteri* Fabr.).
taurica MB. (= *incana* Habl. = *syriaca* Pall.).
β) *dimorpha* Hort. Petropol.
Tragoriganum Lagasca, (= ?*suffruticosa* Mill.), bockduftendes, 4. ♂. k. f. b. Spanien.
- Siderodendron** Vahl, triflorum Vahl, (= *ferreum* Lam. = *Sideroxyloides ferreum* Jacq.).
- Sideroxylon** Dill., L., Eisenholz.
nitidum Blume, glänzendes, ♂. w. Java.
 Nicht hinlänglich gekannte: *nigricans* Dum.Cours, *obovatum* G. fil. (non Lam.).
S. argenteum Thibg., *inerme* L. (= *atrovirens* Lam., W. Enum. = *cinereum* Lam.), v. *Heeria argentea*, *inerinis*, p. 287, II., *obovatum* Lam., non G., *foetidissimum* L. (= *oppositifolium* Mill.), *lanuginosum* Mchx. (= *tenax* Walt., non ?L.), *lycioides* L. (= *laeve* Lam., Walt.), ?*nigrum* G. fil., *reclinatum* Mchx., *strigosum* W., *tenax* L. (= *chrysophylloides* Mchx. = *sericeum* Walt.), v. *Bumelia cuneata*, *foetidissima* etc., p. 137—138, *cymosum* L., v. *Olinia cymosa*, p. 557, *Manglilla* Lam., *melanophleum* L. (= *laurifolium* Lam. etc.), v. *Myrsine Manglilla* et *melanophleos* etc., p. 538 et p. 426, II., *salicifolium* G., v. *Dipholis salicifolia* Nachlese.
- Sieboldia** * (P. F. v. Siebold, k. holländ. Stabsarzt, berühmt als Reisender, Naturforscher etc. namentl. in Bezug auf Japan), (= *Simethis* Kunth), VI. 1., *Coronariae-Asphodeleae*.
bicolor * (= *Anthericum bicolor* Dsf. = *A. ericetorum* Berger. = *A. Mattiazzi* Vandel. = *A. planifolium* Brot. = *Bulbine planifolia* R. et S. = *Phalangium*

Sieboldia

bicolor Red., DC. = *Ph. planifolium* P. = *Simethis bicolor* Kunth), zweifarbige, 4. k. f. b. Sardinien, Pyrenäen, Portugal, Nordafrika.

= *Sieboldia bicolor* Hffg., *florida* Hffg., v. *Clematis bicolor*, *florida*, p. 203.

Siegesbeckia L., Siegesbeckie.

fosculosa L'Her. (= *dichotoma* Sckkr. = *Schkuhria dichotoma* Mch. = *Trimeranthes dichotoma* Cass.).

iberica W. (= *orientalis* MB.), iberische, ☉. f. Caucasus, Taurien.

serrata DC. (= *cordifolia* Poepp., non H. B. K.), sägezahnige, ☉. f. Chili.

Sieglingia decumbens Bernh., v. *Triodia decumbens*, p. 822.

Sieversia geoides Speg., v. *Coluria potentilloides*, p. 212.

Silaus Bess., Rofskümmel.

Besseri DC. (= *alpestris* Bess. = *Peucedanum alpestre* Speg., ?L. = *P. Silaus* MB.), Besser's, 4. f. Podolien, Sibirien.

longifolius Ledeb. (= *Angelica Fischeri* Speg. = *Athamanta denudata* Fisch. = *Coenolophium Fischeri*, p. 876, = *Cnidium Fischeri* Speg. = *Crithmum campestre* Gleditsch. = *C. mediterraneum* MB. = *Ligusticum Fischeri* Lk. = *L. longifolium* W. = *Oreoselinum album* Hoffm. = *Peucedanum album* Hort. = *P. minus* Poir.), langblättriger, 4. f. Sibirien.

β) *divaricatus* * (= *Cnidium divaricatum* Ledeb. = *Ligusticum divaricatum* DC.).

pratensis Bess. (= *Cnidium Silaus* Speg. = *Ligusticum Silaus* Lam., Lk. = *Peucedanum pratense* Lam. = *P. Silaus* L. = *Seseli pratense* Crtz. = *S. solinoides* Jacq. = *Sium Silaus* Roth).

tenuifolius DC. (= *Matthioli* K. = *serotinus* Rehb. = *Ligusticum arenarium* Lk. = *Meum sibiricum* Speg. = *Peucedanum Matthioli* Speg. = *P. serotinum* P. = *P. tenuifolium* Dsf.), dünnblättriger, 4. f. ? Ungarn.

Silene L. (et *Cucubalus* et *Viscago* Auct. pro parte), Leimkraut.

aegyptiaca L. (β *retroflexa* P.).

altaica P. (= *suffruticosa* Pall. = *Cucubalus fruticosus* Pall.), β) *grandiflora* Hort. Petrop.

alpestris Jacq. (= *austriaca* Hort. = *viscida* Speg. = *Cucubalus saxatilis* a Lam. = *Lychnis alpestris* L. fil.).

ambigua Camb., zweifelhaftes, ☉. f. ? Westeuropa.

angustifolia MB. (= *petraea* Adam., Hoffm., non W. K.).

apetala W. (= *aspera* Hort. ? = *nocturna* L.), kronenloses, ☉. f. Spanien, Dalmatien.

arenarioides Dsf. (= *angustifolia* Dietr., non MB. = ? *linifolia* W.), sandmierenähnliches, ☉. f. Nordafrika.

articulata Vivian., gegliedertes, ☉. f. Nordafrika, Portugal.

auriculata Sibth., Sm. (= *lanuginosa* Bertol.), geöhrt, 4. f. Italien, Griechenland.

Bergerii Schott, Berger's, 4. f. Italien.

bicolor Thore, (= *portensis* Bonam. = *reticulata* Hort.).

Campanula P. (= *Cucubalus alpestris* All.).

canescens Tenore, (= ? *decumbens* Bivone, = *sericea* Badarro, = *vespertina* Curt.).

capensis Otth, capisches, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Silene

- caespica* P. (= *fruticulosa* Dietr. = *fuffrutescens* MB.),
catholica Ait., Otth, (= *glutinosa* P. = *Mussini* Hornem.
 = *Cucubalus catholicus* L. = *C. glutinosus* Retz, =
Viscago fusca Mch.).
cerastoides L. (= *Clusii* Schott, = *gallica* L. var. K.
 = *micropetala* DC. = *rigidula* L. = *Lychnis cera-*
stoides Scopol.).
ciliata Pourr. (= *arvatica* Lagasca, = *Pourretii* Poir.
 = *stellata* Lapeyr), gewimpertes, 4. f. b. k. Creta,
 Pyrenäen.
 β) *geniculata* Pourr.
coarctata Lagasca, (= *cerastoides* L. var. K.? = *disticha*
 W. var.? = *tridentata* Hort.), verengertes, ☉. f. Spanien.
conifera N. E., zapfenförmiges, ☉. f. Mesopotamien.
Coulteriana Otth, Coulter's, 4. f. Iberien, Taurien.
crassifolia L., β) *angustifolia* Bartl. (= *Constantia*
 Eckl. Zeyh.).
cretacea Fisch., krideliebendes, 4. f. Sibirien.
cretica L. (= *parviflora* Mch.).
dianthifolia Otth, (= *Cucubalus fruticosus* Pall.), nelken-
 blätteriges, 4. f. Sibirien.
Dilleniana Schott, Dillen's, ☉. f. Frankreich.
dioica Fisch. et Mey. (= ? *cylindriflora* Otth), zwei-
 häusiges, ☉. f. Aleppo.
disticha W. Enum. (= *hispida* Hort., Dsf. = *micropete-*
tala Roem., Schrk. = *pilosa* Hort. = *tricuspidata*
 Hort.), zweizeiliges, ☉. f. ? Nordafrika, Italien.
diurniflora Kunze, (= *noctiflora capensis* Thbg.), tag-
 blumiges, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.
Douglasii Hook., Douglas's, 4. f. Nordamerika.
echinata Otth, igelstacheliges, ☉. f. ?
effusa Otth, (= *wolgensis* Spgl. = *Cucubalus effusus*
 Fisch. = *C. wolgensis* W. Enum. = *S. Olites* P.
 var. Auct.).
Elisabethae Jan, Elisabeth's, 4. f. Oberitalien.
fimbriata Sims, (= *Cucubalus fimbriatus* MB. = *C.*
multifidus Adam., Hoffm.).
flavescens W. K. (= *mollis* Hornem.).
foetida Lk. (= *fuscata* var. Brot.), stinkendes, ☉. f.
 Portugal.
fruticosa L. (= *nitida* Lagasca), β) *suffruticosa* Dsf.,
 γ) *corsica* Hort. Erford.
fuscata Lk., Brot. (= *undulatifolia* Otth, non Moris),
 bräunliches, ☉. f. Portugal.
gallica L., β) *sylvestris* Schott, (= *Cucubalus sylvestris*
 α Lam.), γ) *anglica* L. (= *arvensis* Salisb. = *diffusa*
 Hort., non Otth, = *Cucubalus sylvestris* β Lam.),
 δ) *lusitanica* L. (= *reflexa* Mch. = *sardoa* Moris),
 ε) *hirsuta* Presl.
Gallinyi Heuff., Galliny's, ☉. f. Banat.
glauca Zea, blaugrünes, ☉. f. ?
graminifolia Otth, grasblätteriges, 4. f. Altaische Alpen.
Gypsophila Dsf. (= *ramosissima* P. = *sobolifera* Schott,
 Hortul. = *Cucubalus congestus* W. herb.), gypskraut-
 ähnliches, 4. f. Sibirien.
hirsutissima Otth, (= *hirsuta* Lagasca, = *sabuletorum*
 Lk. = *hispida* Dsf. var. Spach), rauhhaarigstes, ☉. f.
 Spanien, Portugal.
hispida Dsf. (= *hirsuta* Poir. = *trinervia* Sebast.).

Silene

- Hoefftiana Fisch., C. A. Mey., Hoefft's, 4. f. Caucasus.
 holopetala Bunge, Ledeb., ganzkroniges, 4. f. Alt. Sibirien.
 jenisea Steph. (= *baicalensis* Turcz. = *jeniseensis* W.
 Enum. = *viscaginoides* Otth, = *graminifolia* Otth
 var. Auct.), jeniseisches, 4. f. Alt. Sibirien.
 inamoena Lindl., unliebliches, ☉. f. ?
 inflata Sm. (= *S. Cucubalus* Wibel, = *S. oleracea* Fic.
 = *S. vesicaria* Schrad. = *Behen vulgaris* Mch. =
Cucubalus Behen L. = *C. inflatus* Salisb. = *C. veno-*
sus Gilib. = *Lychnis Behen* Scop. = *Viscago Behen*
 Baumg.), β) linearis Sweet, (= *Cucubalus angusti-*
folius Mill., Schrk., Tenore, = *C. angustissimus* Balb.,
 Nocca), γ) Persoonii Schott, (= *Cucubalus alpinus*
 Lam. = *C. Antelopum* Vest, = *C. marginatus* Kit.,
 Schult. = *C. montanus* Vest, = *C. viridis* Lam.),
 δ) glauca Sm. (= *Willdenowii* Swt. = *Cucubalus*
glaucus W.), ε) crassifolia (Thore), (= *Cucubalus*
Thorei Dufour.), ζ) *C. fabaria* (Thore), η) *C. rotun-*
difolia (All.), θ) *campanulata* Saut. (= *Cucubalus lati-*
folius Mill.).
 italica P., DC. (= *clavicarpa* Roch. = *sicula* Presl, =
Cucubalus italicus Jacq. = *C. silenoides* Vill. =
Viscago clavata Mch.).
 juncea Sibth., Sm., simsenförmiges, ☉. f. Kleinasien.
 laciniata Cav. (= *splendens* Hort. = *Lychnis pulchra*
 W. herb.), β) speciosa Hort.
 lanuginosa Bertol. (= *auriculata* Sibth., Sm. var. Rehb.),
 wolliges, 4. f. Italien.
 latifolia Poir., non Hornem. (= *fistulosa* G. Don), breit-
 blätteriges, 4. k. f. b. Barbarei.
 ligulata Vivian., zungenförmiges, 4. f. Nordafrika.
 Ledebourii * (= *petraea* Ledeb., Schrk., non W. K.),
 Ledebour's, 4. f. Sibirien.
 linicola Gmel. (= *eranthema et linaceola* Wib. = *mar-*
ginata Schott).
 livida W. (= *cuprea* Hort. = *lurida* Hort. = *nutans*
 L. var. ζ Otth, = *rubens* Vest), β) pelidna Rehb.
 lychnidea C. A. Mey., lichtnelkenähnliches, 4. f. Caucasus.
 Mandralisii Parlatore, Mandralisi's, ☉. f. Sicilien.
 Marshalli C. A. M. (= *Cucubalus mollissimus* MB., non
 L.), Marshall's, 4. f. Caucasus.
 Menziesii Hook., Menzies's, 4. f. Nordamerika.
 mexicana Moç, Sess., mexicanische's, 4. k. Mexico.
 micrantha Lk. (= *cerastoides* L. var. Spgl. = *micro-*
petala Lagasca, non DC.).
 multicaulis Gussone, vielstengeliches, 4. f. Unteritalien.
 mutabilis L. (= *micropetala* Auct. = *nocturna* β Otth,
 = *reflexa* Ait. = *Cucubalus reflexus* L.), veränder-
 liches, ☉. f. Italien, Spanien.
 neglecta Tenore, (= *nocturna* β Tenor. = *obtusifolia*
 W. var. Spach), übersehenes, ☉. f. Neapel.
 nemoralis W. K. (= *Cucubalus catholicus* Bucher, non
 L. = *C. floccosus* Ficin.).
 noctiflora L. (= *dichotoma* Gilib. = *viscida* Mch. =
Cucubalus noctiflorus Lam. = *Lychnis noctifl.* Schreb.).
 nocturna L. (= *bicolor* Mch. = ? *setacea* Otto, = *spi-*
cata DC. = *Cucubalus spicatus* Lam.).
 Notarisii Cesati, (= *Saxifraga Orsini*), Notaris's, 4. f.
 Oberitalien.

Silene

- nutans L., β) *infracta* W. K. (= *amblevana* Lej. = *Hornemanni* Steud. = *latifolia* Hornem., non Poir.).
odoratissima Bunge, Ledeb., wohlriechendstes, 4. f. Altaiisches Sibirien.
- Otites* P. (= *Cucubalus dioicus* Gilib. = *C. Otites* L. = *C. parviflorus* Lam., non Ehrh.), β) Pseudo-Otites Bess. (= *Lychnis Otites* Scop.).
- pachyphylla* Hort. Berol., dick(stark)blättriges, \odot . f. ?
- paniculata* Otth, rispiges, 4. f. ?
- paradoxa* L. (= *Cucubalus viscosus* Huds.). Italien, England, Frankreich, p. 758
- pensylvanica* Mchx. (= *incarnata* Lodd.).
- picata* P. (= *anastomosans* Lagasca, = *Reinwardtii* Roth, = *reticulata* Hort.), bemaltes, \odot . f. Frankreich, Spanien, Nordafrika.
- pilosa* Spgl. (= *mollissima* DC., non P. = *Cucubalus italicus* var. *pilosus* Hort. Wratisl. = *C. mollissimus* W. Kit. = *C. pilosus* W. Kit. = *Viscago mollissima* Baumg.).
- praecox* Lk., frühes, \odot . f. ?
- pygmaea* Lk., zwergiges, \odot . f. Südeuropa.
- quinquevulnera* L. (= *gallica* var. K. = *Corone quinquevulnera* Hffg. = *Cucubalus variegatus* Lam. = *Lychnis vulnerata* Scopol.).
- regia* Sims, (= *virginica* var. *illinoensis* Mchx.).
- reticulata* Dsf. (= *grata* Donnersm.).
- rubella* L. (= *inaperta* DC. = *Pseudolinum* Ram. = *segetalis* Dufour.), β) *annulata* Thore.
- saponariaefolia* Schott, (= *commutata* Guss. = *Czerei* Baumg. = *Cucubalus saponariaefolius* Bonato), seifenkrautblättriges, 4. f. Italien, Banat, Siebenbürgen.
- scabra* Fisch., non Kit. (= *Fischeri* Steud.), scharfes, 4. f. Sibirien.
- Scouleri* Hook., Scouler's, \odot . f. Nordamerika.
- sericea* All., Moris, (= *diffusa* Otth, = *pubescens* Lois. = *velutina* Pourr., Dsf. = *vespertina* Auct.).
 β) *litorea* Broter.
- sessiliflora* Dsf., Poir., stiellosblumiges, \odot . f. Syrien.
- Sibthorpiana* Rchb. (= *dichotoma* Sibth., Sm., non Ehrh.), Sibthorp's, σ . f. Griechenland.
- sicula* Cyril. (= *divaricata* Clement., non Sibth., Sm.), sicilianisches, \odot . f. Sicilien.
- spathulata* MB. (= *pygmaea* Adam., Hoffm., non Lk.).
- stellata* Ait. (= *Cucubalus stellatus* L. = *Viscago stellata* Rchb.), sternförmiges, 4. f. Virginien, Canada.
- stenopetala* Ledeb., schmalkroniges, \odot . f. Sibirien.
- stylosa* Bunge, Ledeb., langgriffeliges, 4. f. Alt. Sibirien.
- suavis* Schrad., feinriechendes, \odot . f. Südeuropa.
- tatarica* P. (= *viscaginoides* Hornem., non Otth, = *Cucubalus tataricus* L. = *Viscago unilateralis* Mch.), β) *secunda* Steud. (= *Cucubalus secundus* Gilib.).
- taurica* Fisch., taurisches, 4. f. Taurien.
- tenella* C. A. Mey., zierliches, 4. f. Caucasus.
- tricuspidata* Dsf. (= *congesta* Schott), dreispitziges, \odot . f. ?
- turgida* MB. (= *altaica* Otth, = *graminifolia* Bunge, non Otth, = *Cucubalus fruticosus* Gmel. system. = *C. Saxifragus* Schang.), aufgeschwollenes, 4. f. Sibirien.
- undulatifolia* Moris, (= *undulaefolia* Sweet), welligblättriges, \odot . f. Sardinien.

Silene

velutina Pourr. (= *Salzmanni* Otth, = *suffruticosa* Dsf.),
sammthaariges, 4. h. k. f. b. Corsica.

vespertina Retz, (= *bipartita* Dsf. = *colorata* Poir. =
decumbens Bivone, = *distachya* Brotero, = *hispanica*
Jacq. = *tubiflora* Dufour. = *Corone vespertina* Hffg.),
β) *bellidifolia* Jacq., non Thbg.

villosa Cambess. (non Forsk.), zottige, ☉. f. Spanien,
Portugal.

virginica L. (= *Catesbaei* Walt. = *cheiranthoides* Poir.
= *coccinea* Mch. = *pennsylvanica* Mchx.), virginisches,
4. f. Nordamerika.

β) *minor* (= *caroliniana* Walt.).

viscosa P. (= *Cucubalus viscosus* L. = *Lychnis viscosa*
Scop. = *Viscago glutinosa* Baumg. = *V. viscosa* Mch.).

α) *breviflora* Hort. Petrop., β) *longiflora* Hort. Petrop.
Zawadskyi Herlich. (= *lanuginosa* Bertol. var. H. Petr.).

Außerdem erwähnen die Pflanzenverzeichnisse der Gärten etc. noch folgende, deren Vaterland etc. nicht angegeben ist: *cana* Otth, 4., *carnosa* Mch. ☉., *costata* Otth, *discolor* Retz, ♂. (non Sibth, Sm.), *distans* Otth, 4., *filiformis* Otth, *glaberrima* Hort., *gypsophiloides* Schrank., *integrifolia* Hort., *grandiflora fl. pleno* Hort., *montana* Hort., *oblongifolia* Otth, ☉., *pyriformis* Hort. Berol., *quinquenervia* Hort. Berol., *rugosa* P., ?*secundiflora* Otth, (= *glauca* Pourr., Lagasca, non Zea) ☉., *semibarbata* Hort. 4., *serpyllifolia* Hort., *trifida* Tenore, *verticillata* Otth, (= *Cucubalus caespitosus* Dsf., Poir.). 4.

angustifolia Poir., v. *Tunica compressa*, p. 827,
coronaria Clairv., v. *Lychnis coronaria*, p. 482,
porrigens L., *Saponaria* Fr., v. *Saponaria porrigens*
et *officinalis*, p. 721, *Pumilio* Wulf., v. *Hohen-*
warthia Pumilio, p. 303, II.

Siler alpinum Baumg. (= *trilobum* Scop.), v. *Laserpitium aquilegifolium*, p. 343, II., *caucasicum* Spgl., v. *Agasyllis caucasica*, p. 668, *lanceifolium* Mch. (= *montanum* Crtz.), v. *Laserpitium Siler*, p. 446 et p. 343, II., *salsum* Spgl., v. *Peucedanum salsum*, p. 884 et p. 504, II.

Siliquaria glandulosa Forsk., v. *Cleome arabica*, p. 204.

Siliquastrum Adans., Medic., *cordatum* Mch., *orbiculatum* Mch., v. *Cercis canadensis* et *Siliquastrum*, p. 182.

Silphium L., Silphie.

Asteriscus L. (= *reticulatum* Mch.), β) *dentatum* Ell.
(= *scabrum* Walt.).

connatum L. (= *scabrum* Mch.).

gummiferum Ell., gummigebende, 4. f. Nordamerika
(Westl. Georgien).

integrifolium Mchx., ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.

laciniatum L. (= *spicatum* Poir.), β) *dissectum* Poir.

laevigatum Pursh, glatte, 4. f. Nordamerika (Georgia).

lanceolatum Nutt. (= *reniforme* Rafin.), lanzettliche,
4. f. Nordamerika.

perfoliatum L. (= *tetragonum* Mch.), β) *conjunctum* W.,
γ) *erythrocaulon* Beruh., δ) *Hornemanni* Schrad. (=

Asteriscus Hornem. = *connatum* Dsf. Hort. Par.),
ε) *petiolatum* Poir.

pinnatifidum Ell., fiederspaltige, 4. f. Nordam. (Georgia).

Silphium

- pumilum Mchx. (= *patulum* Banks), β) tomentosum Pursh.
 Radula Nutt., raspeblättrige, 4. f. Nordam. (Arkansasgeb.).
 reticulatum Pursh, netzförmige, 4. f. Nordamerika.
 scaberrimum Ell., schärfste, 4. f. Nordamerika.
 speciosum Nutt., prächtige, 4. f. Nordam. (Arkansasgeb.).
 terebinthinaceum L. (= *elatum* Pursh).
 ternatum Retz, (= *ternifolium* Mchx. = *trifoliatum*
 Dsf. Hort. Par., Hook. bot. mag., non L.), β) atropurpureum Retz.
 trichopus Rafin., rauhstielige, 4. f. Nordamerika.
 trifoliatum L. (= *ternatum* Dsf. Hort. Par.).
 Unbestimmtere: latifolium Hill., Vitm., rigidum Mch.,
 vaginatum Hort.
solidaginoides L., v. *Heliopsis laevis*, *Tetragonotheca* G., v. *Tetragonotheca helianthoides*, *trilobatum* L., v. *Wedelia carnosa*.

Silybum Vaill. Sect. II.

- marianum G. (= *maculatum* Mch.), β) pygmaeum Cass.
atriplicifolium Fisch., v. *Rhaponticum atriplicifolium*,
 p. 683, *squarrosum* Tausch, = *Alfredia cernua* s.
Silybum Sect. I. cernuum.

Simaba Aubl. (guianischer Name), (= *Zwingera* Schreb.).

- bicolor Zuccar. (= *Zwingera bicolor* Steud.), zweifarbige,
 h. t. Mexico.
 guianensis Aubl. (= *Quassia crocea* Vahl, = *Q. guianensis* Dietr. = *Zwingera amara* W. = *Z. guianensis* Rausch.).
 orinocensis H. B. K. (= *Quassia orinocensis* Dietr. =
 = *Zwingera orinocensis* Spgl.).

Simocheilus Benth., Genst. p. 885.

- depressus Benth. (= *Blaeria depressa* Lichtenst. = *B. fasciculata* Drege, = *B. glabella* var. *Bartlingiana* Kl. = *Erica embolifera* Salisb. = *E. expromta* Spgl. = *Gypsocallis expromta* G. Don, = *Octogonia glabella* var. Kl.).
 multiflorus Kl. (= *Blaeria aggregata* Wendl. herb. = *Bl. multiflora* Kl. = *Bl. sessiliflora* Wendl.), vielblumiger, 4. f. Cap d. g. Hoffu.
Simsia RBr. (non P. DC.) *anethifolia* RBr., v. *Stirlingia anethifolia*.
Sinapidendron frutescens Lowe, v. *Sinapis frutescens*, p. 760, *S. salicifolium* Lowe, v. *Sinapis angustifolia*.

Sinapis T., L., Senf.

- angustifolia DC. (= *Brassica frutescens* Soland.), schmalblättriger, h. k. Madeira.
 arvensis L. (= *taurica* Fisch. = *torosa* Gilib.), β) retrohirsuta Bess. (= *orientalis* Auct. germ.).
 chinensis L. (= *tenella* Mch.).
 laevigata L. (= *campestris* Jacq. fil. = *cernua* Poir. = *oleracea* Presl, = *virgata* Presl, = *Erucastrum oleraceum* et *virgatum* Presl).
 orientalis L. (= *Sinapistrum arvense* β Spach).
 β) hispida Balb.
alpina Mart. Hort. Erl. = ?, *benghalensis* Roxb., v. *Nasturtium benghalense*, p. 543, *bracteolata* Swt., *mesopotamica* Spgl., *nigra* L., *radicata* Dsf., *Sabularia* Sweet, v. *Brassica bracteolata*, *mesopotamica*, *nigra*, *fruticulosa*, *Sabularia*, p. 130—131 et 77, II.

Sinapis

erucoides L., *muralis* RBr., *tenuifolia* RBr. etc., v. *Diplotaxis erucoides* etc., *ErUCA* Röhl., Clairv. (= *exotica* Hort.), v. *ErUCA sativa*, *glauca* Hort. =?, *hispanica* Lagasca, v. *Diplotaxis catholica*, *incana* L. (= *taurica* MB.), v. *Erucastrum incanum*, p. 312, *nasturtiifolia* Lam., v. *Erucastrum obtusangulum*.

Die übrigen Synonyme vergl. p. 761, sowie überhaupt *Erucastrum*, p. 312, 878 et p. 231, II. — *S. cernua* Thbg. (non Poir.) Japan, China, ist nach Spgl. var. v. *Brassica nigra*, daher p. 760 auszuschliessen und zu berichtigen.

Sinapistrum Medic., Mch., *decandrum* Mch., *giganteum* Mch., *lanatum* Mch., *pentaphyllum* Medic., *violaceum* Mch., *viscosum* Mch., v. *Cleome dodecandra*, *gigantea*, *arabica*, *pentaphylla* etc., p. 204. *Sinapistrum* Spach, *arvense* Spach et var. v. *Sinapis Allionii*, *arvensis*, Kaber, *orientalis*, *turgida*.

Sinningia N. E., Lindl., *guttata* Lindl. etc. (Sinning, Inspector am botan. Garten in Bonn), v. *Gloxinia*, Sect. II. p. 359 et p. 266, II.

calycina Hort., v. *Conradia calycina*, p. 157, II., *Hartwegii* Hort. angl. et belg., v. *Drymonia punctata*, p. 212, II.

Sipanea carnea Hort. belg., v. *Pentas carnea*, p. 497, II.

Siphocampylus Pohl, A. DC., G. Don, *barbatus* G. Don, *betulaefolius* Hook., G. Don etc., v. *Lobelia*, Sect. XI. p. 473 et p. 368, II.

Siphonanthus hastata Hort. belg., *indica* L. (= *angustifolia* W.), v. *Clerodendron hastatum* et *Siphonanthus*, p. 205.

Siphonia Rich., Kautschuckbaum.

brasiliensis H. B. K., brasilianischer, f. w. Brasilien. *elastica* P. (= *Cahuchu* Rich. = *guianensis* Juss. = *Hevea guinaensis* Aubl. = *Jatropha elastica* L. fil.).

Sirium myrtifolium L., v. *Santalum myrtifol.*, p. 720.

Sison L. K., Süfsdolde.

Amomum L. (= *heterophyllum* Mch. = *Cicuta Amomum* Crtz. = *Seseli Amomum* Scopol. = *Sium Amomum* Roth, = *S. aromaticum* Lam.).

Ammi L. spec. (= *capillaceus* Spgl. = *fasciculatus* Pohl, = *Haenkei* Presl), *inundatus* L., v. *Helosciadium leptophyllum* et *inundatum*, p. 389 et p. 294, II., *Ammi* L., *Ammi* Ucria, v. *Ptychotis heterophylla* et *verticillata*, p. 666 et 572, II., *canadense* L., *Thomasii* Tenore, v. *Cryptotaenia canadensis* et *Thomasii*, p. 174, II., *flexuosus* Tenore, (= *carvifolius* Bertol. = *prolifer* Brochi), v. *Bunium carvifolium*, p. 82, II., *Gussonianus* Balb. (= *Gussonii* Spgl.), v. *Petagnia saniculaefolia*, p. 502, II., *integerrimus* Spgl. et *aureus* Spgl. et *trifoliat.* Mchx., v. *Zizia integerrima*, *aurea*, *cordata*, *marginatus* Mchx., v. *Archemora rigida*, p. 42, II., *peregrinus* Spgl., v. *Petroselinum peregrinum*, p. 503, II., *pusillus* Mchx. (= *divaricatus* Spgl.), v. *Leptocaulis divaricatus*, p. 351, II., *rotundifolius* Spgl., v. *Pimpinella rotundifolia*, p. 624, *salsus* L. fil., v. *Peucedanum salsum*, p. 504, II.

Die übrigen Synonyme vergl. p. 761.

Sisymbrella aspera Spach, v. *Sisymbrium asperum*,
p. 761, *sylvestris* Spach, v. *Nasturtium sylvestre*,
p. 543.

Sisymbrium T., L., Rauke.

I. Genuinum.

acutangulum DC. (= *austriacum* Jacq. β K. = *contortum*
Cav. = *pyrenaicum* Vill., non L. = *sinapioides* RBr.
= *Erysimum pyrenaicum* Vill. = *Sinapis pyrenaica* L.).
austriacum Jacq. (= *affine* W. = *compressum* Mch.),
 β) *taraxacifolium* DC. (= *contortum* W. Enum., DC.
= *multisiliquosum* Hoffm.), γ) *eckartsbergense* W., δ)
Tillieri Bell. (= *erysimifolium* Pourr.).

binerve C. A. Mey., zweinervige, ♂. f. Caucasus.

brachypetalum C. A. Mey. (= *septulatum* Hortul.), kurz-
kronige, ☉. f. Soongaria.

brassicaeforme C. A. Mey., Ledeb., kohlförmige, ♂. f.
Altaiisches Sibirien.

canescens Nutt. (= *brachycarpum* Richards. = *myrio-
phyllum* W. herb. = *Sophia* Pursh, non L.).

cinereum Dsf., aschfarbige, ☉. f. Nordafrika.

decepiens Bunge Hort. Dorp., täuschende, ♂. f. Samarkand.

halophilum C. A. Mey., salzliebende, 4. f. Alt. Sibirien.

heteromallum C. A. Mey., verschiedenwendige, ☉. ♂. f.
Altaiisches Sibirien.

incanum Bernh. (= *canescens* Hook., non Nutt. =
Richardsoni Sweet).

junceum MB. (= *strictissimum* Pall., non L. = *Brassica
polymorpha* Murray, = *Cheiranthus junceus* W. K. =
C. virgatus Patr. herb. = *Erysimum junceum* W.).

mollissimum C. A. Mey., weichste, ♂. 4 f. Alt. Sibirien.

nanum DC. (= *Cheiranthus nanus* Pall. = *Matthiola*

nana Sggl.), zwergige, ☉. f. Sibirien.

β) *humile* C. A. Mey.

perfoliatum C. A. Mey., durchwachsene, ☉. ♂. f. Caucasus.

pumilum Steph. (= *Schimperi* Gay, non Boiss.). Auch
in Arabien heimisch.

ramulosum Nectoux, Delil., ästige, ☉. f. Aegypten.

strictissimum L. (= *Cheirinia strictissima* Lk.), 4. nicht
☉. daher p. 762 zu berichtigen.

trinerve C. A. Mey., dreinervige, ? ☉. f. Caucasus.

II. Arabidopsis DC., K.

Cuningianum Fisch. et Mey. (= *chilense* Lk.).

Thalianum Gay et Monnard, (= *Arabis muralis* Salisb.
= *A. ramosa* Lam. = *A. scabra* Gilib. = *Conringia
Thaliana* Rchb. = *Nasturtium Thalianum* Andrzy.).

III. *Huegenia* Rchb. v. p. 307, II.

IV. *Pachypodium* Webb et Berth. (non Lindl. p. 469).

Columnae L. (= *Erysimastrum* β Lam. = *orientale* L.
= *villosum* Mch. = *Walteri* Crantz).

erysimoides Dsf. (= *nitidum* Zea, = *rigidulum* Lagasca,
= *Zae* Sggl.).

pannonicum Jacq., Ait. (= *altissimum* Pall. = *Sinapeos*
Retz, = *Sinapistrum* Crantz? = *tenuifolium* Geners.).

V. *Kibera* DC.

corniculatum Cav., *hirsutum* Lagasca, *polyceratium* L.
(= *Chamaepium polyceratium* Wallr. = *Erysimum
polyceratium* Lk. = *Klukia polyceratia* Andrzy.).

rigidum MB. (= *hispidum* W. hrb. = *cornutum* et
polyceratium Pall. = *Hesperis rigida* Stev. = *Klu-
kia rigida* Andrzy.).

Sisymbrium

runcinatum Lagasca, supinum L. (= *Arabis supina* Lam. = *Braya supina* K. = *Chamaeplium supinum* Wallr. = *Erysimum supinum* Lk. = *Klukia supina* Andrzy.). villosum Lagasca, (= *hirsutum* DC., non Lagasca), zottige, ☉. f. Spanien.

VI. Descurainia Webb.

Irio L. (= *erucaefolium* Gilib. = *erysimastrum* α Lam. = *glabrum* W. = *pinnatifidum* Forsk., non DC.). pinnatifidum DC. (= *bursifolium* Gouan, Vill. = *dentatum* All. = *Arabis dentata* Clairv. = *A. pinnatifida* Lam. = *Braya pinnatifida* K. = *Cardamine runcinata* Poir.).

VII. Velarum DC., Rchb.

officinale Scop. (= *S. officinarum* *Erysimum* Crtz. = *Chamaeplium officinale* Wallr. = *Erysimum officinale* L. = *E. runcinatum* Gilib. = *Klukia officinalis* Andr.).

Unbestimmtere: brachylobum Otto, (= *asperum* Hort., non L.), patens Mch. (= ? *Brassica patens* Murray). album Pall., v. *Hutchinsia alba*, p. 307, II., *Alliaria* Scopol., v. *Alliaria officinalis*, p. 29, *arenosum* L., *coeruleum* Gilib., v. *Arabis arenosa*, *coerulea*, p. 70, *Barbarea* Crantz etc., v. *Barbarea vulgaris* etc., p. 112, *clandestinum* Hort., *coronopifolium* Dsf., *palustre* Leyss., Roth (= *terrestre* Wither.), *dubium* P. (= *apetalum* Dsf. = *Sinapis* Burm.), *anceps* Wahlbg. etc., v. *Nasturtium clandestinum*, *coronopifolium*, *palustre*, *indicum*, *anceps* etc., p. 543 et p. 430, II., *filifolium* W., v. *Leptaleum filifolium*, p. 455, *gallicum* W., v. *Erucastrum Pollichii*, p. 312 et 231, II., *polystachyum* Hort. Berol., v. *Halimolobus patula*, p. 283, II., *repandum* W., v. *Brassica repanda*, p. 131, *repandum* Poir. (= *monense* L. = *murale* MB. *saxatile* Lam., P. = *vimineum* MB.) etc., v. *Diplo-taxis saxatilis* etc., *subbipinnatifidum* Hornem., v. *Sinapis subbipinnatifida*, p. 761.

Die übrigen nöthigen Synonyme s. p. 762.

Sisyrinchium L. (= *Bermudiana* Adans. Medic. G.), Schweinsrüssel.

anceps Lam. (= *angustifolium* Mill. = *Bermudiana* α L. = *gramineum* Curt. = *Bermudiana graminifolia* Medic. = *Marica anceps* Ker).

arenarium Poepp. (= *flexuosum* Lindl. non Spgl.), Sandliebender, 4. k. Chili.

ascendens Poepp. (= ? *graminifolium* β *pumilum* Lindl.), aufsteigender, 4. k. Chili.

Bermudiana L. (= *iridioides* Curt. = *Bermudiana graminea* G. = *B. iridifolia* Medic. = *Marica Bermudiana* Ker, = *Moraea Bermudiana* Thb. = *Sy-rhynchium Bermudiana* Hffg.).

convolutum Nocca, (= *flavum* Hffg. = *luteum* Fisch. = *triquetrum* Hort. angl. = *Marica convoluta* Ker).

gladiatum Spgl. (= *Ixia gladiata* L. fil. = *Marica gladiata* Ker, = *Moraea gladiata* Thbg. = *Bobartia gladiata* Sweet).

grandiflorum Cav., non Dougl. (= *Moraea grandiflora* P.), großblumiger, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

iridifolium H. B. K. (= *laxum* Lk. = *pubescens* Cham. = *Marica iridifolia* Ker).

Sisyrinchium

latifolium Ait. (= *bulbosum* Mill. = *capitatum* P. = *palmifolium* Cav. = *plicatum* Spgl. = *Galathea vespertina* Salisb. = *Marica plicata* Ker, = *Moraea palmifolia* Jacq. = *M. plicata* Sw.), breitblättriger, 4. Kn. w. Caribäen.

lutescens Lodd., gelblicher, 4. k. Chili.

macrocephalum Grah., großköpfiger, 4. k. t. Buenos Ayres. majale Lk., Kl., Otto, Mai-S., 4. k. Valparaiso.

pedunculatum Gill. et Hook. (= ? *flavum* Miers).

striatum Sm. (= *reticulatum* Hort. = *sertiflorum* Salisb.

= *spicatum* Cavan. = *Bermudiana striata* Mch. = *Marica striata* Curt. = *Moraea serrata* Jacq.).

aurantiacum Zuccag., *spathaceum* P., v. *Moraea aurantiaca* et *spathacea*, p. 418—419, II., *ixioides* Forst., *paniculatum* RBr., *pulchellum* RBr., v. *Libertia ixioides*, *paniculata*, *pulchella*, p. 461, *melaleucum* Eckl., v. *Aristea melaleuca*, p. 77.

Sitobolium Desv., Körnerfarn, XXIV. 1., Pteroideae (Polypodiaceae).

punctilobum Desv. (= *Alectum pilosiusculum* Lk. = *Aspidium punctilobum* Mchx. = *Dicksonia pilosiuscula* W. = *D. pubescens* Schk.), punktlappiger, 4.

f. b. Nordamerika, (Pensylv., Virgin.).

Sitodium cauliflorum G., v. *Artocarpus integrifolia*, p. 85.

Sium T., L., Merk.

I. Berula K.

angustifolium L. (= *S. Berula* Gouan, = *erectum* Huds.

= *incisum* P. = *nodiflorum* Flor. dan., non L. = *Apium Sium* Crantz).

II. Eusium (genuinum).

cicutae-folium Gmel. (= *lancifolium* β Ledeb.), wasserschierlingblättriger, 4. f. Sibirien.¹⁾

cyminosma Hort. Petr., gewürzhafter, 4. f. ? Asiat. Rufsland. Douglasii DC., Douglas's, 4. f. Nordamerika.

lancifolium MB. (= *latifolium ucranicum* Fisch.).

latifolium L. (= *lancifolium* Schrk., non MB. = *sulcatum* P. = *Coriandrum latifolium* Crtz. = *Drepanophyllum palustre* Hoffm.), β) *longifolium* Presl.

III. Sisarum.

Sisarum L. (= *brevifolium* Hort. = *podolicum* Hort.).

 β) Ninsi Thbg.

Anomum Roth, (= *aromaticum* Lam.), v. *Sison Anomum*, p. 761, *annuum* Roth, (= *tortuosum* Roth), v. *Seseli annuum*, p. 749, *Apium* Lam.

(= *graveolens* Vest), v. *Apium graveolens*, p. 68, *Bulbocastanum* Spgl., *Carvi* Bernh., *verticillatum*

Lam., v. *Carum Bulbocastanum*, *Carvi* et *verticillatum*, p. 167 et 168, *bulbosum* Thore, non Poir.

(= *intermedium* DC.), *crassipes* Spgl. (= *limosum* Moris), *inundatum* Roth, *nodiflorum* L., *repens* L.,

v. *Helosciadium bulbosum*, *crassipes*, *inundatum*, *nodiflorum*, *repens*, p. 389 et 294, II., *canadense* Lam., v. *Cryptotaenia canadensis*, p. 174, II., *ferulaefolium* Spgl., *peucedanoides* Spgl., *virescens* Spgl.,

v. *Bunium ferulaefolium*, *peucedanoides* et *virescens*, p. 82, II., *graecum* L. non Guss. (= *siculum* L.),

1) Vergl. *Falcaria dahurica*, p. 242, II.

Sium

v. *Kundmannia sicula*, p. 337, II., *lobatum* Moon, v. *Heracleum nepalense*, *nudicaule* Lam., v. *Peucedanum salsum*, p. 504, II., *rigidius* L. et *tricuspidatum* Ell., v. *Archemora rigida* et *tricuspidata*, p. 42, II., *segetum* Lam., v. *Petroselinum segetum*, p. 610, *virens* Hort., v. *Cnidium venosum*, p. 208.

Hiernach p. 763 (wo auch die übrigen Synonyme zu vergleichen sind), zu ergänzen und zu berichtigen.

Skinnera Forst., *coccinea* Mch. et *excorticata* Forst., v. *Fuchsia coccinea* et *excorticata*.

Skyllanthus Endl., Deltakrönchen, V. II., Asclepiadeae. *sibiricus* Endl. (= *Asclepias sibirica* Murray, = *Cynanchum sibiricum* RBr.), sibirisches, 4. f. Sibirien.

Slateria japonica Desv., v. *Ophiopogon japonicus*, p. 562.

Slevogtia Rehb., *orientalis* Griseb. et *occidentalis* Griseb., v. *Hippion hyssopifol.* et *verticillatum*, p. 401.

Sloanea Plum., *Sloanea*.

alnifolia Mart., erlenblättrige, ♀. w. Brasilien.

dentata L. (= *grandiflora* Sm. = *Plumierii* Aubl. = *Castanea Sloanea* Mill.).

Massoni Sw. (= ? *dentata* L., Spgl.), Masson's, ♀. w. Caribäen.

Smegmadermos emarginata R. et P. (= *Smegmaria emarginata* W.), v. *Quillaja Smegmadermos*, p. 582, II. *Smelowskia* C. A. Mey., *alpina* C. A. Mey., *brevicaulis* Steud., *cinerea* C. A. Mey., v. *Hutchinsia alpina*, *brevicaulis*, *alba*, p. 406 et p. 307, II., *integrifolia* C. A. Mey., v. *Eutrema integrifol.* Nachl.

Smilacina Dsf., Maienblümlein.

I. *Genuina*.

borealis Sims, (= *Convallaria borealis* Poir. = *Clintonia ciliata* Rafin. = *Dracaena borealis* Ait.).

flexicaulis Wender., hin- und hergebogenes, 4. f. ?

racemosa Dsf. (= *Convallaria racemosa* L. = *Majanthemum racemosum* Lk.).

stellata Dsf. (= *Convallaria hybrida* March. = *C. stellata* L. = *Majanthemum stellatum* Lk.).

umbellata Dsf. (= *borealis* a Ker, = *Clintonia ciliata* β) Rafin. = *Convallaria umbellata* Poir. = *C. umbellulata* Mchx. = *Majanthemum umbellatum* Lk.).

II. *Majanthemum* Wigg., Mch. (= *Evallaria* Neck. = *Styrandra* Rafin.).

bifolia Dsf. (= *cordifolia* Beck. = *Convallaria bifolia* L. = *C. quadrifida* Lam. = *M. bifolium* Lam. et DC. = *M. Convallaria* Roth, = *M. cordifolium* Mch. = *Sciophila convallarioides* Wibel, = *Unifolium quadrifidum* All.).

canadensis Pursh, (= *bifolia* Dsf. var. Spgl. = *Convallaria canadensis* Poir. = *Majanthemum canadense* Lk.).

Smilax T., Stechwinde.

Houstoniana Steud. (= *spinosa* Mill., non Poir.), Houston's, ♀. Sch. k. t. Vera Cruz.

laurifolia L. (= *cuspidata* Poir.).

medica Chamiss., Schltld., medicinische, ♀. Sch. k. Mexico. (Ob kultivirt?) ¹)

Milleri Steud. (= *aristolochiaefolia* Mill., non W.).

1) Ist die zuerst in Europa angewendete Sarsaparille.

Smilax

officinalis H. B. K., gebräuchliche, ♂. Sch. t. Neugranada.
(Kaum kultivirt.)

Pseudochina L. (= *canellaefolia* Mill.).

β) *hederaefolia* Mill.

Pseudosarsa Visian. (= *Sarsaparilla* Hort. = ? *bermudensis* Duhan.), unächte, ♂. Sch. k. ?

pubera Mchx. (= *pubens* W. Enum. = *pumila* Walt.).

quadrangularis W. (= *virginiana* Mill.).

Sarsaparilla L. (= ? *glauca* Walt., Mchx.).

spinosa Poir., dornige, ♂. Sch. w. Ostindien.

β) *ovata* Jaum. St. Hil., Duhan.

Smithia Ait., *conferta* Sm. (= *capitata* Desv.), geminiflora Roth, (= *sensitiva* β W. A.), p. 765.

Smyrnum T., L., Myrrendolde.

apiifolium W. (= *creticum* Mill. = ? *Anosmia Jdaea* Bernh.).

Matthioli Presl, (= *rotundifolium* Mill.), Matthioli's, 4. f. b. Sicilien, Creta.

perfoliatum Mill. (= *Dioscoridis* Spgl.), β) *Kitaibelii* DC. (= *perfoliatum* W. K.).

rotundifolium Mill. (= *aegyptiacum* L. = *Dodonaei* Spgl. = *perfoliatum* L. a Lam. = *ramosum* d'Urv.), rundblättrige, ♂. f. Spanien, Italien, Griechenland.

atropurpureum Lam., *barbinode* Mühlbg., v. *Thapsium atropurpureum* et *barbinode*, *cicutarium* MB., *nudicaule* MB., v. *Physospermum cicutarium* et *nudicaule*, p. 522, II., *cordatum* Walt., *trifoliatum* Mühlbg., *aureum* L., *integerrimum* L., v. *Zizia cordata*, *aurea*, *integerrima*, *heterophyllum* Mch., v. *Sison Anomum*, *nodiflorum* All., v. *Trochiscanthes nodiflorus*, p. 825.

Sobralia R. et P., Sobralie, XX. I., Orchideae.

biflora R. et P., zweiblunige, 4. w. Peru.

decora ? Lindl., zierende, 4. w. Südamerika.

dichotoma R. et P., zweizinkige, 4. w. Peru.

Elisabethae Schomb., Elisabeth's, 4. w. Guiana.

fimbriata Poepp., Endl., gewimperte, 4. w. Peru.

Galeottiana v. Houtte, Galeotti's, 4. w. Südamerika.

Liliastrum Lindl. (= *Epidendrum Liliastrum* Salzm.), Lilienähnliche, 4. w. Brasilien.

macrantha ? Lindl., großblumige, 4. w. Südamerika.

sessilis ? Lindl., sitzende, 4. w. Südamerika.

rosea Poepp., Endl., *setigera* Poepp., Endl., beide in Peru heimisch, scheinen nicht kultiv. zu werden.

bletioides Hort. belg., v. *Bletia hyacinthina*, p. 125,

citrina LaLlave, v. *Cattleya citrina*, p. 173.

Sogalgina Cass., *balbisioides* Cass. (= *Ptilostephium balbisioides* Spgl.), *dentata* Lilja, *trilobata* Cass., v. *Galinsoga balbisioides*, *dentata* et *trilobata*.

Soja *hispida* Mch. (= *javanica* Savi, = *Dolichos Soja* L.).

Solanandra cordifolia P., v. *Galax aphylla*.

Solandra Sw., Solandra.

nitida Zuccagn. (= *Datura sarmentosa* β Lam. = *Portlandia grandiflora* Hort.).

scandens W. (H. B.), klimmende, ♂. Sch. w. Südamer. (Scheint bis jetzt nicht kultivirt zu werden.)

Solandra capensis L., v. *Hydrocotyle Solandra*, p. 309, II., *Solandra* Murr., Poir., *aculeata* Poir. (= *spinosa* Poir.), v. *Abelmoschus ficulneus*, p. 1, II., *lobata* Murr., v. *Lagunaea lobata*, p. 443, *squamea* Poir., v. *Lagunaria Patersonii*, p. 341, II.

Solanoides Mch., *laevis* Mch., *pubescens* Mch., *undulata* Mch., v. *Rivinia laevis*, *humilis*, brasil.

Solanum T., Nachtschatten.

- adoense* Hochst., adoaischer, ☉. m. f. Abyssinien.
aggregatum Jacq. (= *guineense* L. spec. ed. 2. = *sempervirens* L. spec. ed. 1. = *Atropa solanacea* L. mant. = *Saracha solanacea* P.).
ambiguum Dunal, zweifelhafter, ☿. Sch. w. Martinique.
amblophyllum Hook., vollblättriger, ☿. k. Lima.
Angurium Dunal, (= *angustifolium* Mill.), Angurien-N., ☿. t. k. Vera Crux.
aquaticum Dsf. Hort. Par., Dum.Cours., wasserliebender, ☿. w. ?
arabicum Dunal, (= *armatum* Forsk.), arabischer, ☉. f. Arab.
atriplicifolium Gill. (non Desport.), meldenblättriger, ☉. f. Chili.
atropurpureum Schrk. (= *atrosanguineum* Hort.), schwarzpurpurfarbiger, ♀. ☿. w. Brasilien.
atrovirens Dunal, schwarzgrüner, ☿. w. Westindien.
auriculatum Ait. (= *mauritianum* Scopol.).
axilliflorum Dunal, (= *scandens* Mill.), achselblumiger, ☿. Sch. t. k. Vera Crux.
bahamense L. (= *fruticosum* Mill.).
Balbisi Dunal, (= *brancaefolium* Jacq. fil. = *decurrens* Balb. = *formosum* Weinm. = *inflatum* Hornem. = *mauritianum* W. hort. = *sisymbriifolium* Lam. = *Thouini* Gmel. Hort. Carlsr. = *viscidum* Schweig. = *viscosum* DC.).
Berteri Dsf. Hort. Par., Bertero's, ☉. f. Chili.
bonariense L. (= *arborescens* Mch. = *baccatum* Hort. = *grandiflorum* Hort.), β) *guaraniticum* St. Hil.
candidum Lindl., reinweißser, ☿. ☿. k. Mexico.
capense L. (= ? *humile* Lam., non Bernh. = *Milleri* Jacq.), capischer, ☿. k. Cap d. g. Hoffn.
capsicastrum Lk., Dsf., beifsbeerenähnlicher, ♂. k. ?
chinense Dunal, chinesischer, ☉. ☿. f. k. China.
ciliatum Lam. (= *capsicoides* Hort. Par. = *ciliare* W. = *sinuatifolium* Arrab. = *pentapetaloides* Hort.), gefranzter, ☉. ♀. m. f. w. Brasilien.
concavum Lindl., ausgehöhlter, ☿. Sch. k. Chili.
corymbosum Jacq. (= *corymbiferum* Gmel. system. = *cymosum* R. et P. = *parviflorum* Nocca).
cuneifolium Dunal, (= *croceum* Dunal, = *dubium* Dunal, = *jamaicense* Mill.).
cyanocarpum Blume, kornblumenblaufrüchtiger, ☉. w. m. f. Java.
Donianum Walp. (= *bahamense* Mill., nec L.), Don's, ☿. ☿. k. Bahamische Inseln.
Dulcamara L. (= *scandens* Lam., non Alior. = *Dulcamara flexuosa* Mch. = *Lycopersicum Dulcamara* Medic.), β) *rupestre* Schm., γ) *litorale* Raab, Lk.
elaeagnifolium Cav. (= *dealbatum* Lindl. = *leprosum* Ortega, = *saponaceum* Hook.).
elegans Dunal, zierlicher, ☿. k. t. Neuholland.
ericalyx Dunal, (= *racemosum* Mill.), wollkelchiger, ☿. t. Carthagera.
esculentum Dun., β) *Melongena incurvata* Mill.
ferox L. (= *hirsutum* Roxb. = *involutum* Blume, = *lasiocarpum* Dunal, = *mamosum* Lour. = *quadri-loculare* Sogl.).

Solanum

- fistulosum Rich., Dun., röhriger, ☉. f. Ostindien, Mascarenas.
 α) baccis nigris (= *nigrum* Wall. ex parte, = *Rhinocerotis* Blume), β) baccis rubris (= *erythraeum* Dun. = *rubrum* Murr., Gmel. syst.).
- flavum Kit. (= *Kitaibelii* Schult., Hort. = *ochroleucum* Bast., Dun.).
- geminifolium Cham., Schldl., paarblättriger, ☿. k. Mexico.
- giganteum Jacq. (= *niveum* Thbg., Vahl, = *papilionaceum* Hort.).
- Gilo Raddi, Gilo-N., ☉. m. f. Brasilien.
- glaberrimum Dunal, kahlster, 4. f. Insel Timor.
- glaucescens Zuccar., blaugrünlicher, ☿. k. Mexico.
- glaucophyllum Dsf., blaugrünblättriger, ☿. t. ?
- graciliflorum Dunal, schlankblumiger, ☿. w. Java.
- grandiflorum R. et P., großblumiger, ☿. t. k. Peru.
- Gula Hamilt. (= *diffusum* Roxb. = *ferox* Burm., non L.), Gula-N., ☉. w. m. f. Ostindien.
- heterophyllum Lam. (= *acanthifolium* Hort.), verschiedenblättriger, ☿. w. Guiana.
- hirsutum P., Dun. (= *aegyptiacum* Lam. = *memphiticum* Gmel. syst. = *nigrum* β *hirsutum* Vahl, = *villosum* Lam. var. Sogl.), rauhhaariger, ☉. f. Aegypten.
- hispidum P. (= *stellatum* R. et P., non Jacq.), steifhaariger, ☿. t. k. Peru.
- Houstoni Dunal, (= *quercifolium* Mill.), Houston's, ☿. ☿. t. k. Vera Cruz.
- humile Bernh. (= *nigrum* L. var. Sogl. = *viridescens* Hort.).
- Jacquini W. (= *diffusum* Roxb. = *virginianum* Jacq. = *xanthocarpum* Schrad. et Wendl.).
- Jamesii Torrey, James's, ☉. f. Nordamerika (Arkansageb.)
- jasminoides Paxt. (= *jasminiflorum* Hort. Cels.), jasminblumiger, ☿. t. ? Südamerika.
- incanum L., Dun. (= *argyranthum* Dum. Cours. = *marginatum* β *argyranthum* P. = *S. Melongena* L. var. N. E. = *zeylanicum* Lam.).
- indicum L. (= *canescens* Blume).
- laetum Kunze, freudiggrüner, ☿. k. ?
- lanatum Dunal, (= *aspero-lanatum* R. et P. = *asperum* P.), wolliger, ☿. ☿. k. t. Peru.
- Linkii G. Don, non R. et S. (= *oliganthum* Lk. Enum. nec Dunal, = *laurifolium* Hort. = *rariflorum* Steud.), Link's, ☿. w. ?
- lividum Lk. in W. herb. (= *recurvum* Hffg.).
- Maccai Rich., Dunal, Maccai-N., ☿. w. Cayenne.
- macrantherum Moç., Sess. (= *dulcamarioides* Poir. = *macranthemum* R. et S.), großbeuteliger, ☿. Sch. k. t. Mexico.
- macranthum Dunal, (= *marroniense* Hort.), großkroniger, ☿. ☿. w. Brasilien.
- Maglia Molina, (= *tuberosum* Poepp., non L.), Maglia-N., 4. Kn. k. Chili.
- marginatum L. (= *abyssinicum* Jacq. = *argyranthum* Auct. = *niveum* All.).
- Martusianum Steud. (= *molle* Schrk., non H. B.), Martius's, 4. w. Brasilien.
- microspermum Dunal, kleinsamiger, ☉. f. ?
- Milleri Jacq. (= *subbiflorum* Ortega, = *trilobatum* Mill.).
- miniatum Bernh. (= *puniceum* Gmel. = *rubrum* Lumnitz. = *incertum* Dun. var. β. N. E.), var. melanocerasum (non W.).

Solanum

- monodynamum* Visian., monodynamischer, ⚥. ⚥. k. t. Mexico.
nigrum L. (= *vulgatum* W.), β) *atriplicifolium* Desp.
nodiflorum Jacq. (= *strictum* Zuccag.). ☉. nicht ⚥.
oliganthum H. B. K., Dun. (non Lk.), wenigblumiger,
 ⚥. ⚥. w. Südamerika.
oporinum W. Enum. (= *cymosum* Ortega, = *grandi-*
florum Dsf. = *macrophyllum* Dun., DC. Hort. monsp.).
oxycarpum Schiede, Schtdl., spitzfrüchtiger, 4. w. Mexico.
persicum W. (= *assimile* Frivalds. = *Dulcamara* L. var.
 Bess.), persischer, 4. ⚥. Sch. f. Persien, Rumelien,
 Sibirien.
pinnatum Cav., gefiederter, ☉. f. Chili.
pteroaulon Dunal, (= *alatum* Mch. = *judaicum* Bess.
 = *melanocerasum* W. = *nigrum* ε *virginicum* L. =
scabrum Mill. = *virginicum* P.).
pubigerum Dunal, (= *Cervantesii* Lagasca, = *micro-*
carpum Brouss., Cerv.).
pulchrum Dunal, schöner, ⚥. w. Brasilien.
quitense H. B. K. (= *angulatum* R. et P. = *quitoense*
 Lam.), quitoscher, ♂. ⚥. w. Quito.
Radula Vahl, (= *asperum* Rich. = *salvifolium* Lam.),
 raspelblättriger, ⚥. w. Südamerika.
reclinatum L'Her., non Hort. (= *laciniatum* Dun., non
 Ait.), zurückgebeugter, 4. ⚥. k. k. Peru.
Richardi Dunal, Richard's, ⚥. w. Martinique.
Rossii Knowl. et Westc., Rossi's, ⚥. ⚥. k. Mexico.
rubiginosum Vahl, (= ? *ochroneurum* Lk.), γ) *cocci-*
neum Hort.
rubrum Mill. (= *oleraceum* Rich. var. *baccis rubris*),
 Ostindien, Californien.
sanctum L. (= *coagulans* Hochst. et Steud., non Forsk.
 = *coccineum* Hort. Par. = *incanum* Forsk.).
sandvicense Hook., Sandwich's-N., ⚥. k. t. Sandwichsinsel.
saponaceum Dunal, (= *scabrum* R. et P. = ? *torvum* Sw.).
Schiruschuna Mill., malabarischer, ☉. w. m. f. Malabar.
Schrankii Steud. (= *uncinatum* Schrk.), Schrank's, ⚥.
 w. Brasilien.
serpentinum Dsf. (= *Melongena* L. var. ? Dsf.), schlan-
 genförmiger, ☉. m. f. ?
speciosum Dunal, prächtiger, ⚥. ⚥. w. Caribäen.
stoloniferum Schtdl., sprossender, 4. k. Mexico.
subarmatum W. Enum. (= *bahamense* Hort. = *igneum*
 L. var.).
subinerme Jacq. (= *laurifolium* Mill. non L. fil.).
subviscidum Schrk., wenigschmieriger, ⚥. w. Brasilien.
Swartzianum R. et S. (= *aureum* Sw., non H. B. K.
 = *lepidotum* Dun.), Swartz's, ⚥. w. Brasilien.
tectum P. (= *sinuatum* W. = *villosum* Dietr.).
torvum Sw. (= *acanthifolium* Dsf. Hort. Par. = *fici-*
folium Ortega, = *indicum* L. spec. = *stramonifolium*
 Lam., non Jacq.).
tricolor Moç., Sess., dreifarbiger, 4. k. t. Mexico.
tuberosum L. (= *esculentum* Neck. = *Parmentieri* Mo-
 lina, = *Lycopersicum tuberosum* Mill.).
Tweedianum Hook., Tweedi's, 4. k. t. Bonaria.
umbellatum Mill., doldiger, ⚥. w. Südamerika.
unguens Weinm., klauentragender, 4. w. Brasilien.
uniflorum Dun. (= *dichotomum* Rich. = *Melongena* L.
 var. Spgl.).

Solanum

Vellozianum Dun. (= Wellosianum Hort.), Vellozo's, ⚭. ⚭. w. Brasilien.

Verae crucis Steud. (= carolinianum Mill., non L.), veracruzischer, ⚭. ⚭. k. t. Vera Cruz.

verbascifolium L. (= adulterinum Hamilt. herb. = ? bahamense Mill. = bicolor W. msp. = erianthum Don, = pubescens Roxb.).

verrucosum Schldl., warziger, 4. Kn. k. Mexico.

villosum Lam., Mch. (= aegyptiacum Forsk. = luteum Gmel. Flor. Bad, = moschatum P. = nigrum γ W.).

violaceum Jacq. fil., Ortega, (= cuneatum Mch.), violetter, ⚭. t. w. Ostindien, China, Neuholland.

virgatum Lam. (= elongatum Hort.).

viscosum Mch., schmieriger, ☉. ⚭. m. f. k. ?

Zuccagnianum Dun. (= obtusifolium W. herb. = scabrum Zuccagn. = Willdenowii R. et S.).

Unbestimmtere: aethioides Cav., Hort., africanum Dunal, aguarquia Brot. Brasil., americanum Mill. ☉. Virgin., dictyoticum R. et S. (= reticulatum W. mspt.), impediens Weinm. (= ? Jussieui Dun.), lusitanicum Dun., memphiticum Mart. Hort. Erl. ☉., Mönchii Dunal, (= stellatum Mch.), rigidum Lam. ⚭., sinuatum Ait. ⚭., somniculosum Hort., sulcatum Räusch., Vaillantii Dun., Wildianum Wender. etc.

africanum Mill., non Dun. (= crassifolium Lam.), montanum L., phyllanthum Cavan., pinnatifidum R. et P. (= multifidum Poir., non R. et P.), v. Witheringia crassifolia, montana etc., p. 857, Aquartia Dunal, microphyllum Spgl., v. Aquartia aculeata et microphylla, p. 69, amazonicum Ker, cornutum Lam. (= heterandrum Juss.), Fontanesianum Dunal, heterandrum Pursh, heterodoxum Dunal, (= Mullus Hort.) rostratum Dunal, Vespertilio Ait., uncinellum Lindl., v. Nycterium amazonicum, cornutum, Fontanesianum, heterandrum, heterodoxum, rostratum, cordifolium et uncinellum, p. 551, p. 440 et Nachlese.

Hinsichtl. d. übrig. s. Lycopersicum, p. 483 et 376, II.

Solea Spgl., Ging., Solea.

concolor Ging. (= stricta Spgl. pugill., non syst. = Hybanthus concolor Spgl. = Jonidium Sprengelianum R. et S. = Viola concolor Forst. = V. stricta Mühlbg.). capensis Spgl., heterophylla Spgl., verticillata Spgl., stricta Spgl., verbenacea Spgl., v. Jonidium capense, heterophyllum, polygalaeifolium, strictum et verbenaceum, p. 430.

Solena revoluta D. Dietr., v. Posoqueria revol., p. 555, II.

Solenanthes G., Röhrenblume, V. I., Rhamneae.

spinosa G. Don, (= Cryptandra spinosa Cunningh.), dornige, ⚭. t. k. Neuholland.

Solenanthus Ledeb., Röhrenkrone, V. I., Asperifoliaeae (Borragineae).

apenninus Hohenack. (= Cynoglossum apenninum L.), apenninische, ♂. f. Apenninen, Sicilien.

Biebersteinii DC. (= dubius Hohenack. = Cynoglossum stamineum MB., excl. syn.), Bieberstein's, ♂. f. Taurien.

circinnatus Ledeb. (= Echinosperrum circinnat. D. Dtch.), kreiselförmige, ♂. 4. f. Altaisches Sibirien.

lanatus A. DC. (= Anchusa lanata L. = Cynoglossum cheirifolium β Lehm.), wollige, ♂. 4. k. Nordafrika.

Solenopsis Presl, *Bivoneana* Presl, *canariensis* Presl, *Laurentia* Presl, (= *Salzmanniana* Presl), *minuta* Presl, v. *Lobelia* Sect. V. (*Laurentia*) *tenella*, *canariensis*, *Laurentia*, *minuta*, p. 471 et 367, II.

Solenostylis Lem., Scheidw., v. Houtte, Röhrengriffel, XIV. II., *Acanthaceae*.

aurantiaca Lem., Scheidw., v. Houtte, (= *Aphelandra aurantiaca* Lindl., p. 40, = *Hemisandra aurantiaca* Scheidw.).

Ghiesbreghtiana L., S., v. H. (= *Justicia Ghiesbreght.* Hort.), Ghiesbreght's, f. w. t. Mexico.

velutina L., S., v. H. (= *Justicia velutina* Hort.), sammethaariger, f. w. t. Mexico.

Solidago L., Goldruchte.

bicolor L. (= *alba* Mill. = *Aster bicolor* N. E.).

canadensis L. (= *arcuata* Tausch, = ?*humilis* Mill. = *praecox* Mch. = ?*virginiana* Mill.).

confertiflora DC., gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.

corymbosa Ell., doldentraubige, 4. f. Nordam. (Georgia).

elliptica Ait. (= *arguta* Ait. var. Spgl. = *latissimifolia* Mill.), β) *plantaginea* Dsf.

erecta Pursh, aufrechte, 4. f. Carolina.

gigantea Ait. (= *serotina* W. nec Ait.).

integrifolia Dsf. (= *sempervirens* Mchx., non L. = *speciosa* Nutt. = *petiolaris* Mühlbg.).

β) *angustata* (*erecta* Ell.).

lepida DC., schilferige, 4. f. Nordamerika.

multiflora Dsf., vielblumige, 4. f. Nordamerika.

nemoralis Ait. (= *hispida* Mühlbg.).

β) *cinerascens* Schweinitz.

odora Ait. (= *retrorsa* Mchx.).

paniculata DC. (= ?*mexicana* H. B. K.), rispige, 4. f. b. Mexico.

patula Mühlbg. (= *asperata* Pursh, = *angulata* Schrad.).

pilosa Mill., Tausch, (= *canadensis* γ W.), haarige, 4. f. Nordamerika.

procera Ait. (= ?*hirsutissima* Mill. = ?*Tournefortii* Tausch).

rigida L. (= *grandiflora* Rafin.).

salicina Ell., weidenähnliche, 4. f. Nordam. (Georgia).

serotina Ait. (= *glabra* Dsf. β Endl. = *deflexa* Mch.).

tortifolia Ell. (= *odora* Mchx., non Ait.), gedrehtblätterige, 4. f. Nordamerika (Carolina, Georgia).

viminea Ait. (= *integerrima* Mill.).

Virgaurea L., β) *alpestris* W. K. (= *carpathica* Schrad. = *lapponica* Wither.), γ) *laxa* Tausch.

Unbestimmtere: *adscendens* Hort., *Cleliae* DC. (= *dubia* Scop.), *conferta* Dsf., Poir., *dubia* Schult., *fistulosa* Mill., *marylandica*, Mill., *petiolata* Mill., *pyramidalis* Mch.

cordifolia Mill., v. *Aster cordifolius*, p. 95, *Cymbalaria* Mch., v. *Munychia Cymbalaria*, *Aster* Sect. XII. p. 99, *glauca* Gmel., v. *Senecillis glauca*, p. 742,

graveolens Lam., *viscosa* Lam., non Schrad., v. *Inula graveolens et viscosa*, p. 317 et 318, II., *pauciflos- culosa* Mch., v. *Bigelowia uniligulata*, p. 68, II., *pubes- cens* Wall. (= *nepalensis* D. Don), v. *Amphirapis*

pubescens, p. 33, II., *retusa* Burm., v. *Nidorella toetida*, p. 437, II., *viscosa* Schrad. non Lam., v. *Psiadia glutinosa*, p. 661. — *spuria* Forst. =

Commidendrum spurium DC. wird kaum kultivirt.

- Soliva** R. et P., Less., DC., p. 771, (= *Gymnostyles* Juss., p. 278, II.).
anthemifolia RBr. (= *Gymnostyles anthemifolia* Juss.).
Barcklayana DC., C. A. Mey. (= *Gymnostyles Barcklayana* Steud.), Barcklay's, ☉. f. Chili.
nasturtiifolia DC. (= *Gymnostyles nasturtiifolia* Less.),
 Wasserkressenblättrige, ☉. ♂. f. k. Buenos Ayres.
pterosperma Less. (= *Gymnostyles pterosperma* Juss. = *Ranunculus alatus* Poir.), flügelsaamige, ☉. m. f. Brasilien.
sessilis R. et P. (= *Gymnostyles chilensis* Spgl.), stiellose, ☉. f. Chili.
stolonifera Loud. (= *lusitanica* Less. = *Gymnostyles lusitanica* Spgl. = *G. stolonifera* Juss. = *Hippia stolonifera* Brotero).
- Sollya** Lindl., Sollya.
angustifolia Lindl. (= *salicifolia* Hort. = *Billardiera angustifolia* DC., p. 123).
linearis Lindl., gleichbreitblättrige, ☿. Sch. t. Neuholland.
Sommea Calcitrapa Bory, v. Acicarpha spathulata, p. 13.
Sommerfeltia obovata Schum., v. Drepanocarpus lunatus.
- Sonchus** Vaill., Gänsedistel.
angustifolius Dsf., schmalblättrige, 4. k. Nordafrika.
arboreus DC. (= *Atalanthus arboreus* Sweet, = *Prenanthes arborea* Brouss), baumartige, ☿. k. Teneriffa.
asper Fuchs, Vill. (= *fallax* Wallr. = *ferox* Wall. = *infestus* Poeppig, = *oleraceus* γ. δ. L. = *spinosus* Lam. = *umbellatus* E. Mey. = ? *umbellifer* Thbg.).
caucasicus MB., caucasische, 4. f. Caucasus.
chinensis Fisch., Schrk., chinesische, ☉. f. China.
dumosus Fisch. et Mey., Hecken-G., ☉. f. ? Asiat. Rufsländ.
flexuosus Ledeb. (= *Crepis flexuosa* Bernh.), gebogene, 4. f. Caucasus.
fruticosus L. fil. (= *squarrosus* DC.), strauchige, ☿. ☿. k. Madeira.
gummifer Lk., Gummigebende, ☿. ☿. k. Canar. Inseln.
hantoniensis Sweet, hantonische, 4. f. England.
Jacquini DC. (= *fruticosus* Jacq., non L. fil.), β) abbreviatus Lk. (= ? *acaulis* Dum. Cours. = *Broussonetii* Dsf. = *congestus* W. = *macranthus* Poir.).
leptocephalus Cass. (= *Atalanthus pinnatus* Don, = *Chondrilla pinnata* Lam. = *Prenanthes pinnata* L. fil.), schlankköpfige, ☿. k. Canarische Inseln.
longifolius Trevir. (= *australis* Hort.).
nigricans Tausch, schwärzliche, ☉. f. Neapel.
oleraceus L. α et β (= *ciliatus* Lam. = *laevis* Vill. = *Hieracium oleraceum* Scop.), Gemüse-G., ☉. f. Auf bebauten Stellen aller Erdtheile.
 β) *elongatus* Hort. Marburg.
palustris L. (= *sagittatus* Mch.).
parviflorus Lej., kleinblumige, ☉. f. Belgien.
pectinatus DC., kammförmige, 4. f. Südfrankreich.
quercifolius Dsf., eichenblättrige, ☿. k. Nordafrika.
Royleanus DC., Royles, ☉. m. f. Ostindien.
setosus Ehrh., borstige, ☉. f. ? Aegypten.
spinosus DC., non Lam. (= *Athalanthus spinosus* Don, = *Lactuca spinosa* Lam. = *Phoenixopus spinosus* Cass. = *Prenanthes spinosa* Forsk.), dornige, ☿. k. Spanien, Arabien.
tenax Fisch., Sweet, zähe, 4. f. Sibirien.

Sonchus

tenerrimus L. (= *italus* Spgl.), zarte, ☉. ♂. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

β) *lacerus* W.

uliginosus MB. (= *glaber* Schult.).

ustulatus Lowe, (= ?*hyoseridifolius* Hornem.), brandige, ♂. k. Madeira.

Unbestimmtere: *pinnatifidus* Dsf. ♂., *vaginatus* Hort., *volubilis* Hort.

taraxacifolius W. (= *serratus* Perrot.) p. 772, = *Lactuca taraxacifolia* Schum. wird kaum kultivirt.

acuminatus W., *albanus* Stev. (= *sibiricus* L. var. MB.), *alpinus* L. (= *canadensis* L. = *coeruleus* Sm. = *lapponicus* Fröl. = *montanus* Retz.), *azureus* Ledb., *cacaliaefolius* MB., *cyaneus* D. Don, (= *hastatus* Wall.), *floridanus* L. (= *biennis* Mch. *lapponicus* W. ex parte), *hispidus* Ledeb., *leucophaeus* W. (= *spicatus* Lam.), *macrophyllus* W. (= *canadensis* Fröl. = *cordifolius* Dsf.), *multiflorus* Dst. (= *racemosus* Lam.), *Plumieri* L. (= *acanthifolius* Clairv. = *cichoraceus* Mch.), *preanthoides* MB., *sibiricus* L., *tataricus* L., v. *Mulgedium acuminatum*, *albanum*, *alpinum*, *azureum*, *cacaliaefolium*, *cyaneum*, *floridanum*, *hispidum*, *leucophaeum*, *macrophyllum*, *multiflorum*, *Plumieri*, *preanthoides*, *sibiricum*, *tataricum*, p. 533, 884 et 422, II., *amboinensis* Hort., v. *Emilia* (*Cacalia*) *sonchifolia*, p. 141 et 220, II., *agrestis* Sw. (= *occidentalis* Spgl.), v. *Erechtites hieracifolia* (*Senecio* Sect. IV.) p. 746, *capitatus* Spgl., v. *Lomatolepis glomerata*, p. 475, *chondrilloides* Dsf. (= *Bocconi* Jan), *scorzoneriformis* Spgl., v. *Zollikoferia chondrilloides* et *pumila*, *dichotomus* MB., *hispanicus* Jacq., *picroides* Lam. (= *squamosus* Lam.), *tingitanus* Lam. (= *hispidulus* Bové), v. *Picridium dichotomum*, *hispanicum*, *vulgare*, *tingitanum*, p. 623 et 523, II., *dichotomus* Delil., *Savi*, non MB., *divaricatus* Delil., v. *Micro-rhynchium nudicaule* et var. p. 407 et 408, II., *pallidus* W., *calyculatus* Roxb., *pulchellus* Pursh, v. *Lactuca canadensis*, *Heyneana* et *pulchella*, p. 442 et 339, II., *taraxacifolius* Spgl., non W., *goraeensis* Lam. (= *ciliatus* Perrot.), v. *Brachyrampus caribaeus* et *goraeensis*, p. 76, II., *hastatus* Less., non Alior., *virgatus* Dsf., v. *Nabalus alatus* et *virgatus*, p. 427, II.

Sonninia Rehb. (= *Diplolepis* RBr., Lindl.), Sonnini, berühmter franz. Naturforscher, bereiste Aegypten), V. II., *Asclepiadeae*.

Menziesii Decaisn. (= *Diplolepis Menziesii* R. et S.), Menzies's, ♂. Sch. k. t. Chili.

apiculata (Lindl.) China, *ovata* (Lindl.) China, *vomitaria* (Lindl.), (= *Asclepias vomitoria* König) China, werden in DeCand. prodr. von Decaisne nicht erwähnt.

Sophora L., *Sophora*, Schnurstrauch.

robinoides Walp., *robinienähnliche*, ♂. w. Ostindien. *secundiflora* Lagasca, DC. (= *Broussonetia secundiflora* Ortega, = *Virgilia secundiflora* Cavan., p. 852).

argentea Pall. (= *bifolia* Pall.), v. *Anmodendron Sieversii*, p. 868, *aurea* Ait., *capensis* L. (= *oroboides* Berg.), *sylvatica* Burch., v. *Virgilia aurea*,

Sophora

capensis, sylvatica, p. 852, *alopecuroides* L. (= *albicans* Jaum. St. Hil.), *chinensis* Lodd., *flavescens* Ait. (= *glabra* Mch. = *macrosperma* Jaum. St. Hil.), *galegoides* Pall., *pachycarpa* C. A. Mey., *sericea* Nutt., v. *Radiusia* *alopecuroides*, *chinensis*, *flavescens*, *galegoides*, *pachycarpa*, *sericea*, p. 582 et Nachlese, *australis* L. (= *coerulea* Mch.), *alba* Walt., *perfoliata* Walt., *tinctoria* L., *lanceolata* Walt., *villosa* Walt., v. *Baptisia* *australis*, *alba*, *perfoliata*, *tinctoria*, *uniflora*, *villosa*, p. 113, *biflora* Retz, *buxifolia* Retz, *cordata* Thbg., *cuneifolia* Steud., *hirsuta* Ait., *myrtillifolia* Retz, (= *biflora* L. = *rotundifolia* Berg.), *sericea* Andr., *calyptrata* Retz, (= *biflora* Houtt.), v. *Podalyria* *argentea*, *buxifolia*, *cordata*, *cuneifolia*, *hirsuta*, *myrtillifolia*, *sericea*, *styracifolia*, p. 638 et p. 543, II., *galioides* Berg., *genistoides* Burm., v. *Cyclopia* *galioides* et *genistoides*, *japonica* L. et *pubescens* Tausch, *affinis* Torr. et Gr., v. *Styphnolobium* *japonicum* cum variet. et affine, *juncea* Schrad., v. *Viminaria* *denudata*, p. 840, *microphylla* Ait., *nitida* Sm. (= *sericea* Jaum. St. Hil., non Andr.), *tetraptera* Ait., v. *Edwardsia* *microphylla*, *nitida*, *grandiflora*, *monosperma* Sw., v. *Ormosia* *dasycarpa*, p. 586. Hiernach p. 772 zu ergänzen und zu berichtigen.

Sophronia caespitosa Lichtenst., v. *Witsenia partita*, p. 858.

Sophronitis Lindl., Zierstendel.

grandiflora Lindl. (= *Cattleya coccinea* Lindl.).

Hoffmannseggiana Rchb., Hoffmannsegg's, 4. w. Brasilien.

isopetala Hffg., gleichkroniger, 4. w. Brasilien (Rio Janeiro).

nutans Hffg., nickender, 4. w. Brasilien (Rio Janeiro).

pterocarpa ? Lindl., flügelfrüchtiger, 4. w. Südamerika.

violacea Lindl., violetter, 4. w. Südamerika.

In van Houttes Établissement horticole wird noch eine

S. coccinea verzeichnet.

Soranthe caliciifolia Salisb., *glanduligera* Salisb.,

v. *Sorocephalus lanatus* et *imbricatus*, p. 774.

Soranthus Ledeb., Häufchendolde, V. II., Umbelliferae.

Meyeri Ledeb. (= *Seseli Meyeri* D. Dtrch.), Meyer's,

4. f. Sibirien.

Sorbus T., L., Eberesche.

I. *Adenorachis* DC. (= *Aronia* P.).

arbutifolia * (= *Aronia pyrifolia* P. = *Crataegus pyrifolia* Lam. = *C. serrata* Poir. = *Mespilus arbutifolia* L. = *M. pumila* Schum.).

Chamaemespilus * (= *fruticosa* Crtz. = *Aronia Chamaemespilus* P. = *Crataegus Chamaemespilus* Jacq., Dsf. = *C. humilis* L. = *Lazarolus Chamaemespilus* Borkh. = *Mespilus Chamaemespilus* L.).

densiflora * (= *Aronia densiflora* Spach, excl. Syn. = *Crataegus arbutiflora* Dsf. Hort. Par. = *Pyrus densiflora* Steud.), dichtblumige, ♂. f. ?

melanocarpa * (= *Mespilus arbutifolia* β Mchx. = *Pyrus melanocarpa* W.).

pubens * (= *Aronia pubens* Spach, = *Pyrus capitata* Hort. = *P. pubens* Lindl.).

II. Genuin.

alpina * (= *Pyrus alpina* W. = *P. Aria* β DC. = *Crataegus alpina* Hort.).

Sórbus

Aria Crtz. (= *Aria nivea* Host, = *Crataegus Aria* L. = *Mespilus Aria* Scop. = *Lazarolus Aria* Borkh. = *Pyrus Aria* L.), β) sudetica (Tausch).

Aucuparia L. var. monstrosa Hort., subserrata Opiz.

Hostii * (= *Aria* Crtz. var.? = *Aria Hostii* Jacq. fil.), Host's, \S . f. Oestreich. u. Steyerm. Alpen.

latifolia P. (= *Crataegus dentata* Thuill. = *C. latifolia* Poir. = *Pyrus arguta* Tausch, = *P. latifolia* Lindl. = *P. semilobata* Bechst.).

obtusata * (= *Crataegus Aria rotundifolia* Hort. = *C. obtusata* Spach, = *Pyrus obtusata* Steud.).

scandiaca Fr. (= *intermedia* P. = *Crataegus Aria* β L. = *C. inermis* L. fl. Lapp. = *C. scandiaca* Wahlbg. = *C. suecica* Auct. = *Lazarolus intermedia* Borkh. = *Pyrus decipiens* Bechst. = *P. intermedia* Ehrh. = *P. suecica* Röhl.).

spuria P. (= *Aronia sorbifolia* Spach, = *Mespilus sorbifolia* Poir. = *Pyrus sorbifolia* Wats. = *P. hybrida* Mch. = *P. spuria* DC.).

vestita Lodd. (non Wall.), v. *Crataegus cuspidata*, p. 165, II.

Sorghum Mch., P., Durrgras.

vulgare P. (= *album* Hort. = *medium* Hort. = *pyramidale* Hort. = *Andropogon Sorghum* Roth, Roxb. = *Holcus Dora* Mieg. = *H. Durra* Forsk. = *H. rubens* G. = *H. Sorghum* L.), β) bicolor W. (= *Andropogon bicolor* Roxb. = *Holcus bicolor* L.), γ) nigrum R. et S. (= *nigricans* Hort. = *Andropogon niger* Kunth, = *Holcus niger* Gmel. = *H. nigerrimus* Ard. = *H. nigricans* Auct.).

Außerdem werden aus abyssinischen Saamen noch folgende Varietäten kultivirt: seminibus albis, seminibus albis majoribus, seminibus albis minoribus glumis nigris, seminibus griseo-fuscis, seminibus fulvis majoribus, seminibus brunneis minoribus.

avenaceum P. B., v. *Pentameris curvifolia*, p. 884 et Nachlese.

Soria Adans., *syriaca* Desv., v. *Euclidium syriacum*.

Sorindeja madagascariensis DC. (= *pinnata* Dsf. Hort. Par. excl. Synon. = *Bursera acutifolia* Sbr. hrb. mart. = *Mangifera pinnata* Lam., non L.).

Sorocea St. Hilair, Häufchenbeere, XXII. 1., Urticaceae-Artocarpeae.

Celsiana * Cels's, \S . w. Brasilien.

Sorocephalus RBr., Häufchenkopf.

salsoloides RBr., salzkrautähnlicher, \S . t. Cap d. g. Hffn.

verticillatus RBr., (= *Protea verticillata* Thbg.), wirtelförmiger, \S . t. Südafrika.

Soulangia Brongn. (Soulange-Bodin, berühmter franz. Pflanzen-Cultivateur u. Gartenbesitzer), V. 1., Rhamneae. v. *Phylica* Sect. IV. p. 518, II., et p. 619.

Denen daselbst verzeichneten Arten ist noch beizufügen: *myrtifolia* Otto et Dietr., myrtenblättrige, \S . t. k. Südamerika.

Southwellia Salisb., *angustifolia* Wight, *Balanghus* Wight, *nobilis* Salisb., *Tragacantha* Wight, *versicolor* Wight, v. *Sterculia angustifolia*, *Balanghas*, *Tragacantha*, *versicolor*.

Soymidia Adr. Juss., Soymidie, X. I. (XVI. VI.),
Hesperideae-Cedreleae.

febrifuga Adr. Juss. (= *Swietenia febrifuga* Roxb., p.
794, = *S. Soymida* Dunc.), fiebertreibende, f. w.
Ostindien.

Soyeria Monnier, *blattarioides* Monn., *grandiflora*
Monn., *lampsanoides* Monn., *montana* Monn., *sibirica*
Monn., v. *Crepis blattarioides*, *grandiflora*, *lampsano-*
noides, *montana*, *sibirica*, p. 229—230 et 167, II.

Spadostyles Benth., Kolbengriffel, X. I., Leguminosae-
Papilionaceae (Sophoreae).

Benthonii Endl., Bentham's, f. t. Neuholland.

concolor Endl., einfarbiger, f. t. Neuholland.

Cunninghamii Benth. (= *Oxylobium dilatatum* Cunn.),
Cunningham's, f. t. Neuholland.

flexilis Hort. belg. (= *Dillwynia teucrioides* Sbr. =
Pultenaea flexilis Sm., p. 667).

Hügelii Endl., Hügel's, f. t. Neuholland.

juniperina Hort. belg. (= *Pultenaea juniperina* LaBill.,
p. 667).

ramulosa Endl., ästige, f. t. Neuholland.

rupestris Hort. belg., Felsen-K., f. t. k. Neuholland.

sericea Hort. belg. (= *Pultenaea sericea* Hort.), seiden-
haariger, f. t. k. Neuholland.

Sieberii Benth. (= *Dillwynia cuneata* Sieb. = *Pulte-*
naea euchila DC., p. 667), Sieber's, f. t. Neuholland.

Spaendoncea tamarindifolia Dsf., v. *Cadia purpurea*,
p. 142.

Spallanzania Pollini, (non DC.), *agrimonoides* Pollini,
v. *Aremonia agrimonoides*, p. 75.

Spananthe Jacq., paniculata Jacq. (= *setosa* Mch. = *Hy-*
drocotyle Spananthe W. = *Phellandrium ciliatum* Hrbr.).

Sparaxis Ker, Schlitzschwertel.

blanda Sweet, (= *alba* Hort. = *tricolor* γ *subroseo-*
albida Bot. mag.).

bulbifera Ker, (= *albiflora* Eckl. = *Belemcanda bulbi-*
fera Mch. = *Ixia bulbifera* L. = *Moraea bulbifera*
Jacq.), β) *monantha* (LaRoche), γ) *S. lacera* Curt.

fimbriata Ker, (= ? *grandiflora* Ker, var. = *Ixia fim-*
briata Lam.), gefranzter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

fragrans Ker, (= *Gladiolus odoratus* Schrk. = *Ixia*
fragrans Jacq. = *I. uniflora* Jacq.).

grandiflora Ker, (= *Belemcanda aristata* Mch. = ? *B.*
semiflexuosa Mch. = *Ixia aristata* Ait. = *I. bulbi-*
fera α Thbg. = *I. bulbifera* β *holosericea* Vahl, =
I. sparsa Mill. = *I. uniflora* L.).

b) *striata*, c) *hybrida*.

Griffini Sweet, (= *tricolor* γ *violaceo-purpurea* Bot. mag.).

Liliago Sweet, (= *grandiflora* γ *Liliago* Bot. reg. =
Ixia Liliago Redouté), Lilien-S., 4. Zw. t. k. Cap d. g. H.

lutea Eckl., gelber, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

luteo-violacea Eckl., gelbvioletter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. H.

Meleagris Eckl., Fritillarienähnlicher, 4. Zw. t. k.
Cap d. g. Hoffn.

tricolor Ker, (= *Ixia stellata tricolor* Hort. = *I. tri-*
color Curt.).

versicolor Sweet, (= *Synnotia versicolor* Sweet), ver-
schiedenfarbiger, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

violacea Eckl., violetter, 4. Zw. t. k. Cap d. g. Hoffn.

- Sparganophorus** Vaill., G., Spargträger.
africanus Steud. (= *Struchium africanum* P. B.), afrikanischer, ©. m. f. Senegambien.
Vaillantii G. (= *fasciatus* Lam. = *Struchium* P. = *Ethulia nodiflora* Lam. = *E. sparganophora* L. = *E. Struchium* Sw. = *Struchium americanum* Poir. = *St. Ethulia* Mirb.).
ageratoides Lagasca, v. *Coelestina ageratoides*, p. 210,
obtusifolius Lagasca, v. *Ageratum conyzoides*, p. 24,
verticillatus Mchx., v. *Sclerolepis verticillata*, p. 646, II.
- Sparmannia** Thbg., Sparmannie.
abyssinica Hochst., abyssinische, §. t. k. Abyssinien.
africana L., β) *acerifolia* Hort., γ) *suberosa* Endl.
palmata E. Mey., Sweet.
- Spartina** Schreb. (= *Limnetis* P. = *Trachynotia* Mchx.),
 Ginstergras.
brasiliensis Raddi, brasilianisches, 4. w. Brasilien.
laevigata Lk. (= *glabra* Mühlbg. = *juncea* W. var. Sogl. = *Dactylis maritima* Walt.).
stricta Roth, (= *pungens* P. Beauv. = *Dactylis cynosuroides* Löffl., Huds. = *D. stricta* W. = *Limnetis pungens* P. = *Paspalum cynosuroides* Brotero, = *P. strictum* Brot. = *Rottboella spathacea* Tenore, = *Trachynotia stricta* DC.).
- Spartium** L., *junceum* L., β) *odoratissimum* D. Don,
 γ) *acutifolium* Lindl.
album Dsf. (= *dispermum* W. = *multiflorum* Ait.),
lanigerum Dsf. (= *villosum* Poir.), *lusitanicum* Mill.
 (= *grandiflorum* Brot.), *nubigenum* Ait. (= *fragrans* Lam. = *supranubium* L.), *procerum* W.,
spinosum L., v. *Cytisus albus*, *laniger*, *grandiflorus*,
fragrans, *procerus*, *spinosus*, *aphyllum* Pall., v. *Eremosparton aphyllum*, p. 227, II., *arborescens* Mill.
 v. *Brya Ebenus*, p. 135, *capense* L., v. *Pelecynthis opposita*, p. 494, II., *complicatum* Gouan, Lois.,
complicatum L., v. *Adenocarpus telonensis* et *parvifolius*, p. 18, *contaminatum* Ait., v. *Indigofera juncea*,
contaminatum L., *cytisoides* L. fil., *sericeum* Ait., v. *Lebeckia contaminata*, *cytisoides* et *sericea*,
 p. 450, *creticum* Dsf., v. *Anthyllis Aspalathi*, p. 65,
angulatum L. (= *parviflorum* Vent.), *monospermum* L. (= *Clusii* Spach) et *sphaerocarpum* L., v. *Retama angulata*,
monosperma, *sphaerocarpa*, p. 587, II., *arborescens* Dsf., *patens* L., *scoparium* L., v. *Sarothamnus arborescens*,
patens, *vulgaris*, p. 633, II, et p. 885, *sophoroides* Berg., v. *Hypocalyptus obcordatus*,
aetnense Bivone, (= *trispermum* Sm.), *albicans* Cav., *decumbens* Jacq. Hort., *Gasparinii* Guss.
 (= *gymnopterum* Vivian.), *decumbens* Sut. (= *Halleri* Vill.), *sericeum* Vent., v. *Genista aetnensis*, *canariensis*,
diffusa, *Gasparinii*, *prostrata*, *clavata*, sowie überhaupt hinsichtl. d. übrigen *Genista*, p. 349 et p. 257, II.
- Spatalla** RBr., Salisb., Spatalla.
abietina RBr. (= *Protea abietina* Lichtenst.), tannenähnliche, §. t. Cap d. g. Hoffn.
polystachya RBr., vielährige, §. t. Cap d. g. Hoffn.
propinqua RBr., verwandte, §. t. Cap d. g. Hoffn.
Spathestigma glutinosum Hook., Arn., v. *Pterostigma grandiflorum*, p. 571, II.

Spathicarpa Wilson, Hook., Scheidenfrucht, ? XXI. ix., Aroideae.

hastifolia Wils., Hook., spontonblättrige, 4. w. Chili.

Spathiphyllum Schott, Scheidenblatt, XXI. iv., Aroideae.

lanceolatum Schott, (= *Dracontium lanceaefolium* Jacq.), lanzettförmiges, 4. w. Caracas.

sagittae-folium Schott, (= *Arum sagittae-folium* Rodsch. = *Dracontium sagittae-folium* Mey. = *Pothos sagittae-folia* Rudge), pfeilblättriges, 4. w. Guiana.

Spatium chinense Lour., v. Aponogeton monostachys, p. 69.

Spathodea P. B., Scheidenbignonie.

adenophylla DC. (= *Bignonia adenophylla* Wall., p. 122).

? *amoena* A. DC. (= *Bignonia amoena* Wall. = *B. amara* Loud.), liebliche, 5. w. Wird in Calcutta und auf Mauritius kultivirt, wahrscheinlich auf Madagascar wild.

? *bracteosa* DC. (= *Bignonia alba* Aubl.), deckblättrige, 5. Sch. w. Cayenne.

campanulata P. B., glockenblumige, 5. w. Mittägl. Afrika.

gigantea Blum., riesenhafte, 5. w. Java.

laurifolia H. B. K., lorbeerblättrige, 5. Sch. w. Neu-

andalusien.

Rheedii Sogl. (= *longiflora* Vent. = *Bignonia longiflora* W. = *B. spathacea* L.).

serrulata DC. (= *Bignonia serrulata* Wall., p. 122).

speciosa Brongn. (= *Bignonia fraxinifolia* Hort. Par.), prächtige, 5. w. ?

stipulata Wall., G. Don, (= *Bignonia stipulata* Roxb.), zwischenblättrige, 5. w. Ostindien.

uncata Sogl. (= *Bignonia uncata* Andr., Sims).

tulipifera G. Don, (= *Bignonia tulipifera* Schum.), tulpen-tragende, 5. w. Guinea.

vernica Cham., firnisgebende, 5. w. Brasilien.

Beide letztere scheinen bis jetzt nicht kult. zu werden.

indica P. (= *pentandra* Hook.), v. Calosanthus

indica, p. 109, II., *montana* Sogl., v. Zeyheria mon-

tana, *Roxburghii* Sogl., v. Heterophragma Roxburghii,

Nachlese, *uncinata* Sogl., v. Macfadyena uncinata,

p. 379, II.

Spathoglottis Blume, Scheidenzüngel, XX. i., Orchideae.

Fortuna Lindl., Fortune's, 4. w. China.

ixioides Lindl. (= *Cymbidium ixioides* Don prodr.), ixienähnliches, 4. w. Ostindien.

plicata Blume, Lindl. (= *Bletia angustata* Gaudich.), faltiges, 4. w. Java.

pubescens Lindl., weichhaariges, 4. w. Ostindien.

trivalvis Lindl., dreiklappiges, 4. w. Ostindien.

Spathularia Haw., *Clusii* Haw. (= *leucanthemifolia* Haw.), *stellaris* Haw., v. Saxifraga leucanthemifolia et stellaris, p. 724.

Specklinia Lindl., Specklinie.

acuminata Lindl. (= *Dendrobium acuminatum* H. B. K.), zugespitzte, 4. w. Südamerika.

emarginata Lindl. (= *Cymbidium corniculatum* Sogl. = *Dendrobium corniculatum* Sw. = *Epidendrum corniculatum* Sw. = *E. monophyllum* Hook. = *Liparis monophylla* Sogl.), ausgerandete, 4. w. Jamaika.

Specklinia

- floribunda* Lindl. (= *Dendrobium ophioglossoides* Sbr. hrb. mart.), blüthenreiche, 4. w. Martinique, Süd-am.
Lanceola Lindl. (= *lanceolata* Hort. = *Dendrobium Lanceola* Sw. = *Epidendrum Lanceola* Sw. = *Pleurothallis Lanceola* Spgl.), lanzettliche, 4. w. Jamaika.
linearis Lindl. (= *Humboldtia purpurea* R. et S. = *Stelis purpurea* R. et P.), gleichbreite, 4. w. Mexico, Peru.
pusilla Lindl. (= *Dendrobium pusillum* H. B. K.), kleinste, 4. w. Peru.
scariosa Lindl. (= *Dendrobium scariosum* LaLlav.), trockenhäutige, 4. w. Südamerika.
sertularioides Lindl. (= *Dendrobium sertularioides* Sw. *Epidendrum sertularioides* Sw. = *Pleurothallis sertularioides* Spgl.), sertulariaähnliche, 4. w. Jamaika.

Specularia Heist., A. DC., Venusspiegel.

- cordata* * (= *Speculum* var. β A. DC. = *Campanula cordata* Visian. = *Prismatocarpus cordatus* Rchb.), herzblättriger, \odot f. Dalmatien.
ghilanensis A. DC. (= *Campanula ghilanensis* Pall.), ghilanischer, \odot f. Persien.

Spennera Mart. (Dr. F. C. L. Spenner, ehemal. Prof. der Botanik zu Freiburg im Breisgau, † 1841), X. I., Lythriaceae-Melastomeae.

- annua* Mart. (= *Melastoma annua* Schrk.), jährige, \odot w. Brasilien.
aquatica Mart. (= *Aciotis aquatica* Don, p. 12, = *Melastoma aquatica* Aubl. = *Rhexia aquatica* Sw.), wasserliebende, \odot f. Wa. w. Südamerika.

Spergella glabra Rchb., *nodosa* Rchb., *saginoidea* Rchb., *subulata* Rchb., v. *Sagina glabra*, *nodosa*, Linnaei, et *subulata*, p. 622, II. ¹)

Spergula L. (pro parte), Spark.

- arvensis* L. (= *geniculata* P. = *refracta* Dethar. = *viscosa* Dethard.).
pentandra L. (= *Alsine marginata* Schreb. = *A. pentandra* Crtz. = *Arenaria pentandra* Wallr. = *Spergularia pentandra* G. Don).
viscosa Lagasca, (= *arvensis* L. var. Spgl.), schmieriger, \odot f. Spanien.

Sect. II. *Spergella* Rchb. p. 776, v. *Sagina* p. 622, II.

Spergularia P., Presl, (= *Alsine* Wahlb., M. et K.

- Sect. I. p. 38, = *Arenaria* Auct. (pro parte) = *Lepigonum* Fries, Fisch. et Mey. = *Stipularia* Haw. = *Spergula* Camb., Bartl., Meisn., Godr.), Spärklein, X. III. (IV.), Caryophyllaceae - Paronychieae (Portulacaceae - Paronychieae alior.).

canadensis P. (= *Alsine canadensis* (P.) p. 38, = *Arenaria rubra* β Mch.).

capensis (Fisch. et Mey.), capisches, \odot f. Cap d. g. H.
glandulosa * (= *Arenaria (Alsine) glandulosa* Jacq., p. 38, = *Lepigonum glandulosum* Fisch. et Mey.).

macrorrhiza * (= *Arenaria macrorrhiza* Req., Loisel. = *A. marina* var. δ Steud. = *Spergula macrorrhiza* Godr.), großwurzeliges, \odot f. Südfrankr., Corsica.

macrotheca (Fisch. et Mey.), (= *Arenaria glandulosa* β *macrotheca* Steud. = *A. macrotheca* Hornem.), großbüchsiges, \odot f. Californien, Chili.

1) *S. macrocarpa* Rchb. (= *Spergula saginoidea* Pollini), Südl. Tyrol, Oberitalien, würde also auch zu *Sagina* zu stellen sein.

Spergularia

- marina (Sm.), (= *Alsine marina* K., Rchb., p. 38, = *Arenaria marina* Sm. = *A. media* Wither. = *A. rubra* β L. Huds. = *Lepigonum marinum* Fr. = *Spergula marina* Bartl. = *Stipularia marina* Haw.).
- media P. (= *salina* Presl, = *Arenaria marginata* DC. = *A. marina* β Sm. = *A. maritima* L. flor. Lappon. = *A. pubescens* Steud. = *A. rubra* γ Huds. = *Alsine marginata* Rchb. = *A. marina* M. et K. = *A. media* Crtz. = *Spergula media* Bartl. = *Stipularia media* et *pubescens* Haw.), mittleres, \odot . f. Europa.
- molluginea * (= *Alsine molluginea* Balb., Lagasc., p. 38, = *Arenaria molluginea* Sering. = *Lepigonum mollugineum* Bartl.), weichlingähnliches, \odot . f. Neuspanien.
- purpurea (P.) p. 38.
- rubra P. (= *Alsine rubra* Whlbg., p. 38, = *L. rubrum* Fr. = *Stipularia rubra* Haw. = *Spergula rubra* Godr. = *Sp. purpurea* Bernh.).
- salsugineum (Fisch. et Mey.), (= *Arenaria salsuginea* Bunge), salzliebendes, \odot . σ . f. Sibirien.
- β) leiospermum Fisch. et Mey.
- segetalis * (*Alsine seg.* L. p. 38), (= *Arenaria segetalis* Lam. = *Alsine unilateralis* Mch. = *Lepigonum segetale* Fisch. et Mey. = *Spergula segetalis* Vill., Godr.).
- sperguloides (Fisch. et Mey.), (= ? *Holosteum sperguloides* Lehm.), sparkähnliches, \odot . f. Sibirien.
- succulenta (Delil. p. 38), (= *Arenaria succul.* Sering.).
- villosa Fisch. et Mey. (= *Alsine* (*Arenaria*) *villosa* Ledeb., p. 39).
- Spermacoe** Dill., G. F. W. Mey., Zahnwirbel.
- hispida L. (= *hirta* Rottl. = *rigida* Salisb.).
- longifolia Aubl., langblättriger, f. w. Guiana.
- reclinata N. E. (= *diversifolia* H. B. K. sec. Spgl.), zurückgebeugter, \odot . k. t. Mexico.
- suffrutescens Jacq. (= *suffruticosa* Spgl. = *tetragona* Hort. Berol.).
- tenuior L. (= *assurgens* Spgl. = *dichotoma* W. herb. = *lanceolata* Hort. = *parviflora* Salisb.).
- affinis* Pohl, *cornifolia* Fisch., *gracillima* Pohl, *pumila* Pohl, *stricta* L., *tenuis* Pohl, *vaginata* W., *verticillata* Sw. (= *hyssopifolia* P. = *mucronata* N. E. = *stellata* W.), v. *Borreria affinis*, *cornifolia*, *gracillima*, *pumila*, *stricta*, *tenuis*, *vaginata*, *verticillata*, p. 74, II., *adscendens* Fisch. (= *Fischeri* Lk.), *hirta* Sw., *stylosa* Lk. (= *crassifolia* Hort.), *villosa* Sw. (= *hirta* Jacq.), v. *Mitracarpum Fischeri*, *hirtum* etc., p. 412, II., *exserta* Roxb. (= *sumatrensis* Retz, = *teres* Roxb.), v. *Knoxia corymbosa*, p. 438 et p. 336, II., *hexandra* Rich. (= *hirsuta* W.), v. *Richardsonia scabra*, p. 690 et p. 595, II.
- Die übrigen Synonyme s. p. 776.
- Spermadictyon** Roxb., azureum Lindl. (= *scabrum* Spgl. = *Hamiltonia Dulina* Hamilt. = *H. scabra* Don, = *H. suaveolens* var. *azurea* Wall. = *Nona-telia filamentosa* Hamilt.).
- Spermaxyrum** LaBill., strictum DC. (= *Olaux stricta* RBr.).
- Spermolepis divaricata* Rafin., v. *Leptocaulis divaricatus*, p. 351, II.

Sphacele Benth., Ziestsalbei.

calycina Benth., großkelchige, 4. ⚥. f. b. Californien.

campanulata Benth. (= *Dracocephalum chamaedryoides* Balb. = *Phytoxis acidissima* Molin. = ? *Rosmarinus chilensis* Molina).Lindleyi Benth. (= *Stachys Salviae* Lindl.).

speciosa St. Hil., prächtige, ⚥. w. Brasilien.

Sphaeralcea Juss., St. Hil. (= *Sphaeroma* Schldtl.), Kugeleibisch, XVI. VIII., Malvaceae.abutiloides Spach, A. Juss. (= *Malva abutiloides* L., p. 490, = *Phymosia abutiloides* Desv.).angustifolia St. Hil., Spach, (= *Malva angustifolia* Cav. = *Sphaeroma angustifolium* Schldtl.).elegans G. Don, Sweet, (= *Malva elegans* Cav. = *abutiloides* L. fil.).floribunda Walp. (= *Malva floribunda* Steud. = *Sphaeroma floribundum* Schldtl.), blüthenreiche, ⚥. t. k. Mexico.lactea Spach, (= *Malva lactea* Ait. = *vitifolia* Cav.).miniata Spach, (= *Malva miniata* Cav.).

?β) Creeana (Hook.).

Munroana Spach, (= *Malva Munroana* Dougl.), b) major.obtusiloba Spach, (= *Malva obtusiloba* Hook.).rosea Don, Sweet, (= *Malva rosea* Moç., Sess. = *umbellata* Cav. var. Spgl. = *Sphaeroma roseum* Schldtl.), rosafarbige, ⚥. t. k. Mexico.umbellata A. Juss. (= *Malva umbellata* Cav. = *Sphaeroma umbellatum* Schldtl.), doldige, ⚥. t. k. Neuspanien.**Sphaeranthus** L., Klumpenblümchen.amaranthoides L. (= *zeylanicus* Heyne), amaranthähnliches, 4. w. Ostindien.microcephalus W. (= *africanus* Wall. et ? L. = *globosus* Wall. = *indicus* L. = *laevigatus* Wall.), kleinköpfiges, 4. w. Ostindien, Java.suaveolens DC. (= *indicus* Lam. G. = *Polycephalus suaveolens* Forsk.), feinriechendes, 4. w. Aegypten.*Sphaerocarpus racemosus* Rich., v. *Laguncularia racemosa* Nachlese.**Sphaerolobium** Sm., Kugelfüßchen.

acuminatum Benth., zugespitztes, ⚥. t. Neuholland.

alatum Benth., geflügeltes, ⚥. t. Neuholland.

fornicatum Benth., schuppenklappiges, ⚥. t. Neuholland.

grandiflorum Benth., großblumiges, ⚥. t. Neuholland.

Sphaeroma Schldtl., *angustifolium* Schldtl. etc., v.*Sphaeralcea angustifolia* etc.**Sphaeromorphaea** DC. (= *Sphaeropsis* Auct.), Kugelbeifuß, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.centipeda DC. (= *Artemisia minima* L. = *Centipeda orbicularis* Lour. = *Cotula minima* L.), kleinster, ©. f. China.**Sphaerophysa** DC., Kugelhülse.caspica DC. (= *Colutea caspica* MB. = *Phaca salsula* MB.).salsula DC. (= *Colutea davurica* Spgl. = *Phaca salsula* Pall.), salzliebende, 4. f. Dahurien.*Sphaerospora imbricata* et *triphyllo* Sweet, v. *Gla-diolus imbricatus*.

- Sphaerostigma** Sering., Vergl. p. 777.
 hirtum Fisch et Mey. (= *micranthum* Walp. = *minimum* * 1) = *Oenothera micrantha* Hornem. = *O. hirta* Lk. Enum. = *Holostigma micranthum* Spach).
 minutiflorum Fisch. et Mey. (= *contortum* Walp. = *Oenothera contorta* Lehm.).
- Sphaerotele** Presl, Kugelamarylle, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.
 coccinea Lk., Kl., scharlachfarbige, 4. Zw. w. Peru. 2)
 peruviana Presl, (= ? *Amaryllis cyrtanthoides* Sims), peruanische, 4. Zw. w. Peru. 3)
- Sphallerocarpus** Bess., Klitschkümmel, V. II., Umbelliferae.
 Cyminum Bess. (= *Chaerophyllum Cyminum* Fisch. = *Ch. gracile* Bess., p. 186, = *Myrrhis gracilis* Spgl.), schlanker, ♂. f. Dahurien, Vollhynien.
- Sphenandra** Benth., Schleuderbeutel, XIV. II., Personatae-Scrofulariaceae.
 viscosa Benth. (= *Buchnera viscosa* Ait. = *Manulea coerulea* Thbg. = *M. rotata* Desr.), schmieriger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
- Sphenantha** Schrad., Schleuderblume, ? XXI. x., Cucurbitaceae.
 scandens Schrad., klimmende, ☉. Sch. m. f. Mexico.
- Sphenogyne** RBr., Schleudernarbe.
 calendulaeflora DC., ringelrosenblättrige, ☉. f. Cap d. g. H.
 chrysanthemoides Less., wucherblumenähnliche, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
 dentata RBr. (= *Arctotis* L., non Thbg. = *A. pectinata* Thbg. = *A. piligera* Berg. = *Ursinia dentata* Poir. = *U. piligera* Poir.).
 foeniculacea Less. (= *Arctotis foeniculacea* Jacq. = *Ursinia foeniculacea* Poir.).
 microcephala DC., kleinköpfige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
 versicolor DC. (= *speciosa* Hort.), buntfarbige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
- Sphenopus** Trin., divaricatus Rchb. (= *Gouanii* Trin.), v. *Sclerochloa* Sect. III. p. 734 et 646, II.
- Sphenotoma** RBr., Swt., Schleuderstrauch.
 dracophylloides Hort. Hamburg., drachenblattähnlicher, ♀. t. Neuholland.
 squarrosus G. Don, (= *Dracophyllum squarrosus* RBr. = *Epacris squarrosa* Spgl.), sparriger, ♀. t. Neuholl.
- Spielmannia** Medic., africana W. (= *decurrens* Mch. = *S. Jasminum* Medic. = *Lantana africana* L. = *L. capensis* Thbg. = *L. crispa* Thbg.), p. 477.
- Spigelia** L., Spigelie.
 candida v. Houtte, reinweißse, 4. t. ? Mexico.
 Humboldtiana Cham., Schltl., Humboldt's, 4. t. k. Mexico, Cumana, Montevideo.
- Spilanthes** Jacq., Fleckblume.
 brasiliensis Spgl., brasilianische, ☉. m. f. Brasilien.
 exasperata Jacq. (= *radicans* Jacq., non Schrad. = *Isocarpha spec.* Cass.?).
 intermedia DC. (= *Mutisii* H. B. K. var. P. = *Acmella intermedia* Rich.), mittlere, ☉. m. f. Südamerika.

1) *Oenothera minima* Pursh ist als Synonym p. 556 auszuschließen und zu streichen.

2) Vergl. *Stenomesson coccineum*.

3) Vergl. *Stenomesson curvidentatum*.

Spilanthus

leucocephala Hort. Berol., ? Rchb., weifsköpfige, ☉. m. f. Südamerika (Caracas).

leucophaea Hort. Berol., weifsbraune, ☉. m. f. Südamerika.

mauritiana DC. (= *Acmella mauritiana* Rich., P., p. 13).

Mutisii H. B. K. (= *Acmella Mutisii* Cass. = *A.* ?

occidentalis P. = *Anthemis americana* Mutis, L. fil. =

A. occidentalis W. = *A. oppositifolia* Lam. = *He-*

liopsis dubia Dun.), Mutis's, ☉. m. f. Südamerika.

oleracea L. (= *Bidens fervida* Lam. = *B. oleracea* Cav.).

β) fusca Dsf., P. (= *Bidens fusca* Lam.).

radicans Schrad., starkwurzeln, 4. w. ?

repens Mchx. (= *Acmella repens* P., p. 13, = *Anthemis*

repens Walt.), ☉. 4.

tenella H. B. K. (= *debilis* H. B. K. var. Spgl.), zarte,

☉. m. f. Caracas.

urens Jacq. (= *repens* Spgl. = *Bidens angustifolia* Lam.

= *Cotula Spilanthus* W.), brennende, 4. w. Südamer.

Spinacia T., Spinat.

tetrandra Stev., viermänniger, ☉. f. Armenien.

Spinifex L., Stachelgras, III. II., Gramineae.

squarrosus L. (= *Stipa Spinifex* L.), sparriges, 4. w.

Ostindien.

Spiraea T., L., Spierstaude.

angustifolia Otto et Dietr. (= *lancifolia* Hortul., non

Hffg.), schmalblättrige, ♀. f. ?

angustiloba Turcz. (= *digitata* W. var. ? = *lobata* β

Steud.), schmallappige, 4. f. Dahurien.

ariaefolia Sm. (= *discolor* Pursh).

belgica Dumort., belgische, ♀. f. Belgien.

callosa Thbg. (= *japonica* L. fil. = *stellata* Wall.),

schwielige, ♀. k. f. b. Japan.

β) glauca Wall.

canescens Don, grauliche, ♀. k. f. b. Nepal.

corymbosa Rafin., non Roxb. (= *ceanothifolia* Hornem.

= *betulaefolia* Wats., non Pall. = *crataegifolia* Lk.).

cuneifolia Wall., keilblättrige, ♀. t. k. Ostindien.

dasyantha Bunge, rauchblumige, ♀. f. b. China.

decumbens K. (= *flexuosa* Rchb., non Cambess. =

inflexa Hort.).

digitata W. (= *argunensis* Ledeb. = *palmata* Pall., non L.).

Douglasii Hook., Douglas's, ♀. f. Nordwestl. Amerika.

Filipendula L., β) pubescens DC., γ) angustifolia Mill.

fissa Lindl., gespaltene, ♀. t. Neugranada.

flabellata Bertol., Guss. (= *chamaedrifolia* Tenore, =

hypericifolia γ DC.), fächerförmige, ♀. f. Unteritalien.

hypericifolia L. (= *foliosa* Poir. = *picoviensis* Bess. =

crenata L. var. ?).

incisa Thbg., eingeschnittene, ♀. f. b. k. Japan.

lanceolata Poir. (= *cantoniensis* Lour.), lanzettliche, ♀.

k. t. Mascarenas, China.

laxiflora Lindl., lockerblumige, ♀. t. Ostindien (? West-

indien).

Lindleyana Wall. (= *Schizotus Lindleyanus* Wall.),

Lindley's, ♀. k. f. b. Himalayagebirge.

lobata Jacq., Murr. (= *palmata* L. fil., non Pall. nec Thbg.).

Menziesii Hook., Menzies's, ♀. f. Nordwestl. Amerika.

opulifolia L., β) mollis Walp. (= *capitata* Pursh, =

ribifolia Nutt.), γ) pauciflora Nutt. (= *monogyna*

Torrey), δ) ferruginea Nutt.

Spiraea

prunifolia Sieb. et Zuccar. (= *crenata* var. Thbg.),
pflaumenblättrige, ♂. ♀. k. f. b. Corea, Nördl. China.
b) fl. pleno. (In den japanischen Gärten häufig
kultivirt, auch verwildert.)

quinqueloba Baumg., fünfflappige, 4. f. Siebenbürgen.

Reevesiana Lindl. (= *corymbosa* Roxb., non Rafin.),
Reeves's, ♂. ♀. k. f. b. China, Nordindien.

salicifolia L., var. rubicunda Hort.

Schrenkiana C. A. Mey., Schrenk's, ♂. f. Soongaria.

Thunbergii Sieb. et Zuccar. (= *crenata* Thbg., non L.),
Thunberg's, ♂. k. f. b. Japan.

Ulmaria L., β) denudata Presl, γ) glauca Schultz, var.
fol. variegatis Hort.

Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der
Gärten noch folgende (ohne nähere Angabe des Vater-
landes) erwähnt: canadensis Hort., cuneifolia Wender.,
lancifolia Hffg., nana Hort., oblongata Wender., ovata
Hort., venusta Hort.

japonica Hort. belg., v. Hoteja japonica, p. 305,

japonica Cambess., v. Keria japonica, p. 437.

Spiralepis D. Don, *declinata* D. Don, *modesta* D.
Don, v. *Helichrysum declinatum* et *gnaphaloides*,
glomerata D. Don, *squarrosa* D. Don, v. *Leontonyx*
glomeratus et *squarrosus*, p. 453.

Spiranthera Hook. (non St. Hil.), *elegans* Hook.,
v. *Pronaya elegans*, p. 657 et p. 561, II.

Spiranthes Rich., Wendelähre.

africana Lindl. (= *Habenaria spiralis* Rich. = *Saty-
rium spirale* Pet. Th.), afrikanische, 4. Kn. w. Mas-
carenas, Madagascar.

diuretica Lindl. (= *Nil* Rich. = *Ophrys unilateralis* Poir.).

grandiflora Lindl. (= *Neottia grandiflora* Hook.), groß-
blumige, 4. Kn. w. Brasilien.

Lindleyana Lk., Kl., Otto, Lindley's, 4. Kn. w. Süd-
amerika (La Guayra).

quadridentata Lindl. (= *Neottia quadridentata* W. =
Ophrys peruviana Aubl. = *O. quinquelobata* Poir.),
vierzählige, 4. w. Westindien.

variegata Kl., bunte, 4. w. Südamerika (La Guayra).

In van Houtte's Établissement horticole wird noch *S. au-
rantiaca* und *diaphana* kultivirt, deren Vaterland mir
unbekannt ist.

argentea Hort. Cels., v. *Anoectochilus setaceus*, p. 61,

Llaveana Lindl., v. *Neottia micrantha*, p. 432, II.,

picta Lindl., v. *Sarcoglottis picta*, p. 632, II.

Spirodela Schleiden, polyrrhiza Schleid. = Lemna po-
lyrrhiza L. (et orbicularis Kit.), p. 452.Spironema Lindl. (non Hochst.), Drehsfaden, VI. 1.,
Commelynaceae.

fragrans Lindl., wohlduftender, 4. t. w. Mexico.

Spitzelia aegyptiaca Schultz Bipont., *coronopifolia*
Schulz Bipont., v. *Picris pilosa* et *coronopifolia*,
p. 523 et 524, II.

Spixia Schrk. (non Leand.) *violacea* Schrk., v.
Ampherephlis intermedia, p. 49.

Spondias L., Mombinpflaume.

acida Blume, säuerliche, ♂. w. Java.

axillaris Roxb., achselständige, ♂. w. t. Nepal.

elliptica Rottl., *simplicifolia* Rottl. (= *Mangifera*

Spondias

axillaris Desv.), v. *Buchanania latifolia* et *angustifolia*, p. 136.

Sponia Commers., Decaisn., Sponie, V. II. (XXIII. I.),
Urticaceae-Ulmaceae.

canescens Decaisn. (= *Celtis albicans* W. herb. = *C. canescens* H. B. K., p. 129, II.).

crassifolia G. Don, (= *Celtis cordata* Dsf. = *C. cordifolia* Duham. = *C. crassifolia* Lam., p. 175, = *C. orientalis* Hort.).

? *Lima* Decaisn. (= *Celtis Lima* Sw., p. 175).

micrantha Decaisn. (= *Celtis micrantha* Sw., p. 175, = *Rhamnus micranthus* L.).

orientalis G. Don, (= *Celtis orientalis* L., non Mill. et Hort., p. 175).

pumila G. Don, (= *Celtis pumila* Pursh, p. 175, = ? *C. tenuifolia* Lam. = *C. trinervia* Lam.).

? *sinensis* Decain. (= *Celtis sinensis* P., p. 175).

Willdenowiana G. Don, (= *Celtis sinensis* W. herb. = *C. Willdenowiana* Schult.), Willdenow's, f. China.

occidentalis G. Don, v. *Celtis occidentalis*, p. 175 et p. 129, II.

Sporobolus RBr., Strausshalm.

II. Vilfa Adans., P. B., Trin.

compressus Kunth, P. B. (= *Agrostis compressa* Torrey, = *A. Torreyana* Schult. = *Colpodium compressum* Trin.), plattahniger, 4. f. Nordamerika.

diandrus RBr. (= *orientalis* Kunth, = *Agrostis orientalis* N. E. = *A. tennacissima* L. fil., non Jacq.), 4. nicht ☉. wie p. 779 angegeben ist.

dispar (P. B.), (= *Agrostis dispar* Mchx. = *Cornucopiae dispar* Walt. = *Trichodium elatum* Pursh), ungleicher, 4. f. Carolina.

juncea Kunth, (= *Agrostis juncea* Mchx. = *Bennetia* Rafin. = *Colpodium junceum* Trin. = *Heleochloa juncea* P. B.), simsenförmiger, 4. f. Nordamerika.

minutiflorus Lk. (= *Agrostis minutiflora* Dsf. etc., p. 779). Brasilien.

pungens Kunth, (P. B.), (= *Agrostis pungens* Schreb. = *Podosaemum pungens* Lk. = *Uniola pungens* P. B.).

spicatus Kunth, (P. B.), (= *Agrostis spicata* Vahl, non Thbg. = *A. virginica* Forsk.), ähriger, 4. k. w. Aegypten, Arabien, Senegal.

trichodes (H. B. K.), (= *Agrostis trichodes* R. et S. = *Aira trichodes* Speg.), haarähnlicher, ☉. f. Peru.

virginicus Kunth, (P. B.), (= *Agrostis virginica* L. = *Podosaem. virginic.* Lk.).

Sprekelia Heister¹⁾, (Baron v. Sprekelsen, ehemal. Secretair d. freien Stadt Hamburg), VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

formosissima Herb. (= *S. Heisteri* Trew, = *Amaryllis formosissima* L., p. 44, = *Iris suecica* Hort.), (The *Jacoea Lyli* Anglor.). Wurde schon 1593 in Europa eingeführt.

glauca Lem., blaugrüne, 4. Zw. w. Südamerika.

stenopetala Lem., schalkronige, 4. Zw. w. Südamerika.

1) Kaum als Gattung, höchstens nur als Unterabtheilung von *Amaryllis* anzusehen.

Sprengelia Sm., Sprengelie.

propinqua Cunn., verwandte, ♀. t. Van Diemens Land.

Squilla Steinh., Meerzwiebel, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

maritima Steinh. (= *Ornithogalum maritimum* Lam. Brot., p. 568, = *O. Squilla* Ker, = *Scilla maritima* L. = *Stellaris Scilla* Mch. = *Urginia Scilla* Steinh.), gebräuchliche, 4. Zw. k. Süd- u. Westeuropa.

Stachys L., Ziest, Rofspolei.

affinis Fresen. (= *orientalis* Forsk. = *palestina* Vahl, non L. = *pauciflora* Benth.), ähnelnder, 4. ♀. k. Aegypten, Arabien.

alpina L., β) intermedia Ait. (= ? *cretica* L. spec. = *orientalis* L.), γ) sibirica Lk. Enum. (= *curviflora* et *urticaefolia* Tausch).

arenaria Vahl, (= *congesta* d'Urv. = *diffusa* Schweig. = *iberica* MB. = *prostrata* Lag. = *purpurea* Poir. = *rubra* Don, = *scordifolia* W.). Süd-, West- u. Osteuropa, Kleinasien, Nordafrika.

arvensis L. (= *brasiliensis* Hort. = *Trixago arvensis* Hffg., Lk. = *T. colorata* Presl, = *T. cordifolia* Mch.). Europa, Nordafrika, Mittelasien.

aspera Mchx. (= *arvensis* Walt. = *hispida* Pursh).

baicalensis Fisch., baicalischer, 4. f. Sibirien.

Bridgesii Benth., Lindl., Bridges's, 4. k. t. Mittägl. Chili.

cardinalis Kunze, (= *coccinea* plur. Hort., non Jacq. = *coccinea grandiflora* Hort.), cardinalrothe, 4. k. f. b. ?

circinnata L'Her. (= *latifolia* Ait. = *velutina* W.).

Drummondii Benth., Drummond's, ☉. f. Mexico.

eriantha Benth., wollblumiger, ☉. f. Mexico.

fragilis Visian., zerbrechlicher, 4. f. Dalmatien.

germanica L. (= *Eriostomum germanicum* et *lusitanicum* Hffg., Lk.), β) polystachya Ten. (= *E. polystach.* Presl), γ) dasyantha Rafin., δ) excelsa Hort. — *acutifolia* Bory, Lk., *alba* Mill., Latour, *argentea* Tausch, *biennis* Roth, *cinerea* Hortul., *cretica* Sibth., Sm. (L. ex parte), *elongata* Hort., *heterophylla* Mch., *intermedia* Hortul., non Ait., *lanata* Crtz., *lusitanica* Steud., *nova* Sadler, *orientalis* Hortul., non L., *pannonica* Lang, *sibirica* Hortul., *spectabilis* Choisy, *tomentosa* Gater., *verbascifolia* Hortul., gehören nach Benthams als Synonyme zu *St. germanica* oder scheinen ihm zum Theil nur geringfügige Varietäten zu sein.

heraclea All. (= *barbata* Lapeyr. = *intermedia* Tenore, = *phlomoides* W. Enum.), β) obliqua W.K. (= *orientalis* Vahl).

hirta L. (= *divaricata* Vivian. = *inscripta* Rehb.).

italica Mill., Jan, (= *altissima* Hort. Par. = *salviaefolia* Tenore, = *Eriostomon salviaefolium* Presl), italienischer, Italien, Istrien, Syrien.

β) pungens Russel, (= *Sideritis hirsuta* Sbr.).

lanatum Jacq. (= *Eriostomon lanatum* Hffg.).

maritima L. (= *betonicaefolia* P.).

marrubiifolia Vivian. (= *arvensis* β *purpurea* Poir. = *Poiretii* Tenore), andornblättriger, ☉. f. Corsica, Nordafrika.

menthaefolia Visiani, (= *grandiflora* Host), münzenblättriger, 4. f. Dalmatien.

mucronata Sbr., stachelspitziger, 4. ♀. k. f. b. Creta.

Stachys

palustris L. (= *affinis* Bunge, = *angustifolia* Gilib., non MB. = *austriaca* * = *segetum* Hagen).

β) *ambigua* Sm., Rchb. (= *palustri-sylvatica* Schiede).

pubescens Tenore, (= *Balbisii* Lk. = *decumbens* W.

Enum. = *procumbens* W. herb.), weichhaariger, 4. f.

Lucanien, Dalmatien, Spanien.

ramosissima Roch., ästigster, 4. f. ? Ungarn.

recta L. (= *Betonica* Crtz. = *bufonia* Thuill., = *decumbens* Rchb. = *procumbens* Lam. = *Sideritis* Vill. = *sylvestris* Forsk.).

sericea Wall. (= *persica* Gmel. jun.), seidenhaariger, 4. f. b. k. Caucasus, Persien, Mittelasien.

splendens Wall., schimmernder, 4. t. w. Ostindien.

subcrenata Visiani, (= *recta* β Bertol.), wenigkerbiger, 4. f. Dalmatien.

sylvatica L. (= *cordatofolia* Gilib. = *glaucescens* W. herb.), β) *canariensis* Jacq.

tenuifolia Fisch. (non Pall.), dünnblättriger, 4. f. Asiatisches Rußland.

Tournefortii Poir., Tournefort's, 4. f. b. k. Creta.

truncata Kunze, abgestutzter, ♂. f. Chili.

Alopecurus Benth., *Betonica* Benth., non Scopol., *densiflora* Benth., *discolor* Benth., *grandiflora* Benth., *integrifolia* Vahl, *longifolia* Benth., v. *Betonica* *Alopecurus*, *officinalis* cum variet., *hirsuta* et *incana*, *nivea*, *grandiflora*, *heraclea*, *orientalis*, p. 120 et p. 67, II., *decendentata* Forster, v. *Leucas decendentata*, p. 354, II., *speciosa* Hook., v. *Gardoquia elliptica*, p. 254, II. Die übrig. Synonyme s. p. 781.

Stachytarpheta Vahl, Dichtähre.

aristata Vahl, (= *Verbena aristata* Vahl), grannige, ♀. w. Südamerika.

ciliata Kunze, (= *jamaicensis* Hort.), gefranzte, ♂. ♀. w. Jamaika.

crassifolia Schrad., dickblättrige, ♀. w. Brasilien.

dichotoma Vahl, (= *Verbena dichotoma* R. et P. = *V. jamaicensis* L.), zweizinkige, ♀. w. Mexico, Peru.

*elatio*r Schrad. (= *palustris* Jacq. fil.), höhere, ♂. m. w. Brasilien, Guiana.

gibberosa Rchb. (= *jamaicensis* Vahl var.?), höckerige, ♂. w. ?

hirsuta Jacq. fil., rauhhaarige, 4. w. Brasilien.

hirsutissima Lk. (= ? *hirta* H. B. K.).

mutabilis Vahl, (= *rosea* Hort. = *Cymburus mutabilis* Salisb. = *Verbena mutabilis* Jacq.), β) *Zuccagni* R. et S. (= *Zapania mutabilis* Zuccagni).

quadrangula N. E., Mart., vierkantige, ♀. w. Brasilien.

squamosa Vahl, (= *Verbena squamosa* Jacq.), schuppige, 4. w. ?

urticaefolia Sims, (= *Cymburus urticaefolius* Salisb. = *Zapania urticaefolia* Poir.), nesselblättrige, ♂. 4. w. Südamerika. ¹⁾

Stadmannia trijuga Spgl. etc., v. *Melicocca trijuga* etc., p. 607.

Staehelina L., Staehelina.

apiculata LaBill. (= *Lobelii* DC. = *syriaca* Spgl. = *Serratula apiculata* Poir.), kurzspitzige, ♀. k. Libanus.

1) *Stachyurus* Sieb., Zuccar., ? *Pittosporae*, *japonicus* Sieb., Zuccar., wird bis jetzt kaum kultivirt.

Stachelina

dubia L. (= *rosmarinifolia* Cass. = *Serratula conica* Lam. = *S. dubia* Brot.).

fruticosa L. (= *Centaurea fruticosa* L. = *Hirtellina lanceolata* Cass. = *Serratula fruticosa* L.), strauchige, ♀. k. Creta.

alpina Schrk., v. *Saussurea alpina*, p. 734, *elegans* Walt., v. *Liatris elegans*, p. 461.

Stalagmites Murray, *Cambogia* P. (= *cambogioides* Murr. = *ovalifolia* Don), *dulcis* Cambess., *pictorius* G. Don, v. *Xanthochymus ovalifolius*, *dulcis*, *pictorius*, p. 859.

Stanhopea Hook., Lindl., Stanhopea.

aurantiaca Lodd., orangefarbige, 4. w. Südamerika (La Guayra).

aurea Lodd., goldfarbige, 4. w. Guatemala.

Bucephalus Lindl. (= *Anguloa grandiflora* H. B. K., p. 60, = *Epidendrum grandiflorum* H. B. K. pl. aeq.), stierköpfige, 4. w. Quito, Guayaquil.

Devoniensis Lindl. (= *maculosa* Hort. angl. = *Anguloa Hernandezii* Kunth, = *Maxillaria lyncea* Lindl.), Devonshirische, 4. w. Mexico.

eburnea Lindl. (= *grandiflora* Lindl. = *Ceratochilus grandiflorus* Lodd.), var. *gracilis*, *odorata*, *punctata* Hort. Brasilien, Trinidad.

graveolens Lindl., starkkriechende, 4. w. Peru, Guatemala. var. *alba*, *major* Hort.

guttata ? Lindl., getüpfelte, 4. w. Südamerika.

Harrisoniae Lodd., Harrison's, 4. w. Brasilien.

inodora Lindl., geruchlose, 4. w. Mexico.

insignis Frost, Hook. (= *Anguloa grandiflora* Hort. = *Ceratochilus insignis* Lindl.), var. *major*, *punctata*, *speciosa*. Brasilien. Quito.

Lindleyi Zuccar., Lindley's, 4. w. Mexico.

Martiana Batem., Martius's, 4. w. Guatemala, Mexico. β) *bicolor* Lindl.

oculata Lindl. (= *Lindleyi* Batem., non Zuccar. = *Ceratochilus oculatus* Lodd.), var. *Barkeri* Lindl., *minor* Hort.

Ruckerii Lindl., Rucker's, 4. w. Mexico.

saccata Batem., sackförmige, 4. w. Guatemala.

venusta Lodd. (= *Wardii* var. ? Lindl.), liebliche, 4. w. Brasilien.

Wardii Lodd., Ward's, 4. w. Mittelamerika.

In van Houttes Établissement horticole werden noch kultivirt: *calceolata*, *contracta*, *ecornuta*, *odoratissima*, *punctatissima*, *uncinata*.

Stanleya Nutt., Stanleya.

gracilis DC. (= *Cleome laevigata* Soland.), schlanke, ☉. f. Nordamerika.

Stapelia L., Stapelie¹⁾, p. 782.

Sect. I. Stapletonia Endl.

cactiformis Hook., fackeldistelähnliche, 4. ♀. t. w. Südafrika (Namaqualand). (? Sect. III. Podanthes.)

rufescens Salm Dyck, (= *fissirostris* Hort., non Jacq.), fuchsröthliche, 4. ♀. t. w. Cap d. g. Hoffn.

acuminata Mass., *ambigua* Mass., *Asterias* Mass., *comata* Jacq., *concinna* Mass., *deflexa* Jacq., β) *obscura* Endl.

1) Revidirt nach Decaisne in DeCandolle prodromus S. u. r. v. Vol. VIII. p. 658 u. f.

Stapelia

(= *Duvalia deflexa* G. Don), fissirostris Jacq., glanduliflora Mass., grandiflora Mass., hamata Jacq., hirsuta L., juvenula Jacq., lucida DC., multiflora DC., patula W. Enum. (= *sororia* Jacq. var.), pulvinata Mass., reflexa Haw. (= *deflexa* Jacq. et Hortul.), rufa Mass., sororia Mass., spectabilis Haw. (= *grandiflora* Sims, excl. Synon.).

Sect. II. Gonostemon Haw.

divaricata Mass., pallida Wendl., pilifera L. suppl., stricta Sims.

Sect. III. Podanthes Haw.

ciliata Thbg., irrorata Mass., pulchella Mass., pulchra Haw. (= *variegata* Hort. = *verrucosa* Hort., non Mass.), var. β Simsii * (= *verrucosa pulchella* Hort., non Mass.), pulchella Mass., roriflua Jacq., verrucosa Mass.

Sect. IV. Tridentea Haw.

depressa Jacq., gemmiflora Mass., hircosa Jacq. (= *morschata* Haw.), paniculata W. Enum. suppl., rugosa Jacq., Simsii R. et S. (= *vetula* Sims, non Mass.), stygia Haw., vetula Mass.

Sect. V. Tromotriche Haw.

Tigridia Decaisn. (= *revoluta* Sims, non Mass.), tigerstreifige, 4. f. t. w. Cap d. g. Hoffn.
fusca Jacq. (= *glauca* β Haw.), glauca Jacq., obliqua W. Enum. suppl., pruinosa Mass., revoluta Mass.

Sect. VI. Caruncularia Haw., G. Don.

laevis Decaisn. (= *pedunculata* Sims, non Mass. = *Caruncularia Simsii* Sweet), glatte, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

Jacquini (Sweet), (= *pedunculata* Jacq.), Jacquin's, 4. f. t. w. Cap d. g. Hoffn.

aperta Mass., pedunculata Mass., ramosa Mass., serrulata Jacq. (= *Obesia serrulata* Haw.).

Sect. VII. Orbea Haw.

atropurpurea Salm Dyck, schwarzpurpurfarbige, 4. f. t. w. Cap d. g. Hoffn.

dejecta Salm Dyck, herabgeworfene, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

anguina Jacq., bisulca Donn, (= *trisulca* Jacq.), bufonia Jacq., clypeata Jacq., conspurcata W. Enum. suppl., clypeata Jacq., Curtisii R. et S. (= *variegata* Curt.), inodora Haw., lepida Jacq. (= *Podanthes lepida* Haw.), maculosa Jacq., marginata W. Enum. suppl., marmorata Jacq., mixta Mass., mutabilis Jacq. (= *rufa* Mass.), normalis Jacq. (= *bufonia* Bot. mag., Lk. Enum.), orbicularis Andr., Donn, picta Donn, (= *variegata* Jacq.), planiflora Jacq., β) obscura Endl., quinque-nervis R. et S. (Haw.), retusa Haw., variegata L., Wendlandiana R. et S. (= *rugosa* Wendl., non Jacq.), Woodfordiana Haw.

Sect. VIII. Obesia Haw.

decora Mass., geminata Mass.

Sect. IX. Duvalia Haw.

concolor Salm Dyck, einfarbige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.
caespitosa Mass., compacta Haw., elegans Mass., hirtella Jacq., Jacquiniiana R. et S. (= *radiata* Jacq.), mastoides Jacq., radiata Sims, reclinata Mass., replicata Jacq., tuberculata Haw.

Stapelia

Sect. X. Pectinaria.

articulata Mass., mammillaris L. mant.

Weniger genau gekannte Arten:

canescens Haw., caudata Thbg., cordata Haw., crassa Donn, flavicomata Haw., glomerata Haw., hirtella Haw., ?Jacq., hispidula Hornem., laevigata Haw., lanifera Haw., Massoni Haw., melliflua Blanco (Philippinen), ophiuncula Haw., quadrangula Blanco (Philippinen), stellaris Haw.

arida Mass., incarnata L. suppl. etc., v. Piaranthus aridus, incarnatus etc., p. 523, II., barbata W., campanulata W., crispa Hortul., guttata Mass. (= lentiginosa Sims), humilis Mass., ocellata Jacq., reticulata Mass., tubata Jacq. et duodecimifida Jacq., venusta Mass., v. Huernia barbata, campanulata etc., chinensis Lour., v. Hoya carnosa, europaea Guss. (= Gussoneana Jacq. fil.), v. Apteranthes Gussoneana, p. 40, II., umbellata Roxb., v. Bucerosia umbellata, p. 80, II.

Staphylea L. (= Staphylodendrum Scopol.), Pimpernufs. Bumalda DC. (= Bumalda trifolia Thbg.), japanische, ♀. k. Japan.

occidentalis Sw. (= Turpinia occidentalis Sweet), westindische, ♀. w. Westindien.

Starkea W. (= Starkia Juss.) pinnata Nutt., v. Aplopappus spinulosus, p. 68, umbellata W., v. Liabum Brownei, p. 460.

Statice L. (= Limonium Adans., Mill., Mch.), Wegerichnelke.

I. Genuina.

acerosa MB. (= Echinus W. spec. non L.).

aegyptiaca P. (= tripteris Hort. Par.), aegyptische, 4. k. Aegypten.

angustifolia Tausch, (= Limonium L. var.), schmalblättrige, 4. f. Oestr. Litorale.

aristata Sibth., Sm. (= ?echioides W. Enum.), begrannte, 4. ♀. k. Cypern, Creta.

auriculaefolia Vahl, (non Poir. nec Guss.).

β) ramosa Endl.

bellidifolia DC., non Sm. (= cordata Suffr. = S. Limonium γ bellidifolium Gouan), mafsliebenblättrige, 4. f. Südfrankreich, Ungarn.

bicolor Bunge, zweifarbige, 4. f. b. Nordchina.

coralloides Tausch, corallenähnliche, 4. f. Sibirien.

cordata L. (= maritima β Lam. = obtusa Dum.Cours.).

decipiens Ledeb. (= reticulata Sievers, non L.), täuschende 4. f. Altaisches Sibirien.

echioides L. (= aspera Lam. = sibirica Dum.Cours.).

eximia Schrenk, ausgezeichnete, 4. f. Caucasus.

flexuosa L. (= rosea Pall.).

Fortunei Hort. angl., Fortune's, ♀. k. ?China.

furfuracea Rehb. (= cancellata Bernh. = ?pruinosa Forsk. = pubescens DC. var. Sgpl. = rorida Auct.

fl. Dalmat.), kleiige, 4. ♀. f. b. k. Spanien, Dalmatien.

glaucula Less., blaugrüne, 4. f. Sibirien.

globulariaefolia Dsf. (= ramosissima Poir.).

glomerata Tausch, (= spathulata Auct. fl. Sardin.), knaulförmige, 4. f. b. Sardinien.

intermedia Gussone, mittlere, 4. f. Sicilien.

Statice

- lanceolata* Lk., Hffg., lanzettliche, ⚔. k. Portugal.
latifolia Sm. (= *coriaria* Pall. MB. = *coriacea* Hort.).
 b) fol. variegat., β) *caspinga* Endl.
Limonium L. (= *maritima* Lam. = *Limonium vulgare* Mill., Mch.), β) *humile* Mill., γ) *narbonnense* Mill., δ) *limonioides* Bernh.
macrophylla Lk. (= *platyphylla* Hort.).
macrorrhiza Ledeb., großswurzelige, 4. f. Alt. Sibirien.
monopetala L. (= *scabra* Hort. = *suffruticosa* Hort. = *Limoniastrum articulatum* Mch. = *L. siculum* Mill.), β) *angustifolia* Hort. Par., γ) *denudata* Hort. (= *grandiflora* Hort.).
mucronata L. (= *crispa* Dum.Cours. = *speciosa* Hort. non L.).
pruinosa L. (= *aphylla* Forsk.).
pubigera Dsf., wenighaarige, ⚔. k. ?
purpurea L. (= *peregrina* Berg.).
reticulata L. (= *divaricata* Cav. = *echioides* Hort. = *oleaefolia* Host), β) *dictyophora* Tausch.
rosea Sm., rosafarbige, ⚔. t. k. Südafrika.
rupicola Badaro, (= *acutifolia* Rchb. = *minuta* Moretti, non L.), Felsen-W., 4. f. Oberitalien.
rytidophylla Lindl. (= *Dicksonii* Hook. = *grandiflora* Hort.), runzelblättrige, ⚔. k. Cap d. g. Hoffn.
Sibthorpiana Steud. (= *bellidifolia* Sibth., Sm.), Sibthorp's, 4. f. b. k. Griechenland.
spathulata Dsf. (= *cordata* Poir. = *glauca* P.).
squamata Poir., Dsf., schuppige, ⚔. k. Aegypten.
tatarica L. (= *trigona* Pall. = *trigonoides* H. Par. = *Limonium latifolium* Mch. = *L. tataricum* Mill.).
 ?β) *rubella* Gmel.
Thouini Vivian., Hornem. (= *alata* W. = *sinuata* β L. = *Limonium africanum* Mill.), Thouin's, ♂. 4. k. Aegypten.
tubiflora Delil, röhrenblüthige, 4. k. Aegypten.
virgata W. (= *echioides* Hort. = *reticulata* γ W. spec.).
Willdenowiana Poir. (= *auriculaefolia* Poir., non Vahl, = *auriculae-ursifolia* Pourr. = *ocymifolia* Poir. = *oleaefolia* Scop. = *spathulata* W., non Dsf.).
 Unbestimmtere: *alba* Hort., *atrorubra* Hort. (wahrscheinlich zur Gattung *Armeria* gehörig), *auriculata* Hort., *cordifolia* Hort., *dentata* Hort., *echinata* Hort. Gorenk., *Maurocena* Dum.Cours., *molinensis* Hort., *primulifolia* Hort Prag, *rosea* Hort., *Reinwardtii* Hort., *sanguinea* Hort.

II. *Taxanthena* RBr.

- australis* Sgpl. (RBr.), (= *S. taxanthena* Schult.), neuholländische, 4. ⚔. k. t. Neuholland.
alliacea Cav., *alpina* Steud. (= *montana* Mill.), *Armeria* L. et Auct., *denticulata* Bertol. (= *canescens* Hook.), *fasciculata* Vent., *grandiflora* Hort., *hirta* Steud. (= *littoralis* W., non Lk.), *humilis* Steud. (= *caespitosa* β Poir.), *juniperifolia* Vahl, (= *caespitosa* Cav.), *Pseudo-armeria* Murray, (= *cephalotes* Ait.), *littoralis* Steud. (= *Armeria Brotero*), *maritima* Mill. (= *pubescens* Sm. = *caespitosa* Poir. = *linearifolia* a Loisel.), *pinifolia* Brot. (= *capillifolia* Poir.), *plantaginea* All. (= *Pseudo-armeria* Brot. = *cephalotes* Schousb.), *pungens*

Statice

Brotero, *splendens* Lag., v. *Arneria alliacea*, alpina, denticulata, fasciculata, grandiflora, hirta, humilis, juniperifolia, latifolia, littoralis, maritima etc., p. 79 et p. 45, II.

Stauntonia DC., (G. Staunton, engl. Naturforscher, Begleiter des Lord Macartnei nach China), XXII. x. (VI. III.), Menispermaceae.

angustifolia Steud. (= *Holboellia angustifolia* Wall.), schmalblättrige, ♂. Sch. w. Ostindien.

chinensis DC., chinesische, ♂. Sch. t. China.

latifolia Steud. (= *Holboellia latifolia* Wall.), schmalblättrige, ♂. Sch. w. Ostindien.

Staurophragma Fisch. et Mey., Kreuzmaske, XIV. II., Personatae-Verbasceae.

natolicum Fisch. et Mey., natolische, ♂. k. f. Natolien. *Staurospermum verticillatum* Thonn., v. *Mitracarpum senegalense*, p. 412, II.

Stegia Lavatera DC., v. *Lavatera trimestris*, p. 450.

Steenhammara Lilja, (= *Steenhammera* Rehb., Turcz.)

dahurica Turcz., *maritima* Rehb. etc., v. *Mertensia dahurica*, *maritima* etc., p. 399 et 400, II.

Steffensia Kunth, *acutifolia* Kunth, *adunca* Kunth, *ampla* Kunth etc., v. *Piper acutifolium*, *aduncum*, *amplum*, etc., p. 628 et p. 530, II.

Stegania Patersonii RBr., Lk., v. *Lomaria Patersonii*, p. 475.

Steganotropis conjugata Lehm., v. *Centrosema conjugatum*, p. 132, II.

Stegosia cochinchinensis Lour., v. *Rotthoellia exaltata*, p. 701.

Steinheil Decaisne, (A. Steinheil, Pharmaceut, botanisirte früher um Algier, † 1839 auf der Ueberfahrt nach Caracas), V. II., Asclepiadeae.

radians Decaisne, (= *Asclepias radians* Forsk. = *Cynanchum radians* Lam.), strahlende, 4. t. Glückl. Arabien.

Steironema Rafin., *ciliata* Rafin., *longifolia* Rafin., v. *Lysimachia ciliata*, *longifolia*, p. 485—486.

Stelis Sw., *Stelis*.

angustifolia H. B. K. (= *polystachya* W. var.), schmalblättrige, 4. w. Neugranada.

ciliata Lk., Kl., Otto, gefranzte, 4. w. Mexico.

concinna Lindl., nette, 4. w. Peru.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Guiana.

macrostachya ? Lindl., großährige, 4. w. Südamerika.

micrantha Sw. (= *parviflora* P. = *Dendrobium et Epidendrum micranthum* Sw. = *Humboldtia parviflora* R. et P.).

minutiflora Rehb. (= *Pleurothallis minutiflora* Hffg.), winzigblumige, 4. w. Brasilien (Rio Janeiro).

picta ? Lindl. (Hort. Cels.), bemalte, 4. w. Südamerika.

polystachya W. (= *floribunda* H. B. K. = *Humboldtia polystachya* R. et P.), vielährige, 4. w. Südamerika.

lanceolata W., *pulchella* H. B. K., v. *Pleurothallis*

lanceolata et pulchella, p. 540, II., *purpurea* W.,

P., v. *Specklinia linearis*.

Stellaria L., Godron, Sternmiere.

brachypetala Bunge, Ledeb., kurzkrönige, 4. f. Alt. Sibirien.

cerastoides L. (= *elegans* Sering. = *glareosa* Turcz.

Stellaria

= *multicaulis* W. = *Cerastium elegans* Fisch. =
C. stellarioides Hartm. = *C. trigynum* Vill.).

cuspidata W., feinspitzige, 4. t. k. Quito.

florida Fisch., blüthenreiche, 4. f. Kamtschatka.

Laxmanni Fisch., 4. nicht ☉.

peduncularis Bunge, Ledeb. (= *Edwardsii* Cham., Schldtl.),
 langstielige, 4. f. Altaisches Sibirien.

pentagyna Gaud. (= *aquatica* Scop. = *Cerastium aqua-
 ticum* L. = *Malachium aquaticum* Fr.), fünfmannige,
 4. f. Europa.

Reichenbachii Wierzb., Reichenbach's, 4. f. Banat.

Saxifraga Bertol. (= *Cerastium latifolium* Vitm.), stein-
 brechartige, 4. f. Apenninen.

velutina Sering. (= *mollis* Fisch.).

biflora L., v. *Alsine biflora*, p. 38, *viscida* MB.
 (= *anomala* Rchb. = *dubia* DC. = *sabulosa* Fisch.),
 nach Godron richtiger *Cerastium anomalum*.

Hinsichtlich der übrigen s. *Larbrea*, p. 342, II.

Stellaria Hall., Wigg., *autumnalis* Wigg., *interme-
 dia* Wigg., *verna* Wigg., v. *Callitriche autumnalis* etc.

Stellaris Steinh., *parviflora* Steinh., v. *Scilla par-
 viflora*, p. 644.

Stellera Turcz., non L. (Steller, bereiste als Natur-
 forscher Sibirien, Kamtschatka, †), V. II., Contortae-
 Gentianeae.

cyanea Turcz. (= *Anagallidium tetrapetalum* Griseb.
 = *Swertia tetrapetala* Pall.), kornblumenblaue, ☉. f.
 Ostsibirien, Kamtschatka.

Stemmacantha cynaroides Cassin., *ficifolia* Turcz.,
 v. *Rhaponticum cynaroides*, atriplicifol., p. 683.

Stemodia L., Spaltfädler.

bartsioides Benth., Bartsiaähnlicher, 4. ♀. t. k. Mexico.
durantifolia Sw. (= *verticillaris* Lk., p. 786, = *Ca-
 praria durantifolia* L. = *Conobea verticillaris* Spgl.
 = *C. viscosa* Schrk.).

Ehrenbergiana Schldtl. (= *durantifolia* Hort.), Ehren-
 berg's, ♂. t. k. Mexico.

hyptoides Cham., Schldtl., Hyptisähnlicher, 4. w. Brasilien.

lanata R. et P. (= *Erinus tomentosus* Mill. = *Herpestis
 tomentosa* Cham., Schldtl.), wolliger, 4. t. Mexico.

lobelioides Lehm. (= *Gratiola tetragona* Hook. = *G.
 Hookeri* Walp.)

parviflora RBr. in Ait. Kew. (= *arenaria* H. B. K. =
Erinus verticillatus Mill. = *Conobea ovata* Hort. =
C. pumila Spgl. = *Capraria humilis* Soland.).

senegalensis Dsf., senegalscher, ☉. w. m. f. Senegambien.
muraria Roxb., v. *Lindenbergia urticaefolia*, p. 882,
minuta G. Don, v. *Vandellia scabra*.

Stemona Lour., *Stemona*, VIII. I., Roxburghiaceae.

tuberosa Lour. (= *Roxburghia Stemona* Steud. = *R.
 viridiflora* Hort.), knollige, 4. ♀. Kn. w. China, Ostind.

Stenactis Cassin., Schmalstrahl.

annua Cass. (= *dubia* Cass. = *Aster annuus* L. =
Diplopappus dubius Cass. = *Erigeron annuum* Richt.
 = *Phalacrocoma annuum* Dumort. = *Pulicaria an-
 nua* G. = *P. bellidifolia* Wallr.).

strigosa DC. (= *Doronicum ramosum* Walt. ? = *Erigeron
 australe* Hornem. = *Erigeron strigosum* Mhlbg.),
 striegeliger, ♂. f. Nordamerika.

Stenactis

verna N. E. (= *Aster vernus* L. = *Doronicum laevifolium* Walt.? = *Erigeron nudicaule* Mchx.), Frühlings-S., 4. f. Carolina, Georgien.

alpina Cass., v. *Erigeron alpinum*, *Beyrichii* Fisch. et Mey., v. *Phalacrocoma Beyrichii*, p. 507, II., *delphinifolia* Cass., v. *Polyactidium delphinifolium*, p. 641 et 546, II.

Stenanthium A. Gray, Schmalkrönchen, VI. III. (XXII. I.), Melanthaceae-Veratreae.

angustifolium A. Gray, (= *Helonias graminea* Bot. mag. = *Veratrum angustifolium* Pursh, = *Xerophyllum gramineum* Nutt., p. 837), schmalblättriges, 4. f. b. Nordamerika.

Stenocarpus RBr., Schmalbalgkapsler.

Cunninghamii RBr., Cunningham's, ♂. ♀. k. t. Neuholl.

Forsteri RBr. (= *Cybele umbellifera* Knight. et Salisb. = *Embothrium umbellatum* L. fil. = *E. umbelliferum* Forst.), Forster's, ♂. ♀. k. t. Neuceledonien.

salignus RBr. (= *Hakea rubricaulis* Hort. Cels., Colla).

Stenochilus RBr., Dünnlippler.

incanus Lindl., weißgrauer, ♂. t. Neuholland.

racemosus Endl., traubiger, ♂. t. Neuholland.

Stenocoelium athamantoides Ledeb., *divaricatum* Turcz., v. *Rumia athamantoides* et *seselioides*, p. 619 et 620 II.

Stenomesson Herb., Dünnschwertel(röhre).

aurantiacum Herb. (= *Chrysiphiala aurantiaca* Schult. = *Pancratium aurantiacum* H. B. K.), orangefarbiger, 4. Zw. w. Quito.

coccineum Herb. (= *croceum* Hort. = *Chrysiphiala crocea* Loud. = *C. coccinea* Schult. = *Pancratium coccineum* R. et P. = *P. croceum* Red., Savign. = *P. limense* Mus. Par.), scharlachfarbiger, 4. Zw. w. Peru.

curvidentatum Herb. (= *Chrysiphiala curvidentata* Herb. p. 124, = *Sphaerotele peruviana* Auct. = *Pancratium Herbertianum* Speg. = *P. curvidentatum* Hort.).

β) *pauciflorum* Sweet, (= *Chrysiphiala pauciflora* Lindl., p. 194).

flavum Herb. (= *Chrysiphiala flava* Ker, Lindl., p. 194, = *Pancratium flavum* R. et P.).

Hartwegii Lindl., Hartweg's, 4. Zw. w. Centralamerika. (An der Hacienda del Ixo bei dem Aufsteigen zum Antisana.)

rubrum Herb. (= *Pancratium rubrum* Pav.), rother, 4. Zw. w. Peru.

vitellinum Lindl. (= *Chrysiphiala vitellina* Ker), dottergelber, 4. Zw. w. Lima.

latifolium Herb., v. *Chrysiphiala latifolia*, p. 142, II.

Stenorrhynchus Rich., Schmalschnabel.

flavum Rich. (= *Neottia flava* Sw. = *Serapias flava* Sw.), hellgelber, 4. w. Jamaica.

lanceolatum Rich. (= *Limodorum lanceolatum* Aubl. = *Neottia lanceolata* W.), lanzettlicher, 4. w. Westindien.

Stenosiphon Spach, Schmalröhre, VIII. I., Onagrariae.

linifolius * (= *virgatus* Spach, = *Gaura linifolia* Nutt.), leinblättrige, ♂. Nordamerika, Texas.

Stenospermum Sweet, *capitatum* Sweet etc., v. *Kunzea capitata* etc., p. 337, II.

- Stenosolenium** Turcz., Schlankröhre, V. I., Asperifoliaceae (Borragineae).
saxatile Turcz. (= *Anchusa saxatilis* Pall. = *Lycopsis saxatilis* Turcz. = *Onosma saxatile* Lehm.), Gestein's, ♂. f. Sibirien, Dahurien, Nordchina.
- Stenostomon** G. fil., DC., Schmalschlund, V. I., Rubiaceae.
lucidum G. fil. (= *Guettarda lucida* P. = *Laugeria lucida* Sw. = *Sturmia lucida* L. fil.), spiegelunder, ♀. w. Caribäen.
tomentosum DC. (= *Guettarda tomentosa* P. = *Laugeria tomentosa* Sw.), filziger, ♀. w. Jamaika.
- Stenotaphrum** Trin., Schmallolch, III. II., Gramineae.
glabrum Trin. (= *americanum* Schrk. = *sarmentosum* N. E. = *Ischaemum secundum* Walt. = *Rottboellia dimidiata* Thbg., L. fil. = *R. stolonifera* Poir. = *R. tripsacoides* Lam.), kahler, 4. w. Südasiens, Südafrika, Südl. Amerika.
 β) *complanatum* Schrk. (= *Panicum dimidiatum* L. = *Rottboellia complanata* Sw.).
Stenotheca Monn., *mariana* Monn., *venosa* Monn., v. *Hieracium marianum*, *venosum*, p. 879.
Stephananthus junceus Lehm., v. *Baccharis juncea*, p. 57, II.
Stephania cleomoides W., v. *Steriphoma paradoxum*.
- Stephanocarpus** Lk., Kunth, Kronenfrüchtchen.
Ehrenbergii Lk., Kunth, Ehrenberg's, ☉. f. Aegypten.
Stephanocarpus monspeliensis Spach, v. *Cistus monspeliensis*, p. 201.
Stephanocoma atriplicifolium Turcz., v. *Rhaponticum atriplicifolium*, p. 683.
- Stephanotis** Pet. Thouars, Krönchenblume, V. I. (II.), Asclepiadeae.
acuminata A. Brongn., zugespitzte, ♀. Sch. w. Madagascar.
floribunda A. Brongn., blüthenreiche, ♀. Sch. w. Madagasc.
grandiflora Decaisne, (= *Lisianthus grandifl.* Bréon), großblumige, ♀. Sch. w. Madagascar.
Thouarsii A. Brongn., Thouars's, ♀. Sch. w. Madagascar.
Isaura Decaisn. (= *Isaura Allicia* Commers. = *Ceropegia Stephanotis* Poir.), Madagascar, scheint nicht kultivirt zu werden.
- Sterculia** L., Stinkmalve(baum).
acuminata P. B. (= *Cola acuminata* Schott, Endl.).
Blumei G. Don, (= *lanceolata* Blume, non Cavan.), Blume's, ♀. w. Java.
Chicha St. Hil. (= *Chichaea* Presl), Chicha-St., ♀. w. Brasilien.
colorata Roxb. (= *Erythropsis Roxburghiana* Schott, Endl.).
heterophylla P. B., non Cunningh. (= *Cola heterophylla* Schott, Endl.), verschiedenblättrige, ♀. w. Tropisches Afrika (Oware).
inops Schott, brasilianische, ♀. w. Brasilien.
macrophylla Vent. (= *cordata* Blume, = *Hildegardia macrophylla* Schott, Endl.), großblättrige, ♀. w. Ostind.
nitida Vent. (= *Cola nitida* Schott et Endl.), glänzende, ♀. w. Tropisches Afrika.
nobilis Sm. (= *Balanghus* Ait. ed. 2. = *monosperma* Vent. = *Southwellia nobilis* Salisb.).
platanifolia L. fil. (= *Firmiana chinensis* Medic. = *F. platanifolia* Schott et Endl. = *Hibiscus simplex* L.).

Sterculia

rubiginosa Vent. (= *Balanghas* L. = ? *urceolata* Sm.),
rostfarbige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

urens Roxb. (= *Cavallium urens* Schott et Endl.).

Stereospermum Cham., Hartsaame, XIX. II., Bignoniacae.

chelonoides DC. (= *Bignonia chelonides* L. fil.), schildblumenähnlicher, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Stereoxyton R. et P., *resinosum* R. et P., *rubrum* R. et P. etc., v. *Escallonia resinosa*, *rubra* etc. — *crenulatum* R. et S., *ciliatum* Poir., v. *Schidiomyrtus crenulata* et *microphylla*, p. 640, II.

Sterigma DC., Sterigma.

belichrysiifolium DC. (= *Cheiranthus aureus* W. herb. = *C. lanatus* Gmel.), strohblumenähnliches, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Armenien, Persien.

Steriphoma Speg., Kapperling, VI. I., Capparideae.

paradoxum Endl. (= *cleomoides* Speg. = *Capparis paradoxo* Jacq. Hort. Schönbr. = *Stephania cleomoides* W.), wunderbarer, $\frac{1}{2}$ w. Caracas.

Sternbergia W. K., Sternbergie.

aetnensis Schult. (= *colchiciflora* Gussone, non W. K.), aetnaische, $\frac{1}{2}$ Zw. f. Sicilien.

citrina Ker, (= *Amaryllis citrina* Sibth., Sm. = *Oporanthus citrinus* Herb.), citronengelbe, $\frac{1}{2}$ Zw. f. Griechenl. *americana* Hffg., v. *Haylockia pusilla*.

Stevia Cavan., Stevie.

breviaristata Hook., Arn., kurzgrannige, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

conferta DC., gedrängtblumige, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

α) *capitata* Schlttl., β) *corymbosa* Schlttl., γ) *ramosa* Schlttl.

connata Lagasca, (= *glabrata* Moç., Sess.).

dissoluta Schlttl., aufgelöfste, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

Eupatoria W. (= *hyssopifolia* Cav. = *punctata* P. = *Ageratum punctatum* Ortega, non Jacq. = *Mustelia Eupatoria* Speg.).

glandulifera Schlttl. (= *latifolia* Benth. = *trachelioides* Hook.), drüsentragende, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

hirsuta DC., rauhhaarige, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

Karwinskyana Steud. (= *lanceolata* Walp., non Lag.), Karwinsky's, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

leucantha Schlttl., weifsblumige, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

lucida Lagasca, (= *hymenopappa* Moç. = ? *Ageratum viscosum* Ortega).

origanoides H. B. K., dostenähnliche, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

ovata Lagasca, (= *paniculata* Hort. Par., non Lag.).

paniculata Lagasca, (= *hyssopifolia* Sims, non Cav.).

purpurea P. (= *St. Eupatoria* Bot. reg. = ? *stricta* Hornem.).

pyrolaefolia Schlttl., Wintergrünblättrige, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

salicifolia Cavan. (= *sempervirens* Tenore, = *Ageratum viscosum* Ortega).

tomentosa H. B. K. (= *mollis* Schrad. = *nepetaefolia* Berland., non H. B. K.).

trachelioides H. B. K., halskrautähnliche, $\frac{1}{2}$ k. Mexico.

viminea Schrad. (= *longifolia* Moç.).

viscida H. B. K. (= *villosa* Moç., Sess. = *viscosa* Hort. = *Ageratum purpureum* Moç., Sess.).

callosa Nutt., *pedata* Cav., v. *Florestina callosa* et *pedata*, p. 245, II.

Stewartia Auct. v. *Stuartia*, p. 791.

Stiftia Mikan, *Stiftie*, p. 788.

chrysantha Mikan, (= *insignis* Fisch. = *Augusta grandiflora* Leand. = *Mocinia mutisioides* DC. = *Plazia brasiliensis* Spgl.), goldfarbige, ⚔. w. t. Brasilien.

parviflora Don, (= *Augusta parviflora* Leand. = *Plazia parviflora* Spgl.), kleinblumige, ⚔. w. t. Brasilien.

Stigmarota africana Lour., v. *Flacourtia* Ramontchii.

Stigmatophyllum A. Juss., A. St. Hil. (= *Stigmatophyllum* Lindl.), Narbenblatt.

ciliatum Juss. (= *Banisteria ciliata* Lam. = *B. nitida* Arrab.), gefranztes, ⚔. ⚔. Sch. w. Brasilien.

Gayanum Juss., Gay's, ⚔. ⚔. Sch. w. Brasilien.

heterophyllum Hook., verschiedenblättriges, ⚔. ⚔. Sch. w. Tucuman.

jatrophaefolium A. St. Hil. et A. Juss., brechnußblättriges, ⚔. ⚔. Sch. w. Brasilien.

Stilago Bunius L., v. *Antidesma* Bunius, p. 40, II.

Stilbe L., *Stilbe*, IV. 1., Globulariaceae-Stilbinae.

ericoides Thbg. (= *Lühea ericoides* Schm. = *Selago ericoides* L.), heideähnliche, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Pinastra L. (= *vestita* Berg. = *Selago Pinastra* L.), kieferähnliche, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Stilligia Gard., L., *Stilligie*.

fruticosa Mchx. (= *frutescens* Bosc), strauchige, ⚔. ⚔. f. Nordamerika.

Stilpnophytum Less., *Glanzkraut*, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

linifolium Less. (= *Tanacetum linifolium* Thbg.), flachblättriges, ⚔. k. Cap d. g. Hoffn.

Stipa L., *Pfriemengras*.

I. *Genuina*.

altaica Trin., Ledeb., altaisches, 4. f. Altaisch. Sibirien.

barbata Dsf., bartiges, 4. f. Nordafrika.

capillata L. (= *erecta* Hort. Madrit. = *juncea* β Lam.).

Lagascae R. et S. (= *juncea* β Dsf. = *pubescens* Lagasc.).

splendens Trin. (= *Agrostis longiaristata* Hrbr. ross. = *Lasiagrostis splendens* Kunth).

II. *St. Calamagrostis* Whlbg. v. *Lasiagrostis*

Calamagrostis, p. 343, II.

canadensis Poir. (= *juncea* Mchx., non L., *ovata* Trin. (= *panicoides* Lam. = *setacea* Mchx., Rich.),

v. *Oryzopsis parviflora* et *setacea*, p. 462, II.

Stipularia Haw., non P. B., *capensis* Haw., *marina* Haw. etc., v. *Spergularia capensis* etc.

Stirlingia Endl. (= *Simsia* RBr.), *Stirlingie*, IV. 1., Proteaceae.

anethifolia Endl. (= *Simsia anethifolia* RBr.), dillblättrige, ⚔. t. k. Neuholland.

latifolia Steud. (= *Simsia latifolia* RBr.), breitblättrige, ⚔. t. k. Neuholland.

simplex Lindl., einfache, ⚔. t. k. Neuholland.

tenuifolia Steud. (= *Simsia tenuifolia* RBr.), dünnblättrige, ⚔. t. k. Neuholland.

Stiza erioloba E. Mey., v. *Lebeckia pungens*, p. 347, II.

Stizolobium bulbosum Spgl., v. *Pachyrrhizus angulatus*, p. 580.

Stizolophus balsamitaefolius Cass., *coronopifolius* Cass., v. *Centaurea Balsamita* et *coronopifolia*, p. 176—177.

Stobaea Thbg., Stobaea.

fruticosa Bartl., strauchige, ⚥. k. t. Cap d. g. Hoffn.
heterophylla Thbg., verschiedenblättrige, 4. ⚥. k. t.
Cap der guten Hoffnung.

β) radiata DC.

glomerata Spgl., v. Platycarpha glomerata Nachlese,
pinnata Thbg., v. Berkheya pinnata Nachlese.

Stoebe L., Stoebe.

incana Thbg. (= aethiopica Sieb., non L.), weifsgraue,
⚥. k. t. Cap d. g. Hoffn.

alopecuroides Sieb., non Less. (= cinerea Thbg.),
artemisioides E. Mey., plumosa Thbg., virgata Thbg.
(= fasciculata Cass.), v. Seriphium cinereum, ver-
miculatum, plumosum et var. β, p. 659, II., ericoi-
des Berg., v. Disparago seriphioides Nachlese, re-
flexa Thbg., v. Trichogyne reflexa, ?subulata Sm.
(= cinerea Sbr., non Thbg. = mucida E. Mey.),
v. Elytropappus ambiguus, p. 220, II.

Stoechas Mill., dentata Mill., officinarum Mill., pe-
dunculata Mill., v. Lavandula dentata, Stoechas,
pedunculata, p. 449 et p. 346, II.

Stramonium T., Scop., Mch., G., arboreum Mch.,
fastuosum Mch., foetidum Scop., All. (= spinosum
Lam. = vulgatum G.) etc., v. Datura arborea,
fastuosa, Stramonium etc.

Stratiotes alismoides L., v. Damasonium indicum,
nymphoides W., v. Hydrocleis Humboldtii, p. 308, II.

Stravadium acutangulum Juss., Loud. (= coccineum
DC. = rubrum P.), racemosum Sweet, v. Barring-
tonia acutangula et racemosa, p. 60—61, II.

Streblocarpus oblongifolius Arn., v. Niebuhria ob-
longifolia, p. 436, II.

Streblorrhiza speciosa Endl., v. Clianthus pictus,
p. 150, II.

Strelitzia Banks, Ait., Strelitzie.

glauca Rich., blaugrüne, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

humilis Lk. (= pumila Hort.).

lanceolata Hort., lanzettblättrige, 4. w. Cap d. g. H.

macrophylla Hort., großblättrige, 4. w. Cap d. g. H.

Principis Andr. (= angustifolia Dryandr. var. Spgl.),

fürstliche, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

teretifolia Barrow, stielrundblättrige, 4. w. Cap d. g. H.

Letztere scheint nicht kultivirt zu werden.

Strepsia usneoides Nutt., v. Tillandsia usneoides,
p. 811.

Streptachne Calamagrostis Dumort., v. Lasiagrostis
Calamagrostis, p. 343, II.

Streptocarpus Lindl., Drehfrucht, XIV. II., Gesne-
riaceae-Cyrtandreae.

Hilsenbergii RBr., Hilsenberg's, ♂. 4. w. Madagascar.

Rexii Lindl. (= Didymocarpus Rexii Bowie, Hook. =

Henckelia Rexii *), Rex's, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Streptopus Mch., Drehfufs, Samentaceae-Smilaceae
(Melanthaceae, Liliaceae Alior.).

Sect. I. Genuin.

amplexifolius DC. (= amplexicaulis Poir. = distortus
Bess. = Uvularia amplexicaulis Mill. = U. amplexi-

folia L. = U. distorta Hort.).

β) distortus Mchx.

StreptopusSect. II. *Hexorima* Rafin. (= *Hektorima* Auct.).*candidus* Wall. (= *simplex* Don), reinweißser, 4. k. Nepal.
roseus Mchx. (= *Hexor. dichotoma* Rafin. = *Uvularia rosea* P.).*chinensis* Sm., *peduncularis* Sm., v. *Disporum fulvum*
et *Pitsutum*, p. 208, II., *lanuginosus* Mchx., v. *Pro-*
sartes lanuginosa, p. 561, II.**Strobilanthes** Blume, Zapfenblümchen, XIV. II.,
Acanthaceae.*glabrata* N. E. (= *Ruellia glabrata* Wall.), kahles, ♀.
w. Ostindien.*Sabiniana* N. E. (= *Ruellia Sabiniana* Wall.).**Strobilocarpus** Kl., Zapfenfrüchtler, IV. I., Santalaceae.
diversifolius Kl., verschiedenblättriger, ♀. ♀. k. Cap
d. g. Hoffn. (Kaum kultivirt?)**Strobilorhachis** Kl., Zapfenspindel, ? ?*glabra* Kl., kahle, ♀. w. ?**Strophanthus** DC., Drehblüthler.*divergens* Grah. (= *dichotomus* β *chinensis* Ker, = *di-*
varicatus Hook., Arn. = *Emericia divaricata* R. et S.
= *Nerium chinense* Hunter, = *Pergularia divaricata*
Lour. = *Periploca divaricata* Sogl.).*Wallichii* A. DC. (= *dichotomus* Wall. = *dichot. γ* *coro-*
mandelianus Ker), Wallich's, ♀. w. Ostindien.**Strophostoma** Turcz. v. *Myosotis* Sect. III. p. 425, II.
Strophostyles Ell., *helvola* Ell., v. *Phaseolus helvo-*
lus, p. 613.*Struchium* RBr., Juss., *americanum* Poir., v. *Spar-*
ganophorus Vaillantii, p. 774.**Strumaria** Jacq., Kropflilie, p. 790.Sect. I. *Genuina*.*angustifolia* Jacq., *linguaefolia* Jacq., *rubella* Jacq., *trun-*
cata Jacq., *undulata* Jacq.Sect. II. *Imhofia* Herb. (Baron Imhof, ein unbe-
kannter deutscher Botaniker †).*Burchelliana* Herb., Burchell's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.
 β) *viridescens* Herb.*crispa* Ker, (Herb.), (= *Amaryllis cinnamomea* Mill.,
L'Her. = *A. crispa* Jacq.), *filifolia* Jacq. (Herb.),
(= *Crinum tenellum* L. fil. = *Leucojum strumosum*
Soland.), *gemmata* Ker, Sims, (Herb.), *marginata* Herb.
(= *Amaryllis marginata* Jacq. = *Brunsvigia margi-*
nata Ker, p. 135).*spiralis* Ker, *stellaris* Ker, v. *Hessea spiralis* (= *bre-*
visflora Herb.) et *stellaris*, p. 297, II.**Struthiola** L., Straufsstrauch.*argentea* Lehm., silberfarbiger, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.*erecta* L. (= *glabra* L. = *juniperina* Retz, = *pendula*
Salisb. = *subulata* Lam. = *tetragona* Retz, =
Nectandra tetrandra Berg. = *Passerina dodecandra*
L. = *P. filiformis* Mill. = *P. tetragona* L.).*glauca* Lodd., blaugrüner, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.*imbricata* Andr. (= *lateriflora* Hornem. = *striata* Lam.
= *sulcata* Schm.).*longiflora* Lam. (= *virgata* L. var. ? Wickstr.), lang-
blumiger, ♀. t. k. Cap d. g. Hoffn.*stricta* Donn, (= *erecta* Curt., non L.), steifer, ♀. t. k.
Cap der guten Hoffnung.

Struthiola

virgata L. (= *ciliata* Andr. = *erecta* β Thbg. = *incana* Lodd. = *tuberculosa* et *villosa* Vahl herb. = *Passerina Zeyheri* Spgl.).

Unbestimmtere: *laxa* Hort., *oppositifolia* Hort. angl., *superba* Hort. angl.

Strychnodaphne puberula N. E., v. *Ocotea puberula*, p. 443, II.

Strychnos L., Krähenaugenbaum.

colubrina L., p. 791.

potatorum L. (= *Tetankotta* Retz, = *Caniram Tetankotta* Pet. Thouars).

spinosa Lam. (= *Caniram Vontac* Pet. Th.).

triplinervia Mart. (= *Gardenia trinervis* Vellozo), dreifachnerviger, $\frac{5}{4}$ w. Brasilien.

Stuartia L., Stuartie, p. 791.

Malachodendron L. (= *marylandica* Andr. = *virginica* Mchx., Cav.).

monadelpha Sieb., Zuccar., einmännige, $\frac{5}{4}$ k. f. b. Japan. (Ob eingeführt?)

corchoroides Forsk., v. *Sida spinosa*, p. 753 et p. 663, II., *dentata* Hort. =?, *pentagyna* L'Her., v.

Malachodendrum ovatum, p. 489.

Stubendorfia Schrenk, Stubendorfie, XV. I., Cruciferae-Isatideae.

orientalis Schrenk, orientalische, \odot . $\frac{5}{4}$ f. Asiat. Rußland.

Sturmia Rchb. (= *Liparis* Rich., Lindl.), Sturmie.

elata (Lindl.), (= *L. bituberculata* Lindl. = *Cymbidium bituberculatum* Hook. = *C. veratrifolium* Wall.).

elegans (Lindl.), zierliche, $\frac{4}{4}$ w. Ostindien.

foliosa (Lindl.), (= *L. reflexa* Lindl. = *Cymbidium reflexum* RBr.).

gregaria (Lindl.), (= *L. disticha* Lindl. = *Malaxis* Pet. Th. = *Stelis micrantha* Sbr. herb. maur., non Sw.), heerdige, $\frac{4}{4}$ w. Mascarenas, Zeylon.

Sturmia Hoppe, *minima* Hoppe, v. *Mibora verna*, p. 404, II.

Sturmia lucida G. fil., v. *Senostomum lucidum*, p. 705, II.

Stylandra pumila Nutt., v. *Podostigma pubescens*, Nachlese.

Stylidium Sw., Säulenblümchen.

bellidifolium Sonder, mafsliebenblättriges, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuh.

Brunonianum Benth., Brunon's, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

bulbiferum Benth. (= *recurvum* Grah.), zwiebeltragendes, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ Kn. t. Neuholland.

carnosum Benth., fleischiges, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

ciliatum Lindl., gewimpertes, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

coccineum v. Houtte, scharlachfarbiges, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuh.

Drummondii Grah., Drummond's, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

fruticosum RBr. (= *glandulosum* Salish.).

glaucum RBr. (= ? *Candollea glauca* LaBill.), blaugrünes, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

graminifolium Sw. (= ? *canaliculatum* Poir. = *lineare* Sieb., non Sw. = *serrulatum* Rich. = *Candollea serrulata* LaBill. = *Ventenatia major* Sm.).

latifolium v. Houtte, breitblättriges, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

Lehmannianum Sonder, Lehmann's, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ t. Neuholland.

lineare Sw. (= ? *planifolium* Poir. = *Ventenatia minor* Sm.).

Stylidium

- longifolium* Rich. (= *pilosum* Poir. = *Candollea pilosa* LaBill.), langblättriges, 4. ⚥. t. Neuholland.
paniculatum Sonder, rispiges, 4. ⚥. t. Neuholland.
spathulatum RBr., spatelblättriges, 4. ⚥. t. Neuholland.
spicatum v. Houtte, ähriges, 4. ⚥. t. Neuholland.
stipitatum Benth. (= *Coleostylis umbellulata* Sonder), kurzstieliges, 4. ⚥. t. Neuholland.
violaceum RBr., violettes, 4. ⚥. t. Neuholland.
Stylidium (= *Stylis* Poir.) *chinense* Lour., v. *Marlea begoniaefolia*, p. 497.
Stylimnus maritimus Rafin., v. *Pluchea marylandica*, p. 541, II.

Stylisma Rafin., Säulenwinde, V. I., Convolvulaceae.

- evolvuloides* Choisy, (= *Convolvulus patens* Desr. = *C. trichosanthes* Mchx.), faltenblumenähnliche, ☉. 4. f. Nordamerika.

Stylocoryna Cav., Spgl., Säulenröthe, V. I., Rubiaceae.

- Webera* Rich. (= *Canthium corymbosum* P. = *Cupia corymbosa* DC. = *Gardenia Pavetta* Roxb. = *Pavetta Wightiana* Wall. = *Polyozus maderaspatanus* DC. = *Rondeletia asiatica* L. = *Tarennia zeylanica* G. = *Webera cerifera* Moon, = *W. corymbosa* W., p. 856, = *W. zeylanica* Dav. Dsf.), traubendoldige, ⚥. w. Ostindien.

Stylophorum Nutt., Spgl., *cambricum* Spgl., *crassifolium* Steud., *heterophyllum* Steud., v. *Meconopsis cambrica* etc., p. 551.

Stylurus Knight et Salisb., non Rafin., *buxifolia* Kn. et Salisb. (= *collinum* Kn. et Salisb.), v. *Grevillea buxifolia*.

Stypandra RBr., Stielaffodile.

- imbricata* RBr. (= *Arthropodium imbricatum* Spgl.), ziegeldachförmige, 4. k. t. Neuholland.
grandiflora Lindl., großblumige, 4. k. t. Neuholland, (Schwanenflufs).
scabra RBr. (= *Arthropodium scabrum* Spgl.), scharfe, 4. k. t. Neuholland.

Styphelia Sm., Starrstrauch.

- angustifolia* DC., schmalblättriger, ⚥. t. Neuholland.
reflexa Rudge, non Spgl., zurückgebogener, ⚥. t. Neuh.
tenuifolia Lindl., dünnblättriger, ⚥. t. Neuh. (Schwanenfl.).

Außer diesen u. d. p. 792 verzeichneten wird in den Gärten noch eine *St. laxiflora* kultivirt.

abietina LaBill., *Oxycedrus* LaBill., v. *Cyathodes abietina* et *Oxycedrus*, p. 177, II., *acuminata* Spgl., *affinis* Spgl., *amplexicaulis* Rudge, *appressa* Spgl., *collina* LaBill., *cuspidata* Spgl., *ericoides* Sm., *fastigiata* Spgl., *imbricata* Spgl., *juniperina* Spgl. etc., v. *Leucopogon acuminatus*, *affinis*, *amplexicaulis* etc., p. 459 et p. 355, II., *elliptica* Sm., *glauca* LaBill., *scoparia* Sm., v. *Monotoca elliptica*, *lineata* et *scoparia*, p. 529, *cordata* LaBill., *divaricata* Spgl., *ovalifolia* Spgl. etc., v. *Acrotriche cordata* etc., p. 17, *denticulata* Spgl., *humifusa* P. (= *serrulata* LaBill.), v. *Astroloma denticulat.* et *humifus.*, p. 104, *daphnoides* Sm., *strigosa* Sm., v. *Lissanthe daphnoides* et *strigosa*, p. 469, *pinifolia* Spgl., v. *Stenantha pinifolia*, p. 787.

Styphnolobium Schott, Sauerhüslers, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae-Sophoreae.

— affine Walpers, (= *Sophora affinis* Torr. et Gr.), ähnelnder, ♀. f. Nordamerika (Arkansasgebiet).

— japonicum Schott, (= *Sophora japonica* L. mant., p. 772, = *S. sinica* Hort.), e) pubescens * (= *Sophora pubescens* Tausch).

— *Styrandra bifolia* Rafin., *canadensis* Rafin., v. *Smilacina bifolia*, *canadensis*, Sect. II. p. 764.

Styrax T. Storax.

— Benzoin Dryand. (= *Benzoin officinale* Hayne, = *Laurus Benzoin* Houtt., non L. nec W.), Benzoingebender, ♀. w. Sumatra, Java.

— ferrugineum Pohl, rostfarbiger, ♀. w. Brasilien.

— laevigatum Ait. (= *americanum* Lam., Rich. = *glabrum* Cav., Mchx., non Sw. = *laeve* Walt.).

Suaeda Pall., (Vielkelch), Steppenmelde.

— altissima Pall. (= *Chenopodium altissimum* L. = *Ch. filiforme* Mch. = *Cochliospermum altissimum* Lag. = *Lerchea altissima* Medic. = *Salsola altissima* L. = *Schanginia altissima* C. A. Mey., p. 729, = *Schoberia altissima* C. A. Mey.).

— baccifera Pall. (= *Enchylaena Borysthenis* Spgl. = *Salsola baccifera* Schrad. = *Schoberia baccifera* C. A. Mey.), beerentragende, ☉. f. Am Borysthenes.

— Biebersteiniana * (= *Chenopod. Biebersteinianum* Schult. = *Ch. crassifolium* MB. = *Ch. villosum* Spgl. = *Schoberia Biebersteiniana* C. A. Mey., p. 730).

— Clemente * (= *Chenopodium Clemente* Spgl. = *Cochliospermum Clemente* Lagasca, p. 209, = *Schoberia Clemente* Steud.).

— crassifolia * (= *Chenopodium crassifolium* Dsf. = *Cochliospermum Cavanillesii* Lag., p. 209, = *Salsola sativa* Cav.).

— dendroides * (= *Chenopodium fruticosum* MB. = *Ch. microphyllum* MB. = *Salsola fruticosa* MB. = *Schoberia dendroides* C. A. Mey.), baumähnliche, ♀. f. Caucasus.

— filiformis Dumort. (= *Chenopodium filiforme* Dumort., non Mch. = *Schoberia Dumortieri* Steud.), fadenförmige, ☉. f. Belgien.

— fruticosa Forst. (= *Chenopod. fruticosum* Mch., Schrad. = *Lerchea fruticosa* Mch. = *L. obtusifolia* Hall. = *Salsola fruticosa* L. = *Schoberia fruticosa* C. A. Mey.).

— hortensis Forsk. (= *Chenopodium hortense* Schult. = *Salsola divergens* Poir. = *S. hortensis* Dsf. = ? *S. trigyna* Cav. = *Schoberia hortensis* Steud.).

— maritima Moq. Tand., Dumort. (= *chenopodioides* Pall. = *Chenopod. marit.* L. = *Salsola marit.* MB. = *Schoberia maritima* C. A. Mey., p. 730).

— microphylla Pall. (= *Chenopod. parvifolium* Schult. = *Schoberia microphylla* C. A. Mey., p. 730).

— Pallasiana * (= *crassifolia* Pall. = *Chenopod. Pallasian.* Schult. = *Schoberia Pallasiana* C. A. Mey., p. 730).

— physophora Pall. (= *Enchylaena physophora* Spgl. = *Salsola physophora* Schrad. = *Schoberia physophora* C. A. Mey.), blasentragende, ♀. f. Gegend des caspischen Meeres.

— prostrata Pall. (= *Chenopod. prost.* Schult. = *Schoberia prostrata* C. A. Mey.), gestreckte, ☉. f. Mittelasien.

- Suaeda** (= *Chenopodium maritimum* β MB. = *Ch. salsum* Schult. = *Cochliospermum salsum* Lag. = *Lerchea salsa* Medic. = *Salsola salsa* L.).
- setigera* Moq. Tand. (= *Chenopod. setigerum* DC. = *Salsola sativa* Cav. = *S. setigera* Lag. = *Schoberia setigera* C. A. Mey., p. 730).
- spicata* * (= *Chenopod. spicat.* Schult. = *Salsola salsa* Cav. = *S. spicata* W. = *S. strobilifera* Hort. = *Schoberia spicata* C. A. Mey., p. 730).
- albida* Pall., v. *Kochia hirsuta*, p. 438, *hyssopifolia* Pall. (= *triandra* Donnersm.), *muricata* Pall., *sedoides* Pall. (= *sedifolia* Pall.), v. *Echinopsilon lanatum*, *muricatum. sedoides*, p. 204, II., *linifolia* Pall., v. *Schanginia linifolia*, p. 640, II.
- Suarda ligustrifolia* Nocca, v. *Eugenia baruensis*.
Subularia purpurea Forsk., v. *Schouwia arabica*, p. 643, II.
- Succisa** Vaill. (= *Scabiosa* pro parte Auct.), Schuppenkopf.
- I. *Cephalaria* Schrad., R. et S., Coult. (= *Cerionanthes* Schott, = *Lepicephalus* Lag. = *Picnum* Wallr.).
- attenuata* (R. et S.), (= *trifida* Spgl. = *Scabiosa attenuata* L. = *S. trifida* Thbg. = *S. Verbenaca* Lam.).
- centauroides* Spgl. (= *Ceph. centauroides* Coult. = *C. laevigata* Schrad. = *Scabiosa centauroides* L.).
- α) *communis* (Coult.), (= *S. centauroides* Lam.).
- β) *corniculata* (Coult., R. et S.), (= *S. cornic.* W. K.).
- γ) *uralensis* (DC.), (= *S. uralensis* Murray).
- δ) *cretacea* (DC., R. et S.), (= *Scabiosa cretacea* MB. = *S. coriacea* W. Enum.).
- graeca* R. et S. (= *Scabiosa decurrens et flava* Sibth., Sm.).
- joppica* Spgl. (= *Scabiosa joppensis* Rehb.).
- leucantha* Mch., Spgl. (= *Scabiosa albescens* W. Enum. = *S. leucantha* L. = *S. leucocephala* Auct. = *S. mediterranea* Viviani).
- procera* (Fisch., Lallein.), p. 886.
- tatarica* Spgl., β) *gigantea* (Coult.), (= *Scabiosa altissima* Mill. = *S. gigantea* Ledeb.).
- Vaillantii* (Schott), (= *lancifolia* Mch. = *Scabiosa syriaca* β L. = *S. Vaillantii* MB.).
- II. *Genuina*.
- australis* Schott, (= *Scabiosa australis* Wulf. = *S. repens* Brignol. = *Lepicephal. inflexus* Kluck), β) *albiflora*, β) *pseudo-australis* (R. et S.), (= *S. Triumfetti* Moretti).
- pratensis* Mch. (= *vulgaris* Presl, = *Asterocephal. Succisa* Wallr. = *Scabiosa Succisa* L.).
- Sulitra* Medic., *herbacea* Medic. (= *pubescens* Mch.), *perennans* Medic., v. *Lessertia annua et peren.*, p. 457.
- Suprago* G., *sphaerocephala* Cass., *spicata* G., v. *Liatris sphaeroidea et spicata*, p. 461.
- Sutera** Roth, (Dr. Suter, Verfass. einer Flora d. Schweiz †), XIV. II., Personatae-Scrofularineae.
- glandulosa* Roth, (= *dissecta* Walp. = *Capraria dissecta* Delil.), drüsige, ♂. ☉. w. m. f. Ostindien, Nubien, Aegypten.
- foetida* Roth, *oppositifolia* Roth, v. *Chaenostoma foetidum*, p. 134, II., *hispidum* Nachl., *multifida* Walp., v. *Conobea multifida* Nachlese.

- *Sutera pubescens* Hort., v. *Lessertia perennans*.
Sutera calycina Lindl., v. *Trevirania calycina*.
- Swainsonia** Salisb., Swainsonie.
 albiflora G. Don, (= *galegifolia* β *albiflora* Lindl.),
 weißblumige, \S . t. Neusüdwallis.
galegifolia RBr. (= *Colutea galegifolia* Sims, = *Indigofera coccinea* Broegelm. = *Loxidium galegifolium*
 Vent. = *Vicia galegifolia* Andr.), var. *rubra* Hort.
- Swartzia** W., Swartzie.
 triphylla W. (= *Possiria arborescens* Aubl. = *P. triphylla* Poir., Gmel. = *Rittera triphylla* Sw.), drei-
 blätterige, \S . w. Guiana, Brasilien.
- Swertia** L., Swertie.
 punctata Baumg., punktirte, 4. f. Siebenbügen.
americana Spgl. (= *corniculata* Mchx. = *deflexa*
 Sm. = *Michauxiana* R. et S.), *corniculata* L.,
 v. *Halenia deflexa* et *sibirica*, p. 282, II., *carin-*
thiaca Wulf., *rotata* L. (= *sulcata* Roth.), v.
Pleurogyne carinthiaca et *rotata*, p. 540, II., *diffor-*
mis L., v. *Sabbatia paniculata*, p. 709 et 621, II.,
lutea Vest, v. *Gentiana lutea*, *parnassifolia* LaBill.,
 v. *Villarsia parnassifolia*, p. 848.
- Swietenia** L., Swietenie.
 humilis Zuccar., niedrige, \S . t. w. Mexico.
 trilocularis Roxb., dreifächerige, \S . w. Ostindien.
febrifuga Roxb. (= *Soymida* Dunc.), v. *Soymidia*
febrifuga, p. 686, II.
- Symphoricarpus** Dill. (= *Symphoria* P., Pursh),
 Ballbeere.
glaucescens H. B. K., blaugrünliche, \S . k. Mexico.
imberbis Tausch, unbartige, \S . \S . f. ?
microphyllus H. B. K. (= *Anisanthus microphyllus* W.),
 kleinblätterige, \S . k. Mexico.
montanus H. B. K. (= *Symphoria mexicana* Lodd.).
racemosus Mchx. (= *leucocarpus* Hort.), ? β) *elongatus*
 Presl, γ) *heterophyllus* Presl, δ) *glaucus* Hort. Vind.,
 ϵ) *puniceus* Sims.
vulgaris Mchx. (= *conglomeratus* P. = *orbiculatus*
 Mch. = *parviflorus* Dsf.).
- Symphomyrtus** Schauer, Bandmyrte, XII. I., Myr-
 taceae.
Lehmanni Schauer, (= *Eucalyptus Lehmanni* Hort.),
 Lehmann's, \S . k. t. Neuholland.
- Symphytum** T., Schwarzwurz (Beinwell).
 Donii DC. (= *caucasicum* D. Don, non MB.), Don's,
 4. f. ? Caucasus.
mediterraneum K., mittelländische, 4. f. Südeuropa.
officinale L., α) *ochroleucum* DC. (= *album* Auct. =
bohemicum Schm.), β) *purpureum* P. (= *patens* Sibth.
 = *roseum* Hort.), ¹⁾ β) *caruosinum* Hort. angl. (= *coccineum* Hort.), γ) *lanceolatum* Weinm.
orientale L., β) *angustior* DC.
tauricum W. (= ?*borragineum* Tausch, = *bullatum*
 Hornem. = *orientale* Pall., non MB.).
 Nicht hinlänglich bekannte Arten: *coeruleum* Hort. angl.,
echinatum Ledeb., *intermedium* Fisch., *laeve* Bess.
 Cat. hort. Crem. Podol., *racemosum* Stephan.
regium Gmel., v. *Mattia umbellata*, p. 389, II.

1) Auch nach Fries eigne Art.

Synandra amoena Schrad., v. *Solenostylis* (= *Aphelandra*) *aurantiaca*.

Synaphea RBr., *Synaphea*, IV. 1., Proteaceae.
brachystachya Lindl., kurzährige, ⚔. t. Neuholland.
dilatata RBr. (= *Conospermum reticulatum* Sm.), verbreiterte, ⚔. t. Neuholland.
pinnata Lindl., gefiederte, ⚔. t. Neuholland.

Syncarpia Tenore, Bandfrucht, XII. 1. (XVIII. II.), Myrtaceae.
laurifolia Tenore, (= *Kamptzia albens* N. E. = *Metrosideros glomulifera* Sm. = *Pittosporum hirtum* Hort. Taurin. = *Tristania albens* Cunn. = *T. arborescens* Hort. Kew.), lorbeerblättrige, ⚔. t. k. Neuholland.

Syndesmanthus Kl., Benth., Bandblümchen(heide).
articulatus Kl. (= *Blairia articulata* L., p. 124, = *Erica articulata* Thbg. = *E. eriocephala* Lam. = *E. paleacea* Salisb.).
fasciculatus Kl. (= *Blairia fasciculata* W., p. 124, = *Erica fasciculata* Thbg.).
paucifolius DC. (= *Blairia flosculosa et pauciflora* G. Don, = *B. paucifolia* Wendl. = *Erica flosculosa* Salisb. = *Macrolinum paucifolium* Kl.), wenigblättrige, ⚔. t. k. Cap d. g. Hoffn.
scabra Kl. (= *Blairia scabra* W., p. 124, = *Erica exilis* Salisb. = *E. scabra* Thbg.).

Syndesmon Hffg., *thalictroides* Hffg., *tuberosum* Hffg., v. *Thalictrum anemonoides et tuberosum*.

Syngonium Schott, Endl., *Syngonium*, XXI. IX., Aroideae.
auritum Schott, (= *Caladium auritum* Vent., p. 143, = *Arum auritum* L.), geöhrttes, 4. w. Westindien.

Synoum A. Juss., *Synoum*, VIII. 1. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.
glandulosum A. Juss. (= *Trichilia glandulosa* Sm., p. 816, = *octandra* Soland.), drüsiges, ⚔. t. Neuholland.

Syrenia Andrz., *angustifolia* Rchb. (= *Ehrharti* Andrz.), *cuspidata* Rchb. (= *Biebersteinii* Andrz.) etc., v. *Erysimum* Sect. II. p. 313 et p. 232, II.

Syringa L., Flieder, Lilac.
chinensis W. (= *dubia* P., DC. = *speciosa* Hort. = *rothomagensis* A. Rich. = *Lilac Varina* Dum.Cours. *Lilacum rothomagense* Renault).
Emodi Wall. (= *indica* Royle), himalayaischer, k. f. b. Himalaya.
persica L. (= *Lilac minor* Mch. = *L. persica* Lam.).
 e) *pterifolia* Hort., f) *babylonica* Plukn.
villosa Vahl, (= *Ligustrum sinense* Lour.), zottiger, ⚔. k. f. b. China.
 β) *ovalifolia* DC. (= *chinensis* Turcz. = *pubescens* Turcz.).

vulgaris L., β) *marlyensis* DC. (= *purpurea* Hort. = *tatarica* Hort. = *Lilac Marly* Gall. = *L. media* Dum.Cours.), γ) *albiflora cum variet.* Opiz.

Außer den p. 795 aufgezählten Varietäten noch folgende: Charles X., Colmariensis, coccinea, Prince Notger, virginalis (= *alba major*), fol. variegatis, fol. aureo-variegatis, spectabilis.

Sypsone sagittalis Griseb., v. *Genista sagittalis*.

- Syzygium** G., DC., Gewürzmyrte, XII. 1., Myrtaceae.
caryophyllatum G. (= *Calyptranthes caryophyllata* P. = ? *Eugenia contracta* Poir. = *E. corymbosa* Lam. = *Myrtus caryophyllata* L.), ächte, ♀. w. Zeylon.
Jambolanum DC. (= *caryophyllifolium* DC. = *Calyptranthes caryophyllata* Sw. = *C. Jambolana* W. = *Eugenia caryophyllifolia* Lam. = *E. corticosa* Lour. = *E. Jambolana* Lam. = *E. jambolifera* Roxb. = *E. obtusifolia* Roxb. = *Myrtus corticosa* Spgl. = *M. Cumini* L.), Jambolanische, ♀. w. Ostindien.
obovatum DC. (= *Calyptranthes Pollicina* Willem. = *Eugenia obovata* Poir. = *Myrtus obovata* Spgl.), verkehrteiförmige, ♀. w. Mauritius.

Tabacus viscidus Mch., v. *Nicotiana glutinosa*.

- Tabebuja** Gomez, (= *Couralia* Splitg.), (Tabebuja, einheimischer brasilianischer Name), XIV. 11., Bignoniaceae.
fluviatilis DC. (= *Bignonia fluviatilis* Aubl., p. 122, = *aquatilis* E. Mey. = *Couralia fluviatilis* Splitg. = *Tecoma aquatilis* DC. = *Zeyheria fluviatilis* Miq.), flusliebende, ♀. ♀. w. Guiana.
latifolia DC. (= ? *Bignonia latifolia* Rich., p. 122, = ? *Delostoma latifolium* Splitg.), breitblättrige, ♀. Sch. w. Cayenne.
triphylla DC. (= *Bignonia triphylla* L. ? Mill., p. 123, = *Tecoma triphylla* Mart.), dreiblättrige, ♀. ♀. w. Insel St. Thomas, Vera Crux.
uliginosa DC. (= *Bignonia obtusifolia* Lam. = *B. Tabebuja* Vell. = *B. uliginosa* Gomez), sumpfliebende, ♀. ♀. w. Brasilien (Rio Janeiro).

- Tabernaemontana** Plum., L., Tabernaemontane.
amygdalifolia Jacq. (= *Cestrum nervosum* Mill.).
coriacea Lk., R. et S. (= ? *macrophylla* Poir.), lederartige, ♀. w. Brasilien.
coronaria W. (= *divaricata* RBr. = *Nerium coronarium* Ait., Jacq. = *N. divaricatum* L., non Lour.).
crispa Roxb., Hamilt.
Noronhiana Boj. (= *Pandaca* Pet. Th.), Noronha's, ♀. w. Madagascar.
persicariaefolia Jacq. (= *nervosa* Dsf.).
recurva Roxb. (= *gratissima* Lindl.), zurückgekrümmte, ♀. w. Ostindien.
rostrata Wall., geschnäbelte, ♀. w. Ostindien.
divaricata G. Don, v. *Nerium divaricatum*, p. 546,
echinata Aubl., *Hystrix* Steud., *muricata* Lk., v. *Peschiera echinata*, *Hystrix*, *muricata*, p. 501, II.,
odorata Vahl, v. *Malouetia odorata*, p. 383, II.

- Tacca** Forst. (malayischer Name), Aroideae-Taccaceae
 Rchb., Asparagineae s. Sarmantaceae Lk., Taccaceae
 Presl, Blume, p. 796.
cristata Jack., kammförmige, ♀. w. Ostindien.
montana Schult. (= *palmata* Blume), bergliebende, ♀. w. Ostindien, Java.
integrifolia Ker, v. *Ataccia integrifolia*, p. 53, II.
Tachia cordifolia Mart., G. Don, *longifolia* Mart., G. Don, v. *Leianthus cordifolius et longifolius*, p. 348, II.

- Tachigalia** Aubl. (= *Tachia* P.), Tachigalia.
 emarginata G. Don, (= *Cubaea emarginata* Spgl.), aus-
 gerandete, ♀. w. Brasilien.
 floribunda Steud. (= *Dolichonemia speciosa* N. E. =
Moldenhaueria floribunda Schrad.), blüthenreiche, ♀.
 w. Brasilien.
 paniculata Aubl. (= *Cubaea paniculata* W.), rispige,
 ♀. w. Guiana.
- Tacsonia** Juss., Tacsonie.
 mixta P. (= *Passiflora mixta* L. fil.), bunte, ♀. Sch.
 w. Südamerika.
 β) longiflora P. (= *Tacso* P. = *Passiflora lon-*
giflora Cav. = *P. Tacso* Cavan.).
 pinnatistipula Juss. (= *Passiflora tiliaefolia* Molina, =
P. tomentosa Cavan.).
Taeniostema micranthum Spach, v. *Helianthemum*
glomeratum, p. 382 et p. 288, II.
Taetsia ferrea Medic., v. *Cordyline ferrea*, p. 160, II.
- Tagetes** T., Studentenblume (Sammetblume).
 coronopifolia W. (= *clandestina* Lag. = *foeniculacea*
 Dsf., non Poepp.).
 dianthiflora H. B. K., nelkenblumige, ☉. m. f. Peru.
 lunulata Ortega, (= ? *tenuifolia* Cav.), mondförmige, ☉.
 m. f. Mexico.
 multiflora H. B. K. (= *filifolia* Lagasca), vielblumige,
 ☉. m. f. Quito.
 multiseta DC. (= *subulata* Llav. et Lex.), vielborstige,
 ☉. m. f. Mexico.
 patula L., f) bicolor Hort.
Feuillei Bertero, Colla, v. *Rancagua Feuillei*, p. 582, II.
- Talauma** Juss., Talauma, p. 779 et p. 886.
 macrocarpa Zuccar., großfrüchtige, ♀. t. Mexico.
 mutabilis Blume, veränderliche, ♀. w. Java.
 Plumierii DC. (= *coerulea* Jaume St. Hil. = *Anona*
dodecapetala Lam. = *Magnolia fatiscens* Rich. =
M. Plumierii Sw.).
 pumila Blume, (= *Gwillinia indica* Rottl. = *Magnolia*
pumila Andr., non Spgl., p. 488). China, Java.
- Taliera** Blume, Mart. (einheimischer Name).
 sylvestris Blume, wilde, ♀. w. Java, Malabar.
 Tali Mart. (= *bengalensis* Spgl., p. 797, = *Corypha*
Taliera Roxb.).
- Talinum** Adans., Talinum.
 crassifolium W. (= *paniculatum* Mch. = *Portulaca*
crassifolia Jacq.), β) fruticosum W. (= *Portulaca*
fruticosa Murr. = *P. paniculata* L.).
 Moritzianum Kl., Moritz's, ☉. ♀. w. Caracas.
 patens W. (= *paniculatum* G. = *Portulaca paniculata*
 Jacq. = *P. patens* L. = *Rulingia patens* Ehrh.).
 reflexum Cav. (= ? *dichotomum* R. et P. = *patens*
 β (L.) = *Portulaca reflexa* Haw.), zurückgebogenes,
 ♀. w. Südamerika.
 teretifolium Pursh, (= *ciliatum* Lindl., non R. et P.
 = *trichotomum* Dsf. = *Phemaranthus teretifolius*
 Rafin.), stielrundblättriges, 4. k. Pensylvanien, Texas.
 triangulare W. (= *Portulaca racemosa* L. = *P. trian-*
gularis Jacq. = *Rulingia triangul.* Ehrh.), dreikan-
 tiges, ♀. w. Antillen.
 acaule Spgl., *adscendens* Hort. (= *lineare* Hffg.),
ciliatum R. et P. etc., v. *Calandrinia acaulis*, pilo-

Talinum

siuscula, ciliata etc., p. 145 et 105, II., *monandrum* R. et P., v. *Monocosmia corrigioloides*, p. 416, II., *Anacampseros* W., *arachnoides* Ait. (= *retusum* W. Enum.), *filamentosum* Ait., *lanceolatum* Lk., *polyphyllum* Lk., ? *rubens* Hort., v. *Anacampseros rotundifolia*, *arachnoides*, *filamentosa*, *lanceolata*, *polyphylla*, *rufescens*, *varians*, p. 51 et p. 34, II.

Tamara alba et *rubra* Roxb., v. *Nelumbium speciosum* et *Tamara*, p. 544, II.

Tamaryx L., Tamariske.

articulata Vahl, (= ? *chinensis* Lour. = *orientalis* Forsk. = *Thuja aphylla* L.).

canariensis W. (= *gallica* var. Ehrbg.), canarische, ♣. ♣. k. Canarische Inseln.

elegans Spach, (= *indica* Hort. Par.), zierliche, ♣. ♣. k. f. b. Südeuropa.

indica W. (= *epacroides* Sm. = *gallica indica* Ehrbg.).

ramosissima Ledeb. (= *gallica* Sievers), ästigste, ♣. f. Altaisches Sibirien.

Tamonea Aubl., Tamonea.

curassavica P. (= *spinosa* Sw. = *verbenacea* Sogl. = *Ghinia spinosa* W. = *G. verbenaca* Sw. = *Verbena curassavica* L. = *Zapania curassavica* Lam.).

mutica P. (= *spicata* Aubl. = *Ghinia mutica* W. = *Leptocarpos chamaedryfol.* W. herb.).

Tanacetum T., L., Wurmkraut (Rainfarn).

annuum L. (= *Balsamita annua* DC.), jähriges, ☉. f. Südeuropa.

Audiberti DC., Moris, Audibert's, 4. f. Corsica, Sardinien.

canescens DC. (= *incanum* Fisch. et Mey.), grauliches, 4. f. Asiat. Rufsland, Persien.

cinereum DC. (= *Brochia cinerea* Visian. = *Cotula cinerea* Delil. = *Grangea cinerea* Loud.), aschfarbiges, ☉. ♣. f. k. Arabien, Aegypten.

fruticulosum Ledeb. (= *tomentosum* Sievers, = *Artemisia Athanasia* Bess.).

macrophyllum Fisch., großblättriges, 4. f. ? Sibirien.

millefoliatum Fisch. et Mey. (= ? *Achillea abrotanifolia* L. = *A. myriophylla* W. Enum., p. 10), tausendblättriges, 4. f. Persien.

pauciflorum Richards., p. 798, (= *Artemisia matricarioides* Less. = *Cotula matricarioides* Bong.), ☉. nicht 4. Sibirien, Kamtschatka, nördlichstes Amerika.

purpureum D. Don, (= ? *longifolium* Wall.).

tenuifolium Jacq., dünnblättriges, ♣. k. Himalaya.

Balsamita L., *myriophyllum* W. (= *setaceum* Tausch), v. *Pyrethrum Tanacetum*, p. 576, II., *chrysanthemoides* G., *grandiflorum* Poir., non Thbg., *virgatum* Lois., v. *Plagius ageratoides* etc., p. 534, II., *crithmifolium* L., v. *Metagnanthus parviflorus*, p. 402, II., *frutescens* L., v. *Hippia frutescens*, *linifolium* Thbg. etc., v. *Stilpuophytum linifolium* etc., *vestitum* Thbg., v. *Saintmorysia* (= *Morysia*) fasciculata, p. 532.

Die übrigen Synonyme s. p. 798.

Tanaecium pinnatum W., v. *Kigelia pinnata* Nachl.

Tanghinia A. Pet. Thouars, venenifera A. Pet. Thouars, Poir. (= *veneniflua* G. Don, = *Cerbera Tanghinia* Hook. = *C. venenifera* Steud.), p. 798.

Tanghinia lactaria G. Don, *laurifolia* G. Don,
Odallam G. Don, v. *Cerbera lactaria* etc., p. 182.
Taonabo Aubl., *dentata* Aubl., *punctata* Aubl., v.
 Ternströmia *dentata*, *punctata*, p. 801.

Tapenotes DC. (= *Tapina* Mart., non *Tapinia* Aubl.),
 Tapina, XIV. II., Gesneriaceae.

barbata DC. (Mart.), (= *Gesneria barbata* N. E.) bär-
 tige, 4. w. Brasilien.

Tapogomea Aubl., *axillaris* Poir., *elata* Poir., *pur-
 purea* Aubl., *tomentosa* Aubl., *violacea* Aubl., v.
 Cephaelis *axillaris*, *elata* etc., p. 180.

Taraxacum Hall. (= *Leontodon* Auct.), Löwenzahn.
alpestre DC. (= *Leontodon alpestris* Tausch), Voralpen-
 L., 4. f. Sudeten.

apenninum DC. (= *Leontodon alpinus* Guss., non Jacq.
 = *L. apenninus* Tenore), apenninischer, 4. f. Apenninen.

collinum DC. (= *Leontodon salinus* Ledeb.?), Hügel-
 liebender, 4. f. Dahurien.

eriopodum DC. (= *Leontodon eriopodum* Wall. = *L.
 eriopus* Don?).

montanum DC. (= *Dubaea sonchoides* DC. = *Lasiopus
 sonchoides* Don, = *L. montanus* C. A. Mey.). Caucasus.

officinale Wigg., Vill. (= *commune* Dum.Cours. = *dens
 leonis* Dsf. = *T. Leontodon* Dum. = *officinatum* Roth,
 = *vulgare* Mirb. = *Leontodon Taraxacum* L.).

palustre DC. (= *lanceolatum* Poir. = *L. dentatus* Tausch,
 = *L. erectus* Schrk. = *L. lividus* W. K. = *L. palus-
 tris* Sm. = *L. parviflorus* Tausch, = *L. pinnatifidus*
 Tausch, = *L. Raji* Gouan, = *L. salinus* Poll.).

β) *leptocephalum* Rchb., γ) *tenuifolium* (Hoppe),

δ) *Scorzonera* Roth, (= *Scorzonera Tanaxaci* Roth).

Stevenii DC. (= *L. alpinus* Stev. = *L. Stevenii* Spgl.),
 Steven's, 4. f. Caucasus, altaisches Sibirien.

Tarchonanthus ellipticus Thbg., v. *Brachylaena ellip-
 tica* Nachlese, *ericoides* L. fil. (= *senecioides* Steud.),
 v. *Eriocephalus glaber*, p. 229, II.

Tarena zeylanica G., v. *Stylocoryna* Webera.

Tasmania RBr., (Tasman (Abel) ein holländ. Schiffs-
 capitain, Entdecker von van Diemens Land u. anderer
 Inseln), XIII. VI., Magnoliaceae-Illicieae.

aromatica RBr. (= *Winterana lanceolata* Poir.), gewürz-
 hafte, 5. t. Van Diemens Insel.

In den Pflanzenverzeichnissen der belgischen Gärten
 wird noch eine *T. minor* erwähnt.

Tauscheria lasiocarpa Fisch. var. *marginata* Hort. Lips.

Taxodium juniperoides Rich. (= *capense* Loud. =
Cupressus juniperoides L. = *Schubertia capensis*
 Spgl. = *Pachylepis juniperoides* Brongn.), v. *Wid-
 dringtonia juniperoides*, ? *pinnatum* Knight = ?

Taxus T., Eibenbaum.

baccata L., var. *fastigiata variegata* Knight, *adpressa*
 Knight, *erecta nova* Knight, *foliis argenteo-variegatis*
 Knight; die übrigen Variet. s. p. 799.

canadensis W., var. *major* Knight.

globosa Schldl., kugelförmiger, 5. k. Mexico.

Harringtonia Knight, (= *japonica*, *macrophylla* Hort.), 1)

Harrington's, 5. k. f. b. Japan.

Inukaja Knight, *Inukaja-E.*, 5. k. f. b. Japan.

1) Vergl. *Podocarpus macrophyllus* Sweet p. 638 et p. 543, II.

Taxus

Nicht hinlängl. bekannt: *bariensis* Knight, *coriacea* Hort.
chinensis Roxb. etc., s. *Podocarpus* p. 638 et 543, II.
Lambertiana Wall., v. *Pinus* Pindrow, p. 626 et
 p. 528. II.

Tecoma Juss., Trompetenbignonie.

Sect. I. *Eutecoma* Endl. et *Tecomaria* ibid.
 (*Tecomaria* Fenzl).

? *aesculifolia* DC. (= *Bignonia aesculifolia* H. B. K. p. 122).
Aesculus DC. (= *Bignonia Aesculus* Dsf), rofskastanien-
 ähnliche, h. w. Brasilien.

capensis Lindl. (= *Bignonia capensis* Thbg.).

chrysantha DC. (= *Bignonia chrysantha* Jacq., p. 122).

heterotricha DC., verschiedenhaarige, h. w. Caracas.

grandiflora Sweet, DC. (= *Bignonia grandiflora* Thbg.
 = *B. chinensis* Lam. = *Campsis adrepens* Lour. =
Incarvillea grandiflora Speg., non Hort.), großblumige,
 h. Sch. k. f. b. Japan, China.

leucoxydon Mart. (= *Bignonia leucoxydon* L., p. 122).
 a) flore roseo, b) fl. albo.

radicans Juss. (= *Bignonia radicans* L.), β) *coccinea* P.
 (= *minor* Hort.), γ) *flammea* (= *major* Hort.).

? *serratifolia* G. Don, (= *Bignonia serratifolia* Vahl, p. 122).
stans Juss. (= *Bignonia frutescens* Mill. = *B. stans* L.),
 Westindien, Südamerika.

β) *apiifolia* DC. (et Hortul.), (= *incisa* Sweet,
 = *Bignonia incisa* Colv.), γ) *velutina* DC.

venusta Lemaire, (= *Bignonia venusta* Ker, p. 123).

Sect. II. *Pandorea* Endl.

australis RBr. (= *Pandorea* Juss. = *Bignonia Pando-*
rana Andr. = *B. Pandorae* Sims, = *B. Pandorea*
 Vent. = *B. australis* Ait.).

? β) *meonantha* Sweet, G. Don, (= *Bignonia meo-*
nantha Lk. = *B. Pandorea minor* Hort. angl.).

diversifolia G. Don, verschiedenblättrige, h. Sch. k. t. Neuh.
floribunda A. Cunn., blüthenreiche, h. Sch. k. t. Neuh.
 holland (Moreton-bay).

jasminoides Lindl. (= *Bignonia jasminoides* A. Cunn.),
 jasminähnliche, h. Sch. k. t. Neuholland (Moreton-bay).

Oxleyi A. Cunn., Oxley's, h. Sch. k. t. Neucambria.

aquatilis DC., *triphylla* Mart. herb., *uliginosa* Mart.,
 v. *Tabebuja fluviatilis*, *triphylla*, *uliginosa*, p. 716, II.,
splendida Speg., v. *Virgularia splendida*.

Tectaria Cavan., *coriacea* Lk. (= *T. Calahuata* Cav.),
 v. *Aspidium* Sect. VII. p. 50, II.

Tectona *grandis* L. (= *T. Theca* Lour. = *Theca terni-*
folia Hamilt.).

Teesdalia petraea Rchb., v. *Hornungia petraea*,
 p. 305, II.

Teleianthera RBr., Endl., Drüsenamaranth, V. I.,
 Aizoideae-Amaranthaceae.

I. *Bucholzia* Mart.

ficoidea (Mart.), (= *Alternanthera ficoidea* RBr., p. 40,
 = *Gomphrena ficoidea* L. = *Illecebrum ficoideum*
 W. = *Paronychia ficoidea* Dsf.).

frutescens Endl. (Mart.), (= *Alternanthera frutescens*
 RBr., p. 40, = *Achyranthes halimifolia* Lam. =
Illecebrum alsinefolium Scop. = *I. frutescens* L'Her.
 = *I. limense* Jacq. = *Paronychia frutescens* Dsf.).

Teleianthera

polygonoides (Mart.), (= *Achyranthes polygonoides* Lam. = *Alternanthera polygon.* RBr., p. 40, = *Gomphrena polygon.* L. = *Illecebrum polygon.* Mill.).

II. Brandesia Mart.

elongata (Mart.), (= ? *Alternanthera sericea* H. B. K. p. 40, = *Gomphrena elongata* W.), verlängertes, 4. ♀. w. Columbia.

porrigens Endl. (Mart.), (= *Achyranthes porrigens* Jacq., p. 11, = *Celosia elongata* Spgl. = *C. peruviana* Zucc. = *Gomphrena elongata* Fisch. = *G. fruticosa* Hort. = *G. nova* Hort. Par.).

III. Mogiphanes Mart., p. 527.

brasiliensis Endl. (Mart.), (= *M. Jacquini* Schrad. = *Gomphrena brasiliensis* Jacq. = *Philoxerus brasiliensis* RBr.), brasilianischer, 4. w. Brasilien.

flavescens (Mart.), (= *Alternanthera flavescens* H. B. K. = *Gomphrena brachiata* W. herb. = *Illecebrum flavescens* Spgl.), gelblicher, 4. w. Neugranada.

straminea (Mart.), (= *Gomphrena brasiliensis* L. = *G. patula* Wendl.), strohfarbiger, ♂. ♂. w. Brasilien.

virgata (Schrad.).

Telekia Baumg., cordifolia DC. (= *speciosa* Baumg.) et' *speciosissima* DC., v. *Bupthalmum* Sect. IV.

Telephium Imperati L. (= *alternifolium* Mch. = *repens* Lam.).

Teline candida Medic., v. *Genista candicans*.

Telmatopha gibba Schleid. (= *Lemna gibba* p. 452).
β) *trichorrhiza* (L.).

Telopea RBr., *Telopea*.

speciosissima RBr. (= *Embothrium speciosissimum* Sm. = *E. speciosum* Cav. = *Hylogyne speciosa* Knight et Salisb.).

truncata RBr. (= *Embothrium truncatum* LaBill. = *Hylogyne australis* Knight et Salisb.), abgestutzte, ♀. t. Van Diemens Land.

Teloxis Moq. Tand., Grannenmelde.

aristata Moq. Tand. (= *Chenopodium aristatum* L.), sibirische, ♂. f. Sibirien.

Tenoria Bert., *Berteri* Colla, (= *calyculata* Bertero), v. *Trixis frutescens*.

Tenoria Spgl., *arborescens* Spgl., v. *Heteromorpha arborescens*, p. 297, II., *canescens* Loud., *coriacea* Spgl., v. *Bupleurum plantagineum*, *coriaceum* etc., p. 139.

Tephrosia P., Aschenwicke.

capensis P. (= *stricta* Eckl., Zeyh. = *Galega capensis* Thbg.), capische, 4. ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

cinerea P. (= *Galega cinerea* L.), graue, ♂. w. m. f. Jamaica, Domingo.

Colutea P. (= *incana* Grah. = *Galega Colutea* Burm. = *G. incana* Roxb. = *G. villosa* Hamilt.), blasenstrauchähnliche, ♀. w. Ostindien.

coronillaefolia DC. (= *cinerea* P. var. Spgl. = *reflexa* DC. var. ? Spgl. = *Bristonia coronillaefolia* Desv. = *Galega coronillaefolia* Dsf.), coronillablätterige, ♀. w. Mascarenas.

frutescens DC. (= *Galega frutescens* Mill.), strauchartige, ♀. w. Campeche.

Tephrosia

hispidula Pursh, (= *gracilis* Nutt. = *Galega hispidula* Mchx.), steifhaarige, 4. f. Nordam. (Virgin., Georgia).
β) *ambigua* Curt.

hypargyrea DC. (= *heterophylla* Fisch.).

leptostachya DC. (= ? *lineata* Schum. = *purpurea* Lk. = ? *uniflora* P.), schlankkährige, ☉. w. Senegal.

mimosoides P. (= *Barclayana* Sweet, = *Dalbergia Barclayi* Hook. = *Galega mimosoides* W.), sinnpflanzenähnliche, ☿. w. Ostindien.

pallens P. (= *Galega humilis* Thbg. = *G. pallens* Ait.).

purpurea P. (= *galegioides* Grah. = *lanceaefolia* Lk. = *lanceolata*, *lobata*, *stricta*, *Taylorii* et *tinctoria* Grah. = *Galega coerulea* Rottl. = *G. Colonila* Hamilt. = *G. lanceaefolia* Roxb. = *G. purpurea* L. = *G. sericea* Hamilt. = *G. tinctoria* Lam.).

reflexa DC. (= *Reineria reflexa* Mch.), zurückgebogene, ☿. w. ?

stricta P. (= *Galega pulchella* Scopol. = *G. stricta* Ait. = *Indigofera angustifolia* Curt. = *I. foliosa* E. Mey. = *I. stricta* L. fil.).

filiformis P. et *longifolia* P., v. *Sweetia filiformis* et *longifolia*, p. 794.

Teramnus P. Br., Laubenbohne.

hedysaroides Spgl. (= *Glycine hedys.* W. = *G. pentandra* Spgl., non Roxb.), hahnenkopfähnliche, ☿. w. Guinea.

labialis et *parviflorus* Spgl., v. *Glycine labialis*, p. 267, II.

Terminalia L., Catappenbaum.

Bellirica Roxb. (= ? *Chebula* W., non Retz, Roxb. = *punctata* Roth, = *Myrobalanus Bellirica* G.).

Catappa L. (= *eglandulosa* Roxb. = *intermedia* Bert. = ? *moluccana* Lam. = *myrobalana* Roth, = *subcordata* H. B. K. = *Juglans Catappa* Lour.), Ost- und Westindien.

Chebula Roxb. (= *T. myrobalanus citrina* Koen. = *reticulata* Roth).

glabrata Forst. (= ? *moluccana* Lam.), glatter, ☿. w. Freundschaftsinseln.

Ternstroemia L., Ternströmie.

japonica Sieb. et Zuccar., japanische, ☿. k. t. Japan.

lineata DC. (= *elliptica* Sw. = *meridionalis* Moç., Sess.), linirte, ☿. t. Mexico.

japonica Thbg., v. *Cleyera japonica*, p. 205.

Teta viridiflora Roxb., v. *Peliosanthes Teta*, p. 604.

Tetracarpum pinnatum Mch., v. *Schkuhria abrotanoides*, p. 730.

Tetracellium Turcz., *ellipsoideum* Turcz. et *globosum* Turcz., v. *Tetrapoina barbareaefolium*, p. 802 et *Nasturtium Camelinae*, p. 543.

Tetracera L., Vierhorn.

japurensis Mart. et Zuccar., japarisches, ☿. Sch. w. Brasilien.

junceae Hort. angl., simsentförmiges, ☿. Sch. t. Neuholland.

rotundifolia Sm., rundblättriges, ☿. Sch. t. Guiana, Brasilien.

lutea Spgl., v. *Diporidium arboreum*, p. 206, II.

Tetradenia N. E. (non Benth.), *obovata* N. E., *zeylanica* N. E., v. *Litsaea obovata* et *zeylanica*, p. 366, II.

- Tetradiclis** Steven, *Tetradiclis*, IV. I., Rutaceae-Zygo-
phyllae Auct., (Crassulaceae-Anatropeae Fenzl).
Eversmanni Bunge, (= *salsa* Claus., non Stev.), Evers-
mann's, ☉. f. Am caspischen Meere.
salsa Steven, (= *Anatropa tenella* Ehrbg. = *Peplis*
alternifolia Fisch. Hort. Gorenk.), salzliebende, ☉. f.
Gegend des caspischen Meeres, Syrien, Aegypten.
Tetradium Lour., *amarissimum* Poir., v. *Brucea*
sumatrana, p. 124, *trichotomum* Lour. = *Brucea*
trichotoma Spgl. (Cochinchina), wird kaum kultiv.
- Tetragonia** L., Vierecksfrucht.
expansa Murray, Ait. (= *cornuta* G., Mch. = *halimi-*
folia Forst. = *japonica* Thbg. = *Demidovia tetra-*
gonoides Pall.).
hirsuta L. fil., rauhhaarige, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.
β) *villosa* Poir.
purpurea Otto, purpurfarbige, ☉. f. ?
- Tetragonolobus** R., Scopol., Spargelerbse.
purpureus Mch. (= *edulis* Lk. = *Lotus Tetragonolo-*
bis L.).
Requieni Fisch. et Mey., Requien's, ♂. f. Südfrankreich.
Tetrahit Mch., *Ladanum* Mch. etc., v. *Galeopsis*
Ladanum etc.
Tetrahitum hirtum Hffg., v. *Stachys hirta*.
Tetramerium odoratissimum G. fil. (= *occidentale*
N. E., Mart.), v. *Faramea odoratissima*, p. 242, II.,
paniculatum Spgl., v. *Coffea paniculata*, p. 153, II.
- Tetranema** Benth., Vierfaden, XIV. II., Personatae-
Scrofularineae (Antirrhineae).
mexicanum Benth. (= *Pentstemon mexicanus* Hort.),
mexicanischer, 4. t. k. Mexico.
hirsutum Hort., v. *Achimenes hirsuta*, p. 6.
Tetranema nutans G. Don, Sweet, v. *Desmodium*
nutans Nachlese.
- Tetranthera** Jacq., Vierfächerbeutel.
Cervantesii N. E. (= *Laurus aestivalis* Sessé, Lagasca,
= *Litsaea Cervantesii* H. B. K. = *Ocotea ramen-*
tacea Mart. herb.).
geniculata N. E. (= *aestivalis* Spgl. = *Benzoin geni-*
culatum G. Don, = *Evosmus geniculata* Nutt. =
Laurus aestivalis et *axillaris* Lam. = *L. geniculata*
Walt, Mchx., p. 449, = *L. glomerata* Lam.).
japonica Spgl. (= *Fiwa japonica* Gmel. System. =
Litsaea japonica Juss. = *L. Thunbergii* Siebold, =
Tomex japonica Thbg.), japanischer, ♂. k. Japan.
laurifolia Jacq. (= *sebifera* Spgl. = *Berrya chinensis*
Klein, = *Litsaea chinensis* Lam. = *L. hexantha* Juss.
= *L. obtusa* Blume, = *L. tetranthera* W. = *Tomex*
tetranthera W.).
monopetala Roxb. (= *macrophylla* Wall. = *Litsaea*
monopetala P. = *Tomex monopetala* Hffg.), einkroni-
ger, ♂. w. Ostindien.
Roxburghii N. E. (= *apetala* Roxb. = *citrifolia* Juss.
= *Daradmeda* Hamilt. = *Panskia* Hamilt. = *sebifera*
Heyne, = *Litsaea apetala* P. = *L. citrifolia* Juss.
= *L. sebifera* P. = *Tomex sebifera* W.), Roxburgh's,
♂. w. Ostindien.
albida Spgl., v. *Sassafras albidum*, p. 633, II.,
dealbata RBr., *obovata* Hamilt. (= *Cuipala* Don),
zeylanica N. E. (= *pulcherima* C. Wall.), v. Lit-

Tetranthera

saea dealbata, obovata, zeylanica, p. 366, II., *trinervia* Spgl. (ex parte), v. *Daphnidium Myrrha*, p. 191, II.

Tetrapoma *Krusianum* Fisch. et Mey., Turcz., v. p. 886.

Tetrarrhena RBr., Schafgras, VI. 1., Gramineae.
distichophylla RBr. (= *Ehrharta distichophylla* LaBill.),
zweireihigblättriges, 4. k. Neuholland.

Tetratheca Sm., Vierbüchse.

affinis Endl., ähnelnde, ♂. t. Neuholland.

hirsuta Lindl. (= *Tremandra Hügelii* Hort.), rauhhärrige, ♂. t. Neuholland.

setigera Endl., borstentragende, ♂. t. Neuholland.

Tetrazygia Rich., DC., Tetrazygie, X. (VIII) 1.,
Melastomaceae.

discolor DC. (= *Melastoma acuminatum* Vahl, = *M. argyratum* Presl, = ? *M. cinnamomifolium* Jacq. = *M. discolor* L. = *M. elaeagnoides* Sieb. Flor. trin.),
verschiedenfarbige, ♂. w. Westindien.

Tetrorrhiza Adans., *cruciata* Delarb., v. *Gentiana cruciata*.

Teucrium T., L., Gamander.

angustissimum Schreb. (= *angustifolium* Steud. = *capitatum* L. var. Poir. = *Chulilia* Cav. = *Polium* var. ζ Benth.).

Arduini L. mant. (= *Scorodonia Arduini* Rchb. = *Scutellaria cretica* L.), Südeuropa, Griechenland etc.

Botrys L. (= *botryoides* Hort.).

campanulatum L. (= *diversiflorum* Mch.).

capitatum L. (= *Belium* Schreb. = *corymbiferum* Dsf. = *lavandulatum* Pourr. = *Polium* L. var. Benth. = *Polium capitatum*, *erectum*, *serratum* et *smyrnaeum* Mill.).

Cavanillesii Bertero, (= *bicolor* Sm. = *heterophyllum* Cavan., non L'Her. = *orchideum* Lindl.), Cavanilles's, ♂. k. Chili.

Chamaedrys L. (= *multiflorum* Hort., non L. = *officinale* Lam. = *Pseudo chamaedrys* Wender.).

chilense Dsf., chilesischer, ♂. k. Chili.

cubense L. (= *chamaedryfolium* Mill. = *laevigatum* Vahl).

euganeum Visiani, euganeischer, 4. f. Oberitalien.

flavum L. (= *Chamaedrys flava* Mch.), β) *purpureum* Benth. (= *lucidum* Sibth., Sm., non L. = *regium* Hortul.). Griechenland, Smyrna.

fruticans L. (= *tomentosum* Mch. = *Polium latifolium* Mill.).

inflatum Sw. (= *palustre* H. B. K. = *vesicarium* Mill. = *villosum* Forst.).

lusitanicum Lam., non Schreb. (= *Salviastrum* Hffg., Lk. = *Scorodonia lancifolia* Mch.), portugiesischer, 4. ♂. k. Portugal.

Marum L. (= *maritimum* Lam.), β) *myrtifolium* Dsf.

Polium L. Als Abarten werden von Bentham dazu gestellt: *aureum* Schreb., *aegyptiacum* P., *flavescens* Schreb., *valentinum* Schreb. (= *Polium fruticosum* Mill.), *pyncnophyllum* Schreb., *cylindricum* Schreb., *capitatum* L., *Achaemis* Schreb. (= *Polium integerrimum* Mill.), β) *vulgare* Benth., hierzu *lusitanicum* Schreb., non Lam. (= *album* Poir.), *Pseudo hysopus* Schreb. (= *lanigerum* Lagasca) etc.

Teucrium

- pyrenaicum L. (= *reptans* Poir. = ? *rotundifol.* Schreb.),
 scordioides Schreb. (= *lanuginosum* Hffg., Lk.),
 spinosum L. (= *mucronatum* L.).

Chamaepitys L., *Laxmanni* L., *salicifolium* L., v.
 Ajuga *Chamaepitys*, *Laxmanni*, *salicifolia*, p. 26,
 27 et p. 17, II., *sibiricum* L., v. *Nepeta ucranica*.

Thalictrum T., Wiesenraute.

- angustifolium L. (= *angustissimum* Crtz. = *Bauhini*
 Spgl. = *Bauhinianum* Wallr. = *nigricans* Gaud.),
 α) *stenophyllum* K. (= *angustifolium* DC.), β) *hetero-*
phyllum K. (= *nigricans* DC., non Jacq. = *Morisoni*
 Gmel.), γ) *laserpitifolium* W. Enum. (= *lucidum* DC.).

altaense Fisch., altaische, 4. f. Altaisches Sibirien.

baicalense Turcz., baicalische, 4. f. Sibirien.

calabricum Spgl. (= *purpureum* Tenore).

Cornuti L. (= *revolutum* DC.), β) *corynellum* DC.
 (= ? *confertum* Mch. = *pubescens* Pursh).

dasycarpum Fisch., Mey. et Lallein. (= *Cornuti* β Hort.
 Petropol.), rauchfrüchtige, 4. f. Nordamerika.

dioicum L. (= *laevigatum* Mchx.).

dunense Dumort., Dünen-W., 4. f. Belgien.

flavum L. (= *pratense* L. fl. lappon. = *nigricans* Jacq.
 = *anonymon* Wallr. = *heterophyllum* Lej.), β) *vagi-*
natum Dsf., γ) *latifolium* Tausch, δ) *angulosum* Dsf.

floribundum Schrad., blüthenreiche, 4. f. ? Sibirien.

foetidum L. (= *saxatile* Vill. = *styloideum* L. fil.).

gracile C. A. Mey., schlanke, 4. f. Altaisch. Sibirien.

isopyroides C. A. Mey., Ledeb., doltockenähnliche, 4. f.
 Alaisches Sibirien.

Kochii Fr., Koch's, 4. f. Schweden.

Leyii Löhr, Ley's, 4. f. Eifel.

rugosum Ait. (= ? *crenatum* Dsf. = *discolor* W.).

sibiricum L. (= *acuminatum* Spgl. = *parvifolium* Mch.),
 β) *ruthenicum* Schrad.

strictum Ledeb. (= *exaltatum* C. A. Mey.), steife, 4. f.
 Altaisches Sibirien.

vulgare Fr. Schultz, gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.

α) *minus* L. (= *Jacquinianum* K. = *majus* Jacq. =
montanum Wallr.), β) *roridum* K. (= *glaucescens* W.),

γ) *glandulosum* K. (= *pubescens* Schlchr. = *mon-*
tanum glandulosum Wallr.), δ) *strictum* K. (= *syl-*
vaticum K. = *minus* Poll. = *saxatile* DC.), ε)

dumosum K. (= *ambiguum* Schlchr. = *elatum* Gaud.
 = *majus* Sm.), ζ) *nutans* Dsf., η) *flexuosum* Rchb. (=

collinum Wallr.), θ) *trispermum* Fisch., ι) *capillare* Rchb.

Unbestimmtere: *altissimum* Wender., *apiculatum* Tausch,
 Sweet, *cinereum* Dsf., *dichotomum* Hort., *divaricatum*
 Hornem., W., *glaucifolium* Wender., *glaucophyllum*
 Wender., *Schweiggeri* Spgl.

Thapsia T., Thapsie.

altissima Mill., höchste, 4. f. Apulien.

Asclepium L. (= *Apulia* Mill.).

maxima Mill. (= *villosa* L. var. ? DC.), größte, 4. f. b. Span.

villosa L. (= *decussata* Lagasca).

foetida L., *meoides* Guss., v. *Elaeoselinum foetidum*
 et *meoides*, p. 218, II., *gummifera* Spgl., v. *Laser-*
pitium gummiferum, p. 343, II., *Laserpitii* Spgl.,
 v. *Prangos ferulacea*, p. 558, II.

Hinsichtlich der übrigen s. *Thapsium*.

Thapsium Nutt. (= *Thaspium* Auct.), Thapsium, V. II., Umbelliferae.

barbinode Nutt. (= *Ligusticum barbinode* Mchx. = *Sison trifoliatum* W. Enum. ex parte, = *Smyrniium barbinode* Mühlbg. = *Thapsia trifoliata* Mill., p. 806), bartknotige, 4. f. Nordamerika.

cordatum Torr. et A. Gr. (= *Sison trifoliatum* Mchx. = *Smyrniium cordatum* Walt. = *Sm. trifoliatum* Mühlbg. = *Thapsia trifoliata* L. = *Zizia cordata* K.), herzförmige, 4. f. Nordamerika.

β) atropurpureum Nutt. (= *Cnidium atropurpureum* Spgl. = *Smyrniium atropurpureum* Lam.).

Thaumarica cretica Gaudich., v. *Parietaria cretica*, p. 586.

Thea L., Theestrauch.

assamica Hort. angl., assamischer, ʒ. t. Ostindien.

Thecanthes punicea Wickstr., v. *Pimelea punicea*, p. 525, II.

Theka Lam., *ternifolia* Hamilt., v. *Tectona grandis*, p. 800.

Thelysia grandiflora Salisb., v. *Iris alata*, p. 421.

Theobroma L., Cacaobaum.

angustifolia Moç., Sess. (= ? *speciosa* W. herb.), schmalblättriger, ʒ. t. w. Mexico, Brasilien.

caribaea Sweet, caribäische, ʒ. w. Westindien.

guianensis W. (= *Cacao guianensis* Aubl.).

angusta L., v. *Abroma augusta*, p. 1.

Theodora speciosa Medic., *stipulata* Eckl., Zeyh., v. *Schotia speciosa et stipulata*, p. 731.

Theodorea amara Cass., v. *Saussurea amara*, p. 723.

Theophrasta L., Theophrasta.

Jussieui Lindl. (= *americana* Juss., Dsf., Sw., non L. = *Henrici* Hamilt.).

latifolia W., breitblättrige, ʒ. w. Südamerika.

pinnata Jacq. (= *Brownea erecta* Hort.), gefiederte, ʒ. w. Caracas.

macrophylla L., v. *Claviga macrophylla*, p. 202, *serrata* Hffg. (= *serratifolia* Hort.), v. *Brexia spinosa*, p. 131.

Thermopsis RBr. (= *Thermia* Nutt., Spgl.), Fuchsbohne.

corgonensis DC. (= *alpina* Ledeb. = *Thermia alpina* Spgl.).

rhombifolia DC. (= *fabacea* DC. var. Hook. = *Cytisus rhombifol.* Pursh, = *Thermia rhombifol.* Nutt.), rautenförmigblättrige, 4. f. Nordamerika.

Thesium L., Leinblatt.

Bergeri Zuccar., Berger's, 4. f. b. Griechenland.

ebracteatum Hayne, (= *comosum* Roth).

macranthum Fenzl, großblumiges, 4. k. Mesopotamien.

montanum Ehrh. (= *bavarum* Schrk.).

multicaule Ledeb., vielstengeliges, 4. f. Alt. Sibirien.

pratense Ehrh. (= *brevicolle* Presl, = *decumbens* Gmel. fl. Bad. = *Linophyllum* L., Sm., var. Spgl.).

Thevetia L., Juss., Thevetie, V. I., Contortae-Apocynae.

Ahovai A. DC. (= *Cerbera Ahovai* L., p. 172).

cuneifolia A. DC. (= *Cerbera cuneifolia* H. B. K.), keilblättrige, ʒ. ʒ. w. t. Mexico.

nerifolia Juss. (= *Cerbera Thevetia* L.), oleanderblättrige, ʒ. ʒ. w. Westindien.

Thibaudia R. et P. (Thibaud de Chanvalon, franz. Botaniker), X. 1., Ericaceae-Vaccinieae.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ⚥. t. Neugranada.
coriacea Blume, *lucida* Blume, *setigera* Wall., *Sprengelii* Wall., v. *Agapetes coriacea*, *lucida*, *setigera*, p. 12, II. et *Sprengelii* Nachlese, *serrata* Wall., v. *Gaylussacia serrata*, p. 256, II.

Thibaudia nervosa Colla, v. *Bletia florida*.

Thisantha Eckl., Zeyh., Dickblümchen, V. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

glabra Eckl., Zeyh. (= *Crassula glabra* Haw. = *C. glomerata* β Ait., W.), kahles, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.
glomerata Eckl., Zeyh. (= *Crassula glomerata* L. = *C. scleranthoides* Burm.), knaulförmiges, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

strigosa Eckl., Zeyh. (= *Crassula strigosa* L.), striegeliches, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

Thlaspi Dill., T., Täschelkraut.

alpinum Jacq. (= *minimum* Arduin. = *montanum* γ DC.).
 β) *sylvium* Gaud.

altaicum Fisch. et Mey., altaisches, ♂. 4. f. Alt. Sibirien.

annuum C. Koch, jähriges, ☉. f. Asiat. Rußland.

arvense L. (= *baicalense* DC.).

ceratocarpum Murr., L. fil. (= *cornutum* Clairv. = *Capsella ceratocarpa* Mch.).

cochleariforme DC., löffelkrautähnliches, 4. f. Sibirien, Dahurien.

collinum MB. (= *arvense* L. var. Spgl. = *nemosum* Adam., Hoffm.).

hastulatum Stev. (= *Hutchinsia hastulata* DC. = *Lepidium chalepense Gmelinianum* Fisch. = *Noccaea hastul.* Steud.), spontonförmiges, 4. f. Sibir., Caucasus, Persien.

latifolium MB. (= *macrophyllum* Hoffm. = *Pterolobium Biebersteinii* Andr.).

orbiculatum Stev. (= ? *Fischerianum* Bess.), kreisförmiges, ☉. f. Europa, Caucasus.

rotundifolium Gaud., K. (= *Hutchinsia rotundif.* DC. = *Iberis rotundif.* L. = *Lepidium rotundif.* All. = *Noccaea rotundif.* Mch., Rchb.).

stylosum * (Tenore), (= *Hutchinsia stylosa* DC. = *Iberis styl.* Tenore, = *Noccaea styl.* Rchb.).

strictum Sweet, steifes, ☉. f. Persien.

arabicum Vahl, (non MB., nec Desv.), v. *Schouwia arabica*, p. 643, II., *africanum* Burm., *campestre* L., *Cardamines* Poir. etc., v. *Lepidium africanum*, *campestre*, etc., p. 454 et 350, II. Zu ergänz. p. 807.
Thlaspidium semperflorens Andr., v. *Iberis semperflorens*, *Thlaspidium* Medic., *hieracifolium* Medic., *saccatum* Medic. etc., v. *Biscutella apula*, *auriculata* etc., *Thlaspidium sativum* Spach, v. *Lepidium sativ.*

Thomasia Gay., Thomasie.

canescens Lindl., grauliche, ⚥. t. k. Neuholland.

diffusa G. Don, (= ? *prostrata* Hort.), weitschweifige, ⚥. t. k. Neuholland.

glutinosa Lindl., klebrige, ⚥. t. k. Neuholland.

grandiflora Lindl., großblumige, ⚥. t. k. Neuholland.

paniculata Lindl., rispige, ⚥. t. k. Neuholland.

pauciflora Lindl., wenigblumige, ⚥. t. k. Neuholland.

stipulacea Lindl. (= *macrocarpa* Hügel), zwischenblättrige, ⚥. t. k. Südwestl. Neuholland.

Thommasinia Auct., v. *Tommasinia*.

Thrasya H. B. K., *cultrata* N. E., v. *Panicum monostachyum*, p. 474, II.

Thrinax L. fil., Schilfpalme.

argentea Lodd. (= *Palma argentea* Jacq. fragment.), silberfarbige, ♀. w. Antillen.

barbadensis Lodd. (= *parviflora* Maycock fl. Barbados, non Sw.), barbadische, ♀. w. Barbados.

multiflora Hort. angl. et belg., vielblumige, ♀. w. Westindien.

parviflora Sw. (= *Corypha palmacea* P. Br.).

Pumilio Lodd. (= *pumila* Fulchiron), niedrige, ♀. w. Jamaika.

pygmaea Hort. angl. et belg., zwergige, ♀. ♀. w. ? Westind.

radiata Lodd. (= *aurata*, *aurantia*, *elegans et gracilis* Hort.), strahlige, ♀. w. Antillen, Trinidad.

stellata Hort. angl. et belg., sternförmige, ♀. ♀. w. ? Westind.

Thrinicia Roth, Thrinicie.

glabra Schlchr., kahle, 4. f. Schweiz, östreich. Litorale.

hirta Roth, (= *pilocalyx* Lagasca, = *Apargia hirta* Scop. = *Colobium hirtum* Roth, = *Hedypnois hirta* Sm. = *Hyoseris hirta* G. = *Leontodon hirtus* L.), β) *nudicalyx* Lagasca, (= *psilocalyx* Rchb.), γ) *Leyseri* Wallr. (= *taraxacoides* β Gaud.).

maroccana P. (= *hispida* Roth var. K. = *mauritanica* Speg. = *Hyoseris hispida* Schousb.).

Thuja L., Lebensbaum.

Doniana Hook. (= ? *Dacrydium plumosum* Don), Don's, ♀. k. Neuzeeland.

excelsa Bongard, (= *Cupressus americana* Trautv.), hoher, ♀. f. Insel Sitcha.

lineata Dsf., Poir., linirter, ♀. f. k. ?

β) *lavandulaefolia* Dsf.

nepalensis Lodd., nepalscher, ♀. f. b. k. Nepal.

occidentalis L., var. *ovata* Hort. Vindob.

orientalis L., α) *expansa* Endl., β) *pyramidalis* Tenore,

γ) *stricta* Hort., δ) *tatarica* Pinet. Woburn., ε) *Wareana* Hort. angl.

Hybride: *hybrida* Knight.

cupressoides L., v. *Widdringtonia cupressoides*.

Thunbergia L., Thunbergie.

alata Hook. Hybriden u. Varietäten: *albiflora* Hort.,

(= *leucantha* Hort.), *aurantiaca* Hort. et *aurantiaca*

superba Hort., *Barkeriana* Hort., *Fryeri* Lindl., *flava* Hffg.

chrysops Hook., goldfarbige, 4. ♀. Sch. w. Sierra Leone.

? *fastuosa* v. Houtte, prächtige, ♀. Sch. w. ?

Hawtayneana Wall. (= *coerulea* Wight, = *Meyenia*

Hawtayneana N. E.).

Saltiana Steud. (= *angulata* RBr., non Hook.), Salt's,

♀. Sch. w. Abyssinien.

coccinea Roxb., Wall., v. *Hexacentris coccinea*, p. 298, II.

Thunbergia capensis Montin, v. *Gardenia Thunbergia*.

Thylacantha campestris Mart., v. *Angelonia salicariaefolia*, p. 869.

Thymbra ciliata Dsf., *hirsuta* P. (= *hirsutissima* Vent.), v. *Thymus ciliatus et hirsutissimus*, *spicata*

Pall., non L., v. *Ziziphora taurica*, p. 864.

Thymelaea Adans., Scop., Mch., *alpina* Mch., *Cneorum*

All. etc., v. *Daphne alpina*, *Cneorum* etc., *arvensis*

Lam., *dioica* All., *Tartouira* All., v. *Passerina*

annua, *dioica*, *Tartouira*.

Thymelina sericea Hffg., *simplex* Hffg., v. *Gnidia sericea* et *imberbis*.

Thymus T., Thymian.

bracteosus Visiani, deckblättriger, ⚔. f. Dalmatien.
capitatus Hffg. et Lk. (= *creticus* Brot. = *Marinosci* Tenore, = *Satureja capitata* L.), kopfförmiger, ⚔. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

ciliatus Benth., non Lam. (= *Thymbra ciliata* Dsf.), gewimperter, ⚔. k. Nordafrika, Canarische Inseln.

citriodorus Gmel., Lk., non Schreb. (= ?*elatus* Schrad.).

hirsutissimus Poir. (= *Thymbra hirsuta* P. = *T. hirsutissima* Vent.), rauhhaarigster, ⚔. k. Kleinasien.

pannonicus All. (= *austriacus* Bernh. = *lanuginosus* Mill. = *hirsutus* plur. Auct. = *piligerus* Opiz).

β) Marschallianus W.

pulchellus C. A. Mey., schöner, ⚔. f. Caucasus.

Serpyllum L., *arenarius* Bernh., *decumbens* Bernh., *sylvestris* Auct., non Schreb., *effusus* Host var.

striatus Vahl, (= *acicularis* Guss., non W. K. = ?*hirtus* W. Enum. = *Zygis* Sibth., Sm., non L.), gestreifter, ⚔. k. f. b. Südeuropa, Griechenland.

tenuifolius Mill. (= *vulgaris* L. var. Benth.), dünnblättriger, ⚔. f. b. k. Südspanien.

tomentosus W. (= ?*elongatus* Lk. = *marifolius* Pourr., non W.).

Willdenowii Boiss. (= *hirtus* W. Enum.), Willdenow's, 4. k. f. b. Gibraltar.

Unbestimmtere: *aegyptiacus* Benth., *splendens* Hort.

alpinus L., *Calamintha* Scop. (= *Moschatella* Polli.

= *umbrosus* Sgpl.), *carolinianus* Mchx. (= *grandiflorus* Sins),

grandiflorus Scopol., *graveolens* MB.

(= *canus* Stev. = *exiguus* Sibth., Sm.), *Herba*

barona Loisel. (= *affinis* Sieb. = ?*lucidus* Guss.),

Nepeta Sm. (= *Brauneanus* Hoppe, = *diffusus* Hortul.) et var. *athonicus* Bernh.,

patavinus Jacq. (= *suaveolens* Sibth., Sm.), *rotundifolius* Poir.

(= *melissoides* Bernh.), *purpurascens* Poir., v. *Calamintha*

alpina, *officinalis*, *caroliniana*, etc., p. 144,

Sect. I. et II., *lucidus* Ehrh., v. *Ziziphora clinopodioides*,

origanifolius Visiani, v. *Calamintha thymifolia*, p. 104, II.

Hinsichtl. d. übrigen Synonymie s. *Micromeria*, p. 809

et 406—407, II.

Thysanocarpus Hook., Franzennüßchen.

curvipes Hook. (= *runcinatus* G. Don).

pusillus Hook., niedriges, 4. f. Californien.

Thysanotus RBr., Wimperkronen.

divaricatus RBr., ausgespreizte, 4. Kn. t. k. Neuholland.

hispidulus RBr. (= *Chlamysporum hispidulum* Salisb.),

steifhaarige, 4. Kn. t. k. Neuholland.

multiflorus RBr. (= *Chlamysporum junceum* Salisb.),

vielblumige, 4. Kn. t. k. Neuholland.

Ob anceps Lindl., *asper* Lindl., *Manglesianus* Kunth,

pauciflorus RBr. (= *Chlamysp. paucifl.* Salisb.), *triandrus*

RBr. (= *Chlamysp. triand.* Salisb.), sämtlich

Neuholländer, kultivirt werden, ist mir nicht bekannt.

Thysselinum Adans., Hoffm., Mch., *angustifolium* Rehb.

(= *palustre* Hoffm. = *Plinii* Sgpl. = *sylvestre*

Rehb.), *cantabrigense* Hoffm., *involucratum* Mch., v.

Peucedanum sylvestre et var. β et *selinoides*, p. 505, II.

T. davuricum Speg., v. *Callisace dahurica*, p. 148, *grandiflorum* Mch., v. *Pleurospermum austriacum*, p. 635, *nigrum* Mch., v. *Ligusticum pyrenaicum*, p. 462, *lucidum* Mch. = ?

Tiarella L., Spitzhütchen.

pentandra Torr. (= *Oreanthus bracteatus* Rafin.), fünf-männiges, 4. f. Nordamerika.

trifoliata L., dreiblättriges, 4. f. Asien, Nordamerika.

unifoliata Hook., einblättriges, 4. f. Nordamerika.

bitermata Vent., v. *Hoteja bitermata*, p. 205, II., *bracteata* Torrey, *colorans* Grab., *Menziesii* Pursh, v. *Heuchera bracteata*, *glabra*, *Menziesii*, p. 298, II. *Tiaridium* Lehm., *indicum* Lehm. (= *anisophyllum* G. Don), *monostachyum* G. Don, *velutinum* Lehm., v. *Heliophytum indicum*, *monostachyum*, *velutinum*, p. 292, II.

Ticorea Aubl. (einheimischer Name), X. I., *Tricoccae*-*Rutaceae*.

foetida Aubl. (= *Ozophyllum foetidum* Martin, Räusch. = *O. trifoliatum* W.), stinkende, 5. w. Guiana.

jasminiflora St. Hil. (= *Galipea multiflora* Schult. = *Sciuris multiflora* N. E., Mart.), jasminblumige, 5. w. Brasilien.

Tigridia Juss., Tigerblume, (Pfauenschwertel).

lutea Lk., Kl., Otto, gelbe, 4. Zw. k. Chili.

Pavonia Juss., P. (= *grandiflora* Salisb. = *Ferraria Pavonia* L. = *F. Tigridia* Sims, = *Moraea Pavonia* Thbg.), β) *conchiflora* Sweet.

In van Houttes Établissement horticole wird noch eine *T. augusta*, *coccinea*, *coelestis* (= *exaltata*) kultivirt.

Tilia T., Linde.

alba W. K. (= *argentea* Dsf., DC. = *pannonica* Jacq. = ? *petiolaris* DC. = *rotundifolia* Vent. = *tomentosa* Mch.), α) *depressa* Hort. Vindob., β) *oblonga* Hort. Vindob., γ) *virescens* Spach, (= ? *argenteo-nigra* A. Braun, Döll).

flava Wolny, hellgelbe, 5. f. Banat.

flavescens A. Braun, gelbliche, 5. f. ?

floribunda A. Braun, (= *laxiflora* Hort. Carlsr.), blüthenreiche, 5. f. ?

grandifolia Ehrh. (= *affinis* Opiz, = *communis* γ Spenn. = *cordifolia* Bess. = *corymbosa* Ortin. = *europaea* β . δ . ϵ . L. = *mollis* Spach, Ortin. = *pauciflora* Hayne, = *platyphylla* Scopol. etc.), α) *vulgaris* Spach, β) *pluriflora* Spach, γ) *longepedunculata* Spach, δ) *bracteosa* Spach, ϵ) *leptolepis* Spach, ζ) *brevipes* Spach. — Nach der Gestalt der Früchte: *oxycarpa* Rchb., *sphaerocarpa* Rchb., *turbinata* Rchb. — *corylifolia* Host, *flaccida* Host, *intermedia* Host, non DC., *laciniata* Host, *latebracteata* Host, *mutabilis* Host, *obliqua* Host, *praecox* Host, *pyramidalis* Host, *spectabilis* Host, *vitifolia* Host, gehören nach Koch und Endlicher als Varietäten (oder zum Theil Hybriden) auch hierher.

heterophylla Vent. (= *alba* Mchx., non W. K. = *americana* Du Roi, = *macrophylla* Hort.).

laxiflora Mchx. (= *glabra* var. Loud. = *pubescens* Ait. = *americana* Walt., Wangenh. = *caroliniana* Mill.).

β) *leptophylla* Vent. (= *missisippensis* Dsf.).

neglecta Spach, übersehene, 5. f. Nordamerika.

Tilia

nigra Borkh., Spach, (= *americana* L., Ait. = *canadensis* Mchx. = *caroliniana* Wengenb. = *hollandica* DuRoi, = *glabra* Vent.), β) *vestita* Doell.

parvifolia Ehrh. (= *sylvestris* Dsf.), var. *cordifolia* Spach, major et *rotundifolia* Spach.

praecox A. Braun, non ? Host, (= *corallina* Hort. Carlsr.), frühzeitige, β . f. ?

rubra DC. (= *europaea* var. *rubra* Loud. = *grandifolia* β Sm. et plur. Auct.).

truncata Spach, (= *pubescens* var. Vent.), abgestutzte, β . f. Carolina, Georgia.

Tillaea Michel., Tillaea.

Drummondii Torr. et A. Gr., Drummond's, \odot . f. Texas, Louisiana.

peduncularis Sm. (= *Bulliardia bonariensis* DC. = *Crassula bonariensis* Cambes.), gestielte, \odot . f. Brasilien, Bonarien.

rubescens H. B. K. (= *connata* R. et P. = *diffusa* W. herb.).

aquatica L., *prostrata* Schkhr., *Vaillantii* W., v. *Bulliardia aquatica* (= *Linnæi* Spgl.) et var. β *prostrata* (= *Schkuhrii* Spgl.), et *Vaillantii*, p. 137, *erecta* Sauv. (= *rubra* Gouan), v. *Sedum caespitosum*, p. 651, II., *hexandra* Lapier., v. *Elatine hexandra* (= *tripetala* L.), *pharnaceoides* Hochst., v. *Crassula pharnaceoides*, p. 165, II.

Tillandsia L., Thbg., Tillandsie.

aloides Cham., Schldl., aloeähnliche, 4. w. Mexico.

aloifolia Hook. (= *flexuosa* β Lindl. = *tenuifolia* Jacq., non Sw.).

dianthoides Rossi, (= *aeranthus* Dsf. = ? *subulata* Arabida, = *Amalia aerisiniola* Hort. hispan. ? = *Pourretia aeranthus* Loisel.), nelkenähnliche, 4. w. Brasilien.

filiformis Lodd., fadenförmige, 4. w. ?

floribunda H. B. K. (= *coarctata* W.), blüthenreiche, 4. w. Peru.

Karwinskyana Schult., Karwinsky's, 4. w. Mexico.

rubida Lindl., röthliche, 4. w. Brasilien.

vitellina Kl., dottergelbe, 4. w. Brasilien.

Unbestimmtere: *acutifolia* Hort. angl., *discolor* Hort., *farinosa* Hort. (Billberg. spec.?), *obscura* Lodd., *splendens* Hort., *tortuosa* Lodd.

exsudans Dsf., v. *Bromelia exsudans*, p. 132, *zonata* Hort., *bicolor* Hort., v. *Billbergia zebrina* et *bicolor*, p. 123 et 69, II., *psittacina* Hook., v. *Vriesia psittacina*.

Tinantia Scheidw., Tinantie, III. 1., Commelynaceae.

fugax Scheidw. (= *Commelyna rosea* Schldl.), flüchtige, \odot . m. f. Mexico.

Tinus occidentalis L., v. *Clethra tinifolia*, p. 205,

Tinus laurifolius Medic., Borkh, v. *Viburnum Tinus*.

Tithymalus Neck., Mch., Haw., *acutifolius* Lam.,

antiquorum Mch. etc., v. *Euphorbia Pithyusa*, antiquorum etc.

Tithonia Dsf., Aurorablume.

excelsa DC. (= *Helianthus excelsus* W. = *H. giganteus* Cav., non L. = *H. trinervis* Hort.).

pachycephala DC., dickköpfige, 4. k. Mexico.

tubaeformis Cass. (= *helianthoides* Weinm. = *Helianthus tubaeformis* Ortega).

Tittmannia ovata Rehb., *viscosa* Rehb., v. *Vandellia crustacea* et *hirsuta*.

Tium Medic., *hians* Mch. et *lineare* Mch., v. *Oxytropis deflexa* et *Astragalus sulcatus*.

Tococa D. Don, p. 812.

Aubletii D. Don, (= *guianensis* Aubl. = *Melastoma physiphora* Vahl, = *M. Tococa* Desr.).

lanata D. Don, (= *Melastoma lanata* Hort. Cels.).

Toddalia Juss., Toddalie.

aculeata P. (= *asiatica* Lam.).

paniculata Lam. (= *inermis* P. = *Scopolia inermis* Sm. = *S. paniculata* Speg. = *Vepris obovata* G. Don).

Tofieldia Huds., Tofieldie.

calyculata Whlbg. (= *allemannica* Bluff et Fingerh. = *alpina* Sm. = *anthericoides* Schrk. = *palustris* DC. Stbg.).

β) *rubescens* Hoppe, (= *rubra* Braune), γ) *capitata* Hoppe, δ) *racemosa* Hoppe, (= *collina* Schult. = *Hebelia collina* Gmel.).

pubens Dryandr., Sm. (= *pubescens* P.).

Tolmiea Menziesii Torr., A. Gray., v. *Heuchera Menziesii*, p. 298, II.

Tollatia Endl., Tollatie, XIX. II., Compositae-Corymbif.

chrysanthemoides Endl. (= *Oxyura chrysanthemoides* DC. p. 580, non Hort.).

Tolpis Adans., G., Tolpis.

I. *Drepania* Juss., Dsf.

barbata G. (= *prolifera* Mch. = *Crepis barbata* L., non Mill. = *C. boetica* Mill.), b) *pallida* (Dsf.).

II. *Polychaetia* Tausch, (= *Schmidtia* Mch.).

altissima P. (= *sexaristata* Bivon. = *virgata* Bertol. = *Crepis* alt. Balb. = *C. ambigua* Balb. = *C. virgata* Dsf. = *Schmidtia ambigua* Cass.).

crinita Lowe, (= ? *Schmidtia quercifolia* Rehb.).

fruticosa Schrk. (= *Aethionia fruticosa* Don, = *Hieracium fruticosum* L.).

pectinata DC. (= *Crepis pect.* Lowe, = ? *Schmidtia anethifol.* Rehb.), kammförmige, ☉. f. k. Madeira.

Tomex japonica Thbg., v. *Tetranthera japonica*.

Tommasinia Bertol. (Tommasini, Magistratspräsident zu Triest), V. II., Umbelliferae.

verticillaris Bertol., wirtelförmige, 4. f. Südl. Schweiz, Oberitalien.

Tonsella (= *Tontelea*) *pyriformis* Sweet, *prinoides* Roxb., v. *Salacia pyriformis* et *prinoides*, p. 623, II.

Tordylium T., Zirmet (Drehkraut).

Hasselquistiae DC., Hasselquist's, ☉. m. f. Brasilien.

officinale L. (= *microspermum* Tenore, = *Condylocarpus officinalis* K.).

Unbestimmt: *sulcatum* Dsf.

absinthifolium P., v. *Zosimia absinthifolia*, p. 865, *aegyptiacum* L., *cordatum* Poir., v. *Hasselquistia aegy.* et *cordat.*, *cyrenaicum* Speg., v. *Helosciadium nodiflorum*, *peregrinum* L., v. *Ulospermum dichotomum*, p. 830, *segetum* Hort. Par., v. *Torilis helvetica*, p. 813, *siifolium* Scopol. (= ? *austriacum* Hort.), v. *Heracleum austriacum*.

Torenia L., Torenie.

asiatica L. (= *hians* et *vagans* Roxb.).

edentula Griff. (= *peduncularis* Benth.), zahnlose, ☉. 4. w. Ostindien.

Torenia

hirsuta Lam. (= *cordifolia* Benth., non Roxb.), rauhaarige, ☉. 4. w. Ostindien.

plantaginea Benth. (= *Craterostigma plantagineum* Hochst. = *Dunalia acaulis* RBr.), vegetrittähnliche, 4. w. Abyss. *crustacea* Cham., Schldtl. (= *alba* Hamilt. = *flaccida* RBr. = *lucida* Hamilt. = *varians* Roxb.), *diffusa* Roxb., *hirta* Chamiss., Schldtl., v. *Vandellia crustacea*, pedunculata scabra, *obtusifolia* Sm., v. *Mimulus glabratus*, p. 410, II.

Torilis Adans., G., Klettenkörbel.

Anthriscus G. Gmel. (= *rubella* Mch.).

helvetica Gmel. (= *divaricata* Mch. = *infesta* Hoffm. = *radiata* Mch. = *Caucalis arvensis* Huds. = *C. helvetica* Jacq. = *C. infesta* Curt. = *C. segetum* Thuill. = *Scandix infesta* L., non Jacq.).

β) *purpurea* Tenore.

microcarpa Bess. (= *ucranica* Spgl.), kleinfrüchtiger, ☉. f. Ukraine, Podolien.

crinita Spgl., v. *Daucus crinitus*, *macrocarpa* G. (= *tumida* Mch.), v. *Chaerophyllum nodosum*.

Tormentilla erecta L. (= *officinalis* Curt. = *tuberosa* Regn.), *humifusa* G. Don, *reptans* L. v. *Potentilla Tormentilla*, *humifusa*, *nemoralis*, p. 651 et p. 556—557, II.

Torresia latifolia B. P., v. *Centotheca lappacea*, p. 179.

Tortula aspera Roxb., v. *Streptium asperum*, p. 790.

Tosagris agrostidea P. B., v. *Mühlenbergia capillaris*, p. 533.

Tournefortia L., DC. (et *Messerschmidia* L., p. 521), Tournefortie.

Sect. I. *Mallota* A. DC.

argentea L. (= ? *velutina* Sm., non H. B. K.).

Sect. II. *Arguzia* Amman., DC. (= *Messerschm. spec.* L., R. et S.).

Arguzia RBr., R. et S. (= *M. Argunia* G. = *M. Arguzia* L. fil. suppl.), α) *latifolia* DC., β) *angustior* DC. (= *M. rosmarinifolia* W.).

Sect. III. *Pittonia* H. B. K., DC.

microphylla Desv. (= *lucida* Dsf. Hort. Par.), kleinblättrige, †. Sch. w. Westindien.

tomentosa Mill. (= *M. tomentosa* G. Don), filzige, †. Sch. w. Südamerika.

bicolor Sw., *cymosa* L., *foetidissima* L. (= *corymbosa* W. = *dichotoma* Flor. mexic. ined. = *foetida* P. = *macrophylla* Lam.), *gnaphaloides* RBr. (= *Heliotropium gnaphaloides* Jacq.), *heliotropioides* Hook., *hirsutissima* L., non Blanco, (= *corymbosa* Sbr. fl. trin. exsic. = *Messerschm. hirsutiss.* G. Don, = *Cordia pellita* W. = *Ehretia cymosa* W.), *laurifolia* Vent. (= ? *laurifolia* R. et S.), *mutabilis* Vent., *scabra* Lam., *scandens* W. Enum. (= *peruviana* Poir. = *volubilis* R. et P., non L. = *M. scandens* R. et S.), *suffruticosa* L. (= *incana* Lam.), *volubilis* L. (= *M. volubilis* R. et S.).

Sect. IV. *Tetrandra* DC. et A. DC., *Wallichii* DC., *tetrandra* Blume, Java, Ostind., werden nicht kult.

Sect. V. *Messerschmidia* DC., L.

fruticosa Ker. (= *T. Messersch.* Sw. = *Messersch. fr.* L. fil.).

β) *angustifolia* R. et S. (= *M. fruticosa* β P.).

Nur d. Namen nach bekannt: *angulosa* Dsf. Cat. hort. Par.

Tovomita fructipendula Poir., v. *Marialva fructipendula*, p. 387, II.

Toxicodendron Mill., G., non Thbg., *altissimum* Mill., *crenatum* Mill., *glabrum* Mill., *pubescens* Mill. (= *serratum* Mill., *vulgare* Mill. (= *volubile* Mill.) etc., v. *Rhus succedaneum*, *suaveolens*, *glabrum*, *Toxicodendron* et *radicans* etc., p. 687—688, p. 693, II. Cobbe G., v. *Schmidelia* Cobbe, p. 641, II.

Tozzellia pratensis Savi, (= *utriculata* Savi), v. *Alopecurus utriculatus*, p. 37.

Tozzia L., Tozzie, XIV. II., Personatae-Scrofulariaceae-Rhinantheae.

alpina L., Alpenbewohnende, 4. f. Europäische Alpen.

Trachelium L., Halskraut.

angustifolium Schousb., schmalblättriges, ♂. f. k. Nordafrika.

tenuifolium L. fil., v. *Merciera tenuifol.*, p. 399, II.

Trachyandra Kunth, Rauhaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

blepharophora Kunth, (= *Anthericum blepharophorum* R. et S. = *A. ciliatum* Jacq. Schönbr.), doppel-franzige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

canaliculata Kunth, (= *Anthericum canaliculatum* Ait. = *Bulbine canaliculata* Spgl., p. 137), β) *rufa* K. (= *Anther. rufum* Bot. mag. et reg.).

? *ciliata* Kunth, (= *Anthericum ciliatum* L. suppl. = *Bulbine ciliata* Lk., p. 137).

divaricata Kunth, (= *Anther. divaricatum* Jacq., p. 63).

elongata Kunth, (= *Anther. elongatum* W. = *A. filiforme* Thbg.), verlängerte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

? *falcata* Kunth, (= *Anther. falc.* Thbg., L. suppl. p. 63).

flexifolia Kunth, (= *Anther. flexifol.* L. suppl. p. 63).

hirsuta Kunth, (= *Anther. hirsutum* Thbg., p. 63).

hispida Kunth, (= *Anther. hispidum* L. = *Arthropodium hispid.* Spgl.), steifhaarige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn. β) *majus* (R. et S.), (= *Anther. hispidum* Jacq.).

Jacquini Kunth, (= *Anther. flexifolium* Jacq., non L. suppl. = *A. Jacquinianum* R. et S.), Jacquin's, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

longifolia Kunth, (= *Anther. longifolium* Jacq., p. 64).

revoluta Kunth, (= *Anther. revol.* L., Ait., Kew., p. 64).

? *scabra* Kunth, (= *Anther. scabrum* L. suppl. = *Bulbine scabra* R. et S., p. 137).

vespertina Kunth, (= *Anther. vespert.* Jacq., p. 64).

Trachylobium Hayne, Rauhblatt, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

Gaertnerianum Hayne, (= *Hymenaea verrucosa* G. = *Tanroujou* Juss.), Gärtner's, 5. w. Madagascar.

Hornemannianum Hayne, (= *Hym. verrucosa* Hornem.), Hornemann's, 5. w. Brasilien.

Trachymene Rudge, Runzel(Rau)dolde.

compressa Spgl. (= *Azorella compressa* LaBill. = *Fischera compressa* Spgl.), platte, 4. t. k. Neuholland.

ovalis DC. (= *conferta* Gaudich. = *ovata* Spgl., non Rudge), eiförmige, 5. t. k. Neuholland.

Zweifelhaft: *gigantea* Hort. angl.

incisa Rudge, v. *Hügelia incisa* Nachlese.

Trachypogon N. E., *avenaceus* N. E., v. *Sorghum halepense*, p. 773, *Schoenanthus* N. E., v. *Cymbopogon Schoenanthus*.

Trachys mucronata P., v. *Cenchrus muricatus*, p. 129, II.

Trachyspermum Lk., *copticum* Lk., v. *Ptychotis coptica*, p. 571, II.

Trachystemon D. Don, (= *Psilostemon* DC.), Rauh-
faden, V. 1., Asperifoliaceae (Borragineae).

creticum D. et G. Don, (= *Borrago cretica* W., p. 128, = *Psilostemon creticum* DC.).

orientale D. Don, (= *Borrago orientalis* L., p. 128, = *B. cordifolia* Mch. = *Nordmannia orientalis* Hort. = *cordata, cordifolia* Hort. = *Psilostemon orientale* DC.),
morgeländischer, 4. k. Orient (Byzanz).

Tradescantia L., Tradescantie.

albiflora Hort. Berol., weißblumige, 4. k. ?

caricifolia Hook., seggenblättrige, 4. k. Texas.

ciliata Hort. Berol. (= *virginica* L. var.?), gefranzte,
4. f. ? Nordamerika.

cirrhifera Mart., wickelrankige, 4. t. k. Mexico.

commelynoides R. et S., commelynenähnliche, 4. t. k. Mexico.

crassifolia Cavan., β) *Fischeri* Weinm.

crassiuscula Lk. (= *Crassula* Lk. et Otto, = *Sellowii* Pohl).
? β) *crassipes* Hort.

discolor L'Her. (= *spathacea* Sw. = *Ephemerum bi-*
color Mch.).

elata Lodd., hohe, 4. f. Nordamerika.

erecta Jacq. (= *bifida* Roth, = *malabarica* Auct. =
recta Rausch. = *undulata* Vahl, = *Commelyna grandiflora* Herbar. = *Ephemerum racemosum* Mch.).

Humboldtiana R. et S. (= *speciosa* H. B. K., non L.),
Humboldt's, 4. t. k. Mexico.

Karwinskyana R. et S., Karwinsky's, 4. t. k. Mexico.

Martensiana Kunth, (= *Commelyna multiflora* Martens
et Galeotti), Martens's, 4. t. k. Mexico.

pilosa Lehm. (= ? *pilosissima* Fraser, = *virginica* L. var.
Redouté), behaarte, 4. f. Nordamerika.

spicata Know. et Westc., ährige, 4. t. k. Mexico.

tumida Lindl., angeschwollene, 4. t. k. Mexico.

venustula Kunth, (= *Karwinskyana* Hort. Berol.), lieb-
liche, 4. t. k. Mexico.

zebrina Hort., zebrastreifige, 4. w. Südamerika.

Unbestimmtere: *punctata*, *splendens*, *thyrsosa* Brotero.

axillaris L., *cristata* Jacq. etc., v. *Cyanotis axilla-*
ris etc., p. 241 et p. 177, II, *divaricata* Vahl, v.

Dichorisandra Aubletiana, p. 200, II., *Callisia* Sw.,
v. *Callisia repens*, p. 148, *marginata* Bouché, non

Blume, *zanonia* Sw., v. *Campelia Bouchéana* et
zanonia, p. 156 et p. 114, II.

Tragacantha Adans., Mill., *argentea* Mill., *glabra*
Mill., *massiliensis* Mill., v. *Astragalus barba Jovis*,

tumidus, *Tragacantha*, p. 101—103.

Tragia *corniculata* Vahl, (= *Microstachys corniculata*
Juss. = *Cnemidostachys VahlII* Spgl.).

Tragium aromaticum Spgl. etc., v. *Pimpinella aro-*
matica etc. Sect. II. p. 526.

Tragopogon T., Bocksbart.

floccosus W. K. (= *canus* W. = *heterospermus* Schweigg.).

graminifolius DC. (= *caucasicus* Szow., Fisch. et Mey.),
grasblättriger, ♂. f. Caucasus.

hirsutus Gouan, (= *Geropogon hirsutus* L., non All.),
rauhhaariger, ♂. f. Südfrankreich.

Tragopogon

humilis Fisch., Sweet, niedriger, ♂. f. Caucasus.

phaenopappus Fisch. (= *coloratus* C. A. Mey.).

pratensis L., *γ*) *sinuatus* Avé Lallemand.

Tragopyrum MB., Bockweizen.

grandiflorum MB. (= *Polygonum grandiflorum* W.),
großblumiger, ♂. f. b. k. Armenien.

laetevirens Ledeb., freudiggrüner, ♂. f. Alt. Sibirien.

pungens MB. (= *Polygonum frutescens* var. *spinosa*
Pall.), stechender, ♂. f. Sibirien.

Tragoselinum dissectum Mch., *magnum* Mch. etc.,
v. *Pimpinella magna* etc.

Trattinickia P., non W., *angustifolia* P. etc., v.
Marshallia angustifolia etc., p. 497.

Traunsteineria Rchb. (Jos. Traunsteiner, Apotheker
u. Botaniker zu Kitzbühl in Tyrol), XX. I., Orchideae.

globosa Rchb. (= *Orchis globosa* L. = *O. Halleri* Crtz.
= *Nigritella globosa* Rchb., p. 548), kugelblumige,
4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa.

Tremandra RBr., Tremandra, VIII. I., Polygalaceae-
Tremandreae.

diffusa RBr., weitschweifige, ♂. t. Neuholland.

verticillata Hort. belg., wirtelblättrige, ♂. t. Neuholland.

floribunda Hort. = ? *Tetratheca* species, = *Hügelii*
Hort., v. *Tetratheca hirsuta*.

Trentepohlia integrifolia Roth, *pinnata* Roth, v.
Heiophila amplexicaulis, *pendula*.

Trevesia Visiani, (Familie Treves dei Bonfilji in Padua,
Gönner der Botanik), V. (VII.) v., Araliaceae.

palmata Visiani, (= *Aralia dubia* Spgl. = *A. palmata* Spgl.
= *Gilibertia palmata* DC., p. 263, = *Gastonia pal-*
mata Roxb., Lindl. = *Hedera palmata* Wall.).

Trevirania * (non W., nec Roth), (Dr. G. R. Trevi-
ranus zu Bremen u. Dr. L. C. Treviranus, Prof. der

Botanik u. Director des botan. Gartens in Bonn, aus-
gezeichnete u. kenntnisreiche Naturforscher), V. I.,
Rubiaceae.

calycina * (= *Cephaelis calycina* Lindl. = *Sutera caly-*
cina DC.), großkelchige, ♂. ♀. w. Brasilien.

Trevirania coccinea W. (= *pulchella* Mart.), *gran-*
diflora Schiede, *heterophylla* Mart., v. *Achimenes*
coccinea etc., p. 6, II., *Trevirania Gratiolae* Roth,
v. *Hornemannia bicolor*.

Triadenia Spach, *microphylla* Spach, (= *Sieberi*
Spach), *Webbii* Spach, v. *Hypericum aegyptiacum*
(= *creticum* Hort.) et *Webbii*.

Triadenia (= *Triadenum* Rafin.) *purpurascens* Rafin.,
v. *Elodea virginica*, p. 219, II.

Triaenodendron Endl., Dreizinkbaum, X, I, Legu-
minosae-Caesalpinieae.

caspicum Endl. (= *Gleditschia caspica* Dsf.), caspischer,
♂. f. Gegend das caspischen Meeres.

Trianthema Sauv., Dreiblümchen.

decandrum L. (= ? *diffusa* Mill. = *glinoides* P. =
Zaleja decandra Burm.).

monogynum L. (= *T. Portulacastrum* Sauv. = *procum-*
bens Mill.).

pentandrum L. (= *Rocama arabica* Gmel. syst. = *R.*
digyna Forsk.), fünfinniges, ☉. ♂. m. f. w. Arabien,
Ostindien.

β) *obcordatum* Roxb.

Trianthes

polyandrum Blume, (= *Pyxipoma polyandra* Fenzl),
vielmänniges, 4. w. Brasilien.

Trias Lindl., Triangelorche.

ovata Lindl., eiförmige, 4. f. Ostindien.

Tribrachia Lindl., Dreiähre.

hirta Lindl. (= *Bulbophyllum hirtum* Lindl. = *Stelis hirta* Sm.), rauhe, 4. w. Ostindien.

odoratissima Lindl. (= *Bulbophyllum odoratissimum* Lindl.
= *Stelis caudata* Don, = *St. odoratissima* Sm.),
wohlriechendste, 4. w. Ostindien.

pendula Lindl. (= *Bulbophyllum pend.* Pet. Th. = *B. recurvum* Lk., Otto).

purpurea Lindl. (= *Anisopetalum Careyanum* Hook. =
Bulbophyllum Careyanum Speg. = *Pleurothallis pur-
purea* D. Don), purpurfarbige, 4. w. Nepal.

reptans Lindl. (= *Bulbophyllum reptans* Lindl.), krie-
chende, 4. w. Nepal.

Tribulus L., Bürzeldorn.

albidus Friwaldsky, weißlicher, ☉. f. Rumelien.

terrestris L., β) *bicornutus* Fisch. et Mey. Caucasus.

Trichasma Walp., Haarklee, XVII. IV. (VI.), Legumi-
nosae-Papilionaceae.

calycinum Walp. (= *Argyrolobium calycinum* Jaub. et
Spach, = *Chasmone calycina* E. Mey. = *Cytisus
calycinus* MB. = *C. nanus* W. Enum. = *C. pauci-
florus* W.), großkelchiger, 4. ♀. f. Caucasus, Persien.

ciliatum Walp. (= *Argyrolobium Andrewsianum* Steud.
= *Chasmone Andrewsiana* E. Mey. = *Cytisus tomen-
tosus* Andr. = *Dichilus ciliatus* Speg. fil. = *Goodia
lotifolia* Hortul., non Salisb. = *G. polysperma* DC.),
gefranzter, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Trichera arvensis Schrad. (= *hirsuta* R. et S.), *ci-
liata* R. et S. (= ? *leucantha* Schrad.), *hybrida* R. et S.
(= *bidens* Schult. = *mutabilis* Schrad.) etc., v.
Knautia arvensis, *ciliata* etc., p. 438 et 335, II.

Trichilia elegans Juss., *odorata* Andr., v. *Moschoxylon
elegans* et *odoratum*, p. 421, II., *T. glandulosa* Sm.
(= *octandra* Soland), v. *Synoum glandul.*, p. 715, II.

Trichinium RBr., Haaramarath, V. II., Aizoideae-
Amaranthaceae.

alopécuroideum Lindl., fuchsschwanzähnlicher, ☉. m. f.
Neuholland.

Trichocline Cassin., Haarhülle, XIX. II., Compositae-
Eupatorineae-Mutisiaceae.

incana Cass. (= *Arnica incana* P. = *Bichenia sinuata*
Gill. et Don, = *Doronicum incanum* Lam.), weiß-
graue, 4. w. Brasilien.

Tweedii DC. (= *humilis* Hook., Arn.), Tweedi's, 4. w.
Montevideo.

Trichogyne Less., Haargriffel, XIX. v. (II.), Compo-
sitae-Corymbiferae.

cauliflora DC. (= *Chrysocoma spicata* Forsk. = *Gnapha-
lium aegyptiacum* P. = *G. Annophila* Wall. = *G.
cauliflorum* Dsf. = *G. Chrysocoma* Poir. = *G. Ruppelii*
Fresen. = *Ifloga Fontanesii* Cass.), stengelblumiger,
☉. f. Nordafrika, Ostindien.

laricifolia Less. (= *Artemisia ambigua* L. = *Seriphium
laricifolium* Lam. = *Stoebe laricifolia* E. Meyer),
lerchenblättriger, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

Trichogyne

reflexa Less. (= *Gnaphalium repens* Houtt., non L. = *Seriphium reflexum* P. = *Stoebe reflexa* L. fil.), zurückgebogener, 5. k. Cap d. g. Hoffn.

Tricholaena Schrad., Haarfennich.

fragilis A. Braun, zerbrechlicher, ☉. m. f. Abyssinien.
micrantha Schrad. (= *Agrostis plumosa* Tenore, = *Panicum saccharoides* Trin. = *P. Teneriffae* RBr. = *P. villosum* Presl, = *Saccharum Teneriffae* L.).
β) rosea N. E., γ) tonsa N. E.

Trichonema Ker, Haarschwertel.

chloroleucum Ker, (= *ochroleucum* Ker, = *Ixia chloroleuca* Jacq. = *I. crocea* Thbg. = *I. ochroleuca* Vahl).
Columnae Tenore, Rehb. (= *Ixia Columnae* Schult. = *I. minima* Tenore, Hort. = *Romulea Columnae* Sebast., Mauri).

cruciatum Ker, (= *longifolium* Salisb. = *Ixia cruciata* Jacq. = *I. fugax* Hornem. = *I. quadrangula* Laroche. = *I. rosea* Banks).

ornithogaloides Dietr. (= *chloroleucum* Ker, var. Spgl. = *Ixia ornithogaloides* Lichtst.), vogelmilchähnlicher, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

recurvifolium Ker, (= *recurvum* Spgl. = *Ixia recurva* DC., Red., non Vahl).

Trichophyllum Nutt., *lanatum* Nutt., *oppositifolium* Nutt., v. Bahía lanata, oppositifolia, p. 58, II.

Trichorrhiza teretifolia Lindl., v. *Cymbidium triste*, p. 180, II.

Trichosporum Don, *grandiflorum* Don, *radicans* Don, *volubile* N. E., v. *Aeschynanthus grandiflorus*, *radicans*, *volubilis*, p. 11–12, II.

Tricondylus ferrugineus Kngt. et Salisb., *myricae-folius* Kngt. et Salisb., *siliaifolius* Kngt. et Salisb., *tinctorius* Kngt. et Salisb., v. *Lomatia ferruginea*, *longifolia*, *siliaifolia*, *tinctoria*, p. 475 et 370, II.

Tricuspis caroliniana P. B. (= *noveboracensis* P. B. = *quinquesida* R. et S.), v. *Uralespis cuprea*.

Tridactylites annua Haw., v. *Saxifraga tridactylites*.

Tridens quinquesida Schult., v. *Uralespis cuprea*.

Trifolium T., Klee, (Dreiblatt).

ascendens Hornem., aufsteigender, 4. f. Georgia.

albiceps Ehrbg., weißköpfiger, ☉. f. Aegypten.

altissimum Dougl., höchster, 4. f. Nordamerika.

ambiguum MB. (= *Vaillantii* MB.), zweifelhafter, 4. f. Taurien, Caucasus.

anomalum Schrk. (= *repens* L. var. DC.).

capillatum Dumort., haarförmiger, 4. f. Belgien.

Cherleri L. (= *incanum* Presl, = *involutatum* Lam. = *obvallatum* Mch.).

chilense Hook. (= *Lupinaster chilensis* Presl), chilesischer, 4. k. Chili.

circumdatum Kunze, (= *Lupinaster circumdat.* Presl), kreisförmiger, ☉. f. Chili.

coarctatum Rehb., verschmälerter, 4. f. Calabrien.

conicum P., Savi, (= *Kitaibelianum* Sering. = *scabrum* Schreb. = *tenuiflorum* Tenore), kegelförmiger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

diffusum Ehrh. (= *ciliosum* Thuill. = *circumcissum* P. = *purpurascens* P.).

echinatum MB. (= *supinum* Savi).

Trifolium

- elegans* Savi, (= ? *ambiguum* MB. = *formosum* Savi, = *hybridum* Poll. = *Vaillantii* Poir. = *Amoria elegans* Presl).
fabaceum Lindl., bohnenähnlicher, ☉. f. Californien.
fimbriatum Lindl. (= *heterodon* Torr. et A. Gr. var. = ? *Wormskioldii* Lehm.).
formosum d'Urvill., schöner, 4. f. Griechenland.
fucatum Lindl. (= *physopetalum* Fisch. et Mey.), geschmückter, ☉. f. Californien.
heterodon Torr. et A. Gray., verschiedenzahniger, 4. f. Nordamerika.
 β) *atropurpureum* Nutt., γ) *calocephalum* Nutt.
isthmocarpum Brot. (= ? *elegans* Savi, = *rubicundum* Vivian. = *Amoria isthmocarpa* Presl), buchtfrüchtiger, ☉. f. Portugal.
latinum Sebast. (= ? *dalmaticum* Visiani).
leucanthum MB. (= *malacanthum* Lk. = *obscurum* Gussone, = *stellatum* Pall. = *variabile* Guss.).
Macraei Hook. (= *albopurpureum* Torr. et A. Gray), *Macraei's*, ☉. f. Chili, Californien.
marsicum Tenore, (= *squarrosus* β *elatum* Tenore), marsischer, ☉. f. Neapel.
macrocephalum Poir. (= *megacephalum* Nutt. = *Pentaphyllum macrocephalum* Speg. = *Lupinaster macrocephala* Pursh.).
Michelianum Savi, (= *hybridum* var. Auct. = *nigrescens* Vivian. = *Vaillantii* Lois. = *Amoria Micheliana* Presl).
neglectum Fisch., Mey. et Lallemand., übersehener, 4. f. Tiflis.
nidificum Griseb., nestähnlicher, ☉. f. Rumelien.
Oliverianum Sering. (= *libanoticum* Ehrbg. = *radiosum* Wahlbg.), Olivier's, ☉. f. Orient.
physanthum Hook., Arn., blasenblumiger, 4. k. Chili.
platycephalum Bisch., breitköpfiger, ☉. f. Nordamerika (Arkansasgebiet).
plumosum Dougl., federiger, 4. f. Nordamerika.
polyphyllum C. A. Mey., vielblättriger, 4. f. Caucasus.
reclinatum W. K. (= *Waldsteinianum* Sweet).
repens L., c) *maculatum* (= fol. atropurp.), b) *luxurians* Hort. Par.
rubens L., b) *flore albo*.
speciosum W. (= *Billardieri* Speg. = *comosum* LaBill. = *Gussoni* Tineo, = *plicatum* Presl, = *Amarenus speciosus* Presl).
spumosum L. (= *apulium* Hortul. = *folliculatum* Lam. = *Mistyllus spumosus* Presl).
suaveolens W. (= *formosum* Curt., non d'Urv.).
succinctum Visiani, dalmatischer, ☉. f. Dalmatien.
Tenoreanum Boiss. et Sprunn. (= *Bocconi* β *longiflorum* Bory et Chaub. = *tenuifolium* Tenore, = *stramineum* Gussone), Tenore's, ☉. f. Griechenland, Neapel, Sicilien.
trichocephalum MB. (= ? *armenium* W. var. = *canescens* Bot. mag.).
tumens Stev., MB. (= ? *alatum* Bivone, = *Galearia tumens* Presl), angeschwollener, 4. f. Iberien, Sicilien.
variegatum Nutt. (= *melananthum* Hook., Arn. = ? *microcephalum* β *glabrum* Hook.), bunter, ♂. f. Nordamer.
versicolor Steud., verschiedenfarbiger, 4. k. Chili.
Wormskioldii Lehm. (= *tridentatum* Hort. Berol. = *Lupinaster Wormskioldii* Presl).

Trifolium

Unbestimmtere: affine Presl, non Lej. ☉, albidum Retz, anomalum Schrk. (?repens L. var. DC.), decipiens Hornem. ☉., intertextum Wender., patulum Tausch, (medium L. var.?).

Trigonella L., Kuhhornklee.

azurea C. A. Mey. (= *Trifolium coerulescens* MB.), azürblauer, ☉. f. Caucasus.

calliceras Fisch. (= *oxyrhyncha* Fisch. = *Lotus medicaginoideus* Retz).

coerulea Sering. (= *Melilotus coerul.* Desr., Lam., p. 507).

β) connata C. A. Mey. (= *Melilotus connata* Bernh.).

γ) Besseriana Sering. (= *Melilotus procumbens* Bess.).

ensifera Trautv. (= *prostrata* Hort. Par.), schwert-hülsiger, ☉. f. ?

orthoceras Karel. et Kiril., geradhülsiger, ☉. f. Soongaria.

spicata Sibth. et Sm. (= *uncinata* Sering. = *Melilotus homosa* Lk. = *M. uncinata* Poir.), ährige, ☉. f.

Griechenland, Iberien.

tomentosa Thbg., filzige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

torta Sm. (= ? *crassifolia* Hornem. = *hamosa* Delil. = *incisa* Hornem.), gedrehte, ☉. f. Aegypten.

americana Nutt., v. *Hosackia Purshiana*, *indica* L.,

v. *Westonia humifusa*, *glomerata* Hort., v. *Medicago glomerata*, p. 503.

Hinsichtlich der übrigen vergl. *Medicago*, p. 392, II.

Trillium L., Dreiblatt.

erectum L. (= *foetidum* Salisb. = *atropurpureum* Hort. = *purpureum* Ell. = *rhomboideum* Mchx.), aufrechtes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

grandiflorum Salisb., Pursh, (= *erythrocarpum* Curt. = *rhomboideum* γ *grandiflorum* Mchx.).

pendulum W. (= *cernuum* Bigel., Bartr. = *erectum* β *album* Pursh, = *rhomboideum* β *album* Mchx.).

recurvatum Beck., zurückgekrümmtes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

stylosum Nutt. (= *Delostyles cernua* Rafin.), langgriffeliges, 4. Kn. f. b. k. Carolina, Virginien.

viride Beck, grünes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

Unbestimmtere: *roseum* Hort., *tinctorium* Rafin.

Trimeranthes dichotoma Cass., v. *Siegesbeckia flosculosa*, p. 755.

Trimorphaea Cass., *acris* Dumort. (= *vulgaris* Cass.), v. *Erigeron acre*.

Trinia Hoffm., Trinie.

hispidula Hoffm. (= *Hoffmanni* β MB. = *dioica* Urvill. = *dioica rossica* Fisch.), steifhaarige, ♂. 4. f. Rußland, Griechenland.

Hoffmanni MB. (= *glaberrima* var. Hoffm. = *Rumia leiogona* C. A. Mey.).

Kitaibelii MB. (= *glauca* Hoffm. = *Pimpinella dichotoma* Spgl. = *P. glauca* Hoffm. = *Seseli pumilum* L. spec.), Ungarn, Taurien, Südrußland, Volhynien.

β) *ramosissima* Fisch., Ledeb.

vulgaris DC. (= *elatior* Gaud. = *glaberrima* Hoffm. = *glauca* Dumort. = *Apium glaucum* et *pumilum* et *Tragoselinum* Crtz. = *Cicutaria dioica* Mch. = *Meum Dalechampii* Tenore, = *Pastinaca glauca* Scopl. etc.).

α) *Henningii* Hoffm. (= *Pimpinella dioica* Bess. = *P. glauca* L. spec. = *P. multicaulis* Poir.), β) Jac-

Trinia

quini DC. (= *Pimpinella dioica* L. mant. = *P. glauca* Spgl. = *Seseli glaucum* Lam. = *S. pumilum* Spgl.).

Triodia cuprea Jacq., v. *Uralespis cuprea*.

Triodica chinensis Lour., v. *Stillingia sebifera*, p. 789.

Trionum annuum Medic. (= *cordifolium* Mch. = *diffusum* Mch.), v. *Hibiscus Trionum cum var.*

Triopteris L., Dreiflügler.

ovata Cavan., eiförmiger, ♀. Sch. w. Domingo.

Triosteum L., angustifolium L. (= minus Mchx.), perfoliatum L. (= majus Mchx.).

Triphora pendula Nutt., v. *Pogonia pendula*, p. 639.

Triphyloides angustifolia Mch., *clypeata* Mch. etc., v. *Trifolium angustifolium*, *clypeatum* etc.

Triphysaria versicolor Fisch. et Mey., v. *Orthocarpus* (Sect. I.) *erianthus*, p. 461, II.

Tripinnaria P., Dreifieder, XIV. II., Bignoniaceae-Crescentieae.

africana Spgl. (= *Crescentia pinnata* Jacq. = *Tanaecium pinnatum* W.), afrikanische, ♀. Mozambique, Mascarenas.

Triplachne nitens N. E., v. *Agrostis nitens*, p. 25 et p. 26, II.

Tripladenia Cunninghamii G. Don, v. *Kreysigia multiflora*, p. 336, II.

Triplocentron apulum Cass., *melitense* Cass., *sulphureum* Webb, v. *Centaurea apula* etc., p. 176.

Tripolium N. E., angustum Lindl., vulgare N. E. etc., v. *Aster* Sect. XV. p. 100.

Tripterella alba Schult., *bicolor* Schult., *coerulea* Mühlbg., *dasyantha* Schult., v. *Burmannia alba*, *bicolor*, *biflora*, *dasyantha*, p. 140 et 83, II.

Tripteris Less., Dreiflügelchen.

arborescens Less. (= *Calendula arborescens* Jacq., p. 146, = *C. muricata* Thbg. = *C. rigida* Ait.).

pallescens DC. (= ? *Calendula oppositifolia* Ait.), bleiches, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

sinuata DC. (= *oppositifolia* E. Mey.), buchtiges, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Triptilion R. et P., cordifolium Lagasca, (= *maritimum* Poepp. = *Nassauvia cordifol.* Don), spinosum R. et P. (= *laciniatum* W. = *N. spinosa* Don).**Trisetum** P., Kunth, Alopecuros R. et S, alpestre P. B., flavescens P. B. (= *pratense* P.) etc., v. *Avena* Sect. IV. p. 107 et p. 55, II.

hispidum Trin., *phleoides* Trin., v. *Koeleria hispida* et *phleoides*, p. 439 et 336, II., *lobatum* Trin. (= *pensylvanicum* Trin.), v. *Reboulea gracilis*, p. 586, II., *macilentum* Trin., v. *Avelinia Michelii*, p. 55, II., *nudum* P., v. *Pentameris Thouarsii*, p. 884, *pungens* P. B. = ?

Tristania RBr., Tristanie.

macrophylla A. Cunn., großblättrige, ♀. t. k. Neuholl. *neriifolia* RBr. (= *salicifolia* Lk. = *Crowea neriifolia* Hort. angl. = *Melaleuca neriifolia* Sims, = *M. salicifolia* Andr.).

salicina A. Cunn., weidenähnliche, ♀. ♀. t. k. Neuholland. *suaveolens* Sm. (= *Melaleuca suaveolens* G.), gut riechende, ♀. f. k. Neuholland.

Tristania

- subverticillata Wendl., fastquirelförmige, f. t. k. Neuholl.
 umbrosa A. Cunn., schattenliebende, f. t. k. Neuholland.
albans (*albicans*) Cunningh. (= *arborescens* Hort. Kew.), v. *Syncarpia laurifolia*, p. 715, II., *corymbosa* Hort., v. *Jambosa australis*, p. 328, II., *arborescens* Hort. (= ? *excelsa* Hort. Berol.), *depressa* Lodd., *robusta* Hort., v. *Lophostemon arborescens*, depressum et robustum, p. 371, II.

Triteleja Dougl., Hook., Lindl., Narbenaffodile.

- bivalvis Lindl., zweiklappige, 4. Zw. k. t. Chili.
 Ob aurea Lindl., Montevideo, peduncularis Benth., Lindl. Californien, porrifolia Poepp. et Endl. Chili, kultivirt werden, ist mir unbekannt.

Triticum T., Weizen.

- I. Agropyrum G., P. B., R. et S., Quecke.
 acutum DC. (= *junceum* L. var. = *littoreum* Schum.).
 β) affine Dethard.
 cristatum Schreb. (= *Avena cristata* Hort. = *Bromus cristatus* L.).
 β) intermedium MB., ? δ) muricatum Fisch., Lk. dasyphyllum Schrenk, rauhblättrige, 4. f. Soongaria.
 glaucum Dsf. (= *intermedium* Host, = *rigidum* Schleichr., non Schrad.), β) puberulum.
 Gmelini Trin., Schrad., Gmelin's, 4. f. Sibirien.
 junceum L. (= *farctum* Vivian. = *nodosum* Stev. = *Bromus truncatus* Scopol. = *Festuca juncea* Mch.).
 littorale Host, Ufer-Q., 4. f. Oestreich. Litorale.
 β) muticum.
 orientale MB. (= *Secale orientale* L.).
 β) spicis minoribus Hort. Petropol.
 pectinatum MB. (= *A. pectiniforme* R. et S.).
 Richardsonii Schrad. (= *trachycaulon* Lk. = *Cryptopyrum Richardsonii* Hort. Prag.).
 rigidum Schrad. (= *elongatum* Host, = *giganteum* Retz, = *junceum* β *giganteum* Roth, = *pilosum* Seenus).
 strictum Dethard. (= *acutum* δ M. et K.).
 strigosum Speg., Kunth, (= *rupestre* Lk., Fisch. = *Brachypod. strigosum* Schult. = *Bromus strigosus* MB.), striegelige, 4. f. Taurien.
 violaceum Hornem., Fr., violette, 4. f. Grönland, Schweden.
 II. Spelta Weizen.
 bicorne Forsk. (= *Critiodium aegyptiacum* Trin.), zweihörniger, ☉. f. Aegypten.
 dicoccum Schrk., Schübl., var. *glabrum album aristatum*, *glabrum album* Lentagos Hort. Petropol. etc.
 β) tricoccum Schübl., var. *Bauhini*, *flavescens*, *glabrum*,
durum Dsf., β) *villosum* Host, var. *nigricans* et *nigrum*.
 polonicum L. (= *glaucum* Mch., non Dsf. = *laevissimum* Hall.).
 turgidum L. (= *Linnaeanum* Lagasca, = *polonicum* γ P. = *vulgare* γ *turgidum* Speg.), Varietäten: *glabrum albidum* de Taganrog Hort. Petropol., *ramosum* Hort. Petropol., *astracanicum* Hort. Petropol., *chinense* Hort. Petropol., *velutinum rufescens* Hort. Petropol. (Blé de St. Helene), *grossum* (Blé gros Turquet Hort. et Oecon.) etc.
 venulosum Sering. (= *monococcum* L. var. Trin.).

Triticum

villosum P. B., non Host, (= *caudatum* P. = *Agropyrum caudatum* P. B. = *A. villosum* Lk. = *Hordeum ciliatum* Lam. = *Secale villosum* L.).

vulgare Vill. (= *sativum* Lam. = *cereale* Schrk.), var. β) *hybernum* L. (= *compactum* Host, = *erinaecum* Hort.).

Unbestimmtere: *benghalense* Host, *cinereum* Hort. Gorenk., *compressum* Hort. Madrit., *flabellatum* Tausch, (= *ciliatum* Hort., non DC.), *ichyostachyum* Seidl, \odot ., *molle* Fisch. Hort. Gorenk, \odot ., *poliens* Tausch, (= *ciliatum* Hort.), *simplex* Hort. Vindob.

Tritomanthe Lk. (= *Tritoma* Ker), *Burchellii* Herb. etc., v. *Kniphofia Burchellii* etc., p. 335—336, II.

Tritonia crispa Ker, *crocata* Ker etc., v. *Montbretia crispa*, *crocata* etc., p. 417, II.

Triumfetta Plum., *Triumfetta*.

Lappula L. (= *Plumierii* G. = *Bartramia Lapp.* Lam.). *nepaulensis* G. Don, (= *annua* D. Don, non L.), *nepalsche*, \odot . w. m. f. Nepal.

oblongata Lk. (= *glandulosa* Heyne, = ? *trichoclada* DC. var. Szgl.), *längliche*, \odot . w. m. f. Nepal.

petiolaris Lindl. (= *rhomboidea* Lindl., non Jacq.), *gestielte*, § . w. Peru.

rhomboidea Jacq. (= *rhombaeifolia* Sw.).

trichoclada DC. (= *triclada* Lk.).

Trixago Lk., Stev., Glitscher.

I. *Eufragia* Griseb.

latifolia Rchb. (Griseb.), (= *Bartsia latifolia* Sibth., Sm. = *B. purpurea* Duby, = *Euphrasia latifolia* L. = *T. purpurea* Stev.).

viscosa Rchb. (Griseb.), (= *Bartsia viscosa* L. = *Lasiopera viscosa* Lk., Hffg. = *Rhinanthus viscosus* Lam.).

II. *Eutrixago*.

apula Stev. (= *rhinanthina* Griseb. = *Alectorolophus Trixago* MB. = *Bartsia Trixago* L. = *Bellardia Trixago* All. = *Lasiopera rhinanthina* Lk. et Hffg. = *Rhinanthus maximus* W., non Lam. = *R. Trixago* L. — *Bartsia maxima* P. = *B. rhinanthoides* Hochst. = *B. bicolor* DC. = *B. capensis* Szgl. = *B. versicolor* P. = *Rhinanthus capensis* L. = *R. versicolor* W.). Auch auf den canar. Inseln, in Abyssinien, Südafrika, Südbrasilien u. Westasien heimisch.

scordifolia Rchb., v. *Odontites Holliana*, p. 443, II.

T. arvensis Mch. (= *scordifolia* Mch.), v. *Stachys arv.*

Trixis RBr., *Trixis*.

corymbosa Don, (= *Perdicionium corymbosum* Moc., Sess.), *doldentraubige*, § . t. k. Mexico.

divaricata Szgl. (= *auriculata* Hook. = *salicifolia* Don, = *Cacalia flexuosa* W. = *Castra regia* Arrabid.), *ausgespreizte*, § . w. Brasilien, Quito.

Ehrenbergii Kunze, *Ehrenberg's*, § . t. k. Mexico.

frutescens RBr. (= *Inula Trixis* L. = *Perdicionium radiale* L. = *Prenanthes fruticosa* W. hrb. = *Tenorea Berterii* Colla, = *T. calyculata* Bert.), *strauchige*, § . w. Südamerika.

Lessingii DC. (= *brasiliensis* Less., non DC. = *Perdicionium brasiliense* Quorund.), *Lessing's*, 4. w. Brasilien.

senecioides Hook., v. *Leuchaeria senecioides*, p. 355 II.

Trochera Rich., *calycina* P. B., v. *Ehrharta calycina*.

- Trochetia** DC., Trochetie, XVI. v., Büttneriaceae.
grandiflora Lindl., großblumige, ♂. w. Mauritius.
Trochocarpa disticha Speg., *thymifolia* Speg., v. Decaspora *disticha* et *thymifolia*, p. 193, II.
Trochoseris Poepp. et Endl., *aurantiaca* Poepp. et Endl., *pterocarpa* Poepp. et Endl., v. *Macrorhynchium aurantiacum* et *pterocarpum*, p. 487.
- Trollius** L., Trollblume.
acaulis Lindl., stengellose, 4. k. Cashmire, Nepal.
altaicus C. A. Mey. (= *caucasicus* Ledeb.), altaische, 4. f. Altaisches Sibirien.
americanus Mühlbg. (= *laxus* Salisb. = *pentapetalus* Banks herb. = *Gaissenia verna* Rafin.).
dahuricus Turcz., dahurische, 4. f. Dahurien.
europaeus L. (= *connivens* Mch. = *globosus* Lam. = *montanus* Salisb.), δ) *medius* Wender., ε) *napellifolius* Roep. (= *aconitifolius* Hort.).
patulus Salisb. (= *caucasicus* Stev. = *Helleborus ranunculinus* Sm., MB.).
pumilus D. Don, niedrige, 4. k. f. b. Nepal.
soncheticus C. Koch, sonchetische, 4. f. Asiatisches Rußland (*Sonchetia*).
 Gartenvarietäten (oder Hybriden): *atrebatensis* v. Houtte, *aureus* Tausch, (= *caucasicus* Hort.), *bicolor* Hffg., *emarginatus* G. Don, *grandiflorus* Tausch, (= *caucasicus* Hort.), *hybridus* Hort.
lilacinus Bunge, v. *Hegemone lilacina*, p. 287, II.
- Tropaeolum** L., Capuzinerkresse.
aduncum Sm. (= *peregrinum* Jacq., non L. = *chilense* et *canariense* Hort.).
azureum Miers, azurblaue, 4. Sch. Kn. t. Chili.
bicolor R. et P., zweifarbige, ⊙. Sch. f. Peru.
brachyceras Hook. (= ? *minimum* Miers, = *Chymocarpus br.* *, p. 195), kurzspornige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
 b) *grandiflorum* Rein., Walp., c) *sulphureum* Walp. *crenatiflorum* Hook., kerbblumige, 4. Sch. Kn. t. Peru.
elegans G. Don, zierliche, 4. Sch. Kn. t. Chili.
Haynianum Bernh., Hayne's, ⊙. Sch. f. Peru.
Jarattii Paxt., Youell, (= *tricolorum grandiflorum* Hort.), Jaratti's, 4. Sch. Kn. t. Chili (St. Jago).
leptophyllum G. Don, schlankblättrige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
Lobbianum Hook., Lobb's, 4. ♂. Sch. Kn. t. Columbia.
majus L., β) *hybridum* L. (= *quinquelobum* Berg.).
minus L., var. *trimaculatum* Hort.
Moritzianum Lk., Kl., Otto, Moritz's, ⊙. ♂. Sch. m. f. t. Caracas.
 Hybriden: *Moritziano-majus* Hort. Berol., *grandiflorum* Hort.
orthoceras Gardn., geradspornige (hornige), 4. Sch. w. Brasilien.
pinnatum Ait., gefiederte, ⊙. m. f. Peru.
polyphyllum Cavan. (= ? *prostratum* Miers), vielblättrige, 4. Sch. t. Chili (Bolivia).
 β) *myriophyllum* Poepp.
speciosum Endl., prächtige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
tenellum G. Don, zarte, 4. Sch. t. Chili.
tricolorum Lindl., Sweet, (= ? *coccineum* Miers, = ? *subincrassatum* Steud.), dreifarbige, 4. Sch. Kn. t. Chili.
 Var. oder Hybrid. mit *T. brachyceras*: *grandiflorum* Hort., *splendens* Hort., *tricolori-brachyceras* Walp.

Tropaeolum

tuberosum R. et P., knollige, 4. Sch. Kn. t. k. Peru.
 violaefforum Dietr. (= *azureum* var. ? *obscurum* v. Houtte),
 veilchenbluinige, 4. Sch. Kn. t. Chili.

pentaphyllum Lam., v. *Chymocarpus pentaph.*, p. 195.

Trophianthus Scheidw., Gürtelorchidee, XX. 1., Orchideae.

zonatus Scheidw., gesäumte, 4. w. Brasilien.

Trophis L., *aspera* Retz, (= *cochinchinensis* Poir. = *Streblus asper* Lour.).**Troximon** G., Bocksalat.

aurantiacum Hook., orangefarbiger, 4. f. Nordamerika.

Trymalium Fenzl, *Trymalium*, V. 1., Rhamneae.

Billardieri Fenzl, (= *spathulatum* Sweet, = *Ceanothus spathulata* LaBill. = *Pomaderris spath.* Brongn., p. 647).

globulosum Fenzl, (= *Ceanothus globulosa* LaBill. = *Pomaderris globulosa* Brongn., G. Don, p. 647).

ledifolium Fenzl, porstblätteriges, 5. t. k. Neuholland.

odoratissimum Fenzl, (= *elegans* Hort. = ? *fragrans* Hort. Kew.).

Wendlandianum G. Don, v. *Pomaderris Wendlandiana*, p. 647 et p. 553, II.

Trymenium Lindl. v. *Odontoglossum* Sect. II. p. 444, II.

Tryphane Fenzl, *caespitosa* Rehb., *Gerardi* Rehb., *verna* Rehb., *recurva* Rehb. etc., v. *Alsine caespitosa*, *recurva*, *verna* etc., p. 38—39.

Tsiana speciosa Gmel., v. *Costus speciosus*.

Tsutsusi Kämpf., G. Don, v. *Rhododendron* Sect. V. p. 686 et p. 591, II.

Tuberaria annua Spach, *perennis* Spach, v. *Helianthemum guttatum* et *Tuberaria*.

Tulbaghia L., Tulbaghie.

alliacea L. (= *capensis* L. = *inodora* G.).

cernua Lallem., übergebogene, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hffn.

Ludwigiana Harv., Hook., Ludwig's, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Heisteri Fabric., v. *Agapanthus umbellatus*, p. 22.

Tulipa Gesn., T., Tulpe.

apula Gussone, apulische, 4. Zw. f. Apulien.

Celsiana Redouté, (= *australis* Lk. = *Breyntiana* Curt., non L. = *sylvestris* β MB. = *trastagana* Brot.).

β) *pumila* Tausch.

Clusiana Vent. (= *Cypriana* Hort. = *praecox* Cav., non Tenore, = *hispanica* W. hrb. = *rubro-alba* Brot.).

gallica Delaun., Loisel., französische, 4. Zw. f. Südfrankr.

Gesneriana L. (= *hortensis* Mch.). Var.: *foliosa*, *polyantha*, *monstrosa* (= *laciniata* = *Dracontia* Redout.),

luteo-rubra, *campopetala* Delaun. — *Aglajana*, *albida*

(= *Gloria alborum*), *Alexandri* (= *Violet Alexander*),

alexandrina, *angusta* (= *Grand Monarque*), *Buonaparteana*,

Burnardiana (= *Burnards agitator*), *Cannigiana*,

Charlotteana, *coccinea*, *Collingwoodii*, *Creveae*,

Daphneana (= *Rose Daphne*), *Daweyana*, *Duckettiana*,

Fredericiana, *fulgens* (= *Rose brillante*), *fulminea*,

Georgii, *Hilliana*, *Hollandiana*, *Jenkinsonii*, *imperialis*,

iridiflora, *Juno*, *Lampsoniana*, *laucastriensis*, *Leopoldi*,

Ludoviana (= *Louis XVI.*), *Maria*, *Majesta*, *marginata*,

(= *Daveys Trafalgar*), *Migueli*, *Penelopea*, *platyantha*,

Platonis, *Polyphemi*, *principessae*, *puella* (= *puçelle*

d'Orléans), *purpureo-rosea*, *regia*, *retusa*, *sanguifera*,

semploniensis, *Strongia*, *Titiana*, *versicolor*, *Victoriana*,

virginica, *Winefrediana* etc. etc.

Tulipa

- maculata Roth, (= ? *Breyntiana* Tratt., Hort. = ? *hispanica* W. = *sylvestris* L. var. ? Schrad.), gefleckte, 4. Zw. f. Spanien.
- maleolens Reboul, var. floribus rubro-purpureis, stramineis, cupreis et pallide glaucis intermixtis Sweet.
- media Ag. (= *acuminata* Hort.).
- Oculus Solis St. Amans, (= *acutiflora* Poir. = *agenensis* DC.), β) praecox Strangways.
- praecox Tenore, (= *Oculus solis* Bot. reg.), α) Tenorii Reboul, β) Raddii Reboul, γ) Foxiana Reboul, δ) persica Lindl.
- serotina Reboul, spätblühende, 4. Zw. f. Toscana.
- Sibthorpiana Sm., Sibthorp's, 4. Zw. f. Griechenland.
- strangulata Reboul, (= *scabriscapa* Strangways), α) princeps Reb., β) Bonarotiana Reboul, (= *vario-picta* Reboul), γ) neglecta Reboul.
- suaveolens Roth, β) pubescens W.
- tricolor Ledeb., Fisch. (= *biflora* Hort. = *patens* Ag. = *sylvestris* Laxm., non L.).
- turcica Roth, (= *acuminata* Vahl, = *cornuta* Redouté, = *pumila* Mch. = *stenopetala* Delaun. et Hort. = *sylvestris* β W.).
- altaica* Auct., non Pall., *biflora* Pall., L. fil., *heteropetala* Ledeb., v. *Orithya nutans et uniflora*, *biflora*, *oxypetala*, p. 457, II.
- Tullia pycnanthemoides* Leavenworth, v. *Pycnanthemum Tullia*, p. 575, II.
- Tunica** Scopol. (pro parte), Fisch. et Mey., Steinnelke. *brachypetala* Jaub. et Spach, kurzchronige, ♂. k. Cappadocien, Südl. Persien.
- prolifera* Scop. (= *Dianthus prolifer* L. = *Kohlruschia prolif.* Kunth), β) *diminuta* (L.).
- Saxifraga* Scop., K. (= *Dianthus Saxifraga* L. = *Gypsophila Saxifraga* L. = *G. scabra* Schult. = *G. rigida* Rchb. = *Imperata filiformis* Mch.).
- stricta* Fisch. et Mey. (= *Dianthus recticaulis* Ledeb. = *Gypsophila stricta* Bunge).
- velutina* Fisch. et Mey. (= *Dianthus velutinus* Guss.), sammthaarige, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.
- Tupa** G. Don, Sweet, *acuminata* DC. fil. etc., v. *Lobelia* Sect. XII. p. 473 et p. 368, II.
- Tupistra** Ker, *Tupistra*, Smilacaceae-Aspidistreae.
- aurantiaca* Wall., orangefarbige, 4. w. Ostindien.
- Turbith** Tausch, *Turbithdolde*, V. II., Umbelliferae.
- Matthioli Tausch, (= *Athamantha Matthioli* Wulf. = *A. Turbith* Brotero, = *Libanthis filifolia* Röhl. = *L. rupestris* Scopol. = *Seseli Turbith* L.), Matthioli's, 4. f. b. Krain, Friaul.
- Turczaninowia** DC. (N. v. Turczaninow, kaiserlich russ. Botaniker u. Reisender).
- fastigiata* DC. (= *Aster fastigiatus* Fisch., non Ledeb.), v. *Aster* Sect. XVI. p. 100.
- Turgosea* Haw. (= *Turgosia* Loud.), v. *Pyrgosea*, p. 577, II.
- Turnera** Plum., *Turnera*.
- cuneiformis* Juss. (= *obtusifolia* Sm.), β) *odorata* Vahl, non Rich.
- rosea* St. Hil., rosafarbige, ♂. w. Brasilien.
- trioniflora* Sims, eibischblumige, 4. ♂. w. Südamerika.

Turnera

ulmifolia L., ulmenblättrige, 4. 5. w. Südamerika.

β) *angustifolia* Curt.

cistoides Hort., non L., *rugosa* W. (= *villosa* Rausch.), v. Piriqueta *cistoides* et *villosa*, p. 532.

Turpinia Vent. (P. J. F. Turpin, Botaniker u. berühmter Pflanzenmaler in Paris, † 1840), V. III., Sapindaceae-Staphyleaceae.

paniculata Vent. (= *Dalrymplea domingensis* Speg.), rispige, 5. w. Domingo, Mexico.

pomifera DC. (= *Dalrymplea pomifera* Roxb.), äpfeltragende, 5. w. Ostindien.

occidentalis Sweet, v. *Staphylea occidentalis*, p. 700.

Turpinia P., *montevidensis* Speg., *punctata* P., v. *Poiretia psoraleoides* etc., p. 545, II.

Turpinia aromatica Rafin., *suaveolens* Rafin., v. *Rhus aromaticum* et *suaveol.*, p. 686—687 et 592—593, II.

Turraea L., Turraea.

lobata Lindl., gelappte, 5. w. Sierra Leone.

quercifolia G. Don, eichenblättrige, 5. w. Sierra Leone.

pinnata Wall., v. *Munronia Wallichii* Nachlese.

Turrita major Wallr., v. *Arabis Turrita*, p. 71.

Turritis Dill., Thurmkrut.

Grahamii Lehm. (= *patula* Grah., nec Ehrh. = ? *Arabis declinata* Schrad. = *A. Hollboelliana* Hort. Hafn.).

retrofracta Hook. (= *Arabis retrofracta* Grah.), zurückgeknicktes, ☉. f. Nordamerika.

arvensis RBr., v. *Moricandia arvensis*, p. 531.

Hinsichtlich der übrigen s. *Arabis*.

Tussacia Rehb., non W., nec Rafin. (F. R. de Tussac, franz. Botan. u. Reisender), XIV. II., Gesneriaceae.

sanguinea * (= *Alloplectus sanguineus* Mart. = *Besleria sanguinea* P. = *Thalbergaria sanguinea* Tuss., Juss. =

Vireya sanguinolenta Rafin.), blutfarbige, 5. w. Südam.

Tussaca secunda Rafin., v. *Goodyera repens*.

Tussilago T., Farfara L. (= *vulgaris* Lam.).

alpina L. etc., v. *Homogyne alpina* etc., p. 304, II.,

albicans Sw., *nutans* L. (= *lyrata* P.), *pumila* Sw.

(= *sinuata* P.), v. *Leria albicans*, *nutans*, *pumila*,

p. 457, *japonica* L. (= *Sieboldii* Hort.), v. *Ligularia*

Kämpferi, p. 357, II., *Anandria* L. (= *Gmelini*

Turcz. = *lyrata* W., non P.), v. *Anandria Belli-*

diastrum, p. 52, *lobata* Hort. s. *Nardosmia palmata*,

p. 609, sowie hinsichtlich der übrigen *Petasites* u.

Sect. II., *Nardosmia* p. 609 et p. 502, II.

Tweedia Hook. et Arn., *coerulea* Don, Sweet, (=

versicolor Hook.), *floribunda* Hort. (= *rosea*, *pubes-*

cens Hort.), v. *Oxypetalum coeruleum* et *solanoides*,

p. 467, II. et Nachlese.

Tylanthus Reisseck., *acerosus* Endl., *ericoides* Endl., v. *Phylla* Sect. V. p. 518, II.

Tylomium Presl, *assurgens* Sweet, *robustum* Presl,

v. *Lobelia* (Sect. XII. *Tupa*) *assurgens* etc., p. 473.

Tylophora RBr., Schwielenträger.

asthmatica Wight et Arn. (= *Asclepias asthmatica* Roxb., p. 87, = *A. vomitoria* Koen. = *Cynanchum vomitor.*

Lam. = *C. Ipecacuana* W. = *G. indicum* Burm. =

C. viridiflorum Sims), brustheilende, 5. Sch. w. Ost-

indien, Molucken, Madagascar.

a) *pubescens* Decaisn., β) *glabra* Decaisn.

Tylophora

barbata RBr. (= *Hoya barbata* Sogl.).

exilis Colebr. (= *Gymnema pubigerum* Hort. b. Calc. = *Pergularia exilis* Sogl.).

laevigata Decaisn. (= *Cynanchum capense* Sbr. = *C. indicum* Lam. = *C. laevigatum* Vahl, = *C. mauritianum* Hort. Maurit. = *Periploca mauritiana* Poir.), glattester, ♀. Sch. w. Mauritius.

laevis Decaisn. (= *Cynanchum parviflorum* Hort.), glatter, ♀. Sch. w. Vaterland unbekannt.

lutescens Decaisn. (= *flavescens* Hort. = *Echites purpurea* Hort.), gelbliche, ♀. Sch. w. ?

Nicht hinlänglich bekannt: grandiflora RBr. (= *Hoya grandiflora* Sogl.).

Typha T., Rohrkolbe.

daenatica Ehrh., Sweet, aegyptische, 4. Wa. f. Aegypten.

latifolia L. (= *major* Curt.), minima Funk., Hoppe, (= *elliptica* Gmel.), β) nana Lallemand., minor Sm. (= *intermedia* Schlecht. = *media* DC.).

Typhonium Schott, Endl., Kolbenarum, XXI. ix., Aroideae.

cuspidatum Decaisne, (= *Arum cuspidatum* Blume, = *A. divaricatum* Auct.), feinspitziger, 4. Kn. w. Ostindien.

divaricatum Decaisne, Bl. (= *Arum divaricatum* L., p. 85, = *A. diversifolium* Blume, = *A. orixense* RBr.). Tropisches Asien, Neuholland, Japan.

flagelliforme Blume, (= *Arum flagellif.* Lodd., p. 85).

minutum Schott, (= *Arum minutum* W., p. 85, = *A. mucronatum* Sogl.).

trilobatum Schott, (= *Arum trilobatum* L., p. 86, = *A. orixense* Roxb.).

Tytonia natans G. Don, v. *Hydrocera triflora*, p. 308, II.

Ucriana W., *racemosa* Schum., v. *Oxyanthus hirsutus*, p. 466.

Ulex L., Hecksame (Stechginster).

australis Clemente, B. Webb, (= *provincialis* Loisel. = *Stauracanthus aphyllus* W. Enum.), südlicher, ♀. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.

baeticus Boiss., spanischer, ♀. f. b. k. Spanien.

Boivini B. Webb, (= *genistoides* Salzm., non Brot.), Boivin's, ♀. f. b. k. Spanien, Nordafrika.

europaeus L. (= *compositus* Mch. = *grandiflorus* Pourr. = *vernalis* Thore).

genistoides Brotero, (= *mitis* Hort. = *Stauracanthus aphyllus* Lk., p. 786), blattloser, ♀. k. f. b. Portugal.

hibernicus G. Don, (= *strictus* Mackay).

nanus Sm. (= *autumnalis* Thore, = *minor* Roth, = *parviflorus* Pourr.).

Ulloa parasitica P. (= *aurantiaca* Hort.), v. *Juanulloa parasitica*, p. 330, II.

Ulmaria palustris Mch., v. *Spiraea Ulmaria*, p. 779.

Ulmus T., Ulme, Ruster, (Rusten).

campestris L. Var.: *asplenifolia* Hort., *tiliaefolia* Host, *viminalis* Hort., *virens* Hort.

β) *minor* Mill. (= *angustifolia* Wrede).

carpinifolia Gled. (= *campestris* L. var. Auct. = *nana* Borkh. = *nitens* Mch.).

corylacea Dumort., haselaufsähnliche, ♀. f. Belgien.

Ulmus

fulva Mchx. (= *americana* γ *pendula* Ait. = *pendula* W. Enum. = *rubra* Mchx fil.).

glabra Mill. (= *montana* Host, = ?*nuda* Ehrh.).

Var.: *Hostii* Hort. Vindob.

major Sm. (= ?*excelsa* Borkh. = *hollandica* Mill. = *suberosa* L. var. Sogl.).

a) *anglica* Engl. Bot., b) *pendula* Hort.

montana Bauh., Sm. (= *corylifolia* Host, = *excelsa* Borkh.). Var.: *cinerea* Hort., *cucullata* Hort., *Hayneana* Hort. Vindob., *longifolia* Hort., *rotundifolia* Hort., *tortuosa* Host.

scabra Mill. (= *effusa* Borkh., non W. = *hollandica* Pall. = *latifolia* Mch. = *suberosa latifolia* Dum.Cours.), scharfe, ♀. f. Europa.

sparsa Dumort., zerstreutsehende, ♀. f. Belgien.

suberosa Ehrh. (= *campestris* L. var. Auct. = *sativa* DuRoi, = *tetrandra* Schkuhr.), var. *fungosa* Hort.

viscosa Dsf. (= ?*glutinosa* W.), schmierige, ♀. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *betuloides* Hort., *ontariensis* Hort., *striata* Bosc, Dsf. Nordam., *toментosa* Dsf.

Ultricia pyramidalis Jacq., v. *Horminum caulescens*.

Umbilicus DC., Nabelkraut.

erectus DC. (= *luteus* B. Webb et Berthel. = *Cotyledon lut.* Huds. = *C. tuberosa* H. Par.).

hispidus DC. (= *Cotyledon hispid.* Lam. = *C. Mucizonia* Ortega, = *C. viscosa* Vahl), steifhaariges, ☉. f. Spanien, canarische Inseln, Barbarei.

horizontalis DC. (= *Cotyledon horiz.* Guss., Tenore), horizontaler, 4. f. b. k. Sicilien, Neapel.

Lievenii G. Don, (= *Cotyledon Liev.* Ledeb., C. A. Mey.).

mexicanus Schltdl., mexicanisches, 4. t. k. Mexico.

pendulinus DC. (= *Cotyledon rupestris* Salisb. = *C. umbilicata* Lam. = *C. Umbilicus a* L.).

β) *C. peltata* (Wendl.).

sedoides DC. (= *Cotyledon sediformis* Lapeyr.), mauerpfefferähnliches, ☉. 4. f. b. Pyrenäen.

strictus Schltdl. (= *mexicanus* Hort. Petropol., non Schltdl.), steifes, 4. t. k. Mexico.

thyrsiflorus DC. (= *Oreostachys thyrsiflora* Fisch.), straußblumiges, ☉. f. Sibirien.

Umsema (= *Unisema* Rafin.), *mucronata* Desv., *obtusifolia* Desv., v. *Pontederia angustifol. et cordata*.

Unedo edulis Hffg., v. *Arbutus Unedo*.

Uniola L., Spitzgras.

latifolia Mchx. (= *paniculata* Hort., non L.).

stricta Torrey, (= ?*Ceratochloa uniolooides* Dsf.), steifes, 4. f. Nordamerika.

lappacea Trin., v. *Centotheca lappacea*, p. 179,

pungens P. B., v. *Sporobolus pungens*, p. 780.

Unona L., Unona.

discolor Vahl, (= *biglandulosa* Blume, = *chinensis* DC. = *U. Lessertiuna* Dun. = *moniliformis* Roxb. =

Desmos chinensis Lour. = *Uvaria monilifera* G. = *U. uncata* Vahl), verschiedenfarbige, ♀. t. w. China, Java, Ostindien.

odorata Dun. (= *virgata* Blume, = *Uvaria od.* Lam.).

longifolia Don, = *Guatteria longifolia* Wall., W. A., scheint nicht kultivirt zu werden.

- Uralespis** Kunth, (= *Uralespis* Nutt.), Schuppengras, III. 11., Gramineae.
cuprea Kunth, (= *Eragrostis tricuspis* Trin. = *Festuca quadridens* Poir. = *Poa quinquefida* Pursh, = *P. seslerioides* Mchx. = *Tricuspis caroliniana* P. B. = *T. noveborucensis* P. B. = *Tridens quinquefida* Schult. = *Triodia cuprea* Jacq. fil.); kupferfarbiges, 4. f. Nordamerika.
- Urananthus** Griseb., Benth., Schweifblümchen, V. 11., Contortae-Gentianeae.
pallidus Liebm., bleiches, 4. k. t. Mexico.
chironioides Benth., *glaucifolius* Benth., *Russelianus* Benth., v. *Eustoma chironioides* etc., p. 239, II.
Urania Schreb., *madagascariensis* Rausch. (= *speciosa* W. = *Ravenulia* Rich.), v. *Ravenalia madagascariensis*, p. 586, II.
- Uraria** Desv., Urarie.
cercifolia Desv. (= *Hedysarum cercifolium* Steud.), judasbaumblättrige, 5. w. Ostindien.
hamosa Wall. (= *desmodioides* Grab. = *Hedysarum hamosum* Roxb.), hackenförmige, 5. w. Ostindien.
lagopodioides DC. (= *retusa* Wall. = *Doodia lagopodioides* Wall.).
Lagopus DC. (= *arborea* G. Don, = *Desmodium arboreum* Sweet, = *Hedysarum arboreum* Hamilt.).
Uraspermum Nutt., *hirsutum* Bigel. etc., v. *Osmorhiza brevistylis* etc., p. 463, II.
Urceolaria exotica Gmel., v. *Schradera capitata*, p. 463, II.
- Urceolina** Rchb. (= *Urceolaria* Herb.), pendula Herb. (= *fulva* Herb. = *Collania urceolata* R. et S. = *Crinum urceolatum* R. et P.).
- Urena** L., Urena.
sinuata L. (= *aculeata* Mill.), α) ? *morifolia* DC. (= *muricata* DC. = *Lappago* Sm.), β) *heterophylla* Sm.
- Urginea** Steinh., N. E., Endl., *Urginea*, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
anthericoides Kunth, (= *Ornithogalum anther.* Lk. = *Scilla anther.* Poir.), zaunlilienähnliche, 4. Zw. k. Numidien.
fugax Steinh. (= *Anthericum fugax* Moris, = *A. sardoum* Mill.), flüchtige, 4. Zw. f. Sardinien.
indica Kunth, (= *Scilla indica* Roxb., p. 732).
undulata Steinh., Kunth, (= *Scilla undulata* Dsf.), wellenförmige, 4. Zw. f. Sardinien, Corsica, Nordafrika.
exuviata Steinh., *filifolia* Steinh., *fragrans* Steinh., v. *Ornithogalum exuviatum* etc., p. 457—459, II.,
japonica Hort. Par., v. *Barnardia japonica*, p. 60, II., *Scilla* Steinh., v. *Squilla maritima*, p. 696.
- Uropetalum** Ker, *longiflorum* Lindl., *serotinum* Ker, β) *fulvum* Sweet, (= *Hyacinthus fulvus* Cavan.), *viride* Ker, (= *Dipcadi filamentosum* Medic. = *D. viride* Mch. = *Lachenal. viridis* W. = *Zuccagnia viridis* Thbg.), p. 831.
- Ursinia** G., Ursinie.
speciosa DC., prächtige, ©. m. f. Cap d. g. Hoffn.
- Urtica** T., Nessel.
balearica L. (= *cordifolia* Mch. = *pilulifera* L. var. Spgl.).
caravellana Schrk. (= ? *corylifolia* Juss. = *latifolia* Rich.).
cubensis Kl., cubaische, ©. ? 4. w. Cuba.

Urtica

gracilis Ait. (= *chamaedryoides* Hort. Berol., non Pursh,
= ? *leptostachys* P. = ? *procera* Mühlbg. = *Drogoe-*
tia ovata Gaudich.).

grandidentata Moris, grofszähnlige, 4. f. ? Sardinien.

Ildefonsiana Steud. (= *scabrella* Hornem., Schrk. =
Ildefonsia Mart.), Ildefonsia-N., 5. w. Brasilien.

Linkiana * (= *ferocissima* Sweet, = *horrida* Lk. En.,
non H. B. K.).

mexicana Hort. Berol., mexicanische, 6. f. Mexico.

oblongata K., längliche, 6. f. Untersteyermark.

reticulata Sw. (= *multiflora* Poir.).

sylvatica Blume, Wald-N., 5. 5. w. Java.

tenacissima Roxb., zäheste, 4. w. Sumatra.

Unbestimmtere: *biloba* Hort., *rubricaulis* Hornem.

microphylla Sw., *serpyllacea* H. B. K., v. *Pilea*
muscosa et serpyllifolia, p. 524, II.

Utricularia L., Wasserschlauch.

Bremii Heer, Brem's, 4. Wa. f. Europa.

intermedia Hayne, (= *media* Schum. = *vulgaris minor*
L., Ehrh.).

pulchella C. B. Lehm., schöner, 4. Wa. f. Mitteldeutschl.

Uvaria L., Zapfenbeere.

Gärtneri DC. fil. (= *trifoliata* G.).

lutea Roxb. (= *coriacea* Vahl, = *montana* Don, =
Guatteria acutiflora Wall.).

velutina DC. (= *villosa* Roxb. = *Guatteria vel.* DC. fil.).

ventricosa Roxb., bauchige, 5. w. Ostindien.

japonica L., v. *Kadsura japonica*, p. 332, II.

Uvularia calcarata Wall. etc., v. *Disporum calcaratum*
etc., p. 269 et 208, II., *distorta* Hort. (= *amplexi-*
fol. L., v. *Streptopus amplexifol.*, *lanuginosa* P., v.
Prosartes lanuginosa, p. 561, II., *rosea* P., v. *Strepto-*
pus Sect. II. *Hexorima*, p. 709, II.

Vaccaria Dodon., Medic., *pyramidata* Medic., G., M. et
S. (= *parviflora* Mch. = *vulgaris* Host, = *sessili-*
flora Sweet, = *Saponaria Vaccaria* L. = *L. rubra*
Lam. = *S. segetalis* Neck. = *S. amplissima* Mill. =
S. pentagona Hort.).**Vaccinium** L., Heidelbeere.

album L. (= *stamineum* Andr. = ? *Vitis idaea alba*
Mch. = *Xylosteum ciliatum* β Pursh), weisse, 5. f.
Nordamerika.

crassifolium Andr. (= *carnosum* P. = *Andromeda luri-*
difolia Ker).

dumosum Andr. (= *frondosum* Mchx. = *hirtellum* Ait.).
 β) *Watsoni* Sweet, (= *humile* Wats.).

floridanum Nutt. (= *Picrococcus floridanus* Nutt.), flori-
danische, 5. f. Florida.

fuscatum Ait. (= *corymbosum* Hook., non L. = *formosum*
Andr. = *marianum* Wats. = *virgatum* Wats., non Ait.).

minutiflorum Wats. (= *multiflorum* DC.).

prunifolium Lodd., pflaumenblättrige, 5. f. Nordamer.

salicifolium Steud. (= *salicinum* Lodd., non Chamiss.),
weidenblättrige, 5. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *gilvum* Meerb., *lucidum* Hort. angl., ni-
grum Dsf., *rugosum* Hort. angl., *salvifolium* Hort. angl.,
sibiricum Hort., *tomentosum* Hort. angl.

- Vachelia** Wight et Arn., Vachelie, XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimosaceae.
Farnesiana W. et Arn. (= *Acacia Farnesiana* W., p. 2, = *A. indica* Desv. = *Farnesia odora* Gasparini, = *Mimosa Farnesiana* L. = *M. indica* Poir. = *M. scorpioides* Forsk.), Farnesische, h. w. Ost- u. Westindien.
- Vahlia** Thbg. (Vahl, Prof. d. Botanik zu Kopenhagen, † 1804), V. I. Rubiaceae.
Oldenlandiae DC. (= *oldenlandioides* Roxb. = *Cyrilla indica* Koen. = *C. oldenlandioides* Koen. = *Heuchera dichotoma* Murr. = *Oldenlandia biflora* Roth, = *O. dichotoma* Speg. = *O. pentandra* Retz, non DC. = *Russelia oldenlandioides* Roxb.), Oldenland's, o. w. Ostindien.
- Vahlodea** Fr. (Dr. Vahl zu Kopenhagen, Sohn d. verstorbenen Prof. Vahl), III. II., Gramineae.
atropurpurea Fr. (= *Aira atropurpurea* Wahlbg. = *A. alpina* Vahl, = *Avena atropurpurea* Lk., p. 107), dunkelrothe, 4. f. Lappland, Norwegen.
- Vaillantia** T., filiformis Ait. (= *Galium filiforme* R. et S.), muralis L. (= *quadriflora* Mch.).
- Valeriana** T., Baldrian.
alpestris Steven, Bunge, (= *montana* MB.), Voralpen-B., 4. f. Caucasus, Sibirien.
Napus Lindl., rübsenähnlicher, 4. k. t. Mexico.
Phu L. (= *hortensis* Lam.).
rupestris Pall. (= *sibirica* W.), *ruthenica* W. (= *sibirica* L.), *villosa* Thbg., v. *Patrinia rupestris*, *sibirica* et *villosa*, p. 591 et p. 481, II.
- Valerianella** T., Rapunzel.
corniculata C. A. Mey., gehörnte, o. f. Caucasus.
coronata Dufur. (= *campanulata* Bivone), β) *discoidea* Lois. (= *sicula* Gussone, = *Fedia discoidea* Vahl, = *F. sicula* Vahl).
hirsutissima Lk., rauhhaarigste, o. f. Griechenland.
mixta Dufur. (= *Fedia microcarpa* Lois. = *F. minuta* Speg. = *F. mixta* Vahl).
congesta Lindl. (= *parviflora* Dougl.), v. *Plectritis congesta*, p. 539, II., *exscapa* (Steven), DC., v. *Hohenackeria bupleurifolia*.
- Vallesia** cymbaefolia Ortega, (= *glabra* Lk. = *Rauwolfia glabra* Cavan.).
- Vallota** Salisb., Herb., *purpurea* Herb. (= *Amaryllis elata* Jacq. = *A. purpurea* Ait. = *A. speciosa* L'Her. = *Crinum speciosum* L. = *Cyrtanthus purpureus* Herb. = *Hippeastrum purpureum* Hort.).
 α) major Hort., β) minor Herb.
- In van Houttes Établissement horticole wird auch eine *V. pyrochroa* kultivirt.
- Vancouveria** Morr. et Decaisne, (Vancouver, franz. Naturforscher etc.), VI. I., Berberideae.
hexandra Morr. et Decaisne, (= *Caulophyllum gracile* Dougl. = *Epimedium hexandrum* Hook.), sechsmännige, 4. f. Nordamerika.
- Vanda** RBr., Vanda.
costata Lindl., gerippte, 4. w. Ceylon.
cristata Lindl., kammförmige, 4. w. Ostindien.
furva Lindl. (= *Cymbidium furvum* W. = *Epidendrum furvum* L.), 4. w. Ostindien.

Vanda

- gigantea* Lindl., riesenhafte, ♂. w. Ostindien.
lissochiloides Lindl., glattstendelähnliche, 4. w. Molucken.
paniculata Lindl. (= *Aerides paniculata* Ker, = *Sarcanthus paniculatus* Lindl.), rispige, 4. w. China.
peduncularis Lindl., langstielige, 4. w. Ceylon.
recurva Hook. (= *Sarcanthus rostratus* Lindl.), zurückgekrümmte, 4. w. China.
 In den belg. Gärten wird noch eine *papillosa* kultivirt.
teretifolia Lindl., v. *Sarcanthus teretifolius*, p. 721,
trichorrhiza Hook., v. *Cymbidium triste*, p. 189, II.

Vandellia L. mant., Vandellie.

- crustacea* Benth. (= *alba* Benth. = *varians* G. Don, = *Antirrhinum hexandrum* Forsk. = *Capraria crustacea* L. mant. = *Gratiola aspera* Roth, = *G. lucida* Vahl, = *Hornemannia ovata* Lk. = *Morgania lucida* Speg. = *Tittmannia ovata* Rehb., p. 811, = *Torenia alba* Hamilt. = *T. crustacea* Cham., Schltld. = *T. flaccida* RBr. = *T. lucida* Hamilt. = *T. varians* Roxb.), krustirte, ☉. m. f. Südasien, tropisches Neuholland, Madagascar, Mascarenas, tropisches Amerika.
diffusa L. mant. (= *Bonnaya organifolia* Speg. = *Gratiola organifolia* Vahl).
erecta Benth. (= *Tittmannia erecta* Benth.), aufrechte, ☉. m. f. Ostindien.
hirsuta Hamilt., Benth. (= ? *multiflora* Blanco, = *Gratiola viscosa* Hornem. = *Hornemannia viscosa* W. Enum. = *Tittmannia ovata* Benth., non Rehb. = *T. viscosa* Rehb., p. 812), rauhhaarige, ☉. m. f. Ostind., Philippinen.
multiflora G. Don, (= *Tittmannia trichotoma* Benth. = *Torenia multiflora* Roxb.), vielblumige, ☉. m. f. Ostind.
pedunculata Benth. (= *Roxburghii* G. Don, = *cordifolia* G. Don, = *Bonnaya cordifolia* Speg. = *Gratiola cordifolia* Vahl, = *Tittmannia grandiflora* Benth. (ex parte) = *Torenia diffusa* Roxb., excl. syn., p. 813), stieligblumige, ☉. m. f. Ostindien.

β) *parviflora* Benth.

- scabra* Benth. (= *Bonnaya Vahlia* G. Don, = *Columnnea minuta* Roxb. = *Gratiola pusilla* W. = *Stemodia minuta* G. Don, = *Tittmannia pusilla* Benth. = *T. sulcata* Benth. = *Torenia hirta* Cham. et Schltld.), schärfliche, ☉. m. f. Ostindien.

Vandesia edulis Salisb., v. *Alstroemeria Salsilla*, p. 40.

Vangueria Juss., *edulis* Vahl, (= *Commersonii* Dsf. = *cymosa* G. fil. = *madagascariensis* Gmel.), *spinosa* Roxb. (= *Meynia spinosa* Lk.).

Vanilla Adans, Mill., Sw., Vanille.

- aromatica* Sw. (= *V. Epidendrum* Mirb. = *V. mexicana* Mill. = *Epidendrum Vanilla* L.).
claviculata Sw. (= *Epidendrum claviculatum* Sw.), keulförmige, ♂. Sch. w. Westindien.
Palmarum Lindl. (= *Epidendrum Vanilla* Flor. Flumin.), palmenbewohnende, ♂. Sch. w. Guiana.
planifolia Andrews, (= *sativa* Schiede, = *sylvestris* Schiede).
Pompona Schiede, (= *grandiflora* Lindl. = *Baynilla pompona* Hispano-Mexicanorum), Pompona-V., ♂. Sch. w. Mexico, Columbien, Guiana.
 Makoy kultivirt noch eine *V. acutifolia*.

- Vasconcellia* Hort. Par., non Mart., Vasconcellie,
? XXII. IX., Cucurbitaceae-Papayaceae.
- Bonplandiana* Hort. Par., Bonpland's, f. w. Brasilien. ¹⁾
Vavanga chinensis Rohr, (= *edulis* Vahl), v. Van-
guerria *edulis*, p. 836.
Velarum DC., Rchb., v. *Sisymbrium* Sect. VII.,
p. 762 et 673, II.
- Velezia rigida* L. f. Südfrankr., Span., Kleinasien, p. 837.
- Velleia* Sm. (= *Velleia* Auct.), *lyrata* RBr. (= *dicho-*
toma Auct. = *spathulata* Juss., non RBr.).
- Vellozia* Vandell. (= *Vellosia* Auct.), (Vellozo, portu-
giesischer Botaniker), VI. 1., Bromeliaceae-Vellozieae.
aloefolia Mart. (= ? *candida* Mikan), aloebblätterige, 4.
w. Brasilien.
candida Mikan, (= *tertia* Spgl.), weifsglänzende, 4. w.
Brasilien.
tubiflora H. B. K. (= *Radia tubiflora* Rich., Kunth),
röhrenblumige, 4. f. w. Südamerika.
- Veltheimia* Gled., *viridifolia* Jacq. (= *capensis* Red.
= *undulata* Mch. = *Aletris capensis* L.).
Venana madagascariensis Lam., v. *Brexia* madagasc.
- Venidium* *perfoliatum* Less. (= *Arctotis spathulata*
Thbg. = *Osteospermum perfoliatum* L. fil., p. 573).
Ventenata avenacea Koel. (= *bromoides* Koel.), v.
Gaudinia tenuis, p. 255, II.
Ventenatia Cav., *humifusa* Cav., v. *Astroloma humif.*,
p. 104, *procumbens* Cav., v. *Melichrus rotatus*, p. 507.
Vepris obovata G. Don, v. *Toddalia paniculata*, p. 812.
- Veratrum* T., Germer (Wedewurz).
Eschscholtzii A. Gray, (= *Lobelianum* β R. et S. =
parviflorum Bongard, non Mchx.), Eschscholtz's, 4. f.
Nordwestliches Amerika.
Lobelianum Bernh. (= *album* β *viride* Lapeyr. = *al-*
bum viridiflorum Wimm. et Grab.).
angustifolium Pursh, v. *Stenanthium angustifolium*,
p. 704, II., *caricifolium* Schlttl., *officinale* Schlttl.,
v. *Schoenocaulon caricifol.* et *officinale*, p. 642, II.,
virginicum Ait., v. *Zygadenus virginicus*.
- Verbascum* T., Königskerze.
Sect. I. Genuin.
aethiopicum Ehrenb., aethiopische, ♂. f. Aethiopien, Syrien.
Blattaria L. (= *Claytoni* Mchx.), Hybriden: Bastardii
R. et S., *ramosinum* Poir.
Boerhaavii L. mant. (= *majale* DC. = ? *rotundifol.* Tenore).
brevidens Benth. (= *phlomisoides* d'Urv.), kurz-zählige,
♂. f. Samos.
candelabrum Kar. et Kiril., armleuchterförmige, ♂. 4. f. Altai.
Chaixii Vill. (= *austriacum* Schott, = *gallicum* W. =
dentatum Lapeyr. = *orientale* MB. = *monspeulanum*
P. = *banaticum* Schrad. = *alpinum* Turr. = *ovatum*
Schrad. = *urticaefolium* Lam. = *virens* Host), Chaix's,
♂. f. Mittel-, Süd-, West- u. Osteuropa, Südrussland,
Armenien.
crassifolium Hffg. et Lk., dickblätterige, ♂. f. Portugal.

1) Die Gattung *Vasconcellia* Mart., zu der Familie der Big-
noniaceae gehörig, hat DeCandolle Arrabidaea (A. de Arrabida,
Bischof zu Rio Janeiro und Herausgeber der Flora Fluminensis)
genannt und im prodr. s. n. r. v. Vol. IX. 21 Arten derselben,
in Brasilien heimisch, beschrieben, von welchen bis jetzt keine
kultivirt zu werden scheint.

Verbascum

- densiflorum* Bertol., dichtblumige, ♂. f. Italien.
gnaphalodes MB. (= *Stevenii* Hort. Vindob.).
Hohenackeri F. et Mey, b) flore albo.
hyoserifolium Schrad., hyoserisblättrige, ♂. f. Orient.
Lychnitis L., β) album Mch. (= *Moenchii* Schultz),
 γ) *Weldenii* Moretti, δ) *lychniti-pulverulentum* Noull.,
 ε) *lychniti-phoeniceum* Wieg. (= *versiflor.* Schrad.).
montanum Schrad. (= *compactum* Hort. = *crassifolium*
 Schleichr., DC. = *grandiflorum* β Poir.).
mucronatum Lam. (= *candidissimum* DC. = *auriculatum*
 Sibth., Sm.).
nigrum L. Var. u. Hybrid.: *Alopecurus* Thuill., *lanatum*
 Schrad., *thyrsoides* Host, *nigro-Lychnitis* Schiede,
Schottianum Schrad., *mixtum* Ram., *nigro-austriacum*
 Rehb., *ruderales* Pfeiff. etc.
olympicum Boiss., olympische, ♂. f. Griechenland.
phlomoides L. (= *rugulosum* W. Enum.), Var.: *album*,
australe Schrad., *condensatum* Schrad., *macranthum*
 Hffg., Lk., *nemosum* Schrad., *samniticum* Tenore,
thapsoides Vill.
phoeniceum L. (= *ferrugineum* Andr. = *cisalpinum* Birol.
 = *triste* Sm.), β) *cupreum* Sims, γ) *puniceum* Schrad.
pulverulentum Vill. (= *floccosum* W. K. = *haemorrhoidale*
 Ait. = *heterophyllum* Moretti, = *pulvinatum* Thuill.).
rubiginosum W. K. (= *caucasicum* Fisch.), β) *tauricum*
 Hook., γ) *ferrugineum* Mill.
simplex LaBill. (= *garganicum* Tenore, = *leptostachyum*
 DC. = *syriacum* Schrad.), einfache, ♂. k. Syrien,
 Calabrien, Südfrankreich.
sinuatum L. (= *scabrum* Presl), Hybrid.: *sinuato-pul-*
verulentum Noull. (= *hybridum* Brot.), *sinuato-Thapsus*
 Noull., *longiracemosum* Chaub.
soongaricum Schrenk. (= *palystachyum* Karel. et Kiril.),
 soongarische, ♂. f. Soongaria.
Thapsus L. (= *alatum* Lam. = *densiflorum* Pollin. =
neglectum Guss. = *Schraderi* Mey.), Var. u. Hybrid.:
Thapso-sinuatum Noull. (= *calyculatum* Chaub.),
Thapso-Lychnitis Mert et K. (= *spurium* K. = *semi-*
album Chaub.), *Thapso-nigrum* Schiede, (= *collinum*
 Schrad. = *seminigrum* Fr. = *ambiguum* Lej. =
 ? *simplex* Hffg., Lk. = *dubium* R. et S.).
thapsiforme Schrad. (= *Thapsus* Mey., K. = *bicolle*
 Murr. = *cuspidatum* Schrad. = *Kicksianum* Dumort.,
 Hybrid.: *thapsiformi-Lychnitis* Schiede, (= *ramigerum*
 Schrad.), *thapsiformi-nigrum* Schiede, (= *adulterinum*
 K.), *nothum* K., *interjectum*, *denudatum* et *flagriforme*
 Pfund. ? β) *macrum* Tenore.
viminale Guss. (= *argyrostachyon* Tenore), gertenartige,
 ♂. f. Neapel.
virgatum With. (= *blattarioides* Lam. = *crystallostemon*
 Weinm. = *Celsiae* Boiss. = *glabrum* W. Enum. =
Celsia viscosa Wight).
 Zweifelhafte oder nicht hinlänglich bekannte Arten:
cordatum Dsf., *glabrum* de l'Arbr., *Hornemanni* Bess.,
novae Hollandiae Roem. Hort. Turic., *peregrinum* Fisch.,
slavonicum Kit., *sulcatum* Dsf., *tauricum* Hort., *ver-*
nale Hort., *versicolor* Wender. etc.
Arcturus L., *lyratum* Lam., v. *Celsia* *Arcturus*,
cretica, p. 175.

Verbascum

II. Janthe Griseb.

bugulaefolium Lam. (Griseb.), (= *V. Osbeckii* L.).

Verbena T., L., Eisenkraut.

americana Mill., amerikanisches, ☉. f. Panama.

angustifolia Mchx. (= *rugosa* Mühlbg.).

aspera Gill. et Hook., rauhes, ☿. k. t. Chili.

Aubletia L. (= *grandiflora* Mchx. = *longiflora* Lam.

= *Billardiera explanata* Mch. = *Buchnera canadensis* L. mant. = *Glandularia carolinensis* Gmel. syst.

= *Obletia* Rozier).

biserrata H. B. K. (= *caroliniana* L. var. ? Spgl., p. 886).

bonariensis L. (= *corymbosa* Hort. Berol. nec R. et S.

(= *trichotoma* Mch.), β) litoralis H. B. K.

caroliniana L. (= *carnea* Medic.).

chamaedryfolia Juss. (= *chamadryoides* Hffg. = *Melin-*

dres Gill. = *melissoides* Sweet, = *veronicaefolia* Sm.

= *Erinus peruvianus* L.), var. scarlatina Hortul.

cuneiformis R. et P. (= *cuneifolia* P.), keilförmiges,

☿. k. t. Peru.

gracilis Dsf., non Chamiss. (= *remota* Benth.), schlan-

kes, ☉. f. Mexico.

juncea Gill. et Hook., simsenförmiges, ☿. ☿. k. t. Chili.

laciniosa Schrad., schlitziges, ☿. f. k. ?

Lucaeana Walp. (= *strigosa* Hook.), Lucae's, ☿. f.

Nordamerika.

rugosa D. Don, Sweet, non Mill., Houst. (= *Doniana* Steud.).

scoparia Gill. et Hook., besenförmiges, ☿. k. t. Chili.

simplex Lehm. (= ? *angustifolia* Mchx. var.), einfaches,

☿. f. Nordamerika.

stricta Vent. (= *alopecuroides* Hortul. = *rigens* Mchx.).

venosa Gill. et Hook. (= *scaberrima* Cham.).

Hybriden und Varietäten:

Abdel Kader, Adonis, alba maculata, Alexandrina, Amanda, Annette, Array, Barkesii, Beauty supreme, belle Pompadour, bicolor, bijou, Blue Queen, Buistii, Burleyana, carnea, cedo-Nulli, coelestina, Comte de Paris, cordata, Défiance, delicata, De Mayi, Duchesse d'Orléans, Elfordiensis, Enchantress, Emma, excelsa, Favorite, Garland, géant, Gladiator, Goliath, Hendersonii, Howardiana, Hudibras, Hylandsii, ignea, Impératrice Josephine, incomparable, Ingrani superba, insignis major, Iveryana, Jeanne d'Arc, Julia Grisi, Lilac perfection, Louis Philippe, Lucassi, Lucreçe, Mac Nabiana, maculata variegata, magnifica, Mars, maxima, Mulberry, mirabilis, Minerva, Nec plus ultra, Nelsonii, Nivenii coerulea, odoratissima, Parthoni (= *fragrans*), Phoenix, picta, Princesse Hélène et royal, punicea, purpurea, Queen, Queen Hélène, ramosa, Rébecca, Reine Victoria, Rose d'amour, rosea elegans et odorata, ruby, Sabini, speciosissima, splendida superba, Stedmanni, Stewartiana, striata, superb lilac, superba, Taglioni, teucroides atrosanguinea et coelestina et Princesse Alice, Thompsoniana, Tom Pouce, tricolor alba, triumphans, Van Geertii, Van Gendtii, Vesta, violacea, Vulcain, Westingii, Wonder of scarlet, Zeuxis etc.

angustifolia Mill., non Mchx. (= *indica* Jacq.), *cajennensis* Endl., *jamaicensis* L., *pilosiuscula* Endl., *Salisburyi* Endl., v. *Stachytarpheta angustifolia*, ca-

Verbena

jennensis, jamaicensis, mutabilis, pilosiuscula et urticaefolia, p. 781 et 697, II., ?*dentata* Visian. etc., v. *Aloysia chamaedryfolia* etc., p. 27, II., *pulchella* Sweet, *sulphurea* D. Don, v. *Shuttleworthia pulchella*, *sulphurea*, p. 661, II., *nodiflora* L. etc., v. *Lippia nodiflora* etc., p. 364, II., *curassavica* L., v. *Tamonea curassavica*, p. 797.

Verbesina L., Verbesine.

crocata Less. (= *Bidens crocata* Cav. = *Platypterus crocata* H. B. K. p. 634, = *Spilanthus crocata* Sims).

Drummondii Lindl., Drummond's, 4. k. Texas.

gigantea Jacq. (= *pinnatifida* Sw., non Cav.).

Karwinskyi Mart., Karwinsky's 4. k. t. Mexico.

Phaetusa Cass. (= *Phaetusa americana* G. = *P. borealis* Spgl. = *Siegesbeckia occidentalis* L.), nordamerikanische, 4. f. Nordamerika.

Siegesbeckia Mchx. (= *occidentalis* Walt. = *Siegesbeckia trinervata* Mch.).

sinuata Ell. (= *laciniata* Nutt. = *Siegesbeckia laciniata* Poir.), buchtige, 4. k. Carolina.

triplinervia Visiani, dreifachnervige, 4. f. k. t. Mexico.

Acnema L., v. *Spilanthus Acnema*, *alba* L., *prostrata* L., v. *Eclipta erecta*, *prostrata*, *asteroides* L., v. *Amellus Lychnitis*, *dichotoma* Murray, (= *lanceolata* Poir., *Lavenia* Roxb., non L., v. *Blainvillea rhomboidea et latifolia*, p. 71, II., *ovata* Hort. Par., v. *Heliopsis buphthalmoides*, *sativa* Roxb., v. *Guizotia oleifera*.

Vermifuga corymbosa R. et P. v. *Flaveria Contrayerba*.

Vermontea decandra Commers., v. *Blackwellia paniculata*, p. 124.

Vernonia Schreb., Vernonie.

fasciculata Mchx., Ell., non Blum (= *altissima* Less. = ?*praealta* DC., non W.), büschelförmige, 4. f. Nordam.

firmula Mart., härliche, f. w. Brasilien.

noveboracensis W. (= *Baldwini* James, = *praealta* W.

Auct. = *Serratula altissima* Mill. = *S. noveborac.* L.).

profuga Notar., windende, f. Sch. w. Südamerika.

scorpioides P. (= *centriflora* Lk., Otto, = *V. tournefortioides* Less., non H. B. K. = *Conyza scorpioides* Lam. = *Lepidoploa scorpioides* Cass.).

tournefortioides H. B. K. (= ?*subrepanda* P. = *Stachelina solidaginoides* W. herb., p. 886).

chinensis Less., v. *Scheuchleria patula*, p. 729, *montevidensis* Hort., v. *Pycnocephalum spathulaefolium*, p. 575, II.

Veronica T., L., Ehrenpreis.

acutiflora Benth., non Lapeyr. (= *angustifolia* A. Cunn.), spitzblumiger, f. k. Nördl. Neuzeeland.

agrestis L. (= *nitidula* Rchb. = *pulchella* Bast. = *versicolor* Fr.). Europa, Caucasus, Mittelasien, Mauritius, Nordamerika. Var.: *calycida et polita* Fr. (= *didyma* Tenore), *opaca* Fr. (= ?*obscura* Dumort.), nach Benth.

Allionii Vill. (= *officinalis* β L. = *pyrenaica* All. = *repens* All.), Allioni's, 4. f. Alpen d. Dauphiné, Savoyens etc.

amoena Stev. (= *graeca* Spruner, = *peduncularis* Bory et Chaub., non MB.).

Baumgartenii R. et S. (= *pauciflora* Kit. = *petraea* Baumg.).

Veronica

- ceratocarpa* C. A. Mey., p. 886.
ciliata Fisch. (= *macrocarpa* Turcz., non Vahl), gefranzter, 4. f. Baical. Sibirien.
densiflora Ledeb. (= *Paederota humilis* W. Walp.), dichtblumiger, 4. f. Altai.
diffusa Hook. fil., weitschweifiger, f. k. Neuzeeland.
diosmaefolia A. Cunn., göttergeruchblättriger, f. k. Neuzeel.
euphrasiaefolia Lk. (= *thymifolia* W. herb.), augentrostblättriger, 4. f. Persien.
exaltata Maund, höchster, 4. f. Sibirien.
filiformis Sm., Vahl, fadentörmiger, c. f. Caucasus, Kleinas.
formosa RBr. (= *diosmaefolia* Kn. et Westc., non Cunn.).
gentianoides Vahl, (= *olympica* Pall.), β) *pallida* Hornem., γ) *gentianifolia* Sweet.
incisa Soland. Var.: *laciniata* Soland., *sublaciniata* G. Don.
laeta Karel. et Kiril., freudigblauer, 4. f. Asiat. Rufsland (Alatau).
ligustrifolia A. Cunn. (= ? *salicifolia* Vahl, non Forst.), ligusterblättriger, f. k. Neuzeeland.
longifolia L. (= *luxurians* Ledeb.), β) *puberula* Benth. (= *maritima* L. = *elata* Dsf. = *excelsa* Dsf.).
 Varietät. u. Hybriden nach Bentham: *media* Schrad., *villosa* Schrad., *glabra* Ehrh., *arguta* Schrad., *nitida* Ehrh., *crenulata* Hoffm., *complicata* Hoffm., *grossa*, *acuta*, *ambigua et rigens* Mart., *confusa et longiflora* R. et S., *ruthenica* R. et S., *persicifolia et polystachya* Lk. Enum, *carnea* DC., *oxyphylla* Steven, *condensata*, *comosa et dentosa* Hort., *azurea* Schott etc.
macrocarpa Vahl, großfrüchtiger, f. k. Neuzeeland.
macrostemon Bunge, großfadiger, 4. f. Altai.
melissaefolia Dsf., Poir. (= *Vestiana* R. et S.), melissenblättriger, 4. f. Phrygien.
 β) *maxima* Steven.
minuta C. A. Mey., winziger, 4. f. Westcaucasus.
multifida L., non Jacq. (= *tenuifolia* Stev.), vieltheiliger, 4. f. Mittel- u. Ostasien, Nordpersien, Taurien, Caucasus.
nivea Lindl., schneeweißser, 4. k. Van Diemens Land.
orientalis Mill., Soland. (= *heterophylla* Salisb. = *taurica* Stev.).
officinalis L. (= *Mülleriana* Vest, = *spadana* Lej.), β) *minor* Benth. (= *hirsuta* Hopk. = *setigera* D. Don, = *acutiflora* Lapeyr.).
paniculata L. (= *altaica* Fisch. = ? *brevifolia* MB. = *amethystina* W. Enum. = *ramosa* Pall. = *serrulata* Pall. = *virgata* Lk. = *foliosa* W. K. = *leucantha* Heln, = *spuria* L. spec.), rispiger, 4. f. Südosteuropa, asiat. Rufsland, Nordchina, Japan.
 β) *angustifolia* Fisch., Benth. (= *Hostii* Moretti, = *ticinensis* Pollini, = *linariaefolia* Pall. = *cartilaginea* Ledeb.).
peregrina L. (= *caroliniana* Walt. = *carnosula* Lam. = *chilensis* H. B. K. = *laevis* Lam. = *marylandica* L. = *pallescens* Gat. = *romana* L. = *subserrata* Rchb. = *xalapensis* H. B. K.).
ponormitana Tineo, panormitanischer, 4. f. Sicilien.
polycarpa Hort. Berol., vielfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.
repens Clairv., DC., non All., kriechender, 4. f. Corsica.
salicifolia Forst., weidenblättriger, f. k. Neuzeeland.
speciosa R. Cunning., prächtiger, f. k. t. Neuzeeland.

Veronica

spicata L. Als Variet. u. Hybrid. gehören nach Bentham hierzu folgende: *Clusii* Schott, *menthaefolia* Schott, *squamosa* Presl, *nitens* Host, (= *crassifolia* Wierzb.), *Barrelieri* Schott, *australis* Schrad. (= *paludosa* Lej.), *alternifolia* Lej. (= *media* Lej.), *brevifolia* Lk. (= *brachyphylla* R. et S.), *orchidea* Crantz, (= *hybrida* MB. = *crassifolia* Kit. = *Crantzii* Schm. = *arguta* Moretti), *longibracteata* Lk., *praetutiana* Moretti, *pal-lens* Host etc.

stolonifera Lehm. (= ? *calycina* RBr. var. Bentham).
Neuholland, (angebl. Nordamerika), p. 844.

tubiflora Fisch. et Mey. (= *Leptandra Meyeri* G. Don),
= *Paederota tubiflora* Walp.).

umbrosa MB., schattenliebender, 4. f. Caucasus.

virginica L. (= *Eustachya alba* et *purpurea* Rafin. = *Callistachya virginica* Rafin. = *Leptandra virginica* Nutt. = *Paederota virginica* Walp. = *Veronicastrum album* Mch.), β) *angustifolia* Steud. (= *Leptandra angustifol.* Lehm), γ) *diversifolia* Steud. (= *purpurea* Steud. = *Veronicastrum diversifolium* Mch.).

Unbestimmtere: *ascendens* Don, 4., *aquatica* Bernh. ♂., *candida* Lodd., *cuspidata* W. 4., *depressa* Kit. ♂.
Ungarn, *Koeleri* R. et S. (= *nova* Koel.), *Koenitzeri* Hort. Jenens., *praealta* Lodd. 4., *rosea* Dsf. (= *atlantica* P.) ♀. Atlas, *stricta* Lodd., *upsaliensis* Hort. (= *paniculat.* var.), *Waldsteiniana* etc.

Lindleyana Wall., v. *Picrorhiza* Kurrooa Nachlese.

Verticordia DC., Verticordie, XII. 1., Myrtaceae-Chamaelaucieae.

acerosa Lindl., nadelähnliche, ♀. t. Neuholland.

Fontanesii DC. (= *Chamaelaucium plumosum* Dsf. = *Diplachne Baueri* RBr.), Desfontaine's, ♀. t. Neuholl.

glaucescens Hort. angl. et belg., blaugrünliche, ♀. t. Neuh.
grandiflora Endl. (= *heliantha* Lindl.), großblumige,
♀. t. Neuholland.

insignis Endl., ausgezeichnete, ♀. t. Neuholland.

Lehmanni Schauer, Lehmann's, ♀. t. Neuholland.

Die Arten dieser Gattung sind größtentheils in unsere Gärten noch nicht eingeführt.

Vesalea Mart. et Galeotti, (Vesalius, bekannter u. berühmter Arzt und Anatom des XVI. Jahrh.), IV. 1., Caprifoliaceae.

floribunda Mart. et Galeott. (= *Abelia floribunda* Hort.),
blüthenreiche, ♀. t. Mexico.

Vesicaria Lam., Blasenschötchen.

arctica Richards. (= *andicola* Gill. = *Alyssum arcticum* Hornem.).

corymbosa Griseb., doldentraubiges, ♂. f. Rumelien.

digitata C. A. Mey., fingerförmiges, ♂. f. Caucasus.

fruticulosa Desv. (= ? *cretica* Poir.), strauchiges, ♀. f.
b. k. Archipelagus.

grandiflora Hook., b) *pallida* Hort.

reticulata Lam. (= *denticulata* Sm. = *Alyssum Vesicaria* L.).

incana Desv., v. *Berteroa incana*.

Veslingia Visian. (Vesling, alter bekannter Arzt und Anatom), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

scabra Visian., scharfe, 4. k. t. Nubien etc.

Veslingia Fabr., *cauliflora* Mch. (= *Heisteri* Fabr.), v. *Aizoon canariense*, p. 26.

Vestia lycioides W. (= *foetida* Hffg. = *Cantua foetida* P. = *C. ligustrifolia* Juss. = *Cestrum grandiflorum* Hort. = *Periphragmus foetidus* R. et P.).

Vexillaria arborea Hffg., v. *Clitoria arborea*, p. 150, II., *brasiliانا* Hffg., v. *Centrosema brasilianum*, p. 132, II., *triquetra* Hffg., v. *Platysema triquetrum*, p. 538, II.

Vialia Visian. (Felix Vial, Prof. d. Botanik zu Padua, 1687—1718), XVI. II. (X. v.), Büttneriaceae.

macrophylla Visian. (= *Hermannia macrophylla* Hort. = *Melhania macrophylla* Vis.), großblättrige, ⚥. t. ?

Vibo Medic., *spinosa* Mch., v. *Emex spinosa*.

Viborgia capitata Mch., *hirsuta* Mch., *purpurea* Mch., *supina* Mch., v. *Cytisus capitatus*, *biflorus*, *purpureus*, *supinus*.

Viburnum T., L. (et *Opulus* et *Tinus* T.), Schneeball. *cotinifolium* D. Don, (= *polycarpum* Wall.).

dubium Steud. (= *fragrans* Lois., non Bunge), zweifelhafter, ⚥. k. f. b. ?

ellipticum Hook., elliptischer, ⚥. f. Nordamerika.

fragrans Bunge, wohlriechender, ⚥. k. f. b. Nordchina.

japonicum Spgl. (= *Cornus japonica* Thbg.), japanischer, ⚥. k. Japan.

laevigatum Ait. (= *cassinoides* Mill. = *lanceolatum* Hill.).

nudum L., α) *Claytoni* Walp., β) *angustifolium* Walp.

(= ? *nitidum* Ait. = *pyracanthifolium* Schwein.), γ)

cassinoides L., nec Mchx. (= *nudum* Hook. = *pyrifolium* Pursh, = *squamatum* W. Enum.).

obovatum Walt. (= *cassinoides* Mill., non L. = *laevigatum* Ait.), verkehrteiförmiger, ⚥. f. Nordamerika.

β) *punicifolium* Dsf.

odoratissimum Ker, (= *chinense* Zeyh., Colla, = *Coffea monosperma* Hook., Arn.).

Opulus L., d) *xanthocarpum* Hort. Vindøb.

rugosum P. (= *latifolium* Hort. = *rigidum* Vent. = *strictum* Lk. = *Tinus* ♂ *strictum* Ait., non Sweet).

Unbestimmtere: *Avona* Hort. Cels., *oleaefolium* Tausch.

Vicia T., Wicke.

I. Euvicia.

alpestris Steven, (= *polyphylla* Dsf. var. Spgl.), Vor-alpen-W., 4. Sch. f. Taurien.

bithynica L. (= *angulosa* Gater. = *minuta* Mch. = *Arachus* Medic. = *Lathyrus bithynicus* Lam. = *L. tumidus* W. = *L. turgidus* Lam.), bithynische, ☉. Sch. f. Südeuropa.

Bobartii Edw. Forst. (= *angustifolia* Sm., non Roth, = *angustifol.* β *acuta* P. = *lathyroides* Dicks., non L. = *sativa* γ Sm.), Bobart's, ☉. Sch. f. England.

calcarata Dsf. (= *angustifolia* Mch. = *monantha* Retz, = *Orobus viciaeformis* Lagasca).

canadensis Zucc. (= *globosa* Retz), canadische, ☉. Sch. f. Canada.

cornigera Chaub., hörnertragende, ☉. Sch. f. Frankreich.

dentata Fisch., non Gill. (= *Fischeri* Steud.).

dubia Schult. (= *Lathyrus italicus* Hort.).

dumetorum L. (= *patula* Mch. = *tetragona* Hort. Par.).

gigantea Bunge, riesenhafte, 4. Sch. f. Nordchina.

lilacina Ledeb., lilafarbige, 4. Sch. f. Altaisch, Sibirien.

Vicia

- lutea L., β) pallidiflora Sering. (= *hirta* Balb.), γ)
 muricata Sering.
 megalotropis Ledeb., großskielige, 4. Sch. Alt. Sibirien.
 narbonensis L. (= *latifolia* Mch.), β) serratifolia Jacq.
 (= *monadelpha* Roth).
 nodosa Fisch., knotige, \odot . Sch. f. ?
 punctata Schlchr., punktirte, \odot . Sch. f. Schweiz.
 purpurea Steven, (= *polyphylla* Dsf. var. Spgl.), pur-
 purfarbige, 4. Sch. f. Osteucasus.
 sardoa Moris, sardinische, \odot . Sch. f. Sardinien.
 sativa L. Var.: Winter Fave or Wetch, seminibus gri-
 seis, alba (white seeded thare), α) obovata Sering.
 (= *helvetica* Hort. = *nemoralis* P.), β) segetalis
 Thuill. (= *luganensis* Schlchr.), γ) glabra Schlchr.,
 δ) pygmaea Sering. (= *lathyroides* Thomas), ϵ) cor-
 data Wulf.
 triflora Tenore, dreiblumige, \odot . Sch. f. Italien.
 villosa Roth, β) glabrescens Hort. Petropol.

II. Faba T.

- Faba L. (= *F. vulgaris* Mill. = *F. major* Dsf. = *F.*
sativa Auct.). Var.: a) atropurpurea, b) atroviolacea,
 c) gilva, d) minima, e) rubra, f) viridis.
 Unbestimmtere: bactra Zucc. \odot ., bohémica Räusch., glauca
 Hort. Liverp., ? non Presl, Terronii Tenore, tetragona
 Dsf., Thouini Mart., virginica Mart.
fruticosa W. (= *tomentosa* Hort.), v. *Coursetia*
tomentosa, p. 164, II.

Victoria Schomb., Lindl., (zu Ehren d. Königin Victoria
 von England, erl. Beschützerin der Wissenschaften u.
 Künste, so benannt), XIII. 1., Nymphaeaceae.

regia Schomb., Lindl. (= *Euryale amazonica* Poepp.),
 königliche, 4. Wa. w. Südamerika.

Crutziana d'Orbigny, ebenfalls in Guiana heimisch, wird
 bis jetzt kaum kultivirt.

Vieusseuxia Delarb., Vieusseuxie.

aristata Delarb. (= *Iris tricuspis* Thbg.), grannige, 4.
 Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

iridioides Red., non Lk. (= *Iris curtispindula* DC. =
Moraea Candolleana Spgl.), schwertelähnliche, 4. k.
 Cap d. g. Hoffn.

tripetaloides DC. (= *Iris mutila* Lichtst. = *I. tripetala*
 L. fil. = *Moraea tripetala* Ker), dreikronenblättrige,
 4. k. Cap d. g. Hoffn.

iridioides Lk., v. *Diates iridioides*. Hinsichtlich der
 übrigen s. *Moraea*, p. 530 et p. 418, II.

Vigna Savi, Vigna.

villosa Savi, zottige, \odot . Sch. f. Chili.

capensis Walp, *Catjang* Walp., v. *Dolichos capen-*
sis, *Catjang*.

Vignea acuta Rehb. etc., v. *Carex acuta* etc.

Vilfa Adans., Trin., v. *Sporobolus* Sect. II. p. 779 et 695, II.
Villanova bipinnatifida Ortega, v. *Parthenium Hy-*
sterophorus.

Villarezia R. et P., Villarezie, V. 1., Celastrineae.

grandiflora Hort. belg., großblumige, h. w. Südamerika.

Villarsia Vent., Griseb., *parnassifolia* RBr. (= ? *chilensis*
 Lodd. bot. Cab. = *rotundifolia* Hort. Par. = *Menyan-*
thes exaltata Sims, = *Swertia parnassifolia* LaBill.).
 β) *reniformis* RBr.

Hinsichtl. d. übrigen s. *Linnanthemum*, p. 360, II.

Vincæ L., Sinngrün.

Sect. I. Catharanthus G. Don, (= *Lochnera* Rchb.).
 lancea Boj. (= *madagascariensis* Hort. Cels.), lanzettliche, 4. w. Madagascar.

rosea L. (= *Pervinca rosea* Mch.) cum var. p. 849.

Sect. II. Cupa Vleea A. DC.

pusilla Murray, L. fil. (= *parviflora* Retz).

Sect. III. Pervinca A. DC.

herbacea W. K. (= *minor* Sm.).

media Hffg., Lk. (= *acutiflora* Bertol. = *major* Brot.), mittleres, 4. f. k. Portugal.

minor L. (= *Pervinca m.* Scop.), var. *intermedia* Tausch.

Vincetoxicum Mch. (= *Cynanchi* Sect. RBr.), Schwalbenwurz, V. II., Asclepiadeae.

acuminatum Decaisne, zugespitzte, 4. f. b. Japan.

atratum Morr. et Decaisne, schwärzliche, 4. f. Nordchina.

canescens Decaisne, (= *Asclepias cretica* Clus. = *A. canescens* W. = *Cynanchum glaucum* Wall. = *Vincetoxicum luteum* Sieber), grauliche, 4. f. Osteuropa, Kleinasien, Nepal, Cashmire.

japonicum Morr. et Decaisne. japanische, 4. Sch. f. b. Japan.

medium Decaisne, (= *luteum* Hffg. et Lk. = *Asclepias lutea* Mill. = *A. fuscata* W. Enum. Suppl. = *Cynanchum fuscatum* Lk.), mittlere, 4. Sch. f. Süd-, West- und Osteuropa.

nigrum Mch. (= *Asclepias nigra* L. = *Cynanchum nigrum* RBr.).

officinale Mch. (= *vulgare* R. et S. = *Asclepias alba* Mill., Lam. = *A. Vincetoxicum* L. = *A. ovata* Hort. = *Cynanchum Vincetoxicum* P., RBr.).

a) angustifolium, b) latifolium.

purpurascens Morr. et Decaisne, purpurfarbige, 4. Sch. f. b. Japan.

sibiricum Decaisne, (= *Asclepias sibirica* L. = *Cynanchum sibiricum* RBr.), sibirische, 4. f. Sibirien, Daurien, Nordchina.

Viola T., Veilchen.

affinis Lecont. (= *cucullata* Ait. = *papilionacea* β DC. = *sororia* Auct. americ.), ähnelndes, 4. f. Nordamer.

altaica Pall, Ker, (= *calcarata* L. var. Gay. = *chrysantha* Fisch. = *grandiflora* Sievers, = *Pallasii* Fisch. = *speciosa* Schrad. = *Mnemion grandiflorum* Spach), (Pensées anglaises, Grandes Pensées, in vielen jährlich immer wieder neu erzeugten buntenfarbigen Varietäten mit abwechselnden Blumistennamen versehen).

arborescens L., non Hortul. (= *longiviola* Pourr. = *suberosa* Dsf. = *tuberosa* Auct.).

Billotii J. W. Schulz, (= *pumila* et *pratensis* Mutel), Billot's, 4. f. Frankreich.

blanda W. (= *amoena* Leconte, non Symes, = *clandestina* Pursh, = *Lecontiana* G. Don, = *obliqua* Pursh, = *pallens* Forst.).

calcarata L. (= *alpina* Tenore, non Jacq. = *Bertolonii* Pio, = *decumbens* Mch. = *gracilis* Bivone, = *grandiflora* Hegetschw. = *heterophylla* Bertol. = *hispida* Lapeyr.).

chinensis G. Don, (= *primulaefolia* Lour.), chinesisches, \odot . f. China.

cucullata Ait. (= ? *cordata* Walt. = *obliqua* Pio, = *resupinata* Mch. = ? *asarifolia* Schweinitz, non Pursh).

β) *sororia* W.

Viola

dactyloides R. et S. (= *digitata* W., non Pursh, = *palmata* Patrin, non L.).

Dehnhardtii Tenore, Dehnhardt's, 4. f. Neapel.

?fennica Fisch., Sweet, fennisches, 4. f. Sibirien.

flabellifolia Lodd. (= *atropurpurea* Rafin. = *pedata bicolor* Pursh, = *pedata flabellata* Sweet), fächerförmiges, 4. f. Nordamerika.

Gmeliniana R. et S. (= *fusiformis* Sm. = *lanceolata sibirica* W.), β) Fischeri Swt. (= *suavis* Fisch., non MB.).

hirta L. (= *hirsuta* R. et S. = *parvula* Opiz), β) carnea, γ) variegata, δ) ambigua W. K., ε) campestris MB., ζ) umbrosa Hoppe.

imberbis Ledeb., unbärtiges, 4. f. Altaisch. Sibirien.

intermedia Lej., mittleres, 4. f. Belgien.

modesta Fenzl, zierliches, ☉. f. Syrien.

α) grandiflora, β) parviflora.

Mühlenbergii Torrey, (= *asarifolia* Mühlbg., non Pursh, = *conspersa* Rehb. = *debilis* Pursh, = *labradorica* Schrk. = *punctata* Lewis, = *uliginosa* Mühlbg., Schwein., non Schrad.), Mühlenberg's, 4. f. Nordamerika.

multifida W. (= *dissecta* Ledeb. = *pinnata a sibirica* W.).

odorata L., i) fol. variegatis, β) arbuscula * (= *arborescens* Hortul., (non L.) fl. pleno), γ) *suavis* MB. (= *Stevenii* Bess. = *parmensis* Hortul.), b) fl. pleno, p. 850.

ovata Nutt. (= *ciliata* W. = *finbriatula* Sm. = *primulaefolia* Pursh, non L. = *sagittata β ovata* Torr., A. Gr.).

palmata L. (= *heterophylla* Lecont., non Bertol. = ? *rannunculifolia* Juss.), b) pygmaea Hort., β) triloba Lewis.

Patrinii DC. (= *primulaefolia* Hamilt. = *prunellaefolia* Fisch. = *Notoniana* Wall.), Patrin's, 4. f. Sibirien, Nordchina, Nepal.

primulaefolia L. (= ? *cordata* Walt. = *Gronovii* W. herb. = *ovata* Rafin.), β) *acuta* Bigel.

prionantha Bunge, (= *caespitosa* D. Don, = *Patrinii β et γ* DC. = *primulaefolia* Hamilt.).

rothomagensis Dsf. (= *hispida* Lam. = *parvula* Tineo, = *tricolor* L. var. DC., K. = *Mnemion hirsutum* Spach).

sagittata Ait. (= *sagittaeifolia* Salisb.).

Schultzii Billot, (= *turfosa* Kirschl.), Schultz's, 4. f. Elsass.

striata Ait. (= *debilis* Mchx., non Pursh, = *Lewisiana* DC. = *ochroleuca* Schweinitz, = *repens* Schweinitz).

tricolor L. (= *hortensis* Hortul.), var. *iridescens* Hort. etc.

villosa Walt. (= *barbata* Mühlbg. = *palmata* L. var.), zottiges, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: *Bruneaunii* Hort., *calycantha* Hort., *lobata striatiflora* Hort.

Virea Adans., G., *hastilis* G., v. *Leontodon hastile*, *scabra* Scopol., v. *Helminthia asplenioides*, p. 293, II.

Vireya sanguinolenta Rafin., v. *Tussacia sanguinea*, p. 747, II.

Virgilia argentea Poir., v. *Ammodendron Sieversii*, p. 862, *lutea* Mchx., v. *Cladrastis tinctoria*, p. 148, II.

Virgilia heliodes L'Her. (= *grandiflora* Fras.), v. *Gaillardia pulchella*.

Virgularia R. et P., Virgularie, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (Scrofulariaceae).

splendida Mart. (= *Esterhazyia splendida* Mik. var. *β vulgaris* DC. = *Gerardia gnidioides* Cham., Schldtl.), schimmernde, ♂. w. t. Brasilien.

Virola sebifera Aubl., v. *Myristica sebifera*, p. 537.

- Viscaria* Riv., Röhl., v. *Lychnis* Sect. I. et IV. p. 428 et 376, II. *cristata* Hort. = ?
- Visiania* DC. (R. v. Visiani, Prof. u. Director d. botan. Gartens in Padua), II. I., Oleaceae.
grandiflora DC. (= *Olea grandiflora* Wall. = *Phillyrea grandiflora* Wall.), großblumige, f. t. Nepal, Ostindien.
paniculata DC. (= *Olea clavata* G. Don, = *Phillyrea paniculata* Roxb. = *P. terminalis* Heyne), rispige, f. t. China.
robusta DC. (= *Phillyrea robusta* Roxb. = *P. terminalis* Roxb.), starke, f. t. w. Ostindien.
- Vitex* L., Keuschbaum (Müllen).
Agnus castus L. (= *verticillata* Lam.), β) *latifolia* Mill., non Lam. = ? *integra* Medic.).
Doniana Sweet, (= *umbrosa* Don), Don's, f. w. Sierra Leone.
incisa Lam. (= *chinensis* Mill.).
Leucoxydon L. fil. (= *Wallrothia Leucoxydon* Roth, p. 855).
trifolia L. (= *integerrima* Mill.).
 Nicht hinlänglich bekannt: *sinuata* Medic.
Viticella deltoidea Mch., v. *Clematis Viticella*, p. 204.
- Vitis* T., L., Weinstock.
aestivalis Mchx. (= *intermedia* Mühlbg. = *Labrusca* Walt. = ? *palmata* Vahl, = *vinifera americana* Marsh. = *vulpina* W., Jacq. Hort. Schönbr.).
cordifolia Mchx. (= *incisa* Jacq. = *vulpina* Walt.), herzblättriger, f. Sch. f. Nordamerika.
Labrusca L. (= *taurina* Walt.), β) *alba* Hort. Vindob.
orientalis Clement., morgenländischer, f. f. Spanien.
 β) *dapsilis* Clem. γ) *patiens* Clem.
vinifera L., var. d) *apyrena*, e) *alexandrina*.
Vitis idaea alba Mch. etc., v. *Vaccinium album* etc.
Vitmannia Turra, non Vahl, *viscosa* Turra, v. *Oxybaphus viscosus*, p. 578, *Vitmannia africana* Wight et Arn., v. *Noltea africana*, p. 438, II.
Viviania psychotrioides Colla, v. *Melanopsidium nigrum*, p. 394, II.
- Vochysia* Juss., *excelsa* Lam. (= *Vochy guianensis* Aubl. = *Cucullaria excelsa* W.).
Vogelia Medic., non Lam, *paniculata* Hornem. (= *sagittata* Medic.), v. *Neslia paniculata*, p. 546.
Voigtia tomentosa Roth, v. *Andryala Rothia*, p. 58.
Volckameria fragrans Hort. (= *japonica* Hort. = *odoratissima* Fisch.), *japonica* Thbg., *Kämpferi* Jacq., *laurifolia* Hort., *ligustrina* Jacq., *multiflora* Burm., *tomentosa* Vent., v. *Clerodendron fragrans*, *Kämpferi*, *squamatum*, *viscosum*, *ligustrinum*, *phlomoideis*, *tomentosum*, p. 205 et p. 149, II.
Volutarella Cass., *bicolor* Cass., *Lippii* Cass., *erucifolia* Cass., v. *Centaurea* Sect. *Amberboa*, *crupinoideis*, *Lippii* et *erucifolia*, p. 175.
Volutella aphylla Forsk., v. *Cassyta filiformis*, p. 171.
- Vouapa* Aubl., *Vouapa*.
phaseolocarpa Hayne, (= *Macrolobium phaseolocarpum* Steud.), bohnenfrüchtige, f. w. Brasilien.
- Vriesia* Lindl. (van Vriese, Prof. d. Botanik u. Director d. botan. Gartens in Amsterdam), VI. I., Bromeliaceae.
psittacina Lindl. (= *Tillandsia psittacina* Hook., p. 811), papageifarbig, f. w. Brasilien.
Vulneraria Lam., Scop., *Anthyllis* Scop. (= *heterophylla* Mch.), *argentea* Lam. etc., v. *Anthyllis Vulneraria*, *barba jovis* etc., p. 65—66.

- Vulpia** C. C. Gmel., Vulpie.
 cynosuroides Parlatores, (= *delicatula* Lk. = *Festuca cynosuroides* Dsf. = *F. delicatula* Lagasca).
 ciliata Lk. (= *Myuros* Rchb. = *pilosa* Gmel. = *Bromus barbatus* Savi, = *Festuca alopecuroides* Tenore, = *F. barbata* Gaud. = *F. ciliata* Danth. = *F. Myuros* L. spec., Gouan).
 Fontanesii Parlatores, (= *Festuca madritensis* Dsf. excl. Synon.), Desfontaine's, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
 incrassata Trin., Parlat. (= *Festuca incrassata* Salzm. = *F. stipoides* Desf. = *F. clavata* Mch. = *Bromus stipoides* L.), verdickte, ☉. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
 Myurus Gmel. (= *pseudomyurus* Rchb. = *Bromus bohemicus* Schm. = *Festuca monandra* Ell. = *F. Myurus* Auct., non L. spec. = *F. pseudomyurus* Willem.),
 β) sciuroides Rchb. (= *bromoides* Auct. = *Festuca bromoides* Auct. = *F. sciuroides* Roth).
 setacea Parlat. (= *Festuca sicula* Guss.), borstenförmige, ☉. f. Sicilien.
 sicula Lk. (= *Festuca sicula* Presl), sicilianische, ☉. f. Sicilien.
 tenuis Parlat. (= *Bromus sabulosus* Gussone, = *B. sardous* Spgl. = *B. tenuis* Tineo, = *Brachypodium tenue* Tineo, = *Festuca incrassata* Bertol., non Salzm.), dünne, ☉. f. Mittel- und Süditalien.
Michelii Rchb., v. *Avelinia Michelii*, p. 55, II.
- Wachendorfia** L., Herberti Sweet, (= *Hibberti* Loud. = *paniculata* β Bot. mag.), hirsuta Thbg. (= *villosa* Andr.).
- Wahlenbergia** Schrad., Wahlenbergie.
 claviculata E. Mey. (= *exilis* A. DC. = *Lobelia paniculata* L.), keulenförmige, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
 gracilis A. DC. (= *capillaris* G. Don, = *Campanula capillaris* Lodd. = *C. gracilis* Forst. = *C. polymorpha* Soland. = *C. vincaeflora* Vent.).
 lobelioides DC. (= *pendula* Schrad. = *Campanula inconspicua* Banks. = *C. juncea* Hort. = *C. juncifolia* Hort. = *C. lobelioides* L. = *C. parviflora* Salisb. = *Lobelia Broussonetii* Bory, = *L. canariensis* Hort. Par. = *L. juncifolia* Hort. = *Roellia cernua* Brouss.).
 nutabunda A. DC. (= *Camp. nutabunda* Guss., Tenore), italienische, ☉. f. Unteritalien, Sardinien.
 repens Schrad. (= *procumbens* DC. fil.).
 striata DC., gestreifte, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
graminifolia DC. fil., *Kitabelii* A. DC., *tenuifolia* A. DC., v. *Edrajanthus graminifolius* etc.
- Waitzia** Wendl. 1810, (= *Morna* Lindl., p. 53, = *Viraya* Gaudich), (Waitz, Landkammerrath in Altenburg), XIX. II., Compositae-Helichryseae.
 aurea Steetz, (= *Morna nitida* Lindl.), goldfarbige, 4. f. t. Neuholland.
 corymbosa Wendl., traubendoldige, ☉. m. f. Neuholland.
 α) Wendlandiana Steetz, β) Benthamiana Steetz, (= *Leptorhynchus suaveolens* Benth. = *Morna nivea* Lindl. = *Helichrysum decumbens* Portenschl.).
 Steetziana Lehm., Steetz's, ☉. m. f. Neuholland.
Waitzia Rchb., *aequimaculata* Rchb. etc., v. *Montbretia aequimaculata*, etc., p. 417, II.

Waldsteinia W., Waldsteinie.

lobata Torr. et A. Gray, (= *Dalibarda lobata* Baldw.),
gelappte, 4. f. Nordamerika.

Doniana Tratt., *fragarioides* Tratt., *sibirica* Tratt.,
v. *Comaropsis Doniana* etc., p. 213 et 155, II.

Walkeria Schreb., *serrata* W. (= *zeylonensis* Hort. =
Gomphia angustifolia Vahl, = *Meesia serrata* G.).

Wallenia Sw. (Wallenius, schwedischer Naturforscher),
IV. 1., Myrsineaceae.

angulata Jacq., kantige, ♀. w. Ostindien.

laurifolia Sw. (= *Petesiodes laurifolium* Jacq.), lor-
beerblättrige, ♀. w. Westindien.

Wallichia caryotoides Roxb., v. *Harina caryotoides*,
p. 284, II., *Khooseana* Lodd. v. Nachlese.

Wallrothia Spgl., non Roth, (Dr. Wallroth, Hofrath u.
Kreisphysikus zu Nordhausen), V. II., Umbelliferae.

tenuifolia DC. (= *splendens* Spgl.), dünnblättrige, 4.
f. Pyrenäen.

tuberosa Spgl., v. *Bunium alpinum*, p. 82, II.

Walpersia Reifseck, (Dr. Walpers in Berlin, Heraus-
geber d. Repertor. botan. system. etc.).

spicata Endl. v. *Phylica* Sect. IV. p. 518, II.

Waltheria indica L. (= *americana* L. = *angustifolia*
L. = *arborescens* Cavan. = *corchorifolia* P. = *erio-*
clada DC. = *ferruginea* St. Hill. = *gracilis* St. Hil.
= *lanata* St. Hil. = *microphylla* Cav. = *obtus-*
et pedunculata W. herb.).

Warneria canadensis Mill., v. *Hydrastis canadensis*.

Watsonia Ker, Watsonie.

aletroides Ker, (= *Jacquini* P. = *tubulosa* P.).

brevifolia Ker, (= *hyacinthoides* P.).

humilis Ker, (= *laccata* P. = *Meriana* Ker var. Spgl.).

tigrina Eckl., tigerstreifige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.
plantaginea Ker etc., v. *Micranthus alopecuroides*
etc., p. 405, II.

Webbia DC. (P. B. Webb, bereiste Spanien und die
canarischen Inseln in botanischer Hinsicht), XIX. II.,
Compositae-Corymbiferae.

pinifolia DC. (= *Conyza canescens* Thbg. = *C. pini-*
folia Lam. = *Vernonia pinifolia* Less.), kieferblätte-
rige, 4. ♀. k. Cap d. g. Hoffn.

Webbia floribunda Spach, *heterophylla* Spach, (= *canariensis* Berth.), v. *Hypericum floribundum et canariense*.

Webera coriacea Wall., v. *Ixora coriacea*, p. 327, II.,
cymosa W., v. *Canthium didymum* Nachlese, *corym-*
bosa W. (= *cerifera* Moon), v. *Stylocorina Webera*,
p. 711, II.

Wedelia Jacq., Wedelie.

frutescens Jacq., non Spgl. (= *Polymnia Wedelia* L.,
non Mill.), strauchige, ♀. w. Carthago.

reticulata DC. (= *frutescens* Spgl. = *Jacquini* Rich.),
netzförmige, ♀. w. Porto Rico.

Weigeltia A. DC. (Weigelt, ein armer Arzt u. Botaniker
aus dem sächs. Erzgebirge, bereiste Surinam u. starb
dasselbst 1828, ein fleißiger Pflanzensammler), IV. 1.,
Myrsinaceae.

myrianthos A. DC. (= *Wallenia myrianthos* Rchb. =
Salvador. surinam. Spgl. fil.), tausendblumige, ♀. w.
Surinam, Guiana, Brasilien.

- Weinmannia fraxinea* Sm., v. *Pterophylla fraxinea*, p. 570, II.
- Weldenia** Schult. fil. (Frhr. v. Welden, k. k. östreich. General, eifriger u. kenntnißreicher Botaniker), VI. 1., ?Bromeliaceae.
candida Schult. fil., weißglänzende, 4. w. Mexico.
Wellingtonia Meisn., v. *Meliosma* Nachlese.
Welwitschia Rchb., *densifolia* Rchb. etc., v. *Gilia* Sect. I. p. 262, II.
- Wendlandia** Bartl., non W. (J. C. Wendland † und H. L. Wendland, beide Gartenmeister zu Herrenhausen bei Hannover, kenntnißr. Botaniker und Gärtner).
paniculata DC. (= *Rondeletia paniculata* Roxb., p. 693).
Wensea pyramidata Wendl., v. *Pogostemum plectranthoides*, p. 639.
- Werneria** rigida H. B. K. (= *frigida* DC. = ? *Arnica peruviana* P. = ? *Doronicum peruvianum* Lam.).
- Westonia** Spgl. (= *Goetzea* Rchb.), *Westonia*, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.
humifusa Spgl. (= *Cleome prostrata* Hort. = *Dillwynia trifoliata* Roth, = *Glycine humifusa* W. = *G. leptocarpa* Grah. = *G. Harpelema* Jacq. fil. = *Hosackia indica* Grah. = *Lotus indicus* Desv. = *Rothia trifoliata* P. = *Trigonella indica* L.), niedergestreckte, ☉. w. m. f. Ostindien.
- Westringia** Sm., *Westringie*.
brevifolia Benth., kurzblättrige, ♀. k. t. Van Diemens Land.
rosmariniformis Sm. (= *rosmarinacea* Andr. = *Cunila frutescens* Don, = *C. fruticosa* W.).
- Whitfieldia** Hook. (Whitfield, engl. Naturforscher u. Reisender), XIV. II., Acanthaceae.
lateritia Hook., blasfmennigrothe, ♀. w. Sierra Leone.
- Wiborgia** Roth, non Thbg., *Wiborgie*.
brachystephana * (= *Galinsogea brachystephana* Hort. Berol.), kurzchronige, ☉. f. ? Südamerika.
Wiborgia obcordata Thbg., *floribunda* E. Mey., *sericea* Thbg., v. *Loethainia floribunda*, *obcordata*, *sericea*, p. 883 et p. 369, II.
Wickstroemia fruticosa Schrad., v. *Gordonia semi-serrata*, p. 272, II.
- Widdringtonia** Endl., *Widdringtonie*, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.
cupressoides Endl. (= *Pachylepis cupressoides* Brongn. = *Thuja cupressoides* L. mant. = *T. aphylla* Burm. = *Cupressus africana* Mill.), cypressenähnliche, ♀. k. Cap d. g. Hoffn.
juniperoides * (= *Cupressus juniperoides* L. = *Taxodium capense* Loud. = *T. juniperoides* Rich, p. 799, = *Pachylepis juniperoides* Brongn. = *Schubertia capensis* Spgl.).
Wierzebickia Rchb., *laricifolia* Rchb., *striata* Rchb., v. *Alsine laricifolia*, *recurva*, p. 39.
Willdenowia Cav., non Thbg., *glandulosa* Cav., v. *Schlechtendalia glandulosa*, p. 641, II.
Willemetia africana Brongn., v. *Noltea africana*, p. 438, II.
Willemetia Maerkl., *arenaria* Maerkl., v. *Kochia arenaria*, p. 438, *eriophora* Moq. Tand. etc., v. *Echinopsilon eriophorum* etc., p. 214, II.

Windsoria poaeformis Nutt., v. *Uralespis cuprea*, p. 750, II.

Winterana lanceolata Poir., v. *Tasmania aromatica*, p. 719, II.

Wistaria Loud. Torr. (*Wisteria* Nutt.).

Backhousiana Hort. angl. (= *Glycine Backhousiana* Hort.), Backhous's, f. Sch. k. f. b. ? Japan, China.

brachybotrys Sieb. et Zuccar., kurztraubige, f. Sch. k. f. b. Japan.

frutescens DC. (= *speciosa* Nutt. = *Apios frutescens* Pursh, = *Glycine frutescens* L. = *Thyrsanthus frutescens* Ell.) b) fl. pleno, β) *macrostachya* Nutt.

japonica Sieb. et Zucc., japanische, f. Sch. k. f. b. Japan. Außerdem werden in den Pflanzenverzeichnissen der Gärten noch eine *W. atrosanguinea* mit abfallenden Blättern u. eine *rosea* von Ceylon erwähnt.

Withania Pauquy, Withanie, V. I., Solanaceae.

aristata Pauquy, (= *Atropa aristata* Poir. = *Physalis aristata* Ait., p. 620).

frutescens Pauquy, (= *suberosa* Pauquy, = ? *Atropa erecta* Zucc. ? = *A frutescens* L. = *Physalis suberosa* Cav.), strauchige, f. k. Spanien.

Witsenia L., *maura* Thbg. (= *tomentosa* Salisb.), *ramosa* Vahl, (= *fruticosa* Ker, = *Aristea fruticosa* P. = *Ixia fruticosa* L. fil.).

Wittelsbachia insignis Mart. et Zuccar., v. *Cochlospermum insigne*, p. 151, II.

Wollastonia biflora DC. (= *Acmella biflora* Speg. = *Adenostemma biflorum* Less. = *Verbesina biflora* L. *Wedelia biflora* DC.), p. 858.

Woodsia incisa Hook. et Grev., *mexicana* RBr., *Perriniana* Hook. et Grev., v. *Physematium incisum* etc, p. 521, II.

Woodwardia virginica Sw. (= *Doodia* Presl).

Wrightia RBr., Wrightie.

coccinea Sims, (= *Nerium coccineum* Roxb.).

mollissima Wall., weichste, f. w. t. Nepal, Ostindien.

Wulffia Neck., DC., Wulffie.

stenoglossa DC. (= *Chakiatella stenoglossa* Cass. = *Chylocladia sarmentosa* Rich. = *Coreopsis baccata* L. fil. = *Helianthus sarmentosus* Rich. = *Pascalina baccata* Speg. = *Verbesina membranifolia* Poir. = *V. oppositifolia* Poir.), schmalzungige, 4. w. Cayenne.

Wydleria DC. (Dr. Wydler, Prof. in Bern, früher in Genf, reiste in den Antillen), V. II., Umbelliferae.

chilensis, Fisch. et Trautv. (= *Apium chilense* H. Par.), chilesische, f. k. Chili.

Xanthium T., *macrocarpum* DC. (= *brasilicum* Arrabida, = *echinatum* Murr. = *italicum* Moretti = *orientale* L. var. ?). β) *maculatum* Rafin. (= *occidentale* Bertol. = *orientale* Cav.), γ) *canadense* Mill. (= *americanum* Walt. = *cuneatum* Mill.).

Xanthogalum Lallemand., Gelbmilchdolde, V. II., Umbelliferae.

purpurascens Lallemand., purpurfarbige, 4. f. Iberien.

Xanthorrhiza apiifolia L'Her. (= *simplicissima* Pursh).

Xanthorrhoea hastilis Sm. (= *resinosa* P.).

Xanthosia Rudge, Gelbfilzdolde.

rotundifolia DC. (= *Cruciella candida* Leschen. = *Leucolaena rotundifolia* Benth.).

tridentata DC. (= *Leucolaena tridentata* DC.), dreizählige, f. t. Neuholland.

Xanthosoma Schott, Endl., Gelbzehrwurz, XXI. ix., Aroideae.

?belophyllum Kunth, (= *Caladium belophyllum* W. = *C. acuminatum* Dietr.), spitzblättrige, 4. w. ?

edule Schott, (= *Caladium edule* Mey.), genießbare, 4. w. Essequebo.

Jacquini Schott, (= *Arum xanthorrhizon* Jacq. = *Caladium xanthorrh.* W., p. 143), Jacquin's, 4. f. w. Antillen.

lividum Endl. (= ?*violaceum* Hort. Cels. = *Caladium livide-vaginatatum* Hort.), schlagblaue, 4. w. Südamer.

sagittifolium Schott, (= *Arum sagittif.* L. = *Caladium sagittae-folium* Vent., p. 143).

variegatum Schott, bunte, 4. w. ?

Xanthoxylon Sm., Zahnweh(Gelb)holz.

Clava Herculis L. (= *caribaeum* Lam. = *carolinianum* G.).

Lamarckianum Cham., Schltl. (= *triphyllum* G. Don, = *Evodia triphylla* DC. = *Fagara triphylla* Lam., non Roxb.), Lamarck's, f. w. Philippinen.

Roxburghianum Cham., Schltl. (= *triphyllum* Wight, = *Evodia triphylla* DC. ex parte, = *Fagara triphylla* Roxb.), Roxburgh's, f. w. Ostindien.

Nicht hinlänglich bekannt: rufescens Dsf.

Xenopoma obovatum W., v. *Micromeria obov.*, p. 407 II.

Xeranthemum L., Papier-(Stroh-)blume.

cylindraceum Sm. (= *annuum* Scopol., non L. = *cylindricum* Speg. = *sesamoides* Gay, = *Chardinia cylindrica* Desv. = *Xeroloma foetidum* Cass.).

inapertum W. (= *annuum* L. = *erectum* Presl, = *foetidum* Mch. = *incomptum* Cass.).

Xerobius lanatus Cass., v. *Egletes bellidifolia*.

Xerobotrys cordifolia, *glauca*, *tomentosa* Nutt., v. *Arctostaphylos cordifol.*, *glauc. et toment.*, p. 73.

Ximenia lanceolata DC. v. *Cyminosma pedunculata*.

Xiphidium Loeffl., Schwertelsimse.

albidum Lam. (= *album* W. = *laevigatum* W. herb. = *floribundum a* Sw.).

rubrum D. Don, (= *Ornithogalum rubrum* R. et P.), rothe, 4. w. Peru. Ob kultivirt?

Xiphium Mill., Schrk., *gramineum* Schrk., *Güldenstädtii* Schrk. etc., v. *Iris graminea* Güldenst. etc.

Xiphocarpus candidus Presl, v. *Tephrosia cand.*, p. 800.

Xiphotheca axillaris Eckl., Zeyh., *sericea* Eckl., Zeyh., *tomentosa* Eckl., Zeyh., *villosa* Eckl., Zeyh., v. *Priestleya axillaris* etc., p. 655.

Xyliia Benth., Holzschote, XVI. vii. (XXIII. i.), Leguminosae-Mimosaceae.

dolabriformis Benth. (= *Acacia xylocarpa* W., p. 6, = *Inga dolabriformis* et *lignosa* Grah. = *I. xylocarpa* DC. = *Mimosa Acl* Blanco, = *M. xylocarpa* Roxb.), hobelförmige, f. w. Ostindien, Philippinen.

Xylobium Lindl., Holzorche.

?foveatum v. Houtte, grubige, 4. w. Südamerika.

Houttei Hort. belg., van Houtte's, 4. w. Südamerika.

lineare v. Houtte, gleichbreite, 4. w. Südamerika.

- Xylomelum** Sm., Holzkapsel.
occidentale RBr., westliche, f. t. — Westl. Neuholland.
pyriforme Sm. (= *salicinum* Cunningh.).
Xylon leoninum Mch. (= *strictum* Medic.), *religiosum* Medic., v. *Gossypium hirsut. et relig.*
- Xylophia** frutescens Aubl. (= *muricata* Arrab., non L. = *setosa* Poir.).
Xylopleurum Nuttallii Spach, v. *Oenothera speciosa*, p. 555.
Xyphidium sordidum Salisb., v. *Iris lusitanica*, p. 422.
- Xyris** L., Schwertelgras.
americana Vahl, (= *coerulea* Lam. = *Jupicai* Rich., non Mch.).
operculata LaBill. (= *anceps* β Lam.).
Purshii Sweet, (= *indica* Pursh), Pursh's, 4. k. Nordam.
Xystidium Trin., *barbatum* Presl, v. *Perotis latifolia*, p. 608.
- Youngia** Cass., mauritiana DC. (= *lyrata* Cass. = *Prenanthes japonica* Hort., non L.).
 β) *integrifolia* Cass.
- Yucca** L., Palmenlilie.
angustifolia Pursh, Nutt., var. fol. albo-marginatis.
arcuata Haw. (= *armata* Haw., Auct.).
concava Haw., Nordamerika, p. 861.
crinifera Hort. belg., haartragende, f. t. ? Südamerika.
glaucescens Haw. (= *angustifolia* Hort. angl.).
graminifolia Zuccar., Karw., grasblättrige, 4. t. k. Mexico.
Hartwegii Hort. angl. et belg., Hartweg's, 4, t. Mexico.
laetevirens Karw., freudiggrüne, 4. t. k. Mexico.
pitcairniifolia Karw., pitcairnienblättrige, 4. t. k. Mexico.
recurva Salisb. (= *recurvifolia* Pursh).
spinosa H. B. K. (= *horrida* Humb.), dornige, f. t. k. Neuspanien.
stenophylla Steud. (= *angustifolia* Karw., non Pursh), schmalblättrige, 4. t. k. Mexico.
 In van Houttes Etablissement horticole wird noch eine *Y. Mensiesii* u. *spiralis* (= *Dracaena dioscoreoides* = *D. elephantipes*) kultivirt.
acrotricha Schiede, *longifolia* Karw., *serratifolia* Karw., v. *Dasylyrion acrotriche*, *longifolia* et *serratifolia*, p. 191, II.
- Zahlbruckneria* Rehb. v. *Saxifraga* Sect. VII. p. 638, II.
- Zalacca** Reinw., Blume, Zalaccapalme, VI. 1., Palmae.
assamica Lodd., assamische, f. w. Ostindien, (Nepal).
Blumeana Mart. (= *edulis* Blume, = *Calamus Rotang* η L. spec. = *C. Zalacca* G., p. 143), Blume's, f. w. Ostindien.
Rumphii Lodd., Rumph's, f. w. Ostindien.
Wallichiana Mart. (= *edulis* Mart., Wall. = *Calamus Zalacca* Roxb.), Wallich's, f. w. Malacca, Pegu, Sumatra.
Zaluzianskya villosa Schm., v. *Nycterinia africana*, p. 440, II.
- Zamia** L., Miq., Keulpalme.
caribaea Lodd., caribäische, f. w. Westindien.
concinna v. Houtte, nette, f. w. ? Westindien.
debilis Ait. (= ? *pumila* Poir. = *prunifera* Lodd.).

Zamia

- Fischeri* Miq. (= *tenuifolia* Fisch.), Fischer's, β . w. Westindien.
- integrifolia* Ait. (= *pumila* Hort.).
- Kicksii* Miq., Kicks's, β . w. Cuba.
- Leiboldii* Miq., Leibold's, β . w. Mexico.
- Loddigesii* Miq. (= *caracasana et serrulata* Lodd.), Loddiges's, β . w. Westindien.
- macrophylla* Lodd., großblättrige, β . w. Mexico.
- Maeleni* Miq., Maelenische, β . w. Mexico.¹⁾
- mexicana* Lodd. (= *Ceratozamia mexicana* Ad. Brongn.), mexicanische, β . w. Mexico.
- muricata* H. B. K., W., weichstachelige, β . w. Neugranada, Mexico.
- β) *angustifolia* Miq., γ) *obtusifolia* Miq. (= *latifolia* Lodd.).
- Otonis* Miq., Otto's, β . w. Cuba.
- pumila* L. (= *debilis* Lodd.), Westindien, Florida, Carolina.²⁾
- pygmaea* Sims, (= *praemorsa* Hort.).
- tenuis* W. (= *dentata* Voigt).
- angustifolia* Jacq., *furfuracea* Ait., *latifolia* Lodd. Westindien, *media* Jacq. s. p. 862. Alle übrigen daselbst verzeichneten s. *Encephalartos*, p. 220—221, II.
- spiralis* Salisb., v. *Macrozamia spiralis*, p. 380, II.
- Zappania lantanoides* Lam. (= *odorata* P.), etc., v. *Lippia asperifolia*, p. 364, II.
- Zarabellia rhomboidea* Cass., v. *Melampodium divaricatum*, p. 505.

Zea L., Mais.

- hirta* Bonaf., rauher, \odot . f. Californien.
- Mays* L. (= *vulgaris* Mill.). Var.: *alba* Mill., *altissima* Gmel., *americana* Mill., *cinerea* Hort., *cryptosperma* Bonaf., *erythrolepis* Bonaf., *guasquinensis* Bonaf., *graeca* Hort., *hirta* Bonaf., *maxima* Hort., *mexicana* Hort., *minima* Bonaf., *minor* Gmel., *noveboracensis* Bonaf., *pensylvanica* Bonaf., *praecox* P., Bonaf. (= *aestiva* Hort.), *rostrata* Jacq. fil., Bonaf., *rubra* Bonaf., *versicolor* Bonaf.

Zehneria suavis Endl., v. *Pilogyne suavis*, p. 623.

Zelkova Spach, Zelkowaulne, V. II., Ulmaceae.

- crenata* Spach, (= *Planera carpinifolia* Wats. = *P. crenata* Mchx. = *P. Richardi* Mchx., p. 631, = *Rhamnus carpinifolius* Pall. = *Ulmus crenata* Hort. Par. = *U. nemoralis* Ait. = *U. polygama* Rich.), kerblättrige, β . f. Südcampus, Nordamerika.

Zenobia D. Don, speciosa D. Don, β) dealbata D. Don, (= *Andromeda dealbata* Lindl. = *A. pulverulenta* Bartr.).³⁾

Zeocriton commune P. B. etc., v. *Hordeum zeocriton* etc.

Zephyra D. Don, Zephyrlilie, VI. I., Liliaceae-Asphodeleae.

elegans D. Don, zierliche, 4. t. Peru.

Zephyranthes Herb., Zephyrblume (Schwertel).

candida Herb. (= *nivea* D. Dietr.).

1) Nach Miquel = *Dion edule* Lindl. s. Nachlese.

2) „Species in caldariis frequens, variis nominibus militans“ Miq.

3) Die von D. und G. Don aufgestellten, von *Andromeda* gespaltenen und von DeCandolle angenommenen Gattungen, werden als solche von Endlicher und Lindley nicht anerkannt.

Zephyranthes

- grandiflora* Lindl. (= *Amaryllis Lindleyana* Schult.).
 β) *carinata* Herb. (= *Amaryllis carinata* Spgl.).
lilacina Liebm. (= *grandiflora* Hort.), lilafarbige, 4.
 Zw. k. Mexico.
lutea Herb. (= *Amaryllis lutea* Pav., non L. = *A. lutescens* Herb.), gelbe, 4. Zw. w. t. Peru.
pumila D. Dietr. (= *Amaryllis pumila* Spin.), niedrige, 4. Zw. k. t. ?
rosea Lindl. (= *carnea* D. Dietr. = *Amaryllis carnea* Schult.).
sessilis Herb., sitzende, 4. Zw. k. Mexico.
 α) *verecunda* Herb. (= *Amaryllis verecunda* Schult.),
 β) *striata* Herb. (= *Amaryllis striatula* Schult. = *A. minuta* H. B.), γ) *Ackermanniana* Herb.

Zetocapnia geminiflora Lk. et Otto, v. *Bravoa geminiflora*, p. 131.

Zexmenia Llav., Anagramm v. Ximenesia.

- monocephala* * (= *Lipochaeta monocephala* DC. = *Verbesina fruticosa* Hort. Par. olim.).
tagetiflora D. Don, (= *Lipochaeta tagetiflora* DC.).

Zeyheria Mart. (J. M. Zeyher, großherzogl. badisch. geh. Hofrath u. Gartendirector zu Schwetzingen bei Heidelberg, † 1843), XIV. II., Bignoniaceae.

- montana* Mart. (= *Bignonia Digitalis* Velloz. = *Spathodea montana* Spgl.), bergliebende, 5. w. Brasilien.
Z. fluviatilis Miq., v. *Tabebuja fluviat.*, p. 716, II.

Zichya Hügel, Benth. (Gräfl. ungarische Familie v. Zichy, Gönner u. Beförd. der Gartenkunst etc.).

- coccinea* Benth. etc. v. *Kennedyia* Sect. II. p. 436, 881 et p. 334, II.

Zieria Sm., Zierie.

- arborescens* Sims, baumartige, 5. 5. k. t. Neuholland.
lanceolata RBr. (= *Smithii* Andr. = *trifoliata* Bonpl.).

Zingiber G., Ingwer.

- Cassumunar* Roxb. (= *Cliffordiae* Andr. = *luridum* Salisb. = *purpureum* Roscoe, = ? *xantorrhizon* Hort. Hafn. = ? *Amomum Cassumunar* Targ. Tozz. = *C. Roxburghii* Colla).
flavescens Lk., gelblicher, 4. w. Ostindien.
Zerumbet Rosc. (= *spurium* Koen. = *Amomum Zerumbet* L.).

- minus* G., v. *Amomum Cardamomum*, p. 48, ? *sylvestre* G., v. *Hellenia alba*, p. 293, II.

Zinnia L., Zinnie.

- ambigua* Hort. Berol., zweifelhafte, ☉. m. f. ?Hybride.
Zizania miliacea Mchx. (= *aquatica* W. = *Reimaria diffusa* Spgl.), 4. nicht ☉.

- clavulosa* Mchx. (= ? *aquatica* L. = *palustris* L.)
 et *fluitans* Mchx., v. *Hydropyrum esculentum* et *fluitans*.

Zizia K., Zizie.

- integerrima* DC. (= *Sison integerrimus* Spgl. = *Smyrnum integerrimum* L., p. 765).

- Z. cordata* K., v. *Thapsium cordatum*, p. 726, II.

- Ziziphora** L., Zizikraut.
capitata L. (= *compacta* Friv.).
clinopodioides Lam. (= *capitata* et *tenuior* Falk. = *Cunila* Dsf. = *Cunila capitata* L. = ? *Thymus lucidus* Ehrh. = *Th. punctatus* W.), 4. 5. p. 864.
 β) *media* Lk., Benth. (= *serpyllacea* Bot. mag.).

Ziziphora

- serpyllacea MB. (= *clinopod.* var. Benth. = *Mussini* Adams, = *odoratissima* Lodd. = *Thymus lucidus* Hort.).
 tenuior L. (= *spicata* Cerv. = *serpyllacea* Tenore),
 dünnes, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Südrussland.
tenuior Flor. Alt. excl. Syn., *taurica* MB., v. *Faldermannia parviflora et taurica*, p. 242, II.

Zizyphus T., Judendorn.

- Jujuba Lam. (= *mauritiana* Wall. = *Sororia* Schult. = *trinervia* a Roth, = *Rhamnus Jujuba* L.).
 Lotus Lam. (= *saliva* G. = *sylvestris* Mill. = *Rhamnus Lotus* L.).
 Napeca W., non Lam. (= *ferruginea* Heyne, = *Rhamnus Napeca* L.).
 rotundifolia Lam. (= *microphylla* Roxb. = *nummularia* Wight et Arn. = *pygmaea* Herb. madrit.).
 Spina Christi Lam. (= *africana* Mill. = *Napeca* Lam., non W.).
 vulgaris Lam. (= *Jujuba* Mill. = ?*nitida* Roxb. = *officinarum* Medic. = *saliva* Duh., Dsf.).
 xylopyrus W. (= *Caraculla* Roxb. = *elliptica* Roxb. = *orbicularis* Schult. = *rotundifol.* Roth, = ?*ruminata* Wall. = *Rhamnus xylopyrus* Retz), holzfrüchtiger, 5. w. Ostindien.
 Nicht hinlängl. bekannt: *incanus* Brotero, Cabo verde.
incurva Bot. mag., nec Roxb. (= *virgata* D. Dietr.),
Paliurus W., v. *Paliurus virgatus et australis*, p. 581 et p. 472, II.

Zoegea L., Zoegea.

- aristata DC. (= *calendulacea* Auct.), grannige, ☉. f. Orient.

Zollikoferia DC., non N. E. (Zollikofer, Arzt u. Botaniker in St. Gallen), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

- chondrilloides DC. (= *Leontodon mucronatum* Forsk. = *Scorzonera resedifolia* L. = *Sonchus Bocconi* Jan, = *S. chondrilloides* Dsf., p. 771).
 pumila DC. (= *Picridium cernuum* Dufour, = *Podospermum pumilum* Loud. = *Scorzonera glandulosa* Pourr. = *S. pumila* Cav. = *Sonchus scorzoneraeformis* Spgl.), kleine, ♂. 4. f. k. Spanien, ? Arabien.
Zollikofera hieracioides N. E., v. *Willemetia aparigioides*, p. 857.

Zornia J. F. Gmel., Mchx., Zornie.

- capensis P. (= *heterophylla* Sm.).
 ceylanica Spgl. (= *conjugata* Sm. = *zeylonensis* P.).
 tetraphylla Mchx. (= *bracteata* Gmel.).
Zornia Mch., *canescens* Mch., *peltata* Mch., v. *Lallemantia canescens*, *peltata*, p. 881, *nutans* Mch. etc., v. *Dracocephalum nutans* etc.

Zostera marina L. (= *maritima* G. = *oceanica* Web.).**Zozimia** Hoffm. (= *Zosimia* Auct.), p. 865.

- absinthifolia DC. (= *orientalis* Hoffm.).
Zuccarinia Spgl., non Blume, *ornata* Spgl., v. *Jackia ornata*, p. 327, II.

Zygadenus L. C. Rich., Mchx. (= *Zigadenus* Auct.), Jochblümchen.

- glaberrimus L. C. Rich. (= *Helonias glaberrima* Lk. En.), kahles, 4. f. Nordamerika.
 ?*β*) *bracteatus* Schult. fil. (= *Helonias bracteata*, Sims).

Zygadenus

hybridus Endl. (= *Leimanthium hybridum* R. et S.),
Bastard-J., 4. f. Nordamerika.

virginicus Endl. (= *Helonias virginica* Sims, = *Leimanthium virgin.* W. = *Melanthium polygamum* Desr.),

virginisches, 4. f. Nordamerika.

glaucus Nutt. (= *commutatus* R. et S.), *sibiricus*
Endl., v. *Anticlea glauca et sibirica*, p. 40, II.

Zygomenes axillaris Salisb., v. *Cyanotis axillaris*.

Zygotomeris flava Moç., Sess., v. *Amicia Zygotomeris*, p. 47.

Zygopetalum Hook., Jochstendel.

africanum Hook., afrikanischer 4. w. Sierra Leone.

conchaceum Hffg. (= *cochleare* Lodd., non Lindl.),
muschelähnlicher, 4. w. Brasilien.

crinitum Lindl., b) *coeruleum*, c) *roseum*.

Mackai Hook., b) *minus*, c) *pallidum*, d) *striatum*.

maxillare Lodd., Lindl., b) *purpureum*.

mandibulare Hffg. (= *maxillare* Cels, nec Hort. angl.),
kieferähnlicher, 4. w. Brasilien.

pubescens Hffg., weichhaariger, 4. w. Brasilien.

velutinum Hffg., sammthaariger, 4. w. Brasilien.

Zygochloa L., Doppelblatt.

Fabago L. (= *Fabago alata* Mch. = *F. major* D. Don),
bohnenähnliches, 4. f. Caucasus, Sibirien, Orient,
Nordafrika.

latifolium Fisch., Mey. et Lallemand, breitblättriges, 4. f.
Soongaria.

Lichtensteinianum N. E., Lichtenstein's, 4. k. Cap der
guten Hoffnung.

sessilifolium L., β) *fulvum* Mill., Hffg.

spatulatum D. Don, spatelförmiges, β . k. t. Cap der
guten Hoffnung.

prostratum Thbg. (= *?lanatum* W.), v. *Seetzenia*
africana, p. 652, II., *fruticulosum* DC., v. *Roepertia*
fruticulosa Nachlese.

Zyphelis amoena Cass. (= *taxifolia* N. E.), v.
Mairia taxifolia, p. 381, II.

Berichtigungen.

Seite 6 lies: *Aceratium Ganitri* statt *A. Genitri*.

- 37 - *Annesorrhiza* Cham., Schldt., Aniswurz statt
Zahlwurz. Dabei als Synonyme zwei Mal *Oenan-*
the statt *Oenothera*.

- 161 - *Coriandrum melphitense* statt *C. mephitense*.

- 240 ist die Bemerkung wegen *Araucaria Bidwilli* Hook.
zu streichen, da diese Species eine ächte *Arauc-*
aria ist.

- 371 lies: *Lophostemon depressum* Schott statt *L.*
depressa.

- 691 - *Sphaeromorphaea* statt *Spaeromorphaea*.

- 758 - *Veronica panormitana* statt *V. ponormitana*.

In der **Arnoldischen Buchhandlung** in Dresden und Leipzig sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:

G. Heynhold,

NOMENCLATOR BOTANICUS HORTENSIS,

oder

alphabetische und synonymische Aufzählung der in den Gärten Europa's kultivirten Gewächse, nebst Angabe ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer Dauer und Kultur; nebst einer Vorrede

von

Dr. L. Reichenbach.

Lang 8. geb. 4 Thlr.

G. Heynhold,

das natürliche Pflanzensystem.

Ein Versuch, die gegenseitigen Verwandtschaften der Pflanzen aufzufinden, durch Andeutung ihrer Bildungsstufen, Uebergänge, Ausnahmen, mit Berücksichtigung der arzneilichen und überhaupt anwendbaren Gewächse, nebst einer historischen Einleitung.

Gemeinfasslich dargestellt und zunächst für angehende Apotheker, Aerzte etc. bearbeitet.

Mit einer Vorrede

von

Dr. H. Ficus.

gr. 8. 1 Thlr.

Flora der Gegend um Dresden.

Erste Abtheilung: **Phanerogamie**,
enthaltend die Pflanzen, deren Frucht auf eine vorausgegangene deutliche Blüthe folgt

von

Dr. H. Ficus und **G. Heynhold.**

Dritte vermehrte Auflage.

Nebst einer geognostischen Karte der Umgegend von Dresden.

8. carton. 2 Thlr. 15 Ngr.

Zweite Abtheilung: **Kryptogamen**,

von

Dr. H. Ficus und **C. Schubert.**

Mit 3 Kupfertafeln.

8. carton. 2 Thlr. 15 Ngr.

Tr. J. Seidel,

die **RHODORACEAE** oder **RHODODENDREAE**,
eine Anleitung zur Cultur dieser Pflanzenfamilie,
nebst einer systematischen Beschreibung der Gattungen und Arten derselben,

von

G. Heynhold.

Zweite Ausgabe.

8. broch. $\frac{1}{3}$ Thlr.

Ausführliche Anweisung

zur richtigen Pflege und Behandlung

grofser Orangerieen,

aus eigenen langjährigen Erfahrungen niedergeschrieben

von

C. A. Seidel.

8. broch. $\frac{1}{4}$ Thlr.

C. A. Rossmäster (Prof.),

das Wichtigste

vom inneren Bau und Leben der Gewächse,

für den praktischen Landwirth fasslich dargestellt.

Mit 4 Steindrucktafeln.

gr. 8. broch. $1\frac{1}{3}$ Thlr.

Dr. H. G. L. Reichenbach,
der deutsche Botaniker

Erster Band:

Das Herbarienbuch.

8. broch. 2½ Thlr.

Dieses Buch enthält auf 35 enggedruckten Bogen: 1) Erklärung des ganzen natürlichen Pflanzen-Systems, 2) systematische Aufzählung aller bis jetzt bekannten, auch der neuesten Pflanzengattungen und Untergattungen, 3) Auflösung der Synonymen, wie dieselbe noch nirgends gegeben worden ist, und 4) ausführliches Register über alle Gattungen und Untergattungen. Dieses Werk bedarf, bei dem gänzlichen Mangel eines ähnlichen und bei seiner Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit für Anfänger und für Meister in der Botanik keiner weiteren Empfehlung.

Hierzu erschienen durch Besorgung desselben Verfassers:

Herbarien-Etiquetten.

Uebersicht aller natürlichen Pflanzenfamilien, Zünfte und Gruppen Jussieu's und aller neueren Autoren mit fortlaufender Nummerirung aller Gattungen. Zur grössten Zeitersparniss für Herbarien-Besitzer zusammengestellt.

7 gr. Bogen auf starkem Papier. ⅓ Thlr.

In der That dürften beide Werke in ihrer praktischen Anwendung thätigen Botanikern Jahre ihres Lebens ersparen und wurden, nachdem der Verfasser durch deren Gebrauch gleiche Erfahrungen gemacht hatte, auf den Wunsch seiner Freunde zum Nutzen Anderer gedruckt.

Dr. H. G. L. Reichenbach,

FLORA SAXONICA.

Die Flora von Sachsen,

ein botanisches Excursionsbuch

für das Königreich Sachsen, das Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen, die Fürstlich Schwarzburgischen und Reufsichen Lande, die Herzogthümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen die Provinz Sachsen und die Preussische Lausitz.

Nebst

Schlüssel zum erleichterten Bestimmen der Gattungen nach Linné's Sexualsystem.

Zweite Ausgabe

mit vollständigem Register der deutschen und lateinischen Namen und ihrer Synonymen.

8. cart. 2⅓ Thlr.

Für die Besitzer der ersten Auflage dient:

Register zur Flora von Sachsen,

enthaltend die deutschen und lateinischen Namen der Gattungen und Arten nebst Synonymen,

von

Dr. H. G. L. Reichenbach.

8. broch. ⅓ Thlr.

Dr. H. G. L. Reichenbach,

Handbuch

des natürlichen Pflanzensystems

nach allen seinen Classen, Ordnungen und Familien,
nebst naturgemäßer Gruppierung der Gattungen;

oder

Stamm und Verzweigung des Gewächsreichs;

enthaltend

eine vollständige Charakteristik und Ausführung der natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen in ihrer Richtung aus der Metamorphose und geographischen Verbreitung, wie die fortgebildete Zeit deren Anschauung fordert.

4. broch. 3 Thlr. 22½ Ngr.

Dr. G. H. L. Reichenbach,
Amoenitates botanicae Dresdensis.

Specimen primum
observationes in myosotidis genus continens.
gr. 8. $\frac{1}{6}$ Thlr.

Gäa von Sachsen

oder

physikalisch-geographische und geognostische Skizze
für das Königreich Sachsen, das Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach,
die Großherzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-
Meiningen, die Fürstlich Schwarzburgischen und Reufsichen Lande, die Herz-
zogthümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen, die Provinz
Sachsen und die Preussische Lausitz, bearbeitet von

Dr. B. Cotta, Dr. H. B. Geinitz, A. v. Gutbier, C. F.
Naumann, Dr. L. Reichenbach und M. A. Schiffner.

8. broch. $1\frac{1}{4}$ Thlr.

Dieses Werk dient als Einleitung zu Reichenbach's Flora von
Sachsen, weshalb wir es den Besitzern derselben empfehlen.

Mittheilungen

über

Flora, Gesellschaft für Botanik und Gartenbau
in Dresden.

Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von

C. Cr. Schramm.

Erstes bis drittes Heft.

gr. 8. geh. $1\frac{1}{2}$ Thlr.

Dr. B. Cotta,

Professor der Geognosie in Freiberg,

Grundriss der Geognosie und Geologie.

Zweite Auflage.

Mit einer Titelskizze, 76 eingedruckten Holzschnitten
und einer besonderen Beilage.

gr. 8. gut gebunden. 3 Thlr. 15 Ngr.

Anleitung

zum Studium der Thier- und Pflanzenwelt.

Ein Leitfaden

für

Lehrer an höheren Lehranstalten und zur belehrenden
Unterhaltung für gebildete Leser

von

E. A. Rossmäslcr.

Erster Theil: Das Thierreich.

(Als dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage von des Verfassers
„systematischer Uebersicht des Thierreichs.“)

Erste Lieferung.

gr. 8. broch. 1 Thlr.

J. J. Berzelius,

Lehrbuch der Chemie.

Fünfte umgearbeitete Original-Auflage.

Erster bis vierter Band.

Mit eingedruckten Holzschnitten, 2 Kupfertafeln und einem
besonderen Abdruck der Atomgewichtstafeln.

gr. 8. broch. Prän.-Preis 20 Thlr.

Diese neue Auflage eines classischen Werkes, deren erste drei
Bände die unorganische Chemie vollständig enthalten, schreitet
ihrer Vollendung rasch entgegen.

Dr. A. Sonnenburg,

Arithmonomia naturalis

seu de numeris in rerum natura tentamen e mineralogia,
botanice et zoologia illustratum cum tabula aenea.

4. 1 Thlr. 15 Ngr.

Dr. C. F. Naumann,
Anfangsgründe der Krystallographie.
Mit 25 Steindrucktafeln.
gr. 8. broch. 2½ Thlr.

Dr. H. B. Geinitz,
Grundriss der Versteinerungskunde.
Mit 28 Steindrucktafeln und 1 Tabelle.
Lexikonformat. gut geb. 8 Thlr.

Ueber das Studium der Botanik,
als eine der nützlichsten und angenehmsten Be-
schäftigungen für alle Stände.
12. 7½ Ngr.

C. F. Peschel,
Lehrbuch der Physik,
nach dem gegenwärtigen Standpunkte dieser Wissenschaft
bearbeitet, zum Gebrauche bei Vorlesungen auf höheren
Gymnasien und mit besonderer Berücksichtigung von Militär-
bildungsanstalten.

Erste Abtheilung:
Physik der wägbaren Stoffe.
Mit 5 Steindrucktafeln und 15 Tabellen.
gr. 8. broch. 2 Thlr.

Zweite Abtheilung:
Physik unwägbarer Stoffe.
Mit 8 Steindrucktafeln und 10 Tabellen.
gr. 8. broch. 4 Thlr.

Das Ganze mit 13 Steindrucktafeln und 25 Tabellen kostet
elegant gebunden 6 Thaler.

C. F. Mäser,
die Lyr a m S p a t e n,
vermischte Gedichte.
gr. 8. broch. 1 Thlr.

F. D. Reichel,
S t a n d o r t e
der
seltneren und ausgezeichneten Pflanzen der
Umgegend von Dresden.
16. broch. 7½ Ngr.

Ueber den Quincunx
als Grundgesetz der Blattstellung vieler Pflanzen,
von
Prof. Dr. C. Fr. Naumann.
Mit einer Steindrucktafel.
gr. 8. broch. 20 Ngr.

Allgemeine deutsche
naturhistorische Zeitung.

Im Auftrage der Gesellschaft Isis in Dresden und in Ver-
bindung mit den Herren H. B. Geinitz, H. Gössel, A.
F. Günther, v. Kiesewetter, E. Lösche, F. Reichenbach,
H. C. Richter und E. A. Rossmäslcr
herausgegeben

von
C. Tr. Sachse.
Mit eingedruckten Holzschnitten und 10 Steindrucktafeln.
Erster Jahrgang in 6 Heften. gr. 8. broch. 2 Thlr. 24 Ngr.
geb. 3 Thlr.
Zweiter Jahrgang in 6 Heften. gr. 8. broch. 3 Thlr.

